

# AETII MEDICI

## GRAECI CONTRACTAE EX

VETERIBVS MEDICINAE TETRABIBLOS,

hoc est, quaternio, siue libri uniuersales qua-  
tuor, singuli quatuor sermones com-  
plectentes, ut sint in summa  
quatuor sermonum  
quaterniones,

id est,

Sermones sedecim, per Ianum Cornarium  
Medicum Physicum Latine  
conscripti.



*Acceſſerunt in duos priores libros (quos de Simplicibus scripſit)  
Scholia, rei medicæ studioſis plurimū profutura, per Hugonem  
Solerium Sanionenſem, Medicū, nunc primum in lucem edita.*



LVGDUNI,

EX OFFICINA GODEFRIDI

ET MARCELLI BERIN-

GORVM FRATRVM,

M. D. XLIX.

# AMPLISSIMIS AC PRUDENTISSIMIS HONESTIS- SIMISQUE VIRIS, SENATVI, POPVLOQUE IMPERIALIS VRBIS FRANCFORDEN. IANVS CORNARIVS ME- DICVS PHYSI- CVS S. D.



ET IVM medicum Græcum iam decennium quum uertendum suscepis-  
sem, multum operæ precij mox ab initio facere mihi uisus sum. Tamen si e-  
nim fragmentum tantum, uenerandæ tamen illud uetustatis, mihi ob-  
gisset, attamen ex eo ipso colligebam non uulgare aliquod consilium illi ui-  
ro fuisse, sed institutum penitus optimum, & ab omnibus approbandum,  
totam uidelicet medicinam in breues quasdam summas contrahendi. Erat autem tum mihi,  
sicut plerisque omnibus aut or ignotus, nisi quòd Asulanorum apud Venetos familia, Græci  
exemplaris editionem pollicita erat, ante Hippocratis, & Galeni operum editionem. Itaq̃ e-  
tiam si fragmentum illud meum sex sermonum, ab octauo usq̃ ad decimum tertium, contem-  
ptibile uideri poterat, ut in publicum ederetur: & incertum esset ad quot libros uniuersales,  
aut sermones partiales, autor opus ipsum extendisset: tamen neuiquam suppressendum ra-  
tus inuentum thesaurum (sic enim tum mihi placebam) sex illos sermones in Latinam lin-  
guam à me conuersos edidi. Neq̃ male successit. Nam nouum & incognitum opus studiosi be-  
nigne exceperunt, per omnem adèò Europam, ut etiam Italia uisum sit, non paruum esse in-  
commodum, totum illum autorem non ad Latinos translatum extare. præsertim quum to-  
tum Græcum opus in aliquot exemplaribus in Italia superesset. Et tum sanè excitatus est  
quorundā magnorum & rectis studijs beneuolentiū Heroum stimulis Baptista Montanus,  
non incelebris apud Veronenses medicus, qui exemplarium illorum copia cōfusus, & priores,  
& posteriores, quos ego non habueram sermones, fragmento meæ translationis adiecit: & sic  
translationem meam suæ apud Venetos editioni inseruit. Et quia candore quodam hoc à se  
factum esse, in præfatione testatus est, ego uicissim illi hoc talionis uice rependam, quòd studio-  
sis cognoscendum propono: hætenus translationem illius, unā cum meâ lucem ferre potuisse.  
nam in posterum non erit, qui me iudice, uel meam priorem, uel illius conuersionem per o-  
mnia sequi debeat. Discipulus est prioris posterior dies. Honestissimum est certamen, non so-  
lum alios, sed etiam seipsum superare. Proinde totum opus Aëtij etiam nos adepti, illud de-  
nuò ex toto conuertendum suscepimus, non tantum quòd uideam, dum exemplaria alia plus,  
alia minus adscripta habent, unum aliquod certum sequendum esse: sed etiam ut ne amplius  
sit styli diuersorum interpretum in uno opere pugna. Et hoc meum consilium si Montano se-  
qui uisum fuerit, adèò non improbabo, ut ingentis candoris loco id habiturus sim, si etiam ipse  
totum Aëtij opus ex sua interpretatione legendum edet. Quapropter meam operam non ali-  
ter studiosis approbare uolo, quàm ut putent me nulla quàm publici commodi causa commo-  
tum, huc progressum esse, & sincerè optimum medicum emendatissimum, ac optime Latinum  
factum (quantum eius per me fieri potuit) inuulgasse. Tantumq̃ abest ut in præsens eius  
translationem, propter meæ editionem, superfluum uideri uelim, ut uehementer expectam et-  
iam illum, totum opus de suo denuò publicare. Et nisi fallor, hæc res non tam ad illius gloriam  
spectat, quàm publicam studiosorum utilitatem: præsertim eorum qui Latinam linguam so-  
lum nouerunt. Continget enim ipsis ex utriusque translationis collatione, ut ueram senten-



tiam asequantur. Atq; uinam etiam hi qui ex Hispanis altas de montibus umbras nobis u-  
trisque offundunt, & in alienis libris ingeniosi sunt, huc incumberent: ut similem, aut potiore  
(qualem ostendant) operam præstarent: plenis buccis studium hominum collaudarem. Iam  
quod illos facere iuuat, nemini prodesse uideo. Et reuera in quatuor uersibus, si quando ali-  
quid è suo exemplari, uelut potiore citat ille, plures errores in conuertendo admittit, quam in  
integrali sermone prioris editionis inueniuntur. Deinde lenissima quæque & nullius momenti  
notat. Verum ubi nodus aliquis incidit, ibi transitu uelut angue conspecto, & nihil hic secat  
Tenedia ipsius bipennis. Sed huc progredi uolebam. Hoc uolebam, expectandum mihi uideri,  
ut & ex Hispanis Latina Aëtij translatio extaret: quò sic studiosi medici, uel aucta, uel de-  
cortatam, aut etiam corruptam lectionem diuersorum Græcorum exemplarium cognosce-  
rent. Hispani suum in hac parte ducem, itemq; Itali suum haberent. Profectò mihi satis est, si  
Germanis meis mea & placent, & prosunt. Iam uerò eiusmodi cauillationibus nihil profici-  
tur, & in talibus annotationibus ut cūq; ueri inueniendi studium prætexitur: tamen hæ sunt  
ipsissima maligni ac morbidi ingenij nota. Facile est aliorum errores indicare: sed te ipsum  
inculpabilem præstes, si quid simile tentes, aut etiam in his annotandis, hic opus hic labor est.  
Et cognosco pennas ex corpore commentariorum meorum medicorum in Galeni <sup>natura rines</sup> li-  
bros conscriptorum, extractas, & sagittis illius adaptatas: ut uehementiore impetu in me fer-  
rentur. Non enim non uidebam ipse quæ mihi in mea translatione displicerent. Verum ea,  
quia potioris, aut alterius exemplaris copia deerat, interim ferri posse sperabam, donec clare  
à me ipso iudicaretur: id quod factum est mox in relatorum commentariorum editione: in  
quibus potissimos locos prioris meæ in Aëtio translationis indicavi ac retractavi. Et iam  
amplius fiet in huius repetitæ meæ translationis editione, quam ad duo exemplaria præuia à  
me conscriptam, & ad Galeni, ac Pauli lectionem collatam, in omnibus sequendam puto.  
Neq; curandum arbitror, si alicubi aliam exemplaria plura, uel pauciora habent, aut etiam  
ordine immutato. Hoc enim in eiusmodi aut oribus peculiariter contingere potest, ut certi loci  
ab alijs atq; alijs augeantur, aut imminuantur, dum quisq; postea uel sibi approbatæ addit,  
aut superflua iudicata derahit. Quod ipsum fortassis etia ab ipsis iustis scriptorum autori-  
bus aliquando fieri contingit. Hanc ipsam operam meam in urbe uestra, Viri Francforden-  
sæ me perfectam, uobis inscriptam ac dicatam esse uolui. Nam quum aliàs hoc inscribendi li-  
bros magnis principibus, ac urbibus munus, publice receptum sit: ego qui apud uos iam in  
quartum annum medicum Phisicum ago, neutiquam committere debui, ut ex scriptis meis  
nò eximium aliquod specimē (quale sanè hoc Aëtij à me Latine conscripti opus esse iudico)  
urbi uestræ peculiariter à me destinaretur: quò uestro grauissimo iudicio approbatum, maio-  
re gratia ac autoritate in publicum exiret. Atq; haud scio an post ulla alius imperij Roma-  
ni urbes, uestra respublica numerari debeat, tot insignibus ornamentis præ cæteris clara. Pri-  
mum enim quid præclarius urbi alicui contingere possit, quam quod urbs uestra iam per mul-  
torum annorum successionem habet, aureæ etiam appellatæ bullæ sacramento roboratum?  
Quod uidelicet Romanus futurus rex in sola uestra urbe, excitis è sedibus suis Romani impe-  
rij electoribus, tanquam ad rem orbis terrarum imprimis, uelut etiam est, necessariam eligi-  
tur, proclamatur, & ex urbe orbis rex & imperator suus innotescit? Quod si prisca histori-  
cos omnes diligentissimos in hoc exquirendo, describendoq; esse uidemus, ut regum ac magno-  
rum principum ortus, ubicunque tandem contigerunt, tanquam locis in quibus contigerunt  
clarioribus inde futuris, exacte prodant ac conscribant: & hodie in annales principum refer-  
re mos est natales ipsorum locos: quod monumentum satis amplum urbi uestræ statui potest?  
Ad quam non unus aliquis magnus princeps, sed tam multi, tot uoluentibus annorum secu-  
lis orbis imperatores, ueri ortus sui primordia referunt: maximè qui non fortuito, ac incerta  
nascenti

nascenti sorte ipsis contigit: uerum septem sacramento adiuratis principibus, totius Germaniae supremis, ob hoc Electoribus imperij appellatis, eius gratia conuenientibus, & summa fide, incorruptissimis iudicibus, firmissimamq; auctoritate, noui regis Romani atq; orbis domini futuri, imò clementissimi imperatoris, orum ac natiuitatem, hoc est electionem, orbi uniuerso salutarem pronunciantibus. At uerò, ut maximum est hoc urbis uestrae, uiri Francforden. decus, sic non minus ornamentum ex nobilissimo emporio uobis accedit, quod omnium totius Germaniae emporiorum maximum esse constat. Possint fortassis alijs alia quaedam emporia, aut ob mercium quarundam pleniorē ubertatem, aut uiliorem annonam, aut perpetuum emporij statum praeferenda uideri. uerum ob mercium omnium aequalem apud uos copiam, mihi quidem nullum emporio uestro maius uidetur: praefertim quum duobus statim anni temporibus celebretur, quibus quisq; & sua commode aduehere ac diuendere, & aliena comparare potest, non dubito quin maiore uirumq; lucro, quam si perpetuus emporij status apud uos extet. Quamquam si quis adeò extra statam duorum temporum oportunitatem uos adeat, reperire itidem possit & emptorem & uenditorem quarundam mercium ab ipso expectarum. Quanta uerò commoditatis res sit, talia emporia esse ac celebrari, uel inde palam fit, quod egentissimi sunt populi ad quos nihil peregrinarum mercium inuehitur: ut & hoc nomine insigniter celebris uestra urbs sit, quod hanc commoditatem ex se in uniuersam ferme Europam deriuat. Atque sint haec quidem praecipua duo uestrae urbis praeconia. Mihi uerò neque hoc leuiter ad laudem uestram pertinere uidetur, quòd mechanicarum artium opifices per omnem Germaniam, morum, consuetudinum & rituum, unicuique arti peculiarium praescripta ac rationes, ex uestra republica uelut opime instituta, aut primum petunt, aut si prius habent, ex uestris emendant, ac confirmant. Quid uerò an non praedicandum uel imprimis erat, quòd artis gladiatoriae apud Graecos ac Romanos olim celeberrima, hodie uerò ubique exoletae ac interceptae, nulla totius orbis parte tam insignia uestigia restant? Quum enim gymnastices partes plerumque omnes hodie sublatae sint. Nam neque in usu sunt tam frequentia & priscis adeò quotidiana balnea. Neque defrictiones ex oleo quotidianas, aut ullas aliquas ualitudinis conseruandae gratia hodie corporibus adhibemus. Et palaestra fere tota intercidit, ut etiam strigmentorum ex balneis, & palaestra ueteribus medicis petitorum, aequae materia atq; usu careamus: gladiatorii ars apud uos non tantum praecclare exercetur, sed eam exercentibus etiam praemia constituta sunt: & in ea praecellentes gladiatoriae artis magistri publice creantur. At uerò quàm utilis res sit humanis corporibus, imò etiam animis gymnastice, cuius pars est & ipsa gladiatoria: uel maxime ab ipso omnium studiorum doctissimo Galeno, in libris salubrium, siue de sanitatis tutela declaratur. Quin idem ad Thrasibulum scribens dubitare audet, num ad medicinam, aut gymnasticen pertineat sanitatis tutela: intantum uidelicet commodat apta corporum exercitatio, ut non minima pars artis tutelarum sanitatis ipsa gymnastice existat. Atq; hoc sane modo, idem fuerit optimus medicus, qui optimus corporis exercitator, ad sanitatem uidelicet conseruandam: quem Graeci significantissime non medicum, sed *gymnastikos*, hoc est, sanitatis tutorem appellant. Quare minus mirum mihi uidetur, fuisse semper, & esse adhuc honoratissimam apud uos artem medicam curatiuam: quum uideam etiam superesse apud uos fere solos, aut certe non alios quàm qui à uobis transumpserunt, artem medicam sanitatis tutelarem. Haec enim duae maxima ac principalissima sunt partes medicinae, quarum altera *gymnastikos*, altera *diagnostikos* appellatur. Quanquam autem in hoc diligentia uestra omnibus admirationi sit, ut bonos apud uos medicos semper habeatis, tamen nescio quo malo fato id fiat, ut uulgus aequae apud uos, uelut nunc ubiq; gentium, ferme pessimos sequatur, hoc est, ut ego puto, sui similes. An autem hoc ex reipublicae utilitate sit, indiscriminatim quo suis ad medicinam publice exercendam admittere, id quod apud uos

uelut

uelut in libera urbe, omnibus liberum est, ampliore consideratione opus habet. Illud certe magna laude præ omnibus Germaniæ urbibus facitis, quod tot medicos, quot nulla alia, publico salario alitis. Par est, aut etiam amplius, studium uestrum in conservandis bonarum literarum, ac artium studiis. Nec desunt uobis præceptores, uel maximis scholis pares. Quin & celeberrimos multos respublica uestra habet Iurisconsultos, quibus omnibus tum in iure dicendo, tum etiam priuatis quibusuis ad consulendum publicis constitutis stipendijs utimini. Quod uero maximum est, pietatis studia, & renascentem uera Christiana religionis cultum tam a prouehitis moderatione, ut etiam ipsis uera pietatis aduersarijs admirationi sitis, dum uident, ac audiunt populum à uerbi ministris ac doctoribus placate edoceri, & sedatis animis populum de sacris concionibus ad suas functiones obeundis abire, & à neutra parte tumultus cieri. Quæ res summam magistratus prudentiam declarat. Vulgo dicitur, Qualis princeps, talis populus. Sed egregie dixit pœta ille: Nobile mutatur semper cum principe uolus. Quare amplissimi senatus imaginem, uel in ipso populo spectare apud uos licet. Sed heu cladem ingentem illam, ex quo magno illo, reipublica uestra principe orbati estis PHILIPPO Forstembergero, in omnibus bonis studiis, ac uirtuosis actionibus uiro admirando. Cuius ego priuatus priuatim, & amore, & admiratione adhuc ita afficior, ut eius sine suspirijs nunquam, sæpiissime etiam lacrymis obortis, mentionem facere possim. Quanto magis putandum est uos uestrum uulnus sentire, à quorum corpore ille resectus est? Erat uir eius ætatis, ut recte immatura morte ereptus dici possit, sexagenario propior quam quinquagenario. Sed corpus uegetum aderat, ac animus uiuidus, ingenium acre, iudicium exactum, mores mansueti, sermo suauis. Et in summa, natura ad benefaciendum omnibus, neminem lædendum nata, quod quò rarius est, eo maiorem laudem in magistratu meretur. Utrang in super callebat linguam, Græcam supra mediocritatem, Latinam, ut cum magnis professoribus certare potuisset: quod aliquot ipsius ad me scriptæ epistolæ testantur. Et quum tota uestra respublica ex eo penderet, & perpetuis senatus curis grauaretur, tamen quantum succisui temporis suffurari poterat, id totum conuertebat ad optimorum auctorum lectionem. Et hoc tempore præter reliqua, totum Homerum Græcum perlegendum, ac conferendum susceperat. Hæc faciem superioris ætatis inauditus Germanis æstus corripuit, & ardentissima febris abripuit: quam eodem tempore in me sauientem summa difficultate ego uix à me reieci. At siue bonorum usum nobis non fauent inuida fata, uelut pœtis quibusdam placuit: siue ostendit deus magis quàm tradit optimarum rerum fruitionem: profecto uestrum luctum priuatus meus dolor proferre cœgit: quo optimi, ac sapientissimi uiri obitus reuera reipublica uestra immaturus, à me publice deplangeretur. Videor tamen mihi aliquanto leuius ferre illius ad meliorem uitam translationem, quum considero qualia reipub. decora post se reliquit, generos suos, uirum omnibus bonis studiis fouendis, ac prouehendis natum Iustinianum ab Holihusen. Et focii uestigijs innitentes, ex ueteri familia ad Iuuenes appellata, Orthonem, ac Danielelem. Nec desunt alij egregij nobis uiri, qui certatim conentur, ut sincera pietas uigeat, & literarum, ac bonorum studiorum honos perstet, ac conseruetur. Sed quor sum tandem hæc omnia? Nimirum quum in urbe uestra uiuo tot insignibus decoris celebri, ut uidear uiri uis uestræ aliquam rationem habuisse, dum & grauissimis iudicijs uestris approbatam hanc operam meam uideri uolo, & uicissim meam erga uos uoluntatem declarare cupio: quò utraque re cognita, studiosi rerum medicarum hoc Aëtij opus à me Latine conscriptum, alacrius excipiant, audius perlegant, studiosius sequantur, & medicando de humano genere bene mereantur. Quod ubi contingeret, non dubito quia intelligent hoc uestrum uiri Francforden. beneficium esse, quò tantum autorem, insignem medicum, in publicum usum editum habent. Crede mihi quisquis es

rerum medicarum studiose, sitotum Galenum contractum, sitotum Oribasium explicatum, si Paulum ampliatum, si omnes ueterum speciales, tum per phramaca, tum per chirurgiam aggressiones, ad omnes affectiones, in summa habere uoles, Aetium habes, unde totum hoc petere, ac ferre potes. Neque refert an sit Aetius ille Haresiarcha, aut alius quispiam Amidenus Opsicij comes, uelut quaedam exemplaria praescriptum habent. Certe Aetium haresiarcham uarijs artibus instructum fuisse, & philosophicis Aristotelicis rationationibus ingenium exercitatum habuisse, D. Epiphanius abunde declarat, in opere contra Octoginta haereses, quod item recens in Latinam linguam transtulimus, ut fieri potuerit, eum etiam medicinam tractasse. Nam quod comitis dignitas recentior sit, quam ut Aetio haresiarchae competat, penitus falsum est. Habet enim, iam ciuitas à me D. Epiphanius, Comitum appellatione ac dignitatem sub ipso Constantino Magno receptam. Et Iosephum quendam e Iudaeo Christianum factum, ea dignitate à Constantino Magno donatum tradit. Potuit igitur fieri, ut aurisaber usque ad perfectam aetatem Aetius, & postea ad Aristotelicam philosophiam studia progressus, & deinceps à Georgio Alexandrino Diaconus constitutus, tandem per principem aliquem Opsicij comes factus sit, & ut uir philosophia doctus, hoc opus ex ueteribus Aecedicis collegerit. Sed nihil pronuncio, neque quicquam refert. Ceterum quod ad operis totius diuisione attinet, manu scriptum exemplar meum habuit τραπεζίτην inscriptionem, ante aliquot sermones partiales. Velut uerbi causa, ante nonum sermonem, Ἀγὼ τὸ δ. δ. β. Αἰτίου, ἀφ' οὗ τῆς τραπεζίτης. Et ante sermonem XIII. Ἀγὼ τὸ ιγ. δ. β. Αἰτίου, ἀφ' οὗ τῆς τραπεζίτης.

Quam rationem sequutus, totum opus in quatuor Tertribllos, hoc est quaterniones uniuersales, singulos quatuor sermones siue libros partiales continentes distinxit, uelut autorem ipsum ab initio fecisse apparet. Porro quod superest precor, ut & uobis, uiri Francforden, ex huius operis editione merita gloria, & studio sis lectionis ac imitationis fructus contingat. Mihi satis est, si in huius Dramatis actu non penitus (quae quorundam malignorum ingeniorum improbitas est) fuero ex scena ac theatro explosus. Valete. Francfordiae, Calend. Nouembrib. Anno Christi M. D. XLI.

#### Errata in Annotationibus.

- In Acoro, penultima capitis linea, flabe, lege, flambe.
- In Aconito, linea 49. complicatis, lege, complicatas.
- In Diplaco, διπλᾶς, legendum.
- In Thapsia, linea 8. hapsiam, lege, thapsiam.
- In Cymino, linea ultima, appellatus, lege, appellatur.
- In Cypero, linea 12. ab ullo, lege, ab illo.
- In Ligustico, linea 6. oleus, lege, olens.
- In Malua, linea 5. quam, lege, quam.
- In Rhu, linea 2. sumachi, lege, sumach.
- In capite 26. libri 2. femriglio, lege, smeriglio.
- Cap. 143. lin. 4. Delphinis, lege, Delphinus.
- Cap. 172. lin. 31. dysoria, lege, dysuria.
- Cap. 183. De cochleari, lege, cochlea.

# CLARISSIMO ATQ.

PRVDENTISSIMO VIRO, DO-

MINO HIERONYMO MONTVO, CHRISTIA-

nissimi Galliarum Regis Henrici secundi, medico

eruditissimo & acceptissimo, Hugo

Solerius medicus.

S. P. D.

\*



**M**EDICINAM à veteribus Græcis copiosissime traditam atq. illustratā fuisse, norunt omnes: à Græcis mansisse in Arabas, qui postrema eius partem, ut diligenter excoluerunt, sic, neglectis Græcorum remedijs alijsq. minoribus inuentis, nouas sibi medicaminum formulas condiderunt: quorum usum posterior ætas retinuit, approbavit, & nonnulla inuenit: quibusq. penè dixerim, solus contenta fuisse, & adhuc nunc esse uidetur. Cumq. sic ferente rerum omnium insigni uicijsu uidine, ab annis, plus minus, quinquaginta priorem suā maiestatem resumere, ac ueterem cultum induere cœperit: tantosq. sibi neruos ac robur nostro æuo cōpararit, ut nullo tempore celebrior magisq. culta fuisse uideri possit: mirum profecto nulli non esse debet, cur Græcorum remediorum usus, penè solus, reparata medicina antiquioris maiestate, tanquam despicatus & inuilitis exoleuerit. Quod cum ego diligentius perpenderem, ac sedulo contemplerer, duas causas præcipuas fuisse comperio: in ueteratum ac contumacem usum alteram, alteram simplicium crassam ac pudendam ignorationem: è quibus ille meticulosos minusq. audentes (nullo rerum habito discrimine) & antiquitatis studiosos: hæc negligentes laborumq. ac disciplinarum contemptores homines facit. Huius uiaq. calamitatis ego atq. indignitatis sedulus aestimator, cum exploratum haberem hunc uetustæ dignitatis neglectum, aut dissimulari omnino, aut à quā plurimis saltem fieri minimi: cœpi cogitare, num arte quadā ac uia certitudine fieri posset, ut cuius medicina studio iudicare non esset difficile, an scilicet ueterum Græcorum formulæ in usum (si id exigeret necessitas) uocari possent: aut omnino, ob simplicium tum inopiam, tum ignorationem negligenda uenirent. Eam igitur ob causam consilij mei fuit, quendam è Græcis autoribus deligere, qui morbos omnis generis, à summo capitis uertice usque ad calcem, fuisset accuratissime, iuxta ueterum normam ac traditionem, complexus: eumq. ue, si id quidem fieri posset, tam diligenter illustrare, & modis omnibus ornare, ut hac ratione prisca medicina autoritas illucesceret, & antiqua claritudine ac celebritate tandem donaretur. Ex his itaque unus Aetius dignior mihi uisus est, qui reliquis omnibus, (iuniores dico) hac in parte anteponi iure optimo debuerit. is siquidem medicinam omnem ita ex ueterum libris in unum uelut corpus ac uolumen contraxit: suorum singula loco tam appositè collocauit & accuratè distinxit, ut ingentia Galeni & aliorum uolumina hoc quasi breuiario comprehensa & disertissime explicata uideantur. Quam ob rem, ut huic tam funestæ ac deplorandæ calamitati tandem pro uiribus reluctarer, & inducta rebus ipsis noua luce, depulsaq. ue ignorantie caligine, uiam quādam ad simplicia, tum nobiliora, tum cognita (si absit qui demonstret) ualde difficilia, studiose pararem ac uelut sternerem: è mei instituti dignitate, reiꝑ. publicæ literaria utilitate esse putavi, breues, ac, quantum per maximam diligentiam liceret, perspicuas in singula simplicium eius capita adnotatiunculas ( & eas quidem Græcis, Latinis, officinarum ac herbariorum, Italicis, Gallicis, Delphinaticis, ac nostratium uulgaris nomenclationibus: nec non soli natalitij plantarum inuentu difficilium

A a

indica-

[illegible]

# HVGONIS SOLERII

## MEDICI IN II. PRIORES

### AETII LIBROS

#### SCHOLIA.

\*

#### *ἀβροτον*, Abrotonum.



BRÖTONVM Græcis iuxta ac Latinis idem nomen feruat. Duūm est generum: mas & femina. mas officinis nomen retinet: Gallis aurone, aut de la garde robbe: Italis, abrotono & ueronica: Delphinatibus, de la gabioſe: noſtratibus belambroy: femina uerō Gallis, Delphinatibus, & noſtris, du cypres: Italis cipreſſo & ſantolina nominatur: officinis criſpula.

#### *ἀγριος*, Vitex.

*ἀγριος* Græcis, Latinis uiter: officinis, copulata tum Græca, tum Latina uoce, agnus caſtus dicitur: Italis agno caſto: Delphinatibus, noſtratibus, & Aquitanis pebrier, quōd eius ſemen piperris modo acie ſit, appellatur. Duo uiticis genera: altera ex purpurea, candidantibus floribus, quæ & notior: purpureis altera, eaq; minus nota.

#### *ἀγροστον*, Gramen.

*ἀγροστον* Græcis, gramen Latinis nominatur. Officinæ, Delphinares, noſtrates & Aquitani Latium nomen retinuerunt. Galli autem eam herbam, dent à chien, Itali gramina uocitant. Duo rum eſt generū, uulgare & pariaſiū. Quod pro pariaſiū uulgo monſtratur, pleriq; Fuchſij centum morbia: putatur. & ſimilius ueri eſt, pariaſiū gramen hiſce orbis tractibus ignotum eſſe.

#### *ἀγκυρα*, Anchufa.

*ἀγκυρα* Græcis: anchufa Latinis. Multa anchuſarū genera: Onochelos Gallis orcanette. Lycopiſ officinarum cynogloſſum cenſeri poteſt, & Gallorum bage. reliquæ ſpecies notæ ſunt, & ex delineationibus petendæ.

#### *ἀγαριος*, Agaricum.

Idem nomen Græcis, Latinis, & officinis habet. Galli, Delphinares, & noſtrates de l'agaric, Itali agarico appellant. duo eius genera, mas, femina, uulgaris tamen ambo notitiæ.

#### *ἀγριατον*, Ageratum.

Græcis & Latinis idem nomen ſeruat: officinis & uulgo ignotū: Italiæ anonymon, noſtræ tamen officinæ herbam ſanctæ Mariæ nominant. Nam in noſtra prouincia quæ ubiq; luxuriat: ſed præcipue non procul ab Aquis ſextijs in uuidis & argilloſis locis.

#### *ἀδιαντον*, Adiantum.

Duo adianti genera: *ἀνδροειδης*, quod Theophraſto adiantum album: Gazæ Theophraſti interpret, & officinis capillus Venæris, Italis capel uenere. *γυναικων*, quod in duo genera diſtribuitur. Si quidem alterum Theophraſto adiantum nigrum: uulgo autem & officinis falſo polytrichū nominatur: alterum uerō folijs filici effigie proximis, & uulgo ſimpliciter adiantū no minari ſolet. Ad quartum adianti genus ſalutem cognomen to uitam referri quidam autumant: quidam Dioſcoridis empetrum uolunt. ut tamen res habeat, conſtat eam multarum ac magnarū uirium eſſe, ut in noſtra ſimplicium hiſtoria, deo bene noſtris ceptis fauente, dicitur.

#### *ἀζαζον*, Aazoon.

*ἀζαζον* tum apud Græcos, tum apud Latinos dicitur. eſt Latinis id quod: ſedi uocent. Multa eiſe ſtatutur genera. maius quod officinis ſemper uiua, noſtris ſemper uiue: Gallis iou barber: Italis ſempre uiuo. minus Gallis de la trippe madame: noſtratibus cacachet, Italis nunc uermicularia, nunc herba graſſa, nūc granellōſa, nominatur. Ad tertium genus referri poteſt offici narum uermicularis.

#### *ἀγρολιν*, Aegilops.

Sylueſtris auena eſt, noſtrisq; ſiuado tero, Italis ſquala, nominat.

#### *ἀγριον*, Lolium.

Officinis nomē retinet, loglio & giolio Tuſcis, alijs orzo di to ppi dicitur. Galli autem iuree, quōd ſe comedentes uelut incubiet: noſtrates uero iūre, nominant: uulgaris eſt apud omnes notitiæ.

#### *ἀγριον*, Populus nigra.

Latium nomē officinis retinet: Gallis peuplier: Italis oppi: Lon gobardis pioppe: Delphinatibus un puioy: noſtratibus pibōu

Io, quaſi populus, dici ſolet. uulgo nota arbor eſt.

#### *ἀκακία*, Acacia.

Verā acaciam deſyderat Europa: quæ idcirco eā nunc ex pruno ſylueſtri colligit officinæ.

#### *ἀκανθον* ἢ *αἰνιδον*, Vrtica.

Duūm eſt urtica generū: ſylueſtris, quæ Gallis ortie grièche, aut græche: Tuſcis ortica ſaluatica: noſtratibus ortigo barbarano, id eſt barbarata ac ſylueſtris: altera minor, nomenq; citra adiunctionem ſeruat. Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Ambæ notæ ſunt.

#### *ἀκανθα*, Acantha.

Officinarum eſt: branca urſina: Italorum branca orſina. in locis maritimis copioſiſſima, ut & in Gallia, prouenit. Delphinatibus inuētū rara, apud quos nuſquā, niſi in hortis quibudā uiſitur.

#### *ἀκανθα* uiridis, Spina alba.

Exiſtimatur à multis, etiam uiris doctis, ea eſſe herba, quam officinæ cardui beatæ Mariæ nominant: quæ, inquam, ubiq; circa urbium foſſas ac rudera pinguibus locis adoleſcit, affatimq; luxuriat: folijs amplis, candidantibus maculis conſperſis, caule breui. Dioſcoridis autem ſpina alba folijs conſtat, quā albus chamaeleon, anguſtioribus, caule procerō, capite oblongo, echinato, & in montibus prouenit. Quæ rationes ſatis cōuincunt, uulgatum officinarum cardum Mariæ (qui Italis cardo di ſanta marie, & herba del latte, à lacteis maculis, nominatur) ſpinam Dioſcoridis albā nō eſſe. Vidi ego in montibus Delphinatibus & in ipſiſ alpiſ, locis aſperis, cardui gen<sup>us</sup>, qui Dioſcorideæ albæ ſpinæ imaginem proriſ referret. Folia enim anguſta erant, candida, profundis diuiſuris inciſa, ſpiñoſa. Caulis cubito longior, molli incanaq; lanugine intercuſus: intus ual uis, ſupremo quaſi loco ramoſus: caput echinatum, ſpinis ualde horridum, oblongum, oui gallinaei magnitudine: flores, ut plurimum, candidi, nonnunquā purpurei. Radix digitalis craſſitudinis, longa, foris ex ſtuo pallida, intus candida, guſtus non inſuiſus, tantillum tamen adſtringentiſ. Semen, quia nondum maturum tum eſſet, non obſeruauī. Ex quibus notis certum eſt, eam plantam, ad ſpinam albam plurimū accedere: non tamē auſim affirmare, donec res explorator mihi fuerit.

#### *ἀκανθα* ἀγρια, Acantha Aegyptia.

His regionibus deſideratur, Aegyptio nimirum & Aſiæ familiaris: Arabibus ſuchaa.

#### *ἀκονιον*, Aconum.

Ad ueterum acorum reuocat ex doctis quamplurimi galangam minorem officinarum: Alij contrā, nō galangam (quæ illis cyperus Babylonicoſis eſt) fed officinarum calamum aromaticū, ueterum acorum eſſe, multis ac ualidis argumentis affirmant: adeo ut hæc ſententiā uarietas difficultate minimē careat. Verū ſi guſtum ſaporum (ut oculus eſt colorum, & reliquæ formæ) certifiſimum iudicem, conſulamus: dubium non eſt, quin officinarum calamū aromaticū, ueterum acorum eſſe exſtitemus. Iſ ſiquidem non calamus eſt, ſed radix candida, odorata, plena, geniculis multis intercepta, guſt<sup>us</sup> acris, admixta (id quod Galenus lib. 6. ſimpl. in uero acoro requirit) tantil la amaritudine. Galanga autem minor quaſi rubra ſpedatur, guſtu, quā ſit aromaticus calamus officinarū, acriore, citra amaritudinem, geniculis uida. Quæ omnia conuincunt, nō galangam quidem, ſed calamum aromaticū officinarū, eſſe ueterum acorum. Accedit calamus ex Lituania Ponti regione, non procul à Galatia, afferri, barbarorumq; lingua tatarſchi zelij, id eſt, tartaricam herbam uocari: galanga uerō nō ex Ponto, ſed ex Syria Alexandria, Alexandria Venetias, Genuam ac Maſſiliam ad nos importari. Poſtremo cōſpici nonnunquā apud ſolidarios, calamum cum ſiccis ſolijs, quæ iridis, ſolijs omnino reſpondeant. E quibus colligere nō ſit difficile, calamum aromaticū officinarum eſſe ueterum acorum: ueterum autem calamum aromaticū adhuc ignorari (quōd ex India ad nos nō adferatur) eiusq; loco iphagnū, id eſt, arborum muſcum, ex Galeni Paulij: fuccidaneis, poſſe ſubſtitui. Plura de acoro & calamo odorato lege apud Petrum Andræ Matthiolum uirum apprime eruditum, ſuis in Dioſcoride cōmentarijs. Habent officinæ ſuum acorum ad ueterum acoro uiribus longē diſſimile: radicibus purpureis, intortis, nodosis, guſtu,



fis, gustu, sine calfactione, ualde adstringenti, caule & folio iridis, sed folio angustiore, flore luteo. floret inuente aestate. Nascitur ubique, aquis locis, & Gallis flabe bastarde, & glaietu d'eaue: nostris blaniou iaulne, quasi gladiolus luteus, nominatur. *Ανιψιγης*, Acontium.

*Ανιψιγης* Græcis: Acontium Latinis. Dne sunt præcipua aconiti summa fastigia. Pardalaches, quod, quorundam opinione, officinis uia uerba nominatur, id uulgo anonyum esse heremitis tamen fuzze Gallice, quæ de liury nuncupatur, nec procul à l'orienta Parrhisiorum uersus orientem solem est, lachryma lob di ci solet. Alteri est lyco donon, æperimendis lupis sic nominatur. Huius tria extant genera: duo ad l'iporum & aliarum ferarum uenationes nata: tertium, quo ad purgationes, gonitui & deiectione molientes, utuntur alpium rustici. Ea ipsa species eorum lingua nunc antonno, nunc antolo dicitur: Lygurbus autem & rusticis terræ cognomenon non (quæ agrum Delphaticum & Pedemontanum interiacet, & uique ad mediterraneum mare, inter totius provinciam & Lyguria protenditur) anthoræ, & prædictis nonnullis anthora nominatur. Illi folia insunt platano similia, minora tamen, nigriora, profunde per ambitum incisâ: caulibus palmu aut cubitum altius: radices geminæ, oblongæ, utrinque obtusæ & continuæ magnitudinis, id est, in neutra parte aut maiores aut minores: foris ex fusco colore subfævis, intus candidæ: ubi ficate fuerint, fractu satis difficiles, friabiles tamen. Vtriuslibet radicis ad fabæ magnitudinem in iusculo aut uino derafam propinquant, ad largas durioris corporis per superna & inferna purgationes. Debilioribus aut per uirium ratione exhiberi à iam comemoratis rusticis, scimus. Secundum lyco doni genus herbarijs itidem anthora: Lygurbus anthoræ & thoro: alpinis Delphinatibus de la thoro nominatur. Hoc radices quoque geminas, uerum unam ex altera appendicem modo nascentem habet, ima parte ualde acuta, superne crassas, quatuor circiter digitos longas, foris nigras, intus ex terreo cineritias, napi modo turbinatas, eiq; effigie simillimas, ac toto bulbo atris fermeque capillaribus radiculis uestitas. Caulis uero bicubitalis, folia platani, subcabra, frequentibus ac profundis diuisuris incisâ, nigricantia. Flos ex purpureo caeruleus, lamis floribus haud ab similibus. Semen in triangularibus tricuspibus; filiquis exiguum, cnicu quantentes proximam, sed multo minus, uermiculorum exemplo rugosum, ima parte sessile, altera utcumque. Hanc lyco doni speciem esse officinarum nappellum (ob eximiam similitudinem, quam eius radices cum nappo habere, uel aspectu iudice, depræhenduntur) existimare quis possit: quanquam ex Auicenna, intra terram, iuxta nappellum talpam inueniri, eius radices uictitantem, quidam existimant, seq; uisidæ afferunt: id quod ego, fateor, non tam curiose obseruauim (et si reliqua omnia in defossis & euulsis plantis sæpissime fuerim in alpiibus ad unguem contemplantus) ut musculum illum inuenirem. Quartum aconitum, quod & ipsum lyco doni quod: tertia species est, uittigineis uel plataneis costat folijs, minus profunde, quam aliorum sunt folia, incisâ, suppalidiss: flore ex luteo pallido, secundum lyco doni flori (ut semen triangularibus filiquis contentum) effigie prorsus æmulo. Radice longa, crassa, multos in ramos siue appendices inter se complicatis, diductâ, ab aliorum radicibus ualde dissimili, quo nullo pacto bulbi imaginem referat. omnes tamē, & præcipue duæ lyco doni posteriores, species gustus horridi, supraq; modò abominabilis. Hæc postrema est herbariorum luparia, uentoribus haudquaquam ignota: uulgo Delphinatium nota quidem, sed tamen anonyma: Italis autem luparia, & herba de la uolpe. Florent omnes mense Iunio & Iulij initio. Semen maturè cit cit finem semperbris. Prima species in syluis ubique prouenit. Reliquæ moribus altis delectantur, & in umbriosis apricis: nasci gaudent. Hæc tam multa de aconito literis mandanda diximus, non ut plantam alioque non nenenosam, & maxima religione uitandam præter primam lyco doni speciem anthoram uerè didicim, quæ usurpari à doctis & prudētibus adhibito iudicio potest: omnibus cognobilè redderemus: sed ut, historica accurate distincta, studiosius lectorē admoneremus, ne posthac bis, ad imperitiis quibusdam tum herbarijs, tum pharmacopæis, temerario nimis ausu, lyco doni secundæ generis radices, nigri ellebori radicem, (quibus nulla ex parte respondent) uice, in usum medicum uocantibus, imponi, suo dedecore, & mortalium irreparabili danno, sineret.

*Ανιψιγης*, Sambucus: *Χυμδαίνης*, Ebulum.

*Ανιψιγης* Græcis: Sambucus Latinis. Duo eius genera: maior qui *Ανιψιγης* & minor, qui *Χυμδαίνης* Græcis nominatur. Maior nobis cognita: sunt species: uulgata ac omnibus nota, quam fecemiam appellauimus: & alia in excelsis frigidisq; montibus nascens, omnibus herbarijs rei scriptoribus indicata, & pau-

cis medicis cognita, quam certioris discriminis gratiâ, maris titulo insignimus. Vulgator maioris sambuci species officinis omnibus Latinum nomen seruat: Gallis du: sus: Italis sambuco: Delphinatibus, ut & sambucus mas, du: sus, aut: sus: nostratibus sambucus aut sambuciquier & famiequier dicitur. Ebuli nomen tum Latinis, tum officinis est commune: Galli uero yebule, Delphinates & nostrates ougue, Itali ebulo appellant.

*Ανιψιγης*, Haliumum.

Inter doctos ambigitur quid sit. Existimant quidam esse Gallo- rum blanche putain, quam nostrates tatine, & Delphinates tautoulier appellant. Verum descriptio illi parum conuenit, ut tutius inter adhuc ignotas plantas sit reponendum.

*Ανιψιγης*, Aloë.

Visitur herba apud Gallias eò aliunde importata, uulgo q; du per roquet, ab insigni uirore: Italis, ut & succus, aloë appellatur. Succus ipsius, herbæ nomen retinet.

*Ανιψιγης*, Alysum.

Sicut auctori ex aliorum sententia placet, syderitis heraclea est, multorum peritiam haudquaquam effugit. Quorundam opinione ad alyson referri potest uulgaris cauda uulpina. Nos autem alysum legant diu exultimam inter ignotas nostro ævo plantas: quanquam spes est maxima excitari iri præclara ingenia, quæ in illius & aliorum, quæ adhuc latent, peruestigatione perit nascimur in cumbat, ac tandem multa tum difficilia, tum ignota, uulgatissima, mortalium omnium bono, uel maximo, sint redditura.

*Ανιψιγης*, Alfine.

*Ανιψιγης* Græcis: alfine, & auricula muris tum Latinis, tum officinis dicitur: Gallis autem, Delphinatibus & nostratibus du: morron: Tufcis centone appellatur.

*Ανιψιγης*, Amaracum.

Amaracum auctori & Galeno id est cū Dioscoridis parthenio: qui partheniū ipsum amaracū uocari à nonnullis, quædammodi samphygium à Cyzicenis & Siculis amaracū quoque nominari, commemorat. Magna est doctorum in amaraco, quod est Dioscoridis partheniū, controuersia. Quidam officinarū matricariā esse uolunt: alij cotulā fœtidā, quæ Tufcis cota, Ferrariensibus brusciaculo, nostris, detractis tantum duobus de ueteri nomenclatione elementis, amarō nominatur. Matricaria autē officinarū Italis amarella, Gallis anomya, Delphinatibus de blancheto, nostris l'herbo de nostro damo uocatur: ut hinc manifestum liceat agnoscere inter illos discriminē. Verū si Dioscorides rectè cōuehit, parthenij delinæmētā cotulæ fœtidæ multo magis fœuebit, quā matricarię: nā dōdratū aut pedalis herba est (matricaria plerūq; bicubitalis) folijs corandrinis, non ut quidā peruerse calumniantur: feniculaeas (matricaria multo amplioribus) odore graui ac tetetro (matricaria nō item) sapore amaro, matricariæ cōmuni, ut & flos intus melinus, per ambitū albus. Accedit cotulā fœtidā adhuc à nostrate plebe, amarō nominari. Quæ omnia efficit, ut ipse cotulā fœtidā, nostris amaro dictā, uerū Dioscoridis parthenium esse existimē. Summamen, aliter cogitandi, iudicium quicq; liberum relinqui uolo.

*Ανιψιγης*, Ambrosia.

Ignota herba est: quanquam immeritò apud Gallias herbam quādam pro ambrosia ostentent: cuius tamen cōuenit descriptio, quā ruta similis est quercui.

*Ανιψιγης*, Ami.

Latini & officinæ omnes Græcæ nomenclationem retinuerunt. Lutetia notissima ac uulgarissima plāta, adeo ut uulgo ammi uocari iā cæperit hic tamen & apud nostrates, quæquā inuentum nō difficiis, pharmacopolarū tamē desidiū, crasse ignoratiæ magistra, ignota delitescit, eiq; quotidie illius semen in usum medicum uocent. Quidam uolunt ignotam plantam esse.

*Ανιψιγης*, Amaranthum.

Autor Galenum secutus amaranthi nomine eius plātæ uires exprimit, quā Dioscorides elichryon appellat: quāq; officinæ omnes stæchadem citrinū nomināt. Delphinatibus ioye diu appellatione notissimum. Est & aliud amaranthi, flore purpureo, quod uulgo Gallorum, Delphinatium & nostratū passe ueloux, appellatur: Itali autem flore uelluoro.

*Ανιψιγης*, Amurca.

Amurca fex est olei oliuarum, quæ in fundo uasorum residet: nostris crappe & duhyule, Italis morca & morchia uocatur.

*Ανιψιγης*, Ampeloprasium.

Latini Græcæ nomenclationē in usum suum uerterunt. Sic dictū est, quod uitium familiaritate oblectatur. Largus liquidum est illius in uineis prouenit, atq; ob id porri uellicale, cepa canina ab ipso uulgo: Tufcis autem porri uellicale.

*Ανιψιγης*, Ampeloleuce, Vitis alba.

Officinariū bryonia est, quæ presertim apud Delphinates, pedo errorē utē syluestre (quā Galli uiorne, nostrates aut redotto, quasi



quasi retortâ, quæ arboribus uehemeter implicet, nominât) uitis  
albe appellatio accipitur. Galli uitæ albâ colouueret: nostrates  
co cordier de serpenti Itali uerò zucca saluatica uocant. Ad uitæ  
nigrâ refertur cõtenduntalij fâmulu, sed falsu, quæ clematidis  
altera species fitalij figillu beate marie, cui<sup>9</sup> delincatio illi nō  
illepidè quadrat, quorū certè sententia nobis donec melior in  
mediū adducta fuerit, pbat. Italij uitis nigra tamaro dici solet.

*ἀμυγδαλῆς*, Amygdala.

Græci, Latini ac officinæ idem nomen usurpant. Duūm præcipuè  
sunt generum, dulcia, & amara. Ex dulcibus quædam molli fra  
gilij: cortice integuntur, ac ob id nostratibus Græcum idioma  
sequutis abalanos, quasi *ἀβλανος*, id est, cortice glandis desti  
tuta, & Delphinatibus metathesi syllabarū alauanes dici fue  
rūt. Quædā interuū cortice duriorē habent, & absolute cōmu  
ni nomine insigniuntur. Gallis enim ac Delphinatibus amē  
dres, Italij mandole, nostris uitæ amēdos & amelos dicitur.

*ἀμμόνιακον*, Ammoniacum.

Officinis Græcas uoces ignorantia partim, partim desidia adul  
terantibus, ammoniacum dicitur.

*ἀμύμον*, Amomum.

Desyderatur uerum amomum.

*ἀνὰ γαλῆς*, Anagallis.

Latini Græcū nomen usurpant. Officinis morsus galline: Gal  
lis morgelline, & petit morron. Duo anagallidis genera: flo  
re caruleo fœmina: phœniceo mas insignitur.

*ἀνὰ πορτῆς*, Portulaca.

*ἀνὰ πορτῆς* Græcis: Latini & officinis portulaca: Gallis poulla pied,  
& pourpie: Delphinatibus pourchalle, nostris portolage, Tu  
scis procchacia: alij Italiae populi procellana nominatur.  
Duūm est generum, syluestris & hortulana: ambæ tamen uul  
garis notitiæ.

*ἀνέμων*, Anemone.

Duūm est generum: syluestre nunc: alterum in cultis nascens.  
Syluestris folio est fœniculaceo, flore ex uiolaceo, suppuru  
reo, magno, qui flantibus uentis patet, atq; ob id herbæ nenti  
est appellata: (quanquā herbæ nenti appellatione parietariam  
helxinem usurpent officinæ) Gallis des coquelourdes. Hæc  
primo uere erumpit, floret, & acpō paulum flos ipse uanescit  
in pappo. Sylus Galliz familiaris. Apud Delphinates in ne  
more Rossillionensi, & montibus Tincto oppido proximis  
inuenitur, nec non in agro Lugdunensi, ubi eius flos ad rusticis  
des fâscions nominatur. Quæ uerò cultis locis prouenit, folijs  
est coriandrinis, puniceo flore, capitulo rhæadis, frumenta  
ceis agris familiaris. Gallicum nomē flosi est des asphensons,  
aut des rubistalibi des passifleurs. Tertia flosrem lactem aut  
purpureum edit, & ferè est ignota, nisi ea sit, quam patim Lu  
tetia pro argemone offentant. nam descriptio ei non inepte  
conuenit, & penè tota adimplatur.

*ἀνῆθος*, Anethum.

Latini & officinæ Græcum nomen usurpant. uulgu tum Gal  
lorum, tum Delphinatum, tum nostratum de l'aneth appel  
lat: Itali anetho.

*ἀνθῆμος ἢ χαμαίανθος*, Anthemis,

Chamamelum.

Chamemeli nomen Latinis, officinis & uulgo Gallico, Delphi  
natico, & nostrati celebre est: illis enim camomille: Italij autē  
camamilla uocatur. Tra statuitur anthemidis siue chamemeli  
genera: leucanthemon chamemeli, chrysanthemum, & cran  
themum: Ex quibus leucanthemon toti Galliz notissimum, &  
usu multo clarissimum est: reliqua genera non item. Vult  
Fuchsius eranthemon consolidam regalem dici. Syluo præ  
ceptor notum, Fuchsius erathemi nomine conueta pingit,  
quam nonnulli ad edysurum referunt. Chrysanthemum cham  
emelum hic inuentu rarum, & paucis notum.

*ἀνῆθος*, Anisum.

Officinis nomen retinet, uulgu Galliz uioierfe de l'anis: Ita  
lia autem aniso appellat.

*ἀπαρίνη*, Aparine.

Officinis rebulus & spargulum: Gallis du gratteron: Italij spe  
ronella. Philanthropi nomen ideo sibi adoptauit, quod per  
transcuntium uestibus adhærescat: omphalocarpi autē, quod  
humani umbilici effigie semem eius sit æmulum.

*ἀπῆρος*, Pirus.

Varia ac penè innumera sunt pirorū genera: Gallis des poires,  
Delphinatibus poires & perus, nostris de peros, Italij persæ di  
cuntur. Arbor poyrier Gallis, & perier nostris.

*ἀρχαία*, Pira syluestria.

Notiora sunt pira syluestria, quam ut explicari debeant.

*ἀριστοχόη*, Aristolochia.

In tria genera fastigiatur, longam, rotundam, & clematitim. Lon  
ga officinis nomen retinet: Arabibus faufel, nostratibus fau

terlo, & Delphinatibus de bloufons, nominatur: Gallis iam a  
ristolochie dici cæpit. Rotunda suam quoq; nomenclationē  
seruat. nostris autem fellayo ab amaritudine, quasi fellago, di  
citur. utraq; officinis notissima, & quotidianu usu clarissima.  
Italij ambæ anomyæ. Clematitis autem, quantū euidem iu  
dico, adhuc ignota delitescit.

*ἀρκεύς*, Aracus.

Cicerula effigie auctori similis est, ut possit cicerula syluestris  
cenferi.

*ἰουνίπερος*, Iuniperus.

Iuniperi duo genera: maior & minor. Volūt quidā maiore iuni  
perum eade uulgo appellari: minorem autem genefure: no  
strates tamen utramq; speciem una appellatione, eade nimi  
rum, complectuntur. Iuniperus maior Gallis infrequens, Del  
phinatibus inuenitur, apud nos autem copiosissime fructuat,  
& plerunq; calidioribus sylus, in arboream proceritatem af  
furgit. ambo ginepro Italij dicuntur.

*ἀνὰ πλαντῶνος*, Plantago.

Duo plantaginis genera: maior & minor. maior officinis nomē  
retinet: minor quinqueneria ut lanceolata nominatur. Est  
& altera maioris plantaginis species, quæ priuatim officinæ  
arrogiosum dicitur, rotundioribus folijs, lanuginosis & fessi  
libus, usuq; multo clarissima. Omnes uulgo notæ. nā Gallis &  
Delphinatibus du plantain, nostris plantage: Italij autem pian  
tagine & centinberia appellantur.

*ἀρον*, Aron.

Officinis iarrus, & pes uituli: Italij gigaro. Flos autē, quæ in uirilis  
pudendi speciem afflurgit, Gallis uit de prebrite nuncupatur.

*ἀρτεμισία*, Artemisia.

Artemisia Græcis, Latinis & officinis, Gallis armoyses: Delphina  
tibus & nostris arcemise. Duūm est generū: multicaulis, & u  
nicaulis. Multicaulis in maiorem ac minorem diuiditur. Ma  
ior iam dictis nominibus appellatur. Minor quorundā senten  
tia est uulgaris matricaria, quæ Italij amarella, Delphinatibus  
blancheto, nostris l'herbo de nostro damo nominatur. Alio  
rum non item, ut qui eam ad parthenium commodissime re  
ferri putet. Tertiam artemisie speciem monoclonon dictam,  
ignorari est certissimum: ideoq; falli eos qui tanacetum offi  
cinariū athanasiam, Gallorū thanasie, Itolorū danæa, Delphina  
tiū thanéo, & nostratū thaanorid, artemisiam speciem, præci  
puè tertiā esse statuunt, ut quæ fit multicaulis, & grauissimū  
spiret odorem: monoclonon contrā unicaulis, & suauē olens.

*ἀσάρον*, Asarum.

Officinæ antiquum nomen seruauit: Gallis du cabaret: Italij baca  
chira dicitur.

*ἀσπάλανθος*, Aspalatus.

Desyderatur uetutum aspalatus: cuius loco suffici potest uiticis  
semen, ex Galeni succidaneis.

*ἀσπαράγος*, Asparagus.

Latini & officinæ Græca nomenclatione utitur. Duo asparagi ge  
nera. Altilis, & syluestris. Altilis ubiq; Galliarū des asparges:  
Italij autē asparago. Syluestris qui & petræus, & myacathinus  
Græcis dicitur, Delphinatibus rouge cōtinz: nostratibus apud  
quos copiosissimus ubiq; puenit: romieum conieui, quod cuni  
culis annuū pabulū suppeditet, nominatur. Apud Delphinates  
nultq; nisi in hortis, uisit. Gallia asparago syluestri caret, nisi eō  
aliūde importetur. Illius radices magni sunt in medicina usus.

*ἀστῆρ ἢ ἀστῆρας*, Aster Atticus.

Quid fuerit aster Atticus, hæcē dubitatū à doctis penè omni  
bus est. Nos tamē, multis laboribus & uigilijs huic disciplinæ  
insumpsum, dei beneficio uerū asterē Atticum in gratiā tādē  
cū suo Dioscoride primi (quod equidē sciam) in Gallia super  
iore non nouo reuocauimus. Ea siquidem plāta est, quā nostrates  
officinæ Christi oculū appellat: Galliz ignota, Delphinatibus  
inuentu rarissima: apud nos ubiq; tam frequens & copiosa, ut  
nisi quā nō pedibus, si nēl tantillum in agros uel iteritri mar  
gines diuerteris, conculcetur, ut alibi copiosius dicitur. In Ita  
lia frequens, sed uulgato nomine destitutus.

*ἀσάρις*, Vua passa.

Vulgaris est ubiq; gēnium notitiæ. Galli de la panse, ou raisin de  
panse, Itali uua passa, Delphinates raisins cōtinz, nostrates agri  
bistes nominant.

*ἀσταφίς ἀγρία*, Astaphis agria,

Officinis staphis agria. Semē enim sub plantæ appellatione usur  
pant. Planta his locis non ita familiaris. Apud Galas in hortis  
frequens. Gallis, Delphinatibus & nostratibus de la graine de  
l'esparuier dicitur. In Italia anomya.

*ἀλφειόδουλος*, Alphodelus.

Officinis aphrodilus. Apud Pitcaunos frequēs, & alendis fuis  
accommodus. hierarus. Apud nos copiosissimus nascitur, &  
uulgo de porraches, à similitudine foliorum porri, appel  
lat.

laturus in Italia vero amphodillo,

*Ἀμφόδιλλος*, *Atracyllis*.

*Ἀτρακτύλλης* Græcis: *Atracyllis* Latinis: officinis & vulgo ignota. Nam cnici generibus, & acarna candidior à Theophrasto cap. 4. lib. 4. hist. plât. pingitur: cuius foliâ peculiare hochabet, ut uulsum, & carni admodum sanguinem succum remittat. unde sanguinis cruentæ ne nomine herbæ inditum. graui est præterea & maligno odore. Semen tardè perficit, autumnum nimirum. Quæ nota satis sunt ad improbandam eorum sententiam, qui syluestrem cnicum primi generis, atracyllidem esse autumant: ut taceam æ omnia atracyllidi parum aptè assignari, quæ Theophrastus loco iam commemorato, manifestè uerbis de cnico pronunciat. Sit igitur atracyllis ex earum plantarum genere, quæ adhuc parum cognita sunt: & putata atracyllis, atq; carduus benedictus (ex Theophrasti sententia) syluestris cnici species: hic, posterior illa, prior, ut in cnico dicitur.

*Ἀριπέλας*, *Aripex*.

Latinis & officinis idem obtinet nomen: Gallis nunc bonne dame nunc prude femme: nunc des arroches: Italis autem trepe se, & reppelle uocatur.

*Ἀβσίνθιον*, *Abstinthium*.

Quatuor abstinthij sunt genera. Ponticum, quod officinæ Romanum appellat. Santonicum officinis propè omnibus ignotum: eius tamen semen santonicæ aut feminis contra (uulgas Gallorum id mort à uers, & cum nostratibus, barboutine uocat) appellatione celebratissimum: quoniam cum non desint, qui abstinthij marini semen id esse existunt. Scirpium seu marinum, tum officinis, tum medicorum non paucis incognitum, maritimis tractibus familiare ac copiosissimum. Et uulgare, quo solo, maximo tum errore, tum mortalium detrimen-to, utuntur omnes ferme officinæ: tanta est earum cæca ignorantia, & virtutis inimica, desidia. Omnia abstinthij genera Lutetiæ Parrhisiorum uiuantur, præter marinum, quod ipsi Tholone, & alibi passim maritimis locis millies uidimus. Ponticum in hortis Lugdunensibus copiosum diligenter Claudij Milleti, medici doctissimi, & rei herbariæ peritissimi iam luxuriam. Vulgare abstinthium Lutetiæ de Paloinis: Belgis & Delphinatibus du fort, nostratibus d'eyssens quasi d'abstinthium, Italis assenzo nominatur. Reliqua genera, uulgata, quod scia, nomenclatione carent.

*βλάκων μυρτιάδης*, *Glans unguentaria*.

Glans unguentaria Dioscoridi fructus est arboris myricæ similis in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra secus Iudæam. Is Arabibus ben dicitur. Duum est Mefuz generum: maior & minor. Maior auellanæ magnitudine spectatur, triangularis quo dammodo, superiorem sui parte uentricosior, inferiorem tenuior, & nonnunquam fessilis, interdum subacutus: & (quæ est natura in rebus fingendis uarietas) quandoq; multangulus, propter suam magnitudinem ponderosus: cortice pitasci, leui, sed fragiliore ac subfusco: intus carnosus, carne oleosa, leni ac pingui, quæ paulò diutius manâ nauseam proritat. Hic fructus copiosissimus nostra ætate in Hispania prouenit: iamq; inde Venetiæ portatur: solidarijs non ignotus: suffumigatoribus ben nomine notissimus. Est & minor myrobalanus, ciceris magnitudine, niger, malus: qui Mefuz, si ex nigro albescit, & medulla est alba, leni, pingui, & uetus, est innocenter. Hicambo inueniuntur. Minorem tamen nondum uidi. Maioris glâdes habeo plures uiginti, quæ ueterum tum Græcorum, tum Arabû descriptioni tam eleganter conueniunt, ut certissimum sit ben suffumigatorum & solidariorum esse Græcorum balanon myrepicam, & Arabum ben.

*βλάκων*, *Glans quercina*.

Glandis quercinæ, ut & quercus ipsius, uaria sunt genera: nota tamen, & speciei appellationem retinentia, ut de quercu dicitur.

*βάλανον*, *Balsamum*.

Nomine tenus cognita sunt tû liquor, tum fructus, tû lignum: tametsi uideri est apud solidarios & pharmacopolas fructum & lignum res plane à carposalbamo & xylobalsamo diuersas. Ex Galeni tamen succidaneis opobalsami loco substitui potest myrrha stacte, quæ est purissima totius liquoris portio, & doctorum sententia, styracis liquidi nomine cognita: aut oleum irinum, aut odoratissimæ iris radix: aut xylobalsamum oleo ueteri incoctum, Manardo. Alijs aliæ mixturæ, quas in recentiorum libris inuenies. Xylobalsami autem inopiam emendant, albæ uiolæ radices. Carposalbamo nullum succidaneum est, ut tutius sit à uulgaris carposalbami usu abstinere.

*βάλανον κυνέου*, *Balaustium, Cyrinus*.

Hoc discriminis inter se duntaxat habent, quod illud syluestris,

hic hortensis punici mali flos sit. Ambo uulgaris notitiæ. Nomen enim apud officinas retinet.

*βάρυς*, *Rubus*.

Bari nomen communior nobis appellationem sortitur, buyss son scilicet, qui ad omnem spinosum fruticem se extendit. Rubus autem magis propriè appellatur: nonse nobis rome: Italia rosou. Rubi duo genera, maior qui & celsus barbaris dicitur: minor qui bassi nomen iisdem obtinuit: humilior enim est, humi ferme ubique repens, & in medicos usus accommodatur.

*βανύλιν*, *Ranunculus*.

In quatuor fastigia distribitur. Vulgare flore luteo, uineis familiaris, cuius flores Galli des basins appellant: herbam, hic piepou. Lacteo flore insignitum, in sylvis Galliæ & Delphinatibus copiosissimum. Vulgatum apium risus, in stagnantibus, aut pigro lapu repentibus aquis frequētissimum. Purpurei, nobis non adeo familiaris: quoniam quâ ad pedem corui refertur quidam uelint. Rari sunt his temporibus in medicina usus. Ranunculi Italici pic coruino, & pic di gallo nominantur.

*βεδελιον*, *Bdelium*.

Officinæ, uocum adulterio gaudentes, bdelium uocant.

*βέτα*, *Betum*.

Betacei generis olus est, Gallis du bleti, Italis biedoni.

*βούβης*, *Bulbus*.

Bulbus: alius cæcubitus, qui Gallis des appetiz, quod sit uelut quoddam gulæ cibos fastidiosius irritamentum, appellatur: aut etiam oignon, à forma cepe, quam repræsentat. Vomitorijs alius, mihi ignotus. Non desunt tamen, qui utrunque bulbum ignotum esse uelint.

*βόργωρος*, *Buglossum*.

Vulgaris borago est. Cuius duæ sunt species: hortensis, quæ Italici borragine: toti Gallie borrache: nostris borrayo: & erratica. Quæ uerò herba passim pro buglossio in ufum medicum trahitur, ad Dioscoridis circium doctorum omnium consensus est referenda.

*βεβήθαλμος*, *Bupthalmum*.

Cotula officinarum non fœtida est. Nam uulgare cotulam fœtidam uerum Dioscorides parthenium esse, eius delineatio demonstrat, ut flos loco, in amaraco uidelicet, diximus.

*βύνιον*, *Bunium*.

Gallis nauei, aut naueu: Italis nagoni. Semen eius de la naue uelut: Delphinates & nostrates etiam naueau appellant: nostri tamen, frequentius rabo nominant, buniadis ac rapi nomenclationem confundentes.

*βεβή*, *Sabina*.

Officinis fauna: Gallis du fauinier: Delphinatibus & nostris fauine: Italis faunina. Duo fabinæ genera: unum folijs cupressi, notum: Alterum tamarici, non ita multis cognitum. Facit Dioscorides fabinam herbari arboris coactæ breuitatis, quod ut plurimum accidit. nos tamen anno superiore duæ apud Delphinates fabinæ plantas uidimus, quarum altera quatuordecim, altera duum supra uiginti pedum altitudinem excederet, ac superaret.

*βρετανικὸν*, *Bretanica*.

Doctorum penè omnium iudicio, officinarum & herbariorum bistorta est: Galliæ & huius gentis montibus præcipuè familiaris: quidam tamen britanica ignotam putant.

*βέουα*, *Auena*.

Vulgaris est notitiæ: officinæ nomen Latinum usurparunt: Gallis & Delphinatibus auoine: nostris fluado: Italis uena, & biau.

*βέριον βαρύντιον*, *Marinus muscus*.

Officinis corallina. Inuentu facilissimum in mari, unâ cum corallo, cum quo euellitur, & ab eo nomen sumpsit.

*βέριον*, *Muscus arborum*.

Is est, qui arborum caudicibus adheret. diuin generum est: Procerior & prominentibus barbis adsimilis: umbrifarum sylvarum & uallium arboribus adnascens: hic rarus est, & ueluti per floccos sparsus ac distributus: Alius breuior, densus & crassior roborum caudicibus agglutnatus: uterque uulgo dela mouffe, officinis uinea, Italia musco appellatur.

*βερβονία*, *Bryonia*.

De bryonia in uite alba dictum est.

*βερβυβιον*, *Bubonium*.

De bubonio supra in asere Attico diximus: copiosissimè eius historiam alibi exaraturi, si domino ita uisum fuerit.

*γεντιανὰ*, *Gentiana*.

Officinis nomen retinet: Gallis de la gentiane: Delphinatibus (apud quos, si usquam gentium, copiosissima progerminat) & nostratibus de genliano: Italis gentiana uocatur. In ore est

est omnibus. radix plurimis cognita, planta non ita multis. excelsis enim montibus, eorumque planiciebus delectatur. Nec facile est gentianam calidiorē solo, sponte natam, invenire. Faciunt nonnulli & minorem gentianam, quæ alibi raro quàm in montibus inuenitur, gustu amarissimo, folio quasi saponaria, flore ceruleo, radice digitata, caule dodrantali, nodoso, lævi. Eam sæpius uidi in montibus, argillofis præsertim in locis. Floret æstate. Semen uix maturefcit. Auunt eam quibusdā Italiciæ populis uulgo petimborsa nominari: maximarumque ac nobilissimarum uirū esse. Ea Fuschio cruciata nominatur.

*γάρρα.* Vinacea.

Officinis arilli, Gallis des pepins, nostris des grignōs, ac si dicas granula, appellantur: vulgaris sunt notitiæ.

*γγίδιον.* Gingidium.

Officinarum est chærophili, uulgo item Gallorū, Delphinatium & nostratū dō cerphœlitz nominat, nulli matronæ olitorie in cognitum. quanquā sunt qui contendant nerum gingidium in his regionibus ignotum esse.

*γλαυκόν.* Glaucium.

Quidam, & quidem doctiores, putant apud seplasia memithæ nomine haberi: alij ignotum esse contendunt. Nos eam litem alijs dirimendam relinquimus. Constat tamen certumque est, multas remediorum formulas parari posse, si memithæ glaucium sit, quæ alioqui nequaquam parabuntur.

*γλίσκον.* Pulegium.

Officinæ nomen seruant: uulgo dō polieu aut poliot: Italici pullegio.

*γλυκίς.* Balnearum sordes.

Balnearum quasi obsoleuit usus, præterquam in Italia: atque ob id sordes huiusmodi ad usus medicos non expetuntur.

*γλυκύριζος.* Radix dulcis.

Officinis corrupte liquoritia pro glycyrrhizæ: Gallis reglice: Delphinatibus & nostratibus regalice: Italici regolina. Radix maximi in medicina usus, planta non ita multis cognita. Sucui autem glycyrrhizæ inopia ut fariatur habes cap. 12. lib. 3.

*γλυκισίδης.* Pæonia.

Officinæ nomen retinent. Dulci est generū: mas folijs iuglandis, fœmina latoribus, rotundioribus, & insigniter dentatis, adq; sinuatis folia proximè accedentibus. Vtraque species Lutetiæ in hortis inuenitur. Fœmina his locis copiosissima. Galli utranque speciem una appellatione complexæ: ut: nā pæoniaz flores des roses nostre dame nominant: hic, quod sciam, anomia est. Nostrates de pïouno uocant.

*γναφαλίον.* Gnaphalium.

Putatur vulgaris officinarum cotonaria: quibusdā tamē ignotum est.

*γυργυρίς.* Rapum.

Latinis & officinis idem nomen seruat. Gallis & Delphinatibus des raues: Italici rabe: nostris rabe: quanquā hac appellatione buniada quoque, id est, napum complectantur. Galli itidem ea uoce rabe raphanum hortensem plerumque nominant.

*δαμασκόνιον.* Damafonium.

Ad damafonium referunt docti herbariorū plantaginem aquaticam, cuius penuriam farsit eryngium cap. 29. lib. 11.

*δαυκίς.* Daucus.

Officinæ nomē quidem retinet: At suspicio est uel maximæ, primam dauci speciem his regionibus ignotam esse. Ad secundā reuocat Manardus lebythici officinarū, quod sanè assentiēte multorum doctorū uirorū iudicio ac testimonio sinuonem Dioscoridis est. Sed tamen ad secundum genus nō ineptere ferrentur saxifragæ uulgares, estis eam quidam filij generis herbas existimant. Tertium genus uulgaris est notitiæ, & solum apud officinas, dauci nomine, in usu creberrimo.

*δάφνη.* Laurus.

Officinis nomen seruat. lauri bacce in usu sunt frequentissimo: planta rarissimo. Gallis, Delphinatibus, & nostris laurier, Italici lauro.

*δισκάνιον, ψευδοδισκάνιον.* Dictamnium,

Pseudodictamnium.

Officinæ diptanum appellant. Verum dictamnion ex Creta insula (cuius unius soboles est) Venetiæ: Venetijs Lugdunū in portatur: quo loco id mihi, sed sic, uidere contigit: rarum tamen negotiorum incuria hic est. Pseudodictamnion in Hispania copiosissimum: hic ignotum.

*δίσκος.* Veneris labrum.

Officinis & herbarijs uirga pastoris. Duo eius genera: hortensis, Gallis chardon à bonetier, Italici cardo: syluestris nostratibus debrutis, id est, scopau uestibus emundandis dicata, nominatur.

*δρύνιον.* Dorycnium.

Ignoratur.

*δολίχη.* Dolichi.

Vulgo nostratium phizoulx rouges, Italici fagiuli turcheschi nominantur: maritimis præsertim locis assidue cultu nobiles, & cibis propè quotidianis expetiti.

*δρακόντιον.* Dracontion.

Tria sunt eius genera: primum uidit Plinius in Hispania, nostris temporibus ignotū: alterum est uulgaris serpentaria maior: tertium, minor, (seu uirile sacerdotis). Dracontio Italici dragocello & serpentaria. Ruellio placet hoc caput apud Dioscoridē ascriptum esse, quod simile ueri non est. Nam id Galenus siletio minime erit prætermittendus, quem constat lib. 6. simpl. satis amplam de dracontio mentionem fecisse.

*δρύν.* Quercus.

Apud Græcos: Quercus Latinis & officinis: Gallis & Delphinatibus chaisine: Italici quercia: nostris roure. Ad quercum multæ gladi feræ arbores referuntur: uulgo Laticis illex, quæ duorū præcipue est generū. Pumilla, quæ post coctū baphicum rubrum (nostris, apud quos plurimum colligitur, uermilhon appellant) glandē de se promittit. Proceræ, quæ nostro sermone uelle, Italico elice dicitur. Est & tertia ilicis species aquifolia cognominata. Huius duo quæ genera. Mas pumilla, quæ fructū ex croceo purpureo, quip magnitudine, & effigie racemosum, aurū in inclināte ad hyemem, profert. In agro Delphinatico & Lugdunensi copiosissima. Fœmina procerior, arborque iustæ magnitudinis, naturā sterilis, folijs latoribus & magis aculeatis: quam Galli dō houx, nostris greu uocant: ex cuius cortice uisū optimū cōficiū aucupes. Ad qntā ilicis speciei iure optimo suber referri potest: cuius cortex Gallis dō liegenobis tū arbor, tū cortex siue, Italici fouero nominat. Maritimis (quod Plinius minimè existimauit) nostre punciæ locis, circa Forū Iulij, & Grasiæ, urbes nō incelebres, familiæ. Illicis species oēs perpetua frondē uirēt, & robustissima sunt materie. Quercuum generi à qui busdā assignatur fructus, quæ Gallis fausteau: Italici faggio: nostris faus. eius fructus Gallis des faines: nostris fay: Italici ghianda di faggio nominatur. In triangulari est, & rusticis, instat fæme, in cibis, ob dulcedinem, expetitus: præcipuumque urforum pabulum.

*ἐβένος ἢ ἐβένος.* Ebiscus, Althea.

Nobilissima, quæ uulgo syluestris, species maluz est, & usu medicō celebris: uulgo officinarū & herbariorum bismalua ab eius præstatiā, Gallis guimaulue, Italici malua uifco, nostris mauue blâche dicitur. Est & alcea herbarijs herba ymeonis. Italici nūc bismalua, muc malua saluatica, interdum bomo uifchio, & malna uifchio nominata.

*ἐβένος.* Ebenus.

Autori lignū est. Dioscorides indeterminatā eius generis, lignū ne esset, an aliud, nomenclationē reliquit. Paulianus, in Attica historia, radicē cesserit, qui, ex herbarij cuiusdā cyprij sententiā, hæc de ebeno scripsit mandauit. Equidē audiui Cyprium quendā, qui herbarum genera omnia ad medicandos homines optime dignoscere sciebat: is ebenum folia producere negat, neque ullum fructum ex ea existere: denique sub sole nusquam apparere, sed esse radices subterraneas, quas Aethyopes fodiant, apud quos sunt qui ebenum reperire sciunt hæc ille. Ex quibus colligi potest, quid sit ebenus. Apud doctos nomen retinet: Italici de l'ebeno, officinis ignotus. De hebeno plura lege apud Solinum cap. 65. ad hæc apud Plinium, & Theophrastum.

*ὀλεα.* Olea.

Ὀλεα Græcis: Latinis olea. Dulci est generum, urbana & syluestris: urbana Gallis, Delphinatibus & nostris oluier, Italici oliuo: fructus oliue nō nominatur: arborque est omnibus nota. Sylue stris autē officinis, medicorum plurimis, & Gallis incognita: nostris & Delphinatibus nostre provincie (nā frigida loca horret & calidis delectatur) conterminis alauerd, ac si dicatur olea uiridis, & d'alauerd, Italici oliuo saluatico nominatur. Folia enim quā domestica uirentiora, minora, breuioraq; habet, & per ambitum mollior crenata. In sylvis frequens nascitur, unde sibi apud Græcos id cognomenū adoptauit. Apud nos copiosissima inuenitur.

*ἐλαφιοβόσκον.* Elaphoboscum.

Officinarum & herbariorum gratia est, iam cognitu facilis: Gallis quibusdā de la phalouf. Luteciæ innominatum, ut & Italia.

*ὀλεων.* Helenium.

Vulgaris iam est notitiæ. Officinis & herbarijs enula campana: uulgo Gallorum, Delphinatium & nostratium, de la campane, Tuscis lella, alijs enola, & enoa, usu multo celebris.

## Veratrum.

Veratri duo summa fastigia: album & nigrum. Album Gallis de l'ellobore: Italis elloboro biancoruticis alium de verare & de nararou: nostris verayre nominatur. In excelliorum montium pratis luxuriat humidioribusq; præsertim locis (in quibus non raro cãdi veratrum caulem, triebitale implere longitudinem confpexi) delectatur. Frequens ac copiosum apud Delphinatũ montes, & in alpinis prouenit, nulli è plebe ignotum. Nigrũ officinis nomen, ut & candidũ, feruat: quanquã inter doctos non constat ea planta, quæ nigri ellobori nomine celebratur, & in medicos usus admittitur, nigrum veratrum sit. Scio pleriq; pharmacopolas valde deceptos lycoctoni secundi generis radices inconsulto pro nigro veratro in suis tabernis uenales habere, eisq; quoties nigrum veratrum expetitur, pudore omni deposito, uti. Fuchsius, placet consilium Plinij & Columellæ (quæ Gallis poumellee: Delphinatibus maritume nostris pomouley, quasi polmoniero, id enim nomen iam dictis autoribus quoq; habuit, nominatur) nigrũ elloborum uocandum, & alterius inopia, in usum uocandum esse. Alij, etiam tiri celebres, tiri nigri veratri genera in Italia nasci contendunt: primum, cui purpurei alterum, cui candidi: postremum, cui herbidũ insunt flores. E quibus nos duo priora, lycoctoni aconiti species: postremum, Columellæ ac Plinij consilium esse existimamus. Siquidem Alpini Delphinates radicibus primi aconiti lycoctoni generis utuntur ad mouen das utrinq; purgationes: eorumq; lingua antonno & anthoulo, Lygnum uerò anthoro dicitur: duas posteriores species ad luporum & aliarũ ferarum uenationes ac perniciem reliquias facit: Postremum, id est Columellæ ac Plinij consilio, Fuchsius, ut dictum est, elloborum niger adulterinus: Gallis poumellee, Delphinatibus maritume, nostris pomouley nominatur, maximamque uirũ est contra omnis generis inflationes, maxime uenenosas: contra ellobori albi, ouillũ pecus male habentis, uolentiam: contra pestilentie contagia, ut quotidianã miræque salubria rusticorum experientia testantur. Siquidem oues quæ pullulantescentem candidũ elloborum, unã cũ reliquo pabulo, deuorant, statim tota intumescunt: tantopere ut minimũ abstr, quin præ immodica tensione diffringantur, uomuntq; assidue ac magnis conatibus. Vnde opilio- nes, nõ ignorata tã perniciosis alimentis inclemetia, cognitoq; salutarĩ remedio, consilijgenis ramis aliquot anteptis, male affectarũ & de uita periclitantũ pecudũ terga, uentre, lateraque eis tandũ percussit, (eas obambulare cogentes) donec totus immoediũs; ille tumor euaporarit, & uomitus sedatũ fuerit: id quod duabus tribus, ad summi, horis perficitur. Ad hæc scio nostre provincie rura, ad quauis pecoris contagionem, trunco consilijgenis uti, perforatis ferri animalũ auriibus, truncoq; ad extirpandũ uenenũ, foraminibus impacto. Quomobrem simile ueri non est, consilijgeni, cum ueratri candidi uitia emendet, eiusq; malignitati aduersetur, nigrũ elloborũ esse: nihilq; mirũ uideri, si uiri docti, magno successu, primi generis lycoctono aconito, & Plinij consilijgeni, ad melancholicas affectiones utantur. Ceterũ si quis cõmemoraturũ iam plantarum radices diligenter expendat, nihil illas cum nigri ueratri radicibus (quæ teste Dioicoride, cepe modo bulbo sæ sunt, erumpentibus ab imo earum bulbo multis radiculis) cõmune habere multo euidentius cõperiet, quã ut pluribus demonstrari nunc debeat. Taceo nullam ex his plantis, dum uelluntur, capitis dolore, ob uaporũ halitum, cocitare, ut ipse millies sum expertus. Id qd' in nigri ueratri euulsione testatur Dioicorides: id eoq; citissimè, ad uitãdũ dolores, euellendũ esse. Ex his qd' constat, nullã harũ triũ plantarũ, ad nigrũ ueratrũ satis aptè posse reduci, qn duas priores, aconiti lycoctoni postremas species esse: postremã herbam fiji generis: difficileq; his in regionib; nigrũ ueratrũ uelutini, sed nomine ten' cogniti esse.

## Veratrum. Helxine parietaria.

Officinarium parietaria est. Delphinatibus de l'espargue: nostris spargoulo: Gallis paritroire: Italis uetrola.

## Veratrum. Panicum.

Panicum nomen officinis & Gallis, du panicum appellantis, retinet: Italis panico, & panizzo.

## Veratrum. Empetrum siue epipetrum.

Vulgatam cretam marinã ad empetrũ referri quidam uolunt, sed nequiquam: nam ignota his regionibus herba adhuc est. Epipetri tamen inopia læcit scammonium pari pòdere cap. 76. lib. 3. Est & Fuchsius suum empetrum fve faxisagrium, quod officinæ saluam uitam: & Delphinates saue uie appellant: quodq; dominus Iacobus Sylius præceptor meus longè dicitissimũ, ad quartum adiantũ genus reduci: quæ herba à ueterum empetro, siue epipetro longè diuersissima, tum delineamentis, tũ facultatibus est, quæadmodũ alibi suo loco dicemus.

## Epithymum.

Officinis nomen retinet, omnibsq; in ore est thymo & satureiz adnascitur. usus est in medicina celebris, & multi.

## Epithymum. Cicer.

Officinæ Latino nomine utitur. Gallis pois ciches: Delphinatibus & nostris cefes, Italis cecce. Duo ciceris genera, album & nigrũ, quod arietinum uocatur, inq; medicinam recipitur, & officinis cicer rubrum nominatur. Album, aliud maius, aliud minus. Maius fabas sua fermè magnitudine æquat: cõmone paucam sustinet, & cibum palato suauissimum præstat: me Se nonenosis familiare, qui, à magnitudine sumptã appellatio ne, gros cefe nominant: minus omnibus notum.

## Epithymum. Serpyllum.

Nomen officina feruat. Gallis & Delphinatibus du serpolet, Italis serpillio, nostris serpolueth dicitur.

## Epithymum. Irio.

Eruca nobilis herbarij: Gallis noble roquette: officinis ignotũ. Italicè anonyon. Eruca species est: urbium fossis & itinerum marginibus familiare. Luteum florem promit.

## Epithymum. Rubia.

Duo erythrodanti genera, maius quod rubia maior, aut rubia tinctorum: minus rubia minor officinis & herbarij dicitur. maior autem rubia Gallis de la guarence: nostris autem rouio, & Italis robbia, nuncupatur.

## Epithymum. Eruca.

Officinis nomen feruat, ubique Galliarum de la roquette, Italicè rucchetia, omnibus nota.

## Epithymum. Eupatorium.

Officinarium est, & Italorum, agrimonia: Gallorum agrimoiner: nostratum agrimoni. Quod autem officinæ eupatorium appellat, hydropiperi Dioicoridis maxime respondet.

## Epithymum. Euphorbium.

Habetur, & nomen retinet. Si recens non addit, ueteris duplum substituitur. cap. 31. lib. 13. Sin omnino desit, sulphur aut castorium eius loco admittitur, cap. 27. lib. 14.

## Epithymum. Zea.

Est uulgaris Italorum spelta. Gallis, Delphinatibus & nostratibus elpeulte.

## Epithymum. Zingiber.

Officinis gingiber, Gallis du gingembre, Delphinatibus & nostris gingiber, Italis giengero. Officinis duplex habetur: albiũ à uulgo magis expetitur, & minus præstans, ob adulterij dolo contractũ: flauum, aut penè terreum: ambo notissima.

## Epithymum. Zythus.

Potus genus est, ex ordeo aqua tãdiu macerato, donec in liquorem uino similem resoluatur.

## Epithymum. Zyma, Fermentum.

Officinis fermentum: Gallis du leuain: Delphinatibus leuain: nostratibus lename.

## Epithymum. Menta.

Mentæ duo generatũ, & syluestris, quæ mentastum Latinis, nobis mentastæ, Italis menta, saluatica appellatur. Satia in quatuor species distribuitur, quæ nõ ita multũ à sese differunt. nomen omnes retinet, excepta una specie quæ balsamũ nomen sibi apud uulgos adoptauit. Nã du baume pãlsim oĩbus uocatur.

## Epithymum. Securidaca.

Ruellio placet edylarum, de la graue, quod frumentis fit molestũ, Gallis nominariãlis des cornuetes dicit, à similitudine quam siliquæ cũ corniculis habent. Hanc, cornuetã inquam, Fuchsius, ut Sylius nosser annotauit, eranthemi chamæmeli nomine depinxit, quæadmodum in Anthemide diximus. officinis q̃ fit ignorat. In Italia aut frequẽs est, sed anonyon.

## Epithymum. Emerocallis.

Quid fit, non ita inter doctos constat. quidam siliũ, cui flos est croceus, hemerocallim putant uocari: quidam adhuc in consiliũ, ne ineptius dicam, genus quoddã fatyrj flore pallido aut subalbido hemerocallim faciunt. Italis autem gallo saluatico nominatur. Memoria tenco me, anno domini 1147. mense Maio, non prociã Lugduno herbam quandã uidisse, cui nota hemerocallis omnes magno cõsensũ addidulerunt. Siquidem bulbo habet radicem, fascis magnã, uniuiculis ceptarũ exemplo intertextam, cãdiã, succosã: caulem rectũ, teretem, caulis liliũ aut asphodeli æmulum: per singulos exortus, uerũ caulis summum, flores exiguos, suppalidos, florem liliũ figura omnino repræsentantes: folia porracea, non numerosa, humi strata, & alia omnia, quæ eam plantam hemerocallim esse aptè conuincant. Copiosissima nascitur in montibus, uerũ uiculis locis terrene quodam, qui plantam, quæ Lugduno Viennam Allobrogum iter est, terminat. Floret mense Maio. Quod illi fit uicũ: datum non est, me ignorare ingenuè fateor: in ea tamen sum sententia, ut eam quam depinxit herbam

bam hemerocallum esse certo existimem.

*Hyssopus*, Senecio.

Officinis nomen retinet: Gallis du senegon: Delphinatibus, & nostris de senigon: Italis cardoncello & pelicciola. herba est vulgo nota, & magni Aetio in hepatis affectibus, momenti.

*Eryngium*.

Officinis iringus: herbarius centium capita: Delphinatibus panicula: nostris panicaut: Gallis (ut & Italis) nullū, quod sciam, apud vulgos nomen obtinuit, ut sibi fufius annotauimus.

*Thapsia*.

*Thapsia* Græcis iuxta ac Lannis: officinis prope omnibus, Gallis & Delphinatibus ignota. Musæ Brassauolo in quibusdam Italiæ montibus provenit, & ad rusticis castragnana vulgo nūcupatur. In nostræ quoque provincie monticulis quibusdā, prope Pertusū celebre oppidū, quos vocāt Les troys freres, nascitur, phar-macopolis eius urbis cognita, vulgo ignota. plurima quoque in Apulia luxuriat: vulgo tamen anonyma. Ne hoc loci id est de thapsia silentio obliterandū. Si quis spiratibus uentis: hpsiam (media existente inter illū & aurā herba) florioro rastro euulserit, tū molestos illico pudentiori experitur pruritū, ut præscindendi assidue ac pertinaciter, absit quā minimum, quin sibi uirile membrū euellat. Id enim ab ipso periculum fecerunt, nuper intelleximus: ut inde facile sit obseruationē cōfirmare, quam in eruenda thapsia præcipit Dioscorides.

*Lupinus*.

Officinis nomen seruat, vulgo ubique: Galliarum des lupins, Italis lupino. Duorum est generum, satius & erraticus.

*Thlaspi*.

Capfella & scandulaceti Latinis: officinis ac herbarijs nasturtium tectorij, & sinapi rusticum. Duo thlaspi genera, maius & minus: utriusque lapidosi & uinei delectatur, herbariæ rei studiosis iam notissimum, vulgo ignotum.

*Lactuca*.

Lactuca alia crispā: rotunda alia: capitata: officinis nomen retinet. Gallis & Delphinatibus lactue: nostris lachugo: Italis lartuga: omnes vulgo notæ.

*Thymus*.

Latinis & officinis nomen retinet: Gallis du thym: Italis thimo: Delphinatibus & nostratibus frigulorā: uulgus, ut ne tri-mum puellum cum ignorare existimem.

*Satureia*.

Satureia Latinis & officinis: Gallis de la thymbre ou saricette: Tu scis cointella, in alijs Italiæ locis sauroreggia & peucella. Delphinatibus de sauroree: nostratibus seruegno. Duo eius summa fastigia: syluestris, quæ præstantior & domestica, maximi in hybernis insulis apud Delphinates usus. Insulis genus appellant de la pouroulo, aut pourouora.

*Intybus*.

*Intybus* Græcis: intybus Latinis. Duo summa seridis genera: syluestris & satua. Satua seris bifariam distribuitur: In unam quæ la-tiore consistit folio, lactuca similior: Hætrix corrupta ab intybo appellacione endivia: officinis itidem hæc pro uera endivia est utiurpanda, longè ualere iussa illarum endivia, quæ est syluestris lactuca: Gallis endyue: nostris endyuo. Delphinatibus cichorée. Altera angustioribus folijs, & gustu subamaro. Hæc quādā uocum diminutione seriola dicitur, quam corrum pentes recentiores, scariolam dixerunt: ea Gallis scariolæ etiā nominatur, & officinis scariola, Lugduni passim cichorée, qua in acetarijs hyeme tota, maxima palati suauitate, utuntur. Syluestris item in duas species diuiditur. Alteram quæ ab insi-gni amaritudine *αμύξις* & *αμύξις*, Latinis ambucia, herbarijs & officinis cichorea: Gallis, & nostratibus cichorée: Delphinatibus cichorée boucheasse. Alteram, quæ hedyppoides nomen à somno conciliando, aut ab eleganti inter ferias odoris suauitate, sibi adoptauit. Hæc dens leonis, aut rostrum porcinum officinis, Gallis pisse in lict, Italis piscia al lecto appellatur.

*Viscum*.

Latinis & officinis uiscū, nostris & Delphinatibus de uisch, Italis uischio: Gallis guis de chesne. Varijs in arboribus gignitur, & omnium rarissime in quercu, quamquam id solum ad medicos usus celebrari & expecti uideatur.

*Viola*.

Hoc loci, uiolæ notæ, mariam appellatam uiolā intelligit. Huius duo inueniuntur genera, cādida & purpurea. Cādida folio est minore, nigriore, quā purpurea, subfiliuto. In hortis Lugdunensibus, & sylvis uicinis passim inuenitur. Purpurea du-gest generū. Siq̃de alterius flores, quinque caliculis uerō, qua tuordecim folijs cōstat. Hūc uiolæ double: lictum simpliciter uiolette vulgo totius Galliarū appellat. Ambo in Italia uiolæ māmole dicitur. De reliquis autem uiolæ generibus in leucoio agitur.

*Equisetum*.

Herbarijs & officinis cauda equina: Gallis de la prele: Delphinatibus, ab eius asperitate, d'aspette: nostris, à cololidandis glutinandisq̃: uulneribus, consulae d'nomatur. Trium est generū, sed omnes notæ, & idem nomen retinet. In Italia tamen minor asprella, maior coda di cauallo dicitur.

*Latia*.

Officinis ignota. Duū est generum. Satua Gallis du guesde: Tusci guado: Aquitanis, apud quos mercimoniæ nomine celebratissima est, ac nostratibus de pastel, nominatur. Syluestris, quamquā doctis non ignota, nullum tamen, quod expiscari saltem poterim, uulgatum sibi nomen adoptauit.

*Salix*.

Officinis nomen seruat. Tria falicis genera, nigra omnium maxime procera, Gallis du saulx aut saule: Delphinatibus & nostris saule, Italis Salice. Candida, quæ mediæ est altitudinis, nostratibus nege dicitur, fluminū ripis familiaris. Viminalis, quæ in satuiam & erraticā distribuitur. Erratica rursum bifariam partitur: in pulliā omnium tenuissimā & ruberrimā, & aliā procerrimā, quæ nigra falicē quodammodo æmulat ac mētur. Viminalis omnes sub ameriez nomine intelligitur & corpore hēdūt, quæ Gallis oufer: nostratibus amarinier: Delphinatibus b' armarinier, & stolonæ aut segete uiticulæ nobis amarinis, illis armarines, Italis uēchi nominantur. Aliam habes falicis diuisiōne apud Fuchsiū est Theophrasto, Plinio & Lucio Columella. Nos, hæc iunus amplexi, ut qui has oēs falicis species exacte cognitas habemus, quāquā: historici alibi copiose tractabimus.

*Calaminthe*.

Tria eius genera. Primum officinis nomen retinet: Italis calamēto. Alterū pulegijs regalis (quod uerius dynopodium Dioscoridis est) nomen sibi alicui. Tertiū putatur herbariorū & officinarum herba cati. Gallis, Delphinatibus & nostris l'herbe au chat. Nepeta Italis nipotella: nec desunt (quod est uerō similis) qui herbam cati calamēti speciem esse negent.

*Calamus aromaticus*.

Officinarū officinæ radicē quādam, quam calami aromatici nomen uendit: quamque nonnulli ad acorū referendā putant: quā nimirū senetia ueterū odoratus calamus desyderet. Substitui calami, cuius laboramus inopia, potest arborū mufcus.

*Calamus phragmites*.

Arundo, uulgaris est notitia: Gallis du rouseau: Delphinatibus & nostris de cannos: Italis canna.

*Cannabis*.

Officinis nomen retinet: Gallis chanure: Delphinatibus chanenou: nostris cannebe, & carbe: Italis canape. In satuiā & syluestre diuiditur. Satua in marē & fœminā, quæ ad linens usus est accommodatior: sed sterilis mas semen proferit. Syluestris multoties ingenia torfit, nec tamē adhuc satis cognita est, quam quam non me later herba, quā pro syluestri cannabi ostendant.

*Fumaria*.

Fumus terre officinis, Gallis, nostratibus, & Delphinatibus fume terre: Italis fumaria & fumo tere: omnibus nota est, & frequentis in medicina usus.

*Capparys*.

Latini & officinæ Græcam appellacionem usurpant. Maritimis locis delectatur hic frutex. Lutea quoque in horto diuæ Mariæ uisitur. Fructus Gallis & Delphinatibus des cappres: Italis cappari: nostris, dictiōne tantillum immutantibus tapperos nominat. In nostra provincia frequēs, maritimis præsertim locis.

*Nasturtium*.

*Nasturtium* Græcis: Nasturtium Latinis & officinis. Duo sunt naturaliter genera: hortense, & syluestre, quod quibusdam lepidius minus, alijs iberis nominatur: & seorsim ab autoribus pingitur. Hortense in duo quoque genera distribuitur. Alteri quicquid folia sunt corian drinis quādamtenus proxima, subalbida: caulibus rectis, cubitalis, leuis, teres, iunci crassitudine: flos exiguus lactei cādoris. Hoc Gallis craifcon halenois: Italis agretto: Delphinatibus antior: nostris nastours dicitur. Alterū uerō folia habet silybrii cardamines, aliquanto maiora, herbacea, caule recti, cubiti altum, crassiusculū, striatum in cuius summo flos infidet luteus, aspechū gratus, alterius flore maior, & ei dissimilis. Hoc Lugdunensibus Frāciscais, in quorū horto tantū hæctenus uidere non licuit, antior nominat. Alterū enim illi ipsi cresco des iardins discriminis gratia appellat. Ambobus in signis acrimonia: sed i eo cui flores sunt lutei, aliquāto maior.

*Cardamomo*.

Duplex est cardamomi: maius & minus. utriusque triangulæres filiquis continetur. Verum in minori flauiores sunt filiquæ, breuiiores, multoque magis articulatæ: tunc autem filiquarū tennes sunt, flauæ, colore & consistentiæ maci officinarū similes. E maior cardamomo eruitur uulgaris grana paradisi: minori autem

vulgarū cardamomū minutis acinis, colore ex terreo flauis, & ita inter fe compactis, ut sua effigie mulcerdam ualde imitentur. Maioris femina multāgula sunt, colore fusca, uinaceis minorā, gustus acerrimi, sine illa adfrictione, nouis, quāquam erigere, uidetur particeps esse minoris cardamomi fructus: & gustus est cum acrimonia minimē insuauis atque tantillum aromatici. Quibūdam placet officinarum hoc cardamomum, nō quidem Græcorum, sed Arabum esse cardamomum: alij nēuētorum, sed aliquid tertium. Alij piper Indicum, quibūdam Plinij siliquafrum existimatur, ad cardamomum reuocare contendunt: sed quā appositē uiderint ipsi.

*κάρδαμυλος*

Caron.

Officinis carui, monitisibus gētis herba familiaris, macilentis locis dodrantalis, caule anguloso, non usquequaq; ut Fenchio placet, quadrangulo, lætioribus & riguis bipedali, plurimum brachiato, flore albo, aut in purpura candido, in summis cauliculis semē angulosum ac copiosum. Folia staphylini, subalbida. Radix cædida, intorta, gustu aromatico. floret æstate. nascitur, ut dictum est, in montium pratis, uulgoq; cheruy nominari ab indigenis solet. Nam illi eiusdem assiduo esu corpora ab hybernis frigidibus tutantur.

*κάρδαμυλος*

Calia.

Vulgaris canella est officinis falso cinamomum dicitur. Nam ueterum cinamomum desyderatur, cuius tamen loco optimæ calie duplum capitur cap. 91. & 101. lib. 13.

*κάρδαμυλος*

Caria

Caria nux arbor, nux iuglans siue regia, nux parua, pontica, auellana. Nux iuglans siue regia, uulgo Gallorum Delphinatiumq; noyer: nostris nogyer: fructus illis noix, nobis nofæ aut noyæ: Italis noci. Huius innumera penē sunt genera. Auellana nucis duo genera. Nā altera edomita, altera syluestris statuit. Syluestris Gallis coudrier: nobis & Delphinatib; oulagnier: fructus oulagnæ domesticæ auellaniæ: fructus utriusq; Gallis auellane aut noissete: nobis & Delphinatibus auellane: Italis auellana, nocella aut nociuolla. Sūt & Indicæ nuces, uomicæ, metel, & anacardi, de quibus recitiores multi abundē scripserunt: ad quos te remitto.

*καστανία*

Castanea.

Castanea tum Latinis, tum officinis dicitur: Gallis & Delphinatibus des castaignes: nostris castagnos: Italis castania: multorum sunt generum. Nam alię syluestres, alię domesticæ: alię maiores, minores alię: alię sunt siuauiores, alię min⁹ siuaues. Quæ maiores & siuauiores sunt, Lutetie marons de Lyon appellantur. Maximus hic apud Delphinates castaneæ omnium generis prouentus. In Gallia rarus: apud nos nullus, aut saltem minimus. Pedemontanorum quoq; ac Lyguriū ager castanearum feracissimus est, nec non & Aruernorum.

*κύνυλον*

Milium.

Officinis nomē feruat: Gallis & Delphinatibus dū milhet, & Delphinatibus iuxta ac nostratibus etiam de melh, Italis autem milgio, uocatur.

*κένδριον*

Cedrus.

Cedri duo genera: maior, & minor. Maior his regionibus nominē tenus cognita. minor ea planta est, quam nostrates ormin appellat, folijs cupressinis, baccis iuniperi maioris, rotundis, piforum magnitudinē æquantibus, subflauis, gustu acri & aromatico. Planta huiusmodi ulnarū duarū, triumue, aut ad summum quatuor (in tantā enim proceritate allurgere interdum apud nos uidetur, quanquam rarissimē) longitudinem, & uirillis tibie magnitudinē non excedit, materie dura est, uenis quibūdañ fantalnis intercurrentibus distinctā, siuauer spiras, fronde sempiterna, cortice rimoso, non supra modum durato. nascitur in montibus, saxosis præsertim locis, calidissq; durioribus regionibus. Cedraliquor cedri est, qui primus, dū pīx ex cedro fit, uigini elicatur, eo liquore his regionibus carem⁹.

*κενταύριον*

Centaurium maius.

In Gallia infrequens. Lutetia tamē in hortis quibūdam uiuitur. Audio à familiaribus rei herbariæ peritis, in alpinis nasci, in mote qui cameraco Sabaudorum metropoli ad septentriones adiacet: tum à docto quodam herbario apud Hispaniam, in montibus ei urbi iunctis, quam uulgo nostram dominam de finibus terræ nominant. Dodorum penē omnium consensu radix, quæ officinæ rhapoticū nomine uenditur, centaurij maioris radix est. Explodendus igitur officinarū de cetauro maioris absurdissimus error: admodumq; sunt, ut doctos de simplicibus medicamentis consulant, desinantq; tam impudenter in tempus reliquum delirare.

*κενταύριον*

Centaurium minus.

Vulgo herbariorū & officinarum cetaurea minor: Gallis du facotin: Delphinatibus de repaire: Italis biondella. Vbiq; frequēs. Duo huius inueniuntur genera: uulgarū, & aliud monta-

nū, humilior, flore cæruleo, calathi aut campanule effigie representante, caule item quadrangulo, gustu amarissimo. monticolis gentis Delphinaticæ uulgo repaire etiam nominatur. Sed de his aliis copiosius agemus.

*κεράσιον*

Cerasus.

Multa cerasi genera. Nā alia acida fructū, aliā dulcem ferūt. quæ acidum fructū edit, Gallis cerisiers, fructus cerises: nostris & Delphinatibus agriottiers, fructus agriottes, Italis ciregie. Huius duo genera. Dulces in multis speciebus distribuitur. Nā alia duracina, quæ Gallis & Delphinatibus des cœurs, nostris grafions. Alia nigra quæ Italis corbine: nostris ceuyriers negros. Alia ex albo rubroq; mixta speciat̃ur, hæc Gallis des guines: Delphinatibus & nostris cerises appellatur. Præstatius cerasi genus officinæ agriottum nominat. De cerasi generibus uide plura apud doctissimum Ruellium cap. 64. lib. 1. siue de stirpium natura historia: & Matthiolum cap. de ceraso.

*κετόνιον*

Siliqua.

Ea planta est, quam recentiores Græci ζυλάρικον καὶ καρβύριον appellant, nostrates de carrubibus: Italis carobe, & carobole. Lygurius maritimis familiaris, & tam frequens, ut apud nos in prouerbiū abierit, carrubia auenā esse asinorū Lyguriū. Rarō in nostra provincia inuenitur, apud Nicēā & Villā cognomēto Francā, passim. Saxosis enim asperisq; locis delectatur.

*κετόνιον*

Betonica.

Dux betonica species. Prior officinis nomen retinet: Gallis de la betoine: Delphinatibus & nostris betoni: Italis betonica. Alia bifariam diuiditur, in altalem & syluestre. Altalis Gallis oilhet: Delphinatibus giroflee: nostris girofolado. Syluestris officinis tunici, Gallis des amers. Inuenitur & in syluis altera agrestis betonica flore suppalido, mirē elegantī, quam Delphinates giroflee bochfaet appellant.

*καλλία*

Galla omphacitis.

Galla duplex habetur. Alia ab orietis partibus ad nos inuehitur, & uulgo galle de romanie appellatur: in Italia aut galla. Alia hic ē quercu nascēs nobis familiaris, quæ simpliciter gallæ nomen retinet.

*κερά*

Cera.

Officinis nomē feruat, uulgo de la cire. Cere species notiores, quām ut in his explicandis immorandum existimem.

*κεβόριον*

Ciborium.

Pocilli genus est, ex Aegyptia faba conflat.

*κινάρα*

Cinara.

Cogitari mihi ac memoria repetēti, quām incerta sit & obscura carduorum nostra certa cognitio: uix succurrit quid de illis, pro re pbabili, nedū certa, sit pronuntiandū. Nā ut agrestes omitta mus, duo fecit Theophrastus, cap. 4. lib. 6. hist. plant. cardui genera: alterū, cui scolymini alterū, cui cacti nomē inest. Scolymū hoc sibi peculiare uidecasse, quādiē tum crudū, tum coctū, uelcēdā subministrat: sed cito gratissimū, cum florescit. Cū solstitiū agitur, eius flore erupere. Eundē senescere in pappos fastidiere: partū oblongū esse, nec spinosū. Eius quoq; folia spinis carere, quāuis plāta ipsa acani specie gerat. Cactū uerō statim à radice caules humi reptātes pducere, quos uocent cactos, & foliū spinosum. Desquamatos eos eculatos esse, tætiliūq; subamaros, & in muria feruari. Emittere præterea ætærum caule rectū, quæ uocēt pternicē: eculatū & ipsum quoq; ac uersutis impatiēte. Seminibus inuolutū, forma quidē spinosum: qd̃, detractis lanuginosis seminibus, uescum sit, & palmæ cerebro per simile. Dioscoridi aut scolymos chamæleonis folia obtinet, aut alba spinæ, nigriora & crassiora: caule lōgū, foliosum: spinosum caputradice nigrā & crassā. Ex quibus liceat, inter Theophrasti, & Dioscoridi scolymū, manifestū agnoscere discriminē. Accedit, Galeni lib. 2. de facultatib. simplic. Pauli, cap. 7. lib. primi, & Aetii hoc loco, cinarā à scolymo (de quo in simplicū effigie meminert) distinguere. Cinarā aut Athengo, lib. 2. Dipno sophistari, nihil aliud esse, quam Scylorū cactōn, quæ à Romanis eorū uicinis, leui quadā litera rum mutatione, carduus nominē. Vnde ex illorū scriptis hoc colligi possit, cinarā & scolymon plantas quidē congeneres: sed huc (præcipuē Dioscoridi) erratici: illā, hortensem esse: quæ, inquit, à Scylorū cactō diuersa planta non sit. Ad cactōn igitur reuocari possit cardui genus illud, quæ Itali cardone: Galia autē cardon & carde nominat̃. Siquidem radice est crassa, candida, folijs amplis, in ambitu profundē incisīs, multis ac rigētib; aculeis armatis: caule recto, nō admodū dū procerō: capite satis aperto, spinis horrido: flore purpureascente: femine uario, id est, ex cælio, fusco, & nigro mixto, oblongo, cnicī horis sis magnitudine, læui nec anguloso. Verū in hac platura, radices erudæ ac coctæ in usum ciborum ueniunt: & inflexi deorsumq; nutantes caules, cacti dicti (nisi cacti uocem nomine foliorum pediculi ueniant, qui quasi humi reptant, uelci sunt, & modicē



modicè amari) desideratur. Vt inde colligi possit eā, aut non  
 uerā cācton, sed quandā eius specie esse: quanquā urbanam,  
 & lauriobis mēsis expetitur: aut, si nera cāctos sit, ob regionū  
 & cultus uarietate, aliqua nūc deesse, quē in ea olim uideban-  
 tur: & adesse alia (uēsa radix salicet, tū cocta, tū cruda, & fo-  
 liorū pediculi, sed cocti) quē olim ignota fuerint. Ad scoly-  
 mon aut Theophrasti, Italorū carciofi, q Logobardis archi-  
 choichon nostris carchofles: Gallis & Delphinatibus artichaut  
 dicuntur: quanquā omnia illa nomina corruptā quandā cācti no-  
 menclationē tēstent. Huic radix est crassa, cāctida, folia ampla,  
 multo minus, quā priora, in ambitu incisa, nullis spinis hor-  
 rida, mollī sanguine incana: dorsum pediculi foliorū, pminēs,  
 ac ualde fibrati: caulīs procerus: caput in cūcumine ex rotun-  
 ditate oblongū, nucis pinē quā emulū: flos nūc purpureus,  
 nunc ex purpura cāctidus: Semē cnicī, alterius semine breuius,  
 crassius, & minus nigrū. Huius præsertim esculentū est pomū.  
 Radices (quæ in scolymon esculentas facit Theophrastus) &  
 reliquæ eius partes, uelut amariore, à mēsis abdicatur. Prioris  
 autē pomū, pediculi foliorū, & radices expentur. Verūm fo-  
 liorū coctæ minus, ob tantillā amaritudinē. Audio in Italia sce-  
 lum huius generis, scolymon uidelicet, quodā spinosus esse:  
 ut inde elici possit carui genus illud, quod Dioscoridis scoly-  
 mon respōdet: nisi Italorū presura, & Gallorū chardonnette  
 (ex cuius florib⁹ lac cogitur, nnde ab Italis inditū nomē) quē  
 scolymons syluestris est, ad Dioscoridē scolymon referatur.  
 Radicē enim crassā ac nigrā habet: caulē rectū, longū, folio-  
 sum, spinosūq; : in cuius summo infidet caput multis spinis  
 horridū: flores cerulei, aut ex ceruleo purpurei: Semē reliquis  
 min⁹: folia quālibet spinē aut chamaeleonis, nigriora & cras-  
 siora. Hæc sunt q de scolymon, cācto, & cinara, ex pbatoriū au-  
 torum lætione eligere ac deprimere potuimus, adhibita in-  
 terim platarū nostri temporis oculari fidē. Acquū tamē ac be-  
 nenolū lectorem optamus meliora in mediū adducere, si ueri  
 similia, & lecturis utiliora apud eodē inuenierit.

*nicotiana*, Ricinus.

Ricinus herbarijs & officinis palma Christi, Gallis & nobis paul  
 me Christi: quibūdā tamē officinis cataputia maior nominat.  
*nicotiana*, Cithus.

Aquitanicis officinis præsertim Monspeffulani cognitus: Gallis  
 cignotus: uulgo Gallorū, ut quibūdā placet, garrius aut en-  
 glentier. Duo eius genera: mas flore rubro: femina pallido:  
 ambobus rosæ effigie. Altitudo fructus cubitalis, rami multi,  
 folia numeroſa, ramorū summitatē uescentia, rotūda, hirsuta.  
 Frequēs uterq; in nostra prouincia, & in Aquitania, syluosis,  
 aridis & asperis locis prouenit. Vulgaritū illi quod inſit apud  
 eodē nomen, adhuc me latet. Femina cithus apud Delphi-  
 nates & in Gallia quoque multis locis inuenitur.

*nicotiana*, Cithus siue Ladanum.

Officinis ladanum.

*nicotiana*, Hedera.

Klaros Grecis: hedera Latinis, officinis & Italis: prædicis quibūdā  
 cussis, inep̄tē pro klaros: Gallis hierre: Delphinatibus ere: no-  
 stris heurre. Tria Dioscoridi hederæ præcipua genera: Can-  
 dida, nigra, helix. Cāctida, candidū fructū parit. Nigra, nigrum  
 aut croci æmulū, quā Dioscoridis ætate, uulgo Dionysiā no-  
 minabat. Helix fructū nō gignit, sed tenues emittit uticulas,  
 folia parua, anguloſa, rubra. Hæ oēs species notæ hodie sūt,  
 & generis nomen retinet. Longē plures hederæ species fecerūt  
 Theophrastus cap. 18. lib. 3, hist. plant. & Plinius cap. 3. 4. lib. 16.  
 nat. hist. ad quos autores breuitatis studio te remitto.

*nicotiana*, Cnecus.

Klaros Grecis, Cnecus Latinis. Duo ei⁹, autore Theophrasto cap.  
 4. lib. 6. hist. plant. genera urbana, & agrestis. Satia officinis car-  
 thamus: Italia farfano faracinesco: Gallis & nostris, à crocatis  
 floribus, saffran bastard. Syluestris dudū itē generū. Altera  
 horreſci cneco similis, sed caule magis recto, quo antiquæ ma-  
 lueres colas uice utebātur. Fructū edit nigrū, magnū, amarum.  
 Altera species hirsuta, caulibusq; fonceho proximis, qui ob fo-  
 liorū mollitiem tertia uerſus inclinetur, & humi quāſi reptare  
 cogatur. Semen proferat amarū, hirsutū. Hæ due species sylue-  
 stris cnicī tā apertē putatā atracylidem & carduum officinarū  
 benedictū (q Italico cardo benedictus, cardo santo, & herba tur-  
 ca: Gallis chardō benit: Delphinatib⁹ herbo dau uerin: no-  
 stris cardū benit nominat) exprimit, ut significatū nō pos-  
 ſint. Vnde mirari subit, Plinū & alios quod sād Latinos scripto-  
 res: eum sequutos, ea unā atracylidē attribuisse, quæ cneco di-  
 lucidē adscribit Theophrastus, Sed inde, opinor, suæ argumē-  
 tum sententiæ deprompserit, quod eadē Theophrastus primā  
 cnicī syluestris (quā ad colus rationē attinet) species penē ad-  
 scripserit, q atracylidi Dioscorides: nec inep̄tē quidē, nisi (in-  
 teritula acarnæ historia) atracylidi ilico meminisset. Ex cui⁹  
 delineamētis non minus proptū fidē colligere, uerā atracylidē

esse adhuc ignotā: aut, si cognita sit, sine honore iacere. Nō est  
 interim hoc filitio oblitandū, syluestre cnicū secundū gene-  
 ris, nostra etate in hortis colī, & cultus māgonio, depōſita feri-  
 tate, in domesticam cōſuetudinē iam tranſiſſe. Quamquā  
 ſcio quodam leuibus argumentis permotos, nolle carduum  
 benedictum, ad syluestris cnicī speciem alteram reuocari: qua  
 ſi tātula in una altera nota diſſimilimodis, reliquis omnibus  
 exactē conſentientibus, herbe speciem poſſit immutare.

*nicotiana*, Coccus cniidus.

Coccus cniidus fēmen thymelæc est. Thymelæza autē officinarū  
 mezeredē, & herbariorū leo terræ: Ea folio est hortēſis lini, fla-  
 gellū cubitalibus, multis ab una radice cōſurgētib⁹, rotūdis,  
 folioſis: fuſco colore: flore albo, copioſo: femine myrti penē  
 magnitudinem, primō uiridi, ubi maturuerit rubro. Floret uerſe  
 æſtate. Semē matureſcit circa mēſem auguſti. In noſtra pro-  
 uincia ubiq; inuenitur, ſed præcipuē apud Aquas Sextias urbē  
 clarifiſimā, & quā inde Maſſiliā itur, in locis ſaxoſis, aridis, &  
 penē ſterilib⁹: faciliſq; uel hac nota inueni eſſe poteſt, quōd  
 nullā pedē uno aut altero, prope ſe uiuentē herbarū pariatur,  
 quin omnes ſua perniciōſa natura interimit, ut nō immerito  
 leo terræ fuerit ab herbarijs cognominata. Inopiā interim ra-  
 dicum thymelæc facit chamaelæza cap. 78. 79. lib. 16.

*nicotiana*, Coccus tinctorius.

Noſtratibus & Gallis du uermilhon: Italis grana, fructus est arbu-  
 ſti ilicēi generis apud nos frequentis, ut ſuprà in quercus mē-  
 tione annotauimus.

*nicotiana*, Prunus.

Varia prunorum genera, ſed quæ duo præcipua reducūtur. Syl-  
 ueſtre & ſatiuū. Satiuo adſcribuntur nigra multiplicia, alba, ce-  
 rea, & rubenta: quorum item plures ſunt ſpecies, ut alibi ſuo  
 loco à nobis dicitur. Sylueſtre Aſianis *prunus*, & Galen. lib. 2,  
 faciliſ. aliment. *prunus* nominat: Gallis autem, Delphinatibus &  
 noſtris prunes: Italis Tuiſis ſuccine dici ſolent.

*nicotiana*, Colocaſion.

Radix est Aegyptiæ fabæ.

*nicotiana*, Cucurbita.

Multa cucurbitæ ſunt genera, ſed quæ omnes nomē generis ſer-  
 uat: Gallis de courges: Delphinatibus & noſtris coucourdes:  
 Italis zucca. Eſt & colocythis in uſu frequens: Gallis colocy-  
 this: officinis colocy nthidos, aut colocy nthida.

*nicotiana*, Arbutus.

Klaros Grecis, arbutus & uedo Latinis, incolis Coricæ inſu-  
 læ arbyto: Italis albatro: Delphinatib⁹ & noſtris arbuto, & d'er  
 bouſſiere: eius fruū d'arboutſos, q Grecis, teſte Dioscoride,  
*myrtus* nominatur. Arbor eſt coacta breuitatis, cotoneæ  
 malo ſimilis, folio numeroſo, laui figurā p ſumma tamē ob-  
 uſiore, & in ambitu lentē ſimbriato: flore iubherbaceo: fructū  
 è lōgis pediculis inæqualiter depēdētē, prunū aut gallæ (aliquā-  
 do tamē parui mali araci) magnitudinem, rotundū, fragrum ſua  
 effigie penitus exprimente, primū uiridi, ubi maturuerit ex ſatu-  
 rata purpura ſulueſcente, guſtu cui quādā acerbitate dulci, largio  
 reſq; eū nauſæa poritante, intus granulōſo, qui autem mo-  
 matureſcit. Plurimus naſcitur in Coricæ ac noſtra prouincia ma-  
 ritimis locis: & apud Delphinates in ſyluis: in quibūdā itē ſa-  
 baudie mōrib⁹, ubi d'arbelles noſiatur. Gallie inſrequēs & pa-  
 rum cognitus. Lugduni, Valētiæ, & Tournoni in hortis quib-  
 dam plantatus uiuitur. Dioscoridi nullus eſt in medicina uſus.  
 Noſtrā tamē memoriā à quibūdā fructus maturus in capitel-  
 lum conſpicitur, liquorq; qui inde ui ignis elicitur, recondito,  
 aut proſiſſus ignoto multis experimento, ad renum & uēſicæ  
 calculos atterendos, ſeſciſſimē uſurparur.

*nicotiana*, Gummi.

Gummi nomine Arabicum puto intelligi: quod quidem habe-  
 tur, & officinis nomen ſeruat, uulgo gomme.

*nicotiana*, Lixitium.

Officinis nomen retinet. Gallis du lexiſ. Delphinatibus lexiœu  
 noſtris leixieu.

*nicotiana*, Conyza.

Pumicaria, & cimicaria, & herba ſancti Rochi dicitur, Gallis l'her-  
 be aux pulces: Italia pulicaria. Duū eſt generum, maior & mi-  
 nor. ambe notę officinis herba pulicaris, Tertium ad Dio-  
 ſcorides, hodie aut ignotum proſiſſus, aut paucis cognitum.

*nicotiana*, Coriandrum.

Vulgaris eſt notitiæ. Ab ob⁹ coriadræ: Italis coriadrōli nominat.

*nicotiana*, Colla, glutinum.

Galli, Delphinates & noſtrates Græcū nomē retinet, & de colle.  
*nicotiana*, Pes cornicis.

Doctōrū propē omnium ſententiā cornu cerui officinarum eſt.  
 Gallis corne de cerſitalis herba ſtella. Ad coronopodium re-  
 uocari poteſt herba, quam Galli uocant du targon.

*nicotiana*, Coſtus.

Coſti uiciū genus Dioscoridi fuit: uerū colore, cōſſentientia ac re-  
 gionibus

gionib<sup>9</sup> distinctū. Arabicū enī candidū facit, leuē, eximia odoris suauitate pedit. Secundū locū tribuit Indico, leui, uberi, & ferule modo nigro. Postremā sedē assignat Syriaco graui, q colore baxeus sit, & odore ferien. Galeus aut costū modicē amarū dicit. Arabū scholā duo costū genera faciunt: dulcē & amarū. Dulcis sapore quadatenus mēf glycyrrhizā, colore fūco, gustū acri, substantiā radicis solida & pōderosa. Amarus ex flauo pallidus est, leuis, lignosus, dulci crasior, minimē acrimoniae particeps. Ex quib<sup>9</sup> intelligit Arabū utrūq; costū à Grēcorū costū alienū esse. Vnde tutius sit ex Galeni succidancie ammoniacū, aut helenij radicē costū inopia usurpare. Aliud dicit nonnullū uterūq; costū Venetijs iam haberi. Habet & uulguis fūc costū qui Gallis Delphinatibus de coq; nostris costū: Italis piparella dicit. Radice numerosa, implicata, multis hinc & inde adnatis appendicib<sup>9</sup>, exigua: caule cubitali: flore in cacumine luteo, flori vulgaris athanasia simili: folijs maioris lepidij, candidis, minimē crasīs, in ambitu serratis, gustū feruido, sapore aromatico ac grato. In hortis ubiq; inuenit, quidā putat costū uulgarē ad Plinij filiquastrū aut piperitū reuocādū. Alij nonnulli pter omnē rationē ad Pauli & Plinij lepidiū, quasi uulgaris costus odore sit & sapore naturij: unde constat lepidium Græcis, agriocardomom & cardamantē fuisse uocatum. Verū in lepidij mentione, hac de re pluribus agemus.

*κνυβιδιον, Vmbilicus Veneris.*

Officinis & Gallis ignotus: apud nos frequē uulgūq; aureilhetos nominat, quod, meo iudicio, quadatenus humanas aures sua effigie emularet. Delphinatib<sup>9</sup> de bloudo: Italis cupriuola.

*κνυβας, Brasica.*

Dum est generū, Satiua, cuius plurimæ sunt species: & syluestris quæ officinis soldana aut soldanella nominatur, Aquitanicæ & nostræ provincie maritimis præsertim locis familiaris. Satiua, ab insigni ac penē arboreo caule, Gallis & Delphinatibus chor: Tuscis caulo: Longobardis uerzai: nostris caulet nomen obtinuit.

*κνυβιου, Crethmum.*

Batis duo generā syluestris, cui<sup>9</sup> meminerūt antiqui, & crethmū appellatur, quod officinarum creta marina, Gallorum crethe marine est. id. Romanis finocchio marino: alijs quibūdā Italiæ populis herba di san piero nominatur. Hortensianā barin neglexerunt ueteres Græci. Eius mentionē fecit Columella. Ea Italiæ bacula, Gallis bacilles: nostris tum basiliches, tum baguies, maximē à maritima plebe, dicitur.

*κνυβι, Ordeum.*

Officinis nomē seruat: Gallis & Delphinatibus orge: Italis orzo: nostris orge & ordi. Diuidit in polytichū, & ditichū, quod aliud in duos, aliud in plures uersus flos ordines distribuitur.

*κνυβιου, Lilium.*

*κνυβιου, Lilium.* Græcis: lilium & rosa: nonia Latinis: officinis lilii. Triā habentur præcipua lilij genera, candidū, purpurascens & croceum. Candidū in hortulanis & syluaticum diuiditur. Syluaticum à nemine hadenus depictū. Constat autē radice candida, succosa, in manus effligem conformata, radiculis oblongis, radicibus albi uerati æmulis, nō numerosis, caule dodrā tali aut proceriore, folio porri aut narcisii, lōgo, angusto, flore horretilis lilij, minore, in summis cauliculis prodeunte. Floret mense Iulio. Nascitur apud Delphinates in montibus alitis, præcipuē in montis cuiusdā pratīs, qui eorum lingua Chironno appellatur. Situs est autem ad septentriones ei urbi quæ Die uulgūq; dicitur. Croceū & purpurascens Fuchsius cognita, distincta & depicta: Gallis hominibus nondum exactē cognita. Nos omnium historiam seorsum exarauimus. Sed ad rem. Lilium officinis nomē seruat: Gallis du lys, Delphinatibus ile, nostris yeli & il: Italis giglio. Croceū, purpurascens & candidū syluestre, quia montibus sunt peculiaria, ideo uulgūq; ignoratur: purpureū tamē, ut quidā uolunt, Italis martagon dicitur. Croceum autē & purpurascens iam in hortis quibūdā maximē Lugdunensibus haberi cœperunt. Cæleste uerō officinarum lilium, iris Dioscoridis est.

*κνυβιδιον, Crocodilium.*

Spinosa platā, in aquatilibus syluarū pratīs nascens pro crocodilio ostēdit: de qua tamē statui certū, meo iudicio, nihil potest.

*κνυβι, Crocus.*

Officinis crocus: Gallis, Delphinatib<sup>9</sup> & nostris, Mauritania imitatione zaffran, quasi zaffranum, Italis zaffrano nominatur.

*κνυβι, Cepa.*

Ceparū duo præcipua genera: Albæ mitiores, minorisq; acrimoniae particeps, ac, ut plurimū, maiores. Rubescētes, acriores, & sensum gustus magis ferientes, hæc Gallis & Delphinatibus oignon: nostris, Latinum nomen tantillum uitiantibus, cebot: Italis cipolla. Habentur ceparum species quædam præmixta, & in cibis magis expetita, quas Galli ciboules appellant, alij ciues.

*κνυβι, Faba.*

Vulgaris est notitiæ: Gallis fæue: Delphinatibus & nostris fæue: Italis fæua.

*κνυβι, Cyclaminus.*

Dum est generum: prior officinis cyclamen & panis porcinus: herbarijs panis porcinus: uulgū Gallico pan porcini: Italico autē pan porcino. Hec species copiosa nascitur apud Diuū Claudium nō procul à finibus Heluetiorū, & in montibus Aruerinæ, & alibi multis in locis. Altera species quæ fit, nondū doctis compertū est. Ruellius tamen contendit esse Gallicarum officinarum sigillum Mariæ, quo nomine Delphinatice polygonatum intelligunt.

*κνυβι, Cyminum.*

Aliud Aethyopici, nobis ignotum. Aliud his regionibus nascēs, quod officinis nomē seruat: Gallis & Delphinatibus du cumin: nostris cumin: Italis cimino appellatur.

*κνυβι, Cupressus.*

Vbiq; Galliarum cypres: In Italia cipressū arbor est notissima.

*κνυβι, Cyperus.*

Cyperus officinis nomē retinet: Gallis du fouchet. Dioscorides cyperi radicis oliuari tuberculo facit tunicēs, inter he cōmissas, nigro colore, iucundē spirantes. Inueniunt tamē nonnullis in locis oblonga, nec à prioribus gustu differētes. Cypero caulis nisi triagulus, nisi quadragūl<sup>9</sup>, ut ob id angulosus Dioscoridi fuerit dictus. Herba est notissima, ubiq; in paludosis & humidis nascēs. Est & cyperus Indicus zingiberi similis, gustū leuiter, aut nihil profero, amaro, qui cōmanducatus crocū remittit colorē: & pilosis partib<sup>9</sup> illitus, pilothorū efficacissimū est. Hic assentientē descriptionē, & doctōrū omniū in iudicio, nihil alit, quā radix illa, quæ ex India cum zingibere affertur, uixq; ab ullo, nisi à peritis, discernitur, quā Italicæ officinæ curcumā (non quidē radicem maioris chelidonij, quæ in Serapiōis codicibus curcuma corruptē pro chelidonia legitur) Gallicæ terram meritam nominant. Tertium cyperi genus herbarum coniectores fecerunt eam radicem, quæ officinis & medicis recentioribus, galanga dicitur: quod subrusta sit, geniculis scætenis, surculosa, in quosdam nodos crasiores ex intervallicis intorta, sapore acerrimo, linguā admodū uellicante, odore quadatenus cyperum imitante. Hanc cyperū Babylonicum cognominant. Quidam contendunt eam esse ueterum acorum. Verū multa notæ repugnant, quō minus galanga dicti acorum ueterum possit, ut in acori mentionē dictum est.

*κνυβι, Ligustrum.*

Officinis alkanna, Gallis du troyne: Delphinatibus & nostris oli uier faulgaue. Tuscis guistrico, alijs quibūdā Italiæ locis oli uetta, alijs oliuella, alijs nonnullis chébrossene, nominatur. Nec me mouet, quōd Fuchsius cyperum platā peregrinā ex Plinio esse uelit. Nā multa plerūq; & lōginquo petitur, quæ domi citra magnū negotium inueniri possunt. Siquidem platæ nō paucae his in regionibus affatim luxuriant, quas antiqui soli, pene dixerim, Crète peculiare existimari, ut de tordyllo apparet, quod ipsemet Fuchsius copiosissimum nasci in Germania prodit: quodq; in huius Delphinatice gentis montibus, & alpidis ipsius, uel ad nauscam uelq; luxuriare certō scimus, quæ admodum alibi copiosius dicemus.

*κνυβι, Cytillum.*

*κνυβι, Cytillum.* Græcis: Cytium Latinis: officinis & uulgū ignotum. Antiquius tum medicis, tum rei rusticæ scriptoribus celebratū fuit, & in precio habitū. Nostris temporibus à paucissimis notum. Hic tamen Lugduni in orto Franciscanorum habetur frutex quidam, qui cytho antiquorū omni ex parte respōdet. Spēctatur autem hac forma. Frutex est lesqueling altitudinem petens, nulla ligni grana, brachio minus crassus, flagellis exiguīs, oblongis, apicē incano, folio sempiterno, folij fœnigræci aut loi trifolij æmulū, dorso medio prominente, superne herbeace, inferne candicante, quod digitis contractum erucam olet, cōmanducatum uerō, cicoris recentis gustum respit. Flore quasi pisi luteo, nigricantibus uelut punctis maculoso: quo decessu fœmen in siliquis, sparij Dioscoridei siliquis, aut anagyridos (quæ uera Theophrasti cap. 17. lib. 3. hist. plant. colutea, & Plinij cap. 18. lib. 16. laburnum est) corniculis non absimilibus, recondit. Floret hyeme tota & usq; ad uernū æquinoctium, aut etiam mensem Maium: sed urgente hyemis inclementia, magis apparente æquinoctio, minus: Maio uerō, minimum: quo nimirum tempore non tam multiflori flores apparent. Ex his sensum æstate siliquatur, ac tandem Autumno, in siliquis sparti Dioscoridei, aut coluteæ Theophrasti, quæ Dioscoridi anagyris est, & Plinio laburnum, siliquis non dissimilibus maturum fœmen recondit. Rarissima planta in Gallia est, & crediderim unica, ut quæ ante annos aliquot Roma à perito, quopiam medico



huc allata fuerit. Olim iuxta aluearia ferebatur, tum in Italia, tum in Hispania. Verum Plinius etate (ut ipse testis est cap. 4. lib. 13) iam in Italia erat rarissima. Nostris temporibus aut nulla, aut (si Virgilio Marcello credimus) ignota sine honore iacet. Vnde mirari subit eorum sententiam, qui cythium faciunt plantam toti Italiae notissimam, quodq; patrio ipse fermone trifolium de cavallo & tribolo nominari dicant: & Fuchio (ut ipsi dicunt) trifolium asplation in consilio existimari. Verum an ruta caparia herbariorum, quae nostris Pherbo de la cabrière, & Fuchio odoratum trifolium dicitur, trifolium illud sit, an cythium, capite de trifolio exactius in examen adducemus. Nunc autem, quoniam in coluteae mentionem incidimus, minimè alienum ab instituto nostro fuerit, huic orationi pauca de illa subnectere. *Κανάρια*, Theophrasto: *ανωρύγος*, Dioscoridi: laburnum, Plinio: quibusdam Italiae populis, eghelo: Delphinatibus, Sabaudis, & terrae nouae incolis, metathesi quadam literarum à Latina nomenclatura minimè variantibus, albour & aulbour nominatur. Arbor est fruticosa frutëx arbo rescens, in quatuor nimirum ulnarum altitudinem assurgens, candide non admodum crasso, ramis hinc & inde diffusis, & coryli modo ab imo caudice regerminat fruticosa specuatur, stolonem numerosos ab una radice fundens, longos, rectos, ex uiridi candicantes, agni uirgis similes: eis quibus per certa interualla erumpunt folia terna, longo pediculo nentia, fœnigraei folijs effigie ac numero similia, maiora tamen adque uiculis folia plurimum accedentia, laeua, superne uiridia, inferne candidantia. E ramis ipsis prope foliorum pediculos emergunt flores lutei, ut flores genistae aut brassicæ, sed longis pediculis inæqualiter dependentes, rariore: illa ac prælonga textura cubitalem æquant longitudo, olentes grauitat, ob id, profecto, apibus in grati. Floribus decussis prælonga succedit cornicula siliquæ uel non prætumida, & multo spiritu distentæ, sed pisorum hortensium siliquis adfimiles, aliquanto tamen breuiiores ac pressiores, fractu contumaces, in medio interdum inanes ac compressæ. In extremis autè ac nonnunquã intermedijs spatijs cōtinetur semen lentis magnitudinem æquans, ex latitudine subrotundum: imo loco, quâ siliquæ per petiolum heret, tantillè excauatum, renis profus æmulis: quod, antè quàm maturerit, uret: post maturitatè uarium est, durit, & ob laeuiorè splendidi. Floret mēse Maio & Iunij initio. dein sensim siliqua tur æstate, ac tandè durecit matrescente uua, & circa calend. Octob. integrè perfcitur. Nasitur in albus & montibus ferme omnibus Delphinatus, Sabaudis, & terræ cognomento nouæ, umbrosis & syluosis locis humidis, & nonnunquã siccis, æque eorum locorū in digenis albour & aulbour nominatur. Ex quibus notis constat Dioscoridem, Theophrastum ac Plinium unam & eandem plantam uarijs nominibus descripsisse. Verum obijcit aliquis: Si Laburnum Plinij & Dioscoridis (id quod negari nō potest) anagyris cēseri hæc plāta debet, q̄ fieri potest, ut de anagyride seorsim Plinius tractat? Sed his rēspōdēdū potest, Plinium anagryrin & Græcorum libris, ut plerq; alia, transiisse: & laburni historiam, qualem aduisione à rustici alpium cognouerut, aut fortè etiā plantam uiderat, summam cōscripsisse: argumētū idē sumpto, quod nonnunquã Theophrastus, dum quā Dioscorides laburni meminert, ut interim taceam illum, cap. 34. lib. 16. eadem de hedera: quæ cap. 10. lib. 24. de citho: & alibi de marrubio, quæ de porro dicenda erant, tradidisse. Ceterū, ne longior sum, certò (præter reliquā historiam similitudinē) ac indubitatō scio, laburni alpiorū corticem fccatū, in pollinem redactū, & drachma plus minus una, ex quopīa liquore potui exhibiti, maximas uacuationes moliri, uerum diuerfa ratione, quandoquidē, si ab infernis ad superna procedendo corticem euulsum porrigas, uōmitti: sin uerò à supernis ad inferna descendendo, deiectiones uel infignes mouebis. Quæ omnia fidē faciūt Plinij laburnū à Dioscoridis anagyri, quæ est Theophrasto colutea, nulla in re differere: eosquēdē: autores unam eandemq; plantam uarijs nominibus expressisse, & adumbrasse. Isto igitur, ut idēm huic disputationi finem imponamus, Theophrasti *καυάρια*, eadem ipsa planta, quæ Dioscoridis anagyris, & Plinij laburnum: quæ, inquam, Italij quibusdam eghelo: incolis terræ nouæ, Delphinatibus & Sabaudis albour & aulbour uulgo nominatur. Sena autem officinarum Arabum magis inuētum esse existimanda quā coluteæ cōgenerem, & ab eius uiribus non uisuequaq; abhorrentem, defendere quidam uoluerint. Verum de his alibiarius ac pluribus (si opus fuerit) agetur.

*Κικύαρις*, Cicuta.

Officinis nomen retinet: Galia de la cigue: Aquitanis cegudo: Italici cicuta: nostris de fenouillas aut fenou de sèrp nominat.

*Νύκταξις*, Nux pinea, Cocalus, Strobulus.

Officinis nux pinea: Gallis & nostris pomme de pin: fructus ipse

id est nucleus nostris, præsertim in maritima provincia, de pig-nons: Italici pinocchi & pignoli appellatur.

*Κανκάρια ρίζα*, Cancanaradix.

Quidam putant esse carui syluestre.

*Κανκαρίς*, Caurcalis.

Gallis, ex Ruellij sententia, persili bastard: Senis Italiae urbe petro-sello iulauico. Verum domino Ioanni Vassæo, medico doctiori Parrhisiensi peritissimo, placet caulem eam esse herbam, quæ Gallis Pherbe aux gouttes appellatur. Eius namq; uidebatur copiam nobis fecit anno domini 1543. cū adhuc Luti-tiæ essemus. Nam tum unicam illius plantam in suo hortu suo drosæ, unā cum maiore centauro (quod tridem ibi uidimus) colebat.

*Καρπύσιον*, Carpesium.

Officinis cubebe: nomen ex Arabum disciplina obtinuit. Quidā negant cubebas carpesiū esse, quod eē fructus fructus: carpesiū aut tem caulis aut radicibus inopia augeri uolunt plu, aut ue-ram casiam minui.

*Κέρκυρα*, Cicerule.

Officinis ignota. Gallis, Delphinatibus & nostris iaysses.

*Λαθύρις*, Lathyrus.

Officinis cataputia minor: Gallis & Delphinatibus de l'espurge: nostris, officinarum nomen usurpantibus cassapue: Longo-bardis capicizza uocatur.

*Λαυράσιον*, Lampšana.

Herba est officinis ignota. nostris à Græca nomenclatione tantil-lum euariantes, de lassenos: Itali lassana: Galli des armoiries appellant. In frumentacis agris ubiq; copiosissima nasci-tur.

*Οξύλαπθον*, Rumex, Oxylapathum.

Oxylapathum officinæ lapathum acutum, Gallis de la parrelle, aut de la patience: Itali rombece. Secundū genus ea herba est, quā omnes hodie rheubarbe & putant & nominant. Tertiū sylue-stre lapathi est, exiguum, ubiq; copiosissimū, & nostris lapas, Gallis & Delphinatibus du lapis dictū. Quartū oxalis dicitur: cuius duo sunt genera, syluestris & hortensis. Hortensis etiam bifariam distribuitur: in eam, quæ oblongis & nigricantibus folijs: & eam, quæ albicanitibus & rotundiusculis constat. Est & syluestris oxalis omnium minima, & in medicos usus, pluri-quā cætera lapathi genera, expetita. Officinis & Italici acetosa: Gallis oxallæ: Delphinatibus & nostris aigretto, Lugdunen-sibus falletretum hæc, tum reliquæ oxalidis species dicuntur.

*Λιμόνιον*, Limonium.

Latinis bæ syluestris, limonium, tertū tinabulum, quibusdam pyrola: Gallis, nostris, Delphinatibus, & officinis ignotum.

*Λειχίς*, Lichen.

Officinis hepatica: ubiq; in locis riguis frequens. In calce huius libri habes Leonopodij & Lepidij capita, quæ hic per ime prudenter omisa sunt.

*Λευκοίον*, Leucoium.

Trialeucoij genera colore inter se disparata. Nā aliud luteum, quod & eiri officinis nominatur: Aliud candidū: & tertiu quod purpureum florem emittit. Gallis & Delphinatibus des giro-flees aut uiolettēs: Italici uiola bianca: plante des uiolets: no-stris de garraons, sumptā, nī fallor, à Mauritanis nomenclatio-ne, quā keiranes, appellantur. Luteū leucoion aliud spōte na-turæ prouenit, aliud in hortis studiose à mulierculis colitur. Cetera hortensia sunt. Ceterum nostra memoria haberi cæpit planta, quæ radicibus constat exiguis, confibratis: caule cubita li, rotundo, molliter uilloso, foliofo: folijs nigris, oblongis, fo-lijs lymphaticæ proximis, acutioribus tamen, in ambitu lere & ex interuallis fimbriatis: flore in cacumine albo, exiguo, agglome-rato, barbulis prius quàm aperiat molliter hispido, & copio-so, leucoij floris æmulo (ubi id nominis sibi apud uulgos adoptauit. Nam maxima ex parte uioles d'espaigne, aut uio-lies multæ appellantur) odorosi suauiter præstanti, & à styrae calamitè minimè alieno. Floret uerno tempore. In hortis ubiq; iam inuenitur. Viola Hispanicæ aut moschatæ (aprius ta-men styracina uolga diceretur) nomenclationem cum uulgo retinimus, quod ex Hispania primum huicallata fuit, & re ue-ra, species uiolæ cēseri possit. Nullum tamen eius in medici-na usum nouimus: est ex odore confestherbam esse uiribus ac dignitate præstantem, & ad multa uilem.

*Λύβος*, Populus alba.

Officinis populus alba: Gallis du tremble & peuplier: Delphinati-bus pioou: Italici alberti: nostris piboulo & aulbero nominatur.

*Ροζμαρίον*, Thus.

Vulgaris est notitia: uulgos encens: Italia incenso, quod passim in templis, & alibi incendatur: appellat.

*Ροζμαρίνα*, Rosmarinus.

Coronaria rosmarinus ubiq; & frequē & cognita: Gallis & Del-phinaris\* de romain: nostris romain: Italici rosmarino. Reliq

eius species non item. Maximi usus olim fuit in medicina primæ rorifinarini speciei semen, quod canchry dicit, eiusq; mentione scaten ueterum medicorum formulæ. Verum tamen eius inopiâ substitui potest tantumdem pyrethri cap. 5. lib. 12. seu pyrethrum aut alaphis agria cap. 65. lib. 8. & cap. 3. 4. lib. 9. Audio tamen Venetijs in quibusdam hortis primâ rorifinarini speciem inueniri, & doctores studio ac diligencia coli.

*Λυγισ, Fuligo.*

Varie sunt fuliginis species.

*Λυγισ, Liguistum.*

Verum liguisticum adhuc desyderatur. Brassaulous nequiquâ conatur herbariorum & officinarum imperatoriâ, quæ est Delphinatium alegros, & Diofcoridis lalepiriâ, quæ liguisticum reuocare, argumetum inde uel firmissimo sumpto, q; imperatoriæ semen oblongum non est, subnigrum, fenicilaceo maius, acre, & aroma oleum (quæ sunt uere liguistica (seminis notæ) sed latum lentius læ modo, membrana in ambitu cinctum, & admodum pressum, quemadmodum alibi copiosius dicemus. Quidam docti affirmant fere in montibus Lygarie ueri liguistici uidisse: non tamen genti peculiare illius plantæ non exprimitur, ut ex illorum scriptis quod sit, cognosci possit, & postmodum haberi.

*Λυγισ, Lini semen.*

Officinis nomen feruat, & nisi multo clarum esset uulgo semence aut grain de lin, Italis fere de lino.

*Λυγισ, Lobi.*

Sunt dolichi, nostris phaulx, de quibus in dolichis iâ dictum est.

*Λυγισ, Mercurialis.*

Officinis mercurialis: Gallis de la mercuriale: Delphinatibus pa nareaul, & uignolanen: nostris corrupte marturiau pro mercuriale: Italis mercorella dicitur. Duum est generum, mas & femina: amba notæ.

*Λυγισ, Lonchitis.*

Ignoratur,

*Λυγισ, Lycium.*

Verum lycium his regionibus desyderatur: rusticum haberi possit, uide cap. 63. lib. 8.

*Λυγισ, Lysimachium.*

Herbarij corneloi uocat: Galli poule aut pelle bolle, q; paulo uel præ pestilentes tumores laboratua eius folia, præfens remediis adharit? suppediat. Duo statuunt eius genera: alterum flore luteo, qd habet? nâ caule consistit iuoco, longo, nodofo, folijs sagittatis ut plurimum ternis, gustu ualde adstringentibus, flore in cacumine luteo, specioso, radice purpurascete, copiosa. Nasctur in pratis humidis, & iuxta alueorum margines ubiq; alterum purpureo, adhuc ignotum.

*Λυγισ, Trifolium.*

Officinis andacoca, & corona regia.

*Λυγισ, Lotus arbor.*

Officinis ignota: Gallis alifern: nostris aliguer dici solet. Italis quibusdam balogaro: alij perslaro.

*Λυγισ, Macer.*

Macer ueterum desyderatur: in uisum tamen eius loco uenit cortex nucis moschata, quem macis officinæ appellant.

*Λυγισ, Malabathri folium.*

Veterum malabathrum non amplius extat: foliū autem quod nunc utimur, inueniunt Arabum est.

*Λυγισ, Malua.*

Malua tria genera, uulgaris flos domesticæ, quæ officinis Latinis nomen feruat, & uulgo mauue dicitur: syluestris, quæ althea flos ebfius nuncupatur: officinis bifinalia: Gallis & Delphinatibus guimauue, Italis malaunio: nostris mauue blanche. Tertia alcea est, folijs quàm reliquæ articulatis?, caule procero & lignoso: officinis incognita: herbarijs herba symeonis: doctis non ignota. Est & arborefcens malua, quæ opinor antiquis hortulanam fuisse, caule quaternum quinque cubitorum, folio amplo, circinnato rotundatis, flore albo aut purpureo, inodoro. Hæc passim in hortis inueniunt.

*Λυγισ, Mandragoras.*

Duo eius genera, mas, ubi cognitus: & femina, quæ nodi uidi. Officinis nomen feruat: uulgo madragore: Galli tamē metathe si quadā syllabarū mōt de gloire, p madragore nominat. Aitne qui se uidisse testant, mare madragorā, uirilis: femina, femine pudē imaginē i radice habere: eisdē meli? adolefcere, & fecundiores esse, si mas iuxta femina, plateat, & cōtra: alioqui steriles esse. Madragoras hic in multis hortis inueniunt: & fati facillimē progenit. Quidā mala infana, quæ uulgo pommes d'amours uocatur, ad madragorā referri debent: cōtēdūt. Si desint poma madragore, cortex radicū ei? usurpat cap. 107. lib. 7.

*Λυγισ, Fenciculum.*

Dum est generum domesticū, & syluestre, quod hippomarathrum, id est, magnū feniculi. Domesticū aliud fatiū dulcius & humilius: uulgarē acris. officinis Græcum nomen infedit: uul-

gō feniculi: Italis finocchio.

*Λυγισ, Mastiche.*

Duo mastiches genera: Aegyptia nigra, inuētū rarior: cuius inopiâ chia usurpari debet, cap. 14. lib. 15. Est & chia mastiche, mastix officinis, & Gallis du mastiac appellata, candida, uisū celebris, & uulgo nota. Hoc tamē iustitio prætereūdi nō duxi, mastiche uires deijcēdæ alui ab antiquis niquā attributis fuisse. Aetiū autē mastichen scrupulorum nouem pondere alui? mo uere, scriptis mandauit cap. 67. lib. 8. & cap. ultimo eisdē: eandē quod duodecim scriptulorum pondere alui? excrementa deijcere, cap. 117. & 155. lib. 3.

*Λυγισ, Melanthium.*

Officinis nigella Romana: Gallis de la pourceur: Delphinatibus de barbus: nostris fene de saint leasitalis niella. Est & syluestre melanthiū, qd quibusdā officinis ternerē pro uero usurpatur, & à Fuchio nō multo cōsultius pro lolio Græcorū accipitur. Gallis de la nyelle: Delphinatibus & nostris nielle. Habetur quoque iam passim Lutetiæ aliud ueri melanthij genus, se mine subflauo aut rufo, quàm ipsum nigrū sit, odoratore.

*Λυγισ, Melioium.*

Latinis fertula cāpana, & corona regia: officinis Græcolū nomē in sedit: Gallis du melilot. Tria hodie inueniunt meliloti genera. Primiū odore suauissimo præditum, folio fenicigræ, lente fimbriato, flagellis oblongis, flore luteo, auenæ fere exiplo spicato. Id à doctis penē obitus uerū Diofcoridis melilotū existimatur. Quidā id luteā faxiragā maluit appellari. Alterū aspectu incano, folijs minutis, crocato flore. Id pro uero meliloti in hæc uerū? tēpora usurpat ab officinis fuit. Tertiū Italicū, qd nōnullis ueri meliloti putatur. Primi, id est, ueri generis duæ sunt species, solo floris colore distinctæ. Siquidem unius floris, luteus: alterius, cādidius. In cæteris, caule nimirū, radice, folio, floris effigie, & pedulo femine plantæ omnino similes: adeo, ut si faxiragæ titulo insigniri debuit, nihil secius faxiraga alba, q̄ lutea appellari poterat: uidelicet plurimis nostris, puincia locis, uberior fatis meliloti, q̄ lutei puentus.

*Λυγισ, Mel.*

Præstantius Atticum, nostrū & Narbonense uiribus & præstantia Atrico respondet. Reliqua quæ frigidioribus locis proueniūt, inferiora sunt. Officinis nomen retinet: Gallis & Delphinatibus du mel: Italis melle: nostris meū & miel dicitur.

*Λυγισ, Melissophyllum.*

Officinis melissa: Gallis de la melisse: Delphinatibus & nostris melize: Italis cedronella & melissa.

*Λυγισ, Papauer.*

Quinq; præcipua cōperiūtur papaueris genera: albi, nigrū, purpureū, rei herbaria scriptoribus intactū, & de quo abunde alias suo loco. Rhæas, cui? duo genera: mas, cui? flos purpure? femina, cui? pallidulus: & cornutū. Prima genera officinis nomē retinet: Gallis du pauotno: nostris papari: Italis papauero. Purpureū autē officinis ignotū. Rhæas officinis papauer rubrū: Gallis du poucau aut coquelicot: nostris, corruptū Græcā nomē, clatione, rhoello: Italis papauero faluatico. Cornutū officinis nomen feruat: Gallis & nostris anonyum, quod sciam, est.

*Λυγισ, Mespilum.*

Latinis & officinis Græcū nomen infedit: Gallis meslier & neslier, Delphinatibus nespollier, nostris nesplier: Italis nespolo. fructus Gallis mesles aut nesses, Delphinatibus nespollus, nostris nēsplos. Duo mespili genera facit Diofcorides. Primum quod à quibusdā aronum dici cōmemorat. Id, ut auctor est Manardus epist. 1. lib. 10. uulgo in Italia azarolo nominat. Alterū quod in Italia nascit, & à quibusdā fetaniū ab alijs epimelis uocatur. Theophrastus autem, cap. 12. lib. 3. hifto. plant. & Plinius cap. 20. lib. 15. nâ hifto. tria mespili genera ferunt, anthedona, fetanē, & Gallicā: ad quos autores breuitatis studio te remitto. De epimelide uaria est doctōrū sententiā. Nam Diofcoridi mespili: Galeno arbuti genus esse uidetur: quāuis ipsi Galeno lib. 2. aliment. idē sit amamelis quod Diofcoridi epimelis: in censu autē simplici epimelida arbuti genus esse dicat, quæ Græcis *κνυμω* uocatur: adeo, ut in tāta tentariū ambiguitate, quid certi proniciari possit, sit profusū difficile. Sed flos mespili Diofcoridi species sit epimelis, flos arbuti rusticis Itale, Galeno & Paulo auctoribus, unedo, & Græcis *κνυμω* nominata, non est huius loci cōsiderare. Verū in præsentia hoc tantū addidisse fat fuerit, mēspilorum apud Galias duo haberi fastigia: maius, quod & mitius: minus, horridius. De comaro autem quibus nominibus uocatur, quibusq; in locis proueniat, abunde suo loco diximus.

*Λυγισ, Malus perfica.*

Perficæ mali genera non pauca. Quædam enim duracina uocantur, & sanguinolenta sunt, nucleo quatenacissimē adhære scunt. Quædam nucleum deserunt, & hæc duum sunt generū, nâ ficiora alia, friabili & solidiore carne, non postremā inter perficā

perfica dignitatis: alia humidiora, omnibus vulgatissima. Corbelliana Lutetiae in magno sunt honore. Officinis omnia nomen retinent: Gallis & Delphinatibus pefches: nostris perieges, ac si dicas perfica: Italici pefche: quae autem multum lutea sunt, pefche corogoe appellantur.

*radix agrestis.* Malus armeniaca.

Romanis Galeni saeculo praecox dicebantur: unde, opinor, Galii ac Delphinates, deprauata priscorum appellatione, abricotz: Itali autem baroco & monache, appellat: nostri autem perles, quod nimirum sunt perficorum malorum uelut anteambulorum quidam, ac praecuriores. Varia his regionibus spectantur armeniacorum genera. Nam quaedam hic habentur, quae galli nacei oui magnitudinem aequant, subfulua, carnosae, & palato gratissima. Alia minora sunt, & multo minus suauia.

*radix iudaea.* Malus medica seu citrea.

Ab insigni fructu, et in colore, sapore, quam forma ac uarietate arbores horum feraces appellatione sibi coparant: quam quae congeneres, et ita inter se similes sunt, ut distinguere, nisi magna difficultate, nequeant. Mala igitur fulgoris auri emula, aurenges Gallis: Delphinatibus & nostris aranges: Italici arci, parés uelut aurengier, & arangier. Quae ex uiridi in luteum langue scunt, uulgo citros, Italici cedri & citroniarbor citrionier. Herbae uirentia colore, limons: Italici limoni: arbor limonier. Praegrada insit melonum, orbiculata: facie turgentia, pontices dicuntur: arbores ponciter. De his plura apud Ruellium cap. 69. lib. 1. Et nos quoque singulorum tum fructuum, tum arborum mali medicae faciem tuis oculis scripto aliquando ita subiicimus, ut etiam absens, quasi praesens, de illis iudicare possis.

*radix.* Malus omnis.

Pomorum infinita genera, sed quae in tria quatuorue praecipua reduci possint: aulstera nimirum, acida, acidulencia, & dulcia. Nomen retinent officinis, Gallis, & nostris: priuatae tamen nomen clarior, aut alio loco, aut ab imponendum arbitrio acceperunt, ut alias explicabitur.

*radix.* Meon.

Officinis foeniculus tortuosus: uulgo ignotum. Locis calidis gaudet. Inuenitur hic in agro Valentino: & in Gallia non procul a Lutetia copiosissimum apud nostrates prouenit: uulgo tamen nostrati, anonymum.

*radix.* Mora.

Mora duum sunt generum, alba & nigra officinis mora: Gallis & Delphinatibus de meures: nostris amouros: Italici moreas: bor illis meurier: nobis amouir: tum arborum, tum fructus, uulgaris sunt notitia.

*radix.* Fungus.

Fungi Gallis des champignons: Delphinatibus braconles: Italici prignoli: nostris bourgiboules: nullius in medicina usus. Alia multa sunt fungorum genera, sed plane inutilia ac pernicioiosa.

*radix.* Auricula muris.

Officinis auricula muris: uulgo do morron. Italici anonyma.

*radix.* Tamarix.

Officinis tamariscus: uulgo do tamariz. Italici tamarigio: Copiosa nascitur in Narbonensi Gallia, apud nos passim in hortis: apud Delphinates in sylua Gratiano poli ad orientem posita. Adhuc in quibusdam Rhodani insulis.

*radix.* Myrtus.

Officinis myrtus: Gallis, Delphinatibus & nostris de la nerte: Ita lis myrto. Duo myrti genera: maior, cui maris nomen: minor, cui femina discernimus gratia adaptari potest. Plurima Lutetiae uisitur in siccilibus uasis. In nostrae prouinciae maritimis tractibus uberrime luxuriat.

*radix.* Moly.

Quid sit sylvestris ruta, nisi ea cescatur, quae passim in agris, tum apud nos, tum alibi inuenitur, nescio. Scio tamen eam herbam, quam Lutetiae sylvestris ruta nomine offendant, moly nomen esse. Audio tamen Plinianum moly (nam Dioscoridei ignoti est) in Capania Italiae inueniri, radicibus eius pedum triginta longitudinem aequantibus. nasci saxosis locis.

*radix.* Nardi spica.

Officinis Graecum nomen infedit: quia illis non infrequenter turpi ter imponitur. Na instiores quida ac callidi nebulones hoc adulterio nardi spica mentiuntur. Accipiunt enim superiorem radicis sefeleos creticis (quod Delphinates ceitre, Lygures ceistre uelut appellat) partem siccam ac uelut comantibus staminibus refertam, truncos: caulis & inferioris radicis amputatis, mace rant, aut modica aqua, in qua dissoluta est rubiae maioris radix, reispergunt: dein cinamomi decocto aromatizant, sicque diligenter siccant: pro nardi spica dant ueniam. Nam hunc fucum mihi nupero detexit quidam, qui eodem ipso quotidie multorum detrimen to uteretur. Volunt docti nonnulli nardi spicam officinarum, non Indicam, sed Syriacam nardum esse.

*radix.* Nardus Celtica.

Si doctis creditur, a paucis hodie nota est. quamquam non desunt, qui Gallorum & nostrorum apic ad Celticam nardi referendū putent, pseudonardi uulgarem lauandum esse uolunt: uerum nardus Celtica in alpiū summis uisibus prouenit, & a rusticis apic adhuc nominatur. Et pseudonardi duo sunt genera: mas Italici spigo: Gallis & nostris apic: femina omnibus Gallie populis lauandae: Italici lauanda.

*radix.* Ferula.

His regionibus ignota. In Apulia frequens ac copiosa prouenit: uulgaris tamen gressu nomen nulli ex autoribus scire potuimus.

*radix.* Sinapi.

Officinis sinapi: uulgo moustarda, aut uerius, grain de moustard de. Italici senape & mostarda.

*radix.* Narcissus.

Narcissus Graecis: narcissus Latinis: officinis ignotus. Duo praecipua narcissi genera: Cădidus & luteus: Cădidus in mare distribui potest & femina. utriusque flos est cădidus: sed mari in medio purpureus: femina uero, croceus. adhuc in mari narcissi maiora sunt oia, flos, caulis, folia, radix: in femina, minora. Ambobus tamen id nomen. Nă flos galles des narcis: Lugduni des icănettes: Alpibus Delphinatibus (nă in alpiis pratis copiosissimus luxuriat) nunc fleur d'oye, nunc gonnette, nunc donnet: tunc nostris corbo donno, quod, more decrepitarum mulierum, caput deorsum inclinat. Aquis sextis tamen, Masillae, & alijs nostrae prouinciae tractibus maritimis, de iuyefusis, id est, iudeis, aut iudaicus flos nominatur. Haec species ubique in pratis uisitis tempore uerno florere inuenitur. In alpijs aut florere mensibus Iunio & Iulio. Observatione interim dignū est, ab uno candidi narcissi, praecipue feminae, cauliculo eodemque loco sepe duos, nonnunquam tres simul flores erumpere: id quod ualde, mehercle, sum, paucis ab hinc diebus, admiratur. Luteus narcissus in maiore & minore dicitur. Maior paucis medicis cognitus: officinis prorsus ignotus. Lugduni & locis circum nictis, uulgo notissimus. Nam quibusdam illorum des icănettes, alijs des campanettes, alijs des coculz, nominatur. Radice, caule, & folio cădido similis est: flos euariat. Siquidem longus est, media fuit parte calathi cęsagii praesentans, crispitum in ambitu fimbriatus, appendicibusque septem in eius medio inclusis in ambitu autem folia sex obtinet, stellae modo radiata, molliter acuta, apicis: floris calathio paulo in fra medium, prodeuntia, suppallosa. Floret statim primo uere, nondumque bene exacta hyemis inclemetia adeo, ut huius flores tum maxime appareant, cum candidi narcissi folia de terra erumpere coeperint. Reliqua omnia illi similia habet. Minori luteo narcissi folia croci insunt: cauliculus quaternū digitorū. Radix bulbosa, nucis aeuellanae magnitudine, foris nigra, intus candida & succosa. flosculus auri penitus fulgoris, cădidi narcissi floribus effigie omnino similis: femē aut, exiguis siliquis cōtēntū. Floret mēse Martio, & Aprilis initio. Nasci dicitur, quaequid explorare haecenus potuerim, in nostra puincia, apud Aptā Iuliā, saxosis locis ad occidentē urbi adiacentibus: quos patria lingua, quae uerni sunt, les baumos appellant: in quibus terebinthus idaea, cedrus humilis, meon, thymus, clematis utraque, onitis origanos, asferis: atticus maxime luxuriat.

*radix.* Nerium aut Rhododaphne.

Quid sit huius regionis ignotatur. Fuchio placet nerium in Germania locis quibusdam inueniri. Audio Italiae familiare esse, & uulgo oleardo nominari. notum quoque iam est in Aquitania.

*radix.* Nymphaea.

Officinis nenuphar. Duo eius genera: alia candido, alia luteo flore. ambae notae.

*radix.* Xanthium.

Lappa minor officinis: Italici lappola minore dicitur. uulgo anonymum: frequens ubique in rudibus, urbium fossis, lacuosis ac fœtoratis locis prouenit.

*radix.* Gladiolus.

Officinis spatula (egestalis: uulgo Gallorum des epēses: flos, Tuscis monacucie).

*radix.* Vinum.

Varia ac penē infinita sunt uini genera, sed nota.

*radix.* Acetum.

Aliud album, aliud rubrum, uulgo do uin aigre. Italiae aceto.

*radix.* Lăser, succus cyrenaicus.

Verus cyrenaicus ueteris succus, hic habetur. Syriaci officinarū beniuin aut belzuin: Italorum belgioini: doctis creditur, est qui lăser parior ac nobilior portio uidetur. Est & officialis ala cognomento fœrida, purioris illius recementum: aut certē lăser ē Media Syriae alatum, Dioscoridi olens grauiter, & potuerim resipiens. Aetio tamen lăser à cyrenaico lăsesteparatur, siue quia lăser succus ipse sylphij, non lăc esset, siue, quia

fiue, quia laferis appellatione perficum aut medicum, ut cyrenacillora, & uribus ac dignitate posteriora, non cyrenacis, uenienter arguendo inde sumptum, quod cyrenacis fucci inopiam emendari tradit laferis duplo cap. 4. lib. 3. & cap. 18. lib. 13. Vnde constat lafer cyrenacis succo uribus infirmis esse (quāquam congener sit) & ob id duplum illius, alterius inopia, ad usum medicos desiderari.

#### *ὀρίγανος*, Origanon.

*ὀρίγανος* Græcis ὀρίγανος: origanum Latinis. Tria sunt origani genera: heracleoneum, onitis, & syluestre. Heracleoticum origanum officinis generis nomen seruat. Gallis (ut nonnulli uolunt) mariolaine d'angleterre: Delphinatibus ouriam: nostris l'herbo de nostro damo, nominatur. Quod in his regionibus adolefcit, non ulquequā: uribus ipsi ab antiquis adscriptis, respondent. Quare onitis origanos aut saureia comodus eius loco usurparetur. Onitis autem officinis omnibus ignota: paucis adhuc medicis cognita: nostrati uulgo notissima. Appellatur enim in nostra provincia pebre d'ale, id est, asini piper: seruato nimirum Græco cognomine, alsumptumq; ab acrimonia, piperis nomine. Hæc est pedalis altitudinis, radice capillari, nigra, inuolui, numerosis ramulis ab eadem erumpentibus: folio hysso, aliquanto angustiore: flore ex dilutissima purpura cædido, semine exiguu, nigro. tota herba fulgens est feruida, uide sibi piperis nomen adoptauit, odore suauis, fragrantis & ualde aromatico. floret quā æstate tota. Nascitur in alperis, aridis & sitientibus ubiq; in nostra provincia & alijs calidis regionibus. In frigidis enim nusquam sponte natum inuenitur. Syluestre origanum quod sit, nondum mihi esse comperit. Tragoriganum esse uolunt eam herbam, quā Galli Pherebe du mastic appellant.

#### *ἰσχυρὸν*, Iuncus acutus.

Iuncus alius holofœchus, mollissimus & ad utilita utilisissimus, qui Latinis maritica, Ruellio autore, dicitur: ualibus nobis acutus, Græcis ἰσχυρὸν: tertius melancranis, quasi atriceps, fructum gerens uuarum coherētum modo. Hoc nihil in uliginosis locis occurrit frequentius, uulgo iunc: Italis seruato generis nomine giunco.

#### *ῥόβος*, Erum.

Officinis Græcum nomen in seditione nostris erce.

#### *ὀρεβάγχη*, Orobanche.

Cuscuta quibusdā est: rusticis Gallie tignealis: Italis herba lupa, & co da di Leone: alijs herba tora. nonā ab itrangulādo lino sumptis.

#### *ὀρύζα*, Oryza.

Officinis nomen retinet: prædictis non paucis ryzum: uulgo du ryz: Italis riso.

#### *ῥήκη, ὁ κνήκς ῥήκη*, Testiculus canis.

Officinis testiculus canis, & non nunquā satyrium, quāquam id minus propriè: Gallis, maxime à Parisinis, du satyrium. Italis anonymos.

#### *ῥήκη σερπῆας*, Testiculus scerpas.

Triorchis à triplici radice dicitur. Huius duo genera, mas flore purpureo: femina variegato. officinis ignoti, aut saltem anonymi, in montium pratis copiosissimi. Testiculi præterea species sunt illæ plantæ, quas Fuchius satyrij basilici nomine describit, nam satyrij radice est bulbosæ illæ radices habet multitudine, ut aptius inter testiculares nomen egerit.

#### *λίγρις*, Olyris.

Est officinarum & Italarum linaria. uulgo ignota: frequens tamen ubiq; prouenit.

#### *πανκράτιον*, Pancratium.

Radix est scille similis, quam scillam maiorē eam uocant: multoties tamen sententia uulgaris scilla uerum pancratem est: Italis scilla minore.

#### *παλῖνος*, Paliurus.

Ambigitur inter doctos de paliuro, Quidā Gallorum aulbe spinæ paliurum putant: quidam diuerfum sentiunt, quod nimirum uulgaris illa alba spina semē in siliquis minimè recondat. Verū, si ueteris ac clarissimi autoris Theophrasti de paliuro scripta paulo accuratius in examen adducatur, facillimè ueritas erit, horumque componi discordia poterunt. Si quidem ex capite 17. lib. 3. de plant. hist. nulli non manifestum ac perspicuum exiit, plures Theophrasti paliuri species nouisse, sed duas præcipue: Alteram cuius semē in siliquis continetur, quam ignotam existimamus: Alteram uerò (ut ipsemet autor est cap. 4. lib. 4. eiusdem historie) cui semē rotundū, rubrū, cedrum magnitudine, aut paulo minus: nucleum habens nō mandandum, modo acinorum punici mali: hæc est uulgarata Gallorū aulbe spinæ, & nostratium aubrepin. Accedit Dioscoridem fructū paliuri uires extendere uiscæ calculi assignare: quæ quidem uires tam manifestis experimentis in alba spinæ uulgaris semine inueniuntur, ut inde uel liquido cōstet, eam à

Dioscorideo paliuro diuersam plantam nō esse. Sūto igitur duo paliuri genera: Alterum quod semē in siliquis recondit, idq; adhuc ignotum, & Dioscoridi intactum: Alterū uulgaris alba spina, cuius fructum Galli & Delphinatibus poyres sains Martin nominant: nostris autem generis, id est, feminis nomenclationem seruat. Meminit & Plutarchus cuiusdam paliuri, ab his longè diuersi: sed is nobis ignotus.

#### *πανακή ἡρκευλῶν*, Panaces herculeum.

Quid sit, non ita constat. Nam huc conuenit (delinements saltem, non uribus) caplanta, quam sphondilij nomine Lutetia uulgo ostentat: quāq; Gallica plebs panale appellat. Ea, inquam, ubique locis pinguib; & humidis uberrimè luxuriat. Inuenitur quædam herba in maritima nostra provincia, cuius nota herculeo panaci omnes responderent, si eius caulis lanugine quadam inaneferet. Nam folia humi strata iacent: aspera, oblonga, à siculis non multum abhorrentia. Caulis rectus, cubitum excedēs, infernè candidus, superne luteus, laevis. Flos illi luteus, sphaericæ rotunditatis. Radix candida, longa, succo prægnans, gustu feruida. Floret mēse maiora non obseruamus. Nascitur in alperis & sitientibus solis: illustratis locis. Hæc interim nō ineptè ad Peloponnesense sciseli reuocaretur, ut suo loco dicef. Herculeus panax in Apulia & in Apennino plurimum nascit, sed anonymus apud uulgos est. Reliqua panacis genera ignoratur. Quæ uero Lutetia chironij panacis appellatione falsò ostenditur, syluestre siarum, quod & cherulilla herbarijs, officinis bacuas, Delphinatibus chirolo: nostris girolo dicitur, est.

#### *πενταφυλλον*, Quinquetfolium.

Ad pentaphyllum uulgarem tormetillam (quæ Gallis & Delphinatibus tomentille dicitur: nostris autem penè ignota est) se-rè omnes referunt. Quidam tormetillam herbam sibi generis faciunt, quod septem, non quinq; folia habere oculorum iudicio eam constet. uolunt tamen pentaphylli inopia in usum timentillā uocant. Alij pentaphyllum in Italia nasci cōtendunt, sed uulgo anonymon: & uulgarè saniculam pentaphylli speciem quartam faciunt.

#### *πέπλος*, Peplium.

*πέπλος* Aëcio cū Hippocrate: *πέπλος* Dioscoridi: utrumq; Latinitis officinis herba incognita. Nascitur in quibusdam maritimis nostræ puincie locis, sed in eo præcipue, qui uulgo istres dicitur, in faucibus enim amplissimi, & nobilissimi lacus maritimi est, qui nostro sermone le Mârtège appellatur, stadijs plus minus sexaginta, à Malsilla urbe antiquissima & clarissima, uersus occidentem solē. Herba est pumilla, & portulacæ similis, folijs superne uiridibus, infernè suppuræis, à domestica portulacæ mininum ab similibus. Officinis quibusdam nostra tribus egrege nota: quibus, ob similitudinem domesticæ, portulacæ marina nominat. Est & peplos herba, appellatōe ab hac nō omnino dissimilis, quā officinæ esulam rotundā appellant.

#### *πέπων*, Peponi.

Cucumerum generi assignatur pepones: Italis meloni & peponi dicti: quorum uaria genera existant: de quibus leue Ruellium & Fuchium. officinis nomen retinent. uulgo pompon.

#### *πίπερις*, Piper.

Tria piperis habentur genera: album, nigrum, & longum, omnia nota, Gallis poiire: Delphinatibus peure: nostris pebre: Italis pepe. Admonendus est mihi lector, haberi Lutetia in plerisq; hortis fructus quosdam, quinimū plus minus cubitorum altitudinis, caudicosos, ramis plurimis illustres, folio mori, aut rubi idæi (rubis officinæ appellant) non amplo, fructu uolurū modo à ramulis per pediculos propendente, ex herbaræo candido, quod piper appellant: fructibus nimirum eo iam pridè ex peregrinis admodum regionibus importatis. Logi interim piperis inopia facit album, & albi nigrum cap. 24. lib. 9.

#### *πυρρὸν ἡρκευλῶν*, Verbenaca.

Duo summa uerbenacæ fastigia tradit, officinis nota, ut apud quas nomen seruēt. uulgo ueruenæ: Tuscis uerminolacæ: alijs Italiæ populis berbena.

#### *περγόλη*, Persea.

Ignota his regionibus arbor est, Aegyptio familiaris.

#### *περδικία*, Perdicia.

Officinarū parietaria est. Gallis paritoire: Delphinatibus esparge: nostris espargoulo: Italis uetruola: de qua suprā in helixine dictum est.

#### *παωνία*, Pæonia.

Duo eius generum: mas & femina: illius flores Gallis roses nostre dame appellantur. officinis herba, pæonia: nostris pionio nominatur. nam copiosissimus est pæonia: prouentus, in finibus nostræ provincie & huius Delphinatice gentis, in montibus ignobilis uici, qui nostra lingua les Amergues dicitur: in Gallicæ hortis multa quoq; inuenitur.

*πετροσέλινον*, Petroselinum.

Selini multa genera. Hortense: quod Latini apii: officina petroselinon: Itali petrosello: Galli persilii: Delphinates perseilii: nostri iugeri, nominat. Hipposelinon Latinis equapii & olus atrio: officina apii: Gallis & Delphinatibus achemonstri apii. Oreoselinon & eleoselinon officinis ignota. Est & aliud selini genus, magni quidē & amplius, quod officina petroselinon macedonicon uocant: cui nulla prorsus ex parte conuenit descriptio. Apud Delphinates in hortis quibusdā uisitur herba, cui petroselinum macedonici historici, quāquam breuis admodum, mirē adscripturatur. Ea uulgo l'herbo de la grauella nominatur. Radicem habet digitalem, non longam, radicis apii amulam, nerium durum, lignosamq; (plantā nimirū ad feminis maturitatem appropinquante) odoratā, gustu acrem, quiq; diu linguam nellacet, suauem tamen, & ad cheruillæ hortensis gustum nonnihil accedentem. A radice erumpit caulis cubitalis, aut procerior, teres, geniculat' inanis, intus medullaceus, laeuis, uirens, multis alarum finibus concauis: ramulis ē singulis geniculis erumpentibus, inq; alios etiam ramulos diductis. In quorū omnium summitatibus flos insidet albus, minutulus, sparsus, nulla umbellæ aut muscarij seruata ratione. Florē illicō subsequitur ipsum semen, duobus granulis inter se coherentibus, semini ameo uulgaris simillimum, odoratius tamē, initio uirens, post maturitatem ex flauide pallidulum, acre, aroma olens, diuq; os ipsum gustantis mira odoris suauitate comendans, folia quē ē singulis caulis erumpunt alia, magna sunt, hortensis cheruillæ folijs similia, aliquoties utrinq; pinnata, et in ambitu serrata: & quo magis ad suum caulem accedunt, eo minora sunt: quæ uerō ē ramulorū finibus exeunt, parua sunt, folijs hortensis apii effigie similia, pinnata semper, & per ambitum serrata. Cæterum quæ ē summis exiliit, minutissima sunt, & quasi feniculae, nisi plana essent, & ut ceruinū cornu uulgare, perpetuo dentata. Florē est late. Semen mature scis circa autumnū initia. Inuenitur in paucis Delphinatū hortis (& iam hic quoq; nostra cura, ut terebinthus idē ac macedonica, philyra, phillyrea, lotus arbor, cedrus humilis, & rhama teretis species) diligentiq; matronarum studio, & seruatur ad exterdos renum calculos. Nam constat modicam eius feminis portionem tritam, & ex albo uino potui datam, magnam uim aneurularum per urinas exigere. Vnde ab effectis uulgas eam herbe de la grauella nominare cōsueuit. Adhæc certum est huius herbæ semina ē Macedonia, superioribus annis fuisse allata: ut uel hinc probari possit, illam ē genere selini macedonici esse.

*πεucedανον*, Peucedanum.

Ad peucedanum meo iudicio reuocari potest ea herba, quæ passim Lutetia, Masiliensis seculo ē nomine, ostenditur: cuiusq; maximus est prouentus in prato Gentilitio propter Lutetiam: necnon in tota Gallia: nam si (ut Ruellio, & alijs doctis placet) officinarum filer quodnomento montanum, Masiliense seculi existimandum sit, ē duobus alterum erit necessarium, aut duo Masiliensis seculo ē statuerē genera, aut alteram ē plantis illis (quod ueri similitudine) seculi Masiliense nō esse. Accedit, quod ea planta à multarum gentium officinis peucedani nomine in usum medicum uocatur. Succo peucedani usi sunt ueteres medici atq; idcirco, si illius copia non adstiterit, sic eā herbæ, & dimidium sagapeni consiciendum monent, cap. 47. lib. 12.

*ρυτάριον*, Ruta.

Officina & Itali Latini nomen usurpantur. Galli & Delphinates da la rue: nostri rudo nominant. Duo rutæ generā hortensis, & syluestris. Syluestris apud nos calidis siccijs locis copiosissimē prouenit: quæ autem planta Lutetia syluestris rutæ loco ostenditur, ruta syluestris, saltem uterum, non est. Satiua ubiq; in hortis inuenitur.

*πίξις*, Pix.

Officinis nomen seruat: Gallis de la poix: Delphinatibus peio: nostris pego: Italibus pece. Multa picis genera, liquida, arida, brutia, cedria, & similes, de quibus copiosissimē ac doctissimē Ruellius cap. 113. l. sui operis de stirpium natura.

*πίστιάκιον*, Pistacium.

Arbor est peregrina, folijs rotundis, cappariis proximis, odoratis, gustu aromatico. Lutetia uisitur in horto diuæ Mariæ. Fructus Græcis & Latpis pistacia: officinis fisticitalis pistachi dicuntur.

*πυτιδία*, Pitydis, nux pinea, nux picea.

Nomen seruat officinis. uulgo pomme de pin.

*πίτυς, δ' ελαιος*, Pini cortex.

Officinis Latini nomen infedit. Gallis ecorce de pin: Delphinatibus rusche de pin: nostris rusco de pin. Hic cortex loti arboris cortici substituitur, si ille desit, cap. 4. lib. 9.

*πλάτανος*, Platanus.

Græcis: Platanus Latinis: officinis ignotus. Duo eius stui possunt genera. fertilis & sterilis, qui pseudoplatanus dicitur: immis gratia dicitur. Ferax platanus Gallorum paucissimis cognitus: Delphinatibus & nostris ignotus. Hic Lugduni hac forma in horto quopiam spectatur. Arbor est adhuc non procerat, trium aut quatuor ulnarum longitudine, caudice uirilis tibia magnitudine, candida ligni materie, cortice crasso, spadicis coloris, ramis oblongis, à pseudoplatano non absummis: fronde uirigine, longo eoq; purpureo pediculo nitente: flore racemoso, ex luteo pallido, semidodrantem longo, la brucea magnitudine, multis appendicibus, ex pallido in luteū langetescentibus, ornato. In summis illis petiolis mox oriuntur filiquilæ, breues, triangulares, membranosis & pressis uelut corniculis, in tripodis formam, singulis eius angulis adnatis. Floret uere: fructus exin sensim infrescit: ac tandem maturisfit ad autumnum. Florem ipi uidimus: & plantam totam. Fructum uerō cernere nondum licuit: uerum que eo scriptis mandamus, ab æconomo intelleximus. Audio in Sabaudia montibus inueniri, aque indigenis platani nominari: id quod à ueritate alienum non uidetur, cum ea planta quæ hic uisitur à Picauis Gallia populus huc ferit allata. Habetur & apud Neapolim in hortis quibusdā. Pseudoplatanus autem ubiq; luxuriat, & Gallis du plan: Delphinatibus playe: nostris blaye: Sabaudis uerō planou uocatur. Huic folia quoq; uitis insunt, ligni candida materia, cortice crassus, spadicus, ut ob similitudinem pseudoplatanus non ineptè appellari possit.

*πολύγωνον*, Polygonum.

Duo polygoni genera: mas & fœmina. mas Latinis sanguinaria: officinis centinodia, corrigiola, lingua passerina: Apuleio per spinacea: Parisiis autem herba sancti Innocentis (quod frequens ac copiosum in eo cœmiterio luxuriat) nominatur. uulgo anonimum. Fœmina officinis ignota. Quod aut in aquis stagnantibus aut pigro lapsu repentibus adolescat, idcirco Gallis pin d' eauē dicitur.

*πόλεμιονον*, Polemionum.

Græcis, Latinis polemionum: officinis plantæ ignotū, nisi ea planta sit, quam herbarij bosci saluiam, & quædam Gallie officina ambrosiam nominant. Verum non ausim affirmare bosci saluiam, esse; syluiaticam saluiam polemionum esse. Quidam se id nosse prædicant, quorum sententiam nec probō, nec improbo. Quibusdam alijs ruta herbariorum cognomento capraria polemionem existimatur: uerum parum probabiliter. quando quidem omnes illius notæ, ne miquma qui dem reclamant, alphabeti trifolio tam adscripturatur, ut absurdissimum putem eam ad aliud genus reuocare. Sit igitur polemon ex arum plantarum numero, quæ parum adhuc examinata cognita sunt.

*πόλιον*, Polium.

Duū est generum: montanum, quod officinis uomen retinet: alterum fruticosius, minus notum.

*ποταμογενον*, Potamogeton.

Paludibus & stagnis familiaris: officinis & uulgo ignotus.

*πολύποδιον*, Polypodium.

Latini filicula: officinis polypodium. Quercinum laudant, quorū rarior, herbariorum incuria, utuntur.

*μαρρύριον*, Marrubium.

Duo præsij genera: album, officinis præsium album: Gallis, Latinā nomenclationem usurpantibus, du marrubium iam dici ceperit: Italibus marrubio: Delphinatibus & nostris corrupta uoce lapsusq; facili bon robin, pro eo quod est marrubium, nominatur. Nigrum officinis præsium fœtidum, balore Dioscoridis est, uulgo ignotum. Habet & præsium officina, cui uiridis nomen indiderunt, albo congener, & uiribus eidem præditum.

*πορρον*, Porrum.

Officina Latini nomen seruat. Gallis porreau: Delphinatibus porreau & porro: nostris porre: Italibus porro. Duo eius generā hortense, & uineale, ambo nota.

*πυρρίδιον*, Propolis.

Quid propoloes nomine accipiendum sit, ambigitur. Scribonio Largo cera uirginæ dicitur. Alijs tamen rudis est & crassa materia in apum officinis nondum cera, odore graui, quapro galbano ueteribus utebantur. Emendari potest eius tenebre inopia, si terebinthina, aut, deficiente terebinthina ipsa, picis brutiæ par pondus substituitur, cap. 42. lib. 12.

*πίτυς*, Vimus.

Officinis ulmus: Gallis & Delphinatibus orme: Italibus olmo: nostris oume. Duo faciunt ulmi genera, domesticum & montanum. Italia, ut Ruellio placet, quatuor ulmi fastigia habet. Est & apud nos arbor montana, quam uulgo nostrum, quasi ulmo congenerem putet, oume teill appellat. Ea species utiliz

tum. Vide



tum. Vidi ego postremis annis uerum satyrium in montibus Delphinatibus: radice bulbosa, cui gallinacei ferè magnitudi-  
ne, foris rufus, intus candidissima, succosa, gustus suavis ac pre-  
dulcis: folijs lilij, caule dodrante altiore, laui, terete: flore py-  
ramidalis ac penè rotundo, ex saturata purpurea candicante, qui  
tamen calathodem uulgaris lilij effigiem non repræsentaret.  
Floret mēfibus Iunio & Iulio. Semen, quia maturum tum haud-  
quaquam effect, non obseruauit. Copiosissimum adolescit in al-  
pibus: & in eo Delphinatus monte, qui ex omnibus, quos un-  
quam uidi, herbarum medicarum feracissimus est: patria eorū  
lingua Chironom uocatur, nec procul à Tia urbe ad septentrio-  
nes est. Nam, præter satyria, illic uidentur testiculares omnes,  
gentiana utraq; sefeli tum Mafsilense, tum Creticum, aconi-  
tillitum purpurascens, & candidum syluestre, lunaria minor  
(quæ eorū lingua l'herbo de la rourō nominatur) chamae-  
leones, asarum, carui, passiflora, narcissus candidus, centaurei  
minus utrumq; bistorta, oxyacantha, anagris, & alia innume-  
ra quæ recensere longissimum esset. Diflat & ab hoc monte  
uerius orientem solem milliaribus circiter octo, planties am-  
plitudinē admirandæ, aquis abundans, monte excelsum ad  
orientē: locis præruptis & plane inaccessis à septentrionibus  
& occasu, saxosa uero plantiæ à meridie circumscrip-  
ta: cuius angustissimum ingressum elegantissimum foris exornat. Ea  
priuata gentis lingua l'as pres de cheualieres nominatur, &  
monti inaccessi (quem rustici indigenæ l'aigulle appellant)  
admodum uicina est. In quam, inquam, plantiem si quis stu-  
dio simplicium adductus, concesserit illi simplicium (& maxi-  
mè sefeleos Cretici, quod illic, si uisq; gentium aut locorū,  
copiosissimum & pulcherrimum luxuriat) copiam, uarietate,  
nobilitate, raritate, & in his diuinam prouidentiam admi-  
rari licebit: quæ loca tam deserta, tam inuisa, & quasi mortali-  
bus inaccessa, tanta herbarum preciosissimarum uarietate atq;  
ubertate locupletari.

#### *Sisymp.* Apium.

De apio suprà in petroselino diximus.

#### *Sefis.* Seris.

De feride copiosissimè in echiorio dictum iam est.

#### *Sefior.* Sefeli.

*Sefior* Græcis: Sefeli Latinis. Quatuor sunt & inueniuntur sefe-  
leos genera. Mafsilicè Stœchadibus insulis, & maritimis no-  
stræ provincie tractibus familiæ: mecon in alpibus, & omni-  
bus Delphinatium nostrisq; montibus frequens ac copiosum:  
officinis sler montanum: uulgo alpinorum sler mōtan. Quod  
Fuchio Aethyopici sefeleos nomine pingitur, iam dictis in  
montibus, alpisbus nimirum, copiosum prouenit: inuentu  
& cognitu (si quis uisualitior fuerit) non difficile. Aut uerius  
Aethyopicum (quia in alia multa notæ reclamationē) sefeli eam  
plantam dixerim, quam Luteriæ, in hortis quibusdam, paritum  
consulto, pro terebintho offendant. Cuius, inquam, largissi-  
mus est prouentus, propter Druentiam, rapacissimum nostræ  
provincie flumen, saxosis locis, iuxta Orgonum Caballoni  
proximum oppidum. Siquidem delineatio uniuersa illi fauet,  
nulla reclamante notā Nam frutex est binq; ternitūe cubito  
rum, caudice digitali, flagellis cubito lōgioribus, iuncōq; cras-  
sioribus ac lignosis, folio demestice oleæ, nigriore, molliore, &  
ad periclymeni folia satis accedente. Flos in ramorum ca-  
minibus infidet luteus, speciosissimè, circinatus (ut cepæ porri-  
ue flores) rotunditatis. Semen fœniculo crassius, nigricans,  
densum, solidum, & feruentis gustus. Radices ualidæ, in pro-  
fundum adæ. Vulgatum nomen mihi nondum sere licuit. Flo-  
ret mense Iunio & Iulio. Semen maturècit Autumno. Nasci-  
tur Orgone & Celone, oppidis nostre provincie, aridis, saxo-  
sis, & macilentis locis. Peloponnense, in maritimis nostræ pro-  
uincie luxuriat, folio cicutæ latiore, crassiore, subsæpero &  
contractu ingratu, nullis tamen spinis horrido, humi strato.  
Caulis illi inest rectus, cubitalis, aut procerior, fœnicula-  
ceus, prope terram candicans, à medio sursum uerfus auri ful-  
gore nitens, laevis ac depilis, tereti forma. Summo cauli infi-  
det umbella, orbiculatæ planè rotunditatis, floris Aethyopici  
æmula, flos luteus. Radix subest longa, recta, crassitudine digi-  
tali, teres, succo pragnans, candida. Floret mēfibus Maio &  
Iunio. Plura nondum uidi. Nascitur in montibus & collibus  
terrenis mari propinquis, & aliquantum remotioribus, cali-  
dis tamen & siccitibus locis, & in humidis nonnunquam. Tu-  
to interim hanc plantam inuenies in agro ignobilis cuiusdam  
uici nostræ provincie, qui uulgo Meinos appellatur. secusq;  
uiam est, quæ Tholone urbe maritima Sanctū Maximinū ducit.  
Vulgi nomenclationem non didici. Ex iam dictis itaq; tibi  
constare potest, hanc quā depinxit plantam, uerum sefeli Pelo-  
ponense esse. Quantum est Creticum, quibusdam tordylium,

Paulo gordylium: officinis, & medicis ferè omnibus igno-  
tum: Fuchio cogniti & bellè depicti. Hoc Lygures & Hupa-  
ni ceistræ: alpini Delphinates, Sabaudi, & qui agro Pedemōta-  
no sunt uicini, de la ceitro nominant. Herba fruticosa est, do-  
dantalibus Diofcoridi (nos tamè pinguibus locis cubitale fere  
quētissimè in alpisbus uidimus) radice crassa, longa, burea aut  
ex bureo candida, omnium maxime aromatica, gustu acri ac  
suauissimum: folio fœniculi, tenuiore tamen & ferè capillari.  
Caulis rectus est, palmo, aut cubito nonnunquam longior,  
in summo brachiatus: umbella coriandritifolia laetè candoris. Se-  
men primò ex rotunditate oblongum, & quodantenus angu-  
losum, quod, ubi exatè maturuit, in duo ueluti scutula scindi-  
tur, gustu feruendum est, odoratum ac iucundum. Floret æstate.  
Semen maturècit, in alpisbus, circa finem Augusti. Herba tota  
tantæ profectò suauitatis, ut si æstiuus ardoribus euellatur, &  
cōfracta manibus attrahatur, uix aliud sis multo tempore pal-  
patibus, quod tibi Cretici sefeleos inuolunt, & uix satis expli-  
cabilem, suauitatem non respiciat: id quod ipsi frequentissimè  
flosis experti. Nascitur, ut dictum est, in alpisbus ubiq; nulli  
non è plebe notissimum.

#### *Sesquy.* Sesamum.

Sesami planta non ita multis nota est. semen officinis sisamum di-  
citur. Italiae anonyonum.

#### *Sidifile.* Sideritis.

Sideritis tres species Diofcoridi statuitur: ex quibus prima tæ-  
rim cognita est, & officinis tetrahl aut herba Iudaica nuncu-  
patur: reliquæ species ignore: quanquam non desint qui uul-  
garem carpentariam, Gallis mieux uault qu'or, dictam, ad si-  
deritin referendam putent, quorum sententia explodenda  
prorsus uenit.

#### *Sinua.* Cucumeres.

Cucumeris fatiui multæ species. officinis nomen seruant. uulgo  
concomber: Tufcis cedriusoli: Longobardis cocomeri.

#### *Sesquy Symp.* Cucumis syluestris.

Cucumis syluestris Latinis nomen seruat: officinis cucumer asi-  
ninus: Gallis concombre sauuaige: Italis cocomero saluatico:  
nostris cocourmasso. Succus eius Græcis, Latinis & officinis  
claterij nomen inuenit.

#### *Sisymp.* Laferpitium.

Quorundam opinione officinis & uulgo offeritur: quibus ne-  
quaquam probatur eorum sententia, qui herbam quæ ab her-  
barijs, nunc imperatoria, nunc angelica, nunc sancti spiritus  
radix nūcupatur, eandem cum laferpitio existimant: ut quæ  
solorum effigie à sylphio diuersissima, uel sensuum iudicio  
ac testimonio appareat. quando quidem hoc folia uulgaris a-  
pij, ex pallido in luteum languescencia, caulem ferulaceum ha-  
berit illi autè subnigra folia, per ambitum serrata insunt: caulis  
concauus, flos ex purpurea candidus (his tamè regionibus can-  
didissimus). Veruntamen, cum in floribus, semine, caule, radi-  
cibus, & quod omnium præcipuum est, facultatibus ipsis, tam  
inter se consentiant hæ plantæ, ut nullum, aut minimum saltè,  
statui discernim possint: non erat, meo quidem iudicio, cur ob  
tantillam foliorum diuersitatem, plantæ inter se alioqui simi-  
lissimæ disjungerentur, notamq; tanti discriminis subirent. Nam  
si radix utrique foris nigra intus candida, aut uerius buxei co-  
loris, semen luteum, foliaceum, flos candidus, facultates omni-  
no eadem: quæ, oblecto, exigua illa foliorum uarietas, & dis-  
similis utrumq; effigies, congeneres plantas, genere diuersis-  
simas efficere & potuerit: quid nonne utriq; folia sint in am-  
bitu serrata: nonne oblonga seld illi quadantenus nigricantia, &  
sepius paritò diuisa: (nam medius pediculus solum in tria dis-  
sectum: laterales singuli singula in duo distributa folia susti-  
nent) huic ex luteo suppalpida, & (nisi terguerari consue-  
tū est) in septenarium quoque numerum quodammodo dispen-  
sata. Sunt igitur duo Europei laferpitij summa fastigia: alte-  
rum, qui apud uulgos & Germanicas officinas offeritur nomen  
insit: alterum uerò quod Gallicis officinis & herbarijs impe-  
ratoria, angelica aut sancti spiritus herba: uulgo autem Del-  
phinatium alpinorum alegros nuncupetur. Vtraque species  
Parisij in hortis uisitur: prior tamen in alpisbus inuentu  
rarior: posterior nullibi gentium aut locorum copiosior.  
Sed hæc alio loco accuratius demonstrabuntur. Nā quia hic  
specterum diuisionem omisit: ille plantas genere eadēdem, di-  
uersas esse uoluit: nos generis (ut ita dixerim) identitate ter-  
ta, speciebusq; exactè distinctis, eorū discordias cōponemus.

#### *Sisymp.* Sinon.

Ignoratur.

#### *Sisymp.* Lauer.

Officinis berula, uulgo de la berle. Sic enim metathesi syllaba-  
rum pronunciat.

*Σίσυμβριον*, Sisybrium.  
Sisymbrij duo genera. prius officinis balsamita: uulgo du cres-  
con: Italis crescione. Alterum, quod & cardamines, à na-  
sturtij odore, cognomen tum accepit, officinis nasturtium a-  
quaticum, Senis autem Italiae urbe gorgolestro dicitur.

*Σκάνδα*, Scandax.  
Quidam uolunt Romanis aciculam dictam fuisse. Quid tamen  
sit ignorat. Dioscorideae enim breuitas eam nobis ignotam  
reddidit.

*Σκίλλα*, Scilla.  
Officinis squilla marina, quamquam & pseudosquilla alibi passim  
inuenitur, uulgo nostratum cebo marino, Italis scilla.

*Σκάρδιον*, Carduus.  
Scolymini meminit Theophrastus cap. 4. lib. 6. hist. plar. meminit  
& Dioscorides. Ex quorum scriptis uix aliud elicere possis,  
quam Theophrastu de hortensij (q Italis carcioff: Longobar-  
dis archichiochi: nostris carchoffes: Gallis & Delphinatib<sup>9</sup> ar-  
tichaultz, nominatur:) Dioscoridem uero de erratico (qui  
Italis, à ui cogendi lactis, prefura: Gallis autem chardonnette,  
dicitur) fuisse locutum: ut in cinare mentione dictum fuit.

*Σκάρδιον*, Scordium.  
Officinæ seruata Græca nomenclatione, multis sæculis puden-  
do nimis errore ophioscorodon rudi plebeculae obtruserunt.  
Nunc iam tamen uerum scordium nosci cæpit: In hortis si-  
quidem Parisiis frequens inuenitur. Adhæc propter Gra-  
tianiopolim Allobrogum ab occidente, & in nostra provincia  
pasisim, maximè Tholone iuxta mare, luxuriat.

*Συλβέστριον*, Allium.  
Duum est generum, hortense, & syluestre. Syluestris duo ge-  
nera. Nam aliud est folio latiore, oblongo, molli, uiridissim-  
um, flore albo, capitulo paucioribus glebis conformato: ra-  
dice non admodum bulbosa, candida: syluis umbrosis gaudet,  
& Plinio atque herbarijs allium urfinum dicitur. Aliud  
in excelsis ac nudis montibus luxuriat, ab aquilone, hortensi  
simile, nisi minus. nomen seruat. Gallis ail: nostris alhet.

*Συλβέστριον*, Myrrha.  
Officinis myrrha: uulgo de la myrrhe.

*Σμύρνα*, Smyrnum.  
*Σμύρνα* Græcè: Smyrni Latine. Duo eius ex Galeni lib. 8. sim-  
p. sententia genera: Alterum, quod à quibusdam agreste hip-  
pofelinon uocari commemorat: non autem, ut quidam per  
peram interpretantur, hippofelinon syluestre à quibusdam  
uocari smyrnum. Id officinis lybysticum: Gallis leueche: alpi-  
nis Delphinatibus, nostra etiam memoria, api, nominatur.  
Est & aliud smyrnum Amano monti familiare, quod olim Ci-  
lices petroselinon cognominabant. Id in Italia copiosius in-  
uenitur: uulgoque (ut ait et Manardus epist. 24. lib. 9.)  
alexandrum, quasi olusatrum (sic enim Romæ Galeni ætate  
uocabatur smyrnum, ut ipse testis est lib. 2. de aliment. facult.)  
& Florentinis macerones, appellatur. Ea quoque species iam  
hic Lugduni, & apud Delphinates, omnibus nota: uerum il-  
lic alexandre & alexandrine: hic macerons à quibuslibet uo-  
catur. Ambæ plantæ in hortis habentur, & iamdictis nomi-  
nibus uulgo cognitæ sunt.

*Σικκιν*, Cicerbita.  
Officinis nostrum porcinum, & passus leporis: nostris de cardel-  
los: Gallis, à lactis, quam reddidit, copia, laisteron: Delphina-  
tibus laicheiron: Italis cicerbita, nominatur.

*Σπάρτιον*, Genista.  
Spartium quod à Dioscoride pingitur, genista est: sed ea, quam  
Galli genest, nostri genesto fero, Lugdunenses geneste de  
florencia, Itali genestra, appellant. Est & innocuus quidam Hi-  
spanicus, qui, quia fimbriis, rudentibus ac ficijs coribus cõ-  
ficiendis sit accommodus, à quibusdam ad sparti genus alte-  
rum reuocatur: uulgo autem spart, & ficiaræ corbes ex eo  
constat spartias, quasi spartias, dici solent.

*Στακίς*, Stacte.  
Doctorem sententia officinarum styrax liquidus, ueterum sta-  
cte est.

*Στακίον*, Pastinaca, Daucus.  
Duo pastinacæ genera: hortense, quæ officinis pastinaca: Gal-  
lis carrote: Delphinatibus pastenade & pastenaiye: nostris pas-  
stenagor: Syluestris quæ & daucus appellatur, de quo suo lo-  
co dictum iam est, quorundam tamen sententia pastinacæ las-  
tiua candida: erratica autem carne est purpurea.

*Στρεκάς*, Stoechas.  
Officinis stoechas Arabicæ plebi nostræ maritimæ morrallin.  
Citrinus officinaru stoechas elychrysum Dioscoridis & Ga-  
leni amaranthum à doctis penè omnibus censetur, ut in ama-  
rantho dictum est.

*Στρεβύον*, Struthium.  
Latinis radícula & herba lanaria dicitur, putatur esse officinarum  
saponaria. Alij uolunt esse ignotum.

*Στράξ*, Syrax.  
Officinis, mutata una litera, florax dicitur. Duo faciunt styracis  
genera: Liquidum, qui doctorem opinione myrrha stacte  
est: Siccum, qui calamitæ nomen indiderunt, & is uerus styrax  
existimandus est. Siquidem Arabes duos styracis gene-  
rum, Græci autem unius duntaxat meminerunt.

*Συαγρίδιον*, Vua.  
Vuarum innumera species, quæ ab imponentium arbitrio uaria  
nomina acceperunt, officinis nomen retinent. uulgo rasein.  
Italis uua. Vnde nostri principis & innocentioris uuarum spe-  
cies emphaticum nomen semper retinuerunt, eam uni aut u-  
nio, id est, uuam appellantes: Eam speciem Delphinates pa-  
churelle nominant.

*Συα*, Ficus.  
Ficum ex uarijs antiquorum scriptis infinita genera obseruauit  
& annotauit Ruellius, ad quem breuitas studio te remitto,  
officinis Latinum nomen infedit, uulgo figues.

*Συμπίτυλον*, Symphytum  
petraum.  
Herbarijs bugla: Gallis du bugle, nuncupatur: quamquam in hæc  
usq; tempora non defuerint, qui herbam Fuchio prunellam  
dictam, ad petraum symphytum referendam, nec id satis con-  
sultò, existimant. Est & symphytum magnum, quod officinis  
consolida maior dicitur. huic flos est albus, & ex purpura dilu-  
tus. Symphytum medium est officinarum consolida media,  
uulgo des marguerites. Restat minimum, quod & bellis dicitur,  
consolida minor: uulgo Gallorum des paqueques: Delphi-  
natum & nostratum de marguerites.

*Συμπίτυλον*, Sycomoræ.  
Fructus sunt Aegyptii ficus, si Theophrasto credimus, his regio-  
nibus non habentur.

*Συρίγις* & *βήρυξ*, Lentiscus.  
*Συρίγις* Græcis: lentiscus Romanis & officinis: Gallis & Delphina-  
tibus ignotus: nostris lentiscus: Italis lentisco. Plurimus in ma-  
ritimis nostræ provinciae tractib<sup>9</sup> adolefcit, frigida loca natu-  
rà horret. Id lentisco resudat masticæ, sed apud Chium, Rhodum,  
Cyprum, Cycladas insulas, Aegyptium, aliaque calidiora  
loca. Apud nos enim nulla colligitur, quòd locus ob remissio-  
rem (sic cum prædictis confertur) calorem resudationibus,  
quam illa, minus fit aptus.

*Συρίγις* & *βήρυξ*, Iunci odorati flos.  
Officinis corruptè omnia pronunciantibus Iquinantum di-  
citur.

*Συρίγις* & *βήρυξ*, Iuncus leuis.  
De iunci speciebus supra dictum est.

*Τερεβινθος*, Terebinthus.  
*Τερεβινθος*, & *τερεβινθος* Græcis: terebinthus Latinis: officinis & Gal-  
lis ignota. Tria tamen Theophrasto & Plinio terebinthi gene-  
ra. Syriaca mascula ac proceræ, Idæa & Macedonica breues.  
Syriaca his regionibus ignota est. Idæa ac Macedonica, quæ  
breues sunt & fœminæ, multis sunt notæ. Alteri enim fructus  
inest lentis magnitudine & figura, & folium propè cappari si-  
mile, uerum longè maius. Alteri uerò racemossus, piperis ma-  
gnitudine, primò uiridis, dein rubens, postremò nigricans, re-  
sinosus furtuosusque, folia angusta, oblonga, lauri æmula, in  
uersus, ut forbus, digesta, qui apud nos petelin uulgatum in-  
est nomen: prior autem à rhus Latina feminis appellatione  
Rhus nominatur. Frequens utraque apud nos luxuriat, &  
iam dictis appellationibus uulgo est notissima. Quæ autem  
planta Lutetia Parrhisorum in conspectu pro terebintho often-  
ditur, non terebinthus, sed fœlel Aethyopicum est.

*Τύριον*, Beta.  
Vulgaris est notitiæ officinis Latinum nomen infedit: Gallis de  
la poyrre: Delphinatibus de reparas: nostris bledo: Italis bieto  
la, nuncupatur.

*Τύριον*, Cinis omnis.  
Nomen retinet, uulgo cendre.  
*τύριον*, Fœnum Græcum.  
Officinis fœnugræcum, uulgo du fœnegræ corruptè pro fœ-  
nogræc.

*Τιθύμαλλον*, Tithymalli.  
Septem tithymalli genera. Characias, qui hodie passim ab herba-  
riæ rei studiosis amygdaloides: quibusdam espurge: Gallis re-  
ueille matin, dicitur: usque in syluis largissimus est proven-  
tus. Paralios peculiariter reueille matin. Cypariasis passim  
inuenitur, & officinis tithymallus coronatus: Italis herba mo-  
ra, nominat. Reliquæ species nō ita cuius notæ. Tithymallo-  
rum



lorū genera nota Delphinatibus thymonet: vulgo nostratiū de chouslo, à lachis dum franguntur eiaculatur, nocantur: qua appellatione lathyrides plerūq; comprehendunt.

*τρυφανθους*, Traganthus.

Officinæ vitiosis pronuntiacionibus afflicta dragacanthum, aut adhuc ineptius draganthum appellant.

*τριβυλος*, Tribulus.

Duo tribuli genera. Palustris, officinis ignotus: Galliz rusticis chastaigne d'eaue. Terrestris, qui esse putatur herbariorum calcitrapa: Gallorum chauchetrappe: nostratium caucotreppe, aut aurnolo.

*τριφυλλον*, Trifolium.

*Τριφυλλον* Græcis: trifolium Latinis & officinis. Duo solum habetur generum. Pratenfis officinis trifolium: Gallis tresfe: Delphinatibus & nostris triolet. Odoratum siue aspalitice, paucis adhuc medicis notum, Fuchsis cognitum & eleganter descriptum: officinis, ut quidam volunt, trifolium odoratum, quantum illis ignotum suspicor: Italis, quantum coniectare licet, lauaneste & galega: herbarijs ruta capraria: nostris Phërbo de la cabrierio, nominatur: ut hinc conficit rutam caprariam herbariorum uerum trifolium odoratum esse. Nam eius folia, dum primum erumpunt, rutam olent: ubi uerò adoleuerint & æstate grauem ac uolentem bituminis odorem spirant: maxime, si digitis atterantur, aut uulæ herbe inter lapides cōstringantur. Accedit notas trifolij aspalitices omnes tam apte nostratium caprariæ responderent, ut nulla ita in contrarium adduci possit, quin perpetuò & adsupplantibus eisdem omnibus, capraria nostræ provincie uerum trifolium aspalitice existimanda sit. Siquidem nostratium capraria supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iuncæ & nigras, unde ramulares nascuntur appendiculæ: in quibus singulis terna exant folia lato trifoliat ut meliloti similia. Ijs recenter exeunt rutæ odor inest: adultis autem, bituminis, id est, odor grauis, fortis ac sua acrimonia sensum ferit. Florem edit purpureum aut ex purpureo cæruleum, agglomeratum. Semen quadranten latum, subfissum, ex altera extremitate tereritum. Radix tenuis, longa, ualida. Ex quibus notis est per spicuum nostratium caprariam esse odoratum ueterum trifolium. Floret in æstate. Semen maturefcit augusto, & septembris decidit. Nascitur ubique in nostra provincia, uulgoque Phërbo de la cabrierio dicitur: & in alijs regionibus calidis, in frigidis autem nusquam sponte nature nasci constat.

*τρίφυλλον*, Solanum.

Solani multa genera. Hortense, officinis solotum & morella: cuius duo genera faciunt: candidius alterum: alterum ad nigredinem magis tendens. Halycacabum, cuius duo genera habentur, nam aliud simpliciter nomen retinet: & officinis alkekægi: Gallis (communi cum alijs rebus multis appellatione) baguenaules & coerette: Delphinatibus bonne bene: nostris de bonshommes nominatur. Alterum recentis notitie, quod di scriminis gratià peregrini nomen obtinuit: uulgo parifino pois de merueille, ob elegantiam illius fructus dici cepit. Haberit iam & his regionibus multis locis in hortis. Tertium somniferum: paucis adhuc notum: tractibus maritimis tum mediterraneis, tum occiduis frequens. Nam apud Nicetæ provincie nostræ continentiā, maximam eius prouentum saporis locis uidere est: tum in Gallia apud Turonenses & Rochellanos. Est & manicum; de quo inter doctos ambigitur. Quidam enim uolunt eam plantam esse, quam hodie Luteiæ solani manici nomine ostendunt: quidam contrariam sententiam tuerentur, utcumque tamen res habeat, negari non potest, quin ea ipsa sola (crediderim autem ego somniferi) species quæpiam sit. Quod autem solani ligno non simile uulgo ostenditur, circæa Dioscoridis existimatur. Quidam tamē solani genus esse uolunt, ea planta Italis herba bella donna nominatur.

*δελφινθους*, Hyacinthus.

*Υακινθους* Græcis: Hyacinthus Latinis: officinis ignotus. Tria sunt hyacynthi summa fastigia. Purpureus, cæruleus, ex cædido pallidus. Purpurei Dioscorides meminit, reliquis duobus ita dicit. Cærulei ad nos uenire rei herbarie studiosi. Is Gallis oignos des boys & ualsiel nominatur. Cæruleum hyacynthum esse, confirmatur ex Philostrati lib. 3. de uita Apollonii, ijs uerbis. Arbor Indica lauro similis, siliquam calycis instar formatam, malis punicis magnitudine, profert. Siliquæ autem pomum inest colore cæruleum, ac ueluti pulcherrimus hyacynthus: gustatu uerò suauissimum omnium, quæ in illo monte nascuntur. Hæc ille. Ex quibus colligitur esse & hyacynthum, cuius flores cærulei sint coloris. Est & tertium eius genus floribus pallidis, & in singulis foliorum floris summitatibus ex cædido pallidæ herbidis, ut macula lentis magnitudine unicuique in-

sculpta uideatur. Omnibus folium inest porti, minus tamen, radix bulbosa, candida, succo prægnans. Primum genus crediderim parum notum esse. uolunt tamen nonnulli cepam caninam, quæ Italis cepola dicitur, esse primam hyacynthi speciem. Quorum sententiæ (est reliqua omnia non male conueniant) reluctari uideatur, quod eius flores, nostris coculz dicit, nunquam pendere deorum appareant, quod in hyacyntho campimprimis requirit Dioscorides. Secidum in sylvis frequens in quibus, uerno tempore: & in admodum umbriosis locis, æstate, cæruleos flores emittit. Postremum in hortis Lugdunensibus inest, & uulgo (communi cum alijs multis floribus nomenclatione) des campanettes, nominatur. Primus hic floru, post ingentia hyemis frigora, erumpit, odoris non insuauis: qui tamen promptissime marcescit, & minimum temporis durat: quanquam siccatus (expertus loquor) longo tempore inrat ac uerè suauem odoris gratiam feruat.

*δελφινθους*, Tubera.

Gallis des truffes: Italis tartuffi: Delphinatibus & nostris tartifles. nullibi gentium, opinor, eorum maior uberiorue provenit, quàm apud Delphates.

*διδυμοειδης*, Hydropiper.

Officinis eupatori nomen falsò multis sæculis obtinuit. doctis hodie cognitor, & nomen seruat.

*διδυμοειδης*, Hyoscyamus.

Tria hyoscyami genera. album, flauescens, & nigrum. officinis inquisiamus: Gallis hancbane. Primi generis usus frequens, reliquæ species improbantur.

*διδυμοειδης*, Hypericum.

Duo eius genera. terrestre, omnibus notum. officinis hypericum, & Italis perforata, Gallis mille peruis: Delphinatibus & nostris herbe de la saint Jean. Aquaticum caule quadrangulo, crassiusculo, cætera terrestris simile, in alueorum marginibus frequens: officinis & uulgo ignotum.

*διδυμοειδης*, Hyssopus.

Duo hyssopi genera, hortense & montanum. Hortense officinis hyssopus: uulgo hyssop: Italis hyssopo. montanum in regionibus calidis frequens, & odore fragrantissimo prædium, nostrisq; uulgata appellatione meiramo nominatur.

*διδυμοειδης*, Lentescens.

Duū sunt generum: maiores & minores. Officinis lentes. uulgo lentilbes: Italis lentice. Apud nostros Græca lentis appellationis scoma in hodiernū usque diem est relictum. Appellant enim ineptum & nullius precij momentie hominem phacquin, id est hebentem, ineptum ac lentis pabulo dignum.

*διδυμοειδης*, Lens palustris.

Officinis, lentida aquæ nominatur. inuentu ubique facilis.

*διδυμοειδης*, Phaceli.

Dioscoridi hortensis similis appellatur. nostris phacoulx: Italis fagiuli.

*διδυμοειδης*, Verbascum.

Multa habentur uerbasci genera. Album cuius semina: nigrum cuius masculi nomen inest. Vtrumque officinis taphis barbarus. Candidum autem Gallis du boughon blâc, nostris de torchos. Hæc duo uulgo nota sunt. Est & tertium uerbascum angustis folijs, oblongis, fragilibus, ex herbaceo nigricantibus, flore albo, aut pallido, calathi formam representante, caule recto, folioso, cubitali aut ampliore, in sylvis frequens, anonymum adhuc, & officinis ignotum. Quartum illud genus, quod marubio simile facit, uulgaris stachys effert, nisi ea sububro flore prædita spectaretur. Triallus siue lychnitis, quæ sit, ignoratur. Ad phlomidis referunt uulgarem herbam, quæ quibsdam herba sancti Petri, alijs herba paralyfis, omnibus simul primula ueris (quanquam, primula ueris appellatione, scio belides, id est, primo uere erumpentes margaritas, quæ sunt Gallorum pasquetes, intelligi à quibusdam & uocari) nominatur, tum eam quæ odorata est, tum quæ odore caret. Putant etiam nonnulli ad phlomidis referendam eam herbam, quæ Fuchsis ueronice fœmine nomine depinxit: quam, inquam, nostrates corruolo blanco nominant, quæ quæ nulli ex uulgaribus herbis est: dignitate secunda,

*διδυμοειδης*, Palma.

Arbor est transmarina, saltem quæ fructum parit: cuiusque fructus ad nos importatur. Is officinis dactylus: uulgo dates solet nominari. Quæ autem in Italia, Lygyria & nostra provincia adolefcit, sterilis est, palmaque uulgo nuncupatur.

*διδυμοειδης*, Ph.

Doctorum omnium testimonio officinarum ualeriana est, quæ in maiorem & minorem distribuitur. In Gallia & Delphina tu frequens: Apud nostros in hortis tantum inuenitur. Vnde eam minus ualentibus delectari, & in eis sponte nasci constat. V ulgus iam ualeriane eam appellat.

*Alga, Fucus.*  
Maritima provincia ulgo nominat, eaq; stercoreandis uineis pro  
fimo utitur. Italia alga.

*Galbanum.*  
Officinis galbanum. Vulgo garbanc, nostris bon gaume.

*Trixago.*  
Officinis Græcum nomen infedit. Gallis & nostris germandræ:  
Delphinatibus gelimandry: praticis non paucis germandræ.  
Italīs calamandria.

*Chamaelea.*  
*Chamaelea.* Græcis: Latine chamaelea: recentioribus, ut antor est  
Ruellius, oliella: officinis mezereon Arabum more dicitur.  
Sed interim non est hoc loco silentio dissimulandum, quas-  
dam officinas autū, mehercle, parū sobrio thymæleam pro  
chamaelea usurpare. Nam chamaelea (cuius ramum Viennæ Al-  
lobrogum, apud doctissimum Guidobaldum, medicum, illi ex  
Italia allatum, uidi) folijs est olæe domesticæ, minoribus ta-  
men aliquanto, & aspectu incano aut subcineritio. Mezereon  
autem, quod utuntur officinæ, folijs constat angustis, oblon-  
gis, foliorum lini hortensis æmulis, numerosis, crassiusculis,  
summos ramos præsertim uestitibus, gustu uiscofo gummo-  
soq; ac non ulgareriter acris: flagellis cubitalibus aut longiori-  
bus, multis ab una radice erumpentibus: flore exiguo, candi-  
do, copioso: fructu primum uiridi, cum autem maturuit, ru-  
bro, myrti ferè magnitudine. Quæ notæ omnes satis argunt  
eam plantam, id est, officinarum mezereon, non chamaeleam,  
sed thymæleam esse. Floret mensē Maio. Semen maturefcit  
mensē Iulio & Augusto. Copiosissima nascitur, in nostra pro-  
vincia ubiq; maxime apud Aquas sextias in montosis, asperis,  
calidis ac sitientibus locis. Quo uerò apud eos nomine uulgo  
to nun cupetur, nondum mihi compertum esse, fateor. In qui-  
busdam Italici locis fructus tam chamaeleæ quàm thymæleæ pe-  
pe montano nominatur.

*Chamaelea.*  
Latinis faranum aut fartugium: herbarijs populago. Herba  
est rotundis folijs molliter per ambitum ferratis, uulgari allia-  
rie effigie proximis: cauliculo recto, herbacei coloris, rotun-  
do, pedali altitudine aut ampliori: flore luteo aut candicante,  
radice fibrosa, inutili: floret æstate. Humidis ac uliginosis lo-  
cis, maxime præter, gaudet. Tori Gallie familiaris. Vulgo, si  
non ignota, saltem anonyma. Quidam tulsilaginem chamgleu-  
ce congenerem putant: quia sententia fuisse autorem uerissi-  
mile est, ut qui de bechio nobili herba nusquam antea memi-  
nerit. Accedit becchio barbaris farfar appellari: officinis un-  
gualem caballianam. Gallis pas d'âne: Delphinatibus de la pate:  
nostris ungo caullino. Chamaeleuces interim penuriam far-  
cit conyza parua aut capparis cortex cap. 16. lib. 3.

*Chamaelea.*  
Albus ubiq; frequens: doctis non ignotus: officinis & ulgo car-  
lina. Niger montibus fere delectatur, latoq; eius flos ambitu  
circumscriptur, qui ædium liminibus, ad arcendas fascinatō-  
nes, clauo affigi, à plebeijs, solet.

*Chamaepitys.*  
Tres eius sunt species, è quibus una desyderatur. Ex his quæ  
habentur, altera iua muschata: altera iua arthetica & chamaepi-  
ty officinis dicitur: nostris iuo: Italia iua.

*Chelidonium.*  
Duo chelidonijs genera: maius, & minus. Maius officinis cheli-  
donia: alchymistis donum cæli: Gallis de l'esciare. Delphinati-  
bus toulange, apud quos certissimo experimento constat,  
eius radices, si dentibus affricentur, aut manducentur, eos pu-  
tescere, & ore, corruptos, euocare tantum abest, ut eorum  
dolores, cum Dioscoride, finiant. Minus chelidonium offi-  
cinis & herbarijs ferofularia. Parisijs ulgo l'herbe sain cte gene-  
ueuse. Tulsis fano scello. Nec est silentio prætereundum mi-  
noris chelidonijs radices saluari experimento duriorum cor-  
porum hernias sanare, si earum succus ex albo uino extra-  
ctus, (scquicyathi mensurâ, supinis in lecho reclinatis hernio-  
sis, diebus circiter duo decim, ieiuno uentriculo, propinetur.

*Chondrilla.*  
Seridis species est, de qua in synbio dictum est.

*Psyllium.*  
Officinis nomen retinet: nostrati ulgo de badassos. ubiq; in  
macilentis & arenosis prouenit.

*Ocimum*  
regale.

Duo ocymij genera: maius, & minus, cui daryophyllati nomen  
officina indiderunt. Antiquis ocymum cantaxat dictum fuit:  
posterioribus Græci basilicum, id est, regium addiderunt, unde  
euenit, ut basilici nomen apud uulgus obtrunierit. Nam Gallis

du basil: nostris basilicæ aut baseli: Italici basilico gentile, no-  
minatur.

Quia suis sedibus exciderant Leontopetalis & Lepidij annotationes,  
eas hic attendendas duximus, ne forte pratermissas à scholasticis arbitra-  
rer.

*Leontopodium, siue*  
*Leontopetalon.*

Ambiguum est quid sit. Nam Ruellio placet esse patam leonis  
officinarum, quam Galli pomeuleæ, Delphinatibus marsure, no-  
stropoumouleyo nominant. Eandem rursus cum Plinij consi-  
ligine confundit, non nominibus quidem, sed re ipsa, si dili-  
genter consideretur. Fuchsius, ne ambagibus implicaretur,  
eam plantam leonis patam officinarum uidelicet ad ellebo-  
rum nigrum adulterinum syluestrem relegauit. Verum siue  
consiglio Plinij, siue leontopetalon Dioscoridis, siue adul-  
terinus Fuchsj elleborus censeri debeat, iam in ellebori men-  
tione diximus. Hoc tamen nunc addere præter rem ac institu-  
tum non erit, uulgare officinarum patam leonis (quam Gal-  
lis pomeuleæ, Delphinatibus marsure, nostris poumouleyo  
nominari diximus) tantillum attritam, horisq; aliquot aqua  
maceratam, præcipuo ad omnis generis inflationes, præsertim  
uenenosas, remedio esse, si ex ea aqua cyathi tres aut quatuor  
ipsis inflatis ieiuno stomacho diebus aliquot continuis pro-  
pinentur.

*Lepidium.*

Lepidium Galeno, cap. 2. lib. 10. compo. pharm. part. ea herba est,  
quam Democritus in Clinico (ut Archigenes apud Aëtium  
cap. penult. lib. 3.) ibidem siue cardamanticen nominauit,  
ac nascitur per omnia fecit similia. Paulus item cap. 77.  
lib. 3. ex Galeni sententia: & lib. 7. ibidem syluestre nascitur  
Græcis siue cardamanticam appellari commemorat: ean-  
demq; genere cum Lepidio esse affirmat. Verum Græcorum  
Lepidio folia lauri ascribit, multo tamen ampliora ac molli-  
ora. Quinetiam Paulus afferunt Plinius, cap. 8. lib. 19. Lepidij,  
in quibus, in cubitale exire altitudinem, folijs esse laurinis,  
sed mollioribus. Ex quibus liceat duo Lepidij genera statuerem:  
maius scilicet & minus. Maiori radix satis longa, candida, intor-  
ta, crassitudine digitali, gustus acris ac feruida, nasciturum re-  
dolens. Caulis in cubitale, aut paulo ampliore, exeunt  
longitudinem, iuncto crassiores, leues, per summa brachia-  
ti, ex candido cæsi ac tantillum per autumnum rubescentes. Fo-  
lia longa, hortensis uulgarisq; costi folijs similia, laurinis  
multo ampliora ac molliora, primum uiridia, deinde fupalli-  
da, aut quasi cineritia, nasciturum redolentia. Flos summis, uir-  
gis insidet albus, racemosus oliuæ modo. Semen copiosum,  
minutulum, gustu feruens. Minus autem Lepidium ternos,  
quaternos, plures aut pauciores cauliculos ab una radice fun-  
dit, teretes, rectos, cubitales, sæpe breuiorcs, ramosos, folia  
nasciturij, gustus acris, nasciturij sapore, gustu, & odore. Florem  
laetum, copiosum. Semen exiguum, teres, oblongum, foli-  
co lanceæ cupidi similit geminatum contentum. Radix candi-  
da est, oblonga, minimi digiti crassitudine, feruens gustus,  
odore nasciturij. Floret utrumq; æstate. Semen maturefcit au-  
tumno. Minus in uiarum marginibus, sepibus, rudibus, iuxta  
parietes ac murorum ruinas, apricis & soli expositis, locis lu-  
xuriat. Maius in uicinis humentibusq; & in ficcis nonnum  
quam ubiq; potissimum in nostra provincia. Hoc à gustus  
acrimonia nostris bon raphy, id est, bonus raphanus, dicitur:  
Gallis anonyum. Minus officinis & ulgo adhuc igno-  
tum. Ruellio tamen & Hermolao raræ eruditionis uiris, Rha-  
phanus officinarum ueterum Lepidium existimatur. Verum si  
raphani nomine eam plantam intellexerint, quæ prælongis,  
latis, in dorsum, ubi adoleuerint, quadrantes recurrit, herba-  
ceisq; constat folijs, radice crassa, acris, caule cubito longiore,  
flore quasi brasicae, & in hortis inuenitur: certum est illos  
cum sibi, tum alijs imponere. Sin uerò eam notent, quæ no-  
stris bon Raphy nominatur, repræsentatione omnino carere  
debent. Nam quòd maius Lepidium nostræ provincie uulgo  
bon raphy appellatur: uerò simile est, eam nomenclationem  
ab herbarijs in uulgus nostrum manasse: ut inde duo rapha-  
ni genera subindici uideantur: Alterum laurinis folijs, gu-  
stu & sapore nasciturij, & id uerum Lepidium maius esse: Al-  
terum helenij aut uerbasci folijs, gustu acris quidem, sed uulga-  
ris raphani, quod non Lepidium, sed raphani species existi-  
mandum sit. Non desunt alijs qui uulgarem piperellam Lepi-  
dium maius esse putent, sententia minime probanda, nisi aliud  
Italici (quod magis suspicor) aliud Gallis piperitidis piperel-  
leque nomine intelligatur. Nam quæ harum gentium officina  
nisi piperitis dici solet, Gallico & Delphinatico uulgo do coq,  
nostris costi uocatur: folijsq; spectatur laurinis, multo tamen  
amplioribus;

amplioribus, minimè crassis, in ambitu serratis, gustu cum quadà amaritudine acri ac stauti: caule cubitali: flore luteo, spe cioso, athanassæ, aut fœminæ abrotoni floribus æmulo: radice numerosa, candida, acri. Quæ note si conferantur cum ijs, quas nostratum bon raphy in esse diximus: conspiciunt, nî fallor, inter ambas plantas agnoscent discrimen: cum alterius flos candidus sit, racemosus, folia incana, læuia, pinguiuscula, gustus feruidi, & nasturtium, omnibus suis partibus, prorsum redolentis: quam ob id à Græcis cardamanticam & agriocardum non nominatam fuisse, constare, uel cuius medicocriter erudito, potest. Quare, ne longius excurrat oratio, in ea ipse sum sententia, ut nostratum bon raphy ueterum lepidium maius cetero existimem. Nec obstat, quòd in pinguib; & humidis locis folia quæ radicibus propiora sunt, maiora aliquando, quàm à Paulo Plinio quæ picta fuerint, nonnunquam usân-

tur: Alioqui eadem ratione, ea rutæ planta, quæ in Herodio Iudæ nobilissima atque munitissima arce, ingentem ficum arborem suam cum proceritate, tum magnitudine æquabat, (ut est autor Iosephus libris de bello Iudaico) ruta non erit, quòd in magnitudinem & altitudinem prorsus inuistatam adoleuerit: Nec ueratum album, Dioscoridi pedalis altitudinis, ueratum erit, quòd illud tricubitale implere lōgitudinem, in albis, umbrosis & uuidis locis, oculis nostris læpe (non tamen citra admirationem) uiderimus: Nec item sabina plāta una pedum duā supra uiginti, alia quatuordecim longitudinis (quas ipsi superiore anno apud Delphinas conspeximus) sabina erit, quòd Dioscoridi arbor sit coactæ breuitatis.

## FINIS LIBRI I.

# HVGONIS SOLERII SANIONENSIS, MEDICI, IN II. AETII LIBRVM SCHOLIA.

\*

Σφρίδις λευκή. Sigillum lemmium. Cap. 4.



ODIE ut plurimum desyderatur. Venditant tamen officinæ factitiam terram, quam uocant sigillatā, pro lemmia terra: cuius uiribus & delincamentis parum responder. Euenit tamen nonnunquam, ut propter cōmercia, adulterina lemmia Constantinopoli in Gallias importetur. Siquidem affirmant docti bolum armeniam orientalem cognominatam esse, uel lemmiam terram, nullo sigillo impresso. Quæ uerò sigillata uisitur auaritia negotiatorum adulterata est.

ῥωτοί, Rubrica. Cap. 5.

Vera desyderatur, quamquam & Gallis rubricæ genus quod sine ple appellent, fabris lignarijs egregie cognita, quam nostras uulgo aucano nominat.

Σαμία γῆ, Samia terra. Cap. 6.

Ignoratur. putat tamen Musæ Brassaulus officinis talchum appellari.

γῆ σελινύσια καὶ χίτα. Terra Selinusia & Chia. Cap. 7.

Non habetur.

μυμολία, Cimolia terra. Cap. 8.

Vera desyderatur. figulina tamen eius uiribus responder: atque ob id, quando cimolia inopia premit, usurpari in usus medicos potest.

ἀμπέλιτις, Ampelitis. Cap. 9.

His regionibus desyderatur. quanquā si etymon spectes, ubiq; inueniri poterit.

κρετικὴ, Crætica. Cap. 10.

Putant eam esse, quam Galli de la croye nominant: uerū uulgaris croye lapis est cādidiissimus, friabilis, & è fodinis erur.

βόλος τῆς ἀρμενίας, Armenius bolus. Cap. 12.

Factitius tantum his in regionibus habetur. Is attamen preparatus contra pestilentie contagia usurpari felici successu à multis solet: propinata nimirum ipsius præparati drachma una, ex stillanti liquoris oxallidis cyathis tribus, diebus sex aut septem in aurora. Eruietur hodie è monticulis quibusdam prope ecenobium Montis maioris, nō procul ab Arelatis urbe nobilissima & antiquissima nostræ provincie, & uulgo boli armeni dicitur, quæ autem terra boli armenie orientalis uenditur uerissima, Galeni terra lemmia est.

ῥῶλος ἀμακτίτης, Hæmatites lapis. Cap. 13.

Quibusdam hæmatinarius dicitur: quod nomen ambiguum est: officinis hæmatites, scilicet dictus, quòd in aqua dissolutus colorem sanguineum reddat. Est & alius hæmatites, qui coti attritus, colorem quandam sanguinis non abfimilem remittit.

σφρίδις, γαλακτίτης, καλακτίτης. Sciftus, Galactites, Melites. Cap. 14.

Sciftus est officinarum & lapidarium specularis. In gypsum inuenitur. reliqui duo ignoratur. uolunt tamen nonnulli eū ignoti esse: sed quòd hæmatitis uiribus respondeat, hæmatem eius loco substitui.

λευκογραφίς ἢ μέριξος, Leucographis aut Moroxus. Cap. 16.

Dioscoridi morochthus & galaxias dicitur: quis autem sit ignoratur.

γαλακτίτης, Galactites. Cap. 17.

Aëtio duo galactitis genera, sed ambo nostris temporibus sunt ignota.

θυϊτης, Thyites. Cap. 18.

Lapis mortuorum alioqui dicitur, ignotus tamen est.

τεκολίθις, Tecolithus. Cap. 19.

Galeno Iudaicus dicitur, eoque nomine officinis cognitus est.

πυρίτης, Pyrites. Cap. 20.

Officinarum & solidariorum marchasitam utramq; ad ueterum pyriten referri uolunt. Meseus stellatus lapis dicitur. Est & sicilis quoddā genus igni excutendo efficacissimum, quod non strates peyrart, corruptā tantillum pyritis nomenclatione, appellant: quod an ad pyriten reuocari possit, pluribus non contendo. Molaris tamen pyriti substituitur cap. 4. lib. 15.

φρυγιός, Phrygius. Cap. 21.

Ignoratur. ἀγρωτός, Ageratus. Cap. 22.

Desyderatur.

ἄσις, Afsius. Cap. 23.

Afsius lapis, & ipsius flos desyderantur. lapidis tamen loco substituitur pyrites, capit. 34. lib. 15. floris autem inopiam emendat sal ammoniacus usus pari ad florem pondere, cap. 45. lib. 12.

γαγάτης, Gagates. Cap. 24.

Officinis ignotus. Gallis du geet. Delphinatibus, nostris & Aquitanis iayet, ex quo texturum precule mulierum. Extant nobilissimæ gagate lapidis fodinæ in montibus Pyreneis, è quibus maximæ glebæ eruantur, & in uaria utensilium genera tū scalpro, tum torro ab indigenis conformantur. nomen prius tum genti est la conté de foy.

μαγνήτης, Magnetes. Cap. 25.

Vulgo de l'aymant: Marinarijs autem calamita.

σμιρίς, Smiris, Pumex. Cap. 26.

Smiris uulgo emeri: talis femigilio. Pumex, pierre ponce.

λίθινος ἢ σπῆς σπῆγγος, Lapides in spongijs. Cap. 27.

Nomen retinet, & uulgo pharmacopolarum notissimi sunt.

*geodes, yfides,* Ostracites,  
Geodes. Cap. 28.

Ostracites lapis durus est, quo marmora poliuntur: geodes autem sic, quod a terram in medio sui corporis contineat, dicitur. An habeatur, necne, compertum nondum mihi est. P. cote naria lapis vulgo un acueur: mola est quaratorij gladij accueuntur, nostrisq; molo dicitur.

*igine,* Ophites. Cap. 29.

Coloris propè terrei est, serpentini cuius æmulus, punctis creberrimis ac minutissimis notatus. vulgus lapidarium serpentine appellat.

*hieracites, xgi, in dactylis,* Hieracites &  
Indicus. Cap. 30.

Ignorantur, aut saltem alijs longe diuersis nominibus uenduntur.

*vitru,* Vitrum. Cap. 31.

Nomen retinet. Gallis uerre, nostris ueyre.

*uirtu,* Aëtites. Cap. 32.

Duo eius genera, colore, magnitudine ac forma inter se distincta. Nam quidam maiores sunt, subrotundi, coloris penè terrei aut ex terreo pallidi, tuberculis quibusdam inæquales, ouo Gallinæque magnitudine pares, interdu maiores. Alij rubiginoso colore, oblongi, amigdalæ aut oui figura, quodammodo presii, & subasperi. Officinis lapis aquilæ: lapidarijs & vulgo pierre d'aigle nominatur.

*alabandinus,* Alabandinus.

Cap. 33.

Quis sit ignoratur,

*lincurium,* Succinum seu Lin-  
curium. Cap. 34.

Electri nomen à solis colore sortita est hæc lacryma. Vulgus & rura ambram citrinam appellant, ambres officinæ autem charabre, more Arabum. Diuersa tamen res est & recetiorum ambaro seu amparo: cuius tria habentur genera: fuluim & præpingue, fupallidum, & nigrum, quod & piscium uentribus erui prædicant: cuiusque portio, quæ dorsi spinæ adhæsit, ambræ gryseæ nominatur. Tradunt recentiores Greci fontes quosdam esse, qui ambarum, ut sulphur, bitumen, & picem eruant, multisque in locis facit urere. De his tamè plura apud doctissimum Ruellium legito cap. 27. libr. 1. & cap. 29. eiusdem.

*laipis,* Ialpis. Cap. 35.

Triâ hic statuit Aëtius iaspidis generâ uiridem, subuirdem, & iaspachatem. Duo priora genera habetur, & nomen retinet: iaspæ: Italici diaspro. Iaspachatem facile crediderim esse eum lapidem, quem nonnulli magna religione uelut thesaurum preciosum seruant, uocantq; agathæ. Aiuunt enim eum lapidem pestilentibus carbunculis adnotum ægrotantes à pernicië uendicare: uiridem autem Iaspidem collo appensum sanguinis è naribus profusiuâ sedare.

*saphy,* Saphyrus. Cap. 38.

Habetur, nomenq; retinet, iaspayr. Italice saphyro.

*smaragdus,* Smaragdus. Cap. 39.

Nomen retinet: emeraulde. maximæ nobilitatis est, & uulgatæ notitiæ. Sunt & alij multi lapides non contemnendæ autoritatis, Aëtio & uetustioribus medicis aut incogniti, aut inditi, ut granatus, chalcodonius, turcius, & alij cõplures: quos, quia de illis autor nullam fecit mentionem, silentio præterimus.

*adarcus,* Adarces. Cap. 41.

Spuma est, ut quidam uolunt, lacustrium harundinum, in alarum cauis concreta, spongij non absimilis. Inuenitur ætius solibus, exiccatis, ob ardores, flagnorum, palustris uisue locorum aquis. Facile ubique haberi potest. officinis ignotus.

*alcyonium,* Alcyonium. Cap. 42.

Quinque Diofcoridi Alcyonij genera. Si, ut quidam uolunt, alcyonium est maris spuma in corpus spongiolum concreta, atque in litus ui undarum & perpetui motus sic cta, duo priora geneta in littore mediterraneæ maris passim inueniuntur. reliqua minus nota sunt, essi quidam uolunt quatuor alcyonij pecies inueniri, Brasilaolo placet maris spumam, quam Ferrarienses officinæ dant unum, uerum alcyonium esse.

*sal,* Sales. Cap. 43.

Sal fossitius, qui mineralis est, officinis sal gemmæ nuncupatur. Armeniacus officinarum fossitius est: uerus autem quorum, ut & Cappadocius, ignoratur: ueri tamen Armeniaci loco usurpatur communis albisimulus, lotus, & exiccatus, cap. 27. libr. 3. Indus olim excedebarat monte Oromeno Indici. Est tamen fal Indus Arabij saccharu candum naturale: cuius loco nos cando fossitio uitur. Fossitius duplex est, ex aquis nimiru, ut mari: puteis, ut in Hispania: fossit, ut in Burgundia:

è nitroforu lignoru cineribus. Nâ è quercu aut corylo adustis, donec carbo appareat segregatus, deinde pfusa aquâ interdû falsâ, interdum dulci, fal hit. Siquidem cinis ille qui postea relinquitur, cõsumptus penè carbonibus, fal est. Verum sal omnis è stirpium materia factus nigrescit. Sals flos ignoratur. Sals spuma haberi maritimis locis potest.

*armeniacum,* Armeniacum pictorum.

Cap. 47.

Desyderatur, nisi sit officinarum lapis lazuli, quem docti caruleum Diofcoridis lapidem uolunt. Is ad melancholicas affectiones accommodatur, ut pictorum armeniacum: ad stipulatur & color, qui, Diofcoride teste, cæruleus in armeniacum expetitur ac cõmendatur. Quidâ uolunt, nos armeniacum lapide carere. Color tamen & facultates conuincunt aliquid esse, quod cæruleo (qui lapis lazuli transmarinus nominatus est) lapidi uiribus respõdeat. Quibusdam placet lapidem inueniri in fodinis metallicis, qui armeniacum ueterum respondeat. Is uerdatur nominatur.

*arsenicum,* Arsenipigmentum.

Cap. 48.

Arsenicum officinis nomen retinet. Vulgo de Parfenic. Vocatur & arsenipigmentum; Gallis de l'orpin, du realgar, aut risagal. Sublimatum enim ab arsenico diuersum est. Est & apud officinas arsenipigmentum rubrum, quod putatur ueterum sandarachâ. Aduertendum est recentiores chymistas arsenici nomine tria intelligere, arsenipigmentum rubrum scilicet, risagalum, & quod peculiari nomine arsenicum uocatur. Nam chymistarum nomina hæc sunt. Arsenicum croceum, quod est arsenipigmentum: arsenicum rubrum; quod est sandarachâ: & arsenicum album, quod priuata appellatione sic vulgo dicitur. Discrimen hoc faciunt docti nonnulli inter arsenipigmentum & sandaracham ueterum: quod sandarachâ, magis arsenipigmentum, minus in terræ uisceribus cõsum est, & idcirco minus rubicundum uideri.

*asphaltus,* Asphaltus, bitumen.

Cap. 49.

Officinis omnibus bitumen iudaicum nominatur. Duo iudaici bituminis genera: liquidu, quod Musa officinis petroleum dici putat, & stercus demonis. Liquidu bituminis fontem admirandum esse aiunt in Aruernia: siccus idem uult officinarum & uulgi mummiam censeri. Alij uolunt mummiam esse uerè tum pisalphaltum.

*nitrum,* Aphronitrum, & Nitrum.

spuma. Cap. 50.

Nitrum, aphronitrum, & nitri spuma obsoleuerunt, & in tantam uenerunt desuetudinem, ut, quid nunc sentiant, penitus ignoretur. Horum loco supponunt officinæ salem petra purgatum, in panes coactum. Id, inquit Syllius præceptor meus, mentiri fatius esset cineribus betæ, brasicæ, & aliorum nitroforum. Aliorum quorundam sententia baurach nitro loco à pharmacopolis substituitur: mentiri tamen posse lae, uini fæce, aut aceti fæce torrefactis. Aëtius cap. 66. lib. 2. uult falsis fossilis (quem gemmam appellari diximus) inopiam pari nitri pondere emendari. Quod si illius loco hoc substituitur, pari ratione, ille huius pernuriâ supplere poterit. Sal quoq; nitri loco sufficit cap. 66. lib. 8.

*gypsum,* Gypsum. Cap. 51.

Latinis & officinis idem nomen seruat. Gallis & Delphinatibus du plâtre: nostris de gypsum. Musæ Brasilaolo gypsum nondum coctum alumen scauole officinarum est: cum uerò decoquitur, id alumen in gypsi naturam transit.

*diphyres,* Diphyrges. Cap. 52.

Nisi sit scoria luti fossi eris, ignoratur. Quidam se uidisse in fodinis Tridentinis aiunt, nullum tamen uulgi nomen afferunt.

*specularis,* Lapis specularis. Cap. 53.

Habetur hodie specularis lapis, in gypsiarjis inuentus, quem tamē ad fissum lapidem referri contendunt.

*sulphur,* Sulphur. Cap. 54.

Duo sulphuris genera: uiuum, & ex uiuo fractitium uulgarissimum, ambo nota officinis nomen retinet. Vulgo du soulfre. Italice solfo.

*ascerus,* Ascerus rafa.

Cap. 55.

Viride æris à recentioribus appellatur: uulgo du uerdet: Italice uerde rame. Vermiculata autem duplex est: naturalis, & factitia, ambæ tamen ignotæ.

*cadmia,* Cadmia. Cap. 57.

Barbaris catimia: officinis: climia nuncupatur. Contendunt tamen multis argumentis docti quidam, ueram cadmiam esse officinarum tutiam,



nostris lampreso uocatur. Delphinis Gallis marisyn. Nostrates appellat dolphins, pisces & cetaceorum genere, magnos, oblongo rostro, dorso, ut cameli, multum protuberante: totumque corpore quasi in cemicirculi figuram conformato. Sardini pisces, des sardines Iberici des echoyes. reliqui sunt ignoti.

#### De crustatis. Cap. 145.

Gammari Gallis hommar & hammar. Locustæ nostris langousto de mar.

#### Molles. Cap. 146.

Polypus un pourpe. Sepia nomen retinet: Gallis seiche: Delphinatibus un seppo. nostris sepo, aut spio. Loligines Gallis calamartz.

#### Echini marini. Cap. 148.

Gallis erissons: maritima nostra plebs orfins de mar nominat. Italia ricio marino.

#### De garo. Cap. 150.

Garum sanies est salitum piscium, siue liquamen, quod ex piscibus aut carnisbus sale maceratis desinit. Varias garorum compositiones habes cap. ultimo lib. 10. Dionysij Vitis des agri cultura, qui, auctoris suppresso nomine, Constantino imperatori attribuit ac dicari fuerunt.

#### Adeps, Pinguedo, Seum.

##### Cap. 151.

Adipis, pinguedinis ac seui uariæ sunt differentia, pro animalium, & quibus extrahuntur, uarietate: quorum uicissitudines annotare necessarium instituit nostro duximus, quo nouum medicinæ tyronem rerum inopiam non perturbaret, & ad ceptis cu rationibus nonnunquam auocaret. Vrsini igitur aut uulpini adipis loco, si hi desint, sufficit potest caprinus, taurinus, equinus, aut butyrum recens, cap. 125. lib. 13. Anserini inopia, gallinae uis aut phasianæ, cap. 118. lib. 5. Gallinae quoque, anserino, & gallinae porcini succedit, cap. 4. lib. 15. Vrsino ite Vulpinus: amborum penuria taurinus, cap. 123. lib. 13. Adipem autem recentium gallinae, anseris, phasianæ, aut butyri, in infusis anodynis, inopia emendat fenogrecum, & althææ radices oleo incoctæ, cap. 5. lib. 11.

#### Medulla. Cap. 153.

Vitulina medulla ceruinæ inopia farcit æquo pondere, cap. 1. lib. 13. & cap. 83. lib. 16. Ad hæc ceruinus adeps, ceruinæ medullæ penuria reparat, cap. 42. lib. 12.

#### Succidæ lanæ. Cap. 159.

Lana succida deficiente, quæcunque alia usurpatur. cap. secund. lib. 15.

#### De terræ intestinis.

##### Cap. 168.

Intestina terræ, ut auctor est Aëtius cap. 6. lib. 4. sunt lumbrici piscatorum, qui in limo fluminis inueniuntur. Hæc cocta, cumque myrrha trita, ac ex passio sumpta iterum sanant, cap. 18. lib. 10. aquas hydropicorum ducunt, cap. 25. eiusdem, diabetem sanant, cap. 1. lib. 11. renem calculos comminuunt, cap. 5. lib. 11. uescicæ calculos atterunt, & urinam mouent, cap. 10. & 22. eiusdem, suppreffas item urinas mouent ex hydromelite pota, cap. 23. eiusdem, podagricis opitulatur, cap. 35. lib. 12. mammæ profundas duritas sanant, cap. 37. lib. 16. earundem abscessus, opitulatur, cap. 39. eiusdem, ueribus illita lac promouent, cap. 142. lib. 3. & lumbricos ducunt, cap. 156. lib. eiusdem, sumpta lac augent, cap. 6. lib. 4. Aurium inflammationes mulcent cum rosaceo cocta, & infusilla deinde olea, cap. 12. lib. eiusdem, earumque dolores leniunt eodem modo parata, cap. 120. lib. 5. Trita autem, & dolenti temporis adhibita, hemicanicos dolores mirè leniunt, cap. 49. & 50. lib. 6. Auriumque dolores infusilla mitigant, cap. 80. lib. 6. & externas aurium affectiones imposita sanant, cap. 88. lib. eiusdem, in testa aut uista, trita, & præuulsis pilis superpersa, eos renasci prohibent, cap. 67. lib. 7. Oculorum fluxiones & albugines sanant, cap. 99. lib. eiusdem. Dolores dentium mitigant, cap. 27. & 33. lib. 8. eosdemque dolentes circa doloris sensum extrahunt, cap. 34. libri eiusdem. Ad alia item multa uetia sunt, ut ex auctoris contextu habere potes.

#### Draco marinus.

##### Cap. 169.

In littore Græco *Apocritus*: Neapoli trachæna: Malsiliæ aragno de mar. Hunc uolunt nonnulli esse Gallorum uice. Dracem marinum uidere est Viennæ Allobrogum, in ædibus doctissimi Guidobaldi, medicis: cuius uidentis ac tractandi copiam mihi fecit anno superiore.

#### Vipera. Cap. 170.

Vipera accuratè auctori describitur, cap. 21. & 90. lib. 13. & Galeno in libr. de Theriaca ad Pisonem. Iam in Italia recognoscere cepit, & a serpentarijs marasso nominatur.

#### Erinaceus marinus. Cap. 171.

Supra in echino marino dictum est, eum a nostris uocari oursin de mar. Pisciculus est magnitudine uig gallinæ, fusco colore, circinnatæ rotunditatis, spiculis quamplurimis horridus, quæ uerò parte humi hæret, tantillum pressus. (nā ea parte humi pronus decumbit, & alimentum capessit) earumcula intus humida, in eundem cum salugine quadam saporis, intercurfantibus intus subrubribus, per certa interualla, mēbranis. Crudus coctusque estur, deiectionemque mirè excitat appetitum. Frequens inuenitur in littore mediterranei maris ubique: saxosis præsertim locis: præcipue in saxis Berganionis arci loci natura munitissima, rariore circiter miliaribus a Stocchabibus insulis, quas uulgo les isles d'yeres nominant.

#### Erinaceus Terrestris.

##### Cap. 172.

Vulgo Erisson animal omnibus notum, armentis bouum, pecorum gregibus, & non raro ipsis mulieribus infestum ac noxium. Tradunt enim rustici (id quod experientia superioribus annis confirmat) uaccam, ouem aut simile fœminæ sexus animal, si herbas aut fructus, super quo gentale semen erinaceus effuderit, fortè fortuna pauerit ac deuorarit, erinaceum concipere, gestare, tandemque parere, aut (si id ob spicula non possit) emori. Paucis enim ab hinc annis id comperit fuit in uacca, & oue (disiectis post mortem earum corporibus, & erinaceo in matrice inuento) non eo Delphinatu tractu, quem uulgo Rojans appellant, non procul ab Isara flumine amplissimum, & antiquis scriptoribus celebratissimum. Fidem hinc rebus abrogandam censerem, nisi adhuc oculati ac fide dignissimi testes extarent, qui idipsum in mulieribus hac accidisse, uel iu reuorandum asserunt. Nam uisæ sunt mulieres aliquot, quæ erinaceos multos, cum id uerum gestaffent, pepererint. Alia quæpiam nobilis genere in monte Cemenio (is enim est, qui Lugduno Belicardum usque ab occidente Rhodanum comitatur) cum alius mēstris iam nouem intumefuit, sperans egregiam fe marito sobolem parituram, quatuor cuniculos instanti loco effecit. Alia quæ Crophulæ animal (sic enim uocant animalculum quod ætate in algidiorebus fontibus inuenitur: oblongum est & gracile, semicirculare, multis pedibus præditum, colore quasi millepedum, quæ in hydryis stabulantur) quæ cubitum longitudine, & brachium magnitudine æquaret, edidit. Alia postremo (dictu mirum & horrendum uisum) monstrum peperit triceps, cubitale, capibus domesticis felis, corpore lacertæ, colore uario, brachijs ac tibijs orbium, cauda breui. Nec item quæ sequuntur sua carent admiratione. Refert Plutarchus grauissimus auctor cap. 9. lib. 8. symposiacum, quandam in dyoria hordeaceum culum, geniculis aliquot cinctum, cum urinis exulsiue. Aliam uerò quandam hospitem ephebum Athenis bestiolum hirfutum, multisque pedibus uelociter ambulante, unā cum multo femine excreuisse. Noui præterea ego, apud Aptam cognomento Iuliam, quandam æ primatibus urbis Bertrandum Rizium, qui deuoratis intempesta nocte, ad alium largiter sollicitandam cata potius, uenereo: quodam furore percitus, mox cum uxore eum habitudine accidit, ut, ut purgantibus medicamentis cum uirili semine in utero coniecta, indeque per uniuersum mulieris corpus transfusa, illa plus minus decies aluit, intra horas pauciores septem, exonerarit: uir autem, qui catapota deuorauerat, nihil omnino excreuerit. Id enim a medico prinuè deinde a uiro postremo ab ipsa muliere, maximo risu simul & admiratione, anno abhinc quatuor, didici. Quænam noui Aruer nam quandam iureconsultum, ætatis mediæ, claris uotum parentibus, qui, ob quandam infimorum intestinorum morbum, ab annis iam pluribus quatuor, nihil prorsus per sedem excreuerit. Verum præcibus inferiori meatu, immutatoque naturæ ordine, quoties fecalibus excrementis grauatæ, ea putria omnia & olentia grauitur, per os quasi uomitu expellit. Audio præterea quandam alium (id enim accepi ab ijs qui frequenter uiderunt) mensibus singulis, sceminarum more, largam sanguinis copiam per gentale membrum excernere coeuisse. Quæ iam dicta omnia ideo adnotare & scriptis mandare uolui, partim quia rara aut inaudita: partim ut mecum discat beneuolus lector, multa quotidie in rerum euenire natura, quæ humane sagacitatis captum excedunt, fidemque omnem superant.

#### Hippocampi marini.

##### Cap. 173.

Hippocampus Malsiliæ cheual de mar dicitur, quod capite & collo sit equino, rostro oblongo, fronte, ut equus, comosa, pilosa ceruice, cauda draconis: gallis uenè chenille.

#### Cantharides. Cap. 174.

Nomen ubique uulgo retinent cantharides.

**Canceri fluuiales. Cap. 176.**

Gallis efcreuices: nostris chambres.

**Locustæ. Cap. 176.**

Locustæ alia terrestris: marina alia. Terrestris multe sunt species, magnitudine & paruitate distinctæ. vulgo langoustes aut saul-terelles. Marina nostris langousto de mar.

**De castoris testibus. Cap. 177.**

*Κίτρινος* Græcis & medicis: Latinis liber: Delphinatibus nibre. An cipitis uisæ animal, lutæ simile, crassum, longum, pilo ceruino, crastiore tamen & asperiore: capite breui, rotundiufculo, rostro simo, dentibus binis, tum superiorem, tum inferiorem maxillam armantibus, oblongis, robustis, & aliquantum incur nis, auribus contractis, rotundis, breuib: ubijs anterioribus dodrantis longitudinem æquantibus, pedibus simæ urfûæ æmulis: posterioribus autẽ breuioribus, & pedibus anserinis: cauda lōga, satis lata, densa, folæ piscis æmula, quamofa, aspera, &, ubi pronefioris ætatis fuerit animal, pilis quibufdã breuib: (presertim uersus eius summum) munita: testibus (quod falsõ est à plerisq; putatum) nusquam foris prominentibus, quin potius ita retractis, ut egerimẽ tractari (tantum abest, ut periculo urgente eius dẽtibus amputari) possint, corpore uni uerso graueolente. Mirum est, castore non nocturno tẽpore, relictis fluminibus ripis, in uicinos locos concedere: & arbores omnis generis, maxime salices (quia teneriores opinor) duobus supra terram pedibus, adeo circumrodere, ut breui temporis interuallo eas excindat, & in miserabilẽ ruinam adigat. Hominum tamen cõspectum & strepitum ualde pertimescit: atq; ob id, repente, si quid insidiarum sibi moliri suspicetur, in uicina flumina se recipiens, saluti fuga cõsulit. Inuenitur in Sabaudia: in Isaræ & Rhodani fluminũ ripis, maxime in ea Rodani insula, quæ uulgo la Camargo dicitur: uicina enim est mari, & Arelatis urbi nostrẽ provincie antiquissimæ & nobilissimæ. Multi de castore multa fabulantur: nos quæ uidimus, ea tibi bona fide liberoq; animo explicam⁹. De fibro uide Aristoteli cap. 5. lib. 8. de historia animalium, Pliniũ cap. 30. lib. 8. & cap. 3. lib. 32. & Solinum eiusq; enarratorem Camertem cap. 24.

**De buccinorum testis uitis. Cap. 181.**

Bij cornuti buccina uocantur in Gallia: in Hispanico mari thelamonas purpuras appellant. Apud officinas duo genera inueniuntur: dentale, quod quorundam opinione, os est buccinorum, ut dentale purpurarum: Syluio tamen dentale uox & res barbara est.

**De galerita uolucres. Cap. 182.**

*Καλαρίτης* Græcis: Latinis galerita, est ea auicula, quã Galli aloete aut cochenix, nostris coculhudo, quasi cucullatam, uocant. Meminit etiam Aëtius cap. 11. lib. 11. passeruli cuiusdam, cuius caro elidendis deturbandisq; renum calculis sit præcipuæ dignitatis: qui, inquam passerulus, quantum ex delineamentis colligere possum, nostris lardeyreto: Delphinatibus larde-no nominatur: quanquã multorum opinione ea est auicula, quam nostri gingno quouo: Galli branle quene appellant. Verum nõ multum refert utranuis in usus medicos admittas.

Congeneres enim inter se uidentur, nisi huic tremula, illi firma cauda inesset. Ego tamen reuera priorem anteponendam ducerem: & posteriorem, prioris inopia, in usum uocarem.

**De cochleari terrestris. Cap. 183.**

Eius multa genera. Alia enim oui gallinacei magnitudinem implent, rotundæq; sunt, subcandidæ, syluis & aquaticis locis familiaria. Alia depressæ: Alia candidæ, in uineis & ueprius degentes, omnium delicatissimæ. Alia rotundæ quidem, sed magnitudinis mediæ, ac uulgares. Gallis limaces & elcaragotz: Delphinatibus & nostris limaces.

**De mænulis. Cap. 184.**

Mænulæ uulgo debogues. Mænularum item nomine comprehenditur, omnes pisciculi, qui Gallis de la menuyse, nostris menudalho dicuntur.

**Torpedo. Cap. 185.**

Piscis est Gallicæ plyæ similis, maior tamẽ, & laterib⁹ magis pinatis, pressus, latus & penẽ circinnatæ rotunditatis, suo attractu totus egelidus, naturalem eam uim habes, ut stuporem repentinum manibus & totibꝛachio afferat, quemadmodum experientia me, in mari Lygustico, docuit. Malsicũ un tourpillhon, quibufdã tremorfa, quod suo contactu tremorẽ inducat. Nautæ tamen qui mecum tum erant (erat autem Frontinienensis, patria Aquitani) gallino de mar, nisi me fallit memoria, appellabant. Venetijs autem tremolo: Romę batti potta & fortergia nominatur.

**Asellus. Cap. 186.**

Vulgaris est merlus.

**De ostreorum & purpurarum testis.**

**Cap. 187. & 188.**

Ostreorum testæ sunt uulgares cocquilles. Testæ autem purpurarum uix inueniuntur.

**Squatina. Cap. 189.**

Ignoratur.

**Scincus. Cap. 191.**

Duo scinci genera: maior ignotus, minor officinis stincus.

**Cicadæ. Cap. 193.**

Vulgares sunt cigales. frigida loca horrent, calidis delectantur, æstiuis ardoribus præteritum aures suis clamoribus ac garritate obtundentes. Hoc interim notari indignum nõ fuerit, cicadas in partu mori, discisso in fœtus exitu parentis uentre, ut de uisera memoriæ proditum est. Id enim obseruatione multa ac longa cognouimus.

**Hyæna. Cap. 194.**

Quod qualẽque sit animal tradit Aristoteles cap. 5. lib. 8. de historia animalium. Hodie, his saltẽ regionibus, ignoratur. Illius stercus olim in usu fuit, quo deficiente, suillum usurpari debet, cap. 6. lib. 13.

**Hirundines. Cap. 195.**

Nomen retinet. Gallis & Delphinatibus hirundelles: nostris dindoletos.

*Scholiorum in loca difficiliora libri secundi Aëtij fenis.*



# AETII MEDICI GRAECI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABIBLI PRIMAE SERMO

PRIMVS, PER IANVM CORNARIVM ME-

DICVM PHYSICVM LATINÆ CONSCRIPTVS.

\*

De simplicibus pharmacis ex plantis, iuxta ordinem literarum  
Græcarum. Item de multorum oleorum præparatione.

\*

## DE SIMPLICIVM MEDICA- MENTORVM VIRIBVS.



**D**IFFERENTIAE partiu-  
larum actionū in singulis phar-  
macis sūt, ex eo quodd singula  
ex ipsis ad tantam caliditatem,  
aut frigiditatem, aut siccitatē,  
aut humiditatem, aut partium  
tenuitatem, aut eārdem cras-  
situdinem accedant. At uero ad quantā tandem ac-  
cedant singula, enarrari non potest iuxta exactam  
sanē ueritatem. Sed nos tamē etiam hoc ipsum ma-  
nifestis, & ad artis usum sufficientibus distinctioni-  
bus comprehendere cōtauimus, unum quidem ge-  
nus esse demonstrando, quod ad simile corporibus  
nostris temperamentum perueniat, ubi a caliditate  
quæ ipsis corporibus inest, transmutationis & al-  
terationis principium quoddam assumpsit. Alte-  
rum uero calidius fieri quā pro nostro tempera-  
mento. Atq; huius quatuor ordines facere mihi uis-  
sum est. Primū qui adhuc ad sensum obscurus est, ut  
ratione deprehendere oporteat. Alterū ab eo secun-  
dum, qui iam ad sensum manifestus est. Tertiū qui  
fortiter calfaciat, nondū tamen urat. Post hūc quar-  
tum & ultimum qui uisior sit. Sic & frigefacien-  
tium primum ordinem eorū quæ ratione indigent  
ad demonstrandum quodd frigefaciant. Secundum  
eorum quæ sensibilibiter frigefaciunt. Tertium forti-  
ter frigefacientium, nondū tamen mortificantium,  
Quartum mortificantium. Iuxta eandē proportio-  
nem etiam humectantium & siccantium. Fiat autem  
clarioris doctrinæ gratia harum distantiarum a tē-  
peramento ordo, ita ut frigidiorū primus sit, in quo  
quis locauerit rosaceū oleum, aut ipsam rosam. Se-  
cundus ab eo sequens proximē, in quo rosæ succus,  
Deinde tertius & quartus, donec ad frigidissima  
perueniamus, cicutā & papaueris succum, & man-  
dragoram, & hyoscyamum. Rursus in calidis ane-  
thum & scœnum græcum primo ordine ponamus.  
In secundo quæ secunda apparent: ita & tertia &  
quarta, donec ad uistoria deueniamus. Iuxta eūdem  
modū in humectantibus ac siccantibus medicamen-  
tis, initio rursus a temperatis sumpto, ordines conse-  
quenter usq; ad summā faciemus. huiusmodi enim  
cognitio non parum ad medendū methodū confert.  
Conuenit porro præexercitatuū esse in sensu gustus,  
& proprietatem unicuiusq; qualitatis saporum in  
memoria habere, uelut uerbi causa: Quum corpus

aliquod linguæ ad moriū uehementer siccatur, & con-  
stringit, ipsamq; ad multā profunditatē exasperat,  
uelut pira syleustria immatura, & corna, ac similia:  
omne tale Acerbum nominatur, hoc est intense au-  
sterum. Quæcūq; uero in contactu linguæ, ipsam  
non confringunt, neq; cōtrahunt, uelut adstringē-  
tia solent, sed contrariarū facere uidentur, exterge-  
re q; & eluere, talia omnia Salsa appellamus. Quæ  
autem his adhuc amplius extergent, simulq; mole-  
ste exasperant, Amara uocantur. Quæ uero mordēt  
& cum ualida caliditate erodunt, Acria. Quæ uero  
absq; caliditate mordent, Acida dicuntur. Habētq;  
præterea uisū fermentandi terram si ad ipsam effu-  
dantur. Quæcūque autem uelut sublinunt & re-  
plent & sedant exasperatas & quasi erosas linguæ  
partes, ipsas cum manifesta iucunditate contingen-  
tia, Dulcia nominantur. Si uero sine manifesta iucū-  
ditate id faciant, Pingua appellantur. Si quidē igitur  
Acrimoniam manifeste percipere uelis, in alio  
& cepis ac similibus frequēter degustatis ac diū cō-  
manducatis discēs, ita ut affectus ex his sensum dili-  
genter memoriæ commendes. Si uero adstringēdi  
uisū palam percipere uoles, in Galla & Rhoe ac si-  
milibus assequere. Si Amariudinem, niri ac fellis  
gustu. Si Dulcedinem, sapæ ac mellis. Præterea siue  
qualitatis expers, siue qualitate ad gustū mediū co-  
gnoscere uisus, aquam accipe, eiusq; gustum dilige-  
ter in memoria retine, & maxime purissimæ aque,  
& nullam prædictarum qualitatu resipientis, neq;  
dulcedinem, neq; acrimoniam, neq; acorem, neque  
amaritudinem, insuperq; neque multum calidē, ne-  
que nimium frigidā. Inde enim progressus, prom-  
ptus ad obscurorum saporum cognitionem perue-  
nies, & eorum quos ego mediocriter dulces, alij a-  
quosos uocare malunt, qualis est harundinum uiri-  
diū & graminis succus, itē tritici & ordei, & alio-  
rum multorum moderate dulcium. & qualis est a-  
qua qualitatis penitus expers, inter caliditatem ac  
frigiditatem manifestam, mediā quantū eius fieri  
potest constitutionem habens, aut etiam paululum  
ad frigiditatem declinans. Quodd si quid eiusmodi  
sapore præditum, non liquidam sed siccā compa-  
gem habeat, id ipsum necesse est terreum esse, & ci-  
tra mordacitatem siccare. Nominantur autem talia  
Emplastica Græcis, hoc est meatus obducentia, ue-  
lut est amyllum, & plurima ex metallis diligenter  
lota, pompholyx, cerussa, Cadmia, terra Cimolia,  
Samius Aster, & similia. Quædā uero ex ipsis non  
solum terrea, sed etiam aquosa natura sunt, aliqua



etiam aërem non modicum intra se habent, viscosa quidem hæc, & ob id meatus oblinētia. Duplex est enim medicamentorum meatus obducuntur natura. Altera terra exacte & sicca, altera viscosa penitus, uerum mixta ex aqua & terra, & plerunque etiam aëre, uelut oleum dulce. At uero candidū ouī simile quidem quodammodo est, uerum magis terrene quā oleum. Caseolum etiā in lacte meatus obducit, & pinguedo suis. Tauri equidem & hirci pinguedo siue adeps, acris & magis terra quā suis pinguedo est. Anseris autē & galli calidior quidem & siccior quā suum est, sed tenuiū partiū, & nequaquā terra. Itaq; pinguedines si non acrimoniam aliquam habent, meatus obducunt, & magis sicciores, & amplius terræ. Talis est & cera probe lota. Et talia quidem sunt medicamenta Emplastica appellata. Quæ uero adstringunt terra sunt, & crassarum partiū cōpagis sue mole, frigida autē qualitate. At uero Arida tenuiū partiū corporibus sunt, frigida autē similiter ut adstringētia. Quæcūq; autē in sapore terras partes repræsentant, quæ colligatæ & contrahunt & resiccant humediores sensiles linguæ partes, siquidē asperiora sunt, Acerba dicuntur: iminus uero aspera, Austeræ & recte taliū saporum tēperamentū Frigidū dicemus. Quādoquidē autem inæqualiter resiccant, hoc est enim exasperatæ, fuerint utque omnino etiam terrea. Omne enim aquosum æqualiter permeat corpora, & diuulsum rursus facile unitur. Terreum uero diuellitur quidem, non tamen facile rursus coit. Et sanē si sensus proprietatem in utraq; affectione in memoriā reuocaueris, isdem testimonium præbebis. Etenim Acidorum saporū transitus, uelox est in sensibus partibus: Acerborum autem, tardus. Et Acidā per profundum corporū actionem suam magis ostendit, Acerba uero in superficie. Cæterum ubi experiri uoles sinceræ acerbitatis actionē, si quidem eadē res gustanti tibi apparuerit acerba simulq; mordens, hanc speciem me monente relinques, & acerbum absq; mordacitate requires, & quod neq; acidum, neq; dulce, neq; amarum est, sed quātum eius maxime fieri potest, nullam omnino qualitatem & uim adstrictioni permixtam habēs. Superuacuum enim & uanum est, tale pharmaci experiri. Incertū namq; est an ob adstrictionem, siue aliam quādam ei permixtam qualitatem, siue per utraq; circa corpus cui ad motum est, efficax fuerit. Chalcidī igitur & mīsy, aramentū sutorium, & squama æris, sorī, & Armeniacum pictorium, argenti uisum, & innumera alia adstringentia, simulq; mordētia, iuxta utraq; qualitates in singula corpora quibus adhibentur agunt. & tamen impossibile sit docere palam, num per adstrictionem, an per acrimoniam, urendi uim habeant. Nam si intra corpus sumatur talia crassarum partiū existentia, & uiribus magis calida, & propterea temporis progressu in permutatione intra animalis corpus ignescētia, ad cādefactū igne lapidis aut ferri similitudinem excalescant & urunt uētris partes, & neq; distribui in corpus possunt, ob grauitatem. Præstabilius igitur est plura alia consequenter degustare, ac diligenter cōsiderare sinceræ adstrictionem seorsim per se, quāntum eius fieri potest, atq; ubi talē repereris, iam tan-

dem ad iudicandum illud medicamentū iuxta prædictā methodum progredere. Vclut si gustanti tibi balaustium, aut gallam, aut cytinum, aut hypocystidem, aut acaciam, aut rhoem, aut aliud quid eiusmodi, appareat exacte acerbum esse, ita ut palam sit nullam aliam qualitatem habere, in eiusmodi iam expendere ac explorare adstrictionis actionē oportet. Acerbum itaq; corpus terreum est & frigidum. Resoluitur autē necessario tripliciter, aut calefescens, aut humescens, aut utrumque simul perpetens. Si igitur calefat solū, non euadet neq; humidius, neq; mollius, sed durius existens dulcedinem acquireret: quemadmodū quercinæ glandes, & præsertim quæ castaneæ nominantur. Si uero humefcat solum, & humiditas crassarum partiū ac aquosa existat, austerum euadet. Nam acerbū exoluitum, austerū producit saporem. Omnis enim saporis uim aquosa humiditas hebetat. Si uero humiditas tenuium partiū & aërea accedat, Acidū reddetur. Frigiditas enim tenuium partiū existens, acidam qualitatem efficit. At uero si humefcat simulq; calefat, cū aquosa quidem humiditate, in dulcedinem transibit, cum aërea uero in pinguitudinem. Etenim arborum fructus qui natura ita facti dulces nobis apparent, acerbam primum & siccam compagem habent, singuli iuxta arboris suæ naturā, progressu uero temporis sunt quidem humidiores. uerum aliqui aciditatem insuper ad acerbitatem assument, quam paulatim deponentes, rursus dulces euadunt maturitatē adepti. Quidam neq; in arboribus, sed decerpti post tempus aliquod dulcedinem acquirunt. Alij quidam neq; media interueniente aciditate, sed statim ab acerbitate in dulcedinem transiunt, quemadmodum oleæ fructus. Ceterum calore maturi fiunt omnes, qui duplex natura existit: Alter proprius & singularis à natura insitus: Alter forinsecus à sole allatus. Atqui si ab initio quidē acerbiores sunt, maturi autem dulces fiunt, ex caliditate utiq; dulcedo, ex frigiditate aciditas & acerbitas ipsis adest. Et sanē manifestum iam factū est, quod fructus ab initio acerbiores existentes, progressu temporis partim dulcescunt, partim acescunt, partim austeri fiunt: Aliqui uero semper acerbī permanent. Quidam etiā redduntur pingues. Quin & iuxta dictarū qualitatum mixturas, multiplicem habent uarietatem. Acerbi itaq; in finem usq; permanent, illicis, arbuti & corni fructus, & cōsimiles. quoniam frigidi & siccī, uelut ab initio erant, permanent, nullam aliā alterationem præterquam solius augmenti acquirētia. Acerbus autē est simulq; dulcis est, myrti & piri syluestris & glandis fructus. Austerus tantum, uitis amineæ uua, & uinum, & quæ his similia. Austerus simulq; dulcis, palmæ fructus, & uinum Surrentinū, & quæcūq; dulcedinem adstrictione permixtam habent. Dulce autem solum est Theræum & Scybelites, & Sirēū, siue hepsēma quod nos sapaam appellamus, & quæcūq; alia his similia. Pinguis uero exacte tum fructus, tum succus oleæ est: Imo etiam alij omnes ex quibus oleū paratur. Quemadmodum autem acerbus succus progressu tēporis dulcior primum, deinde etiam acrior & amarior euadit, & postremū penitus amarescit. Eodē modo etiā frigidus succus acidior statim fit, & si perfectē perfrigescat, citius adhuc

adhuc accescit: fructus quoque statim inter colligendum multa humiditate repleti, item qui aliter aquam adsumpserunt, promptè ex leuissima occasione acidi fiunt. Si enim uua immatura acida est, matura uero dulcis, & maturū fieri fructibus omnibus ex solari caliditate contingit. Manifestum est imperfectiorem ac frigidiorē, acidū esse, perfectiorem uero & calidiorem, dulcem. Quum igitur uinum ex perfrigeratione aescat, cōspicuum est quod ad eundem rursus redit: saporē, ex quo prodijt, uuæ immaturæ inquā. Distat tamen acetum ab uuæ immaturæ succo uiribus, in eo quod acetum acrimoniam quandā ex putredinosa caliditate adeptum est. Uuæ autem immaturæ succus non habet acquisitiuā caliditatē, & propterea neque acetū acridinem: Vnde etiam magis tenuius parūm est acetū quā uua immaturæ succus, uelut sensus quoque testatur. At uero acrimoniam acetū frigiditatem aciditatis euincere non potest, uerum ad penetrandī celeritatem ipsi inservit. Quanto enim citius meatus penetrat calidum quā frigidū, tanto promptius acris sapor quā acidus sensilium corporum meatus pertransit, ut acris uelut præuius iter fruatur, frigidus uero nō ita longe pōt sequatur. Et propterea sanē sensus mixtus ac ægre explicabilis non permittit pronuntiare, Acetū simpliciter frigidum esse. Percipimus enim in ipso igneam quādam acrimoniam. Verum frigiditas ex sequenti aciditate destruit & exinguit euestigio acrimoniam, quare etiam multo maior sensus frigiditatis quā caliditatis nobis cōtingit. Porro quidam æstatis tempore poscam bibentes palām refrigerātur, & sine sitū permānent. Quādoquidem uero sitis dupliciter fit, altera ex humiditatis inopia, altera caliditatis redundantia: eam quæ ex siccitate oboritur non sanat acetum: eam uero quæ ex caliditate oborta est, sanat. Humectare enim nō potest acetū per se, sed non in genere cōperfrigerat. Igitur neque sitim ex sicca interperie, neque ex calida & sicca obortam, acetum potius unquam sanare potest. Si uero concurrant alia quādo simul humiditas cum caliditate, eiusmodi sanē sitis optima medela acetum erit, aliter sititēbus, tum in febribus ardentibus alijsq; omnibus adurentibus, tū in æstate ac calore uehementi, cōposita affectio est ex caliditate ac siccitate, ut merito cōpositam medelam requirant ex aceto & aqua: Acetū quidem ut non insitrene refrigerās, & paritum tenuitate facile penetrans, Aquā uero ut quæ supra id quod refrigerat, & humidissima omnīū existat. Nihil enim humidius aqua. Cæterum in ardore præcordiorum potior aceto est uuæ immaturæ succus forinsecus impositus, tum quod nullam habeat uolentā & offendentem frigiditatem, tum quod neque permixtam mordacem caliditatem. Qui enim ita affecti sunt, lenimento inuolento opus habent, quod forinsecus nullam mordacem acrimoniam inducat, Uuæ itaque immaturæ succus, non solū acidus est, sed etiam acerbus. Nam ut dictum est, omnes ferē arborū fructus circa primam generationem gustu acerbī sunt. Non autem acidū solum frigidum est, sed etiam acerbum ac austērū. Et si quis aliquando gustauit mala cydonia, aut myrti baccas, aut melspā, is sanē manifestē nouit aliū esse feniculum ab acidis in lingua nostra productum, aliū ab acerbis aut austēris. Acerba enim inus protrudere particulā uidentur, quam ex omni

parte æqualiter contingunt, uelut experientia contingentiæ ac contrahentia. Austera uero in profundum subire uidentur, & asperum quendā ac inæqualem sensum inducere, ita ut respicando omnem sensilium partū humiditatem expellant. Quare alia est affectionum proprietas, nō satis clare explicabilis, & in acerbis, & in austēris saporibus. Sed nō potius tamen hominē esse qui nō ex iam relatis incitatus intelligat quid dicam. Omne igitur corpus acerbum & ab alijs qualitibus purum, omni experimento factū frigidum inueni. Omne autem dulce calidum est, & non immodice superexcellit caliditatē quæ in nobis existit: Sed quemadmodū calidæ aquæ cōstatu delectamur, et maxime ubi fuimus frigefacti, donec corporis partes à frigore congelatæ diffundantur, exalaciat enim nos, & neque dissoluens, neque scindens paritum continuitatē, iucundissima est & utilissima. Sic etiā omne dulce edulium, calidum quidem omnino est, non tamen ad tantam caliditatem peruenit ut offendar, sed intra terminos diffundendi & æquādī demulcedi & ac mollidī manet. Omnia enim alimenta his quæ aluntur natura conuenientia & tota substantia familiaria existūt. Statim autem oportet & moderate calida esse hæc, iuxta corporum quæ aluntur proportionem. Et propterea eduliorum ac medicamentorū non una species omnibus hominibus cōuenit. Vnusquisque enim iuxta propriam substantiam simulq; affectionem, ab utrisque tum utilitatem, tum uoluptatē percipit. Verū quum hæc ita habeant, Edulium sanē minus dulce, minus calidū est: magis dulce, tātō calidius est, quāto dulcius. Si uero modū caliditatis excedat, neque dulce tale est, sed iam amarum apparet, uelut mel inueteratū, & quod diutius cōtum eorum est, & singula alia dulcia. Quæ enim temperamenti corporum quæ aluntur similia sunt, citra cōcturam & preparationē, iam dulcia apparent. Quæ uero dissimilia, omnia inuocanda sunt prius quā præparentur. Opus est autem calida castigare frigiditatem, frigida uero calfacientiū condimentorum mixtura, & igne. Eodē modo per humiditatem emendatūr quæ terrea sunt & sicca, magis quā cōuenit. Siccitate uero quæ plus humida & aquosa. Dulce igitur supra hoc quod calidum magis aut minus existit, necessariū etiam humidum magis aut minus est. Quod uero uelut superassatum amarum euadit, simile caldi & cineri, siccū & calidum necessariū redditur. Et sanē ob id omnia amara extergere solēt, scindere dissilicareq; uiscosos ac crassos humores, quæ admodum cinis & nitrū. Quod autem amarus sapor siccit ac terrei temperamenti est, tum ex eo quod ægerrime omnium amara putrefcunt, tum quod nequaquam uermes & alia animalia gignant, qualia uisdelicet in radicibus & herbis & fructibus putrefcētibz innascenti colligere datur. Nam in humidis corporibus maxime uermes & putredines gignit uedemus. Porro exacte Amara (uoco autem sic quæ nulla alia sensibili qualitate participat) omnia ferme animalia, non homines modō, in cibis auersantur, propterea quod omne animal humidum magis aut minus existat, Amara autē sicca sint ad cineris ac caldis similitudinē. Quemadmodū igitur exacte quidem Dulce nutrit, exacte autem Amarum nō alit: sic quod inter hæc medium est nutrit quidē, sed minus quā dulce. Propinquius autem amaro est sapor sal-

fus, nam & terrei utriq; sunt & calidi, differunt tamē  
 inter se non obscura differentia, quod amarus a cali-  
 ditate & siccitate magis sit attenuatus & elaboratus  
 ac quasi subactus. Sed & in salis generibus sic habet.  
 Quæ enim dura sunt & densiora & magis terrea,  
 qualia fere omnia fossilia existunt, minus calida ac te-  
 nuia partiu sunt. Quæ uero friabilia ac laxa, magis  
 tenuium partiu & uiribus calidiora sunt, & aliqua  
 ex ipsis subamara, mediū quodammodo obtinentia  
 inter salē & spumā nitri. Et si quicquid salum di-  
 stus calfeceris, statim amarum euadet. Atq; sic etiam  
 Asphaltidis stagni aqua, quam mare mortuū appel-  
 lāt, in cauo & calido loco cōtēta, & à sole exsillata,  
 amara redditur: & ob id etiā estate magis quā hye-  
 me amara existit, & si hausa eam in uale cauo ad so-  
 lem exponas tēpore æstiuo, confestim magis amara  
 seipsa facta tibi apparebit. Quare in illa aqua neque  
 animal inuallatur, neq; plāta. Sed & quum flumina  
 magna multumq; piscola in ipsam influant, & præ-  
 sertim id quod prope Hierid, iuntē est, quod Iordanē  
 appellāt, nullus piscis oras fluminis supergreditur:  
 & si quis captos stagno immittat, statim corrumpi  
 ipsos uidēbit: & propterea stagnum mortuum, siue  
 mare mortuū appellāt. Adeo exacte Amarū omni-  
 bus plantis & animalibus inimicū est, squalidumq;  
 ac sicum natura, uelut fuligo ex aduersione factum.  
 De Amarorum igitur saporum uiribus satis dixisse  
 uidemur, dissecorios & extororios ac attenuato-  
 rios ipsos esse declarantes, atq; adeo calidos in tantū,  
 ut nondū urant. Ad Acres tam sermonem conuertam-  
 mus, eosq; primū calidos exacte esse dicamus, deinde  
 erosuos & ustorios, crustiq; inducentes, & colliqua-  
 torios, forinsecus cuti impositos, si uero intra corpus  
 assumantur, qui tota substantia quibuscūq; animalibus  
 aduersantur, eos omnes putrefactorios esse, & insec-  
 torios illorū animalium, uelut cantharis & bupre-  
 stis hominis. Qui uero secundū solius caliditatis ex-  
 cessum, si quidem crassiores sint & terrei, uelut auri-  
 pigmentū & candaracha, ac similia, eos exulcerato-  
 rios internarū partium pronūciamus, si uero tenuiū  
 partiu sint, qualia familiaria nobis semina existunt,  
 daucus uidelicet & anisum, ac similia, urinae cōtes  
 & exudatorios, & simpliciter ac summam loquen-  
 do, seccorios ac discussorios. Conferunt etiā quidam  
 refectionibus ex thorace, & mēstruorum fluxioni-  
 bus. Cæterum acres sapores, non solū forti caliditate  
 ab amaris differre uidētur, sed etiā in eo quod amari  
 omnes non modo calidi sunt, sed etiā siccī ad cineris  
 similitudinē. At uero in acribus, quicq; nō sunt ama-  
 ri, multa aliquando permixta esse humiditas, & pro-  
 pterea nō pauca acria nobis in aborū usum ueniūt.  
 Quando uero iam & de saporibus, quæ dici par erat  
 relata sunt, reliquū utiq; fuerit & de uaporibus dice-  
 re. Pleriq; certe uāpores similiter ut sapores nos affi-  
 ciunt. Nam acida omnia ipsūq; etiā acetū, & ossa-  
 tum & gustum eodē modo excitant. Acria autem,  
 uelut alliu & cepa & consimilia, non minus olfactū  
 quā gustū stimulant & recitāt. Eodem modo & in  
 singulis alijs, similis ferme odoratus ac gustus sensus  
 est, adeo ut quorundā corporum que nunquā gusta-  
 uimus, uelut stercoris, persualum habeamus, nō scire  
 qualitatē. & ob id neq; omnino talium rerū gustū  
 attendamus, quod olfactui ualde multū fidei habea-  
 mus. Quin & odorata edulia quæ cōputrefacta mo-

lestum odorē nobis afferunt, statim abijcimus, ne tē-  
 tato quidē gustu. Et ferme in omnibus mutuo cōspi-  
 rant odoratus & gustus. Ad duas autē appellationes  
 pleraq; odorabilia reducimur, odorata autem fetida no-  
 minātes. Odorata quidē iuxta proportionē dulcium  
 ad linguā, fetida uero non dulcium. Videtur porrō  
 de corporibus non odoratis aut omnino parū quid  
 uaporis defluere, aut multo minus quā pro molis  
 symmetria, uelut in salis & maxime acerbis. Crassa  
 rum enim partiu & frigida est substantia acerbiorū,  
 quare uerisimile est etiā quod defluit ab ipsis, modi-  
 cū esse & crassum, & mole uelut terrē, ut neq; cere-  
 brū sua respiracione petere possit. Quare nihil certi  
 ex odore coniectare licet de ipsorū tēperamento, ue-  
 lut ex gustu. Nam inodora crassarū partium substan-  
 tia habent, sed inde nō manifestū est, quārum calidi-  
 tatis aut frigiditatis possideant. Odorata autē tenuiū  
 partiu aliquo modo sunt & calida, quantitas tamen  
 tenuitatis aut caliditatis, nō etiā ex odore indicatur,  
 sed ex gustu. Quod uero nihil certi de temperamēto  
 indicent odorata, in causa est inæqualitas substantiæ  
 ipsorū. Et propterea in Rosa ex odore coniecturam  
 facere non possumus de omnibus in ipsa qualitati-  
 bus. In gustu uero omnes gustabiliū corporū partes  
 æqualiter linguæ obueniūt, mouentq; singulæ sen-  
 sum iuxta suam ipsarū naturā, nimirum Acerbū in  
 ipsa, quod est terreum & crassarū partiu ac frigidū,  
 item Amarū, quod tenuium partiu est ac frigidū. Et  
 tertium insuper Aquosum, necessariū frigidū: ut nō  
 sit certum, uelut dictum est, de simpliciu pharmaco-  
 rum uiribus omnibus ex odore cōiectare. Amplius  
 uero nihilo magis ex coloribus conijcere possumus,  
 de ijsdē. In singulis enim coloribus inuenitur et ca-  
 lida & frigida, & sicca & humida. Possibile tamen  
 est in singulis generibus aut seminiū, aut radicū, aut  
 succorum, etiā ex colore indicacionē quandā sumere  
 temperamenti. Velut uerbi causa, cepa & scilla &  
 uinum, quanto fuerint albiora, tātō minus sunt calida.  
 subflaua uero & fulua, calidiora. Quin & triticū  
 & cæra, & phaseoli, ac cicer, iridis quoque radix &  
 alphodeli, & multorū aliorum, simile quiddā perpe-  
 titur. In singulis enim generibus in uniuersum que  
 fulua & ruffa & flaua sunt, calidiora albis existunt.  
 Quare si quid etiā inde de medicamētorum uiribus  
 coniectare licet, etiā hoc auctarium habes. Optimum  
 quidē igitur, ut dictum, & sēpe demonstratū est, sin-  
 gulorum uires ab exacto experimēto inuenire, neq;  
 enim in hoc falli potes. Præsequā tamen experimen-  
 to uim cognoscas, gustus multum indicat, cui testis  
 tur paululum etiā ipse odor. Horum autem omnīū,  
 quemadmodum etiam aliorum quorundā utilissi-  
 morum, in summa cōpendium contrahā, postquam  
 sanē speciatim quantū possibile fuit, uniuersales ui-  
 res & uisusculi: actiones explicui. Quandoquidē  
 uero medicamenta partim ex animalibus sunt, par-  
 tim plantæ aut fructus, aut horum succi siue liquores  
 existunt, partim uero ex metallicis sumuntur. Præsta-  
 bilius mihi uisum est de plantis primū disserere, non  
 omnibus scilicet totius terrarū orbis, sed de quibus  
 compertum per experientiam habemus; nam & plu-  
 rimum ipsarum genus prouenit, facultatēq; poten-  
 tissimum habetur (atq; id iuxta ordinem literarum  
 Græcarū) Deinde consequenter etiam de metallicis  
 dicere, atque sic ad animalium partes peruenire.

*Abrotonum.*

*Abrotonum calida & sicca* ut prædicitur est, in tertio ordine & discessu à moderatis locarum, gustu multum amaro, qui sapor indicatus est terreæ substantiæ esse, & à largo calore attenuatus esse, ut nō infrenue calefaciat & siccat. Quare coma huius herbarū cū dī floribus in oleo coquitur, quo illito ante accessionem his qui rigore per circulum repente apprehenduntur, minus rigeant. Eiusdem decoctum potum aut per clysterem infusum, lumbricos occidit amplius quàm absinthium. Modica autem participat acerbitate abrotonum, & ob id stomacho incommodum est. Species habet duas, marem & foeminam.

*Abrotonum usum.*

*Abrotonum usum calidum & siccum* uiribus est, magis quàm cucurbita sicca usita, & anethi radix illa enim ulceribus humidis & sine inflammatione perfectis cōueniunt, & propterea maxime ulceribus præputij pudendi apta uidetur. Abrotoni autem usi cū omnis ulceribus mordax est, quare alopecij confert, oleo cicino, aut raphanino, aut sicyonio, aut lentiscino, aut ueteri dilutus.

*Agnos, vitex.*

Huius arbuti folia, flores & semē tertio ordine calida & sicca sunt, & multū tenuium partū. Fructus in cibo assumitur, caliditq; manifeste, simulq; capitis dolorem infert. Fructus minus caput tenet, sed modicū alimentū corpori sufficit, atq; id siccans ac calcians, minime uero flauosum. Et propterea etiā impetus uenereos inhibet. Vnde non solū in cibo ac potu acceptus ad castimoniam cōferre creditus est, sed etiā substratus. Et ad hepar ac splenem indurata ac obstrata, uicinis semen magis conuenit quàm ruta.

*Agrostis, Gramen.*

*Graminis radix moderate frigida est & sicca,* & ob id cruenta uulnera glutinat, ipsa herba imposita cataplasmatibus uice nō fortiter frige factum, uerum in medio humiditatis ac siccitatis consistit. Mordacitas & partium tenuitas in radice modica est, ut aliquando calculos conterere cognita sit decoctū eius bibentibus. Semen uulgo nascentis debile est: Parnassiacæ autem urinā det, et fluxiones uetris ac stomachi siccatur. Estq; uis ipsius siccatoria, tenuium partium, & subacërba.

*Anchusa quatuor.*

Non eiusdem facultatis omnes *Anchusæ* existit. Quæ enim *Onodea* appellatur adstringente simulq; subamarā abunde radicem habet, ut etiā corpora densare, & moderate attenuare, extergereq; ac abluere biliosos falsosq; humores possit: atq; sic & ictericis & splenicis ac nephreticis utilis existit. Frige facta etiā multum, unde cum polenta in cataplasmate imposita, erysipelatis medetur. Exterget autem non solū pota, sed etiā forinsecus imposita, & ob id uisilignes & lepras sanat cū aceto. Folia huius herbarū debillora radice sunt, non tamen siccandi & adstringēdi uicarent. unde & uentris profluuiū sanant cum uino pota. At uero *Lycopsos* appellata similiter erysipelatis cōducit & radicem habet magis adstringentē quàm *onodea*. *Onochilos* autem quæ etiā *Alcibiadium* appellatur, uim habet magis medicatam, & morsis à uipera multū conduci in cataplasmatibus imposita apertisq; & in cibo sumpta, Quarta parua est & ferè sine nomine, consimilis *Alcibiadio*, uerū plus amara & magis medicata, & propterea ad lumbricos latos

apta, acetabuli mēsurā cū hyssopo & nasturtio pota.

*Agaricum.*

*Agaricum uim habet* calfactoriam & discussoriam & dissecoriam crassorum humorum, & obturationes in uisceribus repurgat, & ob id arquam morbum sanat, in his qui ex hepatis obturatione cū morbum contraxerunt. Prodest & comitiali morbo laborantibus, & rigoribus per circuitum rependibus, qui ex crasis & uiscosis humoribus sunt oborti. Prodest & commotis aut pūctis à bestiis quarum frigidum uenenum existit, forinsecus ad locū affectum impositum, itemq; porum hexagij pondere, hoc est drachmæ unius ex uino. Est & purgatorium.

*Ageraton.*

*Ageraton facultatis est* discussorij, & leniter quodammodo inflammationem arcens.

*Adianton.*

*Adianton siccatur, attenuatur, discutit.* Nam & alopecias densat, & strumas & abscessus discutit, & calculos frangit in potu sumptum, & reiectioibus crassorum ac uiscolorum humorum ex pectore ac pulmone nō parum confert, & fluxiones alui sistit. Medij temperamenti inter caliditatem & frigiditatem existit.

*Aizoon, Semperuium.*

*Semperuium utrunq; & paruum & magnum* modice siccatur, moderate item adstringit. Verū non moderate frige fact: est enim tertij ordinis frige facientium, & propterea ad erysipelata ac herpes, & inflammationes ex fluxionibus conducit.

*Ægilops.*

*Ægilops discutiendi uim habet.* Itaque inflammationes induratas & ægilops ac alopecias mirabiliter sanat.

*Aera, Lolium.*

*Lolium calidit & siccit* effaciter, ut propè ad acrium uim accedat, & magis quàm iris; nō est autem uelut illa tenuium partium, sed ab illa longè præuertitur, & propterea locauerit ipsam quis in principio tertij ordinis calfacientium, & in fine secundi siccantium.

*Ægrios, Populus nigra.*

*Populi nigrae flores calida* ut prædicitur sunt, in tertio discessu à temperatis ordine. In differentia autē siccandi & humectandi paululum à temperatis ad siccitatem populis secessit, & magis tenuium quàm crassorum partium existit. Folia ferè floribus similē uim habent, sed ad omnia debilliora & inefficaciora. Resina etiā similem floribus uim possidet, & est adhuc aliquanto calidior. Semen magis tenuium partium & siccatorium est, quàm resina & flores: calidum autem non adeo ualide.

*Acacia.*

*Acacia tertij ordinis siccantium est,* & secundi frige facientium, si quidem lora fuerit illora enim primi est. Nam quum non sit similariū partium, partes quādam dispersas habet tenues & calidas, quæ ab ipsa per loturam decedunt.

*Acalyphe, siue Cnide, Vrtica.*

*Vrticæ folia* habent multum discussorij facultatis habent, citra uehementem calfactionem. Sanat itaq; panos & parotidas, & crassos ac uiscosos humores ex pectore ac pulmone educunt. Habet autem & flatuosum quiddam, ut etiā imperum ad Venerem excitent, & præsertim semen si cum passo bibatur. Alium subduci moderate, uelut extergendo ac titillando

do, non purgando. Gangraena item & cancrofa, & omnino quae ficari opus est, abique mordacitate conuenienter sanant.

*Acanthus, Melamphyllon, Pæderos.*

*Acanthus*, quem alij *Melamphyllū*, alij *Pæderota* appellant, folia habet difcufforia uim moderate prædita. Radicem uero ficatoriam & tenuium partium.

*Acantha leuce, Spina alba, Leucacantha.*

*Spina alba*, quam aliqui *Leucacantham* uocant, radicem habet ficcantē moderate & adstringentē. Quare & coeliacis & stomachicis prodest, & sanguinis refectionem cohibet, & tumores laxos in cataplasmate rempofita coarctet: item dentium doloribus conducit, si quis decocto eius colluat. Semen tenuium partium & calidum est, unde in potu sumptum conuulſus medetur.

*Acantha Aegyptia, Spina Aegyptia.*

*Spina Aegyptia* ex qua acacia preparatur, adstringēdi ac ficcandi uim habet: quare & fluxui muliebri prodest, & ulcera sedis insufflata ad cicatricem perducit.

*Acorum.*

*Acori* radix tertij ordinis calſcipientium ac ficcantium est, & tenuium partium compagem habet. Ciet itaq; urinas, & splenes iquat induratos. Succus eius deterget & depurgat craſtitudinem corniformis oculorum tunicae.

*Aconitum, Pardalianches.*

*Aconitum*, ſive *pardalianches*, ſimile quidem eſt ſeridi ſylueſtri, uerum putrefactoriam & uenenatam uim habet. Quare uitandum ne in cibo aut potu accipiat. Attamen ad erodendum ac putrefaciendum externas corporis partes, aut circa ſedem utile eſt, & ad hanc rem commodior eſt radix eius. Dicitur herbæ ſuccus, pilorum exortum inhibere.

*Acte, Sambucus, Ebulus, Chamaeciste.*

*Sambucus* magna & arborea, quæ acte appellatur, itemq; humilis & herbacea, quæ *Ebulus* & *Chamaeciste*, ambæ ficcantis facultatis ſunt, glutinatoriaq; ac moderate difcuſſoria. Decoctum radicis in potu hydropicis prodeſt.

*Halimol, ſive Halimylis.*

*Halimi* fructus germina quidā comedunt, & recondita aſſeruant. Vim habet lactis & ſeminis generatiuam. In ſapore ſaliſum quid & adſtringens habet, ex quo manifeſtum ſiſidifimilariū partium eſſe: plurima tamen eius ſubſtitiā pars tepere calida exiſtit, cum humiditate imperfecta ac incoſta, leniterq; flatuofa. Radicis drachma una ex aqua mulla pota, coſuulſa, rupta, ac tormina mitiga, & lac attrahit & auget.

*Aloë.*

*Aloë* tertij ordinis eſt medicamentorum ficcantium, primi autem intensi, aut ſecundi exoluti calſcipientiū. In gultu mediocriter adſtringit, et fortiter amareſcit. Subducit uentrē ex genere eorum medicamentorum exiſtens, quæ ſtercorū educitiua appellantur. Eſt autē medicamentum ſtomacho commodū ſi quod aliud, & ſinus glutinar. Sanat ulcera aegre cicatricē recipiētia, maxime circa ſedē & pudenda, propter uim ficcandi circa mordacitatem: prodeſt etiam inflammationibus earrundem partū aqua diluta, & uulnera glutinabat, iuxta eundem modum. Simili modo conuenit, & ad inflammationes in ore, & naribus atque oculis, & omnino repellere ac diſcutere ſolet, ſimulq; exterget paululum, quantum ſanē puris ulceribus circa

offenſionem commodum exiſtit. Oculis propterea iugi humore madentibus, maxime puerorum, præter opinionem medetur. Debet autem craſſiore modo dilui, & oculorum angulis adhiberi.

*Alyſſon.*

*Alyſſon* aiunt eſſe *Sideritū* heracleum appellatā, quæ iuxta uias naſcitur ubiq; purpureum ſorem habēs, & folia craſſiora. Nomen inuenit ex eo, quod comorſis à cane rabido mirabiliter ſuccurrit. Vim habet moderate ficcantē & difcuſſoriam. Habet etiam quiddam exteroſiorem, quo uitiſſignes & maculas faciei à ſole prouocatas depurgat.

*Aſine.*

*Aſine* ſive *Auricula muris*, herbula ſimilē habet uim helxing frigefacientē ac humectantem. Eſt enim ſubſtantiā eius aquoſa frigida; quare etiam citra adſtrictionem frigefacit. Ideoq; ad ſeruētis inflammationes conducit, & ad medicocria eryſipelata.

*Amaracum.*

*Amaracum* calſcit non ingeneroſe, ſiccatur autem non uehementer. Verum in caliditate eſt tertij ordinis, in ſiccando ſecundi.

*Ambroſia.*

*Ambroſia* pro cataplaſmate impoſita, uim habet adſtringentē & repulſoriam.

*Amnium, Ammi.*

*Amni* ſemen maxime in uſum uenit, calſcictoria & ficcantis facultatis in tertio ordine. Eſt & tenuium partium, & ſapore ſubamarum ac acre, atque adeo urinam ciet, & difcuſſorium eſt.

*Amarantum.*

*Amarantum* uim habet attenuandi ac diſſecandi. Quare menſes ducit coma eius ex uino pota. Grumos etiam ſanguinis liquare creditur, non in uentre modo, ſed & in ueſica, ſi cū uino muſſo bibatur. Omnes autem in uniuerſum fluxiones reſiccant in potu accepta: uerum ſtomacho incommoda eſt.

*Amurca.*

*Amurca* ſecundi ordinis eſt calſcipientium ac ficcantium intensi. Atq; hinc ſanē corporum tepramento ſicciorum ulcera ſanat, reliquorum omnium exacerbat.

*Ampelopraſon, Porrum ſylueſtre.*

*Ampelopraſon* uim inter allium & porrum mediam obtinet. Stomacho magis incommodat quā ſatiū. Viſcoſos quoq; humores amplius eo diſſecat, & organa obturata ab obſtrictione liberat. Quapropter etiam urinas & menſes ſæpe mouit, ubi viſcoſorum & craſſorum humorum culpa fuerunt ſuppreſſa.

*Ampelos leuce.*

*Ampelos leuce*, quæ & *bryonia*, itemq; philothrū appellantur, & *Latinis Vitis alba*, germina habet quæ recens producā omnibus familiarem cibum exhibent uerno tempore, itaq; uim edulſum ſtomacho commodum propter uim adſtringendi. Habent autem ſubamarā & acrem leniter adſtrictionem, quare etiam urinam dent. Radix uero exteroſiora & ficcatoria tenuitūq; partiū facultate prædita eſt, & moderate calida. unde etiam lienes induratos eliquat, ſi in potu accepta, tum forſine ſanus cum ſcibus impoſita. Item ſcabiem & lepras ſanat. Vitis porro nigra, per omnia ei conſimilis eſt, ſed debilior.

*Amygdala.*

*Amygdala* amara attenuatoriam uim palām præ ſe ferunt, ut etiam maculas ſolares depurgent, & ad reſectiones

etiones ex pectore ac pulmone uiscosorum & crassorum humorum plurimum conferant. Sed & obstruções liberant ac depurgant hepar, splenem, colum, ac renes. Laterum item dolorem sedant. Arbor quoque uniuersa similem uim habet, ut eius etiam radices coctas, maculis solaribus in cataplasmatibus modum imponentes, eas depurgent. At uero dulcia amygdala amariora debilia sunt.

#### Ammoniacum.

Ammoniacum molliens intense facultatis est, ut etiam articulorum callosas duritias dissoluat, & lienes induratos sanat, & strumas discutiat.

#### Amomum.

Amomum uiribus acoro simile est, preterquam quod scitius est acorum, magis autem concoctorium est amomum.

#### Anagallis.

Anagallis utraq; & quæ cæruleum, & quæ puniceum florem habet, absterfus uim abunde habet, & præterea subcalidi ac attractorii quippiam, quo etiam aculeos e corpore euellit. Succus ipsarum caput per nares purgat, ob eandem causam, & in summa sic candi uim habent citra mordacitatem, unde & uulnera glutinant, & putrescentibus ulceribus auxiliantur.

#### Andrachne, Portulaca.

Portulaca in frigefaciendo tertij ordinis est, in humiditate secundi. Modicam autem austeritatem complectitur, quapropter fluxiones repellit, maxime biliosas & calidas, earum qualitate transmutans, alterans, & multum frigefaciens. Atque ea gratia etiam æstuosius febribus, ut si quid aliud commodat, super os uentris totaque præcordia imposita. Sed etsi probe teratur, adiecto quo crudo una cum utello ac candido, amixtoque modico rosaceo, aceti que momento, euertigito non uulgarem lenitudinem inducit in ardentibus febribus, si corpus uniuersum inde illinatur, imò penitus extinguit, ut neque amplius ulla exacerbatio contingat. Dentium quoque stuporis medela est. Succus eius similem uim habet, quare non solum foris infusus impoposus, sed etiam in potu sumptus perfrigerat. Quod ipsum contingit etiam, si quis totam herbam in cibo sumat. At uero propter uim subastringendi, etiam dysentericis commodum edulium est, & fluxui muliebri & sanguinis reiectioni: uerum ad hæc omnia multo efficacior est ipsius herbarum succus.

#### Anemone.

Anemone omnes acris & exterioris attractoriaeque ac uenarum oscula aperitis facultatis sunt, unde radix quoque commanfa pituitam prouocat, & succus ex naribus purgat, et cicatrices in oculis attenuat. Quin & sordida ulcera Anemone purgat & lepras remouet, & appositæ menses proleant, & lacustraphunt & augent.

#### Anethum.

Anethum calidum in tantu uirtute secundi ordinis intensius, aut tertij exoluti esse deprehendatur. Verum secundum ordinis principio est inter siccantia, aut primi fine. Si in oleo incoquatur, diffusorium est, & dolores sedat, & somnum inuitat, & crudos ac incoctos tumores concoquit. Vsum tertij ordinem calfacientium ac siccantium obtinet, & propterea ulceribus humidis inspersum prodest, & maxime in pudedo. Nam in præputio etiam inueterata ad cicatricem perducit. Porro uiride humidius est ac minus calidum,

utpote adhuc succulentum, quare magis concoctorium est ac somnificum quam siccum, minus autem diffusorium.

#### Anthemis, Chamæmelum.

Anthemis, quæ & Chamæmelum appellatur, calfacit ac siccant in primo ordine. Est autem tenuium partium, & propterea diffusoria & rarefactiua ac laxatoria uipredita: si quidem igitur fuerit uiridis, in oleo ipsam incoquere oportet, non præterire uidelicet oleo chamæmelino, in quo maceratus flos insolatus est. Si uero siccata fuerit, modico aceto præmadefacta, deinde in oleo cocta, comoda fit his in quibus nondum desit materia ad caput afferri. Nam ea quæ iam adest, discutit, & alteram non attrahit, quæ commoditas nulli alteri medicamento contigit. Nechepson Aegyptius ipsum Chamæmeli floræ purum in summo uigore colligere iubet, & in mortario tundere, ac probe conterere, ac pastillos mediocres fingere, eosque in umbra diligenterissime siccare ac reponere. Vsum autem tepore unum ex ipsis terere, oleo primario quod satis est affuso, indeque uniuersum corpus a capite usque ad pedes illinere, in omnibus febrientibus, ac egrum stragulis cooperitum fouere: sudor enim inquit mouebitur bonus in his qui euasuri sunt, & in febre liberabuntur. Nam in plurimis experimento hoc cognitum est, & in peregrinationibus maxime congruum existit, ob circulerendi facilitatem. Præcipit etiam in potu pastillos exhibere febricitantibus sub æquitate ex aqua calida.

#### Anisum.

Anisi semine maxime in usu est, acere & subamarum existens, ut propè accedat ad caliditatem ustiorum. Est enim in tertio ordine calfacientium ac siccantium: ob id & urinam det, & diffusorium est, & inflatōnes circa uentrem sedat.

#### Aparine, Philanthrophos, Omphacocarpus.

Aparine, quam alij philanthrophon, alij omphacocarpō uocant, moderate extergit ac siccant. Habet etiam quiddam tenuium partium.

#### Apios, Pirus.

Piri solia & ramuli austeri sunt, fructus dulcedinem quandam aquosam habet, ex quibus manifestum fit temperamentum inæquale iuxta partes existens. Quapropter in cibo quidem stomacho commodant, & sitim sedant: uerum in cataplasmatibus imposita pira, siccant & mediocriter frigefaciunt, ut uulnus per ipsa conglutinant uere sciam.

#### Achrades, Pira syluestria.

Quæ uero syluestria pira nominantur magis adstringunt & siccant, & ob id uulnera maiora glutinant, & in cataplasmatibus imposita fluxiones reprimunt, quæ admodum in malorum tractatu absolutissime traduntur.

#### Aristolochia.

Aristolochia radix ad medicinam commodissima est, amara & subacris existens. Rotunda ex his maxime omnium tenui est partium, & ad omnia efficacior iccirco ubi crassus humor sortiter attenuandus est, rotundæ usus experitur, atque inde adeo dolores exoburatione, aut crudorum crassitie obortos curat, & infixa extrahit, & putrefactionibus medetur, & sordida ulcera purgat, & dētes ac gingiuas illustrat. Auxiliatur etiam anhdatoribus & singulientibus comitiis libusque morbis ac podagricis, ex aqua pota, ruptisque ac conuulsis medicamentum, ut si quod aliud, commo dū est. Ex reliquis duabus clematis odoratio est, ut etiam unguentarij eā in ungenta assumat: uerum ad



medendum minus ualet. Longa autem Aristolochia minus tenuiū partium est quam rotunda, non tamen inefficax, sed exterloria ac calidā uim habet, & ob id ulcera incarnat, & ad uteri fatus cōmodior habetur.

#### Aracus.

Aracorum semē simile est cicerculis & usu & uiribus, uerum durius quā cicerculae, & propterea etiā aegrius concoqui potest.

#### Arceuthos, Iuniperus.

Iuniperus calida est & siccā tertij ordinis in utroq; genere. Fructus eius calidus quidem similiter est, sed in primo ordine siccā.

#### Arnoglossum, Plantago.

Arnoglossum frigefacit ac siccā in secūdo ordine. Habet & austeri quippiā, quare fluxionibus & putrefactionibus ulceribusq; malignis conuenit, atq; ea gratia etiā ad dysenterias; nam sanguinis eruptionem compescit, & si quid peristum est frigefacit, & sinus glutinat. Est præterea etiam aliorum ulcerum recentium ac ueterum curatrix. Circa mordacitatē enim siccā, & frigiditatē possidet nondum stupefacientem. Semen eius itemq; radix similem uim habent; uerūm sicciorē & minus frigidā. Et semen quidem tenuissimarū partium est, radices uero crassiorum. Ipsa autē folia siccā, tenusiorum partū uim, sed minus frigidā acquirunt. Propterea radicibus etiā ad dentium dolores utimur, tum commanducantes, tum decocto ipsarum colluentes. Ceterum ad hepatis ac renum obstruētia & radicibus, & folijs, & multo magis semine uidetur.

#### Aron.

Ari radix primi ordinis calfacientium ac siccā uim est. Habet & uim exterloriā, sed non adeo fortiter uelut draconitō. Radices etiā in cibo acceptæ humorum crassitiem moderatē dissēcat, ut etiā ad reiectiones sputorum ex pectore commodet. Verum draconitō in hos usus præstabilius est. Aliis præparatur ac editur eo quo draconitō modo seruata.

#### Artemisia.

Artemisia ambæ calfaciunt in secūdo ordine, siccant autem uel in primo ordine intenso, uel secūdi principio. Sunt autem moderatē quoq; tenuium partū, quare ad renum lapides moderatē conueniunt, & ad uteri fatus.

#### Asarum.

Asari radices in usu sunt, acori radicibus uiribus con-similes, uerū magis intense, quare ex his quæ de acoro diximus, etiā de asaro notionem sumere oportet.

#### Aspalathus.

Aspalathus ex dissimilariibus uiribus constat, acris & adstringentibus. Et acris quidem partibus suis calfacit, austeris uero frigefacit, utriq; siccā, & propterea ad putrefactiones & fluxiones utilis existit. Ad putrefcentes in ore gingiuas in uino cocta utilis colluitur.

#### Asparagus, siue Asphragus iuxta Athenienses.

Asparagus petreus siue Mycanthus, exterloriam uim habet, nec tamen ualide calfacit, nec frigefacit. Idcirco renes & secur obstruētia liberat, maxime radices herbæ ac semen. Et sane etiam dentiū doloribus medetur siccādo circa calfactionem.

#### Aster Atticus, Bubonium.

Aster Atticus, quem alij Bubonium appellant, quod non solum in cataplasmate impositus, sed etiam ad-

alligatus bubonas ac inguinum tumores sanare cre-datur. Habet etiam quid discussorium, ut mixturam uirium sit, uelut rosa, sed bubonium non ita adstringit.

#### Astaphis, Vua passa, Carice.

Vua passa satua concoctoria simulq; adstringentē & moderatē discussoriā uim habet: eadē enim est ratio uuarū passerum ad uuas, quæ est caricarū ad ficus. Et dulciores quidē calidiores sunt: Austeriores uero frigidiore, & adhuc magis acerbæ. Stomachum itaq; roborant austeræ, & aluū adstringunt, atq; his amplius etiam acerbæ. Medium uero statum inter has dulces tenent, neque palam exoluerite stomachum, neq; alium subducētes. Vim tamen contemperant di humores semper habent dulces, itemq; moderatē extergendi, unde paruos circa os uentriculi morsus obdunt. Nam maiores morsus generosioribus moribus opus habent. Præstant uuæ passæ pinguis-simæ & tenui cortice præditæ. Ceterum uuæ passæ minus quā caricæ aluū subducunt ac extergunt: uerum stomacho commodiores quā caricæ existūt.

#### Staphis agria.

Staphis agria ualde acrem uim habet, ut fortiter pituitam de capite trahat ac extergeat. Quare & ad scabiē confert: Et uistoria quadam ui participat.

#### Asphodelus.

Asphodeli radix in usu est, uelut ari, & asari, ac draconitij. Vim habet exterloriam ac discussoriam. Vnde in uino albo uetere cocta, & uino calido meraco diatri mensura hausto, menses suppressos celeritē ciet. Vitz cinis calidior & siccantior, magisq; tenuium partium ac discussoriorum euadit, & ob id etiam alopecias sanat.

#### Atractylis, Cnicus syluestris.

Atractylis, siue Cnicus syluestris, uel Androsæmon, ut alij uocant, ex spinosarum plantarū genere est, & siccant ac moderatē calidæ facultatis existit.

#### Atrophaxis, Atriplex.

Atriplex secūdi ordinis est humectantium, primi frigefacitū, adstrictiōis nihil habet, sed aquosa est uelut malua, & facili uentrem permeat. Hortensium genus humectius & frigidius syluestri est: Quapropter inflammationibus ac furunculis incipientibus & augescētib; hortenses, uigentibus & declinātib; syluestres commodiores sunt. Semen exterloriā uim habet, unde ad morbum regium ex iecoris obstruētia obortum utile existit.

#### Asinthium.

Asinthium calidum est primo ordine, siccum tertio. Succus eius multo calidior quā herba est, participat & adstringendi ui non obscura, maxime Ponticum, quare extergit, roborat, siccā, & propterea biliosos uentriculi humores ad infernam excretionem deducit, & per urinas euacuat. Magis autē biliosum intra uenas humorem per urinas expurgat. Idcirco ubi pituita in uentre continetur, nihil concludit. Sic etiam si eadem circa pectus aut pulmonem hæreat. Adstrictoria enim facultas in ipso fortior est quā amara. Quoniam uero acrimoniam quandam possidet, calidum amplius quā frigidum existit.

#### Balanos myrpicæ, Glans unguentaria, Myrobalanum.

Glans unguentaria quæ myrpicæ balanos, & myrobalanon appellatur, exterloriam & incisoriam uim habet.

habet cum aliqua adstrictione, & propterea extensoriam ac adstringentē contrahentemq; ac coactoriam habet actionem, quapropter & ad uaros & lentiginēs, maculasq; solares, prurium, lepram, scabiem, achoras & manantia capitis ulcera, & ulcero-fasq; papularum eruptiones, & omnia crassi succi uitia conueniens est, maxime cum aceto. Cicatrices etiā illustrat. Facit quoq; ad hepar induratum in cataplasmate imposita, & lienē consumit, praesertim si farina aliqua siccatoria ipsi commisceatur, uelut est Ioliacea ac eruina. At uero cortex ualde efficax est, ut eius usus ubi uehementi adstrictione opus est requiratur. Si uero quis carnis eius drachmam unam bibat cum aqua mulla, facillē uomet. Saepē & per inferna aluū largē subducit. Vnde si hepar aut splenem purgare uoluērīmus per huius medicamentū usum, in postea ipsum exhibemus. Stomacho enim incommodat. Verum aceto gaudet tum forinsecus impositum, tum per os acceptum.

*Balanos siue Glans quercina.*

De quercina glande in quercus tractatu commode dicemus.

*Balsamum.*

Balsamum calfacit & siccac secundo ordine, est & tenuum partium. Liqueor eius adhuc magis tenuium partium uim habet, non tamen adeo calidus est, uelut quidā opinantur per partium subtilitatem decepti. Fructus eius consimilem iuxta genus facultatem obtinet, sed partium tenuitate ab illis praeruitur.

*Balaustium, Cytinus.*

Balaustium sylvestris mali punice flos est, uelut satiuæ Cytinus, gustum autem fortiter adstringit, & sanē siccandis ac frigefaciendis facultatis est: quare si intertriginibus ac alijs ulceribus ipsum aridum tenuissimē tritum insperferis, citissimē uidebis ipsa cicatricem recipere citra mordacitatem. Iccirco nō est medicus quispiam qui non hoc pharmaco & in his qui sanguinem reieciunt, ac dysentericis, uentrisq; ac uteri fluxionibus utatur.

*Batos, Rubus.*

Rubi folia maxime tenera iteq; germina mediocriter adstringunt, ut communia oris ulcera cum alia, tum quæ aphthæ appellantur, curent. Imo & uulnera glutinent. Fructus maturus moderatam quandā caliditatem habet. Immaturus frigidam terræ substantiam possidet, & propterea acerbus & ualde siccatorius est. Siccatus autem reponi solet, & humido magis siccatorius euadit. Flos eandem uim quam fructus immaturus habet. Itaq; ad dysenterias & uentris fluxiones ac debilitatem, & sanguinis sputum cōmodus est. Radix supra uim adstringendi, etiam tenuium partium substantiam habet, quare renum lapides atterit.

*Batrachion, Ranunculus.*

Batrachium quatuor specialēs differentias habet, omnes autē fortiter acrem uim possident, ut cū dolore exulcerent. Quare si quis moderatē utatur, scabies ac lepras excoriant, ungues item leprosos remouent, & stigmata siue notas incussas discutit & uerrucas ac myrmecias ex earū gente distas, auferunt. Quin & alopecij profunt modico tempore impositæ. Nam si diutius sinantur, non solum excoriant, sed etiam crustam cui inurunt, atque hæc quidem folia uiridia unā cū cauliculis imposita faciunt. Radix

autem siccata sternutatorium est medicamentum, quomodo omnia alia fortiter siccantia. Sed & dentium dolores mitigat, simulq; ipsos confringit.

*Bellidum.*

Bellidum Scythicum appellatum quod et nigrius & resinosis est, mollietē abunde & efficacē uim habet. Alterum Arabicū, quod etiā pellucidius est, magis siccac quāmolli. Vvuntur aliqui his, & maxime Arabico, ad ramices gutturis achernias aquosas, bronchocelas & hydrocelas Græci appellant, ieiuni hominis salua ad emplastri compagem redigētes. Arabicum etiā calculos renū atterere uidetur, urinasq; dere in potu acceptum. Sed & crudorum flauum insultus, & laterum dolores, ac rupta sanat.

*Blitum.*

Blitum olus est cibarium, temperamento humidum ac frigidum in secundo ordine locatum.

*Bulbus.*

Bulbus comestis frigidioris & crassioris uiscosiorisq; humoris genitor est: nam & agrē concoquitur, & inflat, ac uenerem stimulat. In cataplasmate impositus glutinat & siccac. At uero qui uomitorius Bulbus dicitur, multo calidius temperamentū quāmpredictus habet.

*Buglossum.*

Buglossum humidum & calidum temperamento habet, unde uino infectum lætissimū facere potantibus uidetur. Conducit & tussentibus propter gutturis asperitatem, in aqua mulla decoctum.

*Bupthalthmon.*

Bupthalthmon appellatum uidetur a floribus, qui figura oculi bouis similitudinem referunt. Nam colore chamæmeli floribus quāmsimilimi existunt. Multo autē maiores ipsi sunt, & acriores, & propterea magis discussorii sunt, usque adeo ut etiam duritias sanent ad ceratum permixti.

*Bunion, Arction, Pseudobunion.*

Bunion quod quidā Arction appellant, calfactorij generis in tantum est, ut urina deat, & menses ducat. Sed & Pseudobunion similiter ipsi calidum est.

*Brathy, Herba Sabina.*

Herba Sabina calefacit & siccac tertio ordine: est autē tenuium partium, & propterea discussoria, & menstruum ductrix si quid aliud, & per urinas sanguinē trahit, & uiuēs fetus perimit, ac immortuos eiā cit. Cōuenit putrefactis maxime malignis & inueteratis. Nā quæ diu durauere citra molestiā pharmacia uim tolerat. Quin & denigrata ac ualde sordida, cū melle expurgat, & carbunculos destruit. Quidā etiam duplum ipsius pro cinamomo coniungunt.

*Britannica.*

Britannicæ folia adstringunt, & uulnera glutinant, suntq; similia folijs sylvestris rumicis, præterquam quod nigriora & hirsutiora existūt. Succus foliorū similiter adstringit, quæ quidā coctū ipsum reponunt, ut pharmacū ad putredines oris efficacissimū.

*Bromus, Avena.*

Bromos paulo frigidiore temperamento præditus est, & adstrictionis nonnihil habet, ut etiā uentris profluuijs commode.

*Bryon Thalassion, Muscus marinus.*

Muscus marinus adstringit et frigefacit, unde in cataplasmatibus uicem impositus, ea quæ calida sunt manifestē perfrigerat, ac iuuat.

Bryon

*Bryon, Muscus arborum, Splanchnon, Hypnon.*  
Muscus arborum qui Bryon & Splanchnon ac Hypnon Græcis appellatur, adstringit & frigefacit moderate, ut prope ad temperata accedat. Quare & discutienti ac emolliēdi facultatis particeps est, maxime qui in cedrinis lignis reperitur.

*Bryonia.*

Dictum est de Bryonia, quum de uite alba nobis sermo esset.

*Bubonium, siue Aster Atticus.*

De Bubonio dictū est in secūdo appellatiōis elemēto.

*Geniana.*

Geniana radix efficax est, ubi opus est attenuare & depurgare, extergereq; ac ab obstructionibus liberare.

*Gigarta, Vinacea.*

Vinacea sicca sunt in secundo ordine, frigida in primo. Acerba autem gustu sunt, proptereaq; fluxidus uentris affectionibus plurimum profunt.

*Gingidium.*

Gingidiū ut gustu amaritudinis & ad strictionis particeps est, ita temperamento caliditatis & frigiditatis, iuxta utranq; autē qualitate siccatorum est, imō etiam stomacho ualde commodum, ob adstrictionis non modice participationem. Euidit autē multo magis stomacho commodū, seruēscitū & ex aceto comestum. Caliditatem itaq; non ualde manifestam obtinet, uerum in secundo ordine siccatur.

*Glaucium.*

Glaucium adstringit cum quadam iucunditate, sed & frigefacit manifeste, adeo ut erysipelata nō adeo fortia sanet.

*Glechon, Pulegium.*

Pulegium calfacit & attenuat uehemēter, unde humoribus crassis ac uiscosis ex pectore ac pulmone reiectandis facilem uiam facit. Menfes ciet cum uino albo coctum, ita ut uinum ipsum meracum bibatur. Forinsecus cataplasmatibus modo impositum, tum ischiadicis, tum alios perfrigeratos rubificat.

*Glaos, Sordes balnearum.*

Sordes balnearum moderate emollit.

*Glycyrrhizon, Radix dulcis.*

Glycyrrhizi fructus radicū succus maxime in usum uenit, dulcis existens cū modica quadā adstrictione, quapropter asperitates lenit nō solum arteriarū, sed etiā scabiōse uesciæ. Quandoquidē uero omne dulce moderate, etiam humido temperamento prædium est, pro eius sanæ ratione, siquē quoq; eximit.

*Glycysside, Pæonia, Pentorobos, Ephialtia.*

Glycyssiden etiā pæonia, & pentorobos, & ephialtiā nominant. Radix eius tenuiū partium & siccatoria ac mediocriter calida est: habet enim uim adstringentem leniorem, cū aliqua dulcedine. Quod si quis eam diutius mandet, etiā acrimoniā subamarā percipiet, scilicet sanē & mēses mouet, magnitudine amygdali consua cū aqua mulla pota. Expurgat quoq; iecur obstruātū, lienemq; ac renes. Per adstrictionem autē fluxiones uētris sistit, in uino quopiā austero-rum generis cocta, & uino potio. In summa rescicādi uim fortiter possidet, ut non improbauerim id quod a multis rationabiliter creditū est, eā uidelicet etiā adalligatā puerorū morbu comitale sanare. Aliquando enim puerulo octimestri comitali apprehenso, magnā radicis recentis partē de collo sus-

pēdimus, iussione facta ut perpetuō eā cōtineret appetensam, & de cetero ex hoc facto puer pfectē sanus euasit, neq; amplius apprehensus aut conuulsus est.

*Gnaphalium.*

Gnaphalium adstringentis moderate facultatis est, & propterea dysentericis ipsum cum uino aliquo austero potandum exhibent.

*Gongylis, Rapum.*

Rapi semen ad rē uenere stimulos addit, statu osi spiritus generatiui existens, sic & radix ægrè concoctilis, & statuosa, ac seminis gignitiua est, succū autē in corpus distribuit crassiore. Quare si quis in nimio eius esu perduret, & maxime si ipsam nō probe in uentriculo concoquat, humorē crudum appellatum congregabit, si uero crudior in coctura maneat, ægrè cōcoctilis & statuosa & stomacho incōmoda existit, quandoq; etiam morfus circa uentrē excitat: melior autē fit si bis coquatur, multa enim coctura opus habet. Porro ad uentris deiectionem neque conducit, neque officit.

*Δ Damasonium, Alisma.*

Damasonium etiā Alisma appellatur. Eius radicem experit sumus coctā in aqua, & aqua pota, calculos in renibus consistentes ac coactos confringere.

*Daucus, Pastinaca, Staphylinus.*

Daucus quē & staphylinum ac pastinacam appellat, duorum generū est. Alter syluestris minus comestilis quam satiuus, uerū in omnibus uehemētor. Satiū autē in cibi usum aptus est, sed aliās imbecillior existit, facultatē habent acrem & calfactoriam, & propterea etiā attenuatoria. Radix itaq; possidet etiam statulentum quippiā, & ob id Veneris sitimulatium. Semen satiuū quidē habet item aliquid in se uenerem stimulan, sed syluestris omnis status expers est, quare & urinam ciet, & mēses mouet.

*Daphne, Laurus.*

Lauri arboris folia & fructus siccāt & calfaciunt uehementer, & magis ipse fructus. Cortex radicis minus quidem acris & calidus est, magis uero amarus, & aliquid adstrictionis habens. Ictico & lapideis arteriis & hepaticis conducit. Bibitur in uino odorato pondere obolorum trium.

*Dictamnus, Pseudodictamnus.*

Dictamnus magis tenuium partium est quàm pulegium, in cæteris ipsi cōsimile. Quod uero Pseudodictamnus dicitur, debilius est.

*Dipsacos, Labrum Veneris.*

Dipsaci radix secundi ordinis est siccantium. Habet etiam quid extersorium.

*Dorycnion.*

Dorycnium temperamento simile est papaueri & mandragoræ, & alijs eodem modo frigefacientibus, parum itaq; ex eo somprū soporem inducit, amplius occidit.

*Dolichi, Lobi, Smilax hortensis, Phaeoli.*

Qui nūc ab omnibus Lobi nominantur, apud omnes ueteres dolichi & phaeoli appellabātur, & ab alijs quibus smilax hortensis, nuriunt quidem non minus quā pisa, cōsimiliterq; status expertes sunt, uerum iucunditate & in alui deiectione illis cedūt. Appellantur autem Lobi, hoc est, siliquæ præ alijs præcipue, quoniam ex omni siliquarū genere quē indumento intectæ sunt, hæc solæ unā cum siliquis siue regumētis suis ut plurimum comeduntur.

• Dracon

*Dracontion.*

*Dracontion* acrius est quàm *Aron*, & amarius, & magis caloricum ac tenuium partium. Habet autem quandam breuem adstringendi uim, cum acrimonia & amaritudine permixtam, ut uel inde efficacissimum pharmacum existat. Nam radix uiscera & omnes crassos ac uiscosos humores expurgat, & malignorum ulcerum optimum medicamentum est. Depurgatq; ac extergit generose cū alia extersione indigentia, cum uiliginis cum aceto. folia autem ulceribus & uulneribus recētib; cōueniunt, quantūq; minus fuerint sicca, tanto magis glutināt. Quæ enim sicciora sunt, acriora quàm uulneribus conueniunt existunt. Creditur etiā casum à putredine alleruare forinsecus ipsi circumpositum. Semē autem rare dice fortius, cācros & polypos cōsumere creditur. Succus seminis oculorum albugines deterit.

*Drys, Quercus.*

Vniuersæ quercus partes adstringentis qualitatis particeps sunt. Amplius autem omnibus membranula quæ sub cortice trunci reperitur, & quæ sub cortice glandis super fructus carnem inducitur. Et quare & ad fluxum muliebrem, spuatq; sanguinis ac dysenterias & uentris fluxiones diuturnas, uilis esse creditur. Vtuntur autem ipsa decocta. Vehementius adhuc adstringit phagus & ilex. Cæterū folia ex omni quercus genere pro cataplasmate imposita, uulnera recētia glutināt, quæadmodum ego ruri expertus sum. Glandes quercinæ comestæ alimentum quidem abunde corpori suppeditat. Sed tardi transitus est id ipsum, & crassum ac ægre concoctile. Ex omni glandium genere optimæ sunt *Castanæ*, quæ & *Lopima* appellantur. Solæ enim ex syluestrium fructuum genere, memorabile alimentum corpori sufficiunt. Sunt tamen etiā ipse capitū graues, utpote dolorem eius inducentes, sed multo magis his supradictæ.

*E. Eibiscus, Althea.*

*Eibiscus* malua syluestris, est disculterior, laxatoria, inflammationem arcens, mitigatoria & concoctoria crudorū panorū ac tuberculorū. Radix eius itemq; semen, reliqua similiter faciunt uelut herba. Verum facultatem magis tenuium partium, ampliusq; siccatōriam & exterioriam ex se ostendunt, adeo ut etiā uiliginēs deterant, & semen calculos rheum confringat. Decoctum radidis & ad dysenteriam & alui profluuium, & sanguinis reiectionem utile est, ut quæ uim quandam adstringentem habet.

*Ebenus.*

*Ebenus* lignū est ex eorum numero quæ in succū resoluuntur, uim habet calfactoriā, exterioriam, ac tenuium partium. Vnde & ea quæ pupillis tenebras offundunt uitia, extergere creditur, & in alias oculares compositiones ammisceat, quæ uidelicet ad uetera, & fluxiones, ac pustulas conueniunt.

*Elea, Olea.*

*Olea* germina tantū frigiditatis, quantū adstrictionis habent; fructus exacte maturus moderate calidus est, immaturus adstringētiōr est, & frigidior. Oliuæ drupæ pinguem succum habent, & modicū alimentum corpori præbent. Colymbades uero mūrariæ innatantes, adstringentem succum habēt, & stomachum corroborant, appetentiamq; cibi excitant, & ad hoc commodissime sunt quæ cum aceto sunt

asseruata. Ex his enim quæ ex æquo salubria sunt, id quod iucundius est facilius concoquitur.

*Eleon, Oleum.*

*Oleum* ex oleæ fructu expressum, quod etiā propriissime oleū appellatur, humectans & moderate calidum est. Tale est dulcissimū ex oliuæ maxime drupæ factū, quale est fabinum. Est autem calidum moderate mediū temperatū, & magis discussorium quàm quod ex crudis oliuis expressum est, quod omotribes & omphacinū appellatur. Nam hoc ita to frigidius est, quanto plus adstrictionis habet. *Oleum* autem uetus, si quidem ex dulci oliuæ factum uetustate contraxit, calidius est & magis discussorium. Si uero ex cruda, quousq; sanè aliquid adstrictiōis seruauerit, mixtæ facultatis existit. Vbi uero adstrictionem penitus abiecerit, alteri assimilatur. *Lucernariū* autem à medio ac tēperato, dulci inquam, in tantū ad calidiōrē qualitatem progreditur, quā tum omphacinum ad frigidiorē. Vtuntur omphacino, capite calidiore factō. Dulci, sicciore factō & circūtenso. *Lucernario*, eodem frige factō. Manifestum est autem quod omphacinum, aliquid quoque frigidum adhibere oportet, reliqua semper calida. Atq; hic quidē usus ad caput est. Cæterū si ueniensum corpori præter naturam siccus reddatur, dulce oleum commodissime illinitur. Sed & si defatum sit ex adstrictione, aut frigiditate, aut mordacitate, aut acris pharmacis, aut humore, aut etiam pruritu, idem oleum omnium aptissimū est, maxime cum exercitationibus aut etiam post exercitā. At uero stomacho & iccori inflammatis maxime congruit omphacinum irrigatum, ob adstringendi facultatem. Reliquis paribus dulce magis prodest.

*Oleum Cicinum.*

*Oleum Cicinum* in Aegypto paratur, ex ricini arboris semine, quod croton appellatur, sicut arbor ipsa cici, uiso & expresso, & oleo ex aqua calida electo. Est autem tenuium partium ac discussorium, uelut oleum uetus. Exerit uiliginēs, maculas solares, lentiginēs, assiduū illitū. Consumile raphanino est, quo etiam uis licet, cicino aut uetere non præsentē.

*Oleum seminis Lini.*

Sed & ex lini semine oleū preparatur, quomodo prædictū est. Et usus eius iam est pro cicino. Nam cicinon nō amplius assertur, sed hoc pro ipso assertunt.

*Oleum Raphaninum.*

*Raphaninum* oleum in reliquis simile cicino est, uerum calidius.

*Oleum Populi nigra.*

*Oleum* ex nigra populo in estate paratur, quum multa circa semen est refina. Sumunt itaque eius grana modicēq; confringunt, & ad podere expensum inde trientem, olei dulcis sextarium immittunt, & ad dies quadraginta insolant, atq; ita excolatum repōnunt. Est hoc oleum calfactorium, tenuium partium, mollitorium, cum odore iucundo.

*Oleum Amygdalinum.*

*Amygdalinum* oleum ex amygdalis amaris fit, estq; tenuium partium, & calidius dulci uno gradu. Cōuenit maxime auribus à crasis flatibus oburatis, & ad auditus grauitatē, & sonitui ex frigiditate. Verum quocq; aurium enecat. Experiētia enim nos docuit ipsum auribus maxime prodelle, reliquarum partium

partium comparatione.

*Oleum nucum.*

Nucis oleum similiter ut amygdalinum preparatur, nucibus aut tuis & expressis, aut post contusionē in aquam feruentē coniectis. Commodū est in colicis quoque usus: Insuperque hoc priuatim habet, quod inaurantibus aut inurentibus conducit: Siccat enim & ad multum tempus inaurationes ac inustiones continet & adseruat.

*Oleum Myrobalaninum.*

Oleum ex myrobalanis uim habet depurgandi maculas faciei, lentiginis, uaros, & omnem nigredinem. Sed & aluum purgat, prodest & aurium dolori, & ad sonitum, cum adipe anserino infillatum. Præparatur ut amygdalinum, glande unguetaria molita.

*Oleum Laurinum.*

Laurinum ex bacca lauri fit, quo modo iam dictum est. At uero mixtum hoc modo præparatur. Ad sextarios quinque oliuarum maturarum, baccarum lauri pinguium & recētiū sextarium unum adiungimus, atque ita omnia simul conteruntur ac exprimentur, uelut oleum aliis ex oliuis solet. Calidū ualde est & mollitorium quod purum ex solis lauri baccis factum est, quare uehementē perfrigeratis quadam corporis parte conducit. Multum quoque ficcat, & propterea scabrosus, & asperæ cuti, impetiginibusque asperis, in balneo illitum medetur. fuscigendum est autem in imperigine inflammata, aut scabie inflammata, & in temperaturis calidis ac biliosis. Humidis autem & pituitosis conuenit, & omnibus articulis à frigore infestatis. Est & ischiadicis ex coxendicibus laborantibus commodum. Occidit uermes & pediculos tum feros, tum mansuetos, itemque lendes ac furfures capitis, & ophiāses ac alopecias. Vtus est in balneo ieiunij, ita ut postea cū ouo ac melle & fœni graeci farina detergeatur. Cauiendum ne capiti calido adhibeatur.

*Oleum Sesaminum.*

Sesaminum oleum ex sesamo fit cōtrito & in aquam infuso. Viribus non longe abest ab oleo dulci. Caliditate enim moderatam habet, & saporē omnino leuiter adstringentem: aptum est cibis, nam & saporis iucundus est, & facile concoquitur, & aluum subducit. forinsecus illitū uim obstructoriam meatui habet, propter crassitudinem. Cæterum ad præparationem oleorum quæ odoris gratia fiunt, aptius est quàm oleum commune, propter durabilitatem, & quod non facile putrescat.

*Oleum Lentiscinum.*

Et hoc ex lentisci fructu præparatur eo quo in alijs dictum est modo. Paratur etiam uelut in laurino dictum, fructu lentisci oliuis permixto. Vile est purum & immixtum ori ex fluxionibus infestato, & gingiuis inflāmaris, calidum in ore detentum, tum in balneo, tum circa balneum, repellit enim & roborat circa exasperationem. Mixtum autem magis mitigat, simulque robur conseruat: Quare in icteris ac stomachi totus ac ragationes commodè assumitur,

*Oleum Oenanthinum.*

Oenathinum eadem efficacia est cum melino & rosaceo, præterquam quod aluum non mollit. Compositum hoc modo. Oenanthen, hoc est uitis syluestris fructum florentem, accipe odoram & marcescere

sine, ac in nouū uas unā cum omphacino oleo mittere, & ad dies .xl. quotidie agita. ac excolato utere. Sit oenanthes sextans, olei sextarius unus.

*Oleum Melinum.*

Melinum paratur ex malis cydonijs, fit etiam ex alijs malis, corium habentibus acerbius & odorarius, hoc modo. Adimitur pediculus ad exortum, & sefrusta ad fundum, & pars interior unā cum feminis granis, deinde secantur mala unā, cum adhærere cuticula. Nā in ipsa & odoris gratia, & adstringendū uis cōiunetur, fiunt autem parua frusta, quorū quadrans in olei omphacini sextarium iniicitur, & infolata ad dies .xl. reponitur. Vis melini olei magis ad frigiditatem nurat, non tamē ualde, propter maiori uinositatem. Adstringit autem multū, uelut lentiscinum. Magis uero stomacho familiare est, propterea quod ex duplici materia nutritiua componatur, olei uidelicet ac mali. Quare consequens est ipsum stomacho inflammato ac debili competere, irrigatum, & in epithematis impositum, ac potum. Commodius est rosaceo, propter maiori familiaritatem. Nam stomacho robur addit, & infitos in uentriculo acres humores uehementius propellit. Iniicitur etiam per sedem, quibus colume & crassa intestina ab acribile uexantur. Cauendum est eius usus in affectionibus frigidis. In his enim magis conuenit, si absinthium habuerit simul incoctum.

*Oleum Rosaceum.*

Rosaceum oleum sic præparatur. Accipitur floris rosarum rubrarum exunguium, & per diem ac noctem siccatarum quadrās, olei omphacini sextarius unus: Rosi iniectionis, os uasis occludere oportet, intrinsecus lineolo, forinsecus pellicula, propter imbres repetētes, & infolare ad dies .xl. atque ita excolauum reponere, uasis super tabulas locatis in domo temperata. Quidam alia quedā rosas adiungunt. Verum optima est præparatio ex solis rosis & oleo constans. Alij non infolant, sed uas in pureum aquæ frigidæ ad dies .xl. suspendunt. Conducit capiti calfacto ex sole, aut febribus, aut alia quadam eiusmodi causa, humectat enim & midgat, ac foemnum inducit. Et in febribus ex calfactis uisceribus, conuenit ceratum ex ipso paratum, lotum ex frigida aqua, in æstiate sæpe alterata, ita ut ceratum hoc uisceribus imponatur. Præparatur autem hoc modo. Accipitur ceræ unda una, rosacei quadrans: Cera liquefit cum modico rosaceo in duplici uase, & in aquam diffunditur, & manibus emollitur per aquam eluta, mox rursus, ac tertio liquatur, diffunditur, aquaque eluitur: Deinde reliquum rosacei additur, liquatur, tollitur, agitur, frigit, & in mortarium inditur ac teritur, & aquæ quantum expeclerit infillatur, mox sublatum medicamentum in frigidam subinde permutatam reponitur. Si uero pro aqua acetum infillaueris in mortario ad ceratum, optimum medicamentum efficies ad erysipelata, carbunculos & herpetas. Habetur etiam hoc ceratum Sermone quinto, capite nonagesimo primo. Quin & potum optimum rosaceum cū aqua calida aut frigida, magnam utilitatem de se præbet his quibus stomachus ex acribile, aut libricis, aut ascaridibus infestatur. Verum ad lumbricos maxime puerorum, melius facit sapē permixtum & potum

ponum, ita ut sapa ex uino coctura ad tertias redacto sit præparata. Celerrime enim ipsos expellit. Infunditur etiam colo uexaro ex prædictis causis. Cauendum usus eius est his, qui non multam caliditatem habent, & quorum corpus superfluis excrementis redundat.

#### *Oleum Chamæmelinum.*

Chamæmelinum oleum sic præparatur. Olei dulcis sextarius Italicus unus, florum chamæmeli diem unum præficatorum sextans, in uas mittitur, cuius osculum raro linteolo integitur, quo perspirationem habeat oleum, & sic per dies x. insolat. Etenim si non perficitur ac transpiret chamæmelinum oleum, odorem garo similem acquirit. Post insolationem seruare ipsum oportet excolatum, uase locato in tabulis in domo temperata. Vfus eius est ad caput mediocriter densatum ac dolens ex febribus non ualde ardentibus. Rarefacit enim meatus, & uapores discutit, ac acrimoniae contemperat, & in summa magis mitigatorium est quam rosaceum, in febribus non ualde calidis.

#### *Oleum Anethinum.*

Anethinum ex anethi coma fit adhuc uiride, prius quam semine solidum reddatur & acre, inutile enim ad usum hunc fit floribus abiectis: Resecare autem mollitia tantum germina, & uncia unius pondere expensâ, ad sextarium Italicum unum olei dulcis injicere oportet, & osculum uasis probe obturare, & diebus x. insolare. Calidius hoc est quam chamæmelinum. Itaque fatigatis in hyeme commode adhibetur, mollit enim & humectat. Utendum est eo & in febrilibus leniter ad pituita, & omnino ægrotantibus ex causis frigidis, maxime circa tendines ac musculos conuenit.

#### *Oleum Liliorum, Lilaceum, Susinum, Lirinon.*

Lilaceum siue Susinum, aut Lirinon oleum, fit ex albis lilij folijs exunguib; & solum insectis, circa ipsorum croceum filamentum, ad sextarium Italicum olei dulcissimi, pondere sextantis. Siccare autem etiam hæc oportet in umbra per diem ac noctem: Deinde uasi injicere, & diligenter obturata insolare per triduum: Deinde excolare, & alium sextantem solum immittere, prioribus uidelicet uelut inutilibus eiectis. Ternis enim alteratōibus folia injicere expedit, quare ubi rursus per triduum insolaueris, rursusque excolaueris, tertium sextantem liliorum immittes, similiterque per triduum insolabis, & sic excolatum in umbra repones. Si quis enim mox à principio sexuncem solum immittat, putrefacta oleum fecundum reddent. Commodum est affectionibus mulieribus. Solut enim duritias, & morsus ex acrimonia obundit, & robur utero addit. In Suis testimonia præbent ipsi, quod prægnantibus facilem partum faciat. Sed & alijs illitum, lassitudines eximit fatigatis, & mollientibus medicamentis adiectum mollioriorum est. Et in summa reperfatorium est, & mitigatorium ac rarefactorium, odoratumque, ac facile partum procurat.

#### *Oleum Telinum, siue ex feno græco.*

Oleum telinum ex feno græco uim habet mollificandi. Commodum est ad furfuris, & achoris ulcuscula capitis manantia, depurgat & maculas solares, & faciem dealbat ac extergit & innouat, prodest & ad ueteri duritias ac abscessus, & ægre parientibus opitulari. facit & ad sedis intestinorumque inflammationes,

Insufum soluit renasmos, facit & ad perniōnes. Præparatur hoc modo. Feni græci libræ quinq; olei sextarii octo, cyperi libræ duæ, calami odorati libra una, macerantur hæc in oleo ad dies septē ter quoti die agitata, deinde expressa ac excolata reponuntur.

#### *Oleum Narcissinum.*

Ex albis Narcissi floribus fit oleum Narcissinum, nocte ac diem præficcatis, ita ut sextans ex ipsis in sextarium unum Italicum olei dulcis coniiciatur, & uas diligenter obturatum ad dies quatuor insoletur. Oportet autem & hos alterare quemadmodum in lilio diximus, & reddetur oleum magis odoratum, præsertim si moderate insoletur. Nam si diutius insolaueris Narcissinum, aut etiam lilaceum, uel uiolatium, aut aliud quoddam eorum quæ non fortem & permanentem odorem habent, inodorum euadet. Vim habet Narcissinum calidiorem anethino. Quare ad eadem dem conducit in reliquo corpore, capite excepto. Acris enim est Narcissini fragrantia.

#### *Oleum Violatum.*

Violatum oleum præparatur ex purpureis uiolæ floribus, itemque ex albis, quadratæ ex ipsis in olei sextarium Italicum dulcissimi coiecto, ac tertium alterato, uelut in lilio prædictum est. Vfus eius paulo calidior est quam rosacei. Quare si quis æstare fatigatus & insolat rosaceo careat, uiolaceo uti potest, maxime ex purpureis floribus præparato, ita ut in balneo ex eo illinatur. Nam supra hoc quod lassitudinis medetur, etiam isqualorē ac situm animi, odore suo in mansuetudinem ac uoluptatem transmutat, & somnum imperturbatum inducit.

#### *Isasmeum.*

Oleum apud Persas Isasme appellatum præparatur hoc modo. Candidorum nimirum uiolæ florum sextante in Italicum sextarium unum olei Isasmini insectis, ac alterato quemadmodum in lilio dictum est. Vfus eius in epulationibus apud Persas odoris gratia receptus est. Conducit uniuerso corpori à balneis, in corporibus calore ac laxitate indigentibus. Grauiorem autem odorem habet, ut multi non libenter ipsum tolerant.

#### *Oleum Myrteum.*

Fit & hoc folijs myrti uiridibus pondere sextantis, in olei omphacini sextarium Italicum unum insectis, addita uini odorati adstringētis quarta sextarii parte. Coquantur hæc ad lentā prunam, donec folia arefacta confringantur, & uinum consumatur. Deinde oleum purum excolatur, & uitreo uase excipitur, ac reponitur. Adstringit & frigefacit hoc oleum, amplius quam lentiscinum ac melinum, & propterea irrigationibus stomachi & hepatis non cōpetit, sed neque alia uiscera benigne tractat. Experientia plurima uim eius reperit in ceratis ac emplastris, per quæ densare ac repellere adstringere oportet. Commodat allabentibus fluxionibus, & humectis ulceribus cicatricem inducit. Cohibet pilos capitis mulierum, & est odoratum.

#### *Oleum Mastichinum.*

Mastichinum oleum fit, mastiches uncia una, in olei ualde aerbi sextarium unum immixta. Coquitur autem in duplici uase. Calidum est moderate, & densandi ac obstruendi meatus ut prædictum, si quidem partibus moderate firmari adstringitque ac calfieri indigentibus adhibeatur.

#### *Oleum Styracinum.*

Styracinum præparatur sic: Olei dulcis optimi sextans



rius unus, styraeis pinguis sextans, coquantur in dupli uase, donec styrae uim suam in olei deponat. Paulo calidius hoc est quæ anethinum. Verum ualde mollitior, & propterea corpora indurata prædiare attenuat & emollit.

#### *Oleum Sicyonium.*

Sicyonium olei sic preparatur. Olei dulcis sextarii decem, scenigræci sextarius unus, libanosidis quadrans, polii quadrans, sampfuchi quadrans, tædaru triens, aristolochiæ libra una, melioli semissis, cucumeris syluestris radices libræ duæ, aque quod satis est. Coquantur hæc uelut oportet, & excolata in usum uertuntur.

#### *Oleum Metopium.*

In Aegypto præparatur oleum Metopium appellatū, propter galbani lignum, sitex oleo omphacino & amygdalis amaris, cardamomo, iunco rotundo odorato, melle, uino, calamo odorato, carpopalsamo, galbano, & resina. Est calastorium: Venarum oscula aperit, attrahit, & purgat ulcera, facit ad musculos ac nervos cōfisos, facit ad hernias aquosas, & in summa uim mollitioriam habet.

#### *Oleum Mendesium.*

Mendesium oleum maxime emollit, & corpora laxat, & pus facit. Componitur ex oleo myrobalanino, & myrrha, calistiæ ac resina. Quidam spissandi gratia etiam cinamomum inspergunt.

#### *Oleum Megaleum.*

Quod Megaleum oleum appellatur, quondam præparabatur, nunc autem in usu non est, preparatur similiter ut amaracnum, nisi quod resinam recipit, & ad eam efficac est.

#### *Oleum Amaracnum.*

Amaracnum olei sic preparatur, herbe fabinæ, ligni balsami, calami aromatici, floris iunci odorati, nardi celticæ, costi, singulorum libras v. amomi, calisæ, carpopalsami singulorum lib. i. i. myrrhæ lib. i. Vini odorati sextarios v. Coquito uelut Nardinū. Vis eius calastoria sicut nardinū, non autē adeo corroborat, uerum magis tenuiū partium est magisq; mitigatorium ac lenes, propterea quod opobalsamum non recipit. Mulieribus in uteri sinu inieciū menses ducit. Estq; omnino calidū, emollit, ac aperit ora uenarum. Commodat fistulis, & ramici aquoso post chirurgiam, facit ad crustas & ulcera efferata, facit ad urinæ difficultatem circumlitū sedi, facit ad uteri inflammationes ac duritias, & hæmorrhoidum oscula aperit.

#### *Oleum Cyprinum.*

Cyprinum oleum recipit olei sextar. x. v. cyperi, helenij, iridis, singulorū libram unā, sampfuchi, hyssopi utriusq; quadrans, seminis uiticis quadrante, saluiz quadrans, floris cypri siue ligustri libram unā. Et hoc duabus cocturis coquitur. Nam reliquæ omnes species uino odorato rigate pridie, postea oleo infardæ coquantur ad horas sex, sequenti die oleum excolatur, & affusa aqua pura tertia olei parte, flos cyperi iniicitur, unā cū tenerioribus ramulis non coctis, si uero siccus sit, coctus, atq; ita coquitur hora una. Calistiæ cyprinū non infrenuē, estq; tenuiū partium, & ad uteros amplius perfrigeratos ualde cōmodum. Nam crassos in ipsis humores attenuat. Cæterum ubi copia fuerit herbarū uiridum, cyprinum sic preparatur. Nimirum ex olei sextariis x. caperij, helenij, iridis, singulorū semisse. sampfuchi, hyssopi,

saluiz, singulorū sextante. uiticis foliorum uiridum sextante. citri foliorū uiridium quinceunce. chamælibani uiridis triente. lauri foliorum uiridium quinceunce, cyperi florū dextate, opobalsami semisse.

#### *Oleum Irinum.*

Irinum oleum recipit iridis, aspalathi, cyperi, helenij, singulorum lib. v. opopanax semisse, quidā uero quadrans, anchusæ sextante. Olei sextarios x. x. aquæ sextarios x. v. Cōiunduntur omnia crassius, & macerantur biduo, deinde coquitur horis sex, deinde iniicitur opopanax uino præmaceratus ac tritius. Aliquando ad prædicta additur floris iunci odorati semissis, calisæ quadrans, ligni balsami, nardi celticæ utriusq; semissis. Vis huius calastoria est, sed non acris, propterea perfrigeratis partibus cōmodatior, roborandi q; emollendi uim quandam possidet.

#### *Oleum Nardinum Cyzicenum.*

Nardinum Cyzicenum quod in Alexandria præparatur, ualde cōmodum est, & recipit olei acerbis sextar. x. i. Italicos, aspalathi, cyperi, iridis Illyricæ. Seminis cardamomi, aristolochiæ, calisæ lignæ, singulorum sextecum, helenij, ligni balsami, floris iunci odorati, calisæ, costi, singulorū semisse, amomi, solij malabathri, picæ nardi, styraeis, carpopalsami, singulorum quadrans. opobalsami quadrans. herbæ fabinæ unciam unā. Præparatur hoc modo. Aspalathus, cyperus, helenium, xylobalsamum, iridē, aristolochiam, decoratō & crassius cōfundito, ac triduo aqua calida macerato. Deinde affuso oleo coquito assidue agitando, & aquā paulatim instillando, prout prior consumitur, & ubi tres aut plures coxeris horas, coniecta iam cocta pernoctare finito. Sequenti die extractis his quæ cocta sunt, & aqua ab oleo separata, rursus coquito alia aqua pura, ac modico uino affuso, & ubi bullierint primum cardamomū adiecto, deinde florem iunci odorati, & casiam ligneam cōtusa, coquitoq; ad horas duas, ac rursus pernoctare finito. Tertia die similiter extractis his, & alia aqua rursus addita coquito, & quum effueruerint, casia, costum & reliqua singula seorsim cōtusa ac trita, seorsim inspergito, postremum autem picam nardi, & folium malabathri, & styracem, in tenuissimas partes cōminutum, & ubi eliquatus fuerit, statim ab igne tollito & opobalsamū addito, diligenterq; agitato, & operaculo imposito ac probe uelutū ad biduū finito, atq; ita condula excipito. Porro Secidarium sic præparatur. His quæ ex tertia coctura superfuerint, olei sextar. v. i. adijcitur, & duabus horis bulliere finito, deinde calisæ tenuissimè tritæ sextante. nardi celticæ sextante. herbæ fabinæ drach. i. i. i. styraeis unciam unam. opobalsami sextante addito. Nardinū uim habet calastoriam, roboratoriam, ac mitigatoriam. Quare stomacho perfrigerato, & inualido, item uentriculo atq; iccori eodem modo affectis cōmodissimum est. Infunditur per sedem quoq; in intestinis perfrigeratis. Item in uteros muliebres. Vfus est omnino præstantis & eximij.

#### *Præcoctura Nardinij.*

Vini ueteris lib. x. v. foliorum dendrolibani lib. i. rasdi lib. i. i. calamagrosti lib. i. i. i. brullocyperij lib. i. i. i. Hæc omnia in præcoctura melle, ferueant horis x. i. & ubi euacuata fuerint in uas purū, & cacabus per spongiam deterfus, rursus infundis uini lib. x. v. & illud oleum desuper,

*Nardini preparatio alia.*

Nardinum quod in Ecclesia preparatur. Tachis librā, cinamomi libram, caryophyllorum libram, amomi libram, florum iunci odorati libram, calami aromatici librā, ligni aloës librā, nucum myristicarū librā, cadij libram, xantocaryorum, hoc est, nucum flauarum libram, maceris libram, galangæ libram, balsami libram, carpobalsami libram, xylobalsami librā, myrobalsami libram, folij indicis libram, casie librā, ligni caryophylli libram, piperis longi libram, piperis albi libram, piperis cōmunis libram, laferis chalcidici librā, nardi celticæ libram, thymiamatis librā, myrrhæ troglodyticæ libram, costi libram, musci libram, ambrae librā, gomphidis librā, ladani libram, terebinthinæ librā, vini odorati quod satis est.

*Nardini alia preparatio.*

In præcoctura vini veteris lib. xv. foliorum dendrobii libram 1. foliorū myrti lib. 1. rasti lib. 111. calami mocrini lib. 111. brullocyperii lib. 111. Hæc omnia in præcocturā mitte ut ebulliant horis x11. & ubi euacuata fuerint in uas purū, & cacabus per spongiam deferas, rursus infundis vini li. xv. & oleū illud desuper. Sit autē intrita siue intrimentū, cinamomi lib. 111. galangæ semisis, caryophyllorū triēs, spicæ quadrans, nucū flauarū quadrans, ladani puri quadrans, terebinthinæ uncia x viii. xyloaloes sextans, costi triens, laferis bucellarij libræ quatuor, thymiamatis regij quadrans. Hęc contusa & cribrata ac cum oleo præcocturę unita coquito iuxta experimentum, ut neque comburantur, neq; rursus defectuosa coctura fiat.

*Alia Nardini preparatio, Iosæ Vnguentarij.*

Olei sextar. x11. aspalathi lib. 1111. xylobalsami lib. 11. costi quadrantem. casie lignæ trientem, carpobalsami semissem, amomi trientem, styrcis calamitæ sextantem, opobalsami sextantem.

*Alia preparatio Nardini, Iosæ Vnguentarij.*

Costi sextantē foliorū indicorum trientē. casie semissem. myrrhæ semissem. ligni caryophylli semissem. carpobalsami trientē. spicæ nardi trientē. calami aromatici unciam unā. iridis sextantē. styrcis pinguis dodrantem. croci drach. 1111. olei sextarios vi.

*Oleum Salcat.*

Olei Salcæ preparatio quā in Alexandria parauit, optima est, & recipit, Aspalathi semissem. xylobalsami dodrantē. cyperi trientē. helenij, iridis utriusq; semissem. calami aromatici uncias x viii. floris iunci odorati sextantem & uncia dimidium. styrcis pinguis sextantē. nuces Indicas duas. folij uncias x viii. spicæ nardi uncia unam. caryophylli, arnabo, utriusq; sesquunciam. amomi quadrantē. casie sextantem. costi uncia unam. myrrhæ uncia unam. hypni, xylocasie utriusq; quadrantē. Olei sextar. x. Coquitur modo relato in nardino. ita ut in prima coctura iniiciatur calamus, flos iunci odorati, hypon, prægata uero ueteri odorato. In tertia reliqua sit & secundariū hoc modo. His quæ à tertia coctura superfuerūt adjiciuntur olei sextarij sex, & quantū satis est coquuntur. Deinde iniicitur myrrhæ stactæ bonæ albæ quadrans. Siromatis, hoc est, aquæ opobalsami semisis. mastiches semisis. styrcis boni uncia una. Vtuntur

oleo Salcæ mulieres caput ex eo ungentes. Est autem relata preparatio longe optima.

*Foliatij siue malabathryni preparatio optima.*

Foliatum oleum recipit aspalathi uncias x viii. ligni balsami lib. 11. cyperi lib. v. helenij lib. v. foliorū malabathri trientem. amomi semissem. xylocasie trientem. myrrhæ trientem. costi dodrantem. styrcis primarij lib. 1. cassii siue carpobalsami semissem. calami aromatici lib. v. spicæ nardi sextantē. caryophylli trientē. siromatis quæ est aquosa fex ac resindentia opobalsami semissem. arnabo semissem. cardamomi semissem. iridis librā unam. Olei sextarios x x. Vini odorati quod satis est. Coquitur uelut Nardinum.

*Vngenta odorata quibus commodent.*

Vngenta odorata frigidioribus capitibus magis conueniunt, quā moderate calidis, atq; illis hyeme. Nā calidioribus nō sunt apta. Si uero quis odoris gratia talibus uti uelit, rosacei parē modum ammiscbit. sic enim par pari ammixtum non amplius nocitū est. Quandoquidem uero multæ mulieres tam calida capita habent, ut nullum calidū oleum perferre queat, his consilium est solo omphacino uti, quandoq; uero etiā rosaceo. Quædam uero ex ipsis omnino non utuntur oleo, propterea quod capita ipsarum cito humescunt, & desiccationibus obnoxia sunt, quas sanè ad unguentorum illitionem cogere non oportet. Nam hæc siccatione capium opus habent, per commodas puluisculorum aridorum inferfiones, non humectatione per illitionem oleorum.

*Olei suffumigabilis preparatio.*

Oleum quod suffumigabile appellatur sic preparatur. Vnguium aromaticorū magnorum quincuncē. thuris masculi, styrcis primarij, bdellij puri, costi, singulorum quincuncem. olei boni dulcis sextar. v. hypni quod satis est. Costū in crassas partes secato, similiterq; styrcæ ac bdellium, deinde simul permixta in uas nouū testaceum ansis carens immittito, & osculū eius hypno integro, ac forinsecus ad hypnū aspalathi ligna, aut alicuius alterius odoratorū generis furculos addito ac obrurato, ut nihil ex uase excidere queat. Deinde aliud testaceū uas ansis carens, & longi colli osculū habens accipito, ita ut osculo eius congruat quod prædictas species in se continet, & in ipsum olei dulcis sextarios v. mittito, & effossa terra uas quod oleum habet usq; ad collum obruito, ut ne ignescat. mox alterū uas in caput resupinatū osculo eius quod oleū continet adprabis, forinsecusq; rotū circūcirca luto oblines, similiterq; oscula utriusq; coaptata, & sicca resines, sequenti die carbonēs multos circūpones, integresq; ex ipsis undiq; quæ totum uas, ignemq; accendes ac uentilabis. Ignem autem accensum marcescere ac extinguī finito, ut paulatim cadesca per osculum uasis species oleum suppositum ipsis suffumigent, qua gratia suffumigabile appellatur. Deinde postera die aperito, oleumq; tollito ac seruat in uitreo uase, ac uitro. Hoc utuntur mulieres quibus menses retinentur, illinentes ex eo pectinem & lumbos. Conuenit etiā his quæ nō pro ratione in partu purgantur similiter illitum. Vtile est etiā perfrigeratum pectus habentibus, & tenafimis infestantibus prodest, calidum lana conuoluta exceptum, & pectini ac lumbis impositum.

*De ungentis reliquis.*

Ex his iam facile est etiam de alijs oleis iudicare, quæ b 2 Vngen

Vnguentorum quoque cognominationem habent. Etenim iuxta naturam eorum quæ inijciuntur, oleū altera iuxta, quorum singulorum uim in hoc sermone deinceps condiscēs. Cæterum de reliquis remittentibus ac laxantibus unguentis, in sermone de medicamentorum compositione, post auxilia articularia dicetur, uelut est gleudnum & consimilia.

#### *Elaphoboscon.*

Elaphoboscon calidum & tenuium partium uim habet, ideoque secundo ordine ficitur. Conuenit ad uenenatarum bestiarum plagas, & in potu, & in cibo.

#### *Elenium siue Helenium.*

Helenij radix maxime in usu est. Dici potest calida & sicca, non tamen exacte uelut piper, sed cum humiditate superflua, & propterea in linctus ac elegmata, ad crassos & uiscosos humores ex pectore ac pulmone educendos, commodè miscetur.

#### *Eleliphacos, Saluia.*

Saluia calfactoria uim euidenter habet, & leniter subadstringentē. Quidam narrat suffita super prunas, menses immodicè fluidos mulieribus sistere, itemque muliebrem fluxum, Agrippa autē inquit, saluā herbam facit leuare prægnantes uorant. Nam uitalem conceptū continet. Quare si succi eius heminam unā cum modico sale mulier bibat, quarta à puerperij purgamentis die, & uiro condormiat, infallibiliter concipiet. Aiunt cum in Copto Aegypti pestis grassaretur, eos qui superfuerunt in ea regione coegisse mulieres & uxores suas, ad huius succi potentem adedū usum, & ad plurimā sobolem peruenisse. Orpheus autē inquit, Sanguinem spenubus succi saluæ cyathos duos cum mellis unda una dato, ieiunio in potu, & statim sistitur. Verum phibicis ac tabidis ait, catapocia præpara hoc modis: Spicæ nardi drach. ii, feminis saluæ tostis tuis ac cribratis drach. x. iiii. piperis drach. x. exipe succo saluæ, & redige in catapocia, ac exhibe drachmam unā mane ieiunio, itemque in uesperam, & aquam puram insuper bibendam.

#### *Elleborus, Veratrum.*

Veratrum album & nigrum extensoriæ ac calidæ facultatis sunt, quapropter & ad utiliginis & impetiginis pforasque ac lepras cōueniunt. Et sane uirga etiā nigri in fistulā immissa callosos, in duobus aut tribus diebus callum consumit. Ponantur autem in tertio ordine calfacientium ac siccantium, purgat nigrum humorem atræ bilis, magisque per uentrem infernè. Album uero per eundem supernè, crassos ac uiscosos humores per uomitum expurgās, mouet autem & uentrem infernè.

#### *Elxine, Muralium, Parthenium, Perdicium.*

Hanc aliqui parthenium, alij perdicium, alij muralium siue herbā muralem appellant. uis eius est extensoria, & leniter adstringens cum subfrigida humiditate. unde omnes inflammationes sanat in principio ac augmento usque ad uigorem, & maxime calidas. Sed & furunculis indipientibus inponitur. Et succus ipsius cum rosaceo ad aurium dolores modicè inflammatos conuenit. Quidā succum gargarizant ac tonsillas inflammatas. Quidam medicū etiā in tussis inueterata exhibuerunt, propter manifestam uim extergendi. facit & ad alopécias ac impetiginis ipsa herba per se assidue affricata. Aperit & hemorrhoidas sedis, & fistulas sanat, & sinus occludit, cum modico sale prius & cataplasmatibus modo impositis.

#### *Elymos, Panicum, Meline.*

Panicum Græcis ely mos & meline uocatur. Est autem simile milio forma ac facultate, parum nutrit & siccat, & sanè uentris fluxiones sistit, quemadmodum etiā milium. si uero forinsecus in cataplasmate imponatur, ficitur & perfrigerat.

#### *Empetrum siue Epipetrum, Praefoides*

Empetron solis purgationibus cōmodum esse uidetur, pituitam ac bilem ducens. Saporem habet salsum, ut etiā ad alia eo quis uti possit, ad quæ uidelicet salis substantiæ usus est. Appellatur etiā praefoides.

#### *Epithymum.*

Epithymum per omnia fortiores thymo facultatem habet, siccans ac calfaciens in tertio ordine sine distantia à temperatis, purgat humorem atræ bilis.

#### *Erebinthus, Cicer.*

Cicer legumen est flatuosum, probè nutrit, uentri cōmodum, urinā ducens, lac & semen generās, mensesque ducens. Decoctum ipsius etiā calculos in renibus auerit, maxime nigri. Alterum ciceris genus orobiæti appellatur, uim habet attractoriā, discussoriā, fectoriamque ac extensoriam. Quare & lienem & iecur & renes expurgat, scabiemque ac impetiginē exterit. Item parotidas ac testes induratos discutit, maligna quoque ulcera sanat cum melle.

#### *Erypylos, Serpyllum, Zygis.*

Serpyllum calfactoria uim usque adeo habet, ut menses & urinas moueat. Est autem & gustu satis acre. Dug eius species sunt. Altera hortenlis sampluchum odorē referēs. Altera syluestris quæ & zygis appellatur, non serpens, sed ramulos erectos, tenues, sarmentulosos habens, folia serine similia rubea, subangusta & longiora, ac duriora, flores gustu acres, odoris iucundi. Radix autē inutilis est. Nasctur in petris, efficacior & calidior quàm hortenlis, itemque ad usum medicū accommodatior. Menses enim & urinas ciet pota. Prodest & ad tormina, conuulsā, ruptā, hepatis inflammationes, & ad reptilia ac serpentes, tum in potu accepta, tum cataplasmatibus modo imposita. Mitigat & capitis dolorem cum aceto coctā, capite ex ea irrigato, rosaceo ammixto. Maxime autem in lethargicis ac phreniticis inueteratis congruit. Sedat & sanguinis spurcum, drachmæ unius pondere cum aceto pota.

#### *Erysimon, Irio.*

Erysimi semen uelut sapore nasturtio simile est, sic etiā facultate ipsi adsimilatur, seruens & calfactoriū existens. Quādo uero usus eius in edegmate expetitur, præstat ipsū aqua maceratum torere. Commodat in edegmatis ad crassorum ac uiscosorum humorū in pectore ac pulmone educationem ac per spiritū expurgationem. lnuat parotidas induratas, & duritias ueteres māmaram ac testium. Dioscorides ait in cataplasmate cum aqua aut melle impositum, etiā oculis cancris mederi.

#### *Erythrodanum, Rubia tinctorum.*

Erythrodani radix rufa qua disciores utuntur, acerbā est & subamari saporis, unde & iecur & splenē purgat, & urinas crassas, ac multas, aliquando etiā cruentas euacuat. itemque menses propellit. Moderatè quoque extergit ea quæ extersione opus habet. Itaque utiliginis albas extemit illita cum aceto. Quidā & in potu exhibent ipsam ichthiadicis ac resolutis ex aqua mulsā.

#### *Euzomon, Eruca.*

Eruca olus palam calfacit, sed & semen generare creditur.

33

tur, & impetus ad uenerem excitare. Capitis autem dolorem inducit, atq; hoc magis si quis ipsam solam edat. Quapropter cum lactuce folijs ipsam edere oportet.

#### Eupatorium.

Eupatorium tenuium partium uim habet, extensoriamq; ac sectoria, citra manifestam caliditatem. Quare ob-  
turationes fecoris expurgat. Est etiam modice adstri-  
ctionis particeps, per quam hepatis firmitatem addit.

#### Euphorbium.

Euphorbium uisoria & tenuium partium uim habet,  
similiter ut alij succi.

#### Zea.

Zea media quodammodo est inter triticum & hor-  
deum, ut ex illis cognobilis fiat.

#### Zingiberi.

Radix zingiberis fortiter quidem calfacit, sed non pri-  
mo statim occurrit uelut piper, propterea quod cras-  
siorum partium uim, aquosamq; ac excrementitiam  
substantiam possidet, ob quam etiam facile a teredi-  
nibus perforatur.

#### Zythus.

Zythus acrior est quam hordeum ex quo fit, & mali  
succo, nimirum ex putrefactione factus. Est autem &  
flatuosus.

#### Zima, fermentum.

Fermentum tenuium partium est moderate calidum, &  
propterea citra molestiam ac mordacitatem, ex alto  
extrahit simulq; discutit. Compositum est autem ex  
contrarijs facultatibus, aciditate frigida, & caliditate  
putredinosa, insuperq; salis & farinae, iuxta utriusq;  
naturam.

#### H Edyosmon, Menta, Minthe.

Mentam Greci edyosmon, aliqui minten odoratam  
appellat, uim habet calida ut propere attingat tertium  
ordinem, uerum ex hortenfi cultu humiditatis super-  
fluae particeps est, quapropter & ad uenerem mode-  
rate stimulat, & ob hoc temperamentum etiam cum po-  
lenta in cataplasmata uenit. Caeterum ob amariudini-  
nem lumbricos necat, & decoctum eius per triduum  
consequenter potum, colicis ualde prodest. Acerbitas  
porro ipsius recens sanguinis spiritui cohibet, si cum  
posca bibatur. Tenuium partium ut si qua alia her-  
ba existit.

#### Edyfarum, Securidaca, Pelecinus.

Hedyfarum etiam pelecinus dicitur, itemq; securidaca,  
& inuenitur fuluum aut pallidum colore semen an-  
cipit ade ad similitudinem securis. Amarum autem  
& subacerbum apparet, unde in potu stomacho co-  
modus est. Expurgat uiscerum obturationes, id quod  
& totius fructus ramuli faciunt.

#### Emerocalles.

Hemerocalles radicem habet similem lilij radici figu-  
ra ac uiribus, quare similiter ut illa ambustus pro-  
dest. Nam discussoria leniter uim habet, simulq; re-  
pulsorium quiddam possidet.

#### Erigeron, Senecio.

Senecio uim habet mixtam, frigida, simulq; moderate  
discussoria. Et propterea medicamentis sedis com-  
mode miscetur, cohibet & sanguinis sputum succus  
potus, & lumbricos occidit, & hepaticis prodest, &  
inflammatis efficax cataplasma est.

#### Eryngium.

Eryngium caliditate aut parum quid a temperatis, aut

omnino nihil abscedit, siccitatis autem tenuium partium  
non modice particeps est. Radix eius aqua seruefa-  
cta & ipsa aqua in potu sumpta, colicos sanat, cum  
aqua multa seruefacta, calculosos, urinae fistulicidum,  
eiusq; emittende difficultatem, & nephreticos curat.  
Bibendum est autem hoc eius decoctum per dies xvi,  
ieiunis, itemq; ad noctem dormituri. Si uero lauer  
simul cum ipsa incoxeris, & potandum dederis, me-  
lius res procedet. Affirmauit mihi quispiam se ex  
absiduo eius usu, calculos per lotium ejicere desisse,  
cum antea frequentissime eo uitio diuexaretur.

#### Thapsia.

Thapsia acris & fortiter calfactoria una cum humida-  
te facultatis est. Itaq; ex alto uolenter atrahit, & at-  
tractum discutit. Verum longiore tempore opus fuit  
perficit, propterea quod superflua humiditate largi-  
ter redundet, quo etiam facile corrumpitur.

#### Thermus satius, Lupinus.

Lupinus edulcatus per coctura, in cibo acceptus agre  
coequitur, & alimentum corpori praebet crassi succi,  
& crudos humores generat. Aluum autem neq; ducit,  
neq; sistit. At uero ut pharmacum, edulcatus quidem,  
uim obducendi meatus habet. Qui uero insitum a na-  
tura amariudine habet, extensorius & discussorius  
existit. Occidit lumbricos cum melle delinctus, aut cum  
posca potus. Sed & decoctum ipsius lumbricos expel-  
lere solet potum, & per clyster infusum. Farina quoq;  
eius forinsecus cum bubulo felle umbilico imposita  
idem praestat. Et sane decocti somentum foris ad motum  
utiliginibus prodest, & capitis ulcusculis mananti-  
bus, eruptionibus popularum, scabiei, gangraenis, ulce-  
ribus malignis, partim extergendo, partim discutien-  
do, & citra mordacitatem siccando. Expurgat etiam iecur  
& lienem cum ruta & pipere, iucunditatis gratia adie-  
ctis. Extrahit et menses, & foetus, cum myrrha ac mel-  
le appositus. Farina etiam lupinorum discussoria est.  
Non enim liuida tantum, sed & strumas & tubercu-  
la dura sanat, sed tunc in aceto, aut aceto mulso, aut po-  
sca eam coquere oportet, iuxta aegrorum uidelicet tem-  
peramenta, & affectus differenter oportuno liquo-  
re inuenio. Discutit & liuida farina ipsa, reliquaq;  
omnia quae prius in decocto relata sunt. Quidam &  
ischidiacis in cataplasmatibus imponunt.

#### Thermus sylvestris, Lupinus erraticus.

Sylvestris Lupinus amarior & fortior est ad omnia fa-  
tuoctaliis in genere eandem uim possidens.

#### Thlaspi.

Thlaspios semen uim acrem adeo possidet, ut etiam in-  
ternos abscessus potum rumpat, & menses ducat, &  
foetus perimat. Per sedem immixtum coxendici mor-  
bis prodest cruenta euacuando, & alijs quoq; pur-  
gatoriam uim habet supernae ac infernae humorum bi-  
liosorum, acetabuli mensura potum.

#### Thridax, Lactuca.

Lactuca humidum ac frigidum olus est, non tamen exter-  
ne, sed iuxta fontanarum aquarum frigiditate, quapro-  
pter ad inflammationes conuenit, & ad parua ac leuia  
erysipelata. Edulium est sicut sedans, & somni con-  
cilians, maxime seruefacta cum posca diluta sola come-  
sta. Sed neq; incocctilis est uelut alia olera, neq; ex-  
cretionem per aluum inhihet, neq; promouet, & pro-  
pterea neque mali succi sanguinem generat, non tamen  
perfecte boni succi. Semen potum seminis effluxum  
cohibet, unde & his quibus per somnum id effluit

datur. Cæterum syluestris lactuca succus cum muliebris lacte illius, argemata & inustiones, quæ oculorum ulcera sunt, itemq; caliginem depurgat.

#### Thymus.

Thymus incidit ac calcit manifestè ut tertij ordinis sit calcaciendū, & propterea urinas ac menses ducit, ac fecus detrahīt, & viscera purgat potu, adiuuat pectoris ac pulmonis excretionē. Atq; hæc quidē Galenus. Verū experimento sequentia cōstāt. Arthriticis thymi siccī minutissimè triti drach. iiii. cū aceri mulsi hemina dimidia dato ieiunis: purgat enim bilē, & acres serofos humores, & quæ circa uesciam hgerent. Ventre autem eleuato, quū intumescere iam incipit, drach. i. cū aque mulsæ hemina exhibito ieiunis. Ad lumborū ac coxendicū dolorem laterisq; ac pectoris, & præcordiorū eleuationes ac inflationes, drach. iiii. cū aceri mulsi diluti hemina una dato ieiunis. Si militē & melancholicū & mente perturbatū, & timore percussū drach. iiii. dato cū aceri mulsi diluti hemina una. Lippientibus & in uehementi oculorū dolore similiter dabis ieiunis & ante cenā. In podagris doloribus ita auctis ut moueri non possint ægri, similiter dato cū uino diluto. In testibus eleuatis similiter drach. iiii. ieiunis dato cū hemina uini una. Verū tamen à nigro thymo elleboro appellato penitus abstinendū est. Corruptiorū enim uim habet, & bilē generat. Viere autem eo quī florem purpureum habet ex natura, & album quid amplius complectitur.

#### Thymra, Satureia.

Satureia hortenſis consimilem thymo uim habent, sed sunt multo debiliora.

#### I Intybi.

Intybi lactucis consimilem uim habent, sed tamen iuncunditate multum inferiores existunt: item ad reliqua omnia de lactucis relata minus efficaces sunt.

#### Ioxys, Viscum.

Viscum ex plurima aërea & aquea substantia calida, minima autē terra constituitur. Itaq; plus acrimoniæ in se habet, quā amaritudinis. Quapropter humores ex alto fortiter trahit, non tenues solū, sed etiā crassiores, eosq; diffundit ac discutit. Est autē ex medicamentis nō statim calcaciendibus post primā impositionē, sed quæ tēpore indigent, uelut etiam thapsia.

#### Ion, Viola.

Viola folia aquosam & subfrigidam substantiam prædominantem possident, propterea & per se & cū poſta in cataplasma impoſita, inflammationes calidas mitigant. Imponuntur & in ardore oris uentris, itemq; oculorum.

#### Ippuris, Equisetum.

Hippuris adstringentē cum amaritudine qualitatē habet, et propterea siccatoria fortiter simulq; citra mordacitatem. Vulnēra igitur maxima in cataplasma impoſita gludnat, etiā si nerui dissecti sint, itemq; herniam intestinorū. Sed & sanguinis spurū, & fluxum muliebrē, maximè rufum, insuperq; ad dysenterias aliasq; uentris fluxiones, generosum pharmacū existit herba ipsa cū aqua, aut uino pota. Quidam de ea produnt, uesciæ etiā aliquando ac tenuium intestinorum uulnera curasse. Succus eius sanguinis e naribus eruptiones iuuat, & secunda uētris uitia, cum uino aliquo austero potus, aut in febrientibus cum aqua.

#### Iſatis, Glaſtum.

Iſatis ſatua quæ tinctores utuntur, fortiter siccantis fa-

cultatis est, nondū mordentis, amaræq; simul ac adstringentis. Quapropter magna uulnera durorū corporum glutinat, etiam si in musculorū capitibus existant. Sanguinis eruptionibus utile cataplasma præbet, & tumores laxos mirabiliter discutit, simul ac cōtrahit, & aduersus omnia maligna ulcera efficaciter resistit, siue cōputrescant, siue erodantur. Quod si pro ægri natura ac uiribus fortior appareat, ad folia ipsius trita, aut panē, aut ordeacē farinā, siue triticeā, aut etiā polentā ammiscere oportet, iuxta prædominantē in unoquoq; dispositionem ac affectionem.

#### Iſatis syluestris.

Syluestris Iſatis acere quid habet manifestū ita in gustu & actione, & propterea magis siccatoria quā satua existēs, aduersus humidas putrescēdas fortius resolutatur. Verū ad alia prædicta deterior est immodicē enim & cū mordacitate hæc siccit, irritatq;, & inflammationes excitat. Cæterum fortitudinis facultatis suæ gratia, etiam splenicis utilis existit, quibus satua non profuit.

#### Itea, Salix.

Salicis folijs uti quis potest ad uulnerū cruentorū glutinationē, imō & flore ipsius quo omnes Medici ferme utuntur ad emplastri siccantis compositionē. Est enim uis ipsorū siccatoria citra mordacitatē, habent autē & adſtrictionis aliquid. Quidam succū ex ipsis exprimunt, eumq; pro pharmaco habent mordacitatis expertæ ac siccantē, ad multa utili. Cortex quoque arboris cōsimilem floribus ac folijs uim habet, præterquam quod sicciorē tēperamentō præditus est, quemadmodū omnes ferē cortices. Quidā hunc exsiccant, & cinere utuntur ad ea quæ forti resiccatione indigent. Itaque clauos ac callos, insuperq; uerrucas myrmedas appellatas, eo eximū aceto acri subactis. Aliqui tēpore floris corticē incidunt, succumq; quēdam inde colligunt, quo utuntur ad uitia quæ pupillis tenebris obducunt: est enim medicamentū exterforium ac tenuiū partium. Quare etiā ad alia multa eius usus affluunt, quæ, quum tali facultate præstet.

#### Calaminthe.

Calaminthe tenuiū partium substantia habet, estq; calida & siccā tertio ordine: siccā per se ex aqua mulsā pota manifestē calcacit, & sudores citat ac discutit, & siccit totū corpus, quapropter aliqui ipsā uisū sunt & ad rigores per circuitū repetentes, cocta in oleo, & illito inde toto corpore cū frictione strenua, intra corpus uero assumunt uelut dictum est. Quin & coxendicis cataplasma est in ischiadicis generoso omnino auxilio: trahit enim ex alto ad superficiē, & totū articulū calcacit, & cutem manifestē adurit. Insuper & pora appoſita menses efficaciter prouocat. Bonū est & in elephantiaſi medicamentum non solū ob id quod tenues humores discutiat, sed & quod crassos attenuet & fortiter dissecet, quī sanē hoc morbi genus generat. Sic & cicatrices nigras illustrat, & sugillata discutit. Præstat aut in talibus coctā in uino cataplasmatice uice imponere, uiridē magis quā arefactā: siccata enim fortior euadit & proprius inurit. Est & cataplasma in morbis animalium uirus eiaculariū. At uero ob amaritudinē & ascaridas & lūbricos succus eius perimit tū porus, tū per sedē insuſus, imō & uermes qui in auribus itemq; ulceribus nasci solēt. Prodest & anhelosis & ictericis extergendo ac expurgando iecoris obturationes. Cæterū ad omnia prædicta efficacior

efficacior est mōstana . Orpheus ait succū eius cū pari rosaceo & cerulla triū ad frigimentidā crassitudinē ac illitum, ambustis mederi, & quod omnē opinio- nem superat, neq; cicatricem apparere, & locū pilos producere . Si uero cū cimolia terra & aloē, paribus portionibus acceptis succus teratur, indeq; frons ac tēpora illinantur, capitis dolores euectigio sanātur.

*Calamus aromaticus.*

Calamus aromadus modicā adstrictionem & quā minimā acrimoniam possidet, maximā autem pars eius substantiæ terreæ ac aëreæ est, moderatē caliditatis ac frigiditatis . Vnde & urinam moderatē ciet, & compositionibus stomachidis ac hepaticis quæ foris ipsis imponuntur ammiscetur, & in uteri fetus utiliter assumitur, qui inflammationibus, aut mensium iritationis gratia adhibentur . Ponatur itaque secundo ordine calfacientium ac siccantium, magis tamen siccantium quā calfacientium.

*Calamus Phragmites, Arundo Sepiaria.*

Calami phragmitæ radix exterioriam uim non modicā habet, minimē acrem, folia tamē uiridita moderatē perfrigerant, itemq; non modicā exterioriam uim possident . Cortex eius uisus tenuium partium ac discussoriam uim abīde acquirit, & exteriorium quid habet, ut calfaciat ac siccet tertio ordine, plus tamen siccans quā calfaciens.

*Cannabis.*

Cannabis semen agrē concoquitur, dolorem capitis inducit, & malum succum gignit . Si uero torreatur etiam sic caput tentat, multum calfaciendo, & uaporem calidum ac medicatum ad ipsum delegando . Ex eo uero quod siccō temperamento præditiū est & flatus expers, genitale semen extinguit.

*Cappion, Fumus terre.*

Herba fumarīa acrem simulq; amarā habet qualitatē, neq; omnino expers est acerbē . Quapropter urinam multā biliosā promouet, & iccoris oburationes ac debilitates sanat . Succus eius uisum exacuit de- acrymationē facies . Ipsa herba arida trita acque mulsæ inspersa ac pota, uērem mollit . Vīno autē diluto si- militer inspersa, stomachum corroborat . Dato cōsidenter & decoctū ipsius quomodocūq; febriētibus.

*Capparīs.*

Capparīs radicis cortex prædominantē habet amarā qualitatem, secundo loco acrem, & deinceps acerbā, ex quo palām fit ex diuersis ac pugnantibus uiribus ipsum compositū esse . Etenim extergere & expurgare ac incidere potest ob amaritudinē; calfacere autem & discutere ac attenuare per acrimoniam, cōtrahere uero ac cōstringere & cogere per acerbitatē & propterea lienis induratos si quod aliud medicamentum curat, tum forissecus cataplasmatīs conuenientibus ammixtus, tum intra corpus acceptus, siue coatur in aceto ex aceto mulsō ac similibus, siue aridus tritus ipsē inspersus; euacuat enim apertē uiscosos ac crassos humores sic acceptus, non per urinas solum, sed etiam per uentrem . Sæpenumero uero & cruentā egerunt hi in quibus lien opem sentit, & coxendicum dolores minuuntur . Quin & menses ciet, & pituitā ac capite per os detrahite, & malignis ulceribus inspersus minutissimē tritus commodum pharmacum est, utpote extergere ipsā ualēs & fortiter rescicare . Sed & dentium doloribus prodest cū uīno coctus aut aceto . Strumas quoq; et tumores duros disc-

cuti, si aptis ad hæc medicamentis permisceatur . Fo- lia porro & caulīs, itēq; semen siue fructus, consumi- lem corici uim habent, nisi quōd debiliora existūt . Et sanē ego memini me aliquādo folijs solis strumo- sam duritiē intra paucos dies discussisse . Ammiscetur autem ipsis aliquid quod uehemētiam facultatis ipsorum obrundat . Nihil uero miri est, si etiam aurum uermes succus enecat ob amaritudinē . At uero fructus in muria cōpositus, deinde lotus ac maceratus, donec omnem salis uim deponat, medicamentum est ad excitandum appetentiam prostratā, extergendumq; ac subducendum uentris pituitam, & ad expurgandum oburationes lienis ac fecoris . Vtēdum est autem eo cum commodo liquore, aceti mulsi, aut aceti oleo permixti, præ omnibus alijs cibis.

*Cardamum, Nasturtium.*

Nasturtij semen uisoriā uim habet uelut sinapi, & propterea ischiadicos, & capitis dolores, & quicquid ru- bescatione opus habet id ipsum calfacit, quædmodū sinapi . Ammiscetur cōmodē & medicamentis ad an- helosos destitatis, nimirum ut medicamentū crassos humores discicare potēs . Herba ipsa similem semini uim possidet; uerum imbecillior est . Quare comesta ualde calfacit . Capitis autē dolorem eadem inducit.

*Cardamomum.*

Cardamomum calidam facultatem abundē possidet, ut etiam exulceret in cataplasmate impositū, minus tamen quā nasturtiū . Habet & amaritudinis quid- dam in se, ob quam etiam lumbricos enecat, & sca- biem fortiter extertit cum aceto.

*Caroum.*

Caroi semen siccit & calfacit tertio ordine : acrem autem qualitatem moderatē possidet, & propterea flatus leuat discutitq;, & urinam ciet, non modo semē, sed tota plania.

*Casia.*

Casia calfacit ac siccit tertio ordine, estq; multū tenuiū partiū in gustu autem plurimum acrimoniam habet, paruumq; quandam adstrictionem . Quare propter hæc omnia siccit simulq; discutit corporis superfluitates, & præterea robur organis addit . Cōmodat & ad suppressos menses, ubi per copia simulq; crassitudinē superfluitatū, sufficienter euacuari prohibetur.

*Carya, Nux arbor, Nux inglans siue Regia,*

*Nux parua, Pontica, Auellana.*

Nux arbor habet quidē tum in germinibus, tum in folijs aliquid adstringens, uerum insigniter & copiose in ipso nucis siue cortice, & recenti & arido . Vtūtur itaq; ipso etiam tinctorēs . Nos autem eūdem exprimentes, succumq; similiter ut mororū ac rubi, mororum cum melle coquētes, stomacū præparamus oris utijs cōmodum medicamentum, quo etiam ad alia omnia utimur, ad quæ prædicti succi commodi existūt . Cæterū ipsius nucis nucleus qui in cibi usum uenit, oleosus est & tenuiū partium, particeps est autem & adstringentis qualitatē, sed modicæ & quæ temporis progressu euaneſcit, tota ipsius substantia in pinguem succum transiente, qui oleo uteri similis apparet, & propterea omnino tandem edi non potest . At uero uiridis adhuc & recens nucleus, neque adstringentem qualitatem manifestē possidet, neque oleosā . Vnde ad alui excretionem commodior est quā siccus, & maximē si cum garo, quæ admodum aliqui faciūt, accipiatur . Sed & siccaturū



nucum in aqua maceraturū, uelut quidam facere solent, consimilis uis est ut uiridum. Concoquitur tamen melius nucis fructus, & stomacho commodior est, si cum caricis edatur. A iunt si quis caricas cum nucibus ac ruta prae reliquis cibis comedat, cum non magnopere à ictalibus medicamentis lædi possit. Porro ex inueterata nuce oleum quoque exprimi potest, quod abunde discussorium existit, ut quidam eo etiam gangrænas & carbunculos ac ægilopas curant. At uero putamen eius aridum usum, tenuium paritium siccatorumque & lene pharmacum euadit. Cæterum nux parua, quæ & Pontica, & Euellana appellatur, frigidior est & austerior, utpote magister rea existens. In cæteris regie, siue iuglandi similis est. Capitū autem dolorem in cibo sumpta inducit.

#### *Castanea.*

De castanea eiusque fructu dictū est in querci tractatiōe. *Cenchros, Milium.*

Milium frigesacit primo ordine, siccatur aut tertio exoluto, aut secundo intecto. Est & modice tenuium paritium. Vnde comestum insitæ edicij, omnium ferme eduliorum frumentacei generis minimi nutrimenti est, sed & alium excicat. Verum forinsecus impositum in marispijs siue facculis, fomentum est apertissimum his qui leni reficcatione opus habent.

#### *Cedrus, Cedria, Septica.*

Cedri species duæ sunt, utraque tertio calfacit ac siccatur. Cedria uero quæ ex ipsis sit, etiam quartū iam ordinem attingit. Est autem primi ordinis erodentiū, septica Græci appellant, multum calida ac tenuiū paritium existens. teneras sanæ carnes promptè simulque citra dolorem corrodit caliditas ipsius, per caliditatem quæ in corporibus est aucta; uersū in duris corporibus longiori tempore & uix tandem efficaciam suam ostendit. Vnde mortuorum corpora incorrupta cõseruat, humiditates ipsorum superfluas depascit, solida autem corpora non attingens, propterea quod non tam fortem uim habet, uelut alia erosua appellata. Nihil uero miri est si eiusmodi uim pollet, quod etiā pediculos, & lēdes, & aurium uermes, & alcaridas in recto intestino enecare potest. Fortius insuper apposita uis uos quidem necat, mortuos autem eiicit, quæadmodum etiam ipsum semen genitale, in coitu pudendo oblita, & propterea sic usurpata medicamentū conceptum impediens est nulli alteri posthabendum. Sed & dēum foraminibus insillata dolores quidē minuit, ipsos autem dentes confringit. Attenuat & oculorum cicatrices, & hebetat uisum ob crassitudinem humorum sanat. Quod uero pinguis simū est ex ipsa & exactè oleosum, quod superextentis lanis dū coquitur colligitur, tenuiorū quidem partiū est quàm rota cedria, uerum minus acre ac mordax, quāquam non minus, sed magis etiā quàm cedria efficax sit. Vnde & hoc idiotæ utuntur ad uulnera ouium in tōtura per forpces illata, item ad scabiem, & ad ricinos. Cedri porro baccæ & fructus cedrides Græcis appellati, moderatiorem uim habent, ut etiā in cibi usum ueniant. Si quis tamē plures ex ipsis ingerat, & caput dolet, & excalefacit, & oris uētris morsum percipit.

#### *Centauræa magna.*

Centauræa magnæ radix ex contrarijs uiribus cõposita est. Itaque in gustu acris simulque adstringens appareret, cum quadā dulcedine. In actione uero acrimonia caliditatis opera exercet, menses promouens, &

foetus mortuos detrahens, & uiuentes corrumpens, simulque eiicit. Adstrictio autem frigiditatis crassioris ac terreæ opera designat, cum uulnera glutinando, tum sanguinem spuentes uiuando. Dare autem oportet eis drachm. i. febrientibus cum aqua, febre carentibus cum uino. At uero iuxta omnium qualitatum actionem & ruptis, & conuulsis, & spirandi difficultatibus, ex inueteratæ uisui conueniunt enim euacuare solum in his oportet quod præter naturam est, sed roborare etiam ac firmare expurgata. Succus ad eadem ad quæ radix ualeat. Quidam etiam eo pro lycio utuntur, illo non præferente.

#### *Centauræa parua.*

Centauræa paruæ radix omnino inefficax est, ramulū uero & magis folia, & ipsorum flores in usum ueniunt. Dominatur in ipsis qualitas amara, parū quid adstrictiōis possidens, & propterea foriter siccatoriū est pharmacū absque mordacitate. Magna itaque & recentia uulnera glutinat herba ipsa uiridi in cataplasmate imposita. Vetera uero & ægrè cicatricem recipiētia, ad cicatricē perducit simili modo adhibita. Quin & siccæ glutinatorijs ac siccatorijs cõpositionibus miscetur, quæ finus ac fistulas curare solent. Sed & ueteres duritias mollire creditur, et maligna ulcera sanare. Miscetur & eis quæ fluidas affectiones sanant. De coctum herbæ quidā ischiadicis infundunt per sedē, uelut quod biliosum & crassum humorē ducat. Nā & purgat, & sanē ubi uehementer operatiōem suam exercebit, cruenta euacuat, & magis prodest. Succus eius consimilem uim habet, hoc est, siccatoriā & extensoriā, & tum alia prædicta probè efficere solet, tū cū melle oculis sublinitur, & appositus menses ac foetus educit. Quidā ipsum bibendū dant in affectis neruis, uelut euacuante ac citra molestiā siccantem infarscā. Cæterum & ad hepatis obturationes bonum pharmacū est. Bonum & lienī indurato, forinsecus impositus, neque minus si quis bibere uelit. Herba ipsa exsuccanda est circa summum uigorem, & flore prægnans. Datur succi cochleariū unum cū aqua calida, & sale modico, ac paululo aceto, & purgat generosè humorem aræ bilis. Coma eius conusa & cū melle coctio, aut sapa in collyria formata, fistulas circumscrificat, & callos eximit, collyrijs in fistulas immixtis. Corymbi eius tusi ac cribraui cochlearij mētura ischiadicis datur ieiunis cū aqua calida, ad tri duū aut plures etiā dies. Eius certe pharmaci efficacia magno miraculo sæpe fuit. Et ad polypodas in nariibus excrecentes idē medicamentū siccū inspergitur.

#### *Cerasus.*

Cerasus fructum fert moderatè adstringentē cum dulcedine; matura itaque cerasa & dulcia magis per intestina subeunt, minus uero stomacho commodant, immatura & austeriora uice uersa. Gummi arboris uino potum calculosis prodest quidam tradiderūt.

#### *Ceratonia, Siliqua.*

Siliqua arbor siccatoriā & adstrictoriā uim habet, quemadmodum etiam fructus eius, ceratia Græcis, nobis silique appellata. particeps est autem & alicius dulcedinis. Siliquæ aliquam cum cerasis similitudinem habent. Virides enim & humidæ alium magis subducunt. Siccæ magis sistant.

#### *Cestron, Betonica, Psychotrophon.*

Betonica cestron & psychotrophon appellatur, uim habet siccatoriā uelut gustus indicat: amara enim & acris herba

herba existit, uelut etiam particularis actio ostendit. Nam & rhenum calculos confringit, & pulmonem ac pectus & iecur purgat ac extergit, & menses mouet, & comitali morbo prodest, & ruptis ac cõuulsis medetur. Acidum item ructum sedat, & ischiadicis conducit pota.

*Cicis, Gallæ, Omphacitis.*

Galla quæ omphacitis uocatur, ab uide acerbū pharmacum est, substantiæ terreæ frigidæ plurimæ particeps, ob quam & siccatur, & fluxiones repellit, & cogit ac obstringit laxas ac inualidas partes. omnibus etiam fluidis affectionibus resistit. Ponatur autē in tertio ordine siccantiū, in secundo uero frigefaciendi. Alia tera galla flaua laxa ac magna siccatur quiddē, sed tanto minus, quāto minus acerbæ qualitatē particeps est. Cocta itaq; per se actrita, & in cataplasmate adhibita inflammationē sedas ac prolapsus eiusdē insigne auxilium est. Coquere autē oportet si moderata adstrictione opus est in aqua, si uicem in uino, maximē austero. Gallæ uim supprimit sanguinis habent, & manifestū satis est quod caliditatem et acrimoniam ex uisura acquirunt, & magis tenuiū partiū quā non usque euadunt, itēq; siccatoris amplius. Oportet autē cadesactas super prunas, aceto aut uino extinguere.

*Cera.*

Cera in medio quodammodo est calascientium, frigefaciendum, humectantiū ac siccantiū, habet & crassum solū quid & meatus obturatorīū, quapropter non solū siccatur, sed & per accidēs humectare uidetur perspirationes prohibendo. Vnde & materia est aliorū pharmacorū. Ipsa autē per se ex concoctorū debiliū numero fuerit, quę forinsecus imponitur. Habet enim parū ex diffusoria ac calida facultate, cuius quā plurimæ mel ipsum particeps existit.

*Ciborium.*

Viridem fabarum Aegyptiarum fructum ciboriū appellant. Quare in fabarum tractatione, etiam de hoc considerandum est.

*Cinara.*

Cinara mali succi eduliū est, maximē ubi durior euasit. Nam et biliosum humorē in sese tunc uberiorē colligit, & totam substantiā lignosiorē habet. Quare ex hac quidem humor atræ bilis generatur. Ex succo uero ipsius tenuis & amarę bilis humor producit. Præstat igitur præcoctam ipsam in cibo absumere.

*Cicis arboris fructus, Ricinus, Croton.*

Cicis arboris fructus, quem aliqui crotonem ac ricnū appellant, quicq; purgandi uim habet, exterioria ac diffusoria facultate præditus est, folia eius imbecilliora sunt. Oleum quod ex fructu fit, calidius & magis tenuium partium est quā cõmune, & propterea etiam diffusorium.

*Cisthus siue Cistharus.*

Cisthus frutex adeo adstrictorius est, ut & folia ipsius in cataplasmate imposita uulnera glutinent. Flores efficaciores sunt, ut cū uino poti dynterrias, & uentris imbecillitatem, ac fluxiones, & humiditates facient, in cataplasmate autem impositi putrefactis ulceribus conducunt, propter generosam siccandi uim ferē in secundo ordine. Ipsius fructus frigiditas tepidæ quoq; qualitatē particeps est. Cæterum quę hyocythis appellatur, multo magis quā folia adstringit, itēq; efficax pharmacum ad omnes fluidas affectiones, uelut sanguinis reiectionē, fluxum mu-

liebrem, coeliacas & dyntericas affectiones. Sed & corroborare partes solet, & à plurima humiditate exolutis firmitatē addit, atq; sic sanē & stomachidis & hepaticis conducit. Firmat enim ac roborat non infirmē, epithematis aut andouis apud ammixta.

*Cisthus siue Ladanum.*

Cisthus hic in calidioribus regionibus nascitur, nō genere alius ab his qui in alijs locis nascuntur. sed à regione præcipuā quādam propriam diffusoria qualitatem adeptus est deposita frigiditate. In reliquis igitur consimilis est præcedenti. Verū ex ipso fit ladanum medicamentum calidū primo ordine iam cõmpleto, ut etiam secundū attingat, particeps est autem & adstrictioni cuiusdā modicæ, & tenuium partium substantiā habet, & propterea moderatē emollit, & similiter discutit, itemq; coquoit. Itaq; non mirum est uteri affectibus hoc præcipuē cõuenire, propterea quod aliquid adstringens habet, per quod etiam de fluos capillos retinet. Nā & uitatos humores iuxta pilorū radices attenuat ac cõsumit, & meatus quibus impacti erant, adstringendi ut cogit & constringit.

*Cissos, Hedera.*

Ex cõtrarijs facultatibus hedera cõponitur: habet enim quid substantiæ adstrictoriæ, quā frigida ac terre dicimus. Habet & quid acris, quā calidam esse gustus testatur, sed & aquosæ substantiæ tepidæ uiridis particeps est. Viridia itaq; folia cum uino cocta, etiā magna uulnera glutinant, & maligna ulcera sanant. Vlcerationes quoq; ex igne cicatrice includūt. Cum aceto autem cocta folia splenicis opitulantur. Flores eius fortiores quodammodo sunt, ut cum cerato triti ambusta curent. Succus ipsius per nares purgat, & antiquas aurium fluxiones sanat, & ulcera uetera tum aurium, tum narium ad cicatricem perducit. Si uero acrior appareat, rosaceo aut oleo dulci temperetur. Lacryma hæderę pediculos necat, & pilis nudat, in tantum calidam uim habens, ut etiam leniter urat. Prodest etiam lacryma calculosis in potu.

*Cnicus.*

Cnici semine ad purgationes tantum utimur. Est autem tertij ordinis calascientium, si quis forinsecus admoro ipso uti uelit.

*Coccus cnidius, Granum cnidium.*

Cnidius coccus purgatoriam uim habet, itēq; facultatis acris & uisoriæ.

*Coccus tinctorius, Granum tinctorium.*

Coccus tinctorius adstringentem simulq; amarā qualitatem habet, & per utranq; leniter siccatur, & ob id ad magna uulnera conducit, & ad lauciatos neruos, cum aceto aut aceto mulso trius.

*Coccynele, Prunus.*

Pruni fructus recens magis aluū subducit, siccatus minus. Sunt autem damascena pruna magis adstringentia, Hispana dulciora, & propterea magis aluum ducunt. In solijs autem manifesta quædam adstrictio apparet, unde decocta utiliter gargasiantur in inflammationibus gurgulionis ac tonsillarum. Cæterum syluestrium prunorū fructus adstrictorius est & uentrem sistit. Et in Asia sanē hæc planta prunus nominatur. Gummi omnis pruni cum uino potum lapides frangere quidam produunt, uerum cum aceto impetigines puerorum exterit.

*Colocasion, siue Marixanion.*

Colocasion radices similibus ut est rapis ac cepis, uiscosum autem

autem corpus ipsius est. Vnde exteriorae facultatis particeps est, & uentri in cibo sumpta commodat.

*Colocynthe, Cucurbita.*

Cucurbita humidi & frigidi temperamenti est, utroque secundo ordine. Vnde & ramentorū eius succus auribus inflāmatīs & dolentibus conuenit cum rosaceo. Sic & tota in cataplasmate imposita, calidas inflammationes mediocriter refrigerat. In cibo accepta nimia humectatione corpus implet, & sitim eximit, & alimentum humidum ac frigidum, & propterea etiā modicum corpori praeber. Concoquitur autem non male, ubi non prius fuerit corrupta, id quod accidit ipsi propter malam praeparationem, & ubi uisiosus humor in uentre fuerit coacervatus. Imò si etiā diutius in uentre moretur, quemadmodum reliqua quoque humida edulia. Gaudet origani cōditura propter aquosam in ipsa qualitatem. Omnia enim huius generis acrisbus aut addis, aut auferis, aut salis saporem miscere oportet, si modo neque insuauiter sumi debeant, neque sumentes nauseabundos efficerent.

*Comarus, Arbutus, Memecylon.*

Arbuti fructus memecylon appellatur, estque stomacho incommodus, & capitis dolorem inducit. Arbor ipsa simul cum fructu acerbam qualitatem possidet.

*Commī, Gummi.*

Gummi uim habet siccatoriam, meatus obducit, & asperitates sanat.

*Conia stacte, Lixiuum.*

Quod uelut ablutio est materierum ac cinere redactarum, conia stacte Graecis, nobis lixiuū uocatur. Ex omnibus autem maximè extersorium est & siccandi uis praeditum, quod ex cinere siculneo & tithymallis sit, ut ferè uim erosiuam sortitur. Verum ob substantiam tenuium partium citra dolorem urit.

*Conyza.*

Conyza & maior & minor consimilis temperamenti ac facultatis existunt, gustui acris & amarae apparatus. Cascidunt & siccant euidenter, ut utriusque qualitatis tertio ordine locetur. Decoctae itaque in oleo, rigoribus per circuitum repetentibus salutarè medellā praebent. Quidam flores ipsarum unā cum folijs terentes cum uino bibendos exhibent, ad menses cientes ac foetus ejciendos. Est & tertium conyzae genus, in humidioribus locis proueniens, magis scetidum & imbecillius.

*Corianum, Coriandrum.*

Corianon item corion appellatur, & ex contrariis facultatibus compositum est, multum habens substantiae amarae, quae tenuium partium est & terrea, nec parum aquae humiditatis tepida uis praedita. Habet & parū quid adstrictionis, ex quibus omnibus multariam efficacē est facere ac quae Dioscorides prodidit, uerum non ob solam frigiditatem.

*Colla, Glutinum.*

Glutinum quod ex similagine aut polline ad libros cōficiunt, facultatem habet meatus obducentem & concoctoriā. At uero de taurino glutine ac similibus in sermone de animalibus agetur.

*Coronopodium, Pes cornicis.*

Coronopodij radix in cibo accepta coeliaci opitulari creditur.

*Costus.*

Costus modicè amaritudinis, plurimè uero acrimoniae ac calidae qualitatis particeps est, ut etiam exul-

ceret. Vnde ex ipso cum oleo perfricant corpus ante accessionem in rigoribus per circuitum redeuntibus. Alij idem & in resolutis ac ichthiadicis faciunt, & omnino in his quibus aut partem aliquam calfacere uolumus, aut humorem aliquem ex alto ad cutem attrahere, usus eius competit. Ob eandem causam & urinam ciet, & menses ducit, & ruptis ac coeuulsis, & laterum doloribus confert. Verum ob amaritudinem, etiam latum lumbricum necare creditur, & ad solares maculas ipso utuntur, cum aqua aut melle. Inest praeterea ipsius temperamento sitiuosa quaedam humiditas, ob quam & uenerem stimular cum uino mulso potus.

*Cotyledon, Vmbilicus ueneris.*

Cotyledon mixtam uim habet, humidā & frigidam, & quanda obscurè subadstringentē & modicè amarā. Vnde frigefacit, & repellit, & extergit, & discutit. Inflammationes itaque erysipelatas, & erysipelata inflammata sanat, & in stomachi ardore commodum cataplasma existit. Creduntur folia cum radice commestialapidis atterere, & urinam ciere.

*Crambe, Brasica.*

Brasica comestilis siccatoriam uim habet, & in cibo accepta, & forinsecus imposita, non tamen manifestè acrem, sed ut uulgera glutinet, & maligna ulcera sanet, & inflammationes curet iam induratas ac aegre solubiles, eiusdemque generis erysipelata. Sed & epinyctidas ac herpetas sanat. Habet & quid extersorium, per quod etiā lepras extertit. Succus itaque ipsius quid purgatorium habet, corpus autem eius alui excretionem cohibet, eaque gratia in quibus humectum uentre siccare uolumus, moderate ipsam coquimus, & priore aqua diffusa, statim in alteram calidā praeparatam immittimus ac seruacimus. Non oportet enim neque aërem, neque frigidam aquam contingere quod his coquitur. Neque enim exaetè flaccidū sit, etiam si diutissimè coquas. Itaque in aliam calidam immisam coquimus donec flaccida fiat. Nam si uentris subducendi gratia sumitur, non ualde discoquitur. Siccatur igitur brasica quemadmodum lentacula, & propterea usum hebetat, & atrae bilis humorem generat. At uero asparagus brasicae minus siccatur, & magis urinam ciet. Semen autem potum lumbricos enecat, & maculas solares ac lentiginēs, & quaecumque alia moderata extersione opus habentia extertit. Cauliculi eius usui cinerem effidunt fortiter siccantem, ut & uisoriae facultatis particeps sit. Quapropter eo cum ueteri adipe ammixto, quidam ad ueteres laterum dolores, & sicuti eiusmodi alius dolor infestet, utuntur. Fortiter enim discussorium medicamentū efficitur. Brasica porro syluestris sicior & calidior multo est quam satua, quodammodū omnia alia ferme syluestria satiuīs fortitudine praestant. Vnde neque citra offensionē intra corpus sumuntur. Discutit autē & extergit uehementius quam satua. Ceterum marina brasica ultra hoc quod uentrē emollit, subfalsum nimirum ac subamarum saporem habens, commoda quoque fuerit ad externos corporis usus, ad quos sanè eiusmodi qualitates conueniunt.

*Chrethmon.*

Chrethmon falsum quodammodo in gustu est, unā cum modica amaritudine, propterea & uis ipsius extersoria simulque siccatoria existit. Vtraque tamen facultate amaris cedit.

*Critha,*

*Crithe, Ordeum.*

Ordeum primi ordinis est siccantium ac frigefaciendum, habet & modicum quid exterofitū, & paulo magis siccit quam fabarum farina à cortice depurgata. In reliquis omnibus forinfeco usu consimilia existit. Verum in cibo acceptum ordeum, hoc amplius fabis habet, quod in coctura flatuositatem deponit, fabæ autē quomodocūq; coquatur flatuositas permanet. Crassioris enim substantiæ faba est quam ordeum, & propterea etiam magis quam ordeum nutrit. Ordeum uero succum generat tenuem & exteroforium quid habentem. Nihil igitur calfacit corpus quomodocūq; tandem præparatur. Verum humectat & siccit diuersimodè præparatum. Etenim polenta ex ordeo tosta facta, manifestè apparet siccare. Pilsana uero humectat, quā uelut conuenit, præparatur. Panes autē ordeacei omnes minus nutrit quam triticeï, & magis uentrem subeunt quam illi. Cæterū polenta ex ordeo tosta facta magis quam ordeū siccit, & modicum alimētum corpori sufficit quomodocūq; coquatur. Eadem ex uino Aminæo austero pota alium siccit. At uero maza (uocatū est sic polentam ordeacē liquore aliquo subactā, uelut sapa, aut melle, aut alio quopiam) quæ etiā cruda comeditur, quomodocūq; præparatur, minus quam panes ordeacei concoquitur, & uentrē magis flatu implet, & si diutius in ipso moretur, turbationē efficit. Quā enim ordeum ex natura non parum fursuris habet, torrefactum ordeū idipsum fursuracum & siccus, & magis difficulter confringi potens habet, imò & id quod utile ex ipso in corporis alimentū cedit, siccus euadit. Quicquid igitur fursuracū & durum in ipso est, quemadmodum forinfeco apparet quod aqua non dissoluatur, eodē modo neq; in uentre dissoluitur macerātū, sed permanet incoctū uelut est acceptum. Quā igitur neq; concoquitur neq; in uenas distribuitur, per uentrē secedit, & præsertim quā extergēdi uim ex ordeo habeat: magis autem secedit infernē sepius subactā actrita. Si uero & mel assumptum, adhuc citius subit. Porro quod crinnō Græci uocant, crassiorē farina tum tritici, tum zææ existit, magis alit quam polenta, sed ægrius concoquitur. Vocatur ex ea sorbitio puls, & quæ ex zæa fit uentrem lenius alquanto sistit, magisq; si torreatur.

*Crinon, Lilium.*

Lilij flos temperamentum mixtum habet, ex substantia quadam tenuium partium terreæ, ex qua etiam in gustu amaritudinē offert, & quadam aquosa temperata, unde & oleum ex ipso lenis tum discoloriæ, tum mollientis facultatis existit, et ad ueri duritias aptū. Radix etiā ac folia per se trita, siccā & extergunt ac moderatē discutiunt. Est enim radix primi ordinis exterofuorū, qua gratia & ambustis conducti. Radicem itaq; allatam, deinde rosaceo tritā ambustis imponunt usq; ad cicatris inductionem. Nam & aliās omnia ulcera optimè cicatrice inducit. Sed & uentrē emollit, & menses promouet. Folia quoq; præcocta usq; ad cicatricem inductā imponunt, non ambustis solū, sed etiā ulceribus. Reponimus aliquando & foliorum succū coctum cū aceto & melle ad liquidioris mellis copagem, ita ut succi partes quinque sumantur, mellis autem & aceti utriusq; pars una, sitq; com modum pharmacū ad omnia uehementē resiccatione indigentiā citra mordacitatē, uelut sunt uulnera ma-

gna, & maximè quæ circa capitis musculos sunt, itē ulcera inueterata, fluidaq; ac eggrē recipiētia cicatricē.

*Crocodilum.*

Crocodilij semen ære est, & aromaticum, urinā dens, & menses ducens, ut & calidæ facultatis sit diffusoriaq; ac siccatoria. Succus caulis & seminis cōsimilem uim habet, & nephretidis prodest. Radix expulsiōnes è pectore foriter adiuuat. Estq; minus acris quam semen, uerum non minus amara. Sanguinem quoque per nares ducit.

*Crocus.*

Crocus habet quidem aliquid modicè adstrictorium, quod terreum frigidum esse ostensum est. Dominatur autē in ipso calfactoria uis ac qualitas, ut ex tota substantia sua secundū ordinis sit calfaciētum, primi siccantium, & propterea etiam concoctorum quid habet, quod modica illa adstrictiōne adiuuat.

*Crommyon, Cepa.*

Cepa quarti ordinis est calfacientum, substantia ipsius magis crassā partū existit. Vnde & hæmorrhoidas aperit apposita, & cum aceto illita in sole uisitigines exterit, & alopecijs afflicta citius quam alioquin pilos prouocat: comesta calfacit corpus acrimonia sua, & crassos ac uiscosos humores attenuat. Inflat autē uentrē propter crassā partium substantiā.

*Cyamus, Faba.*

Faba frigefaciendo ac calefaciendo mediū temperamētū propinquissimè accedit, caro eius modicæ cuiusdā exteroforiæ facultatis particeps est, quemadmodū cortex adstrictoriæ. Quapropter aliqui medici fabā integram cum corio suo in posca decoctam, dysentericis & colicis ac uomentibus exhibent. Est autem edulij ratione, si quod aliud, ægre concoctile & flatuosum, etiam si quā diuissimè coquatur, & quomodocūq; præparatur, ad excreationes tamē pectoris ac pulmonis cōmodum. Et uiridis quidem faba comesta, magis aluū subit, uerum minus quam arida ingesta nutrit. Torrefacta tamē fabæ flatuosum deponunt, sed ægrius concoquitur, & tardius comedant, & crassum succū generāt. Pharmaci autē loco faba forinfeco impolita, citra molestiā siccit: Est sanè ad podagricos sape ea uis sumus cocta ex aqua, deinde adipe suillo ammixto. Ad neruos uero cōtulos & ad ulcera, farinam eius impositum aceto mulso, aut uino mulso coctā, rosaceo etiam addito, si inflammatio adesse, polēta uero addita, ad inflāmatos tam ex plaga. Est & testium ac māmaram utile cataplasma: Solet enim has partes inflammatas modicè perfrigerare, maximè ubi lacte in ipsis in casei speciem coagulato ubera fuerint inflammata. Nam lac ab eiusmodi cataplasmate extinguitur. Quemadmodum etiam puriorum pubes, farina fabacea cataplasmatas modo inuncta, diuissimè impubis permanent.

*Cyclaminus.*

Cyclaminus uariā uim habet: Nam & extergit, & discit, & uenarū oscula operit, & attrahit, & discit: Succus enim ipsius hæmorrhoidas aperit, & aluum irritat uolenter, appositus. Sic & tubercula, & strumas, & alias duritias discuit, compositionibus disculsiōis ammixtus. conuenit & suffusus oculis cum melle subliquis, & præterea per nares purgat. Aded autem fortū ut prædictus est, ut etiam imo uentri illitus, aluū subducit & foetus corrumpit, sed & in pelsi forma appositus similiter foetus perimit. Tota radice succo

succo imbecillior est. Est tamen etiam ipsa uehemens; Nam pora & apposita menses ciet, & ictericis confert, non uiscus solum ipsum uidelicet secur expurgans, sed bilem in toto corpore per sudores euacuans. Quare ab eius potu adiuuare omnibus modis oportet sudorem excretionem, corpore cōnecto ac uberius calfacto. Copiam eius drachmas tres, aut summum quatuor excedere non oportet, ex passio aut aqua multa. Exterget & cutem, quapropter maculas solares, & alopecias ac similia sanat, prodest & indurato lienī tum recens, tum siccā in cataplasmate imposita. Quidam aridam radicem etiam anhelatoribus exhibēt. Eadem arida tusa & per tenuissimum cribrum excreta, unā cum caryophyllis, ita utraque sit uncia una, caryophyllorum grana  $\times$  x. naribus infusilla, crassos & uiscosos humores à capite purgat, unde antiquos capitis dolores sanat, & morbo comitidis magnopere opitulatur.

#### Cyminium.

Cymini semine præcipue utimur. Est autem facultatis calfactoria, urinam ciet, & status dissipat, tertij ordinis calfacientium existens.

#### Cyperissus, Cupressus.

Cupressi folia & germina pilulæq; recentes ac tenera, magna uulnera in duris corporibus glutinat, ex quo manifestum est quod siccatoriam uim habent, absq; manifesta acrimonia ac caliditate. Plurimam autem habet amaritudinem, & multo ampliorem acerbitatem uniuersa planta. Tancum uero est in ipsa caliditas, quantum satis est ad deducendam acerbitatem in aliu, citra calfactionis aut mordacitatis inductionē. Quapropter humiditates in profundo, in humectis putredinosissq; affectionibus consistentes, citra molestim simulq; securē depascitur, altera non amplius attrita. Atque sic herniosis confert in cataplasmate imposita. Siccāt enim & robur addit corporibus ex humiditate laxis, mergente se nimirum in alium uel adstringendi, quum deducatur per ammixtam ipsi moderatam caliditatem. Vntur ipsa quidam & ad carbunculos ac herpetas polenta ammixta.

#### Cyperus, Iuncus quadratus.

Cyperī radices maxime in usum ueniunt calfacientes ac siccantes citra mordacitatem; Vnde & ulcēra ob nimiam humiditatem ægre recipientia cicatricem, mirabiliter sanāt. Habent enim quid adstrictorium, & propterea oris ulcerationibus commodant. Habent & uim quandam siccatoriam, qua & calculosis profunt, & urinas ac menses ciet.

#### Cypros, Ligustrum.

Ligustri arboris folia & utrugula ac flores in usum ueniunt, mixtæ facultatis ac temperamenti existentia. Habent enim quid diffusorium ex aquosa substantia moderatè calida: Habent & quid adstrictorium, ex terra frigida. Vnde decoctū foui ambustis prodest. Commodat & ignitis inflammationibus ac carbunculis, citra molestiam ac mordacitatem siccās. Sed & commanducata ulceribus oris sponte productis, & maxime ignitis aphthas referentibus cōducunt. Folia siccata in umbra tusaq; ac cribrata, mox in aqua ad calidum cinerē cocta, modico rhoē culinario inspersa, & aceti momento, bonū cataplasma præbent in podagricis ac chiragricis, in ipsis maximis inflammationibus imposita. Nam & inflammationes sedat, & fluxiones repellit, & quod iam in locis cōtinetur

discurit per meatus occultos, quemadmodum per sudorem. Lædit tamen hoc cataplasma colorem, & maxime ungues. Quapropter prælinere locos oportet, liquido rosaceo cerato. Ipsum autem cataplasma inlegendum est ricini folijs, aut carpassi, si adsint.

#### Cytisum.

Cytisi folia diffusoriet sunt facultatis ammixta tepida aquosa, quemadmodum folia maluæ.

#### Conion, Cicuta.

Quod cicuta extremè frigida uim habeat, omnes norunt, & propterea ex summa illa frigefactione etiam enecat ac occidit.

#### Confructus, Nux pinea, Cocalus, Strobilus.

Coni fructus, quem & Cocalum, & Strobilum, ac Pineam nucem appellat, integer quidem utridis, amaritudinem quandam & acrimoniam cum humiditate habet, & propterea pectore suppuratis commodus est; itemq; alijs quibuscunq; ex pectore ac pulmone facilis creatus ac per tussim reiectio expectatur. Nucleus eius qui in cibi usum uenit, alimentum præbet ægre concoctile, ualidum, ac multi succi, propter oleositatem. Verum medicamenti loco asperitates laeuigat, maxime ubi aqua maceratus omnem suam acrimoniam deposuerit.

#### Cancani radix.

Cancani radix uim habet moderatè siccatoriam citra mordacitatem, substantiam autem crassiorū partium meatus obducuntem. Vnde uino macerata uelut tragacantha, & delincta, arteriæ asperitates sanat. Nihilominus si quis ipsam manducet, succus præterfluens arteriæ prodest, similiter ut glycyrrhizes succus.

#### Caucalis.

Caucalim aliqui daucum syluestrem uocāt. Est autem similis ipsi & gustu & uiribus, calfacit enim uelut ille, & siccāt, & urinā ciet, et muria cōdita reponitur.

#### Carpesium.

Carpesium simile est ei quod phu appellatur, & gustu & uiribus, uerum amplius tenuium partium existit, quapropter & magis quam illud exterget uiscerum obturationes, & urinas mouet, & renes expurgat calculosos. Non tamen in tantum tenuium partium est ut pro dinamomo in usum assumi possit, si cinamomo haberi nequeat, quemadmodum Quintus fecit. Præstat quidem igitur Ponticum Laëticū, nō tamen etiam hoc ipsum uiribus cinamomo par est, sed etiam ab optima causa non modico intervallo relinquitur. Vtraq; appellatio à quibusdam Pamphyliæ montibus est, in quibus plurimum prouenit.

#### Al. Lathyri, Cicerule.

Cicerulæ consimilem ochris & phaselis substantiam habent, itemq; similem succum, sed compage crassiorē, & propterea aliquo modo magis hæc quam illa alunt.

#### Lathyris.

Lathyridem tithymalli speciem esse quidam aiunt. Semen eius purgatoriam uim habet.

#### Laplana.

Laplana in cibo accepta mali succi est, in cataplasmate imposita extensorium quid ac diffusorium habet.

#### Lapathum, Rumex, Oxylapathum.

Lapathum moderatè diffusorium uim habet, & sanè caliditatis particeps est. Renum calculos radix eius cōstringit, & scabiem ac corporis asperitates sanat ex aceto cocta & affricata. At uero Oxylapathū mixtam uim

49

uim possidet: Habet enim repulsiuam unā cum discussoria facultate. Semen ipsorum manifeste adstringit, unde & dysenterias & alui profluuiā sanat, præsertim oxylopathi. Ceterum Hippolapathum in paludibus nascitur, eadem ut prædictū, uerum imbecilliore. Syluestris porrō lapathi radix, quam mylen appellat, ex aceto cocta siue uino, dētes corroborat, eorūq; dolores sedat, si eo decocto calido colluatur.

*Limonium, siue Cynoglossum.*

Limonij semen austerum existens cum uino exhibet coeliaci, & dysenterici, & hæmorrhoidis. conducit & ad fluxum muliebrem.

*Lichen siue muscus petrarum.*

Lichen petrarum exterioris simulq; frigefaciētis moderate facultatis est, & sicantis iuxta utramq; facultatem. Sanat impetiginem cognominem sibi apud Græcos morbum.

*Leontopodium siue Leontopetalon.*

Leontopodij radice maxime utimur, discussoria & calfactoria ac siccatoria, in tertio ordine.

*Lepidium.*

Lepidium quarti ordinis est calfacientium.

*Leucoion.*

Leucoij uniuersus frutex exterioriam & tenuium partium uim habet, maxime tamē flores præsertim sicciores. Quare & cicatrices oculorū crassas attenuant, & decoctum ipsorū menses ac secundas promouet, & foetus immortuos expellit. Nam & uiuum perimit foetum in potu acceptū. Quod si quis uehementiam facultatis ipsius multat, aqua mixtura aut aliquo alio eiusmodi liquore mitiget, habebit et ad inflammationes commodum medicamentum. Sic & decoctum ipsius non meracū fuerit, fomento uteri inflammationes sanat, & maxime diuturnitate induratas. Idem cum cerato ulcera ægre cicatricem recipientia curat. Semen ipsdem uiribus prædictum commodissimū est porum duarum drachmarū pondere, aut appositum cum melle, ad ciendos menses, & foetus uiuos quidem corrūpit, mortuos autē eijcit. Radices cum aceto in cataplasmate impostæ, lienes induratos sanant, itemq; induratas inflammationes.

*Leuce, populus alba.*

Populus alba arbor temperamentum mixtum habet, ex substantia aquosa tepida, & terrea attenuata. Unde & exterioriam uim habet. Gustu autem subamara existit.

*Libanotus, Thur.*

Thus calfacti ordine secundo, siccatur primo. Habet & quid adstringit, quod in albo uix percipere est. Cortex ipsius uim adstringendi manifeste habet, ob quam etiam prædare siccatur, ut secundi ordinis siccantium completi existat. Est & crassam partium & minime acrimonie particeps. Ob has igitur qualitates ac uires, usus eius frequens est medicis, in hæmorrhoidis ac stomachicis, profluuijsq; alui, coeliacijsq; ac dysentericis, nō solum his quæ extrinsecus imponuntur, sed & quæ intra corpus humitur ipsum amiscuentibus. Fit ex eo & fuligo hoc modo. Gratum thuris singulatim forde præhectum & aluacerna accētum, in uas fictile cauum nouū imposito, deinde æneum operculum concauū probe deterfum superposito, suppositis tamen ad utrumq; operculi labrū lapillis quatuor digitorū altitudinis, ut locus sit alterum supponēdi granum, prius quā penitus

extinguatur, donec sufficiens fuligo fuerit collecta. Cæterū externa operculi ænei pars assidue per spongiā ex aqua frigida extergeatur, ita enim omnis fuligo adhærebit, operculo nimirum non ualde calcfacto. Derafa itaque priore fuligine per pinnam, idem facies, quousq; collibuerit. Sed & exusti Thuris cinerem priuatim colliges. Melior est autem fuligo. Vim habet inūgatoriam inflammationum in oculis, sedat fluxiones, repurgat ulcera, replet concaua, sistit carcinomata. Eodem modo parantur fuligines & ex myrrha, & ex styrace. Conueniunt ad eadem omnes. Quin & aliarum lacrymarum fuliginem eodem modo colligere licebit.

*Libanotides.*

Libanotides omnes similem uim habent mollitoriam ac discussoriam. Succus autem & radices & herbe melle ammixto, hebetudinis oculorum medetur ex humorum crassitudine oboritis. Sunt enim libanotides particeps exterioriæ ac induratiæ facultatis.

*Lignys, fuligo.*

Omnis fuligo siccatur, quapropter & substantiā terream habet, & reliquias ignis a materia exusta, sed has tamen tempore modico. Totā autem naturā ipsius siccatoria est, terrea & tenuium partium. Partiales eius differentie sunt iuxta materiam exustam, prout ea ipsa calidior aut frigidior aut mordacitatis expers existit. Thuris porrō fuligine utuntur ocularibus compositionibus ammixta, maxime his quæ ulceribus conferunt. Nam & hæc expurgat ipsaq; carne explet. Terebinthinæ quoq; ac myrrhæ fuligo similiter ut thuris nihil offendit. Verum styracis his fortior est, atq; adhuc magis quæ ex pice liquida sit, quam superat adhuc cedræ fuligo. Vtuntur autem & acrioribus, & in palpebris glabris, & angulis oculorum corrosis, oculisq; humectis absq; inflammatione.

*Ligusticum.*

Ligustici radix & semen ex calfacientium ordine sunt in tantum ut & menses moueant, & urinas propelant, flatusq; discutiant.

*Lini semen.*

Semen lini comestum flatuosum est, etiam si sit torrefactum, ita recrementosa humiditate plenum est. Est autem calidū in primo ordine, humiditatis ac frigiditatis in medio consistentis. Stomacho incommodum & ægre concoquitur. particeps est tamen facularis cædi urina. & torrefactū uentrem aliquatenus sistit.

*Lobi.*

De lobis scriptū a nobis est quā de dolichis ageremus.

*Linozōstus, Mercurialis.*

Mercuriali utuntur omnes ad uentris purgationes, ueruntamē si quis eius usum in cataplasmatibus experiri uelit, reperiet eam multum discussoriam. Et semen huius nondum siccatum experientia docet, tubercula & eminentias in corpore, uulgo Carphidia dicta, dissipare, si quis ipsa diligentius semine eo confricat.

*Lonchitis.*

Lonchitidis triangulare semen haste simile habetis, radix urinam ciet. Eius uero quæ scopolendrio similis est, folia uiridia uulneribus glutinandis conducunt. Sicca eadem ex aceto pota, lienes induratos sanant.

*Lycium, Pyxanthos.*

Lycium siue pyxanthos spinosa est planta, ex qua quod Lycium appellat fit, quo ad fugillata utimur, & ad sedis ac oris inflammationes ac ulcerationes herpe



herpetosq; ac putrefactiones, & ulcera maligna, & intertrigines ac paronychias qui sunt unguium abscessus. Habet enim uim siccandi ex secundo ordine, alias ex diuersi generis substantijs cōpositū: Altera tenuiū partiū, ac disculforia & calida: Altera terrea frigida, ex qua & moderatē adstrictionem habet. Quapropter & ad diuersos effectus hoc medicamento uiuuntur, ut exterforio quidem, adsumentes ad ea quae pu pillis tenebris offundūt, ut adstrictorio uero, coeliacis & dysentericis ac fluxui muliebri exhibētes. Cae- terum Indiū Lyciū ad omnia cōmodius existit.

*Lysimachium.*

*Lysimachium* predominantē habet qualitatem adstric- toria, per quam & uulnera glutinat, & eruptiones sanguinis narium cōpescit inperfa, sed & alias san- guinis eruptiones supprimit tū ipsa, tū succus ipsius adhuc amplius. Quare & porus & infusus dysen- terias ac sanguinis reiectionē, & fluxū muliebrē sanat.

*Lotus, Trifolium.*

*Lotus* satius, quem aliqui trifolium uocāt, moderatē extergendū uim habet, itemq; siccandi, uerum in con- tugatione caliditatis ac frigiditatis tēperatus est. At uero syluestris lotus in Aphrica plurimus prouenit. Semen eius secundi ordinis est calfacientium. Habet & quid exterforium. Semen autem Aegyptij etiam ad panificum accipitur.

*Lotus arbor.*

*Lotus arbor* adstrictoriae qualitatis non multae parti- ceps est. Est autem tenuium partiū ac siccatōria. Ra- mentum itaq; lignorum eius, & ad fluxum mulie- brem, & dysenterias, ac coelicas affectiones condu- cit. Coquitur aliquādo in aqua, aliquando in uino, prout usus postulat. & non solum infunditur, sed et- iam bibitur. Atqui & defluos pilos cohibet mode- ratē adstringendo ac siccando.

*M. Macer.*

*Macer* cortex est qui ex India afferitur, adstringēs cum modica acrimonia, quapropter & siccat: Est & te- nuium partiū, propter odorem. & propterea coe- liacis ac dysentericis compositionibus ammiscetur, in tertio ordine siccantium locatus. Iuxta caloris & frigiditatis differentiam nihil insigniter praestans.

*Malabathi folium.*

*Folium malabathi* spīcae nardi cōsimilem uim habet.

*Malache, malua.*

*Malua* syluestris leniter disculforisq; & paululum mol- litoriae facultatis particeps est. Satius pro eo quod aquosa humiditate participat, etiā uiribus debilior existit. Subit autem uentrem non solum ob humi- ditatem, sed & ob uiscositatem, maxime ubi cum oleo & garo accipitur, uino modico cibi tempore irrorat. Semen ipsorum tanto fortius est, quanto siccius. Quin & Dēdromalache appellata huius ge- neris est, sed magis quam praedictae disculforia. No- minatur autem & Althaea.

*Mandragoras.*

*Mandragoras* praedominantem frigidam uim habet, ut tertiū sit perfrigerantium ordinis, particeps est ta- men & modice caliditatis ac humiditatis in malis suis. Vnde & soporatorium uim hāc possident. Ra- didis cortex fortissimus existens, non solum frigefa- cit, sed etiam siccat. Reliquum internū debile existit.

*Marathrum, feniculum.*

*Feniculum* fortiter calfacit, ut ex tertio ordine censeri

possit. Siccat ordine primo, & propterea etiam lac-  
generat, & suffusus oculis iuxta eandem rationem o-  
pūlat. Cier & urinas & menses ducit.

*Mastiche.*

*Mastiche alba* & chia, ex contrarijs quodammodo fa-  
cultatibus composita est, adstringente & molliente.  
Quapropter & stomachi, & uētris, & intestinorum  
ac hepatis inflammationibus conuenit, secundo or-  
dine calfaciens ac siccans. Nigra mastiche quae Ae-  
gyptia appellatur, magis exicat quam illa, & mi-  
nus adstringit, unde & commodior est quodā mo-  
do ad ea quae fortiore disculsiōne opus habent.

*Melanthium, Nigella.*

*Melanthium* calfacit ac siccat tertio ordine, apparet &  
in eo partium tenuitas. Sic itaq; & destillationes fa-  
nat, calidum linetolo illigatum naribus admotum,  
ut assidue odor eius nares percellat. Sed & potum  
flatus uel maxime discuit. Occidit & lumbricos, nō  
modō comestum, sed etiam foris uentri impositum,  
ob amaritudinē. Lepras & clauos ac uerrucas myr-  
medas, hoc est, fornicarias dictas abolet, & menses  
promouet ob crassitudinem & uiscositatem humo-  
rum suppressos, prodest & alopecijs usum, & cum  
oleo tritum, ac illitum. Sic etiam recta ceruice spi-  
rantibus. Et in summa ubi discicare & extergere ac  
siccare calfacereq; opus est, commodissimum medi-  
camentum existit.

*Melilotum.*

*Melilotum* mixtas uires habet. Nam & adstringit, sed  
& discuit & concoquit. Amplius enim de calida  
substantia quā de frigida in se completitur.

*Mel.*

*Mel* calfacit ac siccat secundo ordine. Est autem simpli-  
cis quā maxime tum facultatis, tum temperamen-  
ti, extensoriae uidelicet appellata. Estq; maxime te-  
nuium partiū, praeteritum quod prouenit ubi thymus  
plurimus nascitur. Quum autem tenuium partiū sit,  
necessario etiam quid acre possidet, per quod uentrē  
ad excretionem impellit. Diximus autem quod ex-  
terget, haec itaq; extensoria uis si ipsi adimatur, ma-  
gis ad urinam quēdam commodum reddetur, itemq;  
ad alimentī distributionem ac nutritionem accommo-  
datus. Admī autem optime potest, aqua plurima  
ammixta, & cocto melle, donec spumare desierit, ita  
ut spuma assidue auferatur. Aqua uero mulla nō co-  
cta uentrem subit antequā cōcoquatur. Itaq; senti-  
bus & frigidis corporis tēperaturis mel cōmodum  
est. Verum in aetate uigente constitutis ac calidis, in-  
bilem transit ante cōcoctionem. Mel porrō coctum  
per se, minus acre ac mordax euadit, unde & magis  
nutrit, & ad sinus glutinandos cōmodissimū existit.

*Melissophyllum.*

*Melissophyllum* marubio uiribus simile est, sed multo  
tame ipso inferius, & ob id neq; usus eius ualde ex-  
petitur. Quum enim ubiq; marubium abundet, su-  
peruacaneum est melissophyllo uti. Si tamen nō ad-  
sit marubium, pro ipso succedere potest in eisdem  
usibus, ut tamen efficaciae eius manē memores simus.

*Mecon, Papauer, Thylacitis, Rheas.*

*Papauer* omne perfrigerantem uim habet. Sed hortens-  
sis, thylacitidis Græcis appellata, semen moderate  
somniaferum est. Verum Rheacis semen fortius fra-  
gescit. Quare citra lēSIONEM eo quis nō uidetur. Syl-  
uestris autē semen nigrum existēs, medicatū iam est  
multum

multū frigidatens, maxime Thebani. Sed & succus fortiter perfrigerat, usq; ad suporē & morificationē. Est enim quardi & extremi ordinis perfrigeratū.

*Mecon ceratidis, Papauer cornutum, Paralium.*

Papauer cornutum Græcis etiam paraliū vocatur, quoniam ferē circa mare nascitur. Vim habet sectosiam & exterioriā. Quare radix eius cocta in aqua ad dimidias, hepaticis affectionibus prodest, solia & flores fordida ualde & maligna ulcera iuuat. Sed ab ipsorum usu recedendum est, ubi ulcera fuerint depurata. Nam usq; adeo extergere solent, ut & depurata carne aliquid eliquent, ac consumant, & ob id etiam crustas ulcerum tollunt.

*Mespilum.*

Mespili arboris fructus acerbus est, & uentrem plurimum supprimit.

*Melea persice, Malus persica.*

Malus persica & folijs & ramis amarā qualitatem prædominantem habet, quare & lumbricos occidit trita umbilico impolita, & aliās discusorum medicamentum existunt. Fructus eius periscum appellatum, humidioris & frigidioris est tēperamenti. Caro eius comesta facile corrūpitur, & omnino uiuola est. Quare nō oportet ipsā, uelut aliqui faciunt, à reliquo cibo ingerere. Corruptur enim & uentri innatant. Porro uniuersalis huius regulæ perpetuo memore esse oportet: Quod quęcūq; mali succi sunt, humida autē & lubrica, & quæ facili aluo sedere possunt, ea prius quā alia comedere oportet. Sic enim & ipsa cito subeunt, illisq; uia præstirunt. Quæ uero postrema sumuntur, etiā alia simul corrumunt.

*Melea Armeniace, Malus Armeniaca.*

Armeniace mali fructum præcocia appellant. Est autem humidus ac frigidus hic fructus secundo ordine, ubi sanē fuerit maturus, à persico in hoc differt, ipsoq; præstat, quod non similiter in uētre corrumpitur, neq; accedit. Multis uero et iucundior apparet, & propterea stomacho accommodatior.

*Malus medica, siue citrea.*

Mali medicæ fructus ab omnibus citrium appellatur. Id in semine acidam qualitatem & uim siccatoriam prædominantem habet, ut tertiū ordinis sit siccantiū ac perfrigerantiū. At uero in cortice habet quidem siccatoriam uim in secundo ordine, nō tamen frigidam qualitatem, propter aromaticitatem. Caro ipsius crassi succi est & frigida, ob duritiem: semen autem penitus edi non potest, neq; quod acidum esse diximus, neq; eius nucleus qui reuera semē existit, amarā qualitatem, & discusoriam ac siccatoriam uim in secundo ordine habens. Sed & folia siccandi ac discutiendi facultatem habent.

*Malva omnia.*

Cæterū in alijs malis magna est differentia. Quæcūq; enim adstringunt, frigidum ac terreum succum habent: Quæ uero acidā apparent, frigidum quidem, sed tenuium partium habet, mediæ autem temperaturæ sunt dulcia, ad caliditatem repentiā. Austerorū igitur malorum usus est, quum aut ob intemperiem calidam aut humiditatem multam, uētre debilis est. Acerborum uero, ubi eadem multum fuerint aucta, nam adstringentia quantum in ipsis est, suppriment infernas excretionē. Acidā autem cient. Quum igitur suspicio fuerit crassum humorem in uentre collectum esse, non ualde frigidum, hæc exhibebis. Nam

& hunc desiccant & infernē subducunt, & propterea excremenā humedant. Vbi uero purum repererint uentriculum, ipsū amplius suppriment.

*Meon.*

Mei radices in usu sunt in tertio ordine calfaciētes. Siccant in secundo, humiditatem retrimentitiā in se complectæ, Vrinæ itaq; cient, & menses prouocant potius: Amplius acceptæ capitis dolorem inducunt, & propter humiditatem, flatūs.

*Morus, Mora, Sycamina, Sycomorā.*

Mori arboris fructus, ficamina & sycomorā frequenter à plerisq; Græcis uocatur. si quidem igitur manura & ante reliquum cibum in uentriculum purum ingerantur, celerimē per intestina cedunt, & alijs cibis uiam præstirunt. Verum post cibum acceptæ, aut uitatum humorem in uentre reperientia, celerimē corrumpuntur, & peregrinam quandā, quæ dici commodē non possit corruptionem inducunt, similiter ut cucurbitæ & pepones, ubi non fuerint cocostati. Tempus usus moris est itidem ut peponibus & cucumeribus, ubi siccum & calidum fuerit uētriculi corpus, & ex necessitate etiā hepatis. Tunc enim fo-lummodo omnis uis huiusmodi utiliter quis utetur, & ubi quis lōgo itine aut multo ardore fuerit defatigatus. Tunc enim profunt squalorem corporis rigantia, & moderatē perfrigerantia. Mora immatura sole siccata diligenter ac reposita, cōmodum adstrictorium medicamentum exhibent, ut etiā dysenterias sanent, & affectiones coeliacas, & alias fluidas. Tunduntur autem & obonijis mīscētur, quemadmodum Rhōis fructus. Bibuntur etiam cum aqua & uino. Cæterum cortex radicis arboris purgatoriam uim habet cum quadā amaritudine. Quare & latum lumbricum occidit seruatus cū uino, eoq; calido meraco potio cyathi mēsurā, & diu suppresos menses prouocat.

*Myccetes, Fungi.*

Fungi frigidum ac humidum abunde edulium sunt, unde & propē ad uenenatorem uim accedunt, & sanē quidam ex ipsis occidunt.

*Myos otis, Auricula muris.*

Muris auricula siccatur ordine secundo, nullam manifestam qualitatem habens. Succus eius cyathi mensura cum zytho potus, lumbricū latū efficaciter expellit.

*Myrica, Tamarix.*

Myrica incōlisior & exterioriam uim abunde possidet, citra manifestam siccationem, habet & quid adstrictorium, & ob has facultates lienibus induratis conduct, radicibus aut ramulis aut folijs cum aceto aut uino coctis, fructus & cortex non modicæ adstrictionis participes sunt, simulq; extergent, & tenuium partium existunt. Vt ita myricæ cinis siccandi uim acquirit.

*Myrsine, Myrtus.*

Ex contrarijs hæc planta composita est substantijs, prædominantem tamē in ipsa terreum frigidum. Habet & quid tenuium partium calidum. unde fortiter siccatur, & omnes partes ipsius refringendi uim habet, tum forinsecus corpori imponitæ, tum intrā assumptæ.

*Moly, Ruta syluestris, Harmala, Belsa.*

Moly aliqui rutam syluestrem uocant, aliqui harmala. Syri Belsā. Vis eius tenuium partium & calida est tertio ordine. Vnde & secatur & discutitur crassos & uiscosos humores, & urinam promouet. Qui ruri ha-

bitant utuntur eo in diuturno capitis dolore, aqua coquentes, & caput inde rigantes. Similiter & ad reliquas corporis partes perfrigeratas.

Nardostachy, Nardi spica.

Nardi spica primo ordine calfacit, siccit secundo completo. Composita est ex substantia multum adstringente, & acri calida non multa, & quadam modica subamara. Quare & ad iecur & ad stomachum merito conducit, pota & forinsecus imposita. Urinas ciet quoque, & stomachi morfus sanat, & fluxiones ventris ac intestinorum reficac, itaq; capitis & pectoris, fortior est Indica, nigrior quam Syriaca existens.

Nardus Celtica.

Celtica nardus consimilem in genere uim cum praeditis habet, sed ad omnia debilior est, praeterquam ad urinas cendas. Est enim calidior illis, sed minus adstringit.

Narthex, Ferula.

Ferula semet attenuat & calfacit. Interna eius pars, medulla appellata, adstringentis cuiusdam qualitatis particeps est, ob quam haemoptoicis & coeliacis prodest.

Napy, Sinapi.

Sinapi calfacit ac siccit quarto ordine. Optimum est Aegyptium aut Syriaci, & quod mole minus est, & minus cruent coloratum.

Narcissus.

Narcissi radix siccatoriam in tantum uim habet, ut uulneta magna glutinet, etiam si tendines sint consili. Habet & quid exteriorum ac attractorium.

Nerium, Rhododaphne.

Nerium aut Rhododaphne frutex est omnibus notus, qui si forinsecus corpori in cataplasma imponatur, discussoriam uim habet: Si uero intra corpus sumatur, perniciosus & uenentis non solum hominibus, sed & plurimis pecoribus existit.

Nymphæa.

Nymphæa radix & semen uim habet siccatoriam leuem: Itaque & uentris fluxiones, & seminis per somnum effluxum, aut si etiam alias immoedice ferantur, sistunt. Profunt & dysentericis. Cæterum Nymphæa quæ albam radicem habet, uehementioris facultatis est, ut & muliebrem fluxum sanat. Bibitur & ipsa & quæ nigram radicem habet, in uino nigro austero. Possident & quid exterioris facultatis, unde & uisilignes sanæ aqua rigatæ, & alopecias cum liquida pice, præstat ad hæc quæ nigram radicem habet, ad reliqua quæ albam.

Xanthium, Lappa, Phasganion, Philantropos, Choëradolothron.

Xanthium, quidam phasganion, quidam philanthropon, alij choëradolothron appellant. Semen eius discussoriam uim habet. Decoctum corticis radices potum lienes consumit, & dætes motos firmat eiusdem decoctum ex uino collatum.

Xiphion, Gladiolus.

Gladioli radix praesertim superior, uim attractoriam, discussoriam, atque adeo siccatoriam habet.

O. Oenos, Vinum.

Vinum ex secundo ordine est calfacientium. Antiquum ualde, ex tertio, quemadmodum nouum mustum, ex primo. Eadem proportio est siccitatis ad caliditatem. Quandoquidem uero plurimas in uino differentias reperimus, distinguendum est de ipsis quam brevissimis id fieri potest. Rusa itaque & crassa ex

omnibus ad sanguinem generandum commodissima sunt, ut quæ parua egerant in sanguinem irasmutatione. Deinceps nigra simulq; dulcia ac crassa. Deinde colore quidem rufa aut nigra, compage uero crassa & habentia simul adstringentem qualitatem. His minus ualent alba, simulq; crassa, ac acerba, ad nutritionem: Minime uero omnium aliter colore alba, compage tenuia, & quodam modo aque similia. Concoquantur autem in uentriculo & magis distribuuntur dulcia quam austera, ut pote calidiora ut prædita, sed & uentrem magis subducunt. Cæterum ualde de crassa, & tardius concoquantur, & tardius in corpus distribuuntur, ubi autem uentriculum robustum nacta fuerint, ut probe concoquantur, amplius nutrimentum corpori præbent. Manifestum est autem quod & aluum sistunt, & urinae cientes incommoda existunt, in quibusdam crassum succum generantia. Quædam ex ipsis etiam iecur & lienem ac renes oburant, atq; inde aliqui in aquam inter cutem incidunt, aliqui & calculo laborant ex nimio ipsorum usu, & praesertim senes. Optimum uinum est, & sanis, & ex morbo recolligentibus commodissimum, quod colore rufum, compage tenue, & leniter subadstringens existit.

Oxos, Acetum.

Acetum mixtas substantias frigidam & calidam, utraq; tenuium partium habet. prædominatur tamen in ipso frigida substantia, quemadmodum in principio huius libri prædiximus. Est autem medicamentum abunde siccatorium, ut tertij ordinis sit completi, ubi sanè forte extiterit.

Opos, Laser, Succus Cyrenaicus.

Laser siue fucus Cyrenaicus, omnibus alijs calidior & magis tenuium partium existit, & ob id etiam magis discussorius. Verum tamen & alij calidi sunt ac statuosii, hoc est Medicus & Syriacus, quem Laser appellant.

Origanum.

Origani herbae tres sunt species, omnes incisoriae & attenuatorie, siccantissq; ac caefacientis facultatis in tertio ordine. Tragoriganus autem aliquid adstrictorium assumpsit.

Oxychoanos, Iuncus acutus.

De iuncu acuto dicitur in schoeni, hoc est, iunci mentione.

Orobis, Eruum.

Eruum siccit secundo ordine intenso, calfacit primo. Quantum autem amaritudinis particeps est, tantum siccit, & extergit, & obstructione liberat. Amplius sumptum sanguinem per urinam expellit.

Orobanche.

Orobanche frigidi ac siccit temperamentum in primo ordine est.

Oryza.

Oryza habet quid adstrictorium, quapropter uentrem supprime. Est edulcimentum ægre concoctile.

Orchis cynos, Testiculus canis.

Orchis herba, quæ cynos orchis, hoc est canis testiculus dicitur, duplicem radicem bulbosam habet, humidam & calidam, quapropter etiam sapore dulcis est, & maior quidem radix ob multam humiditatem, ad uenerem stimulat pota. Minor uero ad siccitatem repens impetus ueneris compescit.

Orchis altera.

Orchis altera, quam serapiada uocant, sicciorẽ priorẽ uim habet; quare ad uenerem non similiter comoda est. Laxos

57

est. Laxos autem tumores in cataplasmate discutit, & ulcera fordida purgat, & herpes sanat. sicca uero & putrefactis & malignis ulceribus medetur. Nā & subadstringens quid habet, per quod aluum super prurit cum uino pota.

*Osyris.*

Osyridis herbae ex qua scopae fiunt, amara est qualitas. Verum uis obstruente liberans. unde & malignas circa secur obstructions resoluunt.

*Pancration.*

Pancratij radix & sapore & uiribus Scillae similis est: quare aliqui etiam utuntur ipsa, scilla non praesente, uerum multo debilior existit.

*Paliurus.*

Paliuri folia & radix adstringentem non obscure uim possident, quapropter & fluidum uentrem sistunt. Discussoriam autem in tantum habent, ut & tubercula curent, quae sanē non ualde inflammata ac calida existunt. fructus incisiorie facultatis eiusque est particeps, ut uescit calculos & confringat, & expurgat, & resectionibus ex pectore ac pulmone auxiliatur.

*Panax Herculeus, Opopanax.*

Panaces Herculeus est, ex quo Opopanax appellatus sit. qui succus calidus est & discussorius in tertio ordine, sicus in secundo. Cortex radicis siccus & calidus, sed minus quam succus. extergit tamen, & propterea ad ossa denudata, & ulcera maligna conducti. Exterget enim & siccatur, & carne replet citra mordacitatem. Semen calidum existens menses ducit.

*Pentaphyllon, Quinqueseplum, Mercurij herba.*

Quinqueseplum, quae Mercurij herba dicitur, radicem habet siccantem in tertio ordine, minime uero acrem. quapropter multi usus est & tenuibus partibus praedictum.

*Peplion.*

Peplij semen in usu est: Ducit bilem unā cum pituita. flatus quoque discutit uelut Hippocrates scribit.

*Pepon.*

Pepon maturus substantiae tenuioris est: Immaturus crassioris, absterforia autē et incisoria facultate participat. Vnde & urinā ducit, & corpus illustrius reddunt, praesertim si quis semen siccet, deinde tuso & cribrato pro smeigmate utatur, ad maculas solares, & faciei lentiginis, ac uirilgines in superficie herentes. Dominatur in ipsis humida & frigida temperatura, suntque secundi ordinis in utraque. semen & radix sicca secundi ordinis initio consistunt. Vis exterioria amplior est in radice quam carne. Caro comesta unā cum extersione & urinas ducit, & infernē secedit magis quam cucurbitae. ut a uero semen magis extergit, ut etiam calculosis renibus conducatur. Ceterum uisiosum succū in corpore gignit pepo, magisque si non probē concoquatur. Tunc enim cholericis quibus & supernē & infernē bilis prorumpit, efflere solet. Nam & prius quam corrumpatur ad uomitum aptus est, si amplius edatur, & si quis non ab eius usu boni succi edulium ingerat, omnino uomet.

*Piper.*

Piper recens pullulans, longum est. quapropter & humidius existit. Quod uero uelut fructus immaturus est, album piper est, acris nigro existens. Nigrum enim uelut superassatum iam & superreficatum est. Virumque autem fortiter calfacit ac siccatur.

*Peristereon, Verbenaca, Veneris herba, Sacra herba.*

Verbenaca, quam peristereona, & ueneris herbam, ac sacram herbam appellant, capitis dolorem egregie tollit, inquit Archigenes, coronae modo impolita, trita quoque cum aceto & rosaceo illita, & cocta cum oleo, indeque rigato capite, omnem ueterē capitis dolorem sanat, & defluos capillos cohibet. Decoctū radicis calidum ore retentum, dentium dolorem sedat, & moros dentes firmat, & oris ulcera sanat. Ceterū ad colicos radicem crassius tufam ex aqua ad dimittas coquito, & ad dies quinq; potui dato. Constat hoc experimento. At uero calculosis & incipienti elephantiāsi, decoctum similiter dato ex aqua mulla. Vtere similiter & ad comitalem morbum, & ad febres quotidianas ac quartanas. Verū ad podagricos & Ischiadicos in uino decoctā exhibebis. Radix exuata fistulae optime colluunt, maxime mori succo & melle ammixto. Eadem radix uita itemque sicca inspersa, fistulas sanat. Quin & melle cocto excepta, fistulae collyrij modo indunt, & praeter opinionem opitulatur.

*Persea.*

Perseae folia adstringentis facultatis moderate participia sunt, ut & partibus de quibus sanguis erumpit, commode imponi possint. Eadem arida trita pruritus sedant afflicta.

*Perdicias.*

Perdicias relata est in quinto elemento, ubi Elxinen ipsam appellauimus.

*Peonia.*

Peonia relata est in tertio elemento, ubi glycyfiden ipsam appellauimus.

*Petroselinum.*

Petroselinum semen maxime in usu est. Herba ipsa imbecillior existit. Semen calidum est & siccum tertio ordine, & incidendi uis praeditum. Itaque menses ducit & urinas uertim, in superque flatus discutit.

*Peucedanum.*

Peucedani radice maxime utuntur, liquoreque ac succo eius. Omnia eandem uim habent. fortior est autem succus multum calfaciens ac discutiens. Vnde & neruorum affectionibus conuenit, & morbis pulmonis ac pectoris, ex crassitudine aut uiscositate humorum obortis, tum intra corpus sumptus, tum odoratur. Quo modo & lienes induratos sanat. Radix uisus ad eadem competit, sed & ossium squamas celerim disparat. & sicca malignis ulceribus inspersa optime medetur, purgat enim & incarnat, & ulcus ad cicatricem perducit, calefaciens quidem ordine secundo, siccans autem tertij initio.

*Peganum, Ruta.*

Ruta syluestris quarti ordinis est calfacientium ac siccantium, satiuata. Estque non solum acris, sed & amara, unde & uim secundi ac discutienti crassos & uiscosos humores habet, & per urinas euacuat. Et sanē tenuius quoque paritum est, & flatus discutit, & ob id inflatibus conducti, & uenericos imperus supprime, ac praecclare siccatur. nā inter medicamenta fortiter siccantia censetur. Rufus haec uerba producit: Syluestris rutae uis ignea est & ulceratoria, maxime uesciae. Quapropter etiam qui podagricum pharmacum bibunt, ex ruta syluestri costans male affectam uesciam acquirunt. quicunque tamen hoc medicamentum sustinuerint, manifestam opem ferunt. Nam ad arthriticis praecipue

pue cōmodum est. Quod si de satia ruta quid am-  
miferis, securius erit, quamquam & ipsa satia ue-  
sicae incōmodat, sed minus quā syluestris. Vt mur  
syluestri in quibus perfrigeratur quid refouere uo-  
luimus. prodest & hydropi flatuoso, & ei qui sub-  
tercus appellatur, prodest & morbis à uisera aut mu-  
re aranco, & magis si prægnaus mus araneus mo-  
morderit, & praeterdum animalia subiugalia. Est &  
forte medicamentū ad papaueris succū potum, & ad  
aconitū cū uino. Satia ruta rigores per circuitū re-  
petentes mitigat pota ante accessiones. mitigat & cō-  
licos dolores porū & insulsum, itemq; uteri strangu-  
latus, Visum acuit in cibo sumpta, & propterea pī-  
ctores assidue eam degustantes, acutius cernūt. Quin  
& melle mixtus succus ipsius, medicamentum euadit  
uisum excutēs. Auxiliatur & urinae difficultati co-  
cta ex oleo, indeq; uesica fota, neq; est aliud medica-  
mentum quod huic hac parte praetuleris. Ceterum in  
lumborū dolore & spirādī difficultate, data ex aqua  
mulla confectum opitulatur. In lethargicis pora &  
insula per clysterem, ualde cōmodat. Sed & tritam  
cum rosaceo & aceto capiti ipsorū illinere oportet.  
Solut & coxendicum dolores pora, & in cataplas-  
mate impolita, & insula per sedem. In cataplasmate  
impolita podagricis genua inflata habentibus, citō  
auxiliatur, & dolores mox lenit. Crustas etiam car-  
bunculorum citō disparat, in cataplasmate impolita  
cum melle aut uuis pafis.

Pix.

Pix arida siccit & calscit secundo ordine, plus autem  
siccat quā calscit. Liquida cōtrā plus calscit quā  
siccat. Habet & quid tenuiū partiū, quo & anhelos-  
sis, & suppuratis pectore opitulatur. Satis est delin-  
xisse cyathi unius mensuram melle ammixto. Habet  
utraq; & exteriorum quiddam, & cōcoctōrium, ac  
discussorium. Quare & scabros ungues extrahunt  
addita cera, & impetigines exterunt. Cōcoquunt &  
duros ac crudos tumores omnes cataplasmaus am-  
mixtae. Ad omnia haec praestat liquida. Sicca ad haec  
deterior est, sed ad uulnera glutināda accōmodatior.  
Fuligo ex liquida pice sic paratur. In lucernā nouam  
funtulo instructā ellychnio, liquidā picem mittes,  
incensamq; ac sicili uale operta, uelut in thure distū  
est, fines, & priore cōsumpto liquore, aliū infundes,  
donec fuliginē sufficiēte collegeris. Vius est ad palpe-  
bras ornādas, & ubi pilos producere oportet, & ad  
oculos imbecillos ac lacrymosos & ulcerosos.

Pistacia.

Pistaci fructus substantiam tenuiū partium habet, quē  
& subamarum quiddam & aromaticum in se com-  
plectitur. Quapropter obstruat expedit & expur-  
gat, praesertim circa iecur, imō & pectus & pulmonē.

Pityides, Nux pinea, Nux picea.

Pityides appellantur fructus pinorum, quidam etiam  
picearum sic appellant. Sunt autem mixte facultatis,  
nimirum & adstringentis, & acrimonium quandam  
cum amaritudine polysidētis. Vnde & reiectionibus  
ex pectore ac pulmone conferunt.

Pini cortex.

Pini cortex praedominatē uim adstringentiam habet,  
in tantum ut intertrigines inspersus optime sanet,  
& ambusta ad cicatricem perducatur, & aluum fluidum  
supprimat si poterit. Sed & piceae cortex huic simi-  
lis est, uerū uiribus debiliior. Vtriusq; arboris folia

uim glutinandi uulnera habent. Fuligo porrō ex his  
ad palpebrarū defluuia, & humectos acerosos ocu-  
lorum angulos, itemq; lacrymosos uulit est.

Platanus.

Platanus humidiorē ac frigidiorē substantia non mul-  
tum à moderatis abscedit. Vnde et folia uiridia trita  
in cataplasmate impolita, inflammationibus quae ad  
huc generantur non obscurē opitulatur. Cortex eius  
& pilulę sicciorē uim habent. Quare cortex quidem  
aceto coctus, ad dentium dolores adhibetur. Pilulae  
uero cum adipe, ad ulcera ambustorum. Quidā cor-  
ticem exurunt, & medicamentum exteriorum effi-  
ciunt, quod cum aqua quidam sanat lepras. Ipso au-  
tem cinere per se insperso, ulcera uetera & ob nimia  
humiditatem fordida curantur.

Polygonum.

Polygonum habet quidē & adstringentium quiddam.  
Dominatur autē in ipso aquosa frigiditas, ut secūdi  
ordinis sit complet, aut tertij incipientis inter frige-  
facientia. Vnde et stomacho exusto prodest, foris in  
cataplasmate impolito, quemadmodū & calidis in-  
flammationibus. Fluxiones enim repellit. Quare &  
herpeti commodum pharmacum est, & ulcerum o-  
mnium, maximē inflammatorum & fluidorum, item  
quae in auribus sunt, nam pus resiccat. Siftit & flus-  
sum muliebrem, & dysenterias, ac sanguinis reie-  
ctionem. Ad omnia uero masculinum ualidius est &  
praestantius.

Polemonium, Phileterion, Chiliodynamon.

Polemonii alij phileterion, alij chiliodynamon uocāt,  
tenuium partium & siccatorum uim habet. Quare qui-  
dam radicem ipsius cū uino ischiadicis, & dysenteria-  
cis, & ad indurata lienem bibendam praebent.

Polium.

Polium amarū est & mediocriter acre, itaq; omnia uis-  
cera obstruione liberat, & menses ac urinas ciet, &  
uiride quidem glutinat uulnera, siccum autem malis-  
gna ulcera sanat. Praesertim minus polii, quo & ad  
antidotos utitur. Nā & amarius est, & acrius quā  
malus, ut tertij ordinis sit siccantium, secūdi comple-  
ti calscientium.

Potamogeton.

Potamogeton adstringit & frigefacit, similiter ut po-  
lypodium. Verum crasiorum partium substantiam  
quā polygonum habet.

Polypodium.

Polypodium dulcem simulq; austeram qualitate pra-  
dominantem habet, ut uim habeat multum siccitatem  
citra mordacitatem.

Prasion, Marrubium.

Marrubium calscit secundo ordine cōpleto, siccit ter-  
tio cōpleto. Iecur & lienem obstruione liberat, pec-  
tusq; ac pulmonem expurgat, & menses prouocat,  
& istericos per nares purgat. Facit & ad aurium do-  
lores iam inueteratos. In cataplasmate impoliti ex-  
terget & discutit.

Prasum, Porrum.

Porri acē uim possident uelut cepae, & iuxta propor-  
tionem calscit corpus, & crassos in ipso humores  
attenuant, & uiscosos secant. Cient & urinā & san-  
guinem expurgant. Optimus usus est ipsorū bis co-  
ctorum. Nam sic comesta acrimonia exuunt, & suc-  
ci uitium non amplius habent. Abstinentum est autē  
à frequēti usu omnium acrium, & praesertim si is qui  
accipiat

adipiat natura biliosior existat. Solis enim his qui pituitosum humorem, aut crudum, aut crassum, aut viscosum coaceruauerunt, hæc edulia comoda existunt.

*Propolis.*

Propolis exterioriam uim non ualida habet, attractoria autem satis ualent. Est enim substantia tenui parietum, & calcastris secundo ordine copio, aut tertij initio.

*Ptelea, Vlmus.*

Vlmi folijs aliquando uulnus recens glutinauimus: adstringunt enim & extergit. Cortex eius amarior est, & magis adstringit, quare & lepram sanat cum aceto. Radices eandem uim habent, unde quidam decocto earum fracturas fouent ad callum recipiendum.

*Pteris, Filix.*

Filicis radix in usum uenit: occidit enim lumbricos laesos quatuor drachmarum pondere in aqua mulla posita. Foetus quoque uiuos quidam enecat, mortuos uero expellit, sed & ulceribus inspersa, ea citra mordacitatem siccant.

*Pyrethrum.*

Pyrethri radix maxime in usu est, uisoria uim habens, per quam dentium perfrigoratorum dolores lenit, affricatur & cum oleo in rigoribus per circuitum repetitis, ante accessionem. Stupescit etiam ac resolutus conducit.

*Pyri, Triticum, Amylum.*

Triticum extrâ impositum primi ordinis est calfacientium, & tamen neque siccare manifeste neque humectare potest. Quod ex ipso fit amyllum, frigidius & siccius ipso euadit. Amyllum ideo dictum, quod sine mola fiat. Panis triticeus cataplasma discussoria uim habet, nimirum quum sal & fermentum panis assumperit. Habet enim fermentum uim attractoriam ex alto, simulque discussoriam.

*P Rhamnus.*

Rhamnus secundo ordine siccant, frigiditatem primo completo, aut secundi initio, unde & herpetas sanat, & erysipelata non ualde calida.

*Raphanus.*

Raphanus calcastris tertio ordine, siccant secundo. Discussoria uim habet adeo ut iugillata diuturna, aliaque liuescacia sanet cataplasmatim modo impositus. uerum obfonsio magis quam alimentum, attenuatis facultatis est simulque calcastris. Quare merito mirari subit illos qui à cœna ipsos crudos edunt, bonæ cœcoctionis ergo. Extremi ipsi magni eius rei experimētū se fecisse iactant, uerum nemo citra læsionē ipsos imitatus est.

*Rheon Ponticon, Rha.*

Rheon ponticon aliqui rha appellant, mixtam autem facultatem habet, adstringentem & calfacientem, & tenuium partium. Unde & rupta, & cœuulsa, & erecta ceruicæ spirationem emendat potum. Hæmoptoicis item ac coeliaci & dysentericis prodest. Impegitines quoque & liuescacia per sanat, cum aceto illitum.

*Resine omnes.*

Omnes resine siccant & calfaciunt. Differunt inter se secundum quod magis aut minus habent acrimoniæ in sapore, & calidæ facultatis, & simili modo iuxta alias qualitates, quod aliarum magis, aliarum minus participes existunt. Omnibus autem præferunt lentissima, mastiche appellata, propterea quod parum adstrictionis possidet, ut & stomachi & uentris ac hepatis debilitati conducatur, insuperque & citra molestiam siccet. Est autem maxime tenuium partium, minimeque acris.

Inter reliquas terebinthina principatum obuenit, non similiter ut mastiche adstringens, sed discutit magis quam mastiche, & extergit in tærum, ut & scabiē deterat, & ex alto attrahat, magis quam cæteræ resine, quod etiam magis tenuium paruum existat. Habet & quid mollitiorum amplius quam mastiche. Aliæ porro omnes resine acriter hanc sunt, pro maioris ac minoris acrimoniæ ratione. Siccissima omnium resinarum est sicca pinus resina, quam priuatim pinus phyllea appellat.

*Resina quomodo urantur.*

Uirtus omnis resina liquida in quadruplici uase, liquois infundendi respectu. Oportet enim resinae quidem congiugium unum, duos uero pluuiialis aquæ in cacabum distendere, & ad prunas leniter coquere, assidue agitando, donec resina odorem perdat, irriabilis fiat, & penitus exareseat, ut etiam digitis confringi possit quod ubi contingit, refrigerata in fictili uase repones. Fit autem hoc modo excellenter alba. Oportet tamen uendam resina prius excolare, & sordes ab ipsa separare. Utuntur & citra aquam, primum quidem eliquata: ac colata, deinde coctæ ad prunas per totum diem, assidue agitando, & ubi penitus expirant tota luntur, ac reponuntur uelut dictum est. Excipitur ex resina etiam fuligo, ueluti in thure prædictum est, & confert ad calibelephara, quæ ornâdis palpebris deservunt, & ad lacrymosos oculos, & corrosos ipsorum angulos, & glabras oculorum genas. Torrefacta uero resina utilis est ad odorata malagmata iteque acopa appellata.

*Rose.*

Rosarum facultas ex aquosa calida, duabus alijs qualitibus ammixta, adstringenti uidelicet & amare, composita est. Flos ipsarum adhuc magis quam rosæ adstringitior est, & propterea etiam siccandi ut prædictus.

*Rhododaphne.*

De rhododaphne diximus, ubi nerion ipsam appellauimus.

*Rhoa, malum punicum.*

Omne malum punicum adstringit et facultatis particeps est, non tamē ut ea omnino prædominetur: sunt enim aliqua ex ipsis acida, quædam dulcia, quædam austera. Quare ex his quæ in malorum tractatu diximus, etiam de his cōiectare licet. Succum autem ubertore habent quam mala aut pira, saporemque insuper iucundiorē quam illa habent, & aliquando ad plures affectiones quam illa commodant, cum alias, ut siquædo stomachus ob uisitationum humorum redundantiā morsum percipit, quo sanè tēpore succus ipsorum cum polenta exhiberi debet, uelut Hippocrates in scimna cardialgus faciendum præcepit, quæ uidelicet oris uentris morsum & dolorem percipiebat. Adnū punicorum magis adstringunt quam succus, magis quoque siccant, his uero amplius adhuc cortices. Quibus consimilem uim etiam cytini possident.

*Rhus.*

Rhois folium adstringit et siccant, hoc coriarij tinctores utuntur. Medicis frustum & succus magis in usum ueniunt, multum austera qualitate habentes. Siccant enim ordine tertio, perfrigerant secundo.

*Rhypos, Sordes, Patos.*

Sordes à statu gymnasiarum discussoria est & molestioria eudorum tuberculorum. Quæ uero in palæstris colligitur, patosque Grecis appellatur, optimū



medicamentum est inflammatarū mammarum. Nā & feruorem extinguit, & influentia reprimis, & cōtentum discutit.

Σ *Sagapenum.*

*Sagapenum* succus est calidus & tenuum partium, uelut reliqui succi. Habet & quid exteriosū, per quod cicatrices in oculis depurgat & attenuat. Quin & suffusionibus & hebetudini usus, ex humorū crassitudine obortis commodum pharmacum existit.

*Sampfuchum.*

*Sampfuchum* tenuum partium ac diffusorium uim habet, siccatur enim & calidat tertio ordine.

*Saprotēs xylon, Caries lignorum.*

*Caries* ac putredo lignorum, maxime eorum quæ ad strictionis simulq; extersionis participia sunt, uelut est ulmus, humida ulcera optime purgat ac replet.

*Sarcocolla.*

*Sarcocolla* lacryma est arboris persicæ, mixtis uiribus prædita, ex substantia quadam meatu obducitur, & modica quadam amara. Vnde leuiter siccatur, & sic uulnera glutinat.

*Satyrium.*

*Satyrium* quidā etiam trifolium uocant, humidum est & calidi temperamenti, quapropter & gustantibus dulcem apparet. Superflua tamen & flatuosam humiditatem possidet, & propterea ad uenerē stimulat. Quod etiam radix herbæ facere solet. Quidam tradunt etiam opisthotonum, hoc est, neruorum errorum distentionem per ipsam sanare ē uino austero potam.

*Selinum, Apium.*

*Apium* in tantum calidum est, ut & urinas & menses cieat. Flatus quoq; discutit, & magis ipso semine.

*Seris, Cichorium, Picris.*

*Seris* siue cichorium subamarum olus est, & magis utiq; syluestre, quod propterea pteris Græcis appellatur. Est autem syluestris, frigida & sicca temperaturæ primo ordine. Sadiua magis frige facit quam syluestris, uerum ob multæ humiditatis mixturam, siccandi uim perdit. Vtraq; autem adstringendis qualitatibus participes est, quædammodum & chondrilla. Nā & hæc seridis species existit.

*Seseli.*

*Seseli* radix & semē in tantū calfaciūt, ut urinae cientes sufficiant. Est autē tenuiū partū, ut & morbo comitiali, & inspirationi quæ recta ceruice fit, conducatur.

*Sesamum.*

*Sesamum* nō modicā uiscositatē & pinguitudinē in se habet, unde & meatu obducit & mollit, & moderatē calidū est. Eandē uim habet & oleum ex ipso.

*Sideritis.*

*Sideritis* habet quidem quid exteriosum, sed maior pars ipsius humida est, & moderatē frigida, estq; modicæ cuiusdā ad strictionis participes. unde & inflammationes arcer, & glutinandi uim habet.

*Sicya, Cucumeres.*

*Cucumeres* faciliū urinā ciēt, uelut etiā pepones, sed minus quam illi, propterea quoddā & substantia ipsorum minus humida quam illorū existat, & ob id neq; ita facile corrumpuntur in uentre uelut pepones. Quidā ipsos cōcoquūt familiaritate quadā naturæ ad ipsos, & ubi in hoc consiliū securē eos ingererint, ignorant quod corporis progressu uitiosum & moderatē crassum succū, ex ipsorū usu in uenis coaceruarūt, qui sanē succus ubi putrescere inceptit, febres malignas

inducit. Quapropter ab omnibus mali succi edulibus abstinerē cōsultū esset, etiā si aliqui faciliē ipsa cōcoquāt.

*Sicyos agrios, Cucumis syluestris, Elaterium.*

*Cucumeris* syluestris feminis succus siue liquor, qui elaterium appellatur, imō etiam radice & foliorū succus, uiles sunt ad medendum. Elaterium itaq; menses ciēt, & focus appositum perdit. Summē enim amarum est, & modicē calidum, ut secundi ordinis sit calfacientium. & ob id etiam diffusoriā uim habet. Itaq; & angina laborantis quidam ex ipso illinunt. Infunditur & ictericis in nares cum lacte muliebri, atq; hoc modo etiam capitis dolores sanat. Ceterum succus radice & foliorū imbeddior est quam feminis. Sed & ipsa radix consimilem uim habet. Nam & extergit, & discutit, & mollit. Verū cortex ipsius maiori siccatoriā ui præditus est.

*Silphium.*

*Silphii* calidissimum quidē succus est, sed & solia, & caulis, & radix generose calfaciūt. Sicutq; omnia flauo-fioris & aëreæ substantiæ, & propterea etiam ægrē cōcoquuntur. Forinsecus tamē imposita efficaciora sunt, & maxime omnium succus, attractoriā uim habens, corporis itē molem consumens ac colliquans.

*Sinon.*

*Sinon* calidi & subamari saporis est, unde & urinam ciēt, & cōcoctoriū existit, & menses prolciēt, & obturationes uiscerum expedit.

*Sion.*

*Sion* in quantum aromaticum saporem habet, in tantū calfaciens & siccans facultatis participes est. Discutit autem, & urinam ciēt, & calculos renū atterit, & menses ducit.

*Sisymbrium.*

*Sisymbrium* tenuium partium & diffusorium, calfacientiorūq; ac siccatoriū uim tertio ordine habet. Semen quoq; ipsius tenuium partium & calidum est. Quare quidam id cum uino singultientibus & torminosibus bibendum præbent.

*Scandix.*

*Scandix* syluestre olus est consimile gingidīo, subacre & subamarum, ut in siccando ac calfaciēdo tertij ordinis sit exoluti. Vrinam etiam ciēt, & uiscera obturatione liberat.

*Scilla.*

*Scilla* incisoria uim abunde possidet, non tamen fortiter calidam, sed in secundo ordine calfacientium.

*Scolymus, Carduus.*

*Cardui* radix multam urinam fecidam ducit, si uino decoctam quis bibat, & propterea alarum & totius corporis foetores sanat. Calida est tertij ordinis initio, sicca secundo.

*Scordium.*

*Scordii* ex multiformi facultate constat. Nam & amarum quid & acerbū & acre habet. Expurgat itaq; simulq; calfacit uiscera, & menses & urinas mouet, & uulsa & rupta ac laterum dolores ex obturatione factos sanat potū. Viride cataplasmatico modo impositum, uulnera magna glutinat. Aridū inspersum, fordidā repurgat, & maligna ad cicatricem perducit.

*Scorodon, Allium.*

*Allium* calfacit ac siccatur quarto ordine. In cibo sumptum flatus dissipat, & sitim extinguit, & crassos uiscososq; humores secundo obturatione liberat. Habet & quid medicatum & mali succi, quod abijcit aqua coctum.

coctum. Fugiendus est eius assiduus usus, præsertim in calidioribus habitudinibus.

*Smyrnia, Myrrha.*

Myrrha secundi ordinis est calfaciendum ac siccantium. Insuper capitis uulneribus, ea glutinare potest. Amaritudinis autem non modicæ particeps est, per quam & lubricos, & sævus occidit ac ejicit. Habet & quid exteriorum, unde & ocularibus compositionibus additur, quæ ad ulcera & cicatrices crassas compositiones sunt. Miscetur & in anhelosorum ac tussientium auxilia, item in arteriarum compositiones: non enim exasperat arteriam.

*Smyrniun, Hippofelinon.*

Smyrniun, alij hippofelinon uocant, ex eodem genere est cum apio & petroselino, uerum semine nigrum & multo maius habet, & est apio ualentius, petroselino imbecillius. calfacit ac siccatur ordine tercio, menses ducit, & urinas det.

*Sonchus, Cicerbita.*

Sonchus uiridis adhuc & tener, uelut alia syluestria olea, comeditur. Cõponitur ex aquosa & terrea substantia, utriusque frigidus, & adstrictionis quid habet. Mani festè itaque perfrigerat, tum stomacho cataplasmatismis uice impolitus, tum in cibo acceptus.

*Spartum, Genista.*

Spartum quo uitæ apud nos ligat, & fructus, & uirgarum succus attractoriam uim non instrenuam possident.

*Stactæ.*

Stactæ appellatur recentis myrrhæ pinguetudo, si cum aqua modica tñdatur, & per organum exprimitur. Est autem ualde odorata & preciosa, & per se unguentum, quod stactæ appellatur. Probatum quæ nihil olei admixtum habet, & modica sui parte multam uim calfactoriam possident, ad proportionem myrrhæ & unguentorum calfacientium.

*Staphylinus, Passinaca, Daucus.*

Passinaca satia imbecillior est, syluestria, quæ et dauci appellantur, ad omnia fortior, urinas mouet, & menses prouocat. Habet & quid exteriorum in se.

*Stoechas.*

Stoechas amarè & adstringentis qualitatibus particeps est. Est & tenuium partium ex odoris argumento. Itaque & obturatione liberare, & attenuare, & roborare, tum uiscera omnia, tum totum corporis habitum potest.

*Struthium, Herba lanaria.*

Struthij radix in usu est, calida & sicca quarto ordine existens. Est autem exterioriora & irritatoria, propter eam sternutamenta mouet.

*Styrax.*

Styrax mollis, calfacit, cõcoquit. Quapropter & tussis, & destillationes, & grauedines ac raucedines sanat, mensesque promouet potius & appositus: Fuligo ex ipso fit uelut ex thure, quæ eandem quoque uim habet.

*Staphyle, Vitis.*

Vitis magis quam omnes temporarij & subcaniculares fructus, horæ Græcis appellati, nutrit, & maxime ubi probè fuerit concocta. Minus autem nutriunt unguem quam ficus, & quod in ipsis præcipuum est cito secedunt. Quare si quando reuincantur, satis multum ofa fendunt. Neque enim probè concoquantur rectæ, sed & iuxta distributionem in hepar ac uenas, crudum succum generant, qui non facile in sanguinem transmutantur, tum propter externam cuticulam, tum propter uinacæ, quorum substantia sicca & adstrictio-

ria existit. Quapropter rectè faciunt qui hæc ipsa uelut inutilia expuunt, & omnem internam carnem unum cum succo exugunt, & sanè uenter his magis subit. Reponuntur autem uisæ in hyemè uarijs modis. Alij in olla cõponunt, olla uidelicet diligenter operata, & operculo pice obdito, ut nullatenus perspiraret aut persisteret. Atque talis uisæ exolutum uentrem firmat, & ciborum appetentiæ excitat, non tamen aluo secedit, & uberius ingesta, caput tēat. Sed adhuc magis capitis dolorè inducit quæ in musto seruatur. Penilis autem caput nihil omnino lædit, uentre uero neque sistit, neque promouet. Similiter neque infirmam appetentiæ excitat, neque firmam exoluit. Vitis quidem igitur dulces calidioris succum habent. Quapropter suum inducunt, & uentrem subducunt, præsertim ubi humectiores fuerint. nam inter calfacientia ac refrigerantia medio modo habent. At uero acidæ & austerae, & quæ cuticulam crassiorē habent, non solum prædicta uisæ habet, sed & concoctionē in uentre & distributionē ac nutritionē impediunt. Cæterum in summa de elarijs fructibus id nosse oportet: Humidos, humidum & tenue alimentum corpori præbere, & quod uniuersum corpus transcat ac cito penetrat, facileque & per urinam & per cutē euacuetur. Contra solidiorum compage fructuum, alimentum quod corpori accedit crassum est, & transitus tardiores, præsertim ubi crassum aut uiscosum aut adstringentem succum in se habuerint.

*Sycæ, Ficus.*

Quod non solum autumnales, sed etiam temporarij ac æstiuæ & subcaniculares fructus, horæ Græcis appellati, cõmune habent, id & ficus adest. nam neque ipsæ succi maliciæ efugere poterunt. Verum hoc cõmmodum & ficus inest, quod facile per uentrem transcat, & totum corpus penetrat. Nam & uim exterioriæ memorabilem habent, & nephritici ex ipsarum esu multa arenosa excernunt. Alimentum autem præbent corpori non solidum, sed laxum, & ipsum uentriculum flatu implent. Verum ob transitus celeritatem, flatus illi non durant: & ea gratia minus quam reliqui fructus nocent. Est sane ficus exactè matura ferè nihil noui habet. Ficus uero sicca calidiorem uim possident secundi ordinis initio. Habent & quid tenuium partium, quod ad multa conducit. Illud tamen mali ex nimio ipsarum esu accedit, quod non ualde bonum sanguinem caricæ gignant. Unde & pediculorum copia ad earum esum consequitur. Si uero uisidos succum tam in uentre continetur, caricæ cõmestæ extremè lædunt. augent autem humorum maliciam in uentre corruptæ, & infernè non secedentes. Vim habent attenuantem & incisoriam, ob quam etiam uentrem ad excretionem incitant, & renes expurgant. Iecori & heni inflammatis quidem noxiæ sunt, quæ admodum etiam uirides ficus, iuxta communem rationem omnium dulcium. Iisdem uero obturatis aut induratis, cum thymo aut pulegio, aut thymbra, aut calamintha, aut origano, aut pipere, aut zingibere, multo ante reliquum cibum tempore intercedente medici præbent. Qui uero cum aliquo crassiore edulio ficus edunt, itemque caricas, non paruum lesionem incurrunt. Ficus sicca dueros tumores concoquunt ac discutunt, ob partium tenuitatem, si in cataplasmate imponantur. Decoctum quoque ipsarum cõsimilem uim habet. Cæterum ubi concoquere uelis, uriceam farinam ammiscabis, ubi discutere, ordeæ

ceam. Et pinguioribus quidem caricæ, tumores concoquunt. acriori uero sapore præditi extergunt ac discutiunt. At uero mellitum ex ipsarum in aqua coctura paratur, uim mellis similem habet.

*Symphitum petraeum.*

Symphitum petraeum ex contrariis facultatibus constat: habet enim quid indurivum, quo pos in pectore ac pulmone contentum expurgat. Habet & quid adstringivum, quod ad sanguinis reiectionem auxiliatur. Verum ob humiditatem, commanducatum sicut extinguit, & arteriae asperitates lenit. At uero ob omnes prædictas facultates, etiam intestinorum herniis impotuit, & ad coxulas, ac rupta cum aceto multo bibitur.

*Sycomoræ.*

Sycomoræ fructus forma ficibus similis est, sed acrimonia nullam possidet, modice dulcedinis particeps, humectior & frigidior quodammodo uis sua extens, uelut mora. Et sane in medio mororū ac sicū meritis locatur, unde etiam nomen habet.

*Schinus, Lentiscus.*

Lentiscus arbutum ex substantia aquea leniter calida, & terrea frigida non multa compositum est, propter quam etiam moderate adstringit. Siccatur igitur tertij ordinis initio, iuxta caliditatem uero & frigiditatem temperatum est. Simile uim in omnibus uis partibus possidet, unde & per se, & cum alijs medicamentis bibitur, ad coeliacas affectiones, & dysenterias, & sanguinis sputa, & sanguinis ex utero eruptiones, prolapsæ quoque sedis ac utero præcipitato commodat, propemodum uelut hypocyctis.

*Schoeni siue iunci rotundi odorati flos.*

Iunci odorati flos caliditate moderate, & adstringit moderate, particeps est & tenuium partium facultatis, unde & menses ciet, & urinas ducit, in fomentis, & potu, & cataplasmatibus adhibitus, prodest & hepatis & uentris ac stomachi inflammationibus.

*Schoenus levis, Iuncos levis, Oxychoenus.*

*Holoschoenus.*

Iunci levis altera species oxychoenus, id est, acutus iuncus; altera holoschoenus, hoc est, tota iuncea appellatur. Gradior quidem & durior est iuncus acutus, crassior autem holoschoenus, & laxior. Huius fructus somnum inducit, Iunci acuti species duæ sunt, altera sterilis, & medicinae inutilis. Altera fructifera, cuius item fructus somnum conciliat, sed minus superiore, hæc & capitis dolorem inducit. Vtræque species torrefacta ex uino pota, fluxiones uentris siccant, & fluxum muliebrem rursus sistit. Et propterea temperamentum ipsarum terreum leniter frigidum esse indicatur, & aqueum leniter calidum, quapropter infusa siccatur, & leniter ad caput decurrere perfrigerat, atque sic somnolentos eos qui utuntur facit.

*T Terebinthus.*

Terebinthi folia, cortex & fructus, habent quid adstringivum, sed & calfaciunt ordine secundo. Fructus est propinquus tertio ordine siccantium. Quapropter & urinam ciet, & leni prodest.

*Teulon, Beta.*

Beta nitrosam quandam uim possidet, quæ extergeat & discutiat, & per nares expurgat. Cocta nitrosam & acre deponit, & ad discussoria leniter facultatem, uis arandi inflammationes ipsi accedit. Alba extensoria ac discussioni efficacior. Nam nigra adstringentis particeps est, & magis in radice. Quam autem extensorium

succum habet, etiam uentrem ad excretionem excitat, & stomachum quandoque mordet, præsertim illis quibus subtiliori sensu præditus est. & propterea incommodum stomacho edulsi est, si uberius ingeratur. Præstantior autem est quam malua ad hepatis obstruktionen, atque id magis ubi cum sinapi, aut aceto edatur, quomodo comesta etiam splenis accidit.

*Tephra, Cinis omnis.*

Lignorum exustorum aut altissimum materierum reliquias, cinis appellantur. Constat ex contrariis substantijs & qualitatibus. Habet enim in se quiddam terreum, & quid fuliginosum. Fuliginosæ itaque partes tenuium partium sunt, & ubi cinis aqua maceratur & excolatur, simul decedunt. Quod autem relinquitur terreum, debile ac lenē euadit, ut quod calidam uim in aqua deponit. Porro non omnis cinis eandem uim eadem habet, sed iuxta uitæ materię differentiam uariant. Nam ex lignis acerbis, uelut quercinibus & similibus, non parum adstringentis habet in terra sui parte, unde & sanguinis eruptiones cohibet. Cæterum ficulneus cinis multum acrimoniae ac uisoriae facultatis in fuliginosa sui parte possidet: in terrestri uero parte uim extensoriam. Cōsimilis huic est & cinis ex tithymallis. Est autem & titanus, hoc est, calx cineris species, magis tenuium partium existens, quam is qui ex lignis reliquus est. Calx itaque aqua exacte ter uti quater lora, & aqua diffusâ, medicamentum euadit siccantium citra mordacitatem. Quod si eadē aqua marina lauatur, discussoriam uim acquirit.

*Telis, Fœnugræcum.*

Fœnugræcum calidum est ex secundo ordine, siccum ex primo, participat & extensoria facultate, & propterea feruentis inflammationes exacerbant. minus calidas & induratas discutit. In cibi usum uarijs modis uenit, sed caput tentat amplius sumptum, præsertim abscque pane ingestum. quibusdam etiam stomachum subuertit. Succus decocti fœnugræci, cum modico melle acceptus, omnes uisidos humores intestinorum commodè subducit. Sed parum omnino mellis amittere debet, ne mordax existat. Cæterum in uentris pectoris doloribus citra febrem, palmas pingues simul cum fœnugræco decoquere oportet, & expressum succum amixto melle rursus decoquere ad prunas donec moderate crassescat, atque ita eo uti modico tempore ante reliquum cibum intercedente. Viadus tamē eius usus est in his qui caput læsioni obnoxij habet. Nam & palmulæ ipsæ caput tentant.

*Tithymalli, Galactides, Characias.*

Tithymalli omnes, qui & galactides appellantur, acce & calidam uim habent prædominantem. Inest ipsis & amaritudo. Fortissimus igitur est succus, deinceps fructus & folia, particeps est & radix prædictarum facultatum, sed non ex æquo. Ipsa quidem igitur cum aceto cocta, dentium dolores & maxime eroforum sedat. Succus quarti ordinis est calfacientium, qui iam uisorius existit. Quapropter illius succi pilos denudant, sed uehementis ipsorum uis oleo amixto mitigatur, & si frequenter id fiat, radices pilorum exuste penitus extirpantur, & corpus glabrum redditur. Eodem modo & uerrucas, ac thymos ex eadem uerrucarum gente appellatos tollunt. Impetiginem quoque ac scabiē extergit. Cortex radices eius qui priuatim Characias appellatur, in umbra siccatus, tulus & cribratus, generose purgat potus. Oportet autem quatuor scrupuli

scrupulorum pondus à uespera in uino dulci mace-  
rare, & manè excolatum uinum per panniculum te-  
pescatum potandum exhibere.

*Tragacanthus.*

Tragacanthus succus est plantæ spinosæ, similem gum-  
mi uim habens, quæ & meatus obducit, & acrimo-  
niam obtundit, & sanè facit quocq; similiter illi.

*Tribulus.*

Tribulus ex moderata humida, & frigida ac siccâ sub-  
stantia constat. Cæterum in terrestri terrea frigiditas  
prædominatur, ob quam & magis adstringit. In a-  
quatilis uero aquositas, & propterea seruentibus in-  
flammationibus conueniunt. Terrestris fructus renū  
calculos arerit potus.

*Triphyllon, Trifolium.*

Trifolium Græci asphaldion è bituminis odore appella-  
re, estq; calidæ ac siccæ facultatis in tertio ordine  
ueluti bitumen, & propterea potum laterū dolores  
ex obturatione obortos sedat, & urinā ac menses ciet.

*Trychnon, Solanum.*

Trychnon aliqui adiecto ad caput uocis litera r. stry-  
chnon appellant, & hortense quidē adstringit & fri-  
gescit ordine secundo. Quod uero halicacabon ap-  
pellatur in foliorū facultate simile est hortensi. uerū  
fructus eius urinā ciet. At uero cortex somniferi ap-  
pellatur de radice detractus, frigescit similiter ut pa-  
paueris succus, ut terit si ordinis perfrigerantium.  
Fructus etiā huius urinā ciet, sed si plures quam  
duodecim corymbi sumantur, surcorem inducit.

*Y. Hyacinthus, Hyacinthus.*

Hyacinthi radix bulbiformis primi ordinis est siccanti-  
um, secundi perfrigerantium. Creditur pueros diu  
impuberes adseruare, si cū uino in cataplasmate inas-  
ponatur. Semē moderate adstringit & ex terger, unde  
istericis datur ex uino. Siccatur ordine tertio, uerū  
caliditatis & frigiditatis in medio consistit.

*Y dna, Tubera.*

Tubera terream substantiam prædominantem possi-  
dent, modica tenuium partium ammixta.

*Ydropiper, Hydropiper.*

Hydropiper herbula est in aqua nascens, & folijs & ra-  
mulis mentæ similis, maior tamen, gustu acris ue-  
lut piper. semina ferè parua iuxta singula folia, herba  
calida quidem est, sed non quantū piper. Viridis im-  
posita sugillata & durities sanat. Vtuntur quidam  
ipsa unā cum semine pro condimento piperis loco.

*Yofcyamus, Hyofcyamus.*

Hyofcyamus cōmodissimus est ad medicinas, qui flo-  
rem & semen album habet tertij ordinis perfrigeran-  
tium existens: Reliqui uenenati sunt.

*Ypericon, Hypericum.*

Hypericum calfacit ac siccatur substantiam tenuium par-  
tium habes, ut & urinas & menses prouocat. Ad hæc  
uero non modo semen, sed etiā folium conducit.  
Viride in cataplasmate positum, ulcera ad cicatri-  
cem perducere potest, præsertim ambustorum. Siccū  
tritum inspersum, humore flaccida & putredinosa ul-  
cera sanat. Quidam etiā ischiadicis ipsum bibens-  
dum præbent.

*Yssopus, Hyssopus.*

Hyssopus calfacit ac siccatur ordine tertio. Estq; tenuium  
partium substantiæ.

*Phaci, Lentes.*

Lentes non ualde adstringunt, in caliditatis autem & fri-

giditatis medio consistunt. Siccant ordine secundo.  
Itaq; corpus ipsarum siccatur ac sistit uentrem. Deco-  
ctum autem promouet. Quapropter ubi sistendi uē-  
tris gratia sumuntur, prima aqua diffunditur.

*Phacos palustris, Lens stagnorum.*

Palustris lens humidi & frigidi temperamenti est, ex  
secundo ordine.

*Phaseli.*

Phaseli itemq; odri, mediā quodammodo edulia sunt,  
inter ea quæ boni sunt, aut mali succi, facileq; con-  
coquuntur aut ægrè, tardèq; commeant, aut cito,  
flatus expertia aut inflantia, parum nutrienda aut  
multum.

*Phlomos, Verbasicum.*

Verbasicum tres species habet, quarū radix acerbâ est,  
unde & fluidis affectionibus auxiliatur. Quidā de-  
cocto ejus dentes in dolore colluunt. Folia omnium  
diffusoriam & extensoriam uim habent. Teritiæ us-  
sus est lucernarum luminā, quæ propriè thryallis ap-  
pellatur.

*Phoenix, Palma.*

Palma arbor abstringentis, qualitatis particeps est in  
omnibus suis partibus, ramorū succus austerus est.  
similiter quod cerebrū uocatur, quod in cibi usum  
uenit, fructus ipsius maxime dulcis, non modica ca-  
liditate participat, & carius & mulci uisus, tum forin-  
secus adhibitus, tum intra corpus sumptus, ubi robo-  
rare, & siccare, & cōstringere ac densare, & obtura-  
re opus est. Omnes palmulæ ægrè concoquuntur, &  
capitis dolorem inducunt amplius comestæ. Qui-  
dam ab earum esu morsum perdidit in ore uentris,  
qui sanè etiā magis capite dolent. Succus qui ex ie-  
phis in corpus distribuitur, crassius penitus est. Habet  
& uiscosum quiddam, ubi pinguis palmula fuerit.  
Quando autem crasso & uiscoso succo dulcedo per-  
mixta fuerit, iecur celerimè ab ipsis obturatur. Si  
uero aut inflammatum fuerit iecur, aut induratum,  
ab ipsarum esu extremè læditur. Consequenter autē  
cum focinore etiam lien obturatur, ac læditur. Cæte-  
rum multo magis lædunt palmulæ uirides etiā pau-  
lo uberius ingestæ. nam & flatu uentrem implent, &  
crudis humoribus, & qui esturatur rigoribus ægrè  
calefcentibus corripuntur. Porro germen tenerum  
quod Elaten uocant, uim eandem cum cerebro ha-  
bet. Quod uelut tegmen & uelamen ipsius est, adstri-  
ctorum quidem est, uerum magis prædictis siccatur.  
Est autem & radix arboris siccatoris citra mordaci-  
tatem facultatis, & modicè adstrictoria.

*Phu, Nardum creticum.*

Phu radix narde similem uim habet, debilior tamē ad  
alia est, uerum urinam magis ciet.

*Phycos, Alga, Fucus.*

Fucus siue alga, multus est marinus, qui uiridis exem-  
pus frigescit & siccatur ordine secundo. habet & quid  
adstringens moderate.

*X. Chalbana, Galbanum.*

Galbanum succus est ferulaceæ plantæ, mollitoriam &  
diffusoriam uim habens. Calfacit ordine tertio, sic-  
cat secundo.

*Chamædrys, Trisago.*

Chamædrys amarā qualitatem prædominantem habet,  
est & aliquo modo acris, unde & lienem colligat,  
& urinas, & menses mouet, & crassos humores se-  
cat, & uiscerū obturationes expurgat. Tertij ordinis  
est

est calfaciendum ac siccantiū. Decoctum ipsius diu-  
nus coctum, & assidue potum, febre quartana corre-  
ptos liberat.

#### Chamelea.

Chamelea amarā qualitatem prædominantem ha-  
bet. Quapropter & sordida valde ulcera, & quæ ma-  
ximas crustas habet, cum melle repurgare potest. Est  
& pota ex purgantium numero.

#### Chameleuce.

Chameleuce calidam vim habet ordine tertio, sicam  
primo. Vnde suffita super carbones manifeste opitu-  
latur ægrè spirantibus, si per infundibulum fumum  
inde hauriant.

#### Chameleon.

Chameleonis nigri radix uenenosum quid habet, unde  
eius usus foris nec receptus est ad scabiem & im-  
petiginem, ac uiriginē, & in summa ad ea quæ ex-  
terioꝛis opus habet. Particeps est & mollitoris ac dis-  
cussoris facultatis, siccatur autem ordine tertio, calfa-  
cit secundo completo. At uero albi chameleonis ra-  
dix pota ex uino austero, & acetabuli mensura, latum  
lumbicū expellit. Dant ipsam & hydropicis,

#### Chamæpitys.

Chamæpitys tertij ordinis est siccantium, secundi calfa-  
cientium. Quam autem plurimum amara sit, exte-  
gerit uiscere magis quam calfacit, unde in regio mor-  
bo exhibetur, & omnino quibus secur facile obtura-  
tur, cōmodum medicamentum existit. Ducit & men-  
ses pota & cum melle apposita. Ciet quoq; urinam.  
Quidam ischiadicis ipsam præbent coctam in aqua

mulsa. herba ipsa uiridis magna uulnera glutinare  
potest, & putredinosa ulcera sanare, & mammarum  
duritias discutere.

#### Chelidonium magnum.

Chelidoniū magnū exterioriā & calidam uim abunde  
posidet, succus eius uisum exacuit, his quibus cras-  
sum quid quod discuti oporteat, circa pupillā colligi-  
tur. Quidā radice usi sunt in morbo regio ex iecino-  
ris obstructione oborto, ex uino albo dātes cū aniso.

#### Chelidonium paruum.

Chelidonium paruum maiore acris est, unde in cata-  
plasmate impositum cutem exulcerat, & ungues le-  
prosoꝛis extertit. Succus eius per nares fortiter purgat  
est enim quarti ordinis calfacientium ac siccantium.  
Maius tertij in uirileque.

#### Chondrilla.

De chondrilla diximus quum de seride ageremus: est  
enim seridis species.

#### Psyllium.

Psyllij semen maxime in usu est. Secundi ordinis est fri-  
gescientium. Verum in sicando & humectando  
medium locum occupat.

#### Ocymum Basilicon, id est, regale.

Ocymum secundi ordinis est calfacientium, habet & hu-  
miditatem superfluam, unde neq; utile est ipsum in-  
tra corpus mittere. uerum foris nec in cataplasmate  
impositum ad discutendum ac concoquendum cō-  
modat. Decoctum ipsius lippientibus ob crassioris  
materie copiam, calidum pro fomento adhibuitum,  
magnopere prodest, præsertim pueris.

## AETII TETRABIBLI PRIMAE, SERMONIS PRIMI, FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

### SECUNDO SERMONE AETII

#### CONTINENTVR.

\*

<b>D</b> e terra differentijs. Caput 1.	Lapis Ageratus. cap. xxii.	Salustus. cap. xliiii.
Quomodo terram lauare oportet. cap. ii.	Lapis Asius, & flos ipsius. cap. xxiii.	Salis flos. cap. xlv.
Quas medelas agrorum terra præbet. cap. iii.	Gagates. cap. xxxiiii.	Salis spuma. cap. xlv.
De terra Lemnia. cap. iiii.	Magnetes lapis. cap. xxv.	Armeniacum pictorum. cap. xlviii.
Rubrica. cap. v.	Smiris, pumex, testæ clibanii. ca. xxvi.	Auripigmentum. cap. xlviii.
Terra Samia. cap. vi.	Lapides in spongijs. cap. xxvii.	Bitumen. cap. xlix.
Terra Selinusia & Chia. cap. vii.	Ostracites, geodes, Naxia cotis retri- mentum. cap. xxviii.	Aphronitrum & litri spuma. cap. i.
Cimolia terra. cap. viii.	Ophites lapis. cap. xxix.	Gypsum. cap. li.
Terra Ampelitis. cap. ix.	Hieracites lapis & Indicus. cap. xxx.	Diphryges. cap. lii.
Terra Cretica. cap. x.	Vitrum. cap. xxxi.	Diaphanes, lapis specularis. cap. liii.
De omni terra usita. cap. xi.	Lapis acities. cap. xxxii.	Sulphur. cap. liiii.
De bolo Armenie. cap. xii.	Alabandicus lapis. cap. xxxiii.	Aerugo rasa. cap. lv.
Lapis hematites. cap. xiii.	Electrum siue succinum seu tyncurum. cap. xxxiiii.	Aerugo uermiculata. cap. lvi.
Lapis schistos, galactites, melitites. cap. xiiii.	Iassus uiridis. cap. xxxv.	Cadmia. cap. lvii.
Communis doctrina de omnibus lapi- dibus. cap. xv.	Iassus subuirdis. cap. xxxvi.	Cyanus. cap. lviii.
Leucographis aut moroxus. cap. xvi.	Iassus pachates. cap. xxxvii.	Squama eris ac ferri. cap. lix.
Galactites. cap. xvii.	Sapphirus lapis. cap. xxxviii.	Argenti spuma. cap. lx.
Tbyites lapis. cap. xviii.	Smaragdus lapis. cap. xxxix.	Litrum. cap. lxi.
Tecolithos. cap. xix.	De metallicis & que ex aqua generan- tur. cap. xl.	Melanteria. cap. lxii.
Pyrites. cap. xx.	Adarces. cap. xli.	Atramentum scriptorium. cap. lxiii.
Lapis Phrygius. cap. xxi.	Alecyonia. cap. xlii.	Misy, Sori, & chalcitis. cap. lxiiii.
	Sal. cap. xliii.	Molybdena. cap. lxx.
		Plumbum. cap. lxxi.
		Pompholyx. cap. lxxii.
		Rhoidarij preparatio. cap. lxxiii.

Sandaracha.	cap. LXXIX.	De renibus.	cap. CXXV.	De canis fluuiatilis testibus.	cap. CLXXVIII.
Sandyx quas & Syricum.	LXX.	De cerebro.	cap. CXXVI.	De canis terrestris catulo.	cap. CLXXXI.
Scoria.	cap. LXXI.	De terrestrium animalium uisceribus.	cap. CXXVII.	De Cygni pullo.	cap. CLXXX.
Stibium.	cap. LXXII.	cap.	CXXVII.	De buccinorū testis uis.	cap. CLXXXI.
Spongia.	cap. LXXIII.	De aluo, intestinis ac utero terrestrium animalium.	cap. CXXVIII.	De galeria uolucres.	cap. CLXXXII.
Alumen.	cap. LXXIII.	De syluestrium animalium carne.	cap. CXXIX.	De cochlea terrestri.	cap. CLXXXIII.
Calx.	cap. LXXV.	cap.	CXXIX.	De menulis.	cap. CLXXXIII.
Eucus.	cap. LXXVI.	De uolucrum animalium carne.	cap. CXXX.	De torpedine.	cap. CLXXXV.
Atramentum sutorium.	cap. LXXVII.	De ascribus & struthocamelis.	cap. CXXXI.	De asello marino.	cap. CLXXXVI.
Chalcitis.	cap. LXXVIII.	cap.	CXXXI.	De ostreorum testis.	cap. CLXXXVII.
Aes ustum.	cap. LXXIX.	De gruibus.	cap. CXXXII.	De purpurarū testis.	cap. CLXXXVIII.
Aeris flos.	cap. LXXX.	De partium uolucrum animalium differentia.	cap. CXXXIII.	De Squatinamarina.	cap. CLXXXIX.
Chrysocollo.	cap. LXXXI.	cap.	CXXXIII.	De sepia.	cap. CXC.
Cerussa.	cap. LXXXII.	De ous.	cap. CXXXIII.	De scinco.	cap. CXCI.
Psorium.	cap. LXXXIII.	Ouorum uis medicamentaria.	cap. CXXXV.	De tellinis.	cap. CXCI.
De materia medica ex animalibus.	LXXXIII.	De alimento ex animalibus aquaticis.	cap. CXXXVI.	De cicada.	cap. CXCI.
cap.	LXXXIII.	cap.	CXXXVI.	De hyena.	cap. CXCI.
De sanguine.	cap. LXXXV.	De cephalo.	cap. CXXXVII.	De harundinibus.	cap. CXCV.
De lacte.	cap. LXXXVI.	De lupo.	cap. CXXXVIII.	De electione optimorum medicamentorum.	cap. CXCVI.
De lactis differentia.	cap. LXXXVII.	De trigla seu mulo.	cap. CXXXIX.	Ex Oribasio. Quae sint media inter calfacientia ac frigescentia.	cap. CXCVII.
De lactis differentia ab animalium habitu.	cap. LXXXVIII.	De piscibus petrositis.	cap. CXL.	Quae moderate calfaciunt.	cap. CXCVIII.
De lactis differentia a temporibus anni.	cap. LXXXIX.	De gobio.	cap. CXLI.	Quae calfaciunt primo ordine.	cap. CXCI.
De lactis differentia a pabulo.	cap. XC.	De piscibus mollis carnis.	cap. CXLI.	Quae calfaciunt secundo ordine.	cap. CC.
De lactis differentia ab aetate.	cap. XCI.	De piscibus durae carnis.	cap. CXLI.	Calfacientia tertij ordinis.	cap. CCI.
Quibus lac conueniat.	cap. XCII.	De piscibus testa intestis.	cap. CXLI.	Calfacientia quarti ordinis.	cap. CCII.
De modo, tempore, ac mensura utendi lactis.	cap. XCIII.	De crustatis.	cap. CXLV.	Quae frigescent.	cap. CCIII.
Quibus lac noceat.	cap. XCIII.	De piscibus mollibus.	cap. CXLI.	Quae frigescent primo ordine.	cap. CCIII.
De lactis coctura.	cap. XCV.	De piscibus chartilaginosis.	cap. CXLI.	Quae frigescent secundo ordine.	cap. CCV.
De sero lactis.	cap. XCVI.	De echinis marinis.	cap. CXLI.	Frigeffactoria tertij ordinis.	cap. CCVI.
De his quae inundantur gratia cum lacte coquantur.	cap. XCVII.	De falsamentis omnium animalium pedestrium, uolucrum & aquaticorum.	cap. CLIX.	Frigeffactoria quarti ordinis.	cap. CCVII.
De lacte acido.	cap. XCVIII.	cap.	CLIX.	Quae siccant citra mordacitatem.	cap. CCVIII.
De primario lacte.	cap. XCIX.	De gero.	cap. CL.	Quae simpliciter siccant.	cap. CCIX.
De lacte concocto.	cap. C.	De muria.	cap. CLI.	Quae primo ordine siccant.	cap. CCX.
De caefo.	cap. CI.	De adipe pinguedineque ac seuo.	cap. CLII.	Quae secundo ordine siccant.	cap. CCXI.
Pharmacum ex caefo uetere ad callosas concrectiones podagricorum.	cap. CII.	De medulla.	cap. CLIII.	Quae tertio ordine siccant.	cap. CCXII.
De efficacia recentis caefi foris adhibiti.	cap. CIII.	De pulmone.	cap. CLIII.	Quae quarto ordine siccant.	cap. CCXIII.
De butyro.	cap. CIII.	De capitibus.	cap. CLV.	Quae media sunt inter siccantia ac humectantia.	cap. CCXIII.
De coagulo.	cap. CV.	De cornibus.	cap. CLVI.	Quae primo ordine humectant.	cap. CCXV.
De felle.	cap. CVI.	De ungibus.	cap. CLVII.	Quae secundo ordine humectant.	cap. CCXVI.
De sudore.	cap. CVII.	De impetigine in pedibus eorum.	cap. CLVIII.	Quae aquosam frigiditatem habent.	cap. CCXVII.
De urinis.	cap. CVIII.	De lanis succidis & puris & uis.	cap. CLIX.	Quae tenuium partium sint.	cap. CCXVIII.
De salina.	cap. CIX.	De pilis uis.	cap. CLX.	Quae crassarum partium sint.	cap. CCXIX.
De stercore.	cap. CX.	De osibus uis.	cap. CLXI.	Corroborantia.	cap. CCXX.
De stercore canino.	cap. CXI.	De pellicibus & corijs.	cap. CLXII.	Concofforia.	cap. CCXXI.
De stercore humano.	cap. CXII.	De uentriculo mergi.	cap. CLXIII.	Suppuratoria.	cap. CCXXII.
De stercore lupino.	cap. CXIII.	De uulpibus.	cap. CLXIII.	Mollientia.	cap. CCXXIII.
De stercore caprino.	cap. CXIII.	De araneorum telis.	cap. CLXV.	Quae indurant.	cap. CCXXIII.
De stercore bubulo.	cap. CXV.	De ranis.	cap. CLXVI.	Exterforia.	cap. CCXXV.
De stercore ouillo.	cap. CXVI.	De mustela.	cap. CLXVII.	Quae uasorum oscula aperiant.	cap. CCXXVI.
De stercore columbino.	cap. CXVII.	De terrene intestinis.	cap. CLXVIII.	Rarescentia cutem.	cap. CCXXVII.
De gallinaceo stercore.	cap. CXVIII.	De dracone marino.	cap. CLXIX.	Densantia cutem.	cap. CCXXVIII.
De stercore anferis, accipitris, ciconiae, & terrestriū crocodilorum.	cap. CXIX.	De uisera.	cap. CLXX.	Corrodentia.	cap. CCXXIX.
Sordes ouium ex qua & sypus.	cap. CXX.	De herinacio marino.	cap. CLXXI.	Reprimantia eminetias.	cap. CCXXX.
De carnibus.	cap. CXXI.	De herinaceo terrestri.	cap. CLXXII.		
De extremis terrestriū animalium partibus.	cap. CXXII.	De hippocapris marinis.	cap. CLXXIII.		
De glandulis.	cap. CXXIII.	De cantharidibus.	cap. CLXXIII.		
De testibus.	cap. CXXIII.	De cancris fluuiatilibus.	cap. CLXXV.		
		De carabo siue locusta.	cap. CLXXVI.		
		De testibus castoris.	cap. CLXXVII.		



Cicatricem inducentia. cap. CCXXXI.	CCXLIII.	Quæ stomacho incommoda sunt. cap. CCLVII.
Exulcerantia in superficie. cap. CCXXXII.	CCXLV.	Flatus expertia. cap. CCLVIII.
Vstoria. cap. CCXXXIII.	Quæ atrabiliarium succum generant. cap. CCLVI.	Flatua. cap. CCLIX.
Attractoria. cap. CCXXXIII.	Quæ biliosum humorem generant. cap. CCLVII.	Quæ extergent, secant, obturatione liberant. cap. CCLX.
Discafforia. cap. CCXXXV.	Quæ superfluitatibus redundant. cap. CCLVIII.	Quæ obturant. cap. CCLXI.
Adstringentia. cap. CCXXXVI.	Quæ superfluitatibus careant. cap. CCLIX.	Quæ tardi transitus sunt. cap. CCLXII.
Quæ semen generant ac prouocant in cibis ac medicamentis, & cibis medicamentarijs. cap. CCXXXVII.	Multum nutritia. cap. CCL.	Quæ facile corrumpuntur. cap. CCLXIII.
Quæ semē inhibeat. cap. CCXXXVIII.	Quæ parum nutriunt. cap. CCLI.	Quæ uentre subducunt. cap. CCLXV.
De alimētōriū uiribus. cap. CCXXXIX.	Quæ boni succi sunt. cap. CCLII.	Quæ uentre suppressunt. cap. CCLXVI.
Attenuatoria alimenta. cap. CCXL.	Quæ mali succi sunt. cap. CCLIII.	Quæ calesciunt. cap. CCLXVII.
Craffi succi alimenta. cap. CCXLI.	Quæ facili cōcoctū sunt. cap. CCLIIII.	Quæ frigesciunt. cap. CCLXVIII.
Media inter attenuatoria & crassefficientia. cap. CCXLII.	Quæ agrē concoquuntur. cap. CCLV.	Quæ siccant. cap. CCLXIX.
Quæ uiscosum sanguinem generant. cap. CCXLIII.	Quæ stomacho commodant eumq; corroborant. cap. CCLVI.	Quæ humectant. cap. CCLXX.
Quæ crudum humorem generant. cap.		Quæ caput ledunt. cap. CCLXXI.

## AETII MEDICI GRAECI CONTRACTAE MEDICINAE TETRABIBLI PRIMAE

### SERMO SECVNDVS.

\*

Quaecunque sunt plantarum partes, & fructus, & succi, & liquores, superiore sermone relatum est. Nunc uero de reliquis medicamentis, terræ uidelicet speciebus, & metallicis iuxta propositum agemus: Deinceps etiam de animalibus.

#### DE TERRAE DIFFERENTIIS. Cap. I.



**T**ERRAM omnes homines familiariter usurpatione illam substantiam solum nominant, quæ liquore subacta, luti euadit. Nā quæ inter metalla reperiunt, nō liquefieri, dico autem liquefieri, per totā substantiā in humorem resolui. madescenti autem in superficie, rigari tantum humore ad corporū profunditatem non penetrante. omnis terra uim siccādi habet, quoniam corpus ipsius natura durū existit. & ubi penitus nullā igneae substantiae mixturā habuerit, leuissimē citra omnē mordacitatem siccatur. Conducit ipsi ad hoc praestandū lotura. Itaq; quaedā lotura nō habent opus, quēdā iterum atq; iterū lauari expetunt. Quōd si circa sensum gustus fueris exercitatus, ipse iudex esse potes, num lauare oporteat, siue non, id quod ex acrimonia aut adstringente depræhendes. Quandoquidē uero impossibile est inuenire substantiā penitus inmixtā ac simplicē, amplius cōsiderare ipsam mixturam oportet, ex his quæ accidunt ipsi, iuxta leuitatis ac grauitatis, itemq; saporis differēcias. Siquidē enim adstringens apparuerit, tanto magis particeps est frigiditatis, quāto plus habuerit adstringētis. Si uero acrimonia praese tulerit, tantū habet caliditatis quantum acrimoniae. Et leuis quidē terra fit, quum per omnē suā temperaturā, aëreae substantiae multae particeps est. Contrā grauis, quāto fuerit grauior, tāto magis sincera terra existit. Calida quidem igitur terra calfacit. frigida & adstringens, perfrigerat & repellit. Quæ uero exterforiū quid possidet circa manifestā caliditatem, leniter siccatur. Quæ autē glutinositate amplio-

rem habet, non extergit, sed glutinositas substantiam meatibus obducendis apertorē efficit, ut extergere nō possit, ubi nulla alia acrimonia uiscositati affuerit, uelut in ovo uidere est. Porro necessariū est neque hoc ignorare, sed eius per omnem materiam quæ in medicū usum uenit meminisse. etenim plurimi opinantur, omnia usita frigidiora seipsis euadere, quidā uice uersa calorem in usitis augeri putant. Vtriq; autem errant. Acrīa quidē igitur omnia usita, multum de calore suo perdunt. Quæ uero talia non sunt, usita caliditate acquirunt. Nullum autē usitum penitus frigidum euadit. relinquitur enim in ipsis uelut igniculus quidā tenuium partium, atq; hoc est quod per loturam usita deponunt, quo per aquā decedente, quod reliquum est usiti, substantia terrea frigida fit, quæ citra mordacitatem siccare potest. Aqua uero in qua medicamentum lotum est, calidam uim tenuium partium acquisiuit. His itaq; declaratis, tempestiuum iam est dicere, quo modo omnem terram non usitam lauare oporteat, si quidem lotura indigeat. Nam quaedam, uelut dictum est, lotura non egent.

Quomodo terram lauare oporteat.

Cap. II.

Omnis terra hoc modo lauatur. Aqua primum subigitur, quæ nullam medicamentariam qualitatem praese ferat, deinde ubi lutum defecit, aqua superflans diffunditur, postea reliquum a subiectibus inferne calculosis ac arenosis repurgatur.

Quas medelas agrorum terra praestet.

Cap. III.

Agrorum terra quæ colitur, omnis quæ pinguis est, utilis est ad curationem omnium partium rescificatio non indigentium. Quare & in Alexandria & Aegyptio ipsa utuntur. In Alexandria itaque uidi hydroscopicos & lienosos aliquos terræ Aegyptiacae luto uti.

Mulsi

Mulsi uero etiā furas, & femora, & cubitos, & brachia, dorsumq; ac latera, & pectus, eius terræ luto illinentes, opem senserunt. Quin & ueteres inflammationes & laxos tumores hoc luto sanant. Et sanē noui quosdam toto corporis habitu aquosos, ex immo-dica hæmorrhoidum euacuatione redditos, inde manifestū auxilium sensisse. Quidam etiā diuturnos dolores iuxta partem aliquam firmatos, hoc luto perfecte sanarunt. Atq; hæc quidē Galenus. Verum Strato de terra sic scribit. Ad uetusitū capitis dolorē, fordes balnearū aut aquæ calidæ, cum terra nigra lota misceto, ac utitor. Aut terram cū decocto caput rosarū subigito ac utitor. Aut testam amphoræ acetariæ tritam terræ addito, cum lauri decocto. Aut clibanī testam cū nigra terra cōmittito, affuso fampsiuchi decocto. Cæterū ad pustulas ex corpore erumpentes scabiosas ac impetiginosas, terrā nigram cum amygdalarū aut lupinorum amarorū decocto subigito, ac utitor. Aut amphorā acetī cū rutæ decocto eluto, eorūq; terram subigito, ac utitor similiter. Aut glebulas salis quæ in fundo amphorarū garī reperitūtur terito, ac terræ ammisceto, & itere uelut efficacī. Aut columbinū simū terræ misceto, & cū halicacabi decocto subigito ac utitor. At uero ad nūlsim uetustam unā cū ulcero corporis habitu, terrā osium utulinorum decocto subigito, & pectus illinito. Aut amphoram mellariā eluto, & terrā subigito ac utitor. Potes & cumini, & nigellæ, ac fampsiuchi decocto similiter terram subigere ac uti. Porro ad lienosos, cinerem sarmentitiam, & grumos fecis uini cū terra subigito, ac utitor. Aut foliorum capparidis decocto subigito. Aut recremētum argenti leuissimē tritum, cum luto permisce ac utere. Aut decocto herbæ serapiadis tritescularis subigito ac utitor. Ad hydrophicos aut testas amphoræ murariæ inueteratas terito, ac terræ ammixtis utitor. Aut sullæ carnis siue uitulinæ garum ammisceto, ac similiter utitor. Aut fampsiuchi aqua marina coquito, eorūq; terram subigito ac utitor. Aut salamenū cū lupinorū amarorū decocto conterito, terræq; ammisceto ac utitor. Aut alumen usitū, & pulegiū usitū cinerē, cū luto committito, & cum aceto mulso subigito ac utitor. Aut bubulū simum siccū tritū terræ ammisceto, & aceto mulso subactis utitor. Ad Ischiadicōs, & omnes neuosarū partiū perfrictiones, fampsiuchum utulinorū osium decocto coquito, eorūq; terram albam subigito ac utitor. Aut anguillam cū sale & nitro coquito, & decocto terram subigito ac utitor. Aut fordes strigētidias cum calce uiuæ terræ ammisceto ac utitor. Aut porri siue alij decocto terrā subigito ac utitor. Aut costum, cassiam, iūcum odoratum, aspalathum, xyloballum, & fampsiuchum contusa, in aqua & oleo coquito, lutoq; permisceto ac utitor. Aut caprarū simum acubulum, simul cum sorde ceratī raphaninī terito, ac ad terram ammixtis utitor. Ad podagram, à capite usq; ad inguinā ex prædictis æger integratur, ab inguine autem infra usq; ad digitos pedū & ungues, ex subscrip-tis. Vituli pedes posteriores unā cum unguis exurito, terito ac terræ misceto, & utitor. Aut lapidē leucographidem cum aqua in qua serrū sæpius extinctū est terito, & aluminis unciam unam addito, ac cum terra subigito & utitor. Aut decocto foliorum cypridi, id est ligustri terram subigac ac utere. Aut gallas

donec flaccescat coquito, & terram eo decocto subigito ac utitor. Aliud. Aluminis liquidū uncia unā, aluminis scissi unciam unā, gummi sexcūctē, cæruillæ dodrantē, melantheriæ quincuncem, misyos sexuncem, foliorum salicis dodrantem, olei myrti aut cici uncias  $x \times 1111$ . acetī sexuncem. terito simul ac cū terra subactis utitor. Aliud. Acaciæ, atramentū sutorij, utriusq; drach.  $11$ . aceto trita siccatō, & ad terram ammixtis utitor. Aliud. Aluminis, spumæ argenti, misyos assati, singulorum drach.  $1111$ . ex pice cerato myrteo liquido, & cum terra subigac ac utere. Aliud. Cerusæ, spumæ argenti, utriusq; drach.  $x \times 1111$ . olei myrti drach.  $x \times 1111$ . aquæ quod fatis est subigito cum terra ac utitor. Aliud, quo curatus est præses Philinus. Succī mororū, aluminis scissi, ligustri, uiticis, gallarum, croci, fructus myricæ, thuris, singulorum sexuncem. Omnia simul tenuissimē trita reponito. Vsu expetente necessārio aqua diluās ac cū terra subactis utitor. Cæterū lauari non oportet, sed perficorū immaturorū decocto perfundī ac foueri. Atq; hæc quidē de agrorū terra sufficiūt.

De terra Lemnia, Sigillum Lemnium, Sphragis

Lemnia.

Cap.  $1111$ .

Lemniam terrā, quam & lemnium sigillū, siue sphragidem uocant, præparatam accipere est, semel lotam in patrio loco, ut altera lotura non habeat opus. Verum aliās alio liquore dissoluta, diuerfimodè operatur. Et sanē in malignis ac putredinosis ulceribus semper feliciter & magno fructū, lemnia terra usus sum. Vfus est pro magnitudine malicidē ulceris. Quod enim ualde foetidū est, humectumq; ac sordidum & inueteratū, lemniam requirit acerrimo aceto dissolutā ad lutosam compagem. Vino autē dilutā, recentia uulnera glutinat. pota ad sanguinis retentiones conducit, & ad letalia medicamenta, & ad morsus uenenatorū animalū. Insula quocq; per dysterem cū plantaginis succo, dysentericis magnopere auxiliatur, præablotis uidelicet ulceribus muria insusa. Datur isdem & sanguinem spuentibus in potu cum posca.

Miltos, Rubrica.

Cap. v.

Rubrica siue miltos uim habet adstringendi, meatus obducendi, resiccandi, quapropter etiam emplastris ammiscetur ac pastillis siue trochiscis siccantibus ac adstringētibus. Siftit aluum cū ovis in sartagine frictis accepta, itemq; insula. Lumbricos etiā pota detrahīt. primas omnium habet Sinopica appellata, uerum in Cappadocia nascens, densa existens & grauis, & colore iocineris, unicolor, & quæ diluta in multum succum diffunditur.

Terra Samia.

Cap. vi.

Samia terra non lauatur. Vimur autem altera eius specie frequētius, quam sanē Samiam Asterem siue stel lam uocant, quæ ad sanguinis spumam facta pota, & undecūq; seratur idem, & pota & apposita. Vimur & ad exulcerationes dysentericas & nomas serpēdo depascentes, infundentes eam cum plantaginis succo, maxime in ulceribus quæ inflammato præoccupauit, & aciora pharmaca non sustinet, & in corporibus molli carne præditis. Mitigat enim humediores præsertim & laxiores partes. Vnde in māmari ac etium inflammationibus adhibetur, trita cum aqua, rosaceo tanto adiecto, ut pharmacum exareferere non sinat. Bonum est hoc modo præparatum medica-

metum etiam ad alias inflammationes calidas, & ad inguinum abscessus incipientes, ac fluctiones podagricas, & in summa ubi moderate frigesacere unaq; mitigare uolumus. ut ex hoc adeo manifeste appareat, samiae terrae uim moderate frigefactoriam esse. Est enim aërea & glutinosa. præstat autem stella samia, terræ samiae, eò quod glutinositatem & uim obducendi meatus ampliores possidet.

*Terra Selinusia, & Chia.*

Cap. vii.

Selinusia & Chia terra exteriori uim ualde moderate habent. Quapropter aliquæ foeminae ad faciem his utuntur. Verū cum leui siccatione ac extersione, neq; caliditatis neq; frigiditatis manifeste participes sunt. & propterea ad ulcera in superficie corporum commodè existunt, qualia sunt ambustorū. Ceterū quæ substantiam meatuum ualde obducatoriam habent, nō extergēt, prohibet enim hoc ipsum glutinositas.

*Cimolia terra.*

Cap. viii.

Cimolia terra mixtæ facultatis est, habet enim uim frigefactoriam & repulsoriam, habet & modicā discussoriam. Lota discussoriam deponit. Verum iuxta naturā eorū quæ ipsi ammiscuntur, manifeste utrāq; uim demonstrat. Nam repulsorijs ac frigefactiuis permixta, lutum quod inde fit perfrigerans ac repulsorium efficit, discussorijs discussorium atq; ita ambustis cōducto aceto subacta & illita. Memineris tamen commune hoc in omni leui terra esse. Omnes enim ambustis prosunt euestigidi ex posca illitæ, bulas exurgere prohibentes.

*Terra Ampelitis, Pharmacitis.*

Cap. ix.

Ampelitis terra etiā pharmacitis appellatur, eò quod efficatori alijs uim possidet, & quod agricolæ uere appetente ipsam diluant, ex eaq; radices uitium quæ germen emisserūt illinant, ut animalcula uitibus noxia eas non cōtingant. Ex eo uero quod enipas uermiculas perimat, satis indicat quantum medicamentariae facultatis possideat. At uero lenitate & uim mitigatoriam non habet, sed magis siccatur. Quapropter & mixtam his medicamentis reperies ipsam, quorū scopus est siccare quippiam ac discutere.

*Terra Cretica siue Creta.*

Cap. x.

Cretica terra similis quodam modo est samiae & consimilibus. Sed ualde debilis est, multum aërositatis habens, quapropter etiam uim extergendi citra mordacitatem magis habet, per quam etiam argentum exterit ac depurat.

*De omni terra usita.*

Cap. xi.

Quandoquidem uero quidam medicū terrā urunt, neq; id male excogitatum in usum ulcerū quæ leniter resiccari oportet. Nosse expedit quod usu terra tenuior partium & acrior euadit, ut ad discussoriam facultatem delabatur. Si uero usita laetetur, acrimoniam quidem in aquam deponit, uerum partium tenuitatem ex usura conseruans, magis siccatoria fit. Quapropter quum omnis terra non usita ulceribus commodata sit, ea quæ post usuram lota est, magis adhuc ad ulcera ægre carnē ac cicatricē recipienda cōducit.

*De bolo Armenie.*

Cap. xii.

Data nobis est in hac magna peste etiam alia quædam terra ex Armenia Cappadociæ cōtermina, maximè siccatoriam uim habens, colore pallida. Qui dabit ipsam, lapidem appellabat. Est autem friabilis, uelut calx & stella samia, non tamen similiter stellæ leuis. Nā & magis densa est, minus aërea, quapropter quæ

negligētius inspicitur, imagine lapidis offertur. Valde autem siccatur in dysentericis, tum in fluxionibus uentris. Insuperq; sanguinis sputo, & destillationi, & putredinosis oris ulceribus conducit, maximè autē defluxionibus à capite ad pectus prodest. Quare etiam his qui ob eam causam ægre spirant ualide auxiliatur, nec non his qui tabe laborant, sic enim resiccatur ulcus, ut ne tulsiant quidem amplius. Ceterū si forte quis à malo liberatus, per licetiorē dietam recidiuum sentiat, is idem ex Armenia bolo opem sentiet, præsertim difficillè anhelitu iam diuturno. Porro in magna hac peste omnes qui de hoc pharmaco biberūt, celerimq; sanati sunt, quibus uero nihil profuit, omnes mortui sunt, neq; ab alio quopiā opem senserunt, ex quo palam cōstat, quod solis his qui incurabiles erant non profuit. Bibitur cum uino substantia tenui, mediocriter diluto, si febre penitus careat homo, aut parum subfricetur, in ualde, cū aquato penitus. sed neq; sunt adeo uehementer feruidæ pestilentes febres. At uero quid attinet dicere quantam uim habeat hæc Armenia bolus siue gleba in ulceribus siccatione indigentibus? Appellatur autem illorū lingua uernacula zarinaça, Syrorū uero zarnacha, mons in quo nascitur, iuxta urbem est appellatā Bagana. Ager in quo mōs est, nominatur Agaraces.

*Lapis hematites.*

Cap. xiii.

Hæmatites à coloris similitudine nominatus est, ascriptus enim ad cotem, uel in pila tritus, sanguinolentū succum remittit. tātæ autem frigiditatis particeps est, quantæ adstrictioniis, merito itaq; aucti sunt medicī hæmatitem lapidem ocularibus cōpositionibus addere. Ego uero etiam solo per se usus sum ad aspreddines palpebrarum, si unā cum inflammatione essent oborta, per oui candidum diluto, aut potius per fœnograci decoctum. si uero citra inflammationē, per aquam. Inidum semper faciendum est à moderate, si quido per specillū insulo, deinde ubi æger ferre uim eius potest, crassitudinem augere oportet, & postremum ita crassum facere medicamentū, ut specillū nucleo subdito palpebræ illinere possis, aut euerfæ asafricare. Idem lapis ad cotem tritus ac potius, sanguinis sputo omnibusq; ulceribus conducit. Aridus autem tritus & ad puluillum redactus, reprimat carnē excrecentem, nemo autem ipso per se utitur, ego uero ad ea quæ dixi usus sum, utribus ipsius ex saporis qualitate cognitis. Quin & ipsa ulcera oculorum ad cicatricē perducit per se solus tritus, uelut paulò antè dixi, iuxta infundatur, siue sublinatur. Nam & hoc ipsum experimento cognoui.

*Lapis schistos, galactites, melitites.*

Cap. xiiii.

Consimilem hæmatitæ, sed debiliore uim schistos, hoc est, scissilis appellatus lapis habet. Ad cotē tritus colorem pallidum reddit. Ab eo consequens est Galactites, lactis colorē dilutus reddens, melitites autē caliditatis cuiusdam particeps est. Nam à similitudine saporis mellis nomen inuenit. Singuli itaq; his paululum ab hæmatite utribus deficiuerunt, & ad oculos similiter in usum ueniunt, sed leniores existunt. Leniora autē medicamenta semper sunt inflammatis partibus accomodatiora, uerū debiliora quàm ut depulsa inflammatione ad perfectā sanitatē perducere queat.

*Communis doctrina de omnibus lapidibus.*

Cap. xv.

Quum communis sit omnibus lapidibus uis siccandi, quicunq;

quicunque ex ipsis aut in succum resoluti, aut aliis tri-  
ti, nullam manifestam gustui qualitatem exhibent,  
eos putandum est debilissimos esse & leuissimos, &  
mordacitatis penitus expertes. Qui uero manifestā  
qualitatē gustantibus offerunt, iuxta qualitatis pro-  
portionem etiā uim habent, si quidem enim adfir-  
xerint, ad reprimendū, & constringendum spissan-  
dumq; ac cogendū commodi erunt, si uero momor-  
de rina, ad caliciandū & discutiendum ac colliquan-  
dum ualebunt. Inter hos mediū sunt qui solummodo  
extergent, citra adstrictionem ac mordacitatem.

*Leucographis aut moroxus.*

Cap. xvi.

Ex lapidum qui in succum resoluuntur numero est &  
qui in Aegypto nascitur, quo utuntur ad lineā illu-  
strāda, quē alij moroxum, alij leucographidem uo-  
cant. Nam quum subuiriidis appareat hic, si ad cotem  
asfricetur, aut asperius pallium, locum inalbat. Ex-  
pers est autem omnium qualitati magis quā prae-  
dicti, non adstrictionem, neq; extensionem, neq; mor-  
dacitatem in gustu exhibens. Vnde hoc tantum ipsi  
adeft quoddā citra mordacitatem siccit. & propterea  
cerato ipsum ammiscent, & ad ulcera cicatrice inclu-  
denda utuntur in corporibus mollibus. miscent eun-  
dem & ocularibus compositionibus. Quanto uero  
mollior est & qualitatum magis expert, tanto mo-  
deratior & miior existit.

*Galactites.*

Cap. xvii.

Galactites quoq; consimilem praedicto colorem subui-  
ridem habens, lacteum succum remittit. Est autem al-  
bior leucographide. Mulieres lacte multo implet, si  
ad balneo citrum lapidem cum aqua aut uino dulci bi-  
bant. Miscetur & ocularibus compositionibus. Tra-  
dunt eundem dentium puerorum collo adalliga-  
tum, facilem dentium exortum efficere.

*Thyites lapis.*

Cap. xviii.

Omnibus relictis lapidibus fortiores uim habet, lapis  
qui ex Aethiopia apportatur subuiriidis aliquo mo-  
do uelut iaspis, nominatus thyites. Dilutus hic succū  
reddit lactei coloris, saporis mordacis, & propterea  
solum ad repurganda & extergenda ea quae pupillae  
tenebras citra inflammationem offundunt, cōducit.  
ex quo numero sunt & recetes oculorum cicatrices,  
quas attenuare solet, extergit & pterygium, oculorū  
uidium Vnguem Latinis appellatum, si nō ualde du-  
rum existat.

*Tecolithos quem Syriacum appellant.*

Cap. xix.

Est & alius lapis fortis facultatis in Syria Palestinae na-  
scens, colore albus, figura cōcinnus, lineas habens ue-  
lut a torno exculpas. appellatur Iudaicus & tecoli-  
thos. Cōstringit calculos in renibus natos, dilutus in  
cote, & ex aqua calida potus. Verum in uesicae lapi-  
dibus nihil eximij praestat. Nepheseon tradit hęc uer-  
ba: Tecolithum lapidem cū aqua terito ad sordium  
frigmentitiorum tenuium crassitudinem, & derasis  
circa uescam ac pubem pilis illinito, & cōstringet ac  
liquefaciet calculos in uesica. Vnde & cantilena or-  
ta est,

Salue pelagus Arabiae,

Cladam medelam proferens

Insigniter, tecolithum.

Idem oleo myrteo dilutus, podagricis commodē il-  
linitur.

*Pyrites.*

Cap. xx.

Est & pyrites ex lapidum numero qui fortem uim ha-

bent, colore argēto similis, cuius usus est discussorio  
emplastro ammixti, adicitur ipsi etiam schistus. hoc  
pharmacum saepe pus, saepe & grumosas concretio-  
nes, in medijs musculorum regionibus consistentes  
discussit. Oportet autem lapides qui in usum uertun-  
tur omnes leuissimos facere, ac conterere consimili-  
ter ut eos qui in oculares compositiones miscentur.

*Lapis Phrygius.*

Cap. xxi.

Phrygius lapis fortiter siccit, habēs quid adstrictionis  
simulq; mordacitatis, unde et repellit ac discutit. Ego  
autem usto semper usus sum, ad putredinosa quidem  
ulcera aut per se, aut cum aceto, & aqua posca, aut uino  
mulso. Ad oculos uero siccum ex ipso facio medica-  
mentum, de quo in opere ubi de compositione medi-  
camentorum dicetur, agam.

*Lapis Ageratus.*

Cap. xxii.

Lapis Ageratus quo coriarij utuntur, gurgulionem in-  
flammatum euidenter sanat.

*Lapis Afsius, & flos ipsius.*

Cap. xxiii.

Est & lapis Afsius in Asso nascens, unde & nomen in-  
uenit, tofacei coloris ac cōpagis, friabilisq; ac laxus.  
Innutritur autem in ipso quippiā simile tenuissimo  
pollini, qui parietibus molendinorū inhæret, quod  
petrae Afsiae florem appellant. Est autem tenuiū par-  
tium, ut humore flaccidas carnes eliquet ac resiccat,  
citra fortē mordacitatem. habet & quid saluum in sa-  
pore: ut coniectare liceat generationem ipsius saluam  
esse, rore quodam ex mari petrae insidente, qui postea  
a sole siccetur & obarescat. Similem florū uim ha-  
bet & petra in qua nascitur, sed efficacia debiliorem.

*Gagates.*

Cap. xxiiii.

Estq; alius quidam lapis colore niger, qui igni admo-  
tus, bituminis odorem de se praebet. Hunc traditū re-  
periri in Lycia circa fluuium Gagen, unde etiam Ga-  
gates appellatur. Cæterū ego crustaceos & planos  
lapides nigros, debilem flammā generantes igni ad-  
motos, ex Cana Syria atriuli prope Hierichuntē, qui  
nati erant in uertice mortuū mare ambiente, ad partiē  
eius orientalem, ubi & bitumen prouenit, unde &  
odorem huiusmodi acquiritur. Vfus sum autē his  
ad inflationes genuum diuturnas & aegrē sanabiles,  
compositionibus ad hoc accides experimento cogni-  
tis ipsos ammiscens, & sanē uisi sunt mihi uim illarū  
longē efficacissimam reddidisse. Ammiscui eosdem  
& emplastro Barbaro appellato, & euasit pharma-  
cum manifestē amplius siccatoriū, ut & sinus cōmita-  
teret ac contraheret, non solum cruenta uulnera glu-  
tinaret, ad quae barbarū emplastrum maximē com-  
modum esse credidit. Ajunt Gagaten aqua coctum,  
& cū aqua potum, lumbrosos expellere, adalligatū  
autem capitis dolores inueteratos sedare. Accelerat  
partū mulieribus aegrē parientibus, si parturiētis ma-  
nu contineatur. Admiranda uis gagatae igni admodū  
& accensī, deinde uino extincti existit. Nam uinum  
hoc cardiacis in potu datum, statim ipsos leuat, & su-  
dore cōpresso, & pulsu excitato. Alij in puluillū con-  
terunt gagatē lapidem, & per dies septem cū uino co-  
lids exhibent, & penitus malū tollunt, datur in diem  
drachma una. Quin & poculum ex ipso suffumigat,  
ex quo cum uino bibendus datur. Idem praestat effi-  
cacier bitumen quoq; potum, fugat serpentes ac re-  
piles bestias suffusis gagates, & menses ac secundas  
detrahit, depræhendit item ac arguit comitiales mor-  
bos. strumas quoque dissoluit tritus, ac commodis ad

iplas medicamentis ammixtus. sanar & sedis affectio-  
nes, quam leuissimè tritus, & uuarum acerbam  
succo ad tertias decoctus. Quo modo etiam alias o-  
mnes corporis fluxiones compescere potest.

#### Magnetis lapis.

Magnetis lapis qui & Heradius appellatur, confimi-  
lem hæmatitæ uim habet. participat & attractoria  
facultate. Tradunt detentum manu chirurgicorum  
ac podagricorum, dolores ipsorum sedare. æque &  
conuulsis opitulatur.

#### Smiris, pumex, testa clibani, & similia. Cap. xxvi.

Smiris extersoriam uim habet. Dentes itaq; mîdos fa-  
cit si ex ea confricentur, uelut experientia cognoui-  
mus. Et pumex extersoriam uim habet uelut smi-  
ris. Et sigulina testa eadem ui præstat, maximè cliba-  
norum. Cæterum smiris etiã acre quippiam habet,  
& propterea ustorij ac siccatorij compositionibus  
miscetur. Item eis quæ curant humore flaccidas gin-  
guas. Sed & pumex affrictus dentes illustrat, non  
solum extergendo, sed etiã per asperitatem. Vitis au-  
tem pumex nihilo inferior est smiride, ad eosdẽ usus.  
Lotus idem post uisuram, caua ulcera optimè carne  
replet. At uero clibanorum testa, una cum extergen-  
di facultate & siccatoriâ possidet. Quapropter em-  
plastra ephestitas & magos, ex hac testa composita,  
optimè dicatricem ulceribus inducunt.

#### Lapides in spongijs.

Lapides qui in spongijs reperiuntur uim attendi ha-  
bent, non ramen adeo ualidam ut ueliscæ lapides cõ-  
fringere possint. uerum renum calculos cõminuunt.

#### Ostracites, Geodes, Naxie cotis retri- mentum. Cap. xxviii.

Ostracitem lapidem quosdã laudare audio, uelut qui  
multam siccatoriâ uim habeat ex adstrictione &  
acrimonia permixtam. quemadmodum & eum qui  
Geodes appellatur ita ut pupillas depurget, & mam-  
marum ac testium inflammationes sanat aqua dilu-  
tus. Naxiæ tamen cotis retrimentum fuscifactoriam  
uim habet: ut etiam podagris opituletur, cum cerato  
rosaceo adhibitur.

#### Ophites lapis.

Cap. xxix.

Ophites lapis uisus extergendi ac atterendi & confrin-  
gendi uim habet. Quare potus ex uino albo ac tenui,  
lapides ueliscæ cõfringit. Adalligatur ad uiperæ mor-  
sus conducti.

#### Hieracites lapis & Indicus. Cap. xxx.

Hieracites & Indicus lapis hæmorrhoidas rescificat de-  
xtero femori adalligati, cuius rei & nos periculum  
fecimus. Diogenes autem de lapidibus libro sic ait:  
Lapis hieracites subuiritidis est ad nigredinem uer-  
gens, & alijs coloribus respersus, ut uariis existat.  
Vim autem habet hæmorrhoidas rescificatæ dextro  
aëri femori adalligatus. Probatio ueri hæc est. Vbi  
habueris ipsum in manibus, melle manus iunge, &  
muscæ non appropinquabunt tibi lapidem ferentem.  
At uero Indicus colore subfuluus est, tritus autem  
purpureum colore succum remittit, & neque densus  
neque rarus est, & cum uino potus hæmoptoicis  
prodest. Qui uero exalbidi coloris est & cineris ima-  
ginem repræsentat, etiam alias sanguinis erupciones  
fistit.

#### Vitrum.

Cap. xxxi.

Vitrum tenuissimè tritum, ex uino albo tenui potum,  
uulscæ calculos potenter confringit.

#### Lapis Aëtites.

Cap. xxxii.

Aëtites lapis agitur sonitû edit, uelut ex altero lapide  
prægnans. fetus uuluarum lubricarum retinet finis-  
stro brachio adalligatus. Verû tempore partus adi-  
mendus est de brachio & femori adalligandus, pa-  
rietq; prægnans citra dolorem. Fures deprehendit,  
si quis ipsum in panem qui comeditur imponat. nã  
qui furtum fecit, commanfa deuorare nequit. Tra-  
dunt etiam simul cum edulij coctum fures arguere.  
Neq; enim poterit fur deuorare quæ cum ipso cocta  
sunt. Tritus autem & cerato cyprino aut gleucino  
exceptus, aut alio quopiam calfaciente, magnopere pro-  
dest arthriticis ac paralyticis.

#### Alabandicus siue Alabandinus lapis. Cap. xxxiii.

Alabandicus coloris subnigricans est suluo ammixto,  
pellucet quasi segmentis quibusdam aut fissuris dis-  
criminatus. Tritus hic superficiem pilorum alborû  
nigram efficit.

#### Electrum siue succinum, seu lyncurium. Cap. xxxiiii.

Electrum quod & succinum, & lyncurium appellant,  
porum dysenterias sanat, & stomachicis opitulatur.  
Chryseletrum quoq; cum mastiche potum dolori-  
bus stomachi medetur.

#### Iaspis uiridis.

Cap. xxxv.

Viridis iaspis proprietate quadam, uelut alia quedam,  
auxiliatur stomacho & ori uentris pro amulero ap-  
pensus. Quidam & anulis ipsum includunt, & dra-  
conem radios habentem in ipso sculptum, quemad-  
modum Nechipsos rex scripsit. Huius itaq; lapidis  
etiam ego experimentum ingens habeo, & sanè ca-  
tenulam ex talibus lapidibus concinnatam de collo  
suspendi, ea commensuratione ac modo ut lapides  
os uentris contingant. Cognoui autem nihil minus  
ualere ac prodesse eos qui sculpturam non haberent,  
quam Nechipsi tradidit.

#### Iaspis subuiritidis.

Cap. xxxvi.

Iaspis subuiritidis adalligatus, stomachi dolores sedat, et  
paralyticas resolutiones ac dolores mitigat. Qui ue-  
ro capnijs appellatur, hoc est fumosus, turbulētum  
ualde habens colorem, magna tutela ægrè parientes  
mulieres asseruat. Sed & hydropicis adalligatus cõs-  
modat, & maxima uulnera ab inflammationibus  
asseruat, eosq; qui uulneratur dolore liberat itidem  
adalligatus.

#### Iaspachates.

Cap. xxxvii.

Iaspachates ex iaspide smaragdeo, & achate composi-  
tus est. Vim habet leniendæ sitis, & hydropicis au-  
xillatur, hepaticisque ac peripneumoniciis & pleu-  
riticis potus. corpus quoque floridum ac speciosum  
facit.

#### Sapphirus lapis.

Cap. xxxviii.

Sapphirus cum lacte tritus potus, omnes internas ulce-  
rationes sanat, & sudores sedat. Externas ulceratio-  
nes idem cum lacte illitus curat. fissuras quoque lin-  
guæ aridus tritus inspersus sanat. In summa siccato-  
riam uim habet.

#### Smaragdus lapis.

Cap. xxxix.

Smaragdus assatus & tritus cum melle Attico permi-  
xtus, oculorum hebetudines sanat. Cum melle uero  
& gummi illitus, elephantia laborantibus utilissi-  
mus est. idem quoq; potus ab eo malo in totum libe-  
rat. fistit & sanguinem undecunq; feratur.

#### De metallicis, & quæ ex aqua generantur. Cap. xl.

Metallica appellare mos est medicis ea quorum gene-  
ratio

ratio in metallis est, siue sponte naturæ, siue per for-  
nacem producatur. Insuperque tertij generis quæ  
rursus ex illis ipsis homines suo ingenio faciunt, ue-  
lut est cerussa, ærugo, sandix, & similia. Itaque con-  
sequenter de omnibus iuxta literarum Græcarum  
ordinem trademus.

## A. Adarces.

Cap. XLII.

Adarces acerrimus ac calidissimus est. Quapropter  
hebetantibus uim ipsius miscetur. & sic multi usus  
fit, affectionibus calidiori indigentibus forinsecus  
admotus.

## Alcyonia.

Cap. XLIII.

Alcyonia omnia extergent, ac discutiunt, habetque acrem  
qualitatem aliqua magis, aliqua minus. Quod ex  
hoc genere Asperum appellatur, externam superfi-  
ciem leuem habet, & internam substantiam asperam.  
estque calidissimum omnium Alcyoniorum, ut etiam  
pilos exurere possit. Quapropter ad lepras, uiciligi-  
nes, scabies ac impetigines, alijs mitioribus medica-  
mentis utimur. Nam Asperum Alcyonium non so-  
lum extergit ac depurgat cutem, sed etiam excoriat  
ac ulcerat. Quod uero Milesum uocatur, figura uer-  
mi simile, purpurei coloris, & compage substantiæ  
molli, omnium tenuissimum est. Quare usum alo-  
pecias sanat, cum uino fuluo ac tenui illitum.

## Ales, sal.

Cap. XLIII.

Sal omnis & fossilis & marinus, eandem in genere uim  
habet. Differetia in eo est quod ex terra effossi sub-  
stantia magis sit coacta, quapropter crassitudo par-  
tium, & uis adstringendi, in his maior existit. Fossili-  
s generis optimus est Ammoniacus & Cappado-  
cius. At uero marino specie similis est qui in qui-  
busdam stagnis generatur. Omnis tamen sal in com-  
muni calfacit, discutiit, adstringit, siccat, cogit ac den-  
sat substantiam corporum quibus adhibetur. Nam  
quicquid est in corporibus humiditate idipsum de-  
pascitur, & quod reliquum est solidæ substantiæ ui  
adstringit spissat. Vnde & siccant, & incorrupta  
adseruant, quæ ob superfluum humiditatem putres-  
cere solent.

## Salustus.

Cap. XLIII.

Salustus discussoriam uim magis habet quam non u-  
stus, quanto sane tenuius corpus ex uisura acquirit.  
Non tamen similiter ut non uisita cogere ac densare  
solidam substantiam ualet.

## Salis flos.

Cap. XLV.

Salis flos compage quidam liquidus est, colore uero cro-  
ceus, partium tenuitate usum saltem superat, & acrem  
qualitatem ac uim multum discussoriam habet. Col-  
ligitur sub æstum caniculæ. Est enim uelut flos qui-  
dam talibus aquis superflans.

## Salis spuma.

Cap. XLVI.

Salis spuma spumofus quidam flosculus salis est, uicinis  
petris adherens. multo autem tenuiorum partium  
naturam habet quam ipse sal, quare & attenuare &  
discutere multo magis potest, uerum quod reliquum  
est substantiæ densare uelut sal non potest.

## Armeniacum pictorum.

Cap. XLVII.

Armeniacum quo pictores ununtur ex Armenia ap-  
portatur, unde quoque holus Armeniæ, de quo di-  
ctum est, affertur. Vim habet Armeniacum extor-  
sionem cum modica acrimonia & paucissima adstri-  
ctione. Itaque quum tale sit ocularibus medicamentis  
ammiscetur. Quin & ipsum per se terunt in tenuissi-

imum puluillum, utunturque sicco ad augmentum pi-  
lorum in supercilijs, ubi ob quandam humorum acri-  
moniam aliqui ipsorum excidunt, aliqui uero non au-  
gescunt, sed ob alimentum inopiam marcescunt. Nam  
acrimonia consumpta, particulam ad naturalem ha-  
bitum reducit. Etenim uisioso humore consumpto,  
natura ad proprias actiones redit, quum nihil sita-  
pius quod ei impedimento sit. Nechepus de eo sic  
tradit: Armenium quo pictores utuntur, duodecima  
drachmæ parte melancholicis & crassum sanguinem  
habentibus dato. Datur & pueris pectoris morbo in-  
fectis, reuomunt enim. nam uomitorio existit. Da-  
tur & morbo sacro obnoxij, ac furiosis, hoc modo:  
Centaury fasciculos manipulares tres in aquæ mari-  
næ heminis tribus coquito, donec una supersit, &  
cum excolaro decocto Armuthel lapidis quæ Græc  
Armenium uocant, tertiam drachmæ partem terito,  
ac confidenter exhibeto. Nihil enim periculi est. Ita-  
que nosse opera: precium est quod Armenium peni-  
tus reuomitur, nihil memorabile sursum efferens, sed  
& infernæ modicum quid paulatim, & in pluribus  
secessibus effert.

## Arsenicum, Auripigmentum.

Cap. XLVIII.

Arsenicum uisoria uim habet tum usum, tum non  
usum. Manifestum est autem quod usum tenuio-  
rum partium euadit.

## Asphaltus, Bitumen.

Cap. XLIX.

Bitumen ex numero eorum est quæ in aqua marina aut  
consimili generantur. Optimum est quod in mortuo  
mari iuxta Hierichumten provenit. Vis est omni bi-  
tumini siccatoria ac calfactoria, ordine secundo. Me-  
ritò itaque ad cruenta uulnera glutinanda adhibetur,  
itemque ad alia quæ siccari expetunt cum moderata cal-  
factione. Quapropter in tenasmi ad egerendum irri-  
tamentis, in quibus pituita crassa infarsa est ut ægrè  
auelli queat, ipsius utimur suffitu. Similiter et ad dy-  
sentericos ex tali causa intestinis ulceratis. Potum  
bitumen nucis ponticæ aut fabæ magnitudine cum  
uino tritum, cardiacis qui animo linquantur, ma-  
gnopere euersigio prodest. Maxime autem feminis  
& pueris & corporibus mollibus conducti. Eodem  
modo datum & quartana citius liberat. Experimenti-  
to constat uis eius potius ex aqua, in his qui a rabioso  
cane morbi sunt: præseruat enim eos ne in timorem  
aquæ delabantur, & eos qui iam inciderunt cõseruat.

## Aphronitrum, Liri spuma.

Cap. L.

Aphronitrum, hoc est, liri spuma, & liri spuma inter  
se differunt, quod liri spuma medicamentum est ma-  
gis siccatorium, aspectu farinæ triticæ simile. Nam  
alba quoque existit. Aphronitrum autem non farinosum  
neque dissolubile, sed compactum est. Differt au-  
tem a sale aphronitrum, in quantum unum solum  
prædominantem saporem manifestè in ipso uidere  
est, amarum uidelicet, qui discussoria uim habet, den-  
satoriam uero non habet, quemadmodum sal possit  
der. Aphronitrum itaque extorioriam uim habet ut  
non solum fordes depurget, sed pruritum quoque sa-  
net. At uero liri spuma eandem uim quam litrum  
habet, sed tenuiorum partium existit.

## Gypsum.

Cap. LI.

Gypsum una cum siccatoria facultate, uim quoque ob-  
ducendi meatus assumpti, lapidescit enim aqua ma-  
ceratæ. quapropter puluillo farinæ triticæ molen-  
dini parietibus adherenti mixtum, & oui candido  
d 4 sub



subactum, ac pilis leporinis exceptis, sanguinis eruptiones prædare sinit.

△ *Diphryges.*

Cap. LII.

*Diphryges* mixtam facultatem adstringentem cum acrimonia habet. Quapropter & malignorum ulcerum bonum medicamentum est, & ad putredinosa oris ulcera, tum per se, tum cum melle despumato. Item ad anginam, maximè ubi iam per adstringentia humorum influxus fuerit repressus. Quin & gurgulione resecto, ipso solo mox usque ad cicatricem indurata saepe usus sum, utpote pharmaco omnia ulcera exacerbat cicatrice includente.

*Diaphanes, Lapis specularis.*

Cap. LIII.

*Diaphanes* siue lapis specularis appellatur,ustus tritus fistulosus ulceribus inspersus celerrimè incarnat.

Θ *Theion, Sulphur.*

Cap. LIIII.

*Sulphur* omne usum attractoria habet, temperamento calidum, substantia tenuium partium existens, ut & ad multa venenum ei aculantia animalia resistat. Ego autem & ad pestinacem marinæ & draconis morsus acictus eo saepe usus sum, arido uulnere insperso, aliquando etiam salua ammixta, aliquando oleo utere, aut melle, aut terebinthina. Sed et scabies ac lepras & impetigines saepe cum eo curauit addita terebinthina. Deterit enim tales affectus, nec materiā in altum repellit, quemadmodum multa medicamenta faciunt.

I *Ios xystos, Aerugo rasa.*

Cap. LV.

*Aerugo* rasa acrem qualitatem habet, discutitque ac consumit & liquefacit omnem carnem. Quod si ad multam ceram ammisceatur, exterforium & cicatricem inducens pharmacum.

*Aerugo uermiculata.*

Cap. LVI.

*Aeruginem* uermiculatam ita facies. In pilam cyprij aeris, quæ & pistillum æreum habeat, aciet albi acris dimidiam heminā infundito, & in sole terito donec strigmentitiam spissitudinem acquirat. Deinde aluminis rotundi drachm. i. & salis fossilis pellucidè albi quæ ac solidi drachm. i. addito, aut si hoc non adsit, nitri tantundem, & posita ad solem sub caniculæ æstum terito, donec colore aeruginosum, compage uero strigmentiosum euadat, atque sic ad uermicularem figuram effingito, ac reponito. Efficacior sit ærugo, si acetipartem unam, urinæ uteris duas contriueris.

K *Cadmia.*

Cap. LVII.

*Cadmia* optima est botrytis. Vim habet omnis cadmia siccatoria, participans ac extensoria. In caliditate ac frigiditate differentia moderata est. Vitis uero & lota medicamentum siccans & extergens citius mordacitatem euadat, ad ulcera explenda tum oculorum, tum totius corporis commodum.

*Cyanus.*

Cap. LVIII.

*Cyanus* acrem & discussoriam ac demolientem cōsumentemque carnem uim habet, participat & adstrictoria.

Δ *Lepis, Squama aeris ac ferri.*

Cap. LIX.

*Squama* alia aeris est, quæ sanè helitis uocatur, alia ferri. Helitis itaque in siccando primas habet, utpote tenuiorum partium, & quæ aliquid aeruginis assumptum, uerum ferri squama maiore adstringendi ui participat, atque ea adhuc amplius ferri stomomatis appellata, hoc est, chalybis, siue in aciem efformata. Quapropter hec abæ ad maligna ulcera meliores quam squama aeris existunt. Aeris autem squama cōsumit & eliquat carnes. Omnes uero squamæ multum mordaces sunt.

*Lythargyros, Argenti spuma.*

Cap. LX.

*Argenti spuma* moderate siccata, quemadmodum alia omnia consimilia, calidit quocumque partemque perfrigerat, ac extergit, atque hæc omnia moderate facit. Quapropter uelut materia saepe ipsa utimur, eamque alijs ammisceamus, quemadmodum etiam cera uelut materia quædam uelimur.

*Litrum.*

Cap. LXI.

*Litrum* inter aphronitrum & salem mediam uim habet. Vsum autem ad spumæ litri substantiam proprie accedit. Siccata itaque & discuit, si quidem intra corpus sumatur, siccata & attenuat crassos ac uiscosos humores, multo magis quam sal. Aphronitrum autem nisi magna urgente necessitate, nemo deuoratur, ut quod stomacho incommodum existat. Et tamen ruralis quidam in strangulatu fungorum ipso utebatur magno successu.

M *Melanteria.*

Cap. LXII.

*Melanteria* medicamentum adstringens est, simulque tenuium partium, ferè omnium maximè pharmacorum quæ adstringunt.

*Melan, Atramentum scriptorium.*

Cap. LXIII.

*Atramentum* scriptorium abunde siccata aqua dilutum, aut potius posita, & ambustis cunctis illitum prodest.

Misy, Sori, & Chalcitis.

Cap. LXIII.

Iuxta Cyprii metallum in Solorum montibus, magna quædam domus erat in monte effossa, iuxta cuius detritam parietem, ad ingrediētes uero sinistrum, introitus erat ad ipsum metallum, in quo quædam uidi plurimum extensas uelut zonas alternatim positas tres numero, infimā quidem foreas, supra ipsam chalcitidis, deinde misyos. Et progressu sancti temporis chalcitis paulatim transmutatur in misy, & diutius adhuc tempore potest etiam fori in chalcitidem permuari. Quare nihil miri est, tria hæc eiusdem generis uim habere, & tenuitate ac crassitudine partium tantum differre. Crassissimarum enim partium inter ipsa est fori, tenuissimarum misy. Mediam uero inter ambo uim chalcitis possidet. Vitis hæc tenuiorum partium sunt, led minus adstringunt.

*Molybdæna, Plumbago.*

Cap. LXV.

*Molybdæna* siue plumbago similem argenti spumæ uim habet, ad frigiditatem uergentem, sed neque extensoria facultatis particeps est.

*Molybdos, Plumbum.*

Cap. LXVI.

*Plumbum* uim habet frigefactoria. nam liquidā substantiam possidet à frigiditate coactā. Vnde & mole & pondere augescit plumbum, in domibus subterraneis turbidum ærem habentibus repositū. Itaque si pilam plumbæ unā cum pistillo plumbæ paraueris, & in ipsam uinū tenue, & oleum rosaceū, aut myrtem, aut melinū infuderis, et ad solē siue ignem triueris, ut succum quædam plumbū remittat. Optimum pharmacum habebis, si eo succo ad sedis inflammationes ulceratas, aut pudendorum, aut testium, aut mammarum uteris. Item ad omnes inflammationes quæ inguinibus, aut pedibus, aut alijs articulis incurbunt. Est & mirabile medicamentum ad maligna & cancerosa ulcera. Ad multos usus idem commodum erit, si ex adstringentibus ac perfrigerantibus succum aliquē addideris, uelut est feridis, coryledonis, semperuisi, portulacæ, psyllij, uinæ acerbæ. Quæcumque uero ex his succū non facile remittunt, uelut portulacæ, his alio

89

his aliorum succū ammiscere oportet, uelut uis acer-  
ba. Lamina porro ex plūbo facta & lūbis imposita,  
ueneris impetus cohibet in his qui exercitae se uo-  
lunt. At uero uisū & lotū plumbū, ad maligna ulce-  
ra, & chironia, & cancerosa, optimū pharmacum est  
dicatice inducens tum per se, tum alijs ammixtum.

II Pompholyx.

Cap. LXVII.

Pompholyx lota ferē omnium primas obtinet quē ci-  
tra mordacitatem faciant. Vnde ad cancerosa ulcera  
commoda est, & alia omnia maligna, & corrosas  
dentium gingiuas.

P Rhoïdarii preparatio.

Cap. LXVIII.

Rhoïdariū uariē præparatur. Optimus modus hic est.  
Rhun olus accipito, & in aqua macerato, & lapidem  
cupholithon appellatū terito, rhois cremore affuso,  
siccati finito. Deinde anchusæ radicem cum oleo co-  
quito donec oleum ruffeat, & ex oleo parum ad-  
dito ac terito, & ad dies xv. siccati finito, & tūc rur-  
sus ex cremore rhois affundito ac siccati finito. De-  
inde in uas testaceum mitto, obturato ac affato, &  
erit bonum rhoïdarium. Cæterū cupholithos à Cæ-  
sare Palestinæ affertur. Qui cupholitho carens, calce  
uiuā ad medicamentum præparandum utuntur.

Σ Sandaracha.

Cap. LXIX.

Sandaracha uisoriā uim habet uelut arsenicum, unde  
in compositiones discussorias & extensorias ipsam  
ammiscunt.

Sandyx quæ & Syricum.

Cap. LXX.

De Sadyce siue Syrico ubi de cerussa agemus dicetur.

Scoria.

Cap. LXXI.

Scoria omnis multum siccatur. Si itaq; ferri scoria siue  
recrementum quā leuissimē contriueris in acerrimo  
aceto, & postea coxeris, pharmacum maximē  
siccatiorum ad inueteratas aurium purulentias ha-  
bebis. At uero argenti scoria appellatur helcysina,  
eadem siccandi uim habens.

Sibium.

Cap. LXXII.

Sibium ultra siccatoriam uim omnibus metallicis cō-  
munem, habet & adstrictoriam facultatē. Quapro-  
pter & ocularibus medicamentis ammiscetur.

Spongia.

Cap. LXXIII.

Spongia pice liquida ac bitumine imbuta & uisā, acré  
& discussoriā uim habet, sanguinemq; sistit. Spongia  
noua aqua frigida aut posca, aut uino madefacta,  
pro corporum uidelicet differentia, uulnera cruenta  
glutinat, uelut alia ad hanc rē idonea medicamenta.

Stypteria. Alūmen.

Cap. LXXIII.

Alūmen omne uehementissimā adstringēdi uim ha-  
bet. Scissile omnium maximē subtilium partium est.  
Deinde rotundum. Crassarum partium est liquidū,  
itemq; crustaceum ac laterarium, placitū & plintia  
in Græci appellant.

T Tizanos, Calx.

Cap. LXXV.

Calx uiua uehementer urit, crustam inducit. Exin-  
cta euestigido quidem & ipsa crustam infligit, uerum  
post unam aut alterā diem, & minus urit, & minus  
crustam inducit. & progressu temporis penitus cru-  
stam non infligit. Calcasti tamen adhuc & carnes cō-  
sumit. Si uero lauetur, mordacitatem deponit, & li-  
xiliū facit: ipsa uero citra mordacitatem siccatur. &  
si bis aut ter, aut pluries lauetur, penitus lenis euadit,  
& generose citra mordacitatem siccatur.

Φ Phycos, Fucus.

Cap. LXXVI.

De fuco referam ubi de cerussa tractabo.

Χ Chalcanthus, Atramentū sutorū. Cap. LXXVII.

De hoc pharmaco meritō mirari licet, quomodo fore-  
tissimæ adstrictioni caliditas non ignaua in ipso mi-  
xta sit. Quare manifestum est quod omnium maxi-  
mè humidas carnes siccare potest, humiditatē calore  
consumēs, adstrictione uero densans ac spissans sub-  
stantiam. Fit & hoc in Cypro prope locum ubi mi-  
sy, chalcitis, ac fori reperiūtur, ut ex his intelligi pos-  
sit, aquam pluuiālem per collem illum excolatam,  
omnem illam terram circumluere ac abluere. Vidi  
autē hanc paulatim coaceruari quotidie in lacu quo-  
dam, & erat sanē tepida ac uiridis, chalcitidem & æ-  
ruginem odore repræsentans. Quidam autē ipsam  
exhaurientes aquam, in urnas quadrangulares ficti-  
les transfundunt, in quibus plurimis diebus coacta  
ac densata chalcithus fit. Verum temporis progressu  
etiā chalcanthus in chalcitidem transit.

Chalcitis.

Cap. LXXVIII.

De chalcitide iam diximus ubi de misy egimus. Nunc  
facis est illud tantum dicere, quod adstrictoriam &  
acrem uim mixtam habet. Prædominatur autē acris,  
uehemens aded existens, ut & carnem inurat, & cru-  
stam inducat. Vistā chalcitis mordet quidam minus,  
sed non minus siccatur. Deponit & adstrictionis non-  
nihil. Quare penitus melior est uisā chalcitis quā  
non uisā, tenuiorum partium uelut alia uisā euadēs,  
acrimoniam autem non adsumens, Nam quæ natu-  
ra acris sunt, uisā mitiora sunt reliqua acriora. Lo-  
ta insuper chalcitis adhuc lenior euadit.

Chalcos, Aes uisum.

Cap. LXXIX.

Aes uisum habet quiddam acre in se, sed & adstrictio-  
nis particeps est. Et propterea si laeuitur, optimum  
pharmacum est ad ulcera dicatrice includenda. Verū  
ante uisuram, in his qui duras carnes habent usus  
eius assumitur.

Chalcu anthos, Aeris flos.

Cap. LXXX.

Aeris flos tenuiorum partium uim habet quā æs uis-  
um, & squama eris, participat & extensoria ui, un-  
de ad magnas asperitudines palpebrarum con-  
ducit, sycoses Græci appellant.

Chrysocolla.

Cap. LXXXI.

Chrysocolla ex eorū numero est quæ carnes eliquant,  
non tamen fortiter mordet, discussoria uisq; facis est  
& siccatoria. quidam eam solam ita appellant quæ  
inter metalla reperitur. Verum præstat arte parata,  
in pila ænea eris rubri, pistillo quoq; similiter greo,  
urina pueri impubis addita, ita ut diutius in sole ca-  
lido teratur. Nam quod inter terendum resoluitur,  
id siccatum commodissimum medicamentum fit ul-  
ceribus malignis, tum per se, tum idoneis ad eandem  
rem pharmacis ammixtum.

† Psymmitium, Cerussa.

Cap. LXXXII.

Cerussa ex plumbo acris aceto dissoluto paratur, & ta-  
men neq; acris neq; mordax est, neq; discussoria, sed  
& meatus obducit, & perfrigerat. Vistā autem pura  
cerussa, in id quod Syricum appellatur trāsit, medici  
sandycem nominant. Et uisā quidē cerussa tenuio-  
rum partium euadit, non tamen calfactoria. At uero  
fucus frigiditatem cerussæ seruans, partium subtili-  
tatem insuper assumpsit, ut per ipsam in alium cor-  
porum penetrare queat.

Psoricum.

Cap. LXXXIII.

Psoricum fit dupla chalcitide ad argenti spumam  
ammixta, ita ut hæc primum acerrimo aceto tea-  
rantur,

rantur, deinde in ollam nouam indantur, quæ media æstate per dies quadraginta in sterquilino defoditur. Hoc medicamentum magis siccatorium, & minus mordax fit quàm chalcitis, palam est autem quod & tenuiorum partium euadit.

*De materia medica ex animalibus.* Cap. LXXXIII.  
Plantarum materia explicata, non omni uidelicet per totum terrarum orbem, sed quantæ nos experientia habemus. Imò & terra & lapidea materia medica enumerata, superest adhuc materiam ex animalibus persequi, siue ea in aqua, siue in terra uitam degant. Quemadmodum autem in platarum materia, etiam de succis qui ex ipsis fiunt mentionem fecimus, sic etiam nunc non solum solidarium in animantium partium uim trademus, sed etiam in ipsis contentorum, uelut sanguinis, bilis, urinae, stercoreis, et similibus, relictis tamen abominandis ac detestandis, & quibusdam lege prohibitis, de quibus cum alij quidam, tum Xenocrates scripsit, uelut est homines comedere, urinas bibere, ac menses muliebres, et similia. Imò relictis quoque medicamentis certa morbum genera inducentibus, itemque compositionibus uenenosorum pharmacorum. Qui enim talia scribunt non minori sed maiori odio digni sunt, quàm qui perpetrant, quanto maior iniuria est cum multis malum aliquod quàm unum solū perpetrare: Et cum actore quidem flagitiosarum speculationum experientia commoriatur: Scribentium uero malefactū immortale est, arma maliciæ improbis suppedians. Dicemus itaque nos de commodis hominibus rebus, quarum experientiam habemus, & sanè primum humorem in animalibus mentionem faciemus.

*De sanguine.* Cap. LXXXV.  
Columbinum sanguinem solēt hi qui ossa capitis fracta perforant, crassæ membranæ infundere, quod si columbinus non adsit, palumbi aut turturis sanguine uti licebit. Quidam & ad fugillatos oculos eodem utuntur calido instillato de recens maciato animali, aut de uenis alarum dissectis. Ego uero sexcetos uidi ossibus capitis perforatos, & nihil læsos ex rosacei usu, citra sanguinem columbinum. Sunt autem & fugillatorum oculorum medicamina multa ex collyriorum genere, & maxime Damocraus ex myrrha, ite quod ex thure constat, & quod ex croco. Sed et scæ nigraei succus in hunc usum potior est sanguine columbino. At uero caprinum sanguine quiddam hydropticis pharmaci loco dederūt, & ad uentris fluxiones aut dysenterias eodē assato usi sunt. Hircinum quoque sanguine aliqui siccant, & alijs ad hanc rem commodis ammixtum, calculosis exhibent. Itaque licebit ruri degenti & alijs auxilijs carēti, etiā hunc in usum uertere, nam experientia periculo uacat. Quin & hoedinus sanguis in usum uenit, de quo Xenocrates sic scripsit: Hoedinus sanguis spuentibus sanguinem ualde commodus est. Oportet autem nondum congelato dimidiæ heming mensura, aceti acerrimi tantundem ammiscere, deinde seruēfactū in tres partes diuidere, & singulis diebus partem unā absorbendam præbere. Vespertilionū porro & ranarum ac ridinorū sanguinem pilos extirpare saluum reperi, quī experientia id explorarem. Quemadmodū etiam aliorū animalū sanguinis uanas promissiones cōperi, & partem expetiri ne tentauit quidē, quī pharmaca habere aptiora & parabiliora ad singulos affectus, cauebā autem

simul ne præstigatoris opinionem incurrerem.

*De Lactis, ex Ruso & Galeno.* Cap. LXXXVI.  
Duplex lactis utilitas est, altera ut alimentū, altera ut medicamentū, saluberrimum lac est purum ac syneisum, neque amaritudinis, neque aciditatis, neque falsedinis, neque acrimoniæ, neque graueolentiæ pariceps, sed ut ita dixerim, odoratum, aut odoris expers, aut si quidem modicè odoratum fuerit, palam est quod & gustantibus dulce erit, utpote modicæ dulcedinis pariceps. Primum autem differentias ipsius considerare oportet.

*De Lactis differentia.* Cap. LXXXVII.  
Quantum natura inter se distant uacca & equa, ac alia animalia, tantum & lac ipsorum inter se differt. Bubulum enim crassissimū est ac pinguisimum, commodèque nutrit ac partes subit. Liquidissimum autem & tenuissimum ac minimè pingue camelini est, & uentrem minus subit, quamuis multum feri habeat. Sed uice uersa equinum magis aluo secedit, similiter & asinum, quod minimū pinguis succi possidet. Quapropter etiam rarò in uentre in caecum mutatur. Caprinum moderatè compagem habet, & ad purgandum debilius bubulo est, de cætero æquè commodum & multum nutriendum. Ouillum hoc crassius est, uerū utilissimè albas sub cute inducere solet, si quis assiduè ipso utatur. Suillum crassissimum est, ut neque coagulo opus sit ad id coagulandum, & serum modicum fecernat, & in coctura celerimè coeat. Quare nec ad alui excretionem commodum est, & uentriculo nauicam mouet.

*De lactis differentia ab animalū habitu.* Cap. LXXXVIII.  
Manifestum est autem quod omne sanum animal melius lac quàm morbidum præbet. At uero morbos animalium ex tenuitate cutis deprehendere licet, & pilī raritate, tuberculis, impetigine, scabie & inedia. Nigriora quoque in brutis ferè in totū fortiora sunt. Quod & carnes ipsorum testatur, utpote iucundiores. Alba contrā imbecilliora.

*De lactis differentia à temporibus anni.* Cap. LXXXIX.  
Iuxta anni tempora liquidissimum & tenuissimū est lac uernum, hoc est, post partum: spissatius autem temporis progressu, ut media æstate ficius ac crassius reddatur. Laudatur æstiuum ut concoctu facilius, & iucundi odoris.

*De lactis differentia à pabulo.* Cap. XC.  
Quin & circa pabulum plurima differentia in lacte reperitur. Nam aliàs aliā herbam animalia depascuntur, & uiridis quidem herba, & iuxta aquas nascentes, liquidius & modicum lac suggerit. Durior uero & montana, apta est ad boni ac multi lactis generationem. Omnia pabula adstringentia, acerbum & aluū sistens lac præbent. Acris uero & præsertim purgantia, uelut est scammonium, & ueratrum, & tithymalli, uentrem turbans lac exhibent. Cytillus autem pingue ac dulce.

*De lactis differentia ab ætate.* Cap. XCI.  
Animalium in uigore ætatis consistentium lac optimum est. Iuniorum liquidius, seniorum ficius.

*Quibus lac conueniat.* Cap. XCII.  
Ex omnibus ferè edulij optimum lac optimi succi est ac alimentū ex contrarijs substantijs ac facultatibus compositum, subducente ac sistente aluū, obturante ac attenuante. Et sanè ubi qualitas ipsius nihil contrarium utriusque naturæ habuerit, & uiscerū ipsius exitus ob uaso

93

us uasorum amplitudinē spatioſi fuerint, utilitas ex lacte conſequetur, & nihil mali ille ex eo experietur. Viſcitates autem lactis etiā ueteres medici recensuerunt. Ventrīs moderatā ſubductionem, ſucci bonitatem, & alimoniam, & quod cōcoctum probē carnem meliorē reddit, & mordaces ſuccos expurgat. Vnde in urina difficultate, & acri egeſtione alui, nō ſolum bibere conducit, ſed etiā infernē per clyſterem infundere. Ad acres enim & mordaces fluxiones cōmodiſſimū eſt, non ſolum abluens ipſas de partibus infeſtatis, atq; hoc per exterioriā humiditatē, quam in ſeroſa ſui parte completitur, ſed etiā craſſitie ac pinguedine ſua corporibus obliuī ac inductum, nō ſinit influxum ac rē nudis ipſis allabi. Ad pulmonis itaq; ac inteſtinorum ulcera, item renum, uellicae ac uteri, & ad papularum eruptiones, ac ſurunculos, & alias cutis alperitudines, conuenientiſſimū eſt in potu. Item ad eos qui cancharidas hauſerūt, aut bupreſſin, & in ſumma ad medicamenta erodētia ac exulcerantia, & ad hyoſcyamum uelut peculiare remedium eſt. Non ſtatim reſpiſcere affectos facit. Cæterum in gutturis exulcerationibus, quæ cum ob alphas multas cauſas, tū ex anginis ſunt, & hiſ; qui ephemerum ſumpferunt, lac gargarillare conducit. Idem potum magnopere prodeſt alimentum non ſentientibus, & ſiccioribus, ac qui ægrē uires recolligunt. Commodum eſt & ad oculorū fluxiones acres, & ad oculos ſugillatos. Quin & ſorinſecus palpebris impoſitum lippientium, ubi dormire uolent, tū roſaceo & oui candido, inflammationes ipſorum concoquit. Eodē modo utitur & ubi ſedis ulcera mitigare uolumus, propter acres ſeroſos humores ac inflammationes dolore affecta, ſimiliterq; ad pudendorū ulcera, & in ſumma ad omnia lenimento opus habetia, ob inflammationem, aut mordacitatē, aut ulceris malignitatē. Quapropter et canceroſis adhiſcentibus in medicamēta dolorē eximentia ammixerūt, qualia maximē ſunt quæ ex pompholyge ſiunt. In uniuerſum igitur mitigatorū eſt lac, leuē naturam habens, atq; multo magis, ubi ſeroſi humoris maior pars per cocturam, aut aliā artem fuerit conſumpta.

*De modo, tempore, ac menſura utendi*

*lactis.*

Cap. xciii.

Omnis qui lac bibere uolet, à reliquis cibis ac potibus abſtineat, donec concoctum ſit ac ſecceſſerit: ſi enim ante eius concoctionē, alium cibum qui ſumatur, neceſſe eſt & ipſum lac corrumpi, ſimulq; corrumpi & cibum qui ſuperingeſtus eſt. Præſtat autē mane bibere recens multum, & tunc plures labores detrahere, quiete ac ſenſim ambulare, & interim ceſſare citra ſomni admiſſionem. Qui enim hoc modo ſe geſſerit, potum lac excernet, idq; in uitiſſa ſecum educet. Opus eſt enim ſi quid aliud, primum acceptum ſecederet, quo factō aliud bibere. principio igitur ſecedit alio cōmodē purgans, non totam corporis molem, ſed quæ in aluo & inteſtinis ſunt partibusq; uicinis. Poſt hæc itā in uenas deſertur optimeq; nutrit, & nō amplius ſecedit, ſed uentrem ſiſtit. Menſuram ſumēdi deſinitur omnibus, impoſſibile eſt, quādammodum in alijs quoq; edulijs, ſatis eſt igitur quantum facile quiſq; ſerat. Cæterū ad mordaces humores & maximē inſarſos, cū modico melle bibere conducit. nā ſic & utiliſ & magis exterioriū eſt, & citius aluo ſecedit, ammiſcenda eſt & ſapa & uinū dulce. Ita enim

commodius ſtomacho euadit. Quod ſi ſalem accipiat, magis etiā aluo ſecedit, ſed inſucutiſſus exiſtit.

*Quibus lac noceat.*

Cap. xciiii.

Lac quod plurimū ſeri habet, periculo maximē uacat, etiā ſi quis ſemper ipſo utatur, quodd uero modicū ſeroſi humoris, nō parū autem caſeoſi craſſitudinis habet, non ſecuri uſus omnibus eſt, qui frequenter id ſumunt. Rencs enim lædit qui apti ſunt ad calculorū generationē, obturationes quoq; & aſſectiōnes circa hepar efficit, in hiſ qui propiē aſſidit poſſunt. Eiuſmodi ſunt quibus anguſti fines ſunt uasorum tranſſumētiū alimētum ex ſima hepatis parte in gibboſam. Sed neq; capiti cōmodum eſt, niſi quis ipſum ualde ualidū habeat. Quemadmodū neq; præcordijs quæ facile inſtantur pleriq; omnibus enim in uentre inſflatur, ut pauciſſimi ſint qui non hoc perpetuantur. Aſſidus quoq; eius uſus dentes lædit, unā eſt circūſta carne gingiuarū. Hanc enim humore ſlaccidam efficit, dētes uero putredinē & eroſioni obnoxios ſa citid quod craſſiori lacti maximē ineſt. Nā aſinū lac propterea quodd ualdē tenue exiſtit, non ſolū non lædit dentes, ſed etiā ipſis cōmodat, propter uim ex tergēdi. Oportet itaq; ab eſu lactis, uino muſſo aqua diluto dentes colluere: ita enim omne caſeolum dentibus ac gingiuis inſarū extergetur. Cæterū qui caſeum non facile læſioni expoſitu habent, cōmodius eſt uino muſſo meraco citra aque mixturā eos colluere.

*De lactis coctura.*

Cap. xc v.

Si quis præcocto lacte ſerū conſumpſerit, omnino uentrem nō ſubducit, dant autem hoc ipſum hiſ quibus uenter ac inteſtina ab acribus ſuperfluatibus mordētur, & qui ieiunum inteſtinū bilioſis fluxionibus inſeſtatum habent, & dyſentericiſ. Modus præparandi duplex: Aut enim diutius cocto lacte ſerū inſumitur, aut ſilicibus iniectis, ſed quod per ſilices iniectos ſit, craſſius præparatur, & propterea uicioſius euadit cum aliis, tum quod cinis ex ignitis lapidibus lacti cōmiſcetur. Habet autem tale lac aliquid commoditatis in putredinoſis ulceribus, quare hiſ exhibere oportet lac per ſilices præparatum, reliquis coctum. Coctura ſit ad ignem aſſiduo agitādo ne dirimatur, & ſi quid ollæ labro adheſerit, etiā id ſpongia munda auſtere oportet. Nā ſæpe hoc ipſum lacti ammiſtum totum corrumpit. Porro per ſilices ſic præparatur. Lac præcoquitur donec plurima humiditas conſumatur, deinde lapides ſilices igniti in lac mittuntur, quot omnino ſuffecerint ad ſerū cōſumendum. Nec minus, imò magis idem efficiunt laminæ ferri ignitæ lacti immerſæ. Eſt enim ferrū adſtrictoriæ facultatis particeps, & proinde plures cylindros ferreos paruū, qui uerū ad finem adiūt habent, ut hæc quaſi anſa facile quis ferrum ignitū tollere queat panniculis detentum, uelut in cauterijs facere ſolemus. Lac tamen hoc modo præparatum facile in uentre caſei figuram accipit. quapropter ſecurius eſt aquā aſſundere, quemadmodum Medici non pauci faciunt, ubi ſerum primum conſumptum eſt, rurſus aquam puram aſſundentes non enim humiditatem ſeri fugiūt, ſed acrimoniam per quam uentrem ſubducit.

*De ſero lactis.* Ex Galeno.

Cap. xcvi.

Serum lactis exterioriū uelut uiu habens, ſubducendi uentris gratia aſſumitur, tum in potu, tum per clyſterem immiſſum. Nam acrimoniam inteſtinorū citra mordacitatē abluī & extergeri. Poſeſt & pro aqua commo

commodissimè assumi ad ulcera acri sanie infestata eluenda. Quin & medicamēta diffusoria ad fugillata liuoresq; ac nigredines, ex corpore melius eluuntur per serum quam per aquam. Sic quoq; eodem ad contusa suffusa ac liuefacta uimur, commodis ad hæc pharmacis ipsum ammiscētes. Serum autē sic præparare oportet. Lac in ollam funditur, sed nō ouillū neq; suillum, utruq; enim ineptū est ad serum detrahendum, coquiturq; igne conditiore, & assiduè ac æqualiter mouetur, & ubi efferbuerit, à motu cessatur, & ubi adhuc amplius efferbuerit, aqua frigida in promptu sit in profundiore quodā uasculo sita, in quam olla in qua lac coquitur immittitur: statim enim sedatur. Sedato autē feruore, rursus coquitur, et ubi efferscit, acetū multum aut aqua multa bis aut ter irroratur, quo facto caseus statim à sero disparatur, serum itaq; mox per panniculū excolatur. Vbi igitur crassas & pituitosas superfluitates abūdare suspicatus fueris, acetū multum irrorabis, ubi acres & biliosas, aquam multam. Quin & immisso in ollam, postquam lac bis aut ter efferbuerit, uase frigidissimā aquam habente, fissuram ac secretionē facimus. Vtendum est sero ad debiles & cibos auersantes. Oportet autem sero quod primum bibitur salem ammiscere, ubi uero purgare coeperit citra salem dato: atq; hoc per interualla quædā facito, donec satis æger purgatus fuerit. Copiā iuxta uires expendere oportet, neq; tamen magnopere deliqueres etiam si quid amplius præbueris. In summa autem copia sit seri potus heminarum quinq;. Et modus quidē parandi feri talis est. Cares autem sic præparant. Cnici semen contundunt, eoq; lac coagulāt, & ualidum serum efficiunt. Deinde excolant, & sale aut aqua marinā addunt, rursusq; coquant ac exhibēt. Fortiter itaq; hoc purgatur, sed omniū iucundissimè bibitur. Omnino autem longæ cocturæ medicarius serum efficiūt. Et his quidem qui fortē euacuatione indigēt, thymi drachmas tres aut quatuor unā cū sero dabis in prima potione. Si uero adhuc amplius purgare uelis, epithymi tussici cribrati drachmas tres dabis. Vitare tamen medicamēta oportet in quibus non magnū est id quod molestat. Cæterū simplicius preparato sero uti oportet in corporibus mollibus, & in quibus euacuare & eluere solū ea quæ in uentre ac in cæcistis hærent uolumus, & in quibus intestinū exulceratur à quibusdā cūq; uulgaribus purgatorij medicamētis, & in quibus bilis pura uentrem infestat, & in quibus inanes uentrē ad egerendū stimulant cupiditates, & in quibus periculum exhibeat, & in uelicā aut uterum exulcerari, & in macilentis ac tenuibus, purgatione tamē egentibus. Maximè omnium autem sero uti oportet in his qui imbecillum stomachum habent, & tamen purgatione indigent. His omnibus exhibendum est serū, neq; sale, neq; alio quopiā medicato ammixto. Sed & puero, & mulieri, & senī, hoc serum citra omne periculum exhibeat, & in caniculæ æstibus inatrepide datur, quāquam tunc temporis alia medicamēta suspecta sint. A uero fortiori sero uti quis potest, & ad corpora & ad uitia uehementioribus medicamentis egentia. Præsertim ad inueteratas papulas, & uaros liuidos & uidatos sub cute humores, uelut lepras & similia. Item ad ulcera uetera & efferrata, & ad ulcera capitis manantia, ac similia. Ad oculos quoq; assidua fluxione uexatos, et ad scabiem

palpebrarum, & maculas solares in facie, potest & in quibus eo in longis febrium circuitibus uti, & in quibus periculum ut ex morbis in aquam intercuit delabatur. Atq; hæc quidem de sero sufficiunt.

De bis quæ iucunditatis gratia cum lacte coquantur. Ex Gal.

Cap. xcviij.

Lac cum aliquo crassi succi edulio diutius coctum, flatuositatē deponit, & magis nutrit, & alui fluxionibus, & tenuibus ex capite in pectus destillationibus conuenit, sed & in hoc considerandū est, ne clām nobis alia quædā uiscera lædat. Quorundā enim natura ab hoc abhorret, et aliās periculo eiusmodi edulia non uacant. Nam & secur oburant, & calculos in renibus generant. Quæ autē cū lacte coquantur hæc sunt: Amygū, similago, alica, tragus, oryza, lagana, placentæq; & panes quidā, neq; probe assati, neque probe præparati, neq; fermenti, neq; salis participes.

De lacte acido. Ex Galeno.

Cap. xcviij.

Lac acidum oxygala appellatum, dentes quidem non lædit quī naturali modo habent. Qui uero frigidiores aut debiliores sunt, uelut ab alijs frigidis, sic etiā ab hoc læduntur. Aliquādo autē & dentium stupor inde oboritur. Et uenter quidem frigidus, nō probe concoquit lac acidū, quī uero moderate habet, ægrè quidem sed tamen concoquit. Qui uero calidiores æquo sunt uentres, supra hoc quod nihil læduntur, etiam commodi nonnihil ex eiusmodi edulij percipiunt. Atq; tales uentres etiam per niuem circumdatam perfrigeratum oxygala citra molestiam ferunt, nisi pectus frigidū fuerit, aut caput aut alia partem. Neq; enim calidā & acrem feri qualitatem oxygala habet, neq; pinguem & calidā butyri. Sed solū in ipso reliquum est caseolum, unde frigidum est & crassi succi, & crudos humores generat, & in frigidioribus uentriculis etiā calculos in renibus gignit.

De primario lacte.

Cap. xcix.

Primarium lac appellatur quod statim à paru multū est, id calido cinere modicè calfactū, citra coagulum statim coagulatur. Veteres Pyriaton hoc uocabant, alij pyriephthon, comeditur hoc ipsum cum melle. Melle enim non addito, ægrius concoquitur, & crassioris succi est, & tardius transit.

De lacte concreto. Ex Galeno.

Cap. c.

Quidam lac etiam concretum exhibent, per coagulum uidelicet coactū, & sero ablato, melleq; addito. Quidam uero etiam seri plurimam partem absorbent, & contingit sanè his uentrem magis aut minus subduci, pro absorpti ferosi humoris quantitate.

De caseo, Galeni.

Cap. ci.

Casei omnes mali sunt, excepto oxygalactino quī ex acido lacte fit: nullum enim laudare possunt, omnes ægrè concoquantur, acidū ructum generant, & flatu uentrem implent, improbè alio sedcunt, pituitā & æstum uentri inducentes. Nam in præparatione ab immisso coagulo acrimoniā assumpunt, & omne humorem deponūt, præsertim inueterati, quī & aciores sunt, & seipsi calidiores & æstuosiores, sumiq; amplius inducentes, & ægrius concoctiles, & priores succi euadūt. Quapropter illud cōmodi quod crassi succi edulia attenuantibus medicamentis ammixta attrahunt & acquirunt, neq; caseus obtinet citra detrimentū. Maius enim ex succi malitia & æstiosa humilitate damnum accedit, quā utilitas ex crassitudine attenuata emergat. Itaq; fugiendus maximè talis caseus

97

caseus qui penitus nihil boni in se habet. At uero recens caseus appellatus oxygalactinus, omnium optimus censendus est. Nam & in cibo suuissimus est, & stomacho innoxius præ omnibus alijs caseis existit. minus ægrè concoquitur, & minus egre transit, neque uero ualde crassus succus est, quo crimine in cõmune omnes casei sunt infames. Inter reliquos porro caseos recens melior uetere est, & mollis duriore, & rarus ac laxus ualde denso & coacto, & qui præcellentem dulcedinem habet falso præstat, & qui moderate salus est, porior est eo qui plurimum salis, aut penitus nullum saltem accipit, iuncundus iniuncundo, asatus crudo præfertur. Caseus coctus multo solidior est, sunt tamen omnes mali.

*Pharmacum ex caseo uetere ad callosas concretiones podagricorum. Galeni. Cap. ciii.*

Quæ arthriticus in sella ad me delarus esset, qui callosas duritias in articulis haberet, statim in mentem uenit mihi ut pernam suissam ueterem salam coquerem, eiusque decocto caseum uetustissimum rigare subigeremque ac in pila probe unire, & duritibus callosis imponerem, quo facto sponte rupta cute circa sectionem, quotidie callorum particulae emergebant. & quæ cum modicatur homo ille experiretur, talis de cætero sibi parans caseum adseruabat, & inueterato utebatur, atque sic in eius usu pleuerabat. Quin & alios similiter assectos ex amicis suis medicamentum eius uim edocebat.

*De efficacia recentis casei foris adhibiti.*

*Galeni.*

*Cap. ciii.*

Recens & humidus caseus magnopere auxiliari uidetur his qui spumam argenti hauserunt, si quis ipsum in cibo accipiat. Potest & uulnera cuncta simpliciora glutinare in cataplasmate impositus, superimpositis folijs uitis, aut lactuce, aut betæ. Caseus autem oxygalactinus etiam magna uulnera glutinat. nam & disculsiore ui participat.

*De butyro. Galeni.*

*Cap. ciiii.*

Butyrum ex pinguisima lactis præsertim bubuli parte fit, concoctoria autem uim habet, modica quoque disculsiore participans. Has uires tamen in medijs inter mollitiem ac duritiem corporibus exercet. Nam ubi hæc fuerint inflammata, concoquit ac facillè discutit. Quare parotidas aurium, & bubonas inguinum abscessus, ipso solo sepe perfectè sanauimus, puerilibus corporibus ac multiebris affectis. Durorum enim penitus corporum tumores præter naturales butyrum discutere non ualet. Idem reiectionibus ex pulmone, in pulmonis ac lateris affectionibus magnificè confert cum melle datum, easque concoquit. Si itaque solum delingatur per se, magis concoquit, minus educit. Si uero una cum melle & amygdalis amaris, magis sursum educit, minus concoquit.

*De coagulo. Galeni.*

Coagulum omne acre & attenuatoriam uim disculsioremque & siccatoria habet. Optimè coagulum est leporinum, dissoluit omne coagulum cum aptis ad hæc rem medicaments potum, sanguinem in uentre in grum concretum. Cætera quæ de coagulo à multis prodita sunt, superuacaneum adscribere existimo.

*De felle. Galeni.*

*Cap. cvi.*

Humorem qui in uescia bilis susceptrice coaceruatur, nunc fel ac bilem nomino, non quam atram, sed quam flauam appellant. Et est sanè humor hic omnium animantis humorum calidissimus. Differetia sunt in ipso

plurimæ, tum iuxta naturam animalium, tum iuxta uictum. Nam pallidior colore bilis moderate calida est, subalbida uero in quantum colorem exolutum habet, tantò caliditate inferior est. Flaua autè tantò calidior quam pallida est, quàm crassior & flauior existit. Etenim flaua fit ex pallida amplius lacta. Si uero adhuc amplius superincalcescat, ad atriorè colorem transmutatur, qui aliquando eruginosus fit, alius quando cæruleus, interdum etiam ad istatidis colorem transit. Itaque & tu colorem bilis expendes, ubi pharmacum præparas in quod fel recipitur. Fit & bilis differenda circa corpus uictum ipsa, prout subtili aut hebetè sensu præditum est. Et fuisse quidem fel omnium aquosissimum est, & propterea debilissimum, exceptis agrestibus suis. Vtuntur autè felle suis domesticæ ad ulcera aurium. non cõtemnendo pharmacum, quo & tu uti poteris, si non aliud compositum aduerit. Fel ouillum paulo acrius fuisse est, atque eo adhuc magis caprinum. Consimile huic est uersinum & bubulum. Taurorum his fortius est, fed inferius hycnarum felle. Callyonimi piscis & scorpij marini ac testudinis fel hoc etiam superant. Est & uolucrum animalium fel omne acrius ac siccus quàm in quadrupedibus. Ex uolucris gallinarum ac perdicum fel in usum medicum præstat. Accipitur & aquilarum fel multum acre est & corrosiuum. Has itaque ubi noueris fells differentias, scuerisque quæ affectiones magis, quæ minus siccatione opus habent, uix contingere potest ut circa curationem aberres.

*De sudore.*

*Cap. cvii.*

De sudoribus aliqui superuacanea conscripserunt, quæ per aliam materiam parabiliorum fieri possunt. Ammiscetur autem sudor eorum qui in palestris exercentur, substrato pulueri, atque hoc patrum Græci uocant. Estque pharmacum disculsiorem. itaque inflammationis mammae auxiliu efficacious est solus is patos impositus. Si uero aridior est, cyprino aut eo non præfente, rosaceo emollire ipsum. Hoc pharmacum illitum lac in uberibus redundans extinguit. Et ego sanè aliquando ipso in inguinum abscessu usus sum, & breui tumorem sedatum uidi.

*De Vrina.*

*Cap. cviii.*

Vrina hominis fere omnium aliarum debilissima est, excepta suilla porcorum domesticorum castratorum. Vim habet extergendi hominis urina, si quod aliud urinæ genus, quod satis indicant fuillones. Vnde & medici ad febres ac lepras adhibent, ulceraque multa humiditate sordetæ ac spurcicia plena, ea perfundunt, idque multo magis si quid putredinosum habuerint. Manantia item capitis ulcera & porriginem eade foventes curant. Nos autè abominati sumus talia facere, quum alia pharmaca sint ad manum. Cæteri ulcera in digitis pedum præsertim ex offensione, ubi non fuerint inflammata, etiam ego sæpe urina curauim, & sanè iter faciëtibz ac peregre proficiscentibus linamentum urina unctum in ulcus imposui, deinde fortissimum linamentum circumdedit, & quodies melere uellet, urinam ad digitum demittere præcepi, & non soluere priusquam ex arte curati essent. Permissi & ruri degentibus non præsentem medico uelera urina perfundere, ubi in partibus infernis essent à pectore usque ad summos pedes. At uero bibere urinam, in dissidii spiratione quæ erecta ceruice contingit, quæ admodum alia qui prodiderunt, non est necesse, quum sint plurima

e alia



alia pharmaca, quæ huic malo opitulantur. Et sanè quidam etiam pota urinæ ab effectu non conualuit.

De Saliua.

Cap. cix.

Saliuæ vires diuersas esse nosse oportet, tum iuxta animalium species, tum prout singula ex his sana sunt aut morbida, prout comederunt aut ieiunia sunt, potaruntq; aut non potauerunt, quemadmodum enim urinæ & sel & sudores, sic & saliuæ, debiles quidem sunt eorum quæ cibum & potum sumplerunt, fortes autem & acres eorum qui sium nimiam itemq; famem tolerant. Medium locum occupant eorū quæ probè quidem concoxerunt, nondum autem cibum aut potum ingesserunt. Hac itaq; saliuæ postremum relata, nutrices infantium impetigines curant, madefacto ex ea paruo digito, deinde loco perfrecto, atq; hoc assidue faciunt. Sed & triticum quidam rurales manducant, & furunculis imponunt, qui sic ex saliuæ uiribus discutuntur & cito concoquuntur. At uero iuxta omnem suam substantiam saliuæ spumæ hominis reptilium uenenatorum generi maximè contraria est. Ego enim circa omnem incantationem, ex solo ieiuni sputo, scorpium pereuntem uidi.

De stercore.

Cap. cx.

Stercus summam discutiendi uim habet. Humanum ob fetorem abominatur. Verum boum, caprarū, ac canum, ubi ossa comederint, nec fetidum est, & magna experientia commendatum non nobis solū, sed multis ueteribus medicis existit. Ego itaque mirandam uim humani itemq; canini stercoris experimento cognoui.

De stercore canino.

Cap. cxii.

Dicendum autem primū de canino stercore, quo frequenter quidam ex præceptoribus nostris utebatur. dabat autem cani ossa tantum biduo comedere, tertia die excrementum stercus accipiebat, siccat ac reponēbat, & usus tempore terebat. Vtebatur autem ad anginas alijs huic malo cōmodis pharmacis id ammiscendo. Dysentericis idem aridum tritum in lac per silices coctum inspergebat, & præbebat multos ita salles. Hos itaq; duos canini stercoris usus multa experientia, uelut mirabilis medicamenti, didicerat. Sed & in malignissimis ulceribus parum de eo stercore addebat in pharmaca alijs ad eiusmodi ulcerum cōmoda, & palam fortius seipso reddidit pharmacum uidebatur. Quin & si quid discuti ac siccatū opus esset, etiam illis medicamentis ammiscēbat.

De stercore humano.

Cap. cxiii.

Stercoris humani eiusmodi experimenū habeo. Quidam faucibus assidue inflammatis uehementer uexabatur, ut periculum suffocationis ipsi immineret. & sanè ueniam secare propter periculū cogeatur. Huic quidam obuiam factus promissit se pharmacū daturum experimento constans, & uocari se iubebat ante uenæ sectionem, si rursus fauces essent inflammatae. Itaq; accersitus, & illiso pharmaco quodam, celeriter hominem sanauit. Erat autem pharmacū stercus pueri aridum, quod cum melle Attico illinebat. Nutrebat autem puerum cuius stercus accepturus erat, uelut idem ille medicus docebat, lupinorū esu, eorum uidelicet qui in frequenti cibi usu sunt, cum optimo pane. Dabat & uinū bibendū uetus. Omnia hæc moderata mole, ut probè concoquere puer posset. Tertia die excrementum pueri stercus sumebat, siccat, ac utebatur uelut de canino stercore prædictū est.

De stercore lupino.

Cap. cxiiii.

Lupinum stercus quidā colicis bibendū dabat, non solum in exacerbationibus, sed etiam in interuallis, si quidem circa inflammationem affecti erant. uidēq; quosdā non amplius morbo hoc correptos, & correptos etiam non ita fortiter afflictos, neq; frequenter. Sumebat autem & ille albius luporū stercus, quod ab osium esu excreuerat. Sumebat autem nō quod in terram cecidisset, nam in fructibus ac floridibus herbis hoc stercus sepe reperitur. Miratus sum porrò de ipso, quod etiam adalligatū sepe prodesse. Inuenitur & in ipso quid ex osibus deuorati animalis quod manducationem effugit, itemq; cōcoctionem, quod ipsum etiam tundens ac contentens colicis bibendum dabat, salem & piper aut tale quippiam ammiscens odoris commendandi gratia. Dabat autem cū uino substantia tenui, aliquādo cum aqua. Quod uero lūbis ægri ex stercore adalligaretur, id ligamentū habere iubeat ex lana agni à lupo discepti, aut si id haberi nō posset, ex corio ceruino. & sanè tum lorū quod lumbis circumdaretur, tum id in quo stercus inuolueretur, ac contineretur, ex eo parere iubeat. Nos autem in ollulam argenteā stercoris lupini sabæ magnitudinem inieciimus, & quibuscum experimenū gratia appendimus. & ammirati sumus quū uideremus manifestam opem inde eos consequi.

De stercore caprino.

Cap. cxv.

Stercoris caprini usus frequentissimus est, ac rē & discussoriam uim habet, induratis tumoribus cōuenit, non lenis tantum, sed aliarum partium. Itaque ego in genuum tumore inueterato & ægrè solubili, ipso usus sum ex posca, cataplasmate parato ex ordacea farina stercore, ammixto & qui curabatur homo mirifice sanatus est, erat autem ruralis. Nam mollibus corporibus pharmacum acrius est. Equidem usum tenuiorum partū redditur, quare ad alopecias competit, & omnia quæ extergentibus indigent medicamentis, uelut lepras, impetigines, & similia. Quin & cataplasmati ad parotidas et inguinum abscessus ammixtum, discussorium existit. medicus ceterē quidam ruralis ipso ad uiperarum morsus, multoq; magis aliarum bestiarum utebatur cum aceto, & ualde multos seruauit. Idem ille etiam eiusdem stercoris pilulas ictericis ex uino bibendas dabat. & ad musculi fluxum cum thure apponebat.

De stercore bubulo.

Cap. cxvi.

Boum stercora exigua habet inter se pro pabuli ratione differentiā. Nam & ipsa siccandi uim habent, possident & aitractoriam. Medicus quidam rei medicamentariæ expertus hydropicos stercore bubulo oblitos ad solem exponebat, & multis opitulatus est. Accipiebat autem humidum adhuc uere quum boves herbā depascunt, & exiccaturum reponebat. Vtebatur eodem & ad strumas, & ad omnes induratos tumores cum cataplasmati modo imponebat.

De stercore ouillo.

Cap. cxvii.

Idem medicus & ouillo stercore utebatur ad uerrucas, & specialiter myrmecas appellatas, thymos ite uocatos, & clauos, aceto autem id disiebat. Sed & amibustorum ulcera ad cicatricem eodem perducebat, rosaceo cerato ammixto.

De stercore columbino.

Cap. cxviii.

Columbarum foris uisum quærentiū stercore, uelut calfactorio pharmaco, ego ipse sæpe ad multa utocum

cum nasciturj semine, quod leuissimè tritum pro sinapi admisceo, in ueteribus affectionibus rubificatione opus habendibus, qualis est, coxendicum morbus, hemiplegia, cephalæa, uertigo, & inueterati dolores iuxta spurias costas, aut scapulas, aut tendines, aut lumbos. Item renum, pedum & articularum, ubi callosæ concretiones nondum fuerint coactæ.

De gallinaceo stercore. Cap. cxviii.

Gallinarum stercore usus sum etiā ipse, ad eos quibus strangulationis periculum ex esu fungorum imminēbat, inspergebam autem ipsum tritum cyathis tribus aut quatuor poscæ aut acetii mulsi, & breui conspicuam opem fenserūt. Paulò post enim pituitosum crassissimum humorem euomebant, à quo perfectè suffocationis accidens conqueuit. Medicus qui me hoc remedij docebat, etiā inueterato colico dolori id ipsum stercore ex uino multo dabat. Quidā & in angina bibedum præbent. est autem gallinaceum stercore debilius colubino. sed & hoc ex gallinis in agris uictū querentibus, & non indusis, accipere oportet.

De stercore asneris, accipitris, ciconiæ, & terrestrium crocod. Cap. cxix.

Stercus asneris, accipitris, ciconiarum, & reliquorum de quibus quidam delirantes scripserunt, ipso experimento cognitum est inutile esse. terrestrium uero crocodilorum etiā ægrè parabilis est.

Sordes ouium ex qua cæsympus. Cap. cxx.

Sordes ouium lanis innutritur, ex qua cæsympus fit, concoctoria uim similiter ut butyrū habet, & parum quid de discussoria. Oesypus uelut Dioscorides tradit sic præparatur: Sumito lanas fordidæ ex alis ouium tortas, crispas, & molles, & calida aqua eluito, omni forde ipsarū expressa, deinde ipsam loturā in craterē amplioris mitito, & alia feruente aqua affusa cōturbato, ita ut poculo uel alio simili uase haurias, & ex alto uolūtèr illas donec spumescat. Deinde aquam marinam, uel frigidam illa non præsentem, irrorato. & desiderè finito, atq; ubi perfrigeratū fuerit id quod superstat conchula tollito, & in aliud uas mitito. & assuā modica frigida aqua manibus subigito. Deinde diffusa aqua, alia calida affundito, & similiter ut prius cōturbato, & aquā maris uel frigidam irrorato. & desiderè finito, atq; ubi perfrigeratū fuerit, rursus id quod superstat cōchula tollito, & similiter manibus subigito. Rursusq; tertio calidā aquam affundito, & idem uelut prædictū est facito, donec cādus & pinguis cæsympus reddatur, & nihil impurū habeat. atq; ita scitili inditū ad dies aliquot in solem exponito ac adseruato. Sed & omnia prædicta ad solē æstiuum facito. Sic enim commodior reddetur, & albus, nihilq; duri ac contorti habens. Quemadmodum qui cerato, aut adipe adulteratur. Facit ad ulcera sedis & uuluarum cum meliloto ac butyro, itē ad plurima alia. Oesypus usus scilicet nem ex se reddit cōmodissimā ad erosos ac scabros oculorum angulos, & ad palpebras callosas & pilorum defluuiū laborantes. Vritur autē in testa noua, donec in cinerem reductus omne pinguiudine depo fuerit. Testa ipsa carbonibus imponitur. deinde exustū colligitur, teritur, et ad prædictos usus adhibetur.

De carnibus ex Galeno. Cap. cxxi.

Non omnes animalij carnes hominē alunt, sed aliquæ etiā sunt letales. Quædam uero non solū ut cibis, sed etiā ut auxiliare medicamen assumuntur. Et ex

his quæ alunt non omnes eandē uim habent. Omnium quidem igitur edulorum caro suilla maximè alit, boni succi est, & melius omnibus concoquitur, cum aliis, tum ob similitudinem ad homines. Carnes bubulæ non modicum & ipse alimentū præbent, neq; facile transpirans, sanguinem tamen crassiorē quàm conuenit generant, & si quis naturā arabilium habuerit temperamentum, affectū quoque melancholico corripit, ex frequenti bubulæ carnis esu. Tales affectus sunt, cæcer, elephas, impegio, scabies, febris quartana, & quæ priuatim uocatur melancholia. Sed & lien quibusdam ex eius succo intumuit, unde deprauatus corporis habitus & hydropitis faepe insequuntur. Sicioris enim & multo calidioris temperamentum est bos quàm porcus. Cæteri uulgi carnes concoctū faciliores habent quàm perfecti boves, sunt enim temperamentū humidioris. Sic etiā hœdi capris præstant. Et capra quidem minus siccō temperamentum prædita est quàm bos, sed hominī ac sui comparata multū euariat. Humidissimā autē & pituitosam carnem agni habent, uerū ouilla caro magis superfluitatibus reducta & peloris succi est. Malsucci est caprina, cū acrimonia, hircina autē pessima est & ad boni succi generationem, & ad cōcoctionē. Deinceps est arietina, deinde taurina. In omnibus autem his castratorum melior est. Vetusorum pessima est concoctū, succo & alimento. Quare & sues quamuis humidum temperamentū habeant, senescentes fibrosas, & duram acaridam, & propterea ægrè concoctilem carnē habent. Leporina quoq; caro crassiorē sanguinem generat, sed melioris succi quàm bubulæ aut ouilla. mali succi est & ceruina, duraq; ac ægrè cōcoctilis. At uero asinorum syluestrium carni. Nam & hanc quidā comedūt, uelut domesticorū asinorum in Alexandria: crassissimi succi est & ægerrimè concoquitur, & stomacho incōmodat. Insuperq; esu inuictū est. quemadmodū etiā equina & camelina, nam & horum animalium carne, tum animam, tum corpus, asinini ac camelini homines uescuntur. Quidam etiā ursinas carnes edunt, & quæ his adhuc deteriores sunt, leoninas ac pætherinas. Quid uero attinet dicere de canibus, quorum catulos pingues, pleriq; homines edunt. Horū omnium animalium carnes siccissimæ natura sunt, & acre alimentum corpori apponunt. Et pro modo præparationum etiā magis aut minus nutriunt, & magis aut minus cōcoquuntur. Nam quæ assatæ aut in sartagine frictæ comeduntur, siccis alimentum corpori sufficiunt. Quæ coctæ, humidius. Quæ uero conditæ sumuntur, mediū inter utraq; locū obtinent. Sed & harum ipsarū non parua differentia est iuxta cōdituræ modum. Quapropter ubi ficare corpus uoles, sicciorum temperatura animalium carnem dabis, ubi calfacere, calidiorum, frigidiorū item & humectiorum similiter conuenienti proportionē exhibebis.

De extremis terrestrium animalium partibus. Cap. cxxii.

Hæc itaq; in summa de terrestrium animalium carne dixisse satis est. Verum de alijs partibus consequenter quam uim habeant discere. Extremas partes appellat in familiarī usu homines, rostra, pedes, & aures, nam hæc minimè pinguedinem habent, minimè item carnosam naturā. prædominatur autem in his nervosa & coriacea species. Suntq; hæc partes multo motu

magis exerceatur, & propterea etiā uiscosiores. Merito itaq; paucius nutrimentum corpori præbent, & ob uiscositate facilius aluo sedunt. Præstant autē pedes suilli rostro, quemadmodū hoc auribus. Lingua laxioris & exanguioris carnis substantiam habet. Venter uero adhuc laxior & exaguior est quā lingua, & propterea etiā friabilior, & concoctū facilius, citra adiacentium intestinorum ammixtionē.

De glandulis. Cap. cxxiii.

Omnēs glandulæ hoc commune habent, quod iucundæ & teneræ edentibus apparent. Mammari uero glandulæ quum lac habuerint, etiā illius dulcedinis nobis quid præsentant, maximè in suisbus. Alimētum ex ipsis probè concoctis, ad carnis naturā propè accedit. Si uero defectuose cōcoquantur, crudum siue pituitosum humorē generant, & humidæ quidē glandulæ pituitosum, siccæ crudum producent.

De testibus. Cap. cxxiiii.

Ex glandulosis corporibus sunt etiā testes. Suilli itaq; & ouilli & hircini comesti aptè concoquantur & malum succum gignunt, propter uirositatem quæ in ipsis existit. Quāto autem suilla caro alijs melior est, tanto testes probè concocti magis alunt. De cætero soli gallorum testes per omnia optimi & iucundissimi sunt, & bonum alimentum corpori sufficiunt, præsertim faginatorem.

De renibus. Cap. cxxv.

Renes palam est mali succi esse, ac ægrè concoqui, quādo etiā in gustu urinæ qualitatem nobis repræsentant.

De cerebro. Cap. cxxvi.

Pituitosus edulium cerebrum est, crassiq; succi ac tardi transitus, & ægrè concoquitur. maximè uero stomacho incommodum est omne cerebrum. Quidam autem mollidie eius decepti infirmis ipsum exhibēt, quum sit præter alia etiā nauosum. itaq; potius ubi uomere aliquem uolueris ab accepto cibo, cerebrum ipsi pinguius conditum postremum exhibebis. Verum uitabis ne cibum auerantibus præbeas. At uero cum calefacientibus ac incisuius medicamentis præparatum, melius seipso euadit.

De terrestriū animalū uisceribus. Cap. cxxvii.

Iecur omnium animalium crassi succi est, difficilis concoctionis, ac tardi transitus, præstat ex ipsis non solū ad uoluptatem, sed ad alia quoq; porcinum, eorum uidelicet porcorum qui sicibus aridis sunt faginati, quodd iecur propterea Græcis sycotum, hoc est ficarum appellatur. Lien mali succi esse creditur, ut qui attrahitarium sanguinem generet. Pulmo utroque facilius concoquitur, quanto etiā rarior est. Verum multò minus quā iecur alit. Alimentum igitur quod corpori inde accedit pituitosus est, propter cartilagineum asperæ arteriæ corpus in ipso sitū. At uero cor ægrè concoquitur ac tardi transitus est, si uero concoquatur probè, alimentum non modicum neque mali succi corpori exhibet.

De aluo, intestinis, ac utero terrestrium animalium. Cap. cxxviii.

Aluus & uterus, in terrestribus animalibus, duriora carnisbus sunt, propterea etiā si probè concoquantur, non exquisitum & inculpatum, sed frigidiorum ac crudiorum sanguinem gignunt.

De syluestriū animalū carne. Cap. cxxix.

Omnium animalium per montes ac syluas uictū quæ-

rentium caro durior est, & pauidissimæ pinguitudinis particeps. quapropter alimentum minus excrementum ex ipsis quā ex domesticis animalibus corpori accedit.

De uolucrum animalium carne. Cap. cxxx.

Omne uolucrum animantium genus minus alimentum corpori suppediat, si terrestribus, & maximè suisbus comparetur. facilius tamen cōcoctu uolucrum caro est, maximè perdicis, & attagenæ, columbæ, gallinæq; ac galli. Verum turdorum, & merularū, & paruorū passerulorum, item eorū qui in turribus degunt, durior est, atq; his adhuc amplius turturris, & palumbi, & anatis. Gallinarū carni similis est phasianorum, quantum ad concoctionē & alimentum atinet, sed iucundiatē cibi præcellit. His durior est & ægrè concoctilis magis ac fibrosior pauenis. In cōmune autem in omnibus uolucris animantibus, uelut etiam in quadrupedibus, id nosse oportet: Quod caro crescentiū adhuc multo melior est quā decrecentium. In uigore consistentium medium locum obinet. Mala item est caro uetustorum, & infantium adhuc siue paruulorum. nam hæc mucosa, & humida & excrementis redundans est, & facile aluo secedit. Vetustorum autē dura, & siccæ & neruosa est, & propterea concoctioni resistit. Atq; huius memineris in uniuersum de omnibus animalibus. Neq; uero parua differentia est eorū quæ in stagnis, aut paludibus siue palustribus locis degūt, ad ea quæ per montes ac siccos locos uictum quaerunt. Etenim iuxta locorum proportionem, carnes animalū aut siccæ, & superfluitatibus carentes, & cōcoctu faciles, aut contrā humidæ & superfluo excremento refertæ & ægrè concoctiles redduntur.

De ascribus & struthocamelis. Cap. cxxx.

Harum caro excrementitia est, & difficilior concoquitur quā prædictarum uolucrum, non tamen alas prædictis peiores habent.

De gruiibus.

Cap. cxxxii.

Gruum caro tota dura est & fibrosa, alæ uero adhuc carne ipsarum duriores existunt.

De partium uolucrum animalium differentia. Cap. cxxxiii.

Viscera in auiibus eandem proportionē habent ad carnes, quā in pedestribus habere dictū est. Intestina uero omnium ferme ad eum inepta sunt. Ventes uero esiles sunt & bene nutriunt. Quidam ipsorum etiam in ibo iucundi sunt, uelut asnerinus, deinde gallinaceus. Aliqui falsò collaudant struthocamelli uentriculum, uelut pharmacum concoctorium. Alij multo magis prædicant præferuntq; huic mergi uentrem. Verum neque ipsi faciliè concoquantur, neque aliorum ciborum concoctionem uelut pharmacum adiuuāt. Alæ in iuuenibus ac pinguius uolucris optimæ, in macilentis contrā ac uetustis pessimæ existunt. Testes optimi gallorum præsertim faginarum, atque adhuc magis eorum qui ex seroso lacte cibos sumūt. Sunt enim boni succi, probèq; nutriti, ac faciliè concoquantur. Cæterum alui excretionem neque priuant, neque inhihent. Cerebrum porro in uolucrum genere longè præstantius est quā in pedestribus, quanto sanè etiā melior siccus est, præsertim auicularum montanarum.

De ouis.

Cap. cxxxiiii.

Oua gallinarum & phasianorum meliora sunt, deceriora

riora anserum & strotocamelorū. Optima ad corporis alimoniam sunt tremula appellata. Sorbilia minus nutriunt, sed facilius aluo sedunt. Iguigant autem faucium aspritudines ex clamore, & aut humoris acrimonia oborras, nā affectus quoddā parit & substantiæ totius lenitate asperitatem curat. Eadem ratione etiā stomachi ac ventris & vesicæ asperitates sanāt. Oviū in aceto coctum & comestum, ventris fluxiones resiccit, quod si ammisseris ipsi quid ex medicamentis ad dysenteriam vel coeliacā affectionem commodis, deinde ad prunas in saragine frixeris, & in cibo præbueris, non parum egris opitulaberis. Commoda ad hanc rem medicamenta sunt, uuxæ acerbæ succus, & rus inspersus, & cinis cochlearum integrè usitatu, uinacæq; uuarum, & myrti bacca, & similia. Oua cocta ægrè cocoquantur, tardi transitus sunt, & alimentum crassum corpori præbent. His autem adhuc magis tardi transitus sunt, crasiorisq; succi, in calido cinere assata. Fricta pelsimum ad omnia alimentū præbent, nam in concoctione in nidore transeunt, & crassum humorem gignūt uitiosumq; ac excrementitium, coctis & assatis meliora sunt quæ desata, uel, ut alij malunt, suffocata appellantur, cū oleo & garo, & uino modico subacta, & in duplici uase ad moderatè desam cōpagem cocta. Quæ enim amplius spissantur, coctis & assatis similia euadunt. Idē facere oportet & in ouis quæ patinis infunduntur. nā dum adhuc succulenta sunt, padnam ab igne tolles.

Ouorum uis medicamentaria. Cap. cxxxv.

In coeliacis ac dysentericis affectionibus, ouum prædicto modo datum, commodum pharmacum existit. Candidum & tenue in recentibus ouis leuissimum & omnis mordacitatis expertum medicamentū est, nō solum oculis adhibitum, sed etiā alijs omnibus partibus leuibus pharmacis indigētib; uelut sunt sedis & pudendorum ulcera, omniq;que maligna, si ad ea quæ citra mordacitatem siccare illa solēt ammisceatur, qualis est pompholyx, & similia. Vitellus eandem facultatē habet, & propterea lenibus ceratis additur, ouis præcoctis aut assatis. Quanto autē sicciora sunt, tantum de leniendi ui perdunt. Testæ ouorū uis medicamentum sanguinem sistens euadunt.

De alimento ex animalibus aquaticis. Cap. cxxxvi.

Animalium in aqua degentiū & genera multa, & species differentiæq; plurimæ existunt. Hoc loco referetur, uelut in superioribus fecimus, ea saltem quæ ad usum medicum & ad sanitatem conseruandam assumuntur. In uniuersum igitur illud scire oportet, quod optima caro est piscium in puro mari degentiū, magisq; ubi locus is uentorū procellis agitur, & neq; terræ, neq; leuia littora aquam ambiant, sed arenosa aut aspera & lapidea. Si uero etiam ad aquilonares uentos loci conuersi sint multo melius est, manifestū est autem mare mari præstare, in eo quod aliud perfectè purum est, aliud magnos et multos fluctus excipit. Nam pisces qui in eiusmodi mari degunt, quāto meliores sunt palustribus, tāto deteriores sunt his qui purum mare incolūt, nam & hi qui in protecto tranquillo mari degunt, peiorem carnem habent. At uero in stagnanti mari uiuentium piscium caro, medius inter fluuiatiles & marinos locum obinet. Recrementitia uerè & multum mucosa est caro eorum qui in limosa ac sordida aqua degunt. hac ad-

huc deterior est caro in stagnis degentiū. Si uero & parua sint stagna, neque magnos fluuios suscipiant, neq; fontes habeant neque effluxum largum, multo sanè deteriores piscium carnes sunt. Si uero in totum nihil aquæ defluat, sed stagnum perpetuo stans sit, omnino deterimæ. cæterum in paludibus & cœnosis locis degentiū extreme uitiosa caro est. Porro ex fluuiatilibus meliores sunt, quæiusmodi flumina incolunt, quorum uelox est & multus fluxus, nam stagnantium fluminum pisces carnem habent cōcoctū difficilem, & bonum alimentum quā paucaissimum habent. pelsimi autem sunt qui in ostijs fluminū degunt, quæ sterquilinā, aut balineas, aut culinas, & uestium ac lineorum sordes expurgant, & si quæ alia sunt recrementa urbis quam præterlabuntur, & quæ in ipsa flumina expurgantur, maximè si populosa urbs existat. cæterum & iuxta nutrimentum pisces meliores & deteriores sunt. Quidam enim herba & optimis radicibus abundat, & propterea meliores sunt. Quidam & limosam herbam & radices mali succi edunt, & aliqui in fluminibus magnam urbem præterlabentibus degentes, stercora hominum & quosdam consimiles cibos uorant, atq; hi omnium pelsimi, uelut dixi, existunt. & si paulo ampliori tempore mortui permanerint, euestigiō computrescūt, ac pelsimè olent. Suntq; hi omnes esu infundui, & ægrè concoquantur, & bonum alimentum paucissimum habent, sed non modicam recrementitiam superfluat. & uitiosum succum in corporibus eorum coaceruant qui ipsis quotidie uescuntur.

De cephalo siue mugile. Cap. cxxxvii.

Cephalus maximè omnium piscium uirilisq; aquis uelut, fluuiatilib; & marinis. Qui igitur in mari uersatur, paruas & multas spinas non habet, iucundiorq; est, & pinguitudine carensq; spinis. Verum in fluminibus degentes cephalis, spinis referti sunt, & pinguem saporē habent, esuq; & concoctū deteriores sunt, stomacho incommo- dant, mali succi & uirosi existunt. At uero sale inueteratus cephalus melior seipso euadit.

De lupo. Cap. cxxxviii.

Lupus ex pelagiorum piscium numero est, hoc eorum qui in profundo mari degunt, huius itaque carum, uelut reliquorum pelagiorum piscium, tenuiorem sanguinem generat. Si uero ad flumina ascēdat, cephalo similis euadit.

De trigla siue mulo. Cap. cxxxix.

Ex pelagijs piscibus est & mulus. Aestimatiōe apud homines reperit, tanquam excellenter iucundus in cibo sit, habet autem duriorē omnibus pelagijs generis carnem, non pinguem, & friabilē, & propterea magis quā alij pisces nutrit, ubi prope concoquatur. Quidam iecur eius & caput, uoluptatis gratia magni faciunt. At uero multi qui carcinadas antimalculæ sunt hæc, ualde minutis cancris similia, colore fulua, uorant, fecidi sunt, & infundui, ægrèq; concoctiles ac mali succi. Cognoscuntur hi ex odore & sapore, sed si quis uentrem ipsorum discerpat, carcinadas in ipso inueniet. Quod si quis in frequentius mulorum marinorum esu perseveret, hebetudinē uisus incurrit.

De piscibus petrosi. Cap. cxli.

Petrosos & saxatiles appellant pisces, degentes ubi petrae sunt & litorea saxosa. In hoc genere optimus cæ-

setur uoluptatis gratia scarus, deinde merula & turdi, & postea iulides, phuceæq; ac percae. Alimentum ex his non modo concoctum facile est, sed & saluberrimum, sanguinem generans compage medicrem.

De Gobio.

Cap. cxli.

Gobius litoralis piscis est, semper parvus manens, sicut etiam alij plures. optimus est & ad uoluptatem & concoctionem, distributionemq; in corpus ac humoris boni generationem, qui circa arenosa ac petrosa litora capitur. Qui uero in fluuiorum ostijs, aut stagnis degit, neque similiter iucundus est, neq; boni succi, neq; concoctui facilis. Si uero aqua uisiosa sit, etiam in ipsa pessimus gobius euadit. Si iure albo decoctus sit donec flaccidus fiat, ius ipsius potum alium subducit. Astatus citra salem comestus, promptitudinem egerendi inanem sanat.

De piscibus mollis carnis.

Cap. cxlii.

Ex piscium mollis carnis numero sunt, aselli, muræne, buglossæ ac passeris, & ex his aliqui in fluminibus & stagnis degunt, aliqui in mari. Et propterea aliquando iucundi & probe nutrities reperiuntur, aliquando uisiosi & mali succi.

De piscibus duræ carnis.

Cap. cxliii.

Ex duræ carnis piscibus sunt dracones, cuculi, scorpij, orphi, glauci, congridi, pagri, amiae, & parui thunni ac pelarides, ægrius concoquuntur quam pisces mollis carnis, & crassum humorē generant, & propterea fortiore uentre indigent ad concoctionem.

De piscibus testæ intestis.

Cap. cxliiii.

Buccina & purpure & reliqua ostrea ac chameæ, ostracodermæ, hoc est, testæ intestæ appellantur. his omnibus commune est, salsum saporem & qui uentrem nostrum molliat, in propria carne habere. Verum in unoquoq; genere magis aut minus talis actio inest. Nam ostrea siue conchæ inter alia mollissimam carnem habent & magis uentrem subducit, & quidam ipsa citra cocturam edunt. At uero parue chameæ, & purpure, buccinæq; ac murices & similia, duram & ægrius concoctilem carnem habent, & minus quam illa uentrem subeunt. Quemadmodum autem ægrè concoctilem carnem habent ostracodermæ duræ carnis, sic etiam ægrè corruptilem habent. Quapropter exhiberi ipsa solent sepe his qui ex humorum prauitate cibum in uentre corruptunt, coquunt autem ipsa, & aqua iterum atq; iterum diffusa, donec salua qualitas deponatur. Sic præparata etiam uentrem fistunt. Si uero coquas & primam aquam diffundas, deinde sale aut magis garo condias, & ius bibendum præbeas, alius bibentis multum subducitur.

De crustatis siue molli testæ intestis.

Cap. cxlv.

Gammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, & quæcunq; alia crusta intesta, tenuem quidē habent ambientem testam, uerū durā, minus superioribus salsum saporem habent, habent tamen, eumq; non modicum. Omnia autem carnis duræ sunt, ægrè concoquuntur, & multi alimentis, præcocta uidelicet. Horum caro uelut etiam ostræorum uentrem fistit, ubi præcocta salsum humorem in aqua deposuerit. Sed & hæc ægrè corruptilem carnem habent, similiter ut duræ carnis ostracodermæ.

De piscibus mollibus.

Cap. cxlvi.

Molles appellantur pisces, neq; squamas habentes, neq; autem asperam aut testaceam, sed mollem. Suntq; tales polypti, sepia, loligines, & qui his similes sunt.

Habent autem carnem duram, ægrè concoquuntur, & salsum humorem modicum in se continent. Si tamen concoquantur, alimentum non modicum corpori præbent. Plurimum autem crudum humorem hi ipsi gignunt.

De piscibus chartilagineis.

Cap. cxlvii.

Asperam & nocte splendidam cutem hoc genus piscium habet, quapropter aliqui à Græcis selachia appellata uolunt, quod selas, hoc est, splendorem emittat. Mollem in se carnem habent torpido & pastinaca, alio moderate subeunt, & non ægrè concoquuntur, & moderate quoque alunt.

De Echinis marinis.

Cap. cxlviii.

Echinos siue herinaceos marinos quidā ex uino multo præsumunt & garo, subducendi uentris gratia, sed & patinas ex ipsis præparant. Referuntur autem inter edulia modici alimentis, & quæ medijs facultatem inter spissantia & attenuantia humores habent.

De salientis omnium animalium, pedestrium, uolucrum, & aquaticorum.

Cap. cxlix.

Non modica differentia saliarum carniū est, prout quædam ex ipsis saliantur. Nam adeo immutantur, ut sæpe animalis temperamento humidum carum salia longè siccior euadat, quam caro animalis natura sicci non salia. Apti itaq; ad salsuram sunt animalium corpora, quæ duras simulq; superfluitate redundantes carnes habent. Quæ uero aut ualde mollem, aut ualde durum, aut siccum & superfluitatū experient corporis habitum habent, ad salsuram ineptia sunt. Quemadmodum enim sicca corpora salia coris similia euadunt, sic ualde humida diffiunt, & salis familiaritate colliquecunt. Itaq; manifestum est, quod dura & neruosa, & uelut pelliculosa accoriacea omnia, salia ægrè concoquuntur. quæ uero ad salsuram idonea sunt, tenuim partium sunt, & comesta crassos ac glutinosos humores attenuant. Cæterum uetera salamenta omnia uisiosa sunt.

De garo.

Cap. cl.

Garum uim habet multum calidam & siccam. Et propterea quidam medici usi sunt ipso ad putredinosa ulcera. Quin & dysentericis & ischiadicis per clysterem insundunt.

De muria.

Cap. cli.

Muria saliorum piscium, similiter ut garum, putredinis ulceribus conuenit, & ad ischiadas ac dysenterias per clysterem insusum. Acrimonia enim sua humores coxendicem insectantes attrahit, & per intestina euacuat. In dysentericis autem putredinosa ulcera abluat & siccat. Maxime uero flurorum saliorum & mænularum muria ad talia medicis usi sunt, & nos ad putredinosa oris ulcera adhibuimus. At uero oliuarum colymbadō muria frequenter in dysentericis utimur, præmittimusq; eam hora una ante quam crustifica insula immittamus, ad ulcera uidelicet præmundanda.

De adipe pinguedineq; ac seuo.

Cap. clii.

Omnis pinguedinis uis est humana corpora humectandi ac calfaciendi. Verum singulæ inter se differunt, prout magis aut minus eas uires habent. Differt pinguedo à seuo crassitudine. Quapropter animalia tota natura magis terrea, seuum habent, uelut humectiora pinguedinem. Et propterea adeps siue pinguedo

guedo facile liquefcit ab igne, non facile autem congelatur. Seum contrā non liquefcit facile, & liquefcitum celerrimē cōgelatur, & multo durius adipē apparet. Humidissima omnium ferme animalium pīn guedo est suilla, magis molliens ac cōcoquens oleo, quare cataplasmaticis inflammationum ammiscetur. Ceterum his qui in recto intestino aut colo morbum percipiunt, item in dysentericis & egerendi cupiditate inanī, capritū seuum magis iniiciamus, non quod acrimoniam obtrundat, sed quod congeletur ob crassificem. Nam suillus adeps defluit uelut oleū. At uero asnerinus adeps suillo quidē calidior est, & ualde tenuitum partium, & propterea infundimus ipsum his qui in alto corporū morbum sentiunt. Nam paritiū tenuitate tota corpora penetrat, & omnibus mor dentibus ferolis humoribus ammiscetur, & mordacitate herbat. Medium inter suillum & asnerinū locum obdinet gallinaceum ac gallorum. Porro taurorum seuum multo calidius & siccus est pinguedine suilla. Vitulinum inferius taurino est caliditate & siccitate. Similiter hœdinum inferius est caprino ac hircino. Rursus hircinum inferius est leonino. Maxime enim discussorium est leoninum, & tenuissimum partium ferme prae omnium quadrupedum seuo, unde tumoribus inueteratis induratis, & cōtractis articulis adhibetū, ualidissimam uim discutiendi habet. Taurinum medium locum obdinet inter suillum ac leoninum, & propterea utriq; medicamento rum generi miscetur, tum his quæ induratis medentur, tum quæ inflammata cōcoquunt, quale est tetrapharmacum & regium appellatum. Quidam uti perarum adipem in principio suffusionum cōuenire tradunt. Verum ursinum alopecij prodesse uere scripserunt. Quidam piscium pinguedinem collaudant ad suffusiones & auritū dolores, aiuntq; omniū piscium adipem ad hoc polle. Omnis adeps ueterascens calidior ac tenuiorum partium euadit, & ob id etiam magis discussorius, id quod omnibus ueterascenibus contingit, quæ non putredo preoccuparit. Summa autem huius sermonis in commune hæc est, cuius meminisse oportet. Nempe iuxta animalitū temperaturam, semper differentias adipis ac seui in ipsis fieri. Item iuxta differentiā generis. Nam masculum semper siccus & calidius est foeminino. Mas autem castratus similis est foeminæ. Ita etiam omne iuuenile animal foeminæ assimilatur. Sic autem & syluestre calidius est & siccus domesticum.

## De medulla.

Cap. CLIII.

Omnis medulla uim dura & indurata corpora emolliendi habet, siue muscoli, siue tendines, siue ligamenti, siue uiscera, hoc modo sint affecta. Optimam autem semper expertus sum esse ceruinam, deinde uitulinam, taurorum & hircorū acrior est magisq; siccatoria, & propterea duritias in fibris induratis dissoluere nequit. Cæterum methodum reliquarum differentiarum, ex his quæ de adipē relata sunt, coniectare potes.

## De pulmone.

Cap. CLIIII.

Pulmo agninus & pordnus usui ac tritu impositi, attritus caldamentorum sanant. Vulpis pulmo siccatus & tritus paulatim potus, anhelosus sanare creditur.

## De capitibus.

Cap. CLV.

Capita mænularum falsarum urebat quidam, urebaturq; ad rimas sedis, & putrescentes gingiuas, & ad

gurgulionem induratum. Vis ipsorum siccatoria est non ualde acris, alius quidam caput integrum leporis urebat, & urebatur ad alopecias cum adipē urfino. Viperarum capita usta in olla ad cinerem, deinde trita cum decocto lupinorum amarorum crassissimo, & temporibus illita, fluxum oculorū diuturnum sistunt. Cinis ipsorum per se leuissimē tritus, & ut aridum collyrium adhibitus, heberem usum magnopere corrigit.

## De cornibus.

Cap. CLVI.

Cornibus cerui ac capræ ustis sæpe usi sumus ad illustrandos dentes, gingiuas quoq; flaccidas adstringunt. Aiunt cerui cornu si post usturam lauetur, dysenteriam ac sanguinis sputum, & coeliacas affectiones sanare. Ictericis quoq; utiliter præbentur. Datur omnibus duorum cochleariorum mensura. Vsum & locum collyrijs ocularibus ad fluxiones oculorū destitatis ammiscetur. Est autem horum collyriorum uis siccatoria. Capræ cornu ad pruritus facere aiunt, itemq; ad scabiem, ulcera, affricum.

## De ungibus.

Cap. CLVII.

Quidam ungues caprarum urunt, deinde cinerem aceto subigunt, & alopecij illinunt. Sunt autē attenuatoria facultatis. Alij suum ungues urunt, & cinerem colicis in potu præbent. Aliqui asinorum ungues istsas, comitalem morbum sanare aiunt, si assidue bibantur. Easdem oleo subactas, strumas discutere. Cinerem quoq; earundem cum muliebri lacte probe tritum, & in collyria redactum, oculorum cicatrices detergere, si cum lacte item illinatur.

## De impetigine in pedibus equorum.

Cap. CLVIII.

Impetiginem equorum aceto tritam ac potā, comitalem morbum curare aiunt. Aliqui & ad omnis reptilis bestie morbum eadem uim iubent.

## De lanis succidis, &amp; puris &amp; ustis.

Cap. CLIX.

Lanæ sordide ac succidæ appellatæ, utiliter adhibentur ad contusas aut quomodocunq; percussas partes, fomentis excipiendis aptæ, quanquā non desit & ipsis sua utilitas, ob foridum efficaciam. Quomodo autē ex his cœlypum parare oporteat, iam dictū est in hoc sermone secundo, ubi de oculi sorde tractauimus. Lanæ loræ ad suscipiendas fomentorum humiditates materia apta existunt. Eadem ustæ uim habent acrem & calidam, cum quadā partium renuitate, ut etiam humectas in ulceribus carnes celerrimē consument. Coniunguntur & in pharmaca siccatoria. Vritur in fistile noui missæ, operculo addito multa foramina habente.

## De pilis ustis.

Cap. CLX.

Piliusti consimilem lanis ustis, calfactoriam ac siccatoriam uim habent.

## De ossibus ustis.

Cap. CLXI.

Ossa usta omnia discussoria & siccatoria uim habent. Quidam tamen de hominū ossibus id maxime prædicant. Talum utiq; suillum ustum, deinde porum, inflationes ac tormina sanare proderunt. Et noui sanē ego quandam nostrorū hominum, qui ossa usta potanda dabat, ignorantibus bibentibus quid potarent, ne abominarentur, atq; sic in multis & morbi comitalem ac articulare curabat.

## De pellibus &amp; corijs.

Cap. CLXII.

Pellis ouilla recens excoriata, flagris cæcis circumdata, manifestē auxiliatur præ omnibus alijs auxilijs, ut in una die ac nocte ipsos curet, concoquit enim &



discutit subcruenta. Hyæne pellem quidam domi positam adferunt, & usu experire ipsam à rabioso cane commorbus circūdant. Nam proprietate quadam prohibet ne commorbus in aquæ timorem delabatur, sed & iam illapsus auxiliatur. Coria vetera maximè solearum usta, cinere ipsorum trito insperso, artritibus calcamentorum non inflammatos sanant. Nam inflammatos exacerbant.

De uentriculo mergi.

Cap. CLXIII.

Mergi uentrem torrefactum & salis modico ammixtum, crudis bonam concoctionem facere tradunt.

De uulpius.

Cap. CLXIII.

Quidam uulpes uiuas in oleo coquant, eoque articulares morbos sanant. Solia enim oleo calido replent, atque sic arthriticos totos insidere faciunt, & diutius immorari iubent. Maximè autem discussorium fit hoc oleum, ut ad superficiem trahat in alto corporum contenta, isticque dolores facienda, aut ob substantiæ crassitudinem, aut ob frigiditatem, aut uehementem acrimoniâ, aut ob flatuosum spiritum egressum non habentem. Ex hoc enim non solum tumores in articulis ipsorum, sed etiam totum corpus repletionem affectum euacuari cōtingit, & propterea maxima utilitas inde cōsequitur. nimirum quæ cause in articulis contentæ discutiantur, & nihil amplius affectus paribus influat, toto corpore à superfluitatibus liberato. At uero si quis improba dicta utatur, affectio redire solet, non tamen ita uehementer uelut antea. Nam antea quæ illæsum ab eo affectu esset corpus, uisiosa dicta malum id induxit. Idem facit & hyena tota oleo uelut uulpes cocta.

De araneorum telis.

Cap. CLXV.

Araneorum telis quidam scripserunt ulcera in superficie ab inflammatione adferuare.

De ranis.

Cap. CLXVI.

Ranæ palustres coctæ, & modico sale ac oleo modico conditæ, magnâ medelam afferunt à repulsiuâ uenenatis cōmorbis, si ius ipsum in potu sumatur. Aliud, Rana in oleo cocta, & oleo pro fomento admoto, diuturni tendinum dolores sedantur. Idem oleum articulare morbum mitigat, & durities emollit. Ranæ uisæ cinis membranæ cerebri sauciata, aut uenæ ruptæ inspersus, sanguinis eruptionem sistit.

De mustela.

Cap. CLXVII.

Mustelam arefactâ & potâ, morbum sacrū curare aiunt. Si tota uiua uratur in olla, cinis eius strumas sanat cum melle, aut terebinthina, aut butyro impositus.

De terræ intestinis.

Cap. CLXVIII.

Terræ intestina trita & neruis dissectis imposita, euestigio mirabiliter auxiliatur, omnē quoque ferri aut lapidis aut alterius rei plagâ glutinant, præsertim in neruosis & ægrè glutinū admittentibus partibus, aut naribus, aut auribus, & similibus. Oportet autē ea leuigare cum terra in qua reperiuntur, si non acrem aut saliam habeat qualitatē. Terræ intestina pota numero quinq; aut septem, cum passo urinam citē, & omne genus lumbicorum ejiciunt eodem modo pota, aut quocumque uelis. Verum latū lumbicū expellunt cum aceto mulso pota. Sed & morbum regū ægrè curabilem per urinas expurgat, similiter cum passo septem numero pota, aut etiā per se, & cum myrrha troglodytide magnitudine ciceris. Vere considerent. At uero in rosaceo cocta, aurium dolores sanat, oleo calido insuso. Oportet autē terræ intestinorum drach. vi. esse,

& rosacei librā unam. Dentium quoque dolores idem oleū sedat, propinquo dolenti denti auri calidū insillatum. Eadem super prunas suffusa dentium dolores sedant, ægro per infundibulū fumum suscipiēte ad dolentem dentē. Molares quoque quos tollere oportet, citra forcipem tollunt uisæ trita, circum dolentē dentem inspersa, prius tamen dentē exactē circūscissificacōe cōuenit. Cinis eorundem in testa exustorum leuissimè tritus, & ut collyriū aridum admotus, incipienti tumore suffusionibus magnificè opitulatur. Auxiliatur idem palpebris in pilos eluxuriantibus, præuulsis antea superfluis pilis, deinde insperso cinere in loca ipsorum per specillum. Prohibet enim pilorum præter naturā regenerationem. Septem autē terræ intestina trita, ex uino mulso ad plures dies pota, calculus in uesica cōstringunt, & paulatim emingere faciūt. Rum punct & internos abscessus, & ad excretionē deductū septem aut nouē pota pro uiribus, trita in aquæ cyathis tribus. Si uero quis ipsa trita in melle reposita assuerit, optimū auxiliū ad percussos à scorpione habebit. Neruorum nodos quos gæglia uocamus, eadē per se trita in cataplasmate imposita dissoluūt. Item māmārum abscessus per se cataplasmatibus uice imposita: suppurat enim attrahūtque, & rūpunt, & ad cicatricē perducent. Prosumt & erysipelas uisæ trita cum aceto illitæ. Podagrarū inflammationes soluūt trita cum melle, ad ce ratū crassitudinē, locis illita & tertia die soluta, locis rosaceo antea subtilitis. Sed & rosaceo cerato trita excepta, optimè pedū dolores mitigat. Cæterū in capite nō finit leucas, uisiliginis albas altius insidentes nasci, si fuerint cōsuetis medicamentis præadstrictæ, & pili postea ex ipsis tritis cum urina pueri illinantur. Oportet autē in testa prius exurere ipsa, et sic in urina uti. Dato & hydropicis septem cum uino mulso, uerum exulcerate uesicæ aut renibus, septē immitte trita cum sapa diluta. Strumas porrō paulatim minuant, uiua locis adalligata tot numero in pāniculū illigata, quot strumæ existūt. Sedāt omnē capitis dolorē et hemicranīā trita tēporibus illita. Subterranea autē sunt hæc terræ intestina, prodeuntia igitur & ad solem conspicua, tempestates ac pluuias significant.

De dracone marino.

Cap. CLXIX.

Draconis marini squamas urito, et terrimè tritū cinerem sublinito, & turbatos ac hebetes oculos sanabis, item eos quibus animalcula uelut culices, præ oculis uolitare uidentur.

De uiperâ.

Cap. CLXX.

Viperæ caro comesta palam calfacit ac siccatur. oportet autē capite & cauda amputatis ipsam excoriare, & omnia interanea eximere, aquaque triplici carnē eluere. deinde in aqua uelut anguillam coquere, addito marrubio, & anetho modico, paucoque oleo. atque ubi iā cocta fuerit, moderato sale cōdire, & edenda præbere, itemque ius absorbendū. Quod autē uiperæ carnes sic comestæ purgent per cutē totū corpus, ex his cognoscere licet, quæ quā adhuc iuuenis essem, experitus sum. Homo quidā elephantiaâ correptus ab omnibus nabilis erat & grauelens. Itaque causa prope uicē exstructa in ipsa debebat. Merebant autē in uicino melleores, quibus uinū in amphora apportabatur. Vbi ergo tēpus bibēdi adesset, melleores uinū in craterem effundebant, atque sic mortua uiperâ simul excidebat. Itaque plenum humanitatis opus se facturos rati, uinum ægrociatū elephantiaâ largiuntur: melius enim esse

esse iudicabant ipsum mori, quam talem uiuere uitā. Verum is epoto uino mirabili modo sanatus est. Et enim uniuersa eius tumescens cuticula, uelut ostreorum testorium decedebat, & quantum eius reliqui fieret, satis molle apparebat, uelut in locustis ac cancris uidere est; ubi testam exuerunt. Quin & in alijs plurimis cōsimiliter accidisse, ueteres memorie prodiderunt. Et nos multos ex uiperis curatos uidimus, unde etiam theriacę ipsas miscemus.

De herinaceo marino.

Cap. CLXXI.

Herinaceus marinus comes superius uentriculo cōductus, & cibos auersantibus, appetentiā excitat. Vri nam laxat idem uescam expurgans, unaq; alium leniter emollit.

De herinaceo terrestri.

Cap. CLXXII.

Herinacci terrestres caro siccata & paulatim pota, elephantiaci auxiliatur, & uitio corporis habitu præditis, conuulsisq; ac nephreticis, insuperq; aqua subtercutē laborantibus; habet enim uim discussoria ac siccatoria. Sed & iecur ipsius sole siccatur ac potū, elephantiaci opitulatur. Cæteri utriq; herinacei terrestres ac marini ustorū cinis exterius est ac discussorius, & carnē consumit. Quapropter & ulcerū superexcrecentē carnē demolitur ac cōpescit, & sordida ulcera expurgat. Verū herinacei terrestres usti cinis pice liquida exceptus alopecias sanat. Eiusdē cinis potus cū uino multo calulosos renes sanat. & aquā intercūtē bibitur cineris cochlearij dimidij mensura. Omnē uring difficultatē ex quacūq; causa oborā, soluit herinaceus, si intestina ac interanea ipsius sufficiant, ægro undiquaq; cooperto; celerim enim sic malū soluitur. Ad hāc rē interanea inueterata esse oportet, & siccā asseruat; quibus nō præsentibus caro aut pellis sic sufficida est. Multa urina ciet interanea siccā trita pota, quantū tribus digitis apprehendi potest, ex uino. Eiusdē caput uisū, & cū adipe urisino illitū, non modo alopecias per sanat, sed etiā pilos ex cantharidibus producti. Corium autē uisum itidem cū adipe, maximē urisino illitū, similiter alopecias sanat. Totus porro terrestres herinaceus uiuus in oleo ad mollem ac lētem ignem coctus diuifusculē, oleū ex ipso coxendicūm dolores ueteres, illitu sanare facit. Fit ex ipso & pilothrū pilis denudandis hoc modo. Herinaceū uiuū in ollam densissimū operculū habentē, & duodecim sextarios capientē mitito, & ad ipsum olei sextarios sex tantū affundito, & ollæ osculū diligenter gyppo oblinito, ut nullatenus trāspirare possit, deinde ad dies x. ad solē sub caniculæ æstibus exponito. Postea apertā tudicula noua diligenter agitato, & mox excolato per panniculū, uitor. Illinatur ex eo locus in sole, & diu cōfricetur donec exudent. postea aqua dulci affusa prole, Cauē dū autē ne alios locos cōingat, quos depilare nolis.

De Hippocampis marinis.

Cap. CLXXIII.

Hippocampi marini & alati comesti, & moriū impotū, à cane rabioso commorosos sanant. Verum cum aceto multo & melle ipsos contereere oportet.

De cantharidibus.

Cap. CLXXIII.

Cantharidum magnificū experimentum habemus ad scabros ungues. Extrahunt enim ipsos cōmodis medicamentis ammixta. Miscunt autem alijs erodentibus compositisq; & excoriatorijs leproforū. Quidam ex præceptoribus nostris in pharmacum urinam ciens parum de cantharidibus addebat, reie-

ctis alis ac pedibus. Ad hos usus commodiores sunt, uelut ego expertus sum, quæ in tridico reperiuntur, & uirgulas trāuersales melini coloris in alis habet. Magis autem adhuc idoneæ sūt, si uitas ipsas in uas fissile mitas. Deinde osculo uasis rarum linteolum obducas, deinde acetū in olla seruafacias, & uas cantharidum inuersum supra ollam detinas, ita ut uas potorem ab aceto elatum, per linteolū cantharides excipiant, donec emoriantur.

De cancris fluuiatilibus.

Cap. CLXXX.

Cancros fluuiatiles crudos tritos & lacti mixtos in potu præbe, & omnis repulis morum curabis, & præsertim scorpij plagæ medeberis. & eum qui potu leopore marino iam perit, statim resistes. Manifestum autem est, quod internam eius carnem cum lacte terere oporteat. Similiter exhibiti auxilium etiam phthificis cōtābescenibus. Itemq; iure albo cocti & comesti, absorpto insuper iusculo. Cæterum cinis cremati cancri similiter ut alia uita siccata. Verū quædam totius substantiæ proprietate, ad rabiosi canis morum efficac est, tū solus, tum multo amplius gēriana & thure additis, ita ut sit thuris pars una, gērianæ quinq;, cineris cancorū partes decem. Vt si sumus autē uitis aliquid quidem aliō modo, fere tamē quomodo præceptor noster utebatur. Patinam habebat is ex gre rubro, in quam uiuos cancos missos urebat, lignis uitis maxime subiectis, donec ad cinerem redigeretur, ut cōmodē teri possent. Atq; sic habebat semper præparatum domi suæ pharmacum. Vrebat autē ipsos cancos mense Augusto sub caniculæ æstibus luna decima octaua. Ex eo uero quotidie à rabido cane commorosis dabat usq; ad quadragesimum diem cochlearium satis amplum in aquā inspergens. Si autem nō à principio, sed post aliquot dies à morfu commorosi curam suscipiebat, bina cochlearia quotidie dabat, ut quadraginta dierū exhibitio expleretur. Vtebatur uero & ad uulnus ipsum medicamentū ex bruta pice, in quod recipiebat piceis libram i. acetū acerrimi sextariū i. opopanax quadragram. Porro cinere cancri fluuiatilis usti melle addito, plantas pedum à frigore ruptas, & digitorum rimas fanabis. Eodem etiam maligna & canerosa ulcera curabis.

De carabo siue locusta.

Cap. CLXXXVI.

Locustæ testam usam acritram cum meraco bibendā dato, & alui infernum fluxum compescit. Expurgat eadem & calulosos renes, multam arenosam urinam deducens.

De testibus castoris.

Cap. CLXXXVII.

Castoris testes castoriū appellant, celebre et multū usus medicamentū, hic in uniuersum uim eius referemus, ad quā si quis respiciat, particulares usus sibi ipsi exquirere poterit. Calfacit itaq; & siccatur, estq; multum tenuium partium medicamentū, siue quis humidū corpori adhibeat egente siccatione, siue frigido indigo caliditatis, siue his qui ex repletionē conuelliunt, ubi ea quæ præter naturam in neruis cōtinentur euacuare oportet, magnam quidem utilitatem ex se ostendit, & nulli parū ullum aliquid detrimentum affricat, præsertim si homo non uehementi aliqua febre laboret. Eadem ratione & tremulis ob crassum ac uiscosum humorum multitudinem, cōmodissimum est potum, utile est & singulati, ex humorū frigidorum ac uiscosorum copia osculo uētris infarsa oborto,

oborto. Si uero ex siccitate, aut immodica euacuatione, aut acris humorum mordacitate, singulis aut conuulso oriuntur, castorij usum uelut infestissimū fugere oportet. Sed & febrientibus non adeo calida febris, sed ut ita dixerim tepida, uelut in alidore sopore, ac lethargo fieri solet, ualde multis castorij exhibitum, & pipere, utriusque cochlearij ex aqua mulsa, & nemo ex ipsis ulla parte laesus est. At uero in lethargidis ac alti soporis febribus, castorium rosaceo dilutū capitū impolissimum ac ceruici. Ad suppressos autem menses ob copiam ac crassitudinem sanguinis, sanguine a talo moderate detracto, cochlearium castorij cum pulegio aut calamintū exhibui, cognouitque medicamentum ipsum purgationem menstruum dēre. Eijcit & secundas dentas, & morantes, similiter cum aqua mulla potū. Inflatos uēres & torminosos propter crassum ac flatuosum spiritū conuulsum, ex posca potum sanat. Datur & orthopnoicis recta ceruicē cespitantibus, cum aceto mullo aut posca. Sufficit & in carbonibus, hiantē aegro & uaporem excipiente.

De canis fluiatilis testibus. Cap. CLXXXVIII.

Canis fluiatilis testes ad eadem comodi ad que castris testiculi existunt, sunt tamen debiliores, eiusdem canis pellis ad calcamentum redacta, pedum ac neruorum morbum egregie mitigat.

De canis terrestris catulo. Cap. CLXXXIX.

Catulus canis terrestris probe saginatus iuxta aegrum accliuatus, si uē stomacho, siue alia interna parte egrotet, morbum eximit ac sanat, affectu in ipsum transeunte. A iunc eundē mortuū diligenter sepeliri oportere.

De cygni pullo. Cap. CLXXX.

Cygni pullus tener in oleo coctus, neruis affectis praeter omnem opinionem medetur.

De buccinorum testis uis. Cap. CLXXXI.

Buccinorum testae usae uim multum siccatoriam habent, unde commodis medicamentis ammixtae inflammationes induratas discutit. Consimilem uim habent purpurarum ac ostreorum testae.

De galerita uolucere. Cap. CLXXXII.

Corydalis Graecis appellatur, & Latinis galerita, uolucere animal paruum, quod saepe iuxta uias uidemus, id simpliciter iure coctum ac comestū colicis prodest. Oportet autē assidue & frequenter id edere, unā cum iure. Nam utilitatem ex ipso saepe expertus sum. Habet autem eminentiam quandam in capite uel cristam, ex primis sponte naturae productam.

De cochlea terrestri. Cap. CLXXXIII.

Cochlea terrestris durā carnem habet, & propterea comesta aegre concoquitur. Verum iusculū ipsius coctae ex aqua & anetho, oleo quoque ac garo, aluo cecedit si potetur. Si uero prima & secunda aqua in qua coquuntur diffusa, in tertia coxeris donec exacte flaccescat, & in fluxione uēris exhibebis, uentrē sistet. At uero cochlearum humiditas sola per se citra carnē accepta (uocat autē eā ipsam cochleae mullā) & thuri ammixta, aut aloae, aut myrrhae, aut aliquibus ex his, aut omnibus, donec cerati crassitudine habeat, pharmacum euadit glutinatoriū, & submucosos auris tumores probe siccant. Glutinat itē ac siccant oculorū fluxiones frōti impositū. Quum itaque mullū eius modici colligere uoles, carnē ipsarū stylo perforato, nō modicā enim humiditate emittunt, praesertim si nō ante multos dies capte fuerint. Haec autē humiditas palpebrarum pilos regludnat. Ego autem aliquando in agro

cuidam neruos saucto unā cum tendinis contusione, carnē cochlearum impolui cum farinae pollice qui moledinis adheret trita, & citra inflammationē uulnus glutinatū est. Erat autē homo durae carnis. Quod si ad manū sint, praestat ammiscere in talibus myrrham aut thurē, aut resina frictam leuissimē trita. Ceterum caro ipsa in pila prius coctusa, deinde trita & impolita, omnes partes superfluum humiditatem habentes siccant, ut etiā hydropicis prodest. Sed & unā cum testis tritae cochleae uentri uniuerso hydropicorū impositur, & super articularū tumores in arthriticis, & apolito quidē ipsarum difficulter auferri potest, uerū multum siccant, & sanē finendae sunt donec sua sponte decidant. Idem facere expedit & in tumoribus aegre solubilibus ex plaga, aut cōtusione factis in auribus. Nam omnes hos excitat, etiam si uiscosum & crassum in alto cōstineatur. Integrae porro cochleae unā cum testis usae, galla omphacitide ac pipere ammixtis, magnopere prosunt dysenterijs, in quibus ulcerae nondum sunt putredinosae. Oportet autem esse peris partē unā, gallae duas, quatuor cineris cochlearum. Quae omnia exacte leuigata ac mixta, reposita seruabis, & usu expetente cochlearij plenī mensuram obfonsis insperges, aut cum aqua calida aut uino bibendam dabis. Citra uero ullam admixtionē ipse cinis cochlearum usitatum siccandi uim habet, cui & quiddam caliditatis propter usuram inest.

De manulis. Cap. CLXXXIII.

Mænulae salae caput usitum, excrecentes in ulceribus carnes, maxime in dentium gingiuis, reprimunt inspersum, & callos eximit, quos clauos uocant, & exuberantes fides eminentias tabefacit ac consumit.

De torpedine. Cap. CLXXXV.

Torpedo uiua apposita, diuturnum capitis dolorem depellit, & prolabantem sedem intro pellit. Mortua uero aut omnino non, aut modicē haec facit.

De asello marino. Cap. CLXXXVI.

Asellus marinus aqua coctus cum anetho, & modico sale conditus, oleo quoque pauco, omnem interaneorum morbum sanat, maxime alui ab acris humoribus infestatae.

De ostreorum testis. Cap. CLXXXVII.

Ostreorum testae omnes leuissimē tritae & ad puluillū redactae, ulceribus malignis conueniunt, & praesertim in ulceribus corrodentibus laborum optimum pharmacum sunt, citra mordacitatem ad cicatricem perducentes: participes enim sunt facultatis adstrictoriae, per quam durae ac terreae existunt. Eam autē per usuram amittit. Eadem cum aceto aut posca aut uino mulla tritae, putredinosas commodē siccant, pro habitu uidelicet aegroti, cōueniente humore ammixto. Quod si uratur ostreorum testa, tenuiorum partium euadit quam buccinorum testa, nam & minus durū est ipsarum corpus. Si uero lauetur hic cinis, comodus sit ad humectiora alque explenda & ad cicatricem perducenda. Atque ego sanē ostreorum testa hoc modo preparata semper uror, ad cavitates ac fluxiones diuturnas & aegre carnem recipientes, etiam si fistulosae essent ac profundae. Circumpono autem eam forinsecus cum adipe suillo uetere, & in ipsum finem quid indo ex his quae talia carne replere solent, quale est pellucidus lapis, specularis appellatur. Quin & dentes ostreorum testa illustrat, uelut etiā buccinorū, & purpurarum, nō solum uī exterforia, sed etiam

etiam substantiæ aspretudine. Quapropter nō est necesse ad hanc rem ipsas ualde leuigare. eadem lotæ ac tenuissimè tritæ humore flaccida ulcera excicant.

De purpurarum testis. Cap. CLXXXVIII.

Purpurarum testæ cum aceto potæ lienes tumentes faciunt. Sufficit uero uteri strangulatus curant, & secundas morantes detrahunt. Vistarum cinis ad eadem facit ad quæ buccinorum adhibetur.

De Squatina marina. Cap. CLXXXIX.

Squatinam marinam usam crassioribus corporibus in balneo inspergit.

De Sepia. Cap. CXC.

Sepia suffocata in aceto, si cum oleo acetum bibendum dederis, eum qui hippocampi marini uenenū sumpsit seruabis. Testa sepiæ exterioriam & siccatoriam uim habet, estq; tenuium partium. Quapropter uisita utimur ad uulnigines, maculas solares ac lentiginis, & scabiem. Sed & sale ammoniaco ammixto, oculorum ungues exterit. Eadem non uisa, dentes illustrat, & affricata oculorum cicatrices dedit, & ulcera in ipsis siccant. Magnas quoq; palpebrarum aspretudines, scycofes Græcis dictas, consumit.

De Scinco. Cap. CXCI.

Scindica renes partes, ad lentiginem pudendorum ciendam bibuntur. Neq; aliud magis contrariū huic facultati destruendæ uideretur, quàm lactuicæ semen ex aqua potum. Quidam etiam lentulicæ decoctum cum melle potum, lentiginem scdere tradunt.

De Tellinis. Cap. CXCI.

Tellinarum salarum uistarum cinis cum cedria adhibitus, superfluos palpebrarum pilos renasci prohibet.

De Cicada. Cap. CXCI.

Cicadis siccis quidam utuntur in colicis affectionibus, cum pari numero granorum piperis, exhibentq; aut tres, aut quinq; aut septem, tum in interuallis, tum in exacerbationibus. Alij costas in uescicæ dolore, ac calculosis, edendas præbent.

De Hyena. Cap. CXCI.

Hyena uiua in oleo cocta, uelut de uulpe dictum est, oleum discussorium efficit, arthriticis utilissimū. Vfus fiat uelut de uulpe indicauimus.

De Hirundinibus. Cap. CXCV.

Hirundinū uistarum cinis cum melle illitus, anginā sanat, & omnino omnes affectiōes quæ in faucibus acurgulione cum tumoribus sunt. Quidā & ad acendum uisum cinere utuntur, collyrij sicci modo adhibentes.

De electione optimorū medicamentorū. Cap. CXCVI.

Agaricum præstat quod firmas rectas habet.

Acaciam eligo fuluam & odoratam.

Alōen elige purā, non lapidosam, ualde splendidam, densam, subfluā, friabilem, hepatis colore, facile liquecentem, odoratā, amaritudinis intensæ. Nigra uero & ualde dura reprobatur.

Amomū elige recens & albū aut subruffum, non coactū, sed solutū & diffusum, semine plenum, similiracemulis, ualde graue et odoratū, nō cariosum, acre & gustu mordax, colore simplex nō uariū. Adulteratū quā id amomide simili existēte. Sēper aut fragmēta reprobāda sunt, electis ramispectis ab una radice.

Ammoniacū thymiam eligēdū est nō lignosum, granis thus referens, purū, densum, nihil fordū habens, castorei odorē præ se ferens, gustu amarum.

Aspalathus bonus est grauis, & post decorticatōnem subruher aut purpuram referens, densus, odo-

ratu, saporis amari.

Abinthium melius est quod in Ponto & Cappadocia nascitur.

Bitumen optimum est purpurei coloris, splendidum, intentū ac grauis odoris. Nigrum autem uitiosum est. Nam pice ammixta adulteratur.

Bdellii præstargustu amarū, colore glutinis, pingue in altum & facile molliū potens, nō lignosum, non sordidum, iucundi odoris in suffitu, & unguis simile aromatico, onychi appellato.

Elleborū nigrum eligito probè coactū, tenuem habentem medullam, acrem gustu ac feruidum. talis est qui in Helicone prouenit ac Parnaso & Antiyria.

Elleborū album elige moderatè extentū, & albū fragilēq; ac carnosum, nō acuminatū & iuncum, aut puluerulentā lanuginē remittentē dum frāgitur. quicq; medullā tenuē habeat, gustu feruidū nō ualde neq; acuatim, saluā autrahentē: qui enim talis non est suffocatorius existit. Primas obtinet Cyrenæicus.

Euphorbium elige pellucidum & acre.

Viscum optimum est recens, coloris prasinū intrinsecus, foris subfluum, nihil asperum aut fursuracē habens, colligitur ex quercu, maloq; ac pyro, & alijs arboribus.

Gluten piscium bonum est non glaucum, subcrassum, non sabrum, facile liquecens.

Calamus aromaticus bonus est fuluus, densis geniculis, & qui in multas scissuras & segmenta allulose frangitur, fistula telis aranearū repleta, subalbidus, in manducando uiscosus, adstringens, & subacris.

Cardamomū optimū est quod ex Armenia afferitur. Elige quod agrè frangitur, plenū & conclusum.

Calsiam elige fuluā, boni coloris, corallium referentem, arcuam ualde, longam, crassam, fistulis plenam, gustu mordacem, & adstringentem cum quodam aromatico seruore, uinum redolentem, uerum purpurea & crassa zigir appellata, rosam odore referens, ad medicum usum maxime apta est.

Cera optima est subpinguis, odorata, pura, pōtica.

Glutidum quod aliqui xylocollam uocant, optimum est Rhodianum, estq; album & pellucidū. Nigrum uero deterius est.

Gummi elige uermiculatum, uitriforme, pellucidum, non lignosum. ab eo proximum est album, resinofum uero ac sordidum inuile est.

Costus optimus est Arabicus, albus existens ac leuis, plurimum habens & iucundū odorē. secundum locū obtinet Indicus densus existēs ac leuis & niger uelut ferula. Tertius est Syriacus coloris buxi, odore nares percellens. Optimus est recens, albus, plenus ex toto, densus, siccus, teredinem non sentiens, gustu mordax ac feruidus. Quidam adulterant ipsum helenij radicem ammiscentes, faciliē est cognitū. Nam helenium linguam non seruēfacit, neq; odorem intentum & nares percellentem exhibet.

Crocus optimus corycius est, recens ac boni coloris, parū albedinis in capreolo habens, oblongus, integer, probè coactus, plenus, nō friabilis, nō pinguis, & tamen in attritu digitos facile tingens, non cariosus, impetuosi odoris, & aris. Qui enim talis nō est, aut uetustus est, aut maceratus. Quo uero faciliē teri possit, in sole ac fistili nouo siccare oportet.

Crocomagmā sic præparatur: Croci drach. centū, rosarū siccarū drach. quinquaginta, amyli drach. i. myrrhæ

myrrhæ troglodyticæ, gummi utriusque drach. i. uno odorato terito, & pastillos formato, eisq; in umbra siccatis, uitior.

Cyperi radix optima est quæ grauissima & densa ac plena, ægrè friabilis, aspera, odorata, cum quadam acrimonia.

Thuris primas obtinet masculum, rotundū, non scætum, album, & ubi incisum est inus pingue. Adulteratur resina pinus aut gummi, facilis est cognitio.

Thuris cortex præstat crassus ac pinguis, odoratus, nõ scaber aut pelliculis refertus: adulceratur cortice strobili aut pini ammixto, deprehenditur id igne; alij enim cortices suffusi fumum edunt. Verum hic ardet odore iucundo uelut thus.

Malabathri folium bonum est recens, in nigrore subalbidum, nõ friabile, integrum, odore nares percitellens, & dum diluitur odoratum, nardum sapore non falsuginem referens, quod uero in tenues partes confusum cariosum odore repræsentat utiosum est.

Medulla optima est ceruina, deinde uitulina, post taurina. Bona est quæ æstate accedente ad autumnū colligitur; alijs enim temporibus cruenta uestigia in ipsa reperiuntur. curatur ad repositionem, recēs molitus aqua affusa, deinde per linteum excolatur, rursusq; lauatur, donec aqua pura fiat, postea in duplici uase liquatur, sordibus innatantibus penina ablatis, postquam autem congelata fuerit, in fictili nouo reponitur, derafa diligenter fece quæ post liquefactionem & excolationem subsidet.

Panacis radices meliores sunt siccæ & albæ, extentes, & incorrosæ, gustu seruidæ, & aromatisæ. Succus panacis commodus est gustu amarissimus, forinsecus uiridis, intrinsecus albus, pinguis, citò solubilis, grauis odoris, & gustu calfaciens.

Myrrha primaria est Troglodytica, subuiridis & pellucida, odorata, acris. quæ uero colore picea est, inutilis existit.

Stactæ myrrha bona est odorata, leuis, oleum admixtum non habens.

Syrax præfertur flauus & pinguis, resinofus, grummos habens subalbidus, ualde odoratus, & dū molitur, humiditatem melleam remittens.

Tragacantha optima est pellucida & leuis, tenuissima & pura, subalbida.

Hyoisycamo utendum est eo qui albos flores producit.

Galbanum optimum est thuriforme, grumofum, purum, non lignosum, quod & ex semine quid amixtum habet, odore graue, & neq; summè liquidum, neq; ualde siccum.

Gagares lapis præfertur qui facillè accenditur, & odorem bituminosum repræsentat.

Melanteria optima est sulphurei coloris, leuis, æqualis, pura, & contactu aquæ citò nigrescens.

Pompholyx optima est Cyprica, & quæ aceto subacta æris odorem refert, colorem autem picis. Est autem & coenosi saporis, & carbonibus ignitis imposita, ardet colorem æreum repræsentans.

Ex Oribasij libris ad Eustathium & Eumapium, de simplicium pharmacorum facultatibus.

Quæ media sunt inter calfacientia ac frigefaci-

cientia.

Cap. cxcvii.

Adiantum, asparagus myacanthinos, muscus qui &

splanchnon dicitur, glycyrrhizæ succus, oleū dulcisimum, cera, faba, lycium, lotus siue trifolium, citrij cortex, filicis radix, nuclei nucis pineæ, lentiscus, lês, terra chia & samia, cadmia, spuma argenti.

Quæ moderatè calfaciunt.

Cap. cxcviii.

Vitidis folia & semen, urticæ semen & folia, amygdala dulcia, anagallides ambæ, atrætylis, glycyrrhizæ radix, oleæ radix, & fructus maturus, fermentum, eryngiū, resina omnes, cicerbita sicca, lunci odorati flos, palmæ fructus, cochlearū cinis, cynocrambe, batrachij herba & radix, pulegiū, lauri folia, & magis baccæ, minus autè radices cortex, dictamnium, pleuodictamnium, saluia, erysimum, lanæ uisæ, bryoniæ radix, aristolochiæ radix, asphodeli radix, daucus, chamedaphne, dracūculi radix, oleum raphaninum, ciccerum species tres, uiscum, caucalis, ligusticum, ferulæ semen, fagapenum, satyrion, apium, sion, sinon, styrax, hydropiper, hypericum, sal, sanguis, fel, urina, salia, sulphur, uiperarum carnes, adeps, salstori piscium muria.

Quæ calfaciunt primo ordine.

Cap. cxcix.

Aloë, chamæmelon, agaricum, absinthium, ladanum, lini semen, malabathri folium, spica nardi, nardus celtica, uinum nouum, serum lactis, caseus, ficus siccæ.

Quæ calfaciunt secundo ordine.

Cap. cc.

Amurca, anethum siccum, sed uiride minus, artemisia, balsamum, elaphoboscum, calamus aromaticus, crocus, thus, mastiche chia, mel, uinū, pix, melissophyllum, marrubium, propolis, cucumeris syluestris succus, scandix, scilla, cardui radix, myrrha, terebinthi cortex, foliaq; ac fructus, fenugræcum, chamæleontis utriusq; radix, chamæpitys, ocymum.

Calfacientia tertij ordinis.

Cap. cci.

Abrotonum præsertimustum, lolium, populi nigrae flores & resina, acorus, amomum, amaracum, ammiū, anethiustum, anisum, iuniperus, asari radix, sabina herba, ueratrum utrunq; epithymum, menta, calaminthe, thymbra, harundinis uallatoris cortex ustus, caroum, calia, cedrus utraq; cici semen, conyazæ, cuminum, thuris fuligo, feniculum, melanthiū, mei radices, moly siue ruta syluestris, aut belesia, rhododaphne, uinum uetus, organū omne, opopanax, petroselinum, ruta, smyrnium, hyssopus, galbanum, chamædrys, raphanus, sampsuchus.

Calfacientia quarti ordinis.

Cap. ccii.

Adarce, ampeloprasen, euphorbium, oleum cedrinū, costus, cepa, lepidium, sinapi, allium, sthruthij radix, tithymallorum succi, & omnia uistoria uel prædita.

Quæ frigefaciunt.

Cap. cciii.

Gramen moderatè, auricula muris, citra adstrictionē, pira in cataplasmate imposita moderatè frigefaciunt, balauitium, rubi folia & germina & fructus uiridis ac flos ipse. Avena moderatè, muscus marinus, glaucum moderatè, dorycnion ualde frigefaciunt, harundinis septaria folia moderatè, decuta summè, lichen in petris nascens, papauer omne, mali fructus, oleæ fructus & folia, oleum myrteum, sedaminum, balanium, helxine siue perdicias moderatè, panicum, uislae folia & succus, mali persici & citrij caro, fungi multum frigefaciunt, item omphacij succus, amyli moderatè, rosaceum mediocriter, sordes ex palæstra, cicerbita non sicca, tribulus uterque, ramorum palmarum succus. Samia terra moderatè, cimolia terra, nazia cotis detritum siue retrinectum, plumbago mediocriter,

diocriter, plumbum, cerussa, sandyx, caseus mollis recens coactus moderate refrigerat.

*Quæ refrigerant primo ordine.* Cap. ccciiii.

Acacia illota, atriplex citra adstrictionem, uinacea, milium, ordeum, platanus, rhamnus, seris.

*Quæ refrigerant secundo ordine.* Cap. ccv.

Acacia lota, plantago, blitum, galla, omphacidis, cucurbita, cucumis, pepo, solanum hortense, lens palustris, alga uicinis, circa prærupta maris litorea collecta, psyllij semen.

*Frigeſcatoria tertij ordinis.* Cap. ccvi.

Semperuium utrunq; portulaca, mandragoras, citrij pars acida, polygonum, potamogeton, hyofcyamus qui & flos & semen album habet.

*Frigeſcatoria quarti ordinis.* Cap. ccvii.

Succus papaueris, cicuta.

*Quæ siccant citra mordacitatem.* Cap. ccviii.

Vitice semen & folia, amura, anagallis utraq; aena, plantago, oleum dulce insulsum lotum, fermentum atrahit ex alto ac discutit. Lupinus amarus, hippuris fortiter, istatis, salicis flos & folia cum quadra adstrictione. Quidam & succum ex ipsis faciunt, & phar macum habent citra mordacitatem licet ad multa comodum. Verum multo amplioris usus est phar macum siccans & adstringens, nucis cortex ustus, si mulg; tenui partium existit, milium, centaurium tenue fortiter siccant, cerasi gummi, lilium, faba, forinsecus imposita, cupressi folia ac reliquæ partes, cyperi radix, nucis pineæ nucleis aqua macerati, nymphææ radix, siræi siue fapa, quinquefolij radix, polypodij, myrrha, farcocolla, stoebe, tragacantha, terra omnis, cadmia, asiae petreæ flos humore flaccidis carnes consumit, pompholyx sæpe uita, calx strenuè, oui candidum ac tenue, eadem uis & uitellorum est.

*Quæ simpliciter siccant.* Cap. ccix.

Vitidis folia & semen, graminis radix moderate, adiaethum, semperuium utrunq; amarantum fluxiones sistit potum, bryoniæ radix, anagryi folia sicca, pira in cataplasmate imposita moderate, aristolochia, asparagus myacanthinus, asphodeli radix, & magis cinis, balauſtium ualde, ruborum fructus immaturus, quercus partes omnes, phagi similiter, bulbos in cataplasmate, eryngium, istatis, salicis corticis cinis uehementer, cannabis semen, pæoniæ radix, lauri folia uehementer, & magis bacce, oleum cyprinum, laurinum, panicum in cataplasmate insipidum, nasturtium, caucalis, pastinaca syluestris siue daucus, lixiuium, præsertim ex cinere sciculneo, brasiica, caules autem eiusdem cinerem fortiter siccantem faciunt, crethmum, lilij folia & radix, omphacium, platani cortex & pilulæ moderate, polypodium, amyllum, sal, nitrum, gypsum præcipue usum, cadmia omnis, omnia metallica & lapidea ac terrea, testa libanorum, coagulum omne, stercus, anserum tamè & accipitrum inusitabile est propter multam acrimoniam, sordes, siue strigmenta, carnes uiperarum, capita menularum falsarum, cornu cerui ac capræ, castorium, ossa usta fortiter, capilli usti, sepiæ testa, lanæ usta, cancrorum cinis, garum abunde, muria.

*Quæ primo ordine siccant.* Cap. ccx.

Chamaemelum, iuniperi bacce, caroum, ordeum, posenta, crocus, thus, sceniculum, rhododaphne, uinum nouum, cucumeris & peponis semen, & radix sicca, scorum græcum,

*Quæ secundo ordine siccant.*

Cap. ccxi.

Lolium, amaracus, bitumen, anethum, balsamum, uinacea, gingidium, elaphoboscum, calamus aromaticus, thuris cortex, & folia arboris, itemq; semè, meſti, mastiche, mel, spica nardi, nardus celtica, uinum, eruum, opopanax, pix, rhamnus, raphanus, scandix, cardui radix, myrrha, lentiscus, terebinthi fructus & folia, lentes, alga humida & uiridis, malabathri folium, galbanum.

*Quæ tertio ordine siccant.*

Cap. ccxii.

Abrotonum præsertim usum, acacia, acorus, aloë, amomum, anethum usum, anisi semè, iuniperus, alarum, absinthium, herba sabina, ueraurum, epithymum, thymbra, calamitula, harundinis sepiariæ cortex ustus, caroum, casia, cedrus, conyza, thuris fuligo, nigella, citrij semen, uinum satis uetustum, acetum, origanum, quinquefolij radix, petroselinum, smyrnium, ruta hortensis, marrubium, rhus, sampfuchus, seriphium, hyssopus, chamaedrys, chamaeleontis utriusq; radix, chamaepitys.

*Quæ quarto ordine siccant.*

Cap. ccxiii.

Ampeloprason, oleum cedrinum, sinapi, ruta syluestris, allium.

*Quæ media sunt inter siccantia & humescantia.*

Cap. ccxiv.

Graminis radices in cataplasmate impositæ, oleum dulcissimum.

*Quæ primo ordine humescant.*

Cap. ccxv.

Auricula muris, buglossum, succus glycyrrhizæ, lactuca moderate, uiolæ folia moderate, mali perſic fructus, fungi, rosaceum, satyrium, stratiotes fluuiatilis.

*Quæ secundo ordine humescant.*

Cap. ccxvi.

Portulaca, atriplex, cucurbita, cucurbita, mali armeniacæ fructus, cucumis, pepo, lens palustris.

*Quæ aquosam frigiditatem habent.*

Cap. ccxvii.

Acacia, auricula muris, portulaca, plantago, atriplex, rubi folia, blitum, mulsus marinus, glaucium, dorycnium, uiscum, salix, cucurbita, cotyledon, cicuta, picea arbor, malua satua, papauer, mala præcoda, fungi, plantanus, polygonum, potamogeton, sideritis, cucumis cibarius, holoschoenus, cicerbita, tribulus, lentidula palustris, psyllij semen, plumbum.

*Quæ tenuium partium sint.*

Cap. ccxviii.

Abrotonum usum, uirex, scandix, populi nigre flores et folia, urticæ semen & folia, amomum, acorus, asari radix, bryoniæ radix, chamaemelon, aparine, aristolochia, plantago sicca, asphodeli radix, præsertim usta, balsamum, herba sabina, sinapi, rubi radix, glycyrrhizæ radix, oleum uetus, oleum cinum, elaphoboscum, euphorbium, fermentum, salicis succus, calamitula, calamus aromaticus, harundinis sepiariæ cortex ustus, casia, carpesion, milium, oleum cedrinum, pruni gummi, mastiche, nigella, succus cyrenacicus, opobalsamum, ruta, pistacij fructus, propolis, terebinthus, rosaceum oleum, sagapenum, sampfuchus, seselis, cucumeris semen, ficus aridæ moderate, flos luneci odorati, cinis, calx, salis flos, hyssopus, sal, alcyonium melleum, nitrum, auripigmētum usum, gypsum usum, sulphur, cadmia, pumex usum, lixiuium, asiae petreæ flos, melanderia, misy, æs usum, chryso-colla, sandix, fucus, adeps leonis ac pardi, sicq; hyæ-næ ualde, castorium, sepiæ testa usta, lanæ usta.

*Quæ crassarum partium sint.*

Cap. ccxix.

Plantaginis radix, balauſtium, uinacea, zingiber, cucumis, & cepe,



cepe, squamae omnes, fori, alumen.

*Corroborantia.*

*Cap. cccxx.*

Cassa, galla omphacitis, storchas, palmae fructus, ablinthium, mastiche.

*Concoctoria.*

*Cap. cccxxi.*

Amomum, uua passa, cera, ladanum, glutinum librarum, crocus, thus, pix, mastiche Aegyptia, rosaceum oleum, myrrha, styrax, galbanum, alica, adeps uulilus & uitulinus, butyrum, celsypus.

*Suppuratoria.*

*Cap. cccxxii.*

Aque temperatae affusae fomentum, aqua & oleum temperata, farina triticea, panis, alica, adeps porcinius & uitulinus, butyrum, thus, pix, resina.

*Mollientia.*

*Cap. cccxxiii.*

Quaecumque caldant non tamen uehementer, simulque non uehementer siccant: sunt autem talia, seuum caprinum, adeps gallinaeus, & porcinius, seuum taurinum & hircinum, medulla ceruina, uitulina, ammoniacum thymia, styrax, galbanum, bdellium, oleum sicyonium, oleum liliorum, oleum dulcissimum, chamemelum, althaeae radix, cucumeris syluestris radix, maluae syluestris folia, mastiche chia, & Aegyptia, terebinthina, resina colophonina, opopanax, sordes statuarum in gymnasijs, sordes palastrarum, butyrum, celsypus.

*Que indurant.*

*Cap. cccxxiiii.*

Semperuium, portulaca, psyllium, lens palustris, folanum. Indurantur autem corpora & partes aut ob siccitatem, aut ob plenitudinem, aut ob congelationem. Si quidem igitur ob siccitatem pars dura fiat, humectare omni modo ipsam oportet. Si uero ob plenitudinem, euacuare eam ipsam oportet. Si uero ob congelationem fuerit indurata, congelationem moderate caldantibus dissolvere oportet. Nam congelatio ex frigore est, quae autem uehementer caldant, magis congelant.

*Exterforia.*

*Cap. cccxxv.*

Stercus caprinum usum & non usum, omnes testae, testis interuortu, sepias testis, herinacei terrestres ac marini cinis, rosae lactis, bryoniae radix, mel, amygdala dulcia elusi apta, & ipsorum arbor, anagallis utraque, anemone omnes, plantaginis folia, maxime arida, aristolochia, aron, asparagus myacanthinus, staphis agrestis, alphodeli radix, atriplicis semine, ablinthij succus, bulbos impositus, ueratri utriusque, helixine, siue perdidias, salicis semine, calami sepiarum radix trita modice, fabae caro, lapsana in cataplasmate imposita, lachen petrarum, leucosii partes omnes, planariae radice cortex, marrubium, meum, propolis moderate, ulmi folia, & cortex ac radix, pullana, terebinthina amplius quam mastiche, sagapenum moderate, cucumeres, peponis partes omnes, cucumeris syluestris radix, betae, tithymallus, phus, chamaeptis, alcyonia omnia, terra chia & samia moderate, smiris abunde, cornu cerui, & caprae usum, & quaecumque in ueneris nitrosa & amara, ea omnia meatus expurgare possunt. Quae uero tenuium partium sunt dulcia, extergent moderate ulcerum sordes, & totius cuticulae, uelut sunt fabae, eruum, ordeum, lupinus, & similia.

*Que uasorum oscula aperiant.*

*Cap. cccxxvi.*

Quae oscula uasorum aperiant, calida sunt non ualde, & crassarum partium: quae enim uehementer caldant, urunt & crustam inducunt, anemone omnes, cepa, allium, sel taurinum, irini & amaracini olei siue unguenti sex,

*Rarefacientia cutem.*

*Cap. cccxxvii.*

Rarefactoria sunt quae moderate & citra molestiam caldant, nequaquam uero siccant. Chamamelon, althaeae, cucumeris syluestris radix, costus, libanoides, nitrum, abrotonum, oleum uetus.

*Densantia cutem.*

*Cap. cccxxviii.*

Aqua frigida, semperuium, portulaca, tribulus uiridis, psyllium, lenticula palustris, mandragorae mala, & summatis omnia quae frigefaciunt non siccant.

*Corrodentia.*

*Cap. cccxxix.*

Auripigmentum, sandaracha, chryso colla, cantharides, eruca pinus, cedria, ueratum nigrum.

*Reprimentia eminentias.*

*Cap. cccxxx.*

Elaterium, cucumeris syluestris radix, ochra, mandragoras, asiae petrae flos, ostreorum testae, herinaeus uterque usus una cum testis suis, hematites lapis siccus tritus et ad puluillum redactus, faba, squama aetris, chryso colla.

*Cicatricem inducentia.*

*Cap. cccxxxi.*

Quaecumque adstringunt & siccant, alumen, galla omphacitis, aes usum, praesertim lotum, mali corium aridum, recrementum plumbi, spuma argenti, helicyma, id est, argenti recrementum, plumbum usum, testis, interuortu omniui testis, uitrum, pumex praesertim usus, & uino extinctus, specularis lapis usus, cerusae, pompholyx, spodium lotum, chryso colla, stibium usum, diphyrges, sarcocolla. omnia praedicta si ulceribus insperseris, ipsa cicatrice includes. Verum cum mordacitate cicatricem inducit atramentum sutorum usum, cadmia, squama aeris ac ferri, praesertim stomomatis, xerugo, calx usta & lota.

*Exulcerantia in superficie.*

*Cap. cccxxxii.*

Rubi canini folia, betae radix, allium, pulegium, hyssopus, organum, sepias testis, asphodeli radix, semen lini, & falsa, & acris, & amara.

*Vistoria.*

*Cap. cccxxxiii.*

Cantharis, diphyrges, sex acetii radix, anemona puniciflora, florem habens, allium, cinis, praesertim ficulnus, nitrum allatum, aes usum, alumen, buccinorum testis usta, menularum capita, auripigmentum, staphis agrestis, granum cnidium, sinapi, pyrethrum, calx non extincta urit, extincta crustam inducit.

*Attractoria.*

*Cap. cccxxxiiii.*

Anemone omnes, anagallis utraque, dictamnus, ciccer, thapsia, cyclaminos, narcissi radix, popolis fortiter, fermentum, stercus omne, sagapenum, succus cyrenaicus & medicus, silphij succus & radix, sparagi quo aucupes utuntur, & semen, & uirgarum succus generose, terebinthina magis quam aliae resinae, sulphur, stercus bubulum, praesertim si ruo boves pascantur, calaminde in cataplasmate imposita, costus contritus cum oleo, fortiter autem aurahit uisum.

*Discussoria.*

*Cap. cccxxxv.*

Abrotonum, agaricum, adiantum, agilops, urticae semen & folia, sambucus, ebulus, chamamelon, anisi semen, aristolochiae radix, asphodeli radix praesertim usta, atriplex, bulbos, herba fabina, muscus qui splanchnon & hypnon Graecis appellatur, daucus, althaea, oleum dulcis, oleum uetus, oleum raphaninum & cinium, & thapsia, calami sepiarum cortex usus abut de discuti, brasicae folia, lilij folia & radix, ladanum, mercurialis, malua syluestris, mel, mali plicae folia, & germina, rhododaphnae, grossi ficus, ficus syluestris, mastiche

maſtiche chīa, opobaſamum, ſuccus cyrenaicus ue-  
hementiſſime, paſiuri folia & radix, ruta, pix, ma-  
rubium, terebintina, roſaceum oleū moderate, ſor-  
des à ſtatuis, ſordes palæſtrarū, quæ patos Græcis di-  
citur, ſampſuchum, cucumeris ſylueſtris radix, myr-  
rrha, carica acriores amplius quàm groſſi, beta circa  
caſtationem, fortior eſt autem alba, galbanum, ſal  
preſertim uſus, ſalis flos, nitrum, halcyonia omnia,  
terra ſamia, hyoſcyamus, caſeus tener ex acido lacte  
moderate, butyrum, coagulum omne, ſtercus omne  
ualde, œſipus moderate, carnes uiperarum fortiter,  
adeps præſertim leoninus, oſſa uſta eorundem leo-  
num, & omnium aliorum dñis.

Adſtringentia.

Cap. cccxxvi.

Oleaſter, piſaſter, leniſcus, apiū, ſemperuium, papa-  
uer, cyſius, aloë, urtica, uinacea, pira, crocus, althea,  
terebinthus glans, hyoſcyamus, hederæ, nymphæa,  
palma, oui utellus aſſatus, paſiurus, hippuris, ſan-  
guis concretus, liguſtrū, œnanthe, braſſica bis cocta,  
coaguli leporinū, ſpōgia uſta, rhamnus, ſunt & mul-  
ta alia adſtringentia, quæ omnibus nota exiſtunt.

Quæ ſemen generant ac prouocant in cibis

ac medicamentis, & cibis medicamenta

rijs.

Cap. cccxxvii.

Ex edulijs omnia quæ amplius nutriūt & inſtant, item  
medicamenta omnia ſtatuſa & calida. Itaque bul-  
bi & cicer, & nuces pineæ, fabæq; ac ficus, edulia  
ſunt multum ſemen generantia. Scincus autem, &  
ſatyriſon, ac ſimilia, medicamenta ſunt. Edulia autē  
ſimulq; medicamenta ſunt, lini ſemen, eruca, & hor-  
minum.

Quæ ſemen inibitant.

Cap. cccxxviii.

Semen inibent omnia quæ frigefaciunt edulia ac me-  
dicamenta, itemq; quæ craſſefaciunt & condenſant,  
uelut lactuca, cucurbita, blitum, arriples, cucurbita,  
mora, mſolepones. Quæ uero ſcant, ne ab inſito  
quidem generari ſemen permittunt, etiam ſi calida ſe-  
riam naturam habeant, uelut eſt ruta. Si uero calida  
non fuerint, multo magis ſcant, & ſemen generari  
non ſiunt, uelut nymphææ radix.

De alimentorum uiribus.

Cap. cccxxix.

Sanitatis ſtudioſum ſi quid aliud, alimentorum uires  
noſſe oportet, itaque ea quæ attenuatoriā uim ha-  
bent, anguſtos tranſitus obturationē liberant, & uis-  
coſa inſarta expurgant, ac craſſa ſecant. Verum qui  
in ipſorum uſu perſeuerant, ſeroſas & bilioſas ſuper-  
fluitates congregant, & ſi quæ adhuc amplius perſe-  
ueret, atrabiliarium ſanguinem reddet. Quare ab aſ-  
ſiduo ipſorum uſu abſtinere oportet, præſertim eo-  
rum quæ temperamentum biliōſum habent. Solis  
enim hiſ qui piſtuſam & crudum humorem uis-  
coſumq; ac craſſum coaceruauerunt, talia conueniunt. Ac  
uero craſſefaciente uſi prædicia, multum alunt, & ſi in  
uentre ac iecore probe concoquantur, ſanguinem bo-  
ni ſucci generant, lienem autē & iecur obturant. Ex  
his uero quædam craſſi tantum ſucci ſunt, uelut leni-  
ticula. Quædam uero uiscoſi, ut malua, quædam craſ-  
ſum ſimulq; uiscoſum ſanguinem poſſident, uelut eſt ca-  
ro teſta inſectorum. Securius itaque eſt diætā & uſu-  
s attenuatorijs ad ſanitatē conſeruatiōnem, præ-  
craſſefacientē, uerum quum modice alar, firmitatem  
non addit corporibus neque robur, & oportet ali-  
quando etiam multum nutriētia moderate aſſumere,  
re, ubi firmitatem acquirere uoles. Cæterum circa

periculum craſſa diætā uti poſſunt, qui exercitijs de-  
diti ſunt, & qui dormiunt, quantū uolunt. Omnes  
autem qui ante ciborum acceptiōnem exerceri non  
poſſunt, alimenta craſſi ſucci uident. maximum enim  
ad ſanitatē cōſeruatiōnem malum, perpetuum occū-  
xiſſit, quemadmodū contrā moderatus motus ma-  
ximum bonum. Omnium porro eduliorum opti-  
ma ſunt, quæ inter attenuantia ac craſſefacientia me-  
dium locum obtinet, & ſanguinem ſubſtantia ac co-  
page moderatum generant. Itaque tale alimentum  
corporibus noſtris cōueniens eſt. nociuū uero craſſi  
ſucci, & propterea ſemper fugiendum. Quin & alti-  
mentorum uarietatem fugere oportet, præſertim ſi  
ex contrarijs uiribus ac facultatibus conſiſterint, ita-  
que enim aſſumpta probe concoquantur.

Attenuatoria alimenta.

Cap. cccxi.

Allium, cepe, naſturtium, porrū, ſinapi, piper, ſmyr-  
nium, pyrethrum, origanum, calaminta, hyſſopus,  
ſilymbrium, pulegium, thymus, ſatureia uiridis acce-  
pta, ſicca enim medicamentum eſt. Ab his proxima  
ſunt eruca, ſion, apium, petroſelinum, ocyminum, rha-  
phanus, braſſica, beta, ſceniculum, coriandrum, ru-  
ta, anethum, liguſticum, cuminum, caparis & tere-  
binthi fructus, carui ſemen, aniſi, dauci, & omnium  
odoratorum & acrim ac palam calidorum ſemina,  
uerum fortiter attenuat ruta ſemen, & cannabis, ut  
medicamenta de cætero exiſtant. Ex cerealijs ſemi-  
nibus attenuant diætā ſolum ordeum conuenit, de  
inde panes clibano cocti triſcei, à reliquijs abſtinen-  
dum, præterquam ſi quis per longius interuallū  
piſum, aut lentem guſtare uelit; plurimum autem e-  
duliorum uſum pro attenuantijs uſibus ratione ſup-  
pediant piſces petroſi & montanæ uolucres paruæ,  
in uniuerſum enim omnia exercitata meliora ſunt  
inexercitatis, & ſcicore uſu uentia, & purum ac  
tenuem aërem inſpiratā, & ex piſcibus qui mollem  
ſimulq; friabilem carnem habent reliquijs præſtant.  
Nam qui duram aut uiſcoſam habent, ab his penitus  
abſtinendum eſt. Habes autem notas carnis omnis a-  
nimalis, friabilitatem ac molliciem, & quibus ſanè  
utraq; aſſuerit, ad ſatiatē edere licet; quibus alte-  
ra tantum, edere quidem expediret aliquando, ſed  
uitanda ſauetas eſt. Neque gallinas prohibeo ſi quis  
exercitio utatur, neque columbas, neque turtures,  
maximè ſi in agro degant, ac montanis locis. Opor-  
tet autem non recens maſtatas, ſed ueniam minimum  
diem ſeruatas à maſtatione edere, non ſolum uirtu-  
tes & gallinas, ſed etiam perdicēs, & omnia quæ mo-  
derate duram carnem habent. Sed & ſali piſces abun-  
dè attenuant, & craſſos ac uiſcoſos humores ſecant,  
eligendi ſunt autem & ex his qui mollem carnem ha-  
bent. Nam cetacei generis uitandi ſunt. Præſtat  
& plurima edulia aceto & aceto muſco præparata acci-  
pere, & ſale prius condire quantū eius fieri poteſt.  
Neque læſionem incurrit, qui fructus pomorum  
alium mollicies acceperit. Verum tarde tranſeun-  
tes deteriores ſunt, & magis ſi duri fuerint. Quare  
ex his ne guſtare quidem oportet, præter eos qui re-  
poſitioni apti ſunt, uelut pira & mala, & uuarum nō  
pauca genera: molliores autem magis edere expē-  
dierit, qui uero ualde auſteri & acerbī ſunt, ad hanc  
diætā inepti exiſtunt. Omnium maximè autem  
apta ſunt carica, & nuces, & piſtacia, & amygdā-  
læ ſubamaræ. Cæterum oliuas neque laudo, neque

uinpero. Verum ex dulcibus non solum eduljis, sed etiā potionibus, mel ferē solū ex acie tenuem succum generat: Vina quoq; tenuia & alba crassos humores fecant, & per urinas expurgant. Vississimum uero ad extenuantem uictum est acerum nullum.

*Craasi succi alimenta.*

*Cap. cxxli.*

Panes furnacei, & siliginē, & nō probē preparati, plantae ex musto & similagine, itemq; liba, & omnis placenta non fermentata ex tritico, & quēcunc; eius generis inde parantur. Sunt etiā similago, ac alica, latis crasi succi, amyllum uero moderatē. Sunt & dolichi crasi succi, & lupini, & interna lentis caro, nam cortex exteriorū quid possidet, itemq; fabae frictae, & pisces molles appellati, loligines, sepiæ, polypodes, & cetacei generis, ex quo sunt & thunni, moderatiores autem ipsi sunt pelamides. Multum crasi si fucus sunt ostræ, & buccina, purpureaq; ac chamae, patellae, peccines, pinnae, & omnia testa infecta, anguillae itē ac cochleae, bubulæ carnes, caprinae, ceruinæ, leporeinae, suillū hepar, renes, testes, moderatē lac coctum, casei omnes, uerū recentes & ex acido lacte minus, oxygala, protogala quod & pyrepton uocatur, oua ad perfectam concretionem cocta & magis adhuc assata, atq; amplius etiānum fricta in sartagine, palmae, castaneae, bulbi, rapa, fungi, tubera, nuces pineae, conī ac strobili appellati, ficiis non probē maturæ, citrii caro, cucumeres præsertim uberius ingessiti, mala nondum matura, uina dulcia quoq; sanguinem crassum generat, & his amplius sapa, & uinum nouum, uinaq; crassa ac nigra.

*Media inter attenuatoria et crasse scientia.*

*Cap. cxxlii.*

Panes optimē preparati, carnes gallinarum, phasianorum, perdicum, columbarum, auagenarum, & paruarum auicularum omnium, optima edulia sunt. Insuper pisces petras ac liqora & altum pelagus incoctentium, gobiolorum, murenarum, buglossorum, & omnium consimilium, qui neq; uiscositatem neq; graueolentiā in dibo repræsentant. Item ficiis, pepones, & ex syluestribus oleoribus feris, id quod commune pluribus genus existit, singulorum autē speciales appellationes sunt apud Atticos, uelut lactuca, chondride, gingidium, & alia infinita syluestria olera quę feridis nomine ueniūt. Eius generis est & asparagus palustris, itemq; myacanthinus, & chamaedaphnes, ac bryonia. Vinum itē solum simulq; dulce ac pelucidum, quale est aruisium, & lesbium, & dulce salernum, ac imolites. Hæc enim bonum & moderatē crassum sanguinem generant.

*Que uiscosum sanguinem generant.* *Cap. cxxliii.*  
Triticum graue, densum, & in alto flauum, uiscosum succum generat: leue autem & rarum & intrinsecus album, minus uiscosum humorem generat. Est & similago itemq; halica satis uiscosa. Item tēdines, præsertim in musculorum extremitatibus, aponeuroses Grecis appellati, & partes circa labra, & lingua, suilla quoq; caro, & agnina, sesami item semen, & palmulae pinguiore.

*Que crudum humorem generant.* *Cap. cxxliiii.*  
Palmulae uirides uescentes crudis humoribus implent, & rapa, & testa inctorum caro, si diutius cocta salsum humorem deposuerit, & pisces molles appellati, uelut sepiæ, polypi, & alia huius generis: item cetaceum genus in mari, quapropter antea falsa hæc in-

usum cibi ueniunt. Talia sunt & intestina, & uētres, & uiuæ quadrupedum, & acidum lac, lupini, uua in uentre recitata.

*Que frigidum humorem generant.* *Cap. cxxlv.*  
Qui se cucumeribus ualde explēt, frigidum humorem coaceruat. Insuper & qui uentres ac intestina & uiuæ quadrupedum animalium ingerunt, & lac acidum, & mala nondum matura.

*Que atrabiliarium succū generant.* *Cap. cxxlvi.*  
Carnes bubulæ, caprinae, & magis taurorum ac hircorum, & adhuc amplius ouium ac leporum, ac suum syluestrium, carnes item falsę quadrupedum animalium. Ex marinis piscibus thunni, balenæ, & omnia cetacei generis, cochleæ, brasiæ, arborum germina, muria, & acidā muria condita, uelut lentisci & terebinthi. Item cinare caro, & lens edulium est maxime aram bilem gignens, & post hanc furfuracei panes, & qui ex typha ac alijs uitiolis seminibus sunt, & casei antiqui, & uina crassa ac nigra.

*Que bilio sum humorem generant.* *Cap. cxxlvii.*  
Siliquæ, itē cinaræ succus amarum bilē gignit, præstas itaq; ipsam feruefactā in dibo fumere. Mel quoq; facile in bilē transit. Omnes quoq; dulcis laporis succi, materiam flauæ bili præbent, itemq; dulcia uina.

*Que superfluitatibus redundant.* *Cap. cxxlviii.*  
Palumbes, anseres, pisces, exceptis petrosiis, uiscera omnia, medulla, spinæ dorsī, cerebrum, auctulæ palustres & stagnorum, cicur, fabæ uirides, faba Aegyptia, porcelli recens nati, ouilla caro, & omnium iuniorum animalium, & ociose uiuentium, pisces fluuiatiles & palustres, & qui in limosa aqua degunt, item omnia cetacei generis in mari.

*Que superfluitatibus careant.* *Cap. cxxlix.*  
Colla animalium, caudæ, alæ, syluestrium animalium caro, & eorum quæ ficis locis degunt.

*Multum nutritia.* *Cap. ccl.*  
Suum demofestorum carnes ex omnibus eduljis optimæ alū, cerebrum bubulum, testes, cor, medulla spinalis, itemq; reliquæ, anserum alæ, & magis gallinarum, omnium uolucrum uentres, cochleæ præsertim ter coctæ. Ex testa infectis quæ duras carnes habent, uelut purpureæ, buccina, & similia, gammari, paguri, cancri, locustæ, squillæ, & consimilia. Item molles appellati pisces, uelut polypi, sepiæ, loligines, & consimiles. Ex cartilagineis, torpedo et pastinaca moderatē, quadra uero magis, nulli & gobi minus. Lac crassius quidem magis, & liquidius minus. Ex panibus siligineus maxime alit, deinde simlagineus; tertio loco est cui fures non decesserunt, triticum coctum, siligo, alica, fabæ carnis habitum non additum & densum faciunt, sed laxiorem. Cicur magis nutrit, phaseli & ochri magis scenograecum, dolichi quos lobos uocant Greci non pisis minus nutriunt, castaneæ, lens, palmulae dulces, uua passæ dulces, ac pingues, rapa, bulbi maxime alunt & præsertim his cocti. Mel depuratum & ad distributionem & ad nutritionem aptum est, uinū omne nutrit quod crassum est. Rubra itaq; & crassa ac adstringentia, magis alunt. minus uero his alba simulq; crassa & austera. Omnium minime alba & tenuia, omnia item crassi succi si probē concoquantur, ualde alunt.

*Que parum nutriunt.* *Cap. ccli.*  
Extremæ animalium partes, uulua, uenter, intestina, caudæ, aures, pinguedo, adeps, omne uoluerium genus

genus minus alit, terrestrium generi comparatum, ca-  
ro quoq; animalium annosorum minus alit quam  
augefcendum. Piscum eius sanguinem tenuiorem  
generat. Ex testa inactis quæ mollem carnē habent,  
uelut ostrea minus alunt, panes ordeacei, polenta or-  
deacea, panes fursuracei & fordidi omnes ac loti, a-  
mylū, mafa ex polēta ordeacea, auena, milium, eōq;  
magis panici, oryza, fabæ uirides, semē papaueris,  
mora, amygdala, pistada, pruna, persica, armenia-  
ca, præcocia, oliuæ, maxime drupæ, nuces auellanae,  
& magis adhuc regie, ferica, corna, pruna syluestria,  
mora rubi, capparis & magis sale condita, terebin-  
thi summitates, bralsicæ, betæ, raphanus, sinapi, a-  
sparagi omnes, pastinaca, daucus, carus, cepa, allium,  
porrum crudum quidem nullum penitus alimētum  
præbet, bis uero aut ter coctum paucissimum, puni-  
ca mala, pira, cucurbitæ, uuq; passæ austeræ & nō pin-  
gues. Porro media quodam modo finit inter parum  
nutrientia, phaseli, ochri, cicerculæ. ficus autem non  
similiter ut reliqui fructus parum nutritur, uerum  
laxam carnem faciunt. Vuæ uero minus quam ficus  
laxam & humectam carnem alunt.

Quæ boni succi sunt.

Cap. cclii.

Optimi succi est optimum lac ferē inter omnia quæ in  
cibo accipimus: optimum autē lac est animalium bo-  
næ habitudinis, statim ubi multum fuerit calidum  
adhuc potum. Oua tremētia & sorbilia gallinarum  
ac phasianorum. Volucres & pisces ferme omnes bo-  
ni succi sunt, exceptis his qui in paludibus ac stagnis  
& fluminibus limosis ac turbidis degunt. Verum  
odore & gustu cognobiles sunt. Nam foetidi & in-  
suauēs ac mucosi sunt, propterea quod in uitiosa a-  
qua degunt. Carnes autē quadrupedum animalium  
si probē concoquantur, optimū sanguinē generant,  
maximē si bono succo prædita sint, uelut est suillum  
genus. at uero omnes circa labia partes, aliæq; extre-  
mitates, & alæ uolucrum, intestinaq; & uulua ac cau-  
dæ, minus boni succi sunt quam carnes, glandulæ au-  
tem probē cōcoctæ, similiter ut caro boni succi sunt.  
Cor non est mali succi, pedes suilli meliores sunt  
quam rostrū & aures: syluestriū quoq; animalium  
carnes meliorē succum quam domesticorum habēt.  
panis purus probē præparatus boni succi est, alica  
item, & pistana probē præparata, fabæ, castaneæ nō  
habent malum succum, fuscus maturæ, & uua matura  
itemq; pendilis repræhendi non merentur. caricæ sta-  
tim quid in corpus digestæ ac distributæ, boni succi  
cunctiuerūt si in uentriculo morētur, mali succi fiūt,  
& pediculos generant, si uero cum nucibus edantur,  
bonum edulium existunt. Cæterum si quis ficus &  
caricas assidue in cibo sumat, non parum lædetur.  
Lactuca ut olus sanguinem bonum gignit, & ab ea  
intubi. Vina odorata boni succi sunt, sed omnium o-  
ptimi succi est salernum dulce & molles.

Quæ mali succi sunt.

Cap. ccliii.

Ab omnibus mali succi edulijs abstinentū censeo, etiā si  
facile concoquantur. Latenter enim diutiori tem-  
pore uidosus humor in uenis ex ipsis congregatur,  
qui leuissima putrefactionis occasione arrepta, mali-  
gnas febres gignit. Est autem maxime uidosi succi ca-  
ro ouilla ac caprina, pessima uero hircina, deinde a-  
rietina, postea taurina. In omnibus his præstant ca-  
strorum carnes. Seniorum autē animalium pessi-  
mæ sunt: Caro leporina crassiorē quidē sanguinē

generat, uerum meliorem ad succi bonitatem quam  
bubula & ouilla. nihilominus tamen & ipsa mali  
succi est, itemq; ceruina, renes & testes perfectiorū ani-  
malium mali succi sunt, exceptis gallis. Itē cerebrū  
& medulla spinalis, exceptis gallis. Iien, oua in sartagi-  
ne fricta, casei ueteres, boletī, amanitæ, scœnogregum,  
lens, auena, cicer non est boni succi. Olyra uero tan-  
to deterior est tritico, quanto melior est quam tīpha  
& auena. panicum, milium, & similia non sunt boni  
succī, dracones, callionymi, scorpij, trachuri, nulli,  
orphi, glauci, zygaenæ, congridi, phagri, & quæcūq;  
alia cetacei generis in mari animalia, omnia mali suc-  
ci sunt. Item omnes fructus subcāniculares mali succi  
sunt, mala nondum matura, pira prius quam conco-  
quantur, persica, mala punica, mespila, corna, pruna  
syluestria, siliqua, & terebinthi fructus, cinara præ-  
sertim ubi dura fuerit, cucumeres, pepones, cucurbi-  
ta his quidem melior est, sed & ipsa in uentre corru-  
pta satis mali succi euadit. ficus et caricæ minus quam  
alii subcāniculares fructus malū succum habēt, uerū  
his qui in ipsarum eū perseuerant, nō ualde bonum  
sanguinem gignunt. unde & pediculorum copia ex  
ipsis consequitur. Ex oleribus nullum boni succi est.  
in medio boni ac mali succi sunt lactuca, intubi, ma-  
lua, blitum, atriplex. Radices plantarum olerum ge-  
neris mali succi sunt quæcūq; acres, uelut ceparum,  
porrorum, alliorum, raphanorum, & dauci. Medio  
loco sunt raporum & cari appellati radices. Ocymū  
pessimi succi est. rapum crudum, bralsica, bulbi non  
probē cocti. At uero allium & cepæ ac porrum bis  
cocta humoris malignitatem deponunt. Cæterum  
extreme mali succi sunt olera quæ syluestria appel-  
lant. Vina crassa simulq; foetida & iniuncta ac auste-  
ra mali succi sunt, quale est bithynum quod in ma-  
gnis dolijs apporatur. nam quod in paruis affertur,  
neq; boni succi neq; mali existit.

Quæ facilia concoctū sunt.

Cap. ccliiii.

Panes bene præparati, pisces petrosi omnes, gobio, tor-  
pedo, pastinaca, si uolucrum generi cōparētur. uolu-  
crum caro terrestrium generi comparata concoctū  
facilior est, præsertim perdidis, atagenæ, columbæ  
& phasianorum, alæ anserum, magisq; gallinarum,  
& in summa præstant alæ laginatorū & iuniorum,  
pessimæ autem sunt gracilium & seniorū. iecur an-  
serum sero lactis laginatorum, itemq; testes gallorū  
similiter nutritorum facillimē concoquuntur. Car-  
nes suillæ cōcocti idoneæ sunt, in uigore ætatis cō-  
sistentibus & laborantibus porcorū uigorosorum,  
reliquis eorum qui adhuc crescunt. Vituli meliores  
concoctū sunt quam boues perfecti, & hœdi quam  
capræ. In uniuersum autem omnium adhuc auge-  
scendum caro facilior concoctū est quam decrescen-  
tium, & animalium in siccis locis degēdum facilius  
concoquitur quam aliorum. Nux regia magis con-  
coquitur quam auellana, bulbi bis cocti melius con-  
coquantur, oua tremētia & sorbilia, lactuca, intubi,  
malua, cucurbita cocta, si nō corrumpatur, uina dule-  
cia facilius quam austeria. Facilius autem cōcoctū est  
quicquid unicuiq; iucundum est.

Quæ ægrè concoquuntur.

Cap. cclv.

Caro caprina, bubula, ceruina, pessimē autem conco-  
quitur hircina, deinde arietina, postea taurina. pessi-  
ma est & seniorum animalium caro. sues quæ senes si-  
brofam & siccā, & propterea ægrè concoctilem  
f 3 carnem

carnem habent. Ventriculus agrè concoquitur, itè intestina, uulua, cor, iecur, aures, caudæ, renes, cerebrum, medulla spinalis, & perfectiorum animalium testes, anferes, exceptis alis, paluborum & sturnorum ac merularum & parviorum uolucrum caro durior est, atq; his magis turturis antiqui, & anatis, ægrius tamè adhuc cõcoquitur, & fibrosior his est paonis & odidi caro. uentriculi quoq; uolucrum omnium agrè concoquuntur, propter substantiæ durtitiam. falsò enim quidã laudant uentrem struthionis camelis ac mergi. Cochleæ item & lac acidũ, casus uetus, recens autè & maximè ex acido lacte melior est, purpurarum caro ac buccinorũ, aliorumq; testa intestinorũ duram carnè habentium. gammari, locustæ, cancri, paguri, squillæ, & omnia huiusmodi. polypi, sepia, & lolligines, & omnia mollia cutè prædita, raija, leuitaia, squatina, dracones, cuculi, callionymia, scorpij, trachuri, oua cocta, fricta, triditũ coctum, polenta, tiphia, auena, fabæ, dolichi, phaseli, cicercula, ciccer, oryza, lupini, panicũ, miliũ, & quæcunq; huiusmodi lens, sesamum, castanea, mala, poria nondum matura, ficus non matura, uua acidæ & austere, palmulæ omnes, filiquæ, ocymum, rapũ crudus, bulbi crudiores, pastinaca, daucus, carus, & omnes olerum radices, ipsaq; olera uniuersa, excepta lactuca & intubus. uina crassa & noua agrè concoquuntur, uerum multo magis concoctioni resistit aqua.

*Que stomacho commodant, cumq; roborant.*

Cap. cclvi.

Palmulæ austere, mala cydonia, oliuæ muria condite, aptiores tamen sunt aceto cõpositæ. uua passæ austere, uua in uinaceis reposita, nux regia hac parte aulana præstat, multoq; magis si cum caricis sumatur. gingidri scandici simile, est ualde stomacho cõmodum, tum crudũ, tum coctum comestũ: longiorè autem cocturã non sustinet: cidaria, sinapi, raphanus, rapum, nasturtiũ, asparagus palustris, chamaedaphnes, oxyacanthæ & bryoniæ, bulbus appetentiæ cibi excitat, itèq; capparisi sale condita, citrij pars externa corrobora stomachum medicamenti loco sumpta. Vinum austereum os uentris roborat itemq; uentrem ipsum præsertim calida intemperie affectum.

*Que stomacho incommoda sunt.*

Cap. cclvii.

Beta stomacho incõmoda est, adeò ut & morsum inducat si uberius comedatur, ocymum, rapũ crudius, blium, arripelx, si non cum aceto ac oleo & garo sumatur, scõmurgæcum stomachum febuerit, itemq; sesamum. Lac frigidum habentibus uentrem accepsit, calidum habentibus in nidore transit. Meridò itaq; nocium est febricitantibus, & si quis amplius cum melle sumat, uomitũ ciet. Pepon non probè concoctus, cholericus, id est bilem supernè ac infernè eijciens facere solet. Similiter & melopepon, omne cerebrum stomacho incõmodum est, & nauseosum, uelut etiam olisum medulla. Vinum nigrũ & austereum facile accescit, & uomitum concitat. Item crassum & nouum.

*Flatus expertia.*

Cap. cclviii.

Cuminum, ligusticum, uidicis semen, cannabis semen, fabæ frictæ, bulbi diutius atq; iterum cocti & ex oleo cum aceto comesti, mel quod in coctura omnem spumam deposuit, flatus discindunt panes ordeacei. Media porrò inter flatus expertia ac flatuosa, sunt pisces, phaseli, ochri, cicerculæ.

Flatuosa.

Cap. cclix.

Cicer, lupini, panicum, milium, & huiusmodi, fabæ, lobi siue dolichi, minus tamen fabis, maza ex polenta, succi omnes, præcipuè cyrenaicus, silphij succus ac radix, sicum flatus modico tempore duras, propterea quòd facile aluo subeant. quæ uero exactè maturæ sunt, propemodum nihil offendent, similiter ut caricæ, palmulæ uirides flatuosa sunt, rapum crudus, lac facile in uentre inflatur, bulbi crudiores, mel non perfectè coctum. uina dulcia flatum tarde transcutiunt generant, item dulcia simulq; austera, mustum itidè, hoc est uinum nouum.

*Que extergent, secant, obturatione liberant.*

Cap. cclx.

Pisana extergit, itemq; scõnogræcũ, melopepon, uua passæ dulces, fabæ, cicer, magisq; nigrum, capparisi satis tenuisum partium est, & extergit, & expurgat ac obturatione liberat, maximè ex aceto mulso aut ex oleo & aceto, præ reliquis omnibus cibis comestis: betæ succus extergit, & magis ubi cum sinapi & aceto comedatur. bulbi attenuatoriam uim habet & obturationes aperientem, cepæ, allia & porri attenuant & secant crassos ac uiscosos humores. serum quoq; lactis humorum crassitiem attenuat, ficus extergit, quapropter multa arnolia de renibus expurgant. Caricæ attenuant ac secant & renes expurgant. amygdalæ extergent & attenuant, purgantq; uiscera, & humorum per sputum reiectiones ex pectore ac pulmone expeditiores faciunt. pistacia robori ac sanitati iocineris conducunt, & ad purgationem humorum id obturatoriam iuxta exitus ipsius, raphanus attenuatoriam uim habet. Mel tenuissimarum partium est, maximè quod ex calidis ac siccis plantis natum est, quapropter etiã aqua multa ad sputorum educationem commodat. Acetum multum non penitus uiscosa ac crassa facile educit, & uiscera citra molestiam expurgat. Valde autè commodat his qui crassum humorem in pectore ac pulmone coaceruarunt. Vina tenuia ac uetera tũ acrimonia ad idem conferunt. At uero aquosum, hoc est albũ & tenuissimũ aptum est ad humorũ ex pulmone educatione, roboret enim & humores humectiores reddit ac moderatè scindit. Vinum dulce in morbis acutis rescitendis uiribus accõmodatum est, uelut in peripneumonia & pleuridde, concoctione morbi iam facta.

*Que obturant.*

Cap. cclxi.

Lac modicum seri habens, & multum de calco, nõ satis tius usus est, si quis in eius esu perseueret. Nam lædit renes, qui aliàs ad calculorum generationem aptiudinem habent, & iocineris obturationes facit his qui eas pati aliàs solent. Caricæ hepati ac spleni inflammationem ac iecur lædunt. Aqua multa incõmoda est his quibus uiscera indurata, aut laxo tumore occupata, aut inflammata in tumorem eleuata sunt. Palmulæ pingues obturant, & præsertim crudæ, omnia item liborum genera, & ex similagine præparata, obturant & splenem augent, & calculos in renibus generant. Similiter & triticea farina cũ lacte. Alia quoq; inepta his qui iecur obturationi obnoxium habent, & renes calculo generando aptos. Vinum dulce obturat, & uiscera auget siue inflat.

*Que tardi transitus sunt.*

Cap. cclxii.

Omnia liborum ac placentarum genera ex similagine facta

facta, trāstus tardī sunt, sabāe frictāe, panes puri, lens cordice deaſcto, cerebrum, medulla ſpinalis, ſecur, cor, triticum coctum, oua aſſata, fricta, lupini, phaeſi, piſa, ſeſamum, mala, pira nondum matura, ſili- quæ, uina dulcia, & magis auſterum & nigrum, ci- tra dulcorem. item omne craſſum ac nouum. Aqua autem adhuc tardius tranſit.

*Quæ faciliſe corrumpuntur.*

Cap. cclxiii.

Perſica, armeniaca, præcoda, & omnes ſubcaniculares fructus, qui humidum temperamentum habent, in uentriculo corrumpi ſolent, ubi non probè & citò aluum ſubierint. Omnia porò mali ſucci, humida autem & lubrica, ac faciliſe ſubire potentia, præ alijs edere oportet. Sic enim & ipſa citò ſubeunt, & alia deducunt. Si uero poſtremum accipiantur, etiā alia ſimul corrumpunt.

*Quæ diſſiculter corrumpuntur.*

Cap. cclxiiii.

Chamulæ paruæ, purpuræ, buccina, & quæcunq; teſta inteſta duram carnem habent, dantur corruptentibus cibum præ humorum uitiatione, ita ut bis aut ter aqua optima coquantur, ſemper in aliam puram ſeruentè tranſlata, ubi prior falſa reddita fuerit. Sed & gammari ac paguri cancriq; ac locuſtæ, & ſquillæ, & quæcunq; eius generis, carnem habent ægrè corruptibilem, ſimiliter ut teſta inteſta duræ carnis.

*Quæ uentrem ſubducunt.*

Cap. cclxv.

Lenticula, braſſica, ex marinis teſta inteſta, & cochleæ compoſitam naturam habent ex cōtrarijs facultati- bus. Ipſum enim ſolidū uiniſcuſq; corpus, tranſitus tardī eſt, & uentrem ſiſtit, uerū humiditas ad excretionem iritat. Si quis igitur lenticulā uel braſſi- cam, aut aliud quid ex prædictis coquat, deinde de coctū ipſum oleo & garo ac pipere condat, & poſtea cui ueliſe bibendum præbeat, palām conſpiciet ex ea poſione uentrem ſubduci. Sed & herinaceorum marinorum ac conchularū omnium, itemq; gallorū ueterum iuſcula uentrem ſubducūt. At uero ſi braſſicam aluū ſubducere uelimus, cacabo in quo cocta fuerit propè poſito ſtatim extractā, in oleum ac garū mitimus. Neq; enim ualde ipſam coquere oportet. Panes furfuracei uentrem ſubducunt. ſœnigræci ſuccus coctus cum melle acceptus, commodus eſt ad ſubducendum omnes uiſioſos humores in inteſtiniſ contentos, ſed modicum eſſe oportet mel quo am- miſcetur, ne morſum ſtomacho inſligat. Oliuæ falſæ ſubduciſt præ reliquis cibis comefæ. Lac quo liqui- dius eſt, eo magis ſubducit. craſſum, minus. Serum uero lactis ualde emollit uentrem. Inijciendū eſt ad ipſum mellis optimi tantum quantū ſatis eſt ad con- dendum ſolummodo, ne ſtomachus ſubvertatur. iuxta eandem rationem & ſalem indere oportet, ne guſtus offendatur. Animalium ualde iuuenū carnes fa- cilius aluo ſcedunt, ſimiliter & charſilaginei piſci cuius generis torpido & paſtinaca moderate ſcedunt. beza quoq; moderate ſubit, & recens caſeus cū mel- le, ariplex, cucurbita, pepones, melopepones, ficus, caricæ, uuæ paſſæ dulces, præſertim humida, mora ante reliquum cibum ſumpta, nux adhuc uiridis, ad excretionem cōmoda eſt. imò etiā ſicca, aqua præ- macerata, et pruna ſicca ſimiliter aqua, aut aqua mul- ſa præmacerata edantur. etenim plus mellis habentia uentrem multum molliſcūt, etiamſi quæ ſola ipſa comedat, ſed multò amplius ſi aquam muſſam inſu- per ſorbeat, uentris ſubductioni conferent, cæterum

à ſumptione talium, uinum dulce bibere oportet, & pauco tempore interiecto prandere. Porò mora, ceraſa præcoda, perſica et omnia humecta, & aquo- ſa, & in totum quæcunq; nullam fortem qualita- tem guſtū aut olfactū offerunt, ea mediæ quodam- modo facultatis inter ſubducētia ac ſupprimētia aluum exiſtunt. Mel ſolum non coctum ſi quis de- lingat, probè aluum ducit. aqua muſſa item parum aut omnino nihil cocta aluum ſubit. uinum dulce conferi ad uentris excretionem. Muſtum aluum ea molliſc ac ſubducit.

*Quæ uentrem ſupprimunt.*

Cap. cclxvi.

Palmulæ auſteræ, uuæ paſſæ auſteræ, mora rubi, pruna ſylueſtria, poma adſtringēdi ui prædita, pira, ma- la punica, ſimiliter gammari, paguri, cancri, locuſtæ, ſquillæ, & quæcunq; alia cuiusmodi molli teſta inteſtorum, minus quidem quā teſta inteſta uen- trem ſupprimunt. uerum habent etiā hæc ipſa ſal- ſum in ſe humorem, quem ubi in aquam depoſue- rint, uentrem ſiſtunt uelut oſtreorum & teſta inte- ſtorum caro. Lenticula item & braſſica bis coctæ uentrem ſiſtunt, & ubi humectam aluum ſiccare ue- limus, quū iam moderate cocta eſſe uidetur braſſi- ca, prima aqua diſſuſa, aliam calidam ſtaim aſſum- dimus, deinde ruriſ in illa ipſa coquimus, donec ſtaccida fiat. Oportet autem neq; ærem, neq; aquam frigidam attingere quod bis coquiſtur. nō enim am- plius exaſte ſtaccēſcit, etiamſi diuiſiſſime poſtea co- quatur. Cæterum lenticula decorticata fortè adſtri- ctoria uim perdit, & non ſimiliter ſiccāt uentris hu- miditates. Si tamen ipſam bis coquas, prioremq; a- quam diſſundas, deinde parum ſalis aut garī addas, & aliquid ex ſiſtentibus uentrē immitas, ita ut gu- ſtus non lædatur, iucundiſſimum ſimulq; utiliſſimū pharmacum ſimulq; edulium efficiet. Polenta ex uino auſtero poſta uentrem ſiccāt, oryza ſiſtit, pani- cum item & milium, carnes leporinæ, uinum auſte- rum, & nigrum citra dulcedinem, & album ac au- ſterum, & fuluum ac auſterum.

*Quæ caſciunt.*

Cap. cclxvii.

Triticum coctum, & panes ex illis, tipha, auena, ſœno- græcum, palmulæ dulces, mala dulcia moderate, ſe- ſamum, uuæ dulces, quapropter & ſiſim inducunt, uuæ paſſæ dulces magis mediocriter, apium, ſmyr- nium, eruca, raphanus, rapum, ſinapi, naſturtium, pyrethrum, paſtinaca, caros, allium, cæpa, porrum, caſeus uetus, uinum dulce, moderate calidum eſt, & propterea ſiſim inducit. Fuluum uero calidius eſt nigrum, ſtaum calidiſſimum eſt extremè, deinde ful- uum, deinde ruſum, poſtea dulce, poſtremo album omnium minimè caſcific. Vinum uetuſtiſſimum multum calidum exiſtit.

*Quæ frigefaciunt.*

Cap. cclxviii.

Ordeum iuxta omnes utendi modos, milium, panicū, tubera, cucurbita cocta, pepones, melopepones, cu- cumeres, pruna, mora, uuæ auſteræ & acidæ, uuæ paſſæ auſteræ, mala adſtringētia, & acidā ac tenerio- ra, & pira cuiusmodi, et mala punica adſtringētia, pal- mulæ frigidū ſuccum habent, lactuca, intuba medio- crius, portulaca, papaueris ſemen, aqua, uinū aquo- ſum non manifeſtè caſcific, ideo etiā febrientibus ci- tra periculum datur. uinū album & auſterū minimè ut uinum caſcific. uinum uero album ſimulq; auſte- rum, & craſſum ac nouū ſenſibiliter frigefacit. frige-



facit autem & acetum. nam tenuiſſ parduū exiſtit. quapropter neruoſ ampliuſ quā alia frigefaciētia lādit. Media porrō quodammodo inter caſſaciētia ac frigefaciētia ſunt, panes lod, amyli, uae uiuofae.

Quae ſiccant.

Cap. cclxix.

Lenticula, braſica, polenta, uitiſ ſemen, eruū biſ coctum & aqua ſapiuſ edulcatum, praefat autem album, ſed & aſſatum aut friſtum ſiccioſ alimentum corpori praebet, item quod ſimpliſter garum & uinum habet, ſiccioſ eſt non habet. maxima autem eſt differentia & ſeminum, & olerum, & plantarum omnium pluſ aut minuſ ſiccantium, iuxta eorū quae ipſiſ adijciuntur uires.

Quae humectant.

Cap. cclxx.

Puſſana, cucurbita cocta, pepones, melopepones, cucur

bitae, nuceſ uirideſ, pruna, mora, ſycomora, laſtueae, intuba, malua uero & bliu ac attriſplex aquoſiſſima olera ſunt. ſabe uirideſ humectat, et cicer. aqua calida humectat & caſſicit, frigida humectat & frigefacit.

Quae caput laedunt.

Cap. cclxxi.

Palmulae omneſ, eruca, ſcenuſ mgregum, mora rubi, uinum quoque ſulluum capitiſ doloſem inducit, & mentem teniat magiſ quā nigrum. Auſterum etiam & odoratum caput teniat, aquoſum uero neq; capitiſ doloſem inducit, neque neruoſ lādit. Vinum autem modicum aquae mixturam ſereſ, capitiſ doloſem ex humoribuſ in uentre ortum ſedat. lac non eſt commodū capiti, niſi quiſ ualde forē ipſum habeat. cremor uuarum, quem ſecem dicunt, doloſ capitiſ inducit. item uua ipſa in uinaceiſ reſoſita.

## AETII TETRABIBLI PRIMAE, SERMONIS SECVNDI, FINIS.

# INDEX EORVM QVAE IN

## TERTIO SERMONE AETII CONTINENTVR.

\*

- |  |               |  |               |  |                |
|--|---------------|--|---------------|--|----------------|
| De friſtione preparatiua.                      | cap. i.       | Elaterium.   | cap. xxxviii. | Abſinthiatum ſlauam bilem ducenſ.                                | cap. lxx.      |
| De exercitacionibuſ.                           | cap. ii.      | Granum cnidum.   | cap. xxxix.   |  |                |
| De exercitacionum ſpeciebuſ.                   | cap. iii.     | Agaricum.  | cap. xl.      | Abſinthiatū ad pituitoſoſ.                                       | cap. lxxxi.    |
| De uociſtatione.                               | cap. iiii.    | Cnici ſemen.   | cap. xli.     | Roſatiū ſlauā bilem ducenſ.                                      | cap. lxxxi.    |
| De geſtatione.                                 | cap. v.       | Lathyris.  | cap. xlii.    | Roſatum pituitam, & ſeroſum ac atrae bilis humorē euacuans.      | ca. lxxxiii.   |
| De equitatione.                                | cap. vi.      | Ariſtoloſchia clematidiſ ſemen.                        | cap. xliiii.  | Melliſ roſacei purgatoriſ preparatio.                            | cap. lxxxiiii. |
| De re Venerea.                                 | cap. vii.     |  |               |  |                |
| De inſolatione.                                | cap. viii.    | Mercurialiſ.   | cap. xlv.     | Aceti purgatoriſ preparatio.                                     | cap. lxxxv.    |
| De uene ſectiōe.                               | cap. ix.      | Cucumiſ ſylueſtriſ.                                    | cap. xlii.    |  |                |
| De euacuacioniſ meſura.                        | cap. x.       | Styrax.  | cap. xlvii.   | Aceti muſſi purgatoriſ preparatio.                               | cap. lxxxvi.   |
| Qualeſ uena ſecande.                           | cap. xi.      | Thymuſ.  | cap. xlix.    | Acetum muſſum purgans omneſ uitaſ toſ humoreſ.                   | cap. lxxxvii.  |
| Quomodo uena ſecanda eſt.                      | cap. xii.     | Cyclaminuſ.  | cap. l.       | Acetum muſſum quod coliciſ ac ne phriticiſ per ſedem inſunditur. | cap. lxxxviii. |
| De magnitudine ſectiōiſ.                       | cap. xiii.    | Scordium.  | cap. li.      |  |                |
| De figura ſectiōiſ.                            | cap. xiiii.   | Chamepityſ.  | cap. lii.     | Acetum muſſum amarū.   | cap. lxxxix.   |
| Quod ſit oportunum tēpuſ.                      | cap. xv.      | Bdellium.  | cap. liii.    | Poſca uentreſm molliēſ.  | cap. lxxx.     |
| De repetita detractiōe.                        | cap. xvi.     | Aquam ducentia.  | cap. liii.    | Alia poſca ualde clara.  | cap. lxxxxi.   |
| De arteriarum ſectiōe.                         | cap. xvii.    | Squama eris.   | cap. liii.    | Gari purgatoriſ preparatio.                                      | cap. lxxxii.   |
| De medicamentum ſitiēſ ſanguinem arteriarum.   | cap. xviii.   | Euphorbium.  | cap. liii.    | Melliſ emollientiſ preparatio.                                   | cap. lxxxiii.  |
|  |               | Chameleae.   | cap. l.       |  |                |
| De curcubimorum uſu.                           | cap. xix.     | Sanguinem purgantia.                                   | cap. li.      | Garum aquoſum.   | cap. lxxxiiii. |
| De ſcarificatione.                             | cap. xx.      | Methoduſ componendi purgatiua phar= maca.              | cap. lvi.     | Garum uinoſum purgatorium.                                       | cap. lxxxv.    |
| De ſanguigugis.                                | cap. xxi.     |  | cap. lvii.    |  |                |
| De purgatione.                                 | cap. xxii.    | Vini purgantiaſ bilem preparatio.                      | cap. lviii.   | Garum acetoſum purgatorium.                                      | cap. lxxxvi.   |
| Bilem ſlauam purgantia.                        | cap. xxiii.   |  |               | Iuſcula emollientia.   | cap. lxxxvii.  |
| Scammonia.                                     | cap. xxiiii.  | Vinum pituitam ducenſ.                                 | cap. lix.     | Lac purgatorium.   | cap. lxxxviii. |
| Peplum.  | cap. xxv.     | Vinū melancholicis cōmodum.                            | cap. lx.      | Oliu purgatorie.   | cap. lxxxix.   |
| Veratrum nigrum.                               | cap. xxvi.    | Vinum polypoditeſ.                                     | cap. lxi.     | Oxyportia purgatoria.  | cap. xc.       |
| Bilem atram purgantia.                         | cap. xxvii.   | Vinū muſſum ſtercuſ exigēſ.                            | ca. lxii.     | Oxyportium ex palmuliſ.  | cap. xci.      |
| Epithymum.                                     | cap. xxviii.  | Vinum muſſum ſlauam bilem ducenſ.                      | cap. lxiii.   | Purgatorium ex cotoneiſ maliſ.                                   | cap. xcii.     |
| Polypodium.                                    | cap. xxix.    |  |               | Purgatorium ex citrio.   | cap. xciii.    |
| Pulegiam, tragoriganum, leucanthemon, alyſſon. | cap. xxx.     | Vinum muſſum pituitam ducenſ.                          | cap. lxiiii.  | Purgatorium ex ſaniculo.   | ca. xciiii.    |
| Armenium.                                      | cap. xxxi.    | Vinum muſſum atram bilem euacuans.                     | cap. lxv.     | Aliud ualde ſtomacho gratū.                                      | ca. xc.        |
| Centaurium minuſ.                              | cap. xxxii.   | Conditum ad ſlauam bilem.                              | cap. lxvi.    |  |                |
| Pituitam ducentia.                             | cap. xxxiii.  | Conditum pituitoſiſ.                                   | cap. lxvii.   |  |                |
| Colocynthis.                                   | cap. xxxiiii. | Conditum melancholicis.                                | ca. lxviii.   |  |                |
| Tibthymaluſ.                                   | cap. xxxv.    | Abſinthiatū preparatio ſtatuſ & ſterco= cora euacuans. | cap. lxix.    |  |                |
| Iſium.   | cap. xxxvi.   |  |               |  |                |

Purgatorium ex foeniculo quod parari solet ad atram bilem. cap. xcvi.  
 Purgatorium atræ bilis. cap. xcviij.  
 Aliud purgans atram ac flauam bilem cap. xcviij.  
 Pastillum flauam bilem purgans. cap. xcix.  
 Buccella purgatoria. cap. c.  
 Aloëdaria citra modestiam purgantia. cap. ci.  
 Pharmacum pituitam ducens. cap. cii.  
 Purgatorium atræ bilis. cap. ciii.  
 Bilis & pituitæ, & atræ bilis ac reliquorum humorum commune purgatorium. cap. ciiiij.  
 Aloëdaria emollientia ex rosaceo melle. cap. cv.  
 Aloëdarium ex Philagrjo. cap. cvi.  
 Aloëdarium Oribasij. cap. cvij.  
 Sal purgatorium. cap. cvijij.  
 Purgatorium pituitam ducens. cap. cix.  
 Purgatorium aquam ducens. cap. cx.  
 De hieris. cap. cxij.  
 Purgatorium citra molestiam purgans. cap. cxij.  
 Hiera Galeni. cap. cxijij.  
 Hiera Archigenis. cap. cxijij.  
 Hiera Ruffi. cap. cxv.  
 Hiera Iustij. cap. cxvi.  
 Quomodo auxiliari oportet his qui pharmacum biberunt, & non purgantur. cap. cxvii.  
 Cura excessus purgationis. cap. cxviiij.  
 De uomitu. cap. cxix.  
 Preparatio raphanorum cum ueratro albo. cap. cxx.  
 Quibus dandum sit ueratrū. cap. cxxi.  
 Quid ueratrū facere possit. cap. cxxii.  
 Quod multi accepto ueratro nihil quidem uomuerunt, nihil tamen minus quam purgati utilitatem perceperunt. cap. cxxiii.  
 Qui sint apti ad ueratrū. cap. cxxiiii.  
 Tempora uniuersalia ac particularia ad sumendum ueratrū apti. cap. cxxv.

Veratri probati nota. cap. cxxvi.  
 Victus ratio ueratro purgandorum. cap. cxxvii.  
 Differentiæ exhibitionis ueratri. cap. cxxviii.  
 De cremore ueratri. cap. cxxix.  
 De ueratri decocto. cap. cxxx.  
 De ramentis ueratri, item de confuso ac cribrato. cap. cxxxi.  
 Que preparare oportet exhibitionis tempore. cap. cxxxii.  
 Quomodo post potum curandi sint. cap. cxxxiii.  
 De purgationis excessu. cap. cxxxiiii.  
 Epithemata purgatoria. cap. cxxxv.  
 Compositio olei siue ugenti purgatorio. cap. cxxxvi.  
 De localibus euacuationibus. cap. cxxxvii.  
 Que oculis purgant & lacrymas prouocant. cap. cxxxviii.  
 Que aures purgant. cap. cxxxix.  
 Que per nares purgant. cap. cxli.  
 Que humiditatem ex ore trahunt. cap. cxli.  
 Que lac generant ac mouent. cap. cxlii.  
 Pulmonem ac pectus purgantia. cap. cxliij.  
 De suffitionibus. cap. cxliiij.  
 Que tenuia intestina euacuant. cap. cxlv.  
 Que sinu hepatis purgant. cap. cxlvi.  
 Que gibba hepatis purgant. cap. cxlvij.  
 Splenem euacuantia. cap. cxlviii.  
 Rhenes purgantia. cap. cxlix.  
 Vesicam purgantia. cap. cl.  
 Que glandi indantur ad urinas prolestandas. cap. cli.  
 Lapides in renibus ac uescica euacuantia. cap. clii.  
 Vterum euacuantia. cap. cliiij.  
 Que in potu sumpta menses ducunt.

cap. cliiij.  
 Que sterora euacuant. cap. clv.  
 Lumbricos eductia. cap. clvi.  
 Sudores excludentia. cap. clvij.  
 Que euacuant ac corrumpunt pediculus omnis generis circa superficiem corporis. cap. clviii.  
 De infusionibus sedis. cap. clix.  
 De glandibus. cap. clx.  
 De tomentis siue floccis. cap. clxi.  
 De ære. cap. clxii.  
 De uentis. cap. clxiiij.  
 De accessione ac significatione stellarum. cap. clxiii.  
 De aquis. cap. clxv.  
 De balneis. cap. clxvi.  
 De balneis naturalibus. cap. clxvii.  
 De frigide lotionē. cap. clxviii.  
 De infessu solij ex oleo. cap. clxix.  
 De spongie usu. cap. clxx.  
 De aspersionibus. cap. clxxi.  
 De irrigationibus. cap. clxxii.  
 De infessionibus. cap. clxxiii.  
 De humectationibus. cap. clxxiiii.  
 De fomentis, persusione, cataplasmatibus, ac cucurbitis. cap. clxxv.  
 De cataplasmate ex fermento. cap. clxxvi.  
 De cataplasmate ex pane. cap. clxxvii.  
 De cataplasmate ex fursuribus. cap. clxxviii.  
 De cataplasmate ex ficibus. cap. clxxix.  
 De dropac apicatione. cap. clxxx.  
 De sinapismo. cap. clxxxij.  
 Quod caprarum fini pilule cum aceto impositæ, priuatim cox edicunt morbo conueniunt. cap. clxxxij.  
 Que sint alia rubificantia. cap. clxxxiiij.  
 De iberide, siue cardamine, que etiam lepidū uocatur. cap. clxxxiiij.  
 De euocantibus ex alto auxilijs. cap. clxxxv.

## AETII MEDICI GRAE CI CONTRACTAE ME

DICINAE TETRABILI PRIMAE  
 SERMO TERTIVS.

De his quæ per chyliterem infunduntur, euacuantur, & exhibentur. Et de ære, uentis, locis, aquis, rubificationibus, sinapismo, ac similibus.

DE FRICTIONE PRAEPARATIUA. Cap. i.



in molem eleuetur.

N T E exercitacionem corpus calfacere oportet, frictionis tum per lineam, tum per oleum, usui, fricandūq; est corpus nudis manibus donec probe calefcat, & molliatur, ruborq; floridus efflorescat, & conficta particula

De exercitacionibus. Cap. ii.  
 Exercitatio est motus uehemens. Vehementia autem terminus est respirationis alteratio ad celeritatem ac densitatem. Exercitatio ipsa partes instrumentales preparat, ut non facile affectionibus imperantur, & ad actiones obeundas robustiores reddit, & alimentum attractionem fortiore, & nutritionem meliorem, propter excitatum calorem facit. Sed & sensibiles itemq; obscuros meatus propter fortē spiritus motum

rum expurgat. Quandoquidem igitur distributioni alimentis opitulatur, oportet sanè neq; humoru crudorum, neq; ciborum inconcoctorum copiam, neq; in ventre, neque in intestinis contineri: periculum est enim ne ad omnes animalis partes deducantur antequam probe concoquantur. Manifestum igitur est etiam ante cibos exercitari corpora oportere. Oportunitatis nota ex bonitate coloris urinaru sumitur. Aquosa enim urina, humorem ex ventre in corpus digestum ac distributum, incoctum esse significat. Fulsua vero & biliosa iamdurum perfectam concoctionem notat. At uero moderate pallida, signu est concoctionis nuper facte. Tunc itaq; ad exercitia procedendum est, uentris ac uescicæ excremento prius deposito.

De exercitationum speciebus. Cap. III.

Cōmune est omnibus exercitationibus, calor is innati corporibus augmentu. Cæterum singulari robur ista exercitatio, hoc est, uolentia, musculos ac nervos ualidiores reddit. Tales sunt, fodere, onus maximu leuare, & aut in loco permanere, aut paululum progredi & uelut deambulare. Huius generis est & perfunem manibus apprehensum repere ac ascendere, & plurima alia eiuscemodi. At uero ueloces exercitationes, citra contentionem & uolentiam, cursus sunt, & summorum manuum luctus ac exercitia, & parua pila. Cæterum robustis exercitationibus uelut ueterinibus uti quis potest, si celeres motus addat. Insuper exercitoru aliqua lumbos aut manus aut crura magis exercent, aliqua spinam, aut pectus, aut pulmonem solum. Exerendum est autem donec corpus in molem eleuetur, & floridu euadat, motusq; expediti ac æquales & ualidi existant. In hoc autem corpore etiam sudorem conspicias calidum uapore permixtum. Cessandum uero tunc primum ubi quid ex prædictis fuerit alteratum, uelut si corporis moles contrahi uideatur, statim quiescendum est. Similiter etiam si coloris floriditas contabescat. Quin & si motuum uigor remitti uideatur, statim cessandū est, & si circa sudorem mutatio aliqua apparuerit iuxta multitudinem sue qualitatem. Si enim paucior aut frigidiore prodeat, euertigis desinendum est, oleumq; affundendum, indeq; corpus recurandum, moxq; frictione recuratoria, quæ post exercitationem adhiberi solet, utendum quemadmodum prædiximus in usu habent.

De frictionum speciebus. Cap. IIII.

Frictio dura corpora contrahit, mollis soluit. Quare quæ supra modum exoluta sunt corpora, frictione dura, quæ contrahit, adstricta, molli fricanda sunt. Si uero æqualiter habeant, palmæ est quod neq; mollior neq; durè, sed quantum eius fieri potest, utroq; ex-cellu uitato. Frictio multa gracilitatem inducit, pauca uice uersa, media mediocritatem.

De uociferatione. Cap. V.

Vociferatio exercitatio est pectoris & uocalium instrumentorum, insuperq; calor is naturalis purgans, attenuans ac roborans, & corporis partes solidas & robustas reddens, ut non facile affectionibus impetantur. Utendum est uociferatione in anhelosis, & recta ceruicæ spirantibus, tabidisq; ac doloribus diuturnis pectoris ac dorsi, & in pectoris abscessibus post rupturam, & ad rauicam uocem ex plurima humiditate factam, & in febribus quarantis. Nam concretum humorem conuenientissimè excutit, &

stomachi humiditatem, quam priuatim quartana febris inducere solet, expellit. Conuenit etiam stomachicis præsertim assidue uociferari, & acidum rusticum. At uero capitis affectionibus incommensurabilis uociferatio existit. Cæterum qui uociferatione usus est, alio prius exonerata, & infernis paribus cōstrictis, lotaq; facie placide persusa, & ubi mox à somno fe moderate loquedo & deambulando præparauerit, ita tandem ad uociferationem progredi. In ipsa autem uociferatione continitas, & uocis bonitas, ac iucunditas, nihil contulerint ad sanitatem. Verum grauiorum uocum sonus utilis existit, quare in hoc se exercere oportet. Sic enim plurimus aer in respiratione attractus, peccatus diffidit, & alium ac totius corporis meatus dilatat ac disperat, unde in uociferationibus, & concitatis lectionibus redundantium humorum excretiones contingunt, & his quidē qui concitatus legunt, magis & per sudores, qui uero mitis uocem intendunt, per ocula transpirationem. Nam tota corporis moles in lectionibus ac uociferationibus intenditur. Contingit item propter attenuacionem ex motu factam, multa sputa resoluta, mucumq; ac pituitam excerni. Porro his qui propter frigiditatem, caliditate opus habent, quoddam commodius auxilium afferri quæquam actio per respirationem. Oportet itaque sæpe legere, & uniuersum corpus relaxare, sicut carne, ad corporis rarefactionem, asperam arteriam, & alios spiritus exitus commode distendere, & grauisimas uoces concinne sonare. Utentiu autem uocis actionibus neque temere, neque inconsiderate, sed neque prauis ac corruptis humoribus corpore repleto, neque in magnis ac manifestis cruciatibus, ad uocis exercitium progrediendum, ne amplior distributio corruptorum humorum aut uaporum in corpus fiat.

De gestatione. Cap. VI.

Reliquæ quidem exercitationes in motu corporis factæ sunt, gestatio uero mixta est ex motu & dispositione quieti simili, quum plurimè corporis partes quiescere uideantur, uniuersum uero gestationis tractu moueatur. Atque hinc adeo uulgarissima simulq; lenissima exercitatio est gestatio, ut quæ neq; lassitudinē corporibus inducat, ipsaq; cōsimiliter uelut magna exercitia moueat. Omnis autem gestatio insitum calorem uenulare & exdare potest, & materiam multitudinem dispergere, habitumq; corroborare, & actiones stupidas suscitare. Differetia gestationis multæ sunt, uerum peculiare hæc sunt. Prima quidem in lecto, eoq; aut pensili, aut fulcrâ mobilia iuxta angulares pedes habente. Altera in lectica, quæ & ipsa duplex est, ita ut qui gestatur uel desicent uel decumbant. Tertia in curru. Quarta in nauigio. Ponenda etiam equitatio est inter gestationis partes. Itaq; gestatione in lecto utendum in febricitantibus, aut diuturno morbo decumbentibus, in quo corpora contumpta se erigere non ita ualent. Item in his qui uires recolligere à febrili afflictione tam incipiunt, & in his qui ueritatem sumperunt. Utendum & phreneticis. Nam spiritus perturbacionē placide lenit, & ad somnum illucit. Utendum & in lethargicis, & appetentia ciboru delecta. At uero in lectica siue ferulo decumbentes gestamus, febrile lethargica aut semiteritiana, aut quotidiana correptos. Item hydropicos, si uaporē

pore attonito percussos, resolutos, nephriticos, podagricos. Desidentes autem in lectica gestatos, eos in quibus febris exacte remissi. Cæterum gestatio in curru cõussorium quiddam habet, & diurnos morbos commouet. Est autem & in hac alia uehementior, alia mior. Miores itaq; utendū in capitis affectionibus, & his quibus intestina fluxione laborant. Vehementior, in affectionibus pectoris ac stomachi, & in tumoribus laxis, hydropticisq; ac stupore attonito percussis. Verum uertiginosos & dimidia capitis parte affectos, auersos ab iunere rerorum de fidere in curru oportet, eosq; leniter mouere. Etiam multos nouimus hoc modo curatos, qui nullo alio auxilio indiguerunt. Sed tamen sedem aliquato superiorē ipsis esse oportet. Porro gestatio in nauigio si iuxta terram fiat, & in mari tranquillo, hydroptici conueniunt, & elephantiasi laborantibus, syderatis, tumidis. Et stomachum quidem ab initio subuerit, paulo autem postea in adfuetudinem uenit. Verum gestatio per pelagus uehementissima est, & mutationes plurimas ac maximas facit. Nimirum quō animi mixtos affectus habeat, ex tristitia, & spe, timoreq; ac periculo, modò gaudentibus & lætis, modò in agone existentibus nauigantibus. Omnia autem hæc composita sufficientem uim habent omnem uerem morbum exigendi & è corpore excludendi. Quin & mixtura ex quiete ac motu corporis, si quid aliud, probè corpus nutrit.

## De equitatione.

Cap. vii.

Equitatio nis usus modicus est in ægrotis: neque enim multam utilitatem opus ipsum præbet. Nam si leniter impellatur equus, nihil aliud quam lassitudinem facit, maximè inguinum, iuxta crurum explicationem ac dependentiam. Si uero agitur equus, uniuersum corpus dolorose concutitur. Et tamen etiam hic motus aliquid utilitatis habet in ualētibz. Suprà enim alia exercitia, & spiritus & corpus, & maximè stomachum firmat, sensusq; purgat & acutior res reddit. Verum pectori pessimum est hoc exercitium. Cæterum in omni gestatione omniq; exercitatione, curandum est maximè, ut in salubri loco fiat, & in aëre puro, nec solum de alijs exercitijs hoc accipiendum est, sed etiam de nauigatione.

## De re uenerca. Ex Rus.

Cap. viii.

Naturalis opus coitus est, nullū autem ex naturalibus operibus nudum est. Verum iuxta immo dicū & assiduū usum, itemq; iuxta tēpus non conueniens assumptus, noxius euadit. Multo autem magis nocuus fit assiduus usus, his qui neruos, aut pectus, aut renes, aut lumbos, coxendicesq; ac pedes, imbecilles habet. Cuius rei coniecturam hinc facere licet, quod omne hominis robur in coitus usu debilius redditur. Robur autem, est insus in nobis calor. Vnde sanè concoctiones coeuntibus non integrè contingūt, & pallidi fiunt, & neq; exactè uident, neq; ut oportet audiūt, neq; alios sensus integros possident. Quin & obliuiosi tales & tremuli existūt, & articulis maximè coxendicū dolent, & alij ex ipsis renem, alij uelica morbos incurrunt. Quibusdam etiam oris graueolentia, & dentium dolores, & gurgulionum inflammationes oboriscunt. Et uisū sunt iam uiri multi qui ex multa uenere sanguinem expuerunt, partim ob uiolentam spiritus compressionem ac intentionem, partim ob uenarum ac arteriarum quæ ex pul-

mone ad testiculos deferuntur communionem. Cæterum scēma ex coitu sanguinem non spuit, cum propter reliquam corporis humiditatem, tum quod in mixtione minus laboris perfert. imò etiā propter confusas infernas purgationes, quare si contingat etiam scēminam spuer sanguinem, magnam ex purgationibus medelam acquirit. Itaq; propter iam reatas causas medici boni iubent uenere abstinere, siue adsit quis ex prædictis morbis, siue timeatur, ob naturalem corporis debilitatem, atq; hætenus quidem offensiones & consensus coitus, quantū uires nostræ tulerunt, paucis retulimus. Restat ut etiā utilitates recensamus, neque enim penitus inutiles & omnibus nociuæ res uenercæ existunt, si & usus, & tempus, & modum, & sanā utentis constitutionem inspicere uelis. Utilitates ex coitu hæ sunt: Repletionem euacuare, & leuius reddere uniuersum corpus, idēq; ad augmentum promouere, & uiribus efficere. Duris habitudinibus ex longioribus interuallis usus eius cōmodat: mollit enim organa, & meatus dilatat, & pituitam expurgat, & impeditam rationis uim explicat, & maximas iras remittit. Quapropter et auralis percitis, subristibusq; & hominum confortia sugientibus, uelut magna quædam medela, cōmodissimus existit: sed et iuxta aliū modum furiosos, ac saniores mentem reducit, & quosdā comitali morbo præhenso sanat, & capitis grauitatem ac dolore ad uigorem ac integritatem permutat. Hippocrates summam morbis à pituita rem uenercā optimam esse pronunciauit. Multi quoq; ex morbis alimentū non sentientes, ex usu ipsarum refecti sunt, alij bene spirantes ex ægrè spirantibus euaserunt, alij ibos auersantes, appetentiam edēdi assequuti sunt, quidam à frequentibus feminis per somnum effusio nis liberati sunt. Naturæ ad uenerem apposita sunt calidiores & humidiores. nā eius usum plus quā m altæ ferre possunt: minime autem sicca & frigida. Est & uigētum natura ad eam accōmoda, senum uero nequaquam. Ex temporibus uir aptum est, ineptus autumnus & æstas, sed neq; hyems cōmoda est propter frigiditatem. Et sanè diæta quoq; calidior & humidior ad coitum idonea est, contrā sicca & frigida, ciens inutiles. Humidæ enim diætæ etiam impotenti ad coeundum cōmodant. Oportet igitur humidum & calidum esse uictum, qui accedere debet labor modicus, & cibus boni succi. Vinum itaq; fit colore fuluum, substantia tenue, panes puri furnacci recentiores, carnes hedorum, agnorum, & porcorū. Ex uolucris gallinæ, attagenæ, perdices, anseres, anates. Ex piscibus polypti, & molli carne præditi. Oleum hominum, irio, eruca, rapum his coitū & flaccidū faciūt, hæc enim medicamentū loco exhibentur. Leguminum fabæ, cicor, ochri, phaselis, pisa, dolichis. nā & flatu corpus implent, & luculenter alunt. Magnopere etiam optimam uiam laudo, quod ad hanc uictus rationem atinet: humectat enim & sanguinem a spiritu corpus replet. Cæterum qui uenere uiri uolet, recentes repletiones uitabit, cruditates item ac ebrietates, similiterq; famem. Malum est enim repleto corpore coire, item à gymnasijs & à balneis. Vitandæ lassitudines, & pregressi uomitus, & alui profluvia recentia. nam inueterata aliquando per uenerē rescit. Commodissimum coeundi tempus est à cibo non nimium ingesto, nam & ad robur conducit, & frigida

frigiditates euenire solitæ minus sunt. Et si quidem à prandio quis ad uenerem incitetur, quiescere oportet donec cibus desideret. Si uero à cœna, necesse est paululum antea dormire. Porro uehementes impetus ac cupiditates ad uenerem non probro, sed eis resistere suadeo, præsertim si cui morbus sit qui ex uenere facile offensum percepit.

De insolatione, & arene aggestione, ac alijs uaporatorijs sementis. Ex Aetio. Cap. ix.

Quidam se ad solem exponunt, parum non uncti, alij etiam uncti, & alij desidentes, aut decumbentes, alij stantes & deambulantes aut currentes. Alij decumbentibus aliqui in strato, aliqui super corio, alij in arena, aut sale decumbunt. Solaris itaq; inusitio citra unctionem, moderate adhibita, perspiratione occultam auget, & sudores elicit, aluum autem sistit, et carnem conseruat, pinguitudine uero abolet, & tumores laxos cit alios, tum maxime hydropicorum deprimit. Spiritum autem dësioiem ac uelociorem reddit, & propterea anhelos & recta ceruice spirantes exacerbat. uerum capiti diuturna frigiditate laborati commodat. nam & firmum & eggritudinis minus obnoxium efficit. Oportet tamen in his aluum præuacquare. Inimica est enim insolatio capiti, euacuatione infernè nō præmissa. At uero insolario cum unctio ne, eadem similiter potest. Verum corpus magis siccatur, uelut unguine assatum, quapropter & superficiei magis denigrat. Cæterum per oculum trāspiratio nem hæc minus discuit, nimirum ad cauterij similitudinem densans carnē. Qui uero desidentes aut stantes insolantur, uehementius quàm deambulantes & magis quàm currentes inuruntur. Decumbentes autem in strato, non magnopere uiuantur, sed capite magis replentur. Qui super corio se soli exponunt, magnam utilitatem consequuntur, præsertim hydropticis & ischiadicis, nephriticis, resolutis, elephantiasiborantes, intumescētes circa resectionem, coeliaci, & qui circa uentrici ueterem morbum habent; itemq; syderati, sceminae quoq; quæ ab utero strangulantur, & adhuc amplius quæ alba uteri fluxione infestantur. Oportet autem magnū esse corium, & oleo perunctum, & super tenuem arenā cribratam extētum, & ubi præcastrū est corium, tum demum ægrum super id decumbere, capite cum crudo lineo uelato. Permanentem autem est diutius in eadē decubitus si gura, & postquā corpus multum fuerit seruēfactū, uertere iubendū ac deuoluendū, & postea rursus in alterum latus reuoluendū, ac quiescendū, atq; hoc ipsum sæpius facere oportet. Idem modus etiā in arena adhibetur, loco assiduè permutato. oportet autē ministrum adesse, qui calētissimam arenā colligat, & corpori desolati ac obruti superingerat. Si quidē igitur mare affuerit, utendū est eius arena. Nā & leuior & magis reficābus huius arene fomentatio ac feruor est, quàm eius quæ per corium cōtingit. Si uero fluuiatilis arena fuerit, præstat corio uti. Nā & arena fluuiatilis, & aer humidior est ex euaporationibus. Quod si salis copia adsit, multo præstabilis est tenui sale substrato hominē decumbere. Oportet autē altitudinē esse non minorē tribus palmis paruis; si enim nō fuerit altus sal, caliditas ipsius faciliè diffilatur, utpote quæ ex alto emeritum ac progressū non habeat.

De uenæ sectione. Ex Galeno.

Cap. x.

A similibus corporis partibus primas actiones per-

fici, alibi demonstratum est, itemq; per instrumētales, secundas. Itaq; humores in corpore contenti cōsiderandi sunt, quam tandem utilitatē aut cladē partibus afferant, per quas corpus actiones suas facit. At uero plenitudo colligi dupliciter dicitur. Aut enim uiriū respectu plenitudinē dicimus, aut respectu capacitatis uasorū humores continentiu. Quæadmodū enim is qui onus gestat, nō statim ut grauiatur & laborat, iam etiam concidit & uincitur ab ipso onere. Iuxta eundē modū ubi uires à plenitudine grauantur, possibile est ipsas diu resistere, & nondū hominē ægrotare. ubi uero quis diutius negligatur, uires cōcidit. His itaq; magnopere prodest uenæ sectio priusquā uires uincantur. Sed & plenitudine ac copia sanguinis in corpore non existentē, uenæ sectio uilis sit, inflammatione incipiente ob prægressam plagam, aut ob partikulæ debilitatē, humoribus ex corpore acruatim in ipsam congregatis. Aliquando enim sanguis acruatim ad particulam quandā irruens, aut suprafacit eam, ut actio ipsius corrumpatur, aut memorabilem cladē inducit, uelut in syderationibus contingere uidemus: quādoq; uero etiā ipsum uas perurum pit, uelut in sanguinis sputo cōtingit. Conandū itaq; est ut redundantē sanguinem euacuemus quā cōtissimē, priusquā magnum aliquod malum circa aliquam corporis partē operetur. Quin & magni alius cuius morbi timore uenam secamus. Atq; ego sæpe multos podagricos annis tribus aut quatuor infestatos ex intervalis, aut purgato redundantē humore in principio ueris, aut sanguine detractō curauī. nā & podagricis et arthriticis, comitalibusq; ac arabilioris morbis, item sanguinē spuētibz, uertiginosis, & his qui frequenter angina arripiuntur, peripneumonij, pleuriticis, lippitudinibus uehementibus, & in summa his qui magnos morbos frequenter incidunt, uenæ sectionē omnibus auxilijs potiorē pronuncio. Consideranda porro ueniunt in omni uenæ sectione, plenitudinis quantitas ac qualitas, morbi magnitudo siue præsens sit, siue timeatur, ætas uigor, & præ his omnibus uiriū robur aut debilitas. deinde naturalis habitus totius corporis, hora ac tempus anni, regio, præsens ambientis constitutio, prægressus uictus & diæta, copia ciborū & potus, & maxime an multū nutriendos cibos homo ingesserit, & an consueta exercitia reliquerit, & an consueta excretionē suppressæ sint. At uero aggrauante & infestante plenitudine, non omnino sanguis detrachendus est. Aliquādo enim crudus quidam humor in corporibus coacruatus est, quapropter diligenti animaduersione opus est, ut quantopere uires ualidæ sint, & quātopere humor ipse perfrigeratus est, quod ipsum ex urinis & alijs signis cognoscas. Nam in eiusmodi affectionibus præexolutæ uires, in uenæ sectione extremē condidere solent, ut resocillari amplius non possint, quod ubi cōtingit, periculum nō paruum consequitur, præsertim incidente febre, in constitutione æstiuā, stomacho malè affecto, aut corpore uisuiro molli & temperamenti humidū ex natura existēte. Exoluantur enim tales, & celerim in animi deliquij collabuntur, etiam si non magna febris in ipsos irruat. Sed & si hyems fuerit, aut regio frigida, & natura hominis frigidiore, minimè uenæ incisionē admitemus: tales enim hoc modo dispositos moderatis frictionibus, et unctionibus moderate calfacient

ficientibus, & portonibus incisoria ui præditis sanamus.

*De euacuationis mensura.*

Cap. x1.

Magnitudo morbi & uirum robur principales scopi sunt incidendæ ueng, qui ubi aucti fuerint, maiorem euacuationem fieri oportere indicant, sicut cōtra ubi non fuerint aucti, euacuationis quantitatem imminuere oportet, in quantum uires imminutæ sunt, itemq; morbi magnitudo. Consequenter autē simul consideranda est hominis natura. Nam eos qui moderatē graciles sunt & magnas uenas habent, multūq; sanguinis, largius euacuabis. qui uero uenas angustiores habent, & corpore albi & carne teneri sunt, parce. Sanguinem enim modicum hi habēt, & facile humores ipsi transpirant. Iuxta eandem rationem, neq; pueris uenam secabis, usq; ad quatuor et decem annorū ætatem, imō neq; senibus, præsertim uiribus debilibus existentibus. Quod si uires fuerint fortes, & necessitas urgeat, etiā septuagenarij uenā secabis.

*Quales uenæ secandæ.*

Cap. x11.

Reuulsiois gratia semper uenas in directū secabis in his à quibus sanguis erumpit. Nimirū ut sanguis in dextro nare fluente, uenam dextræ manus seces: è sinistro uero, sinistræ. Quod si splen patiatur, uenā inter anularem & parū digitum manus seca, aut in cubito internā. Sed & in pleuridici uenam è directo affecti lateris seca. Grauilissimos item oculorū dolores mirabiliter mitigat, uenā è directo affecti oculi seca in cubito, quæ humeralis appellatur. Nā interiores uenæ secæ, utilitatē præbent in partibus infra collum affectis. Externæ uero faciei & capiti: Mediæ uirgæ. Si autē in uenæ sectione error contingat, in media quidem uena neruus subiaccens diducitur. In interna uero, arteria substrata. Et uitandum est ne hanc secemus citra magnam necessitatem. Nam minoris periculi est humeralē secare. Et sæpe facta in hac fissura magna, neq; inflammationes sequutæ sunt, neq; dolores. Quare hanc cōsidentē secare licet. Internam uero cum multo metu. Vitandum item ut ne teneamus mediam. Quæmadmodū autem prædictæ partes ex uenarum cubiti sectione opem sentiunt, ita inferiores his, hoc est, coxa, & uterus ac uesica, ex uenarum poplitis ac talorum sectione. Rhenes autem uirgæ opem serunt, & ex cubiti & ex infernarum uenarum sectione. Scio autem coxædicū affectiōnem in una die sanatam, per euacuationē à cruribus, quæ sanæ non propter frigiditatem, sed uasis coxæ sanguine impletis facta erat. Oportet autē in omnibus inflammationibus incipientibus, reuulsorē facere uenæ sectionem, uelut pede inflammato ex manu. Verum in affectibus diuturnis, maximē quidem ex ipsis affectis partibus, sin minus, ex propinquis.

*Quomodo uenæ secandæ est.* Ex Antylo. Cap. x111.

Punctum quidem uenæ incisionem facimus, ubi uasa fuerint obursa: Cæsum uero, ubi fuerint manifesta, ita ut firmemus manu in obscurioribus, & his qui ad idum flectere solent cubitum. Oportet autem nō totum uas diducere, Nam dum labia ipsius evertuntur, fluxus non fit cum ei aculatione. Neque uero infernam uasis partem ad radiū diuidere oportet, sed supernam ad brachij exortum tendentem. Supernam enim secā, speciosa sanguinis ei aculatio contingit. Et ad hæc commoda est supernæ partis uenæ sectio, quoniam è uase quis aberrare non potest.

*De magnitudine sectionis.* Ex Antylo. Cap. x111.

In his qui accurata euacuatione opus habent, magna fissura faciendā est, itemq; in quibus crassitiem sanguinis contineri cōfitebimur. In quibus uero reuellere & auctere uolumus lationē sanguinis, uelut in relectantibus sanguinē, aut quibus de naribus aut alia quadā parte sanguis erumpit, parua uulnuscula incutimus. Non enim indigent euacuatione (quæ euacuetur ab affectiōe) sed retractione ac reuulsione. Oportet igitur in his permittere ut sanguis fluat multo tempore per uenā. Paruis item fissuris utendū est in phreniticis aut mēte motis, aut alijs delirantibus, quo cito cōglutinatiō uulnusculi fiat: contingit enim ut deliri sæpe latenter uinculū manus soluant. & si quidem cōtingit magnā esse fissuram, sequitur periculū ex sanguinis eruptione. In parua uero, etiā grumus uulneris osculo infidēs, sanguinis eruptionē prohibere poterit. Insuper & paruis fissuris utendum est in paruis uasis, magnis uero in maioribus. Nam si in magnis uasis paruum uulnusculum fiat, necesse sario grumi collecti fluxum sanguinis impediunt.

*De figura sectionis.* Antyli.

Cap. xv.

Sectionis figuræ tres sunt: transversa, recta, non pun-gens sed findens uenā in directū, & inter hæc media, quæ appellatur obliqua. Transuersa igitur utendum est in quibus detractionem omnino non repetere uolumus: Curuata enim cubito oscula fissuræ cōponuntur. Et commoda est hæc figura, ubi magnā fissuram facere uoluerimus. Obliqua uero figura utilis est in quibus detractio repetenda est. Et eo quod à uase nō aberramus dum sic secamus. Sed & sanguinis ei aculatio ex obliqua fissura pulchrior aspectū est uidentibus, dū uelut obtorquetur & obuoluitur sanguis in saltu. Oblonga uero in directum figura commoda est in his quibus non solum eadem die sectionem reiteramus, sed etiā post unam aut duos dies. Incuruato enim cubito disparantur oscula fissuræ. Commoda est item in directum fissura his in quibus præuaricatio labiorū fissuræ fieri solet. At in hac figura minus speciosa sanguinis ei aculatio coniungit.

*Quod sit oportunum uenæ secandæ tempus.*

Galen.

Cap. xv1.

In omni diei ac noctis hora, necessitate urgente, uenam secabis: ita ut scopum hab eas in his qui februnt, exacerbationis declinationem: in his uero qui aut propter lippitudinem, aut aliud quid eiusmodi absq; febre, uenæ sectione indigent, magnitudinem doloris aut inflammationis. Quæ enim hora uideris dolorē mitigari, uenā secabis. At uero si nihil tale urgeat, melius est manē uenā secare, non statim ubi à somno surxeris, sed ubi uigilaueris ad horā unā. Sed et quosdam prælauare præfat & prædeambulare. In quibus uero præseruationis gratia uenam secamus, licet etiā ab actu consuetarū operationum uenā incidere.

*De repetita detractione.* Galeni.

Cap. xv11.

In quibus simpliciter euacuare uolumus, eadē die iterata detractio fiat. In quibus autem reuellere, præstat ut post duos dies fiat. Et in quibus quidem opus est multa euacuatione, uires autem nō sunt fortes, in his euacuationē referuare oportet, & prima detractiōe defectuosiore facta, rursus iteratō detrahare, aut si uoles tertium. Quum uero seruientis sanguinis multitudo febrem acutissimam incēderit, uelut in synochis, siue cōtinētibus, ibi accurata euacuatione opus est.



est, Et oportet tentare ut euacuemus usque ad animi deliquium, uisum robore ex pulsibus considerato. In aliquibus enim noui sex libras statim esse detractas. Fluente itaque sanguine attendere oportet semper pulsuum tractui, ut ne citra animaduersionem, pro deliquio animi mortem inducas.

De arteriarum sectione. Galeni. Cap. XVIII.  
Arterias fecant medici in temporibus quidē, ob oculo-  
rum fluxiones, quum calidæ & flatuofæ fuerint. Eas  
uero quę sunt retro aures, in uertiginosis, & his ma-  
ximè qui ex diuturnis morbis capitis calidis ac fla-  
tuosis laborant. Iam uero & ob alias plurimas affec-  
tiones circa caput consistentes diuturnas, quidā se-  
cant arterias retro aures. Verum aliqui arteriarum  
sectiones uerentur, propter sanguinis retinendi dif-  
ficultatem; & quod dum fistula in cicatricem abit,  
dilatatio uasis ipsius arteriæ fit, quę aneurysma Græ-  
cis dicitur, & inter tumorem genera resectetur.

Medicamentum sistens sanguinem ar-  
teriarum.

Quum igitur languinis eruptio ex incisa arteria confe-  
quatur, oportet hanc hamulis attractam totam traſſe  
verſum diſſecare. Deinde aloem & mannã thuris  
zerere, & ouorum albumine ſubigere, & tenellis pi-  
ſtis leporinis medicamentum excipere, & ſiſſurę im-  
ponere. Dicitur autem de hoc amplius, in loco de ſan-  
guinis eruptione, inter vulneraria medicamenta.

De cucurbitularum usu, Ex Antylo. Cap. xx.  
Neq; in morborū principijs, neq; in corporibus reple-  
tis, cucurbitis utemur, sed quā euacuatū fuerit totū,  
& nō amplius inflexerit: parti cui cucurbitę sunt ad-  
hibendę, & opus fuerit mouere ac excutere & atra-  
here relinq; in parte inuallę fluxionē. Cauendum est  
autē ne cucurbitā prope māmās affigamus. Nā illa  
bentes in cucurbitas māmę & tumelēctes, non facillē  
sint illas tolli. Tūc uero spōgijs ex calida expressis  
cucurbitas circūdare oportet: si enim remittere so-  
lent. Si uero nō sic remiserint, cucurbitę perforandę  
sunt. Illud porro nosse expedit, quōd nō solū localis  
uenę sectio detrimentō est, anteq; uniuersum corpus  
euacuat, per affectas partes sanguinē detrahēs, sed  
etiā cucurbita. Et uenę quidē sectio minus est pericu-  
losa: p rationē enim alladonis materię, etiā sangui-  
nis excretionē facit. Cucurbita uero tū impetu affi-  
xionis uiolenter materiā atrahēs, tū multū locū oc-  
cupans, & tamē neq; uasis sensibilē fissurā faciēs, at-  
trahit quidē memorabilē materiā, nō euacuat autem  
pro rationē attrahē. Et præcordijs quidē intēpesti-  
uē affixa, præsertim in cōtinendis febribus aut fe-  
mteritandis, & maximē si etiā mēs egri fuerit turba-  
ta, & sensus sit obtusus, strāgulatus et moriē eadē die  
inducit. Capitū uero intēpestiue admoia, lethargos,  
& corporis ac mentis stuporē, & oculos prociuos  
facit. Quibus autem conigerit ut hęc effugiant, hi o-  
mnino in diuturnum capitis affectum hic incidunt.

De scarificatione. Ex Galeno. Cap. xxi.

Vena fecare sepe in anno non arbitror cōmodum esse:  
simul enim cū sanguine multus vitalis spiritus excer-  
nitur. Quum autē hic frequentius cōsumatur, & tota  
corporis moles perfrigeratur, & omnia naturalia  
opera deteriora fiunt. Probo igitur ut ab ignobili-  
bus partibus, uelut sunt crura, per scarificationem  
detractio fiat. Opimū autem est hoc auxilliū ad con-  
seruationem sanitatis, & ad eandem recuperandam,

fi fuerit præuaria. Prodest autem scarificatio etiã oculis diuturna fluxione affectis, & alijs capitis affectionibus, itemq; thoracis, & anginis. Oportet autẽ in unoquoque membro factas sanguinis inspissationes, post uniuersalem corporis euacuationem, soluere per localem scarificationem.

De sanguisugis. Galeni.

Слѣд. XXII.

**Sanguifugas** capias una die servare oportet, cap. xxiij.  
co sanguine alere, usus autē tēpore pars cui admoventur  
dē sunt nitro preparatur, & aqua dulcissima exacte  
ablatur. Postea ē fomentō sanguis illinatur. Atq; sic  
accipiatur sanguifuga ac mitratur in aquā parvā, &  
fulgine ipsarū per spongiām dēterfa sic admovebit;  
inherentes enim nō cessant trahere, donec salem aut  
nitrū aut cinerem ori ipsarū inspergamus. Postquā  
vero exciderint, fouēdi sunt loci per spongiām. Et si  
sanguis erumpat, gallam usitam, aut linteum usum,  
aut spongiām liquida pice imbutā ac usitam, insper-  
ge, & supernē chartam aceto madidam impone.

De purgatione. Ex Antylo.

Cap. XXIII.

Eos qui sana habet corpora purgare difficile est. Nam & uertiginosi ac uoluliosi fiunt ac torquentur, purgatioq; difficulter ipsis procedit. Et ad hec cito exoluuntur tales dum purgantur. Quia si purgare uolueris humores & meatus aperire, per quos humores transferuntur ac trahuntur a purgatorijs medicamentis. Et serofos quidē ac tenues humores in principio morborū euacuare oportet in crasis uero ac uiscosis coctio expectanda est, qualis est pituita, & bilis atra. Sed & in omnibus diuturnis morbis semper coctionem expectare conuenit. In acutis uero quā cōmotē fuerint materiae, etiā in principio phlegmācum exhibe, & tamē cū multa cautione. Nam quum humores sunt in motu, lationeq; ac fluxu, timor est ne quod ex uisceribus natura debile existens materiam commotam excipiat, & praesertim thorax. At in una aliqua parte firmatos humores, uelut in uiscerū inflammatione cōtingit, medicamentis aggredi nō oportet, priusquā coquantur; quicquid enim inflāmata in principijs per medicamentā solvere cōnātur, inquit Hippocrates, a diftento quidē & inflāmato nō aufciantur quicquā: nihil enim remittit cruda affectio. uerum sana & morbo reficiētia cōsumuntur; dū enim debile sit corpus, morbus dominatur, quā tūc morbus dominatur, perniciēs adest. Proinde materiae remouēdē gratia utimur purgatorijs medicamentis in cephalaea, uertigine, hemicrania, comitiali, anhelatione, erecēdē ceruicis spiratione, coxēdēdice, arthritide, podagra, nephritide, & in affectiōibus uescic ac uteri diuturnis. Similiter autē etiā ubi fluxus assiduū infestauerit aures, aut nares, aut oculos, aut os, aut flumina, aut totā superficiē: & neq; rescicetur ab alijs auxilijs, neq; aliter sit sit poterit: solet enim purgatio per aliuū fluxiones cohibere. Et in hoc ordine locari potest etiā humoris atrae bilis purgatio, quē hemorroidarū differtū gradū assumitur post uenae sectionē. At antiquae affectiōnis emouendae ac expurgandae gratia, utimur purgatorijs in resolutione, si deratione, alimentū nō sentietibus, torpore, sopore, grauitate perseuerante in quacūq; corporis parte. Ceterū ob corporis tēperamentū trāsmittendū, utimur purgatorijs in diuturnis febribus, nimirū quotidianis ac quarantis, infantia, atra bile, menis excessu,

malo habitu corporis, his qui alimentū non sentiunt propter viscosum humore. Insuperq; in elephantiasi, scabie, lepra, pustulis, morbo pediculari, & in ulceri- bus spontaneis ac grauitus, & affectionibus fluidis. At uero quo circūstus & infestus humor educatur, uelut purgatorijs, in aqua inter cutē, & regio mor- bo. Et hoc loco ponēde sūt etiā uētris fluxus, in qui- bus purgatoria assumuntur: aliquādo enim acris & inutilis humor uētris rōnibus insidet aut intestinorū, similiter uelut acres glādule aut infusions per anū, sicut intestina, & simul ipsa stimulat, & promptitu- dinē efficit ad excretionē, simulq; per acridinē suam ex circūferentia corporis ac totius molis humore at- trahit. In his igitur consentaneū est purgatorijs uti, quo talis humor ex corpore expellatur, & uenter ac intestina pura fiant. In summa utendū est purgatorijs medicamentis, in his quibus uires ualide sunt, & uo- lūtas propia est, & qui stomachū robustū habent, & multā inutilē materiā in corpore colligūt. At pīgues & prae-graciles ad purgationē inepti sunt. Insuper & qui multo sanguine abundāt, & q; assidue animo lin- quuntur, & egre reuocantur, & q; cito uomūt ex omni occasione. Pueri itē ac senes, & mulieres qbus mēses ualide purgantur. Et qui ualde purū habent corpus. Et qui certā habēt uictus rationē. Et quibus alius est natura adstricta. Et q; dysenteria & coeliacā affectio- ne faciliē corripuntur. Omnes hi ad purgationē inepti sunt. Incipiendum est autē ad bilem purgandibus.

*Bilem flauam purgantia.* Aloë. Cap. xxviii.

Aloë totum quidem corpus non purgat, uerum sitam in stomacho & uenter ac intestinis bilem, citra mole- stiam educit, ac placidē unā cū subiectis excremen- tis. Datur itaque his quibus caput affligitur, propter assiduās sientes ad ipsum de stomacho euaporatio- nes. Exindit enim inutilium uaporum allationem. Danda est & lippienibus, propter eandem causam, & his qui ob bilis augmentū sicut, quibus lingua & os faciliē reficatur: & qui circa stomachū ardorē, aut nauſeam, aut molestiā aliquā euerſoria percipiūt. Praebetur & his qui praeter rationem pallidiores facti sunt, & in quibus superfluitates educatione indigent, & dysiter adhiberi non potest ob aliquam causam. Dantur autē aloës drachmae ii. cū aqua mul- sa. Cōmoda est etiam si quis ipsam quotidie sumat, aut a cena, aut mane ante cibum potus. Tritam itaq; aloē corticis dīstij succo excipe, aut si is desit, succo brasicae utere. Habeant autē hinc formatae: pil- ulae decris magnitudinem. Et dato tria aut quinque quotidie ei qui opus habet. Pores & cū terebinthina ipsam efformare, & cū melle cocto. Oportet autem in deglutiendo, aut postea absorbere aquā mulsam. Purgatoria equidē medicamenta omnem causam ex corpore extrahunt, instar cucurbitae, principalibus partibus inherantia, ipsaq; per uentrem euacuantiā.

*Scammonia.*

Cap. xxv.

Scammonia flauā bilē maxime educit. Inducit autem stomachi dolorem, & graue olet, ac iniucunda est, & ualde sicculosa. Quum enim omnia purgatoria sto- machū infestent, aloë excepta, scammonia plus omni- bus illi molesta est. Vitanda igitur est his qui debilem stomachum habent, & febricitantibus: qui enim leuissima sit, faciliē abripitur in corpus, & omnem in ipso immunditiam cōmouet, prohibetur autem a fe- brili calore, ut ne superfluitates ad excretionē ducat.

Danda igitur est his qui bonum stomachum habēt, & non februnt, atq; non faciliē uomunt, & nō faciliē animo linquuntur. Dantur ex ea scrupuli duo plus minus, pro uirium ratione. Ammisceat ipsi sal, & thymi coma, aut pulegiū. In his uero qui ferre possunt, praestat aloē miscere. Datur & per se cum melle, aut pisanā succo, si danculū exhibere uolumus.

*Peplium.*

Cap. xxvi.

Peplij semen, aliquādo uero & ramulos simul, in umbra siccata, tusa ac cribrata dato, scrupulorum qua- tuor pondere, in aqua mulla, ad fillatū modico ace- to. Nam post flauam bilem, etiam nigram & pituitam ducit. Et flauis dissipat, quemadmodū etiā Hip- pocrates alicubi dicit. Maxime igitur cōuenit flauis- sis affectionibus, quae sane atrā bilem lacessunt, & au- spicantur. Cōuenit etiā splenis inflammationibus diutur- nis, uteri itē accoli, & laxis abdominis tumoribus.

*Veratrum nigrum.*

Cap. xxvii.

Veratrum nigrum atram & flauam bilem ex toto cor- pore trahens, inferne expurgat, nō tamen cum ulla difficultate. Quapropter etiam febriculis per circū- cūitū & diu, ipsum exhibemus. Datur & furiosis, & hemiericis, ac diuturno capitis dolore afflictis. Ma- xime uero idoneum est uisceribus, & utero & uesi- cae, si purgatorio medicamento opus habent. Maxi- ma uero ipsius uis est, priuatim educere si quid cor- ruptoriū sanguini fuerit ammixtū. Vnde etiā in diu- turno regio morbo cōmodum est, & ad asperitates cutis, uelut sunt lepra, impetigines & similia. Est & elephantiasī utile. Datur ex co. scrupuli tres plus mi- nus, ita ut tenuia draca radices lignula paululum in aqua madefacta, deinde auferatur cortex, et sicetur in umbra tūdaturque ac cribratur. Datur cū passo aut aceto mullo. Condimenti porro gratia addere opor- tet ipsi, petroselinū & dauci parum. Si uero efficacius purgare uolueris, misce & descammonia parum.

*Bilem atram purgantia.*

Cap. xxviii.

Atram bilem ducenibus utendum est praecipue in mel- lancholicis atra bile uexatis, stomachicis, his quae fa- ciliē iritantur, iracundis, homines auersantibus, se- cessum quaerentibus, & his qui in refectione uirium, purgatione opus habēt, & in habitibus obaridis & parū musculosis, & praesertim in autumno seruente.

*Epithymum.*

Cap. xxix.

Epithymum atram bilem inferne purgat. Dantur ex ipso confuso ac cribrato perfectis scrupuli xii. cum passo & aceto mullo ac modico sale. Conſert affe- ctionibus flatuosis & hypochondriacis praecordiorū, & quibus iecur grauatur, & difficultat spirantibus. Similiter autē uelut epithymum purgat flos in stoe- be enascens, & flos qui in thymbra nascitur, atq; epi- thymbrō appellatur. uerū uterq; uiribus debilior est.

*Polypodium.*

Cap. xxx.

Polypodium bilem maxime nigram ducit & pituitā. Dantur radicis purgatae scrupuli vi. affusa aqua mulla diluta. Potest & super salamentū deradi, ac comedi ante pradium. Purgat etiam mediocriter ac citra mo- lestiam, radix cocta in iure gallinaceo, & in pūsana.

*Pulegium, Tragoriganum, Leucanthemum, Alysson.*

Cap. xxxi.

Pulegium ducit atram bilem acerbuli mensura potū in aqua mulla. Similiter & tragoriganum, & par- thenium, quod & Leucanthemum uocatur. Dantur singulorū scrupuli sex. Sed & Alysson similiter pur-

mellis sexta. i. accipito. Et cnicum in crassas partes cō-  
mulum ac linleo illigatum macerato, uitorq; uelut di-  
ctum est.

Vinum mulsum atq; bile euacians. Cap. lxxv.  
Polypodij drach. iiii. Vini sextar. v. mellis sextar. i. tun-  
de, cribra, macera, & utere.

Conditum ad flauam bilem. Cap. lxxvi.

Piperis drach. iiii. scammoniae unc. i. seminis apij drac.  
i. uini sextar. v. mellis sextar. i. terito species per se pri-  
mum, deinde etiam cum melle, & postea uinum adde,  
& sine ad dies quinq; & utere.

Conditum pituitosis. Cap. lxxvii.

Lathyrum unc. i. piperis unc. i. seminis anisi apij, sin-  
gulorum unc. i. uini sextar. v. mellis sextar. i. præpa-  
ra uelut dictum est, & utere.

Conditum melancholicis. Cap. lxxviii.

Polypodij unc. i. piperis unc. i. seminis apij drach. i. Vi-  
ni sextar. v. mellis sextar. i. præpara uelut dictum est  
& utere.

Absinthii preparatio status & stercore  
euacians. Cap. lxxix.

Ligustici drach. i. s. cumini drach. i. spicæ nardi scrup. ii.  
floris iūdi odorati scrup. vi. mastiches scrup. vi. Vini  
sextar. v. mellis sextar. i. tusa ac cribrata terito cum  
melle, & uinum ammisce, excipe & utere post dies  
quinque ante prandium.

Absinthium flauam bilem ducens. Cap. lxxx.

Costi drach. i. mastiches drach. iiii. rosarum siccarum  
drach. ii. spicæ nardi drach. ii. floris iūdi odorati dra-  
chmā i. aloës unc. i. scammoniae unc. i. mellis sextar.  
i. uini sextar. v. præpara & utere uelut dictum est.

Absinthium ad pituitosos. Cap. lxxxi.

Mastiches drach. iiii. costi drach. iiii. folij indi drach.  
i. spicæ nardi drachm. i. floris iūdi odorati drach. i.  
casie drach. i. polypodij unc. i. mellis sextar. i. lathy-  
ridum purgatorum unc. i. uini sextar. v. præpara &  
utere uelut dictum est.

Rosatum flauam bilem ducens. Cap. lxxxii.

Rosarum exungutum recentij lib. i. uini ueteris sex-  
tar. vi. mellis sextar. i. Rosæ ad diem unam præficca-  
ræ mittuntur in uinum, & macerantur per dies no-  
uem. Deinde uinum excolatur & adijciuntur melli prius  
trito cum scammonia unc. i. oportet autem tundere  
ac cribrare scammoniam, atq; sic leuigare cum mel-  
le. Postea uero recondatur in uasa, & quæ exacte coo-  
perta suspendes in puteum aque frigide, & sines per  
dies septem aut nouem. Deinde extrahæ & alios tri-  
ginta dies sine, & sic propomate utere.

Rosatum pituitum, & serosum ac atra  
bilis humorem euacians. Cap. lxxxiii.

Si præcedes descriptio accepit grani cnicij unc. i. abs-  
que scammonia, euacuat serosum humorem & pi-  
tuitam. Si lathyrada solum, pituitam euacuat. Si epi-  
thymum solum, atræ bilis humorem expurgat.

Mellis rosacei purgatorij præpara-  
tio. Cap. lxxxiiii.

Mellis lib. i. succi rosarū lib. i. mastiches drach. iiii. pi-  
peris drach. ii. zingiberis drach. ii. scammonie scrup.  
viii. coquito mel cum rosarum succo ad compagē  
mellis liquidioris. Deinde insperge scammoniam &  
mastichen leuissime trita, & parum coque, & ablata  
ab igne cum reliquis in mortario unito & sepōito,  
& dato cochlearium. Euacuat flauam bilem. Quidā  
uero simpliciorē præparationem facere uolentes,

præmacerant modica aqua scāmōniā, deinde seruēsa  
ciūt; & detracto superfate ipsius cōcremēto excolat,  
& leuigatā ad mel rosaceū adijciūt, & simul coquūt  
uelut dictū est. Si uero lathyrīdū unc. i. acceperit præ-  
dicta præparatio mellis rosacei, absque scammonia,  
purgat pituitam. Si uero polypodij acceperit unc. i.  
atræ bilis humorem euacuat. Verum efficacior sit, si  
pro polypodio epithymum acceperit.

Aceti purgatorij preparatio. Cap. lxxxv.

Scammonia unc. i. acetii sextarios v. terito simul, & si-  
nito ad dies quinque, & dato ad intinctus cum cibo  
cochlearium. i. aut ii. purgat flauam bilem. Si ue-  
ro pro scammonia, inieceris lathyrīdū unc. i. purgat  
pituitam. Si uero epithymi unc. i. inieceris, euacuat  
atræ bilis humorem.

Aceti mulsi purgatorij preparatio. Cap. lxxxvi.

Mellis despumati sexta. i. acetii acerrimi sextar. i. coqui-  
to simul usque ad mellis compagem, deinde adijce  
epipetri triti ac cribrati unc. i. utere ad intinctus; aut  
cū aqua dato bibere cochlearia. ii. circa horam tertīā  
ieiunis. Euacuat bilem, si uero non assuerit epipetrū,  
scammonia inijce unc. i. Aliud acetum mulsum. Mel-  
lis despumati sextar. i. acetii sextar. i. coquito simul  
ad compagem. Deinde inijce cnicī internam partem  
purgatam & tritam pondere unc. i. & sine ad dies  
quinque, et utere ut uoles. purgat pituitā. Aliud. Mellis  
& acetii singulorū sextar. i. coquito, & thymi leuissi-  
mē triti unc. i. addito, & sinto per diem, ac uitor. eua-  
cuat atræ bilis humorem. Omnia uero quæ præ-  
dictis acetii mulsi præparationibus inijciuntur, lin-  
teolo illigata macerentur.

Acetum mulsum purgans omnes uitas

Cap. lxxxvii.

Comæ hyssopi sesquidram, organij unc. i. pulegij ses-  
quidriā, marrubij unc. i. epithymi, seminis cnicij, cactu-  
minū thymi, agarici singulorū unc. i. polypodij sexta-  
rē, scammonia unc. i. scrup. v. acetii sesquidriarū, aque  
sexta. i. mellis lib. ii. sape sexcūcē. Herbas præmacea-  
ras accito & aqua ad tertias decoquito & excolato,  
& mel addito, ac rursus coquito ad bonā copagē. Et  
scāmōniā, epythymum, agaricū, trita ac tenuissimo  
cribro excrata, in mortario ammisce. Et ubi mode-  
ratē purgare uolueris, scrupulos v. exhibebo. medio-  
uere modo scrup. xx. At uero fortibus perfectā do-  
sim exhibere potes, uncia i. Quidā etiā alypidiadis un-  
ciā i. addit. Aliud status euacuās. Aceti sextar. i. mel-  
lis sextā. i. bacarū uiniperi dra. iiii. piperis unc. i. zin-  
giberis unc. i. petroselinij drach. iiii. seminis apij, am-  
mij, ligustici, anisi, epithymi, singulorū drach. iiii.  
cumini drach. ii. seminis anethi drach. ii. polypodij  
unc. i. præpara & utere uelut prædictum est. Con-  
uenit colicis.

Acetum mulsum quod colicis ac nephriti-  
cis per sedem infunditur. Cap. lxxxviii.

Centaurij unc. i. alypidiadis recentis sextatē, rutæ uir-  
dis sextatē, marrubij, agarici, casie, iridis, hyssopi,  
pulegij, singulorum drach. iiii. fillæ unc. i. acetii sex-  
tar. iiii. mellis sextar. i. omnia acetio macerata ad ter-  
tias coquito & colato, & adiecto melle ad mellis li-  
quidioris copagē coquito. Deinde scammonie tenuissi-  
mē trite unc. i. spicæ nardi unc. i. purgatorij medica-  
menti ex sceniculo unc. i. inspergo, & uitis uitor  
hoc modo, ubi puacuaris colicū per clyster sterco-  
ra educēt, accipe acetii mulsi cochleariū, & dissolue  
cum

cum succo pitisanæ, & infunde. Vtere similiter & in nephriticis pituitosis floribus. Euacuat pituitam citra molestiam & sanat.

*Acetum mulsum amarum.*

Cap. LXXXIX.

Foeniculi uiridis una cum radicibus fasciculū i. apij cū radicibus, rutæ uiridis singulorum fasciculum unū. acetū sextar. ii. & dimidium, hoc est libras v. mellis sesquilibram. Coquito herbas, cum aceto ad tertias & excolato, & mel ad acetum indito, & coquito donec mellis liquidioris cōpagem habuerit. Deinde aloës primariæ unc. i. in mortario terito ac cribrato, & ad ipsam paulatim acetū mulsum addito, unito, excipito ac uitior: exhibetur ex eo cochlearium unum, ita ut ab ipso absorbeat aqua calida. Caput egregie purgat. Est autem & stomacho gratū. Acetum mulsum uentrem emolliens, Prosimilitæ, pulegij, origani, thymbræ syluestris, polypodij, singulorum unc. i. radicū apij drach. iiii. radicū anethi scrup. vi. agaricij, epithymi, scammonij, singul. unc. i. mellis sextar. i. acetū sextar. i. macerato species & coquito uelut acetum mulsum. Vbi uero deuenit ad bonam cōpagem, tollito ab igne, & adijce scammoniam, epithymum, & agaricū. Et dato quadrantem cum aqua calida.

*Posca aluum emolliens.*

Cap. LXXX.

Cymini quadrantem, hyssopi sesquiuinciam, ammiij sexquiuinciam, pulegij sesquiuinciam, petroselinij drach. iiii. cacuminum thymi drach. iiii. zingiberis unc. i. seminis cnicij unc. i. piperis drach. iiii. epithymi drach. iiii. salis capadocci dodrantem. Tundito & cribrato, & aridum seruato. Vltus tempore dato cochlearium i. ex posca.

*Alia posca ualde clara.*

Cap. LXXXI.

Cumini quadrantem, pulegij sesquiuinciam, fœniculi sextantem, seminis apij sextantem, anisi sextantem scrup. vii. scammonij trientem, epithymi quadrantem, salis communis besselum aut libram i. Tundito, cribrato, & dato cochlea. i. ex posca, purgat imperuerse.

*Gari purgatorij præparatio.*

Cap. LXXXII.

Scammonij drach. iiii. piperis grana l. gari nigri quadrantem, misce, utere ad intestinū, aut quomodo uolueris, purgat bilem. Aliud. Cnici grana x. piperis grana l. gari quadrantem. Internam cnicij partem tritam unito ac uitior. purgat pituitam. Si uero pro cnicio adieceris lathyridas, efficacius facies. Si uero polypodij drach. iiii. inieceris, atræ bilis humorem euacuat. Efficacius autem euadit, si pro polypodio, epithymi drach. iiii. aut tres inieceris.

*Mellis emollientis præparatio.*

Cap. LXXXIII.

Fœniculi uiridis manipulū i. aquæ sextar. iiii. coquito ad tertias, colato, & adijcto mellis lib. i. & coquito ad cōpagem mellis, et dato ex eo cochlearia iiii. purgat bilem flauā. Si uero pro fœniculo, seminis cnicij interiorē partē adieceris uncie i. pondere, purgat pituitam. Si uero polypodium aut epithymū eodē pondere simul coques, purgat atræ bilis humorem.

*Garam aquosum.*

Cap. LXXXIII.

Gari unc. i. piperis grana l. seminis apij obolum i. hoc est siliquas iiii. mellis cochlea. l. aquæ quadrantem, scammonij scrup. i. s. aut ii. Reliquis coctis & ab igne ablatis ammisce scammoniam, & dato ante cibum. Si uero pro scammonia, seminis cnicij granorum ulgini internam partem adieceris, purgat pituitam. Si uero polypodij drach. iiii. adieceris, purgat

atræ bilis humorem.

*Garam uinosum purgatorium.*

Cap. LXXXV.

Gari conclulas ii. uini conclulam i. piperis grana x. ligustici scrup. i. scammonij scrup. i. mellis parū, utere. Purgat bilem. Si uero cnicij granorum x. x. internam partem inieceris pro scammonia, purgat pituitam. Si polypodij drach. iiii. atram bilem.

*Garam acetosum purgatorium.*

Cap. LXXXVI.

Seminis apij drac. i. piperis grana l. cumini obol. i. sucij cyrenaci siue laleris tantundē, scammonij scrup. i. gari unc. i. acetū quadrantem, utere, purgat bilem. Si uero pro scammonia, cnicij granorum uiginti ternam partem adieceris, purgat pituitā. Si uero polypodij drach. iiii. atræ bilis humorem euacuat.

*Infula emollientia.*

Cap. LXXXVII.

Aquæ sextar. i. olei conclulæ i. gari parū, salis pauillum, anethi modicū, omnia donec succulenta fiant coquito. Deinde granorū unc. x. internā partem indito, & dato. Euacuat pituitam. Si uero polypodij drach. iiii. contusas ac cribratas insperferis infusulo perdicis aut phasianij, purgat atræ bilis humore. At uero scammonia non probō in infusula coiectam, eod quod experimento compererim indoneam esse.

*Lac purgatorium.*

Cap. LXXXVIII.

Lactis asini aut caprini heminam i. scamoniæ scrup. ii. misceto ac exhibeto. purgat bilem. Si uero cnicij granorum x. x. internam partē inieceris, euacuat pituitam. At uero polypodium aut epithymum non probō ut lacti miscantur, eod quod tingant lac, & nō potest hoc latere accipientem. Pleriq; enim ob timorē ditatem purgari non uolunt.

*Oliua purgatoria.*

Cap. LXXXIX.

Piperis drach. i. epithymi drach. i. silphij drac. i. mēnig uiridis drach. i. comæ pulegij drach. i. cymini drach. i. rutæ drach. i. scammonij unc. i. palmularum pinguium sextantem, mellis sextar. i. acetū sextarij dimidium, oliuas muria conditas o. x. numero, omnia prædicta per tenuissimē terito, & deinde cū aceto multo. Postea oliuas singulas ter facinatas inijecto, & finito ad paucos dies, ac uitior. dato in cibo oliuas tres, & infusuli cochlearium i. aut ii. pro uiribus.

*Oxyporia purgatoria.*

Cap. xc.

Si ad concoctorium medicamentum quod ex malis cotoneis parari solet, cochlearij unius mensura acciperis, ammisce scammonij scrup. ii. flauā bilem citra molestiam euacuabis. Si uero lathyridum grana x. x. addideris, purgat pituitam. Si polypodij aut epithymi drach. iiii. addideris, purgat atram bilem. Similiter autē si quocq; diosporitico cōcoctorio pharmaco uteris, idem efficies, & maxime in quibus pistaui in thorace residet. Si uero ad cōcoctorium ex calamintha pharmaco ammisceueris medicamenta purgantia, euacuabis omnem citra cutē corporis ultiosum humorem, lepras, impetigines, & similia.

*Oxyporium ex palmulis.*

Cap. xci.

Zingiberis, piperis, cumini, petroselinij, singulorū unc. i. scammonij in fermento assatæ ac tenuissimē tritæ unc. ii. s. palmularū pinguiū carnis trientem, foliorū rutæ unc. i. mellis lib. i. acetū sextar. i. Coquito mel & acetum & palmulas, donec reliqua fiat tertia acetū pars. Deinde rutam cū palmulis terito, & arida leuissimē trita inspergito ac unito, & paulatim acetū mulsum coctū addito, unito ac uitior, uelut admirando & multa experientia cognitio pharmaco. Perficitur do-

sis sunt cochlea. ii. ad adfritam aluum, dum adhuc in vigore est medicamentum. Si uero nō ualde fuerit alius adfritus, pro mensura illius adfritionis exhibendū est pharmacū, aliquando cochleariū i. s. aliquando i. solum. Subducit egregie flauam bilem. Quapropter & in morbo regio utiliter exhibetur, & terianarij, ubi cōcoctio bona in urinis apparuerit, purgat etiā pituitā moderatē. Vtere cōfideret in omni tēpore uelut imperuero ac minime curiofo. Ego uero etiam his qui abscq; purgatione febricitant dedi, postquā apparuit cōcoctio in urinis, & cōfestim sanati sunt. In quibus autē atram bilē purgare uolueris, adde ad prædictam dosim, epithymi scrup. i. aut pro uiribus. Si uero pituita multā insidet, adijce agarici aut isij scrup. i. purgat enim moderatē pituitā.

*Purgatorium ex cotoneis malis.*

Cap. xci.

Malorum cotoneorum maturorum, magnorū, odoratorum, fermento obliturum & assaturū, carnis purgatē trientem, mellis despumati quincuncem, pipēris drach. ii. scammonij drach. v. i. singula per se terito & unito, ac exhibeto cochlear i.

*Purgatorium ex citrio. Oribasij.*

Cap. xcii.

Purgat hoc caput, facit ad stomachicos, coelacos, et qui non possunt forte purgatorium ferre propter imbecillitatem. Vnde etiam pueris citra noxiā datur. Est enim stomacho commodum. Citrij corticis ac carnis lib. i. aquæ sextar. i. s. mellis sextarij dimidium, pipēris unc. i. scammonij unc. i. Citrium in tenues partes secato, & cum aqua ad tertias coquito, deinde colato, & mel ad decoctū adijcto, ac coquito ad bonam compagem, & reliquias coctorum citriorum terito, ipsiq; arida tenuissimē trita inspergito, et ubi simul triueris, coctam aquam illam nullam adijcto, & unitis uisitor, cochlear i. exhibens.

*Purgatorium ex feniculo ualde bonum.*

Cap. xciii.

Epithymi, zingiberis, pipēris, scammonij, singulorum unc. i. foeniculi uiridis, rutæ uiridis, apij radicū uiridum, singulorum quadrantem, aquæ sextar. i. i. mellis lib. i. i. decocto ad tertias redacto adijce mel, & coque ad bonam compagem. Deinde insperge arida, & exhibe cochlear i. magnum.

*Aliud ualde stomacho gratum.*

Cap. xciv.

Foeniculi, cumini, pulegij, apij, singulorum manipulū, aquæ sextar. i. i. coquito ad tertias, & colato, & tandem mellis addito, & coquito ad mellis compagem, & inspergito in mortario scammonia leuissimē tritæ unc. i. pipēris unc. i. mastiches tritæ drach. i. i. i. unito datoq; cochlear i. Conuenit flatuosis.

*Purgatorium ex feniculo quod parari solet ad atram bilem.*

Cap. xcvi.

Scammonij sextantem, zingiberis, pipēris, singulorum unc. i. petroselinij scrup. x. i. corticis ueratij nigri scrup. vi. epithymi unc. i. mellis lib. i. i. succi foeniculi lib. i. i. Coquito succum cū melle ad mellis compagem, et affundito paulatim ad arida trita ac cribrata in mortario, & unitis uisitor. Datur ex eo cochlear i.

*Purgatorium atræ bilis. Oribasij.*

Cap. xcvi.

Aquæ sextar. i. i. mellis do drantē, epithymi unc. i. epithymi usum ac cribratum inspergito, ubi illa simul ad tertias decoxeris. Dato bibendum pro uiribus. Misi uero uideatur quarta pars exhibenda esse. his autem qui bono habitu præditi sunt, dimidium.

*Aliud purgās atram ac flauam bilem.*

Cap. xcvi.

Scammonia, epithymi, singulorū seſquiunciam, petro-

selini, zingiberis, mentæ, singulorum drach. i. i. excipe melle, & exhibe nucis ponticæ magnitudine.

*Pastillus flauam bilem purgans.*

Cap. xcix.

Piperis, mastiches, nucum pinearum, passularum enucleatarum, singulorū grana x. cumini grana x. scammonia scrup. i. i. plus minus, mellis parum, trita simul dato, uel ut pastillum. Huius dosis una est, purgat citra molestiam.

*Buccella purgatoria.*

Cap. c.

Fermenti ex similagine libras ii. scammonia unc. i. seminis foeniculi, cumini, folij malabathri, singulorū filiquas i. i. piperis grana x. x. i. i. salis communis parum, olei & gari cochlear. ii. arida conuuluto accribrato, et cū fermento molliato, & facias panes paruos duplam latitudinem miliaris habentes. Torreto in clibano, & exhibeto perfectam dosim sextantem ex hoc pane edendam, quocunq; quis uoluerit modo, saltem ut ieiunus utatur. Est enim maximē alienum ab omni molestia, purgat bilem.

*Alodaria citra molestiam purgantia.*

Cap. ci.

Aloës quadratē, agarici unc. ii. s. scammonia unc. i. bdellij drach. i. i. i. gummi uermiculati sextantē, excipe succo brasicae. in his uero qui humore flaccidū stomachum habent, succo carnis citrij, & forma pilulas ciceris magni magnitudine, & dato perfectis septē ieiunatis. Si uero uoles, etiā ante coenā, & post coenā. Si autem mollire uolueris, tria dabis ex his catapotia. Aliud sine molestia purgans. Scammonia sextantem, bdellij unc. i. aloës drach. i. i. i. gummi drach. i. i. i. & cum succo brasicae fac catapotia ciceris magnitudine, & exhibe post coenā. si mollire uolueris, tria. Si uero purgare, septem ut plurimum, aut quinq;.

*Pharmacum pituitam ducens. Oribasij.*

Cap. cii.

Baccarum lauri recentium sextantem, euphorbij unc. i. mellis quod satis est, ut elegmatissimā formā habeat. Datur cochlearij dimidiū. Redundantibus humoribus plus datū plus profuit. Vtere uelut optimo. Aliud pituitam euacuat. Seminis anisi, pipēris, casia, mellullæ colocynthidis, singulorum drach. i. i. i. grani cnidij, seminis cnici, singulorū drach. i. i. i. mellis quod satis est, ut elegma fiat. dato perfectis cochlear i. s. Aliud. Anisi, apij, ammi, pipēris, grani cnidij, seminis cnici, lathyrilorum, singulorum drach. i. i. i. casia drachm. i. i. mellis despumati quod satis est. Perfecta dosis sunt cochlear. ii.

*Purgatorium atræ bilis. Philagri.*

Cap. ciii.

Zingiberis drach. i. seminis apij drach. ii. succi cyrenaisci, pipēris, ligustici, singulorū drach. i. epithymi drach. i. i. excipe melle ut elegma fiat, & exhibe cochlear. ii. Aliud. Epithymi, agarici, aloës, singulorū drach. i. i. i. corticis ueratij nigri drach. i. i. hyssopi, trididis, absinthij succi, singulorum drach. i. i. i. bdellij, gummi, uerulscq; drach. i. Si uero nō affuerit absinthij succus, adijce comē tantundem, & excipe melle. & dato pro uiribus. Euacuat atræ bilis humorē, itemq; pituita.

*Bilis & pituita, & atræ bilis ac reliquorum humorum commune purgatorium.*

Cap. ciiii.

Lathyrilorum, medullæ colocynthidis, foliorum chamaelæ siccorū, scammonia, epithymi, polypodij, anisi, singulorum drach. x. cacuminum thymi, pipēris, mastiches, carpopalsami, casia, seminis apij, chamæpityos sicca, singulorum drach. v. absinthij succi aut comæ drach. v. mellis quod satis est ad elegma. Dato cochlear i. aut plus pro uiribus. Vtere autem hoc non

non in omnibus, sed in quibus coniectaueris omnes humores æqualiter in corpore redundare.

*Aloëdaria emollientia ex rosaceo melle.* Philagrij. *Cap. c.v.*

*Aloës* sexcuncæ, costi, spicæ nardi, carpobalsami, floris iunci odorati, singulorum unc. i. calix unc. i. agarici drach. iiii. croci drach. iiii. s. comæ centaurij scrup. iiii. mellis sextantem, succi rosarii trientem, epithymi unc. i. rhei scrup. viii. alari scrup. iiii. ligni balsami scrup. vi. mastiches scrup. viii. excipe melle rosaceo, & da pro uiribus. Aliud ex rosaceo melle, molliens utrem sine omni molestia. Vere uero ipso ad articulos, & maxime coxendicū dolore, itemq; lumborum. Aperit etiā icoris obstructions. Ilij scrup. viii. agarici drach. iiii. aloës sextantem, spicæ nardi scrup. viii. floris iunci odorati scrup. viii. croci scrup. iiii. calix scrup. x. costi scrup. viii. carpobalsami scrup. viii. mellis rosaci quadrante & scrup. viii. terito & formato catapotia cū melle rosaceo, & quinq; exhibeto, post cenam quotidie si uoles, aut alternis diebus, aut prout uisum fuerit. Exerget enim stomachum & articulos, præcipue uero purgat pituitam. Est autem consueto more præhendū ac coenandū. Aliud bilem & pituitam ducens. Absinthij comæ rusticæ ac cribratæ, aloës tenuissimæ tritæ, utriusq; unc. i. excipe succo tithymali, maxime myrsinæ, & efformato catapotia phalæsti magnitudine. & dato ut. tantum.

*Aloëdarium ex Philagrio.* Idem. *Cap. c.vi.*

Purgat hoc bilem & pituita. Colocynthidis medullæ, aloës, scammonij, singulorum drach. v. succi aut comæ absinthij drach. v. excipe succo brasicae, & fac catapotia ciceris magnitudine, & exhibe perfectis xxi. Aliud, & ipsum multo experimento cognitum. Euacuat autē tres humores. Aloës, epithymi, scammonij, singul. drach. ii. colocynthidis, agarici utriusq; drach. i. excipe succo brasicae. Et dato catapotia x. Aliud quod in Tyro præparatur. Scammonij sextantem, aloës drach. i. mastiches, bdellij, piperis, absinthij, singulorum drachm. i. excipe succo mediij citrij ac corticis, & fac catapotia. Et dato septem aut nouē. Si uero uoles probe purgare, habeant catapotia exhibenda pondere scrup. iiii. s. & amplius. *Idem.*

*Aloëdarium Oribasij.* Idem. *Cap. c.vii.*

Conuenit hoc maxime lippiētibus. Euacuat autē magis bilem flauā & atrā, Scammonia uero, & corticis uerarij nigri unc. i. salis ammoniaci drac. i. radice pæradis drach. iiii. piperis, pulegij, utriusq; drac. i. efformato cū aqua pilulas fabis græcis similes. Et dato ex eis septē mediā dosim, ita ut habeat septē, drachmam unā & obolos duos. Aliud, Oribasij. Aloës sextantem, spicæ nardi, alari, mastiches, croci, xylobalsami, sing. drac. vi. calix drach. x. epithymi drach. xii. formato catapotia erui magnitudine, cū decocto pulegij. Et dato xxi. Hoc quartanarios sanat. Possunt etiā cum melle cocto efformari.

*Sal purgatorium.* Idem. *Cap. c.viii.*

Salis ammoniaci sexcuncæ, silphij drac. ii. seminis apij drach. ii. zingiberis drach. i. piperis drac. ii. solij indicij, spicæ nardi, pulegij, singul. drach. i. scammonij unc. i. Datur cochlearij unū. Euacuat bilem. Aliud. Salis ammoniaci sexcuncæ, seminis apij drac. i. zingiberis drach. ii. piperis drach. iiii. spicæ nardi drach. i. pulegij scrup. iiii. s. solij scrup. i. lathyridij unc. i. dato cochlearium. Euacuat pituitā. Aliud. Salis ammo-

niaci sexcuncæ, zingiberis drac. iiii. piperis drac. ii. anisi, seminis apij, utriusq; drach. ii. solij scrup. i. epithymi unc. i. dato cochlearij. Euacuat atræ bilis humorem. Sal ybducens & euacuens circūstam in uentre ac intestinis pituitam, & reliquos humores. Purgat moderate etiā bilem. Cōuenientiū est arthriticis, uertiginosis. hoc usus est quidā stomachicus, & frequēter ex comitali morbo cadere solius, & in gentes gratias egit. A morbis uero præseruat famulantes ipso utentes. Petroselinij drach. iiii. mastiches scrup. ii. zingiberis drach. iiii. piperis, euphorbij, utriusq; scrup. i. salis ammoniaci drach. xv. scammonij drac. vi. Datur cochlearij dimidiū in prædio, cū carnibus uolucris aut gallinæ, aut piscis, ad indicium. Sit autē pondus scrup. iiii. s. Si uero efficacius purgare uoles, dato ieiuno mane cū succo pilanæ, aut cum aqua mulla, scrup. vi. fortioribus etiā vii. dare potes. De bilioribus uero scrup. ii. aut iiii. s. Aliud purgatorij purgās. citra periculū non eueriens stomachū. Datur in omni tempore, & omni ætati, & pueris. Educit sterces & omnē materiam corruptā, à capite usq; ad ungues. Remouet furfures & reliquas circa caput nascentes pustulas. Facit ad uertiginē, lippietis, Medetur omnibus circa cutē pustulis. Sanat teritiam, quartanam, quodidā, in interuallis exacerbatum datum, ubi concoctio bonā in urinis apparuerit. Bilem autē præcipue euacuat. Habet hoc modus. Zingiberis, petroselinij, epithymi, silphij, ammiij, seminis apij, cumini, ligustici, piperis, singul. drach. iiii. scammonij quadrante, & uncia dimidium. salis ammoniaci tosti septuncē. Torreto salem acutum ditto cū reliquis. Scammonia uero uritam cribratam unito in mortario, & dato scrup. ix. cū succo pilanæ aut aqua mulla meracore. Aliud cōsimile, acutius experimento constans, imperperisum, euacuat magis bilem. Ammiij scrup. vi. seminis apij scrup. iiii. piperis, petroselinij, epithymi, cumini, singulorum scrup. iiii. s. scammonij unc. i. salis cōmunis quincuncem, salis ammoniaci trientem, datur cochlearium cū pituita. Aliud experimento constans ualde bonum. Epithymi scrup. x. cumini thymi scrup. viii. salis ammoniaci scrup. viii. piperis scrup. ii. cumini Aethiopiæ, anisi, utriusq; scrup. ii. mastiches scrup. xii. contusa trita adseruato. Vfus autē tēpore scammonij scrup. ii. sumito, ac terito cū modico melle, et adhuc aridi triti adseruati medicamentū scrup. ii. tantū, & uncto ac dato cum pilanæ succo aut aqua mulla.

*Purgatorium pituitam ducens.* Diogenis. *Cap. c.ix.* Euphorbij, piperis, salis ammoniaci, singulorum unc. i. terito & redigito in puluillum, & dato in ovo sorbili cochlearij dimidiū. hoc purgat pituitam solum. Dosis perfecta sunt scrup. iiii. s. Aliud flauam bilem purgans. Scammonia unc. i. costi, spicæ nardi, utriusq; scrup. iiii. s. radice rubiæ leuissimæ tritæ scrup. ii. perfecta dosis sunt scrup. iiii. media ii. minima i. Aliud atram bilem euacuans. Scammonia in malo assatæ drach. v. costi, spicæ nardi, utriusq; scrup. iiii. s. carophylli scrup. i. s. radice rubiæ scrup. ii. epithymi scrup. ii. perfecta dosis scrup. vi. media iiii. s. minima i.

*Purgatorium aquam ducens.* Oribasij. *Cap. c.x.* Ducit hoc item pituitam, piperis, seminis rutæ, scobis siue ramentorum eboris, euphorbij, æquales partes. Dantur scrup. iiii. cū aqua mulla aut cōdito, facit & ad colicos



colicos & hydropicos. Alitid aquam ducēs. Petroselinū, anisū, cacuminū thymi, singulorū drach. iiii. foliorum chamelææ siccorum drach. x. mellis quod satis est ut eclegma fiat. Daro perfectam dosim cochlear. iiii. s. Si uero efficacius facere uoles, ammisce prædictis squamæ æris drach. vi. Et daro perfectam dosim cochlear. iiii.

De Hieris.

Cap. cxv.

Hiera Logadij. Medullæ colocynthidis sextantē & uncia dimidium, scillæ aslææ, agarici, ammoniaci thymiamatis, thymi, scamoniæ, singulorū drach. x. corticis uerarij nigri, hyperici, utriusq; drach. x. epithymi, bdellij, polypodij sicci, aloës, chamædryos, marrubij, cassiæ, singulorū unc. i. myrrhæ troglodyticæ, piperis albi, longi, nigri, cinamomi, croci, opopanax, sagapeni, castorij petroselinij, aristolochiæ longæ, singulorū drach. iiii. excipe melle. Dosim perfectam sunt drach. iiii. minima iiii. adde ad dosim dum exhibitur es salis tenuissimæ tritæ cochlearij dimidium.

Purgatorium circa molestiam purgās. Cap. cxii.

Facit ad ischiadicos, & qui per circuitū diuturne uexantur. Medullæ colocynthidis unc. i. inferi sextantē. merito probē, & dato robustis drach. i. cū aquæ mulsæ portione magna ieiunis. Debilibus uero siliquis nouē. Vt re cōsident. Aliud eximū. Ad principia infanæ, melancholicis, paralyticis, ischiadidis, uertiginosis, comitali morbo laborantibus, alopecij, capitis doloribus. Verarij nigri, scamoniæ, utriusq; drach. viii. salis ammoniaci drach. iiii. gummi drac. i. efformato cataporia ceteris magnitudine cū succo brasitiæ, & daro perfectis seru. v. Media dosis seru. iiii. Minima iiii. his qui ualde debiles sunt. Est hæc descriptio Oribasijs, cap. lx. xvii. desunt autem huius species tres. Purgatoriū medicamentū. Profomilicæ, epithymi quadrantē, isij unc. i. agarici drac. iiii. euphorbij drach. vi. spicæ nardi, folij, costi, piperis, singulorum drach. v. x. caryophylli seru. vi. Datur ex hoc scrup. vi. cum aqua mulsā. Si uero bilem flauam reperis cum alijs duobus humoribus redundantem, adde ad hanc dosim usum tempore etiam scamoniām, quantum satis esse iudicaueris pro uisibus. Habet autem hæc dosis, isij siliquis quinque, epithymi scrup. i. s. agarici siliquis ii. s. euphorbij siliquis iiii.

Hiera Galeni.

Cap. cxiiii.

Medullæ colocynthidis sextantē & uncia dimidium, chamædryos, agarici, scillæ aslææ, ammoniaci thymiamatis, scamoniæ, corticis uerarij nigri, stoechadis, hyperici, singulorū sextantem, epithymi, euphorbij, utriusq; drach. viii. polypodij sicci, bdellij, aloës, marrubij, cassiæ, singulorū sextantem. myrrhæ troglodyticæ, sagapeni, croci, aristolochiæ longæ, piperis albi, longi, cōmunis, cinamomi, opopanax, castorij, petroselinij, singulorū drach. iiii. Mellis quod satis est. Daro perfectam dosim drach. iiii. Mediam iiii. Miniam iiii. cū aqua mulsā & salis tenuissimæ tritæ cochleario dimidio. Maxima porrō est huius utilitas: purgat enim ex profundo uarios humores ut cellēter, ita ut neq; exolutionē, neq; tribulationē, neq; quæ debilitat, neq; inappetentiā, neq; aliā angustiam ægro accipienti exhibeat. Sed potius facile sperantes & hilares & robustos efficit, ut mirabilis sit ipsius excellētia. Sanat itaq; hemicanicas affectiones, uertigines, comitiales morbū, infantiā, melancholiā, lethargum & similia, hebetudinē uisus, grauitatē audiūs,

uocem interceptam, anhelosos, stomachicos, afflictiōnes antiquas, splenicos, nephriticos, colicos, ischiadicos, arthriticos, podagricos. Duct menēses. Conuenit tremulis, & resolutis, impetiginem feram, & omnes circa cutem corporis nascentes pustulas, & elephan-tiasim, & febres diuturnas per circuitum repetentes sanat, & omnia maligna ulcera.

Hiera Archigenis, ex epistola ad Marsum de atrabile. Cap. cxiiii.

Medullæ colocynthidis sextantē & uncia dimidium, chamædryos, agarici, marrubij, stoechadis, singulorū drach. x. opopanax unc. i. sagapeni unc. i. petroselinij, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorū drach. v. cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglodyticæ, polij, croci, singulorū drach. iiii. excipe melle desumato, ut habeat strigmentū crassitudinē, & reponē in vitro uasē. perfecta dosis sunt drach. iiii. (In alio exemplari additur seru. iiii.) cū aqua mulsā adiecto salis cochleario parauo. Quū enim sordibus inquinatus & male affectus fuerit æger, strenuā cōstitutionē inducit, non solū ob multitudinē eorū quæ per aliu subducuntur, sed etiā quod priuatim bilē atram immittit. Pleuridiū itaq; primū præparata est, & flatuosis affectionibus cōueniētiūssima est, & facili spirationē facit, & impedimentis nūrimē aduerfatur, & colore cutis depurgat, sanguinē quidē defecās, malē uero ardētē spiritū lucidius accedēs. Sed nō est propositū nobis encomiū dicere eius, quæ nō frustra hiera, id est, sacra appellata: longū enim sermonē res ea requirat. Ad melancholias autē affectiōes nō est aliud pharmacū quod huic cōparari mereatur. Et noui multos p asidui eius uisum nullo alio opus habuisse, etiam nullā omnino bilē excreuisse: nō em̄ quæ nigra excernūt bilē solī melancholici uocatur, sed quæ ita habet in solidis mēbris talis cōstitutiōis seruaturā. Sed & pāniculorū siue mēbranarum cerebri malos habitus ualde bene extērit: unde morbū comitalē & infanias inde oriētes mirabiliter remouere uidetur. Ego reperi hanc descriptiōnem in medicamentario libro de Romā mihi allato ualde laudatā ad insanos, melancholicos, ischiadicos, paralyticos, uertiginosos, comitiales morbū, alopecias. Non habebat autē opopanax, neq; piper, neq; pulegiū. Hiera Antiochi. Chamædryos, agarici, medullæ colocynthidis, stoechadis, singulorū drach. x. opopanax, sagapeni, petroselinij, aristolochiæ, piperis albi, singulorū drach. v. cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, croci, folij, singulorū drach. iiii. Mellis quod satis est. Facit ad melancholias, infanias, morbū comitalē, & oēs seculū sanguinē habentes.

Hiera Risi, ad melancholias. Cap. cxv.

Medullæ colocynthidis sextantē & uncia dimidium, chamæpityos drach. x. chamædryos drach. x. cassiæ drac. v. agarici, marrubij, utriusq; drach. x. opopanax unc. i. sagapeni, petroselinij, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorū drach. v. cinamomi, spicæ nardi, croci, myrrhæ troglodytidis, polij, singulorū drach. iiii. Excipe melle, et exhibe drach. iiii. perfectā dosim cū aqua mulsā, & sale. Habet aliquid ad intelligentiā utile, eod quod à capite plurimā ducit. Vnde uertiginosos, & capitis grauitatē, & glaucomatis fieri minūtib; comitali morbo, paralyticis affectionibus; hoc pharmacū priuatim adhibere soleo, et si opus fuerit memoriā reuocare. At melancholico nō parua nec uulgaris utilitas ex ipso cōtingit. Quare sepe per ipsū purgādu; est.

Euenim

Etenim alia medicamenta aliter alibi præparantur, & ad alios quosdā morbos magis apta sunt. Si uero q̄s ad atram bilem uti uoluerit, hoc utile existit. Vtatur autem singulis diebus ex hac antidoto fabæ magnitudine, non purgationes gradatim: magnopere enim confert ad concoctiones, & status discutit. Videtur porro mihi conducibile esse, ut ob strenuas purgationes in aluæ feminis drach. ii. bibantur.

*Hiera iusti, faciēs ad eadē uelut relatæ. Cap. cxvi.*  
 Epithymi trientem, & uncæ dimidium, marrubij, stœchadis, chamædryos, coridis ueratri nigri, scammonia, agarici, piperis albi, cōmunis, longi, scillæ alla-tæ, singulorum sextantē, medullæ colocinthidis, euphorbii, aloës, croci, gentianæ, seminis peroselinii, ammoniaci thymiamatis, sagapeni, singulorū uncia i. opoponacis, polij, cinamomi, casie, myrrhæ troglodytice, spicæ nardi, floris iunci odorati, pulegij, singulorum drach. iiii. aristolochiæ longæ, & rotundæ, utriusq̄ drach. ii. mellis depumati quod satis est. Perfecta dosi drach. iiii. s. cum aqua mulsa & salis tenuissimē triti cochleario uno.

*Quomodo auxiliari oportet his qui pharmacam biberunt, & non purgantur. Cap. cxvii.*  
 Si uero quis poteo pharmaco non purgetur, aqua mulsa meraciorē alsidue absorbenda dato, & niri parā in aqua liquefacti. Optimū autē cognoui multo experimēto mastichen, ut dētur eius scr. xii. leuissimē tritæ cū aqua tepidiore. Optimū est & glādē ano indere, ex sale, nitro, ac melle. Et masti aliquādo māducatum effecit quod debuit: corroboratū enim os uentris, superfluitates infernē protrudit: Ob quot causas nō exercuit uenter purgatorio dato: ob quinque causas. Aut propter naturæ ægri proprietatem, aut ob datū pharmaci paucitatem, aut propter stercore durū impactū in quibuldā intestinis, aut quod natura impetū per urinas fecit, aut propter errorē, pars quidē purgantis, ad hoc ut nihil lædat corpus, alimētum sit animalis, pars uero in pharmacū uenenosum eueritur. At uero Hippocrates de purgationis excessu sic dicit: Quum purgationis excessus hominem arripuerit, statim in balneū ipsū inducito, uinūq̄ bibendum & ante balneū cū potū dato, suluū colore, & albū substantia. Et mea experientia comperit hoc præstantissimū omnium, quare ne contemperis.

*Cura excessus purgationis. Orisibj. Cap. cxviii.*  
 In his qui nimium purgantur, potū contrahere oportet, & somnum procurare, dandi est autē uinum austerum paulatim, cū aqua fontana. Bonū est & crassiores polentā torrere ac potui inspergere. Aut parū de calice papaueris, & gallæ parū. Facit etiā probē lentis decoratæ farina cū aceto & bea nigra cocta, rhoe adiecto aut parū de calice papaueris. Cōducunt & pira sicca expressa, & mala cotonea. Si uero adhuc perseuerat lationis impetus, utendū est efficacioribus ad coeliacos descriptis. In his uero qui facile uomunt, aquam tepidā multam bibendā dato, & uo mere iubetō, digito aut penna immissa. Atq̄ hoc facies bis & ter consequenter. Deinde oleum melinum & uinum calefacto, & in hoc lineū tinctum uentri admouero. & post modicū interstitiū antidoti theriacis fabæ magnitudinem cum uino bibendum dato.

*De uomitu. R. ufi. Cap. cxix.*  
 Quandoquidem in uiolentis uomitibus sæpe absurda quædā sequi solent, operæ pretiū fuerit prius modos

referre, quomodo quis facile uomat. Nā pituitā mouet uomitus, & caput leuat: & eū qui auditus cibum ingessit, aut plus uini haustū, lædi prohibet. Auxiliatur autē purgatio per uomitus nimio corporis molli. Opitulatur item excellētē gracilibus. Omnes autem fluidas affectiones uomitus sanare solet, uelut ulcerationē renum, uescicæ, & antr. & aliarū partū, elephantiasim, cancras, malos corporis habitus, articulorum affectiones. Cōuenit & hydropicis, maximē aqua inter cutē laborantibus, regio sit morbo, & comitali in his quibus a stomacho initium affectionis accipit. Nam his qui in capite affecti sunt comitali morbo, incongruus est uomitus. Cōducit itē tremulis, resolutis, siderationibus, spirationibus erecta ceruice, melancholijs, impetiginosis. Cōtrarij uero sunt uomitus sanguinis resectioni, stragulatibus uteri, na turis nauscabundis, animi deliquijs, his qui a suffocatione alsidue uexantur, & qui ex qualibet occasione caput dolēt, & qui suffusione suspēctam habēt, & in summa omnibus oculorū affectibus. Sini autē uomitoria nō acerbā & arida, sed partim dulciora, partim aciora. Videtur autē inter hæc raphanus probari, & eruca, & salsamentū uetus, origanū uiride, cepe & porri. Coadiuuat uomitus etiam pūsana adiecto modico melle, & pingues carnes. Attamē nō oportet prædicta aut huiusmodi decoquere, & succos ipso rum solos accipere, uerū totā molē deuorare. Necq̄ uero circa mādicationē etiā immorari oportet, si q̄s uomere uelit. Siat tamē omnia ex coctura emollita. Manifestū est autē ex uinis quodq̄ dulciora esse eligenda: hæc enim magis in uētre supernatāt. Et calidæ potu utendū est. Oportet & amygdalas melle tinctas quædere, & placetas gustare, & cucumeris semē macerātū cū melle offerre. Sed & cucumeris satui ac peponis radice trita cū melle uomitū mouet, & Celicę radix trita septem drachmarū pōdere in aqua mulsa ac pota fortiter sursum purgat, ut aliquādo etiā excessus purgationis consequatur. Qui uero fortioribus uti uolūt, narcissi bulbū in aqua coquūt, & cū decocto quidē tēperat uinū: ipsum autē bulbū edūt coctū, cū oleo & modico sale. Mouet etiā uomitū unguētū irinū, & plus adhuc cyprinū, si quis illius etis his digitis iritet. Citra molestiā mouet uomitū etiā hyssopi decoctū, & thymi, & enicē semē tritū cum sesamo, ac cū aqua mulsa plurima potū. Et nasciturū semen. Similiter: oleū sesaminum, raphaninū, narcissinū. Dasphnoidis folia uiridia tria comesta. Optimū est & hoc raphani decoctū, & caricarū cremorē simul misceto, tepescacito, & bibendū dato. Pleraq̄ igitur & euersiora uomitoria reprobanda sunt. Dandi uero sunt raphani ieiunij qui inediā tulerunt, & a cœna prius uomuerūt. Sini autem raphani ualde acres, & secantur in tenues laminas, macerentur autē hæc frustula a uespera in aceto & melle. Edat autem uomiturus ex his magnā copiam, & alsidue superingerat acetum mulsum. Deinde ad horas duas lentē obambulet, & plurima aqua tepida hausta uomat, per digitū aut pennæ tritamentum.

*Preparatio raphanorum cū ueratro albo. Cap. cxx.*  
 Præparantur etiā alio modo raphani ad diuturnas affectiones, & fortiore exagitatione indigentes. Veratri enim albi & optimi festu carū drach. vi. in raphanos figuntur, ita ut raphani prius harundine compungantur, & deinde festuque ueratri in foramina immittantur,

tantur. Hæ festuæ ubi totam noctem in raphanis māsferint, sequenti die exciuntur, ut ipsarum in raphanis relicta. Postea uero raphanos confcindere oportet & in aceto multo macerare, & similiter edendos exhibere, Diligenter autem considerandū est, ne quid ex cortice ueratri in raphanis permaneat.

Quibus dandum sit ueratrū, & quibus non, Ex

Antylo ac Posidonio.

Cap. cxxi.

Ipsū ueratrū dandum est his qui diuturno ac forti morbo laborant, & qui in alijs auxilijs spem nō habent. Dandum est hydropicis, elephantiosis, malo habitu præditis, resolutis multo tempore, comitalibus & melancholicis, arthriticisq; ac podagricis. At enu merare in quibus affectionibus probetur ueratrū, non facile est propter multitudinem. Præstat itaq; dicere qui morbi à ueratro lædantur. Incommodū est iterq; ueratrū, sanguinis reiectioni, spirationi cretæ ceruicæ strangulationem minantī, & in suffusione immittēte, capitisq; affectibus qui ex interuallis uolentos dolores inducunt, cum rubore faciei & uasorum diffentione; & in uteri strangulationibus, & his qui alsi dūe animo linguantur.

Quid ueratrū facere possit. Cap. cxxii.

Veratrū potest corpora transmutare ac permutare, temperaturam ipsorum rectiorem ac robustiorem efficiens.

Quod multi accepto ueratro nihil quidem uomuerunt, nihil tamen minus quam purgati utilitatem perceperunt.

Cap. cxxiii.

Multū accepto ueratro ipsoq; concocto, omnino quidem non sunt purgati, utilitatem uero non minorem perceperunt quam hi qui purgati fuerant.

Qui sint magis apti ad ueratrū, Cap. cxxiiii.

Viri aptiores sunt ad ueratrū mulieribus, & ex ipsis uiris hi qui fortio rem habitum possident. At mulierosi, & habitu ualde pingues, aut graciles, aut thoracem non carnosum habentes, & longam ac angustā ceruicem habentes inepti sunt. Pueri quoque ac senes inepti sunt; & qui ualde frigidam temperaturam habent, & qui sana corpora habent, & multo sanguine abundant, inepti sunt. Item difficulter uomentes & pusillanimes.

Tempora uniuersalia ac particularia adsumendum ueratrū apta.

Cap. cxxv.

Tempus uernū aptissimū est ad sumendum ueratrū. Deinde autūmnus. Aestas incōgrua est, & nimirum hyems quoq; nisi ualde magna uerget necessitas. Et tūc hyeme quidē qui ualde calidum temperamentū habent aptiores sunt. Aestate uero senes. Cōstitutio idonea est serena & calida & insolara. At in morbis in quibus interualla sunt, dandum est in interuallis. In alijs, quandoquēq; cōtigerit. In quartanis uero & intestinis fluxione uexatis, in ipsis accessionibus.

Veratri probati note.

Cap. cxxvi.

Optimū est ueratrū quod ab una radice plures festucas siue furculos habet, esq; paruos & extentos, & non rugosos, & non in acutū desinētes, neq; caudam muris referentes. Intus uero ualde albos, foris autem pallidiores, profundam medullam habentes, friabiles, qui non flectuntur ob mollitiem, sed franguntur transuersim instar caulīs, & qui in fractura fumosum quid cōtinent ac remittunt, atq; hoc purum. Nam si puluerulentū id fuerit, uetustate ueratri indicat. Bonū porro ueratrū mansum primum dulcedinis in-

dicationem de se præbet, deinde modicæ acrimoniæ, postea serouere fortem inducit in ore, & saliuam multam ducit, & stomachum euerit. Oportet autem uere colligere ueratrū radice adhuc prægnante.

Viūs ratio ueratro purgandorum. Cap. cxxvii.

Viūs ratio accuratissima constituenda est his qui ueratro purgandi sunt. Attenuatis enim corporibus nō citra periculum exhibetur. Diebus tribus antea abstineat à carnibus aut reliquis crassis succi eduljjs ac potibus. Ad ius faciāt aut seipsos ad uomitū, & ter aut quater prius uomant à cena, & aluus subducatur. Oportet autem declarata antea domesticis anxietate certaminis futura, sic ad hoc auxilium procedere.

Differentiæ exhibitionis ueratri. Cap. cxxviii.

Datur diuersimodē ueratrū. Alij enim decoctū ueratri dant, alijs cremorem, alijs ipsam eius substantiam. Et alijs forpice in ramenta confectum exhibent. Alij iusum & cibarium. In ramenta igitur confectum d rō incipit purgare, post horas in totū duas, bilem & pituitā educens citra multam lincationē. Et ipsū simul uomitū reiectū, in quatuor aut quinq; horis purgationem sedat. At in puluillum redactum ualde tarde operatur, ut post quatuor aut quinq; horas scæpe incipiat. Verū omnes species bilis & pituitæ educit, & ad periculum contractionis & nimia purgationis deducit. Ad longum etiam tempus producit purgationem, sed utilitatem multiplicem exhibet.

De cremore ueratri.

Cap. cxxix.

Cremor in quo maceratū est ueratrū, datur senibus & pueris, & his quibus habitus defluxit, & qui morbi facile solubile habent. Datur & his qui elephantiāsim futurā timent. Oportet autē drach. v. ramentorū, in aquæ pluuialis hemina dimidia macerare aut triduū, deinde colare et calcare, atq; exhibere totū cremorē.

De ueratri decocto.

Cap. cxxx.

Decoctum ueratri dandū est tum prædictis, & qui illis adhuc sunt robustiores, infantibusq; ac atra bile percitis. Preparatur hoc modo. Veratri librā i. cōcisam in aquæ pluuialis sextar. ii. macerato aut triduū. Deinde ad prunas mitiores cogito ad tertias. Postea colato & adiecto ad decoctū, mellis despumati primarij lib. ii. & coquito usq; ad mellis compagem, & cochlearium magnū delingēdum dato. Licet etiā aqua calida miscere, & dare cum sorbitione quadā. hoc neq; conuulsiones, neq; contractiones, neq; nimiam purgationem facit. Exeridium autem est uolenti ad ipsū ueratrū transire, ut etiam confidenter ramenta eius confecta accipiat.

Deramentis ueratri, item de confuso ac cribrato.

Cap. cxxxi.

Cæterum his qui maiori molimine ac exagitatione opus habent, fortioribusq; ac confidentioribus, & facile uomētibus rametā cōfcta danda sunt. At uero his qui adhuc audentiores sunt, aut etiā consuetudinē habent, cōsumum & tenuissimū cribro excremum dabis. Ramenta uero sic exhibe. Accipe festucas, confinde forpice ad polentæ aut fursurū magnitudinē. deinde puluillū linteo exterge, & detractis omnibus tenuibus particulis, ut ne strangulet, dato: timidioribus quidē cum pilanæ aut alicæ succo, ubi parū decoxe ris: fortioribus uero cū aqua calida, aut aqua mulā, ita ut cogas ipsos insuper forbere aquā nullā purā aut aquā, ut ne relinquatur quid in faucibus aut cōmacho. Dosis perfectissima fortibus, de rametis cōcistis,

cifis, sunt drach. ii. s. de puluere crassiore, drach. una & oboli ii. de puluillo drach. i. & oboli ii. Cōtundi mus autē crassiorē eius farinam in mortario, & per angustissimū cribrum excernimus, & tenuissimū auferentes, id quod crassius est, exhibebimus cum succo alicē, aut mazē ex polenta factē. Tenuem uero puluillum tundimus, & exactē cribramus. Et postea cum cocto melle solidissimo in catapodia coactum ac efformatum exhibebimus.

Que preparare oportet exhibitionis tempore. Cap. cxxxii.

Præparantur porrō ipsi ad opem ferendam lacinatio- nibus, animi deliquis, & conuulsionibus hæc. Aqua calida & frigida, & decoctum hyssopi, mel, ruta, pu legium, acetum, mala, panis calidus, uinum, pullus gallinaceus coctus, oleum commune & scyonum, sal, galbanum, castorium, cremor ueratri, oleum cyprinum, aut irinum, aut nardisium, pennæ, sternu- tatorum, cucurbitule diuersæ, lectica siue ferculum, lectus stratus molle habens, clyster.

Quomodo post potum curandi sint. Cap. cxxxiii.

Si quidē facile purgētur postquā biberint medicamē- tā, dabimus ipsi aquā frigida absorbēdā aut colluē- dam. Deinde odoramentū quoddā corroborans. Et iubebimus ipsos sedere aut recinari, & in quiete ma- nere ad horas duas, ut ne citius quam oportet phar- macū reuomatur. Postea iubebimus ipsos moueri. Prima perceptio caloris circa stomachū & fauces cō- tingit: Deinde salua multa in os colligitur: Postea paritē alimētū & pharmaci cū pituita uomūt; deinde pituitā & bilē cum pharmaco: Mox purā bilē. Sæpe uero etiā ueter infernē subducitur, quādo salē etiā ro- lerabilior purgatio cōtingit. Singultus leuiter, & fa- cies rubicūda est. Si uerō faciliē procedit purgatio, & facies bonū colorē habebit, & singultus cessabit. His uero quī circa mediā purgationē singultūt, aquam mulsam dabimus, aut decoctū rutę, & aquā tepidam in potu. Deinde purgatos lauabimus, & alimētum stomacho gratū exhibebimus. Perseuerate uero pur- gatione, oportet dare aquā mulsam calidā absorbē- dā in qua decocta est ruta, aut aquam cū oleo. Penna quoq; cyprino aut irino oleo, aut alicui simili tin- ctā irriterent, & lecto pēssilē reclinat cōmouētur. Si uero ualde uexētur à stragulatione, cremoris ueratri cyathos tres offeremus. Nā ex qualitate adiuuat pur- gationē. Quod si neq; sic stragulationis periculū le- niatur, acerrima infusione per clysterē euacuabimus. Dabimus ipsi etiā galbani obol. iii. deuorandos, nō ut uomitū cōstemus, sed ut stragulationē sedemus. Aut sternutatoriū forte admouebimus, absidue per- lectū pensilē agitates, & pēnarū immisione iritates. Vbi uero incipit purgari, mitigādus est singultus, uelut antea dictū est. Si uero uolētus fuerit singul- tus, sternutatorio utemur, & cucurbitis per totā spi- nā, & maximē circa magna scapularū uerticula, de- trahētēs ipsas ad spinā. perseuerantes enim cucurbitæ sæpe corrigūt stomachū cōtractū & uelut cōtortū à singultu. Ligabimus etiā extremas partes, & foue- bimus immittas in aquā calidā. At uero succedēs in quibusdā contractiones, crurū maximē & manū; (solēt em̄ pleriq; hæ accidere) leniemus fordit illi- nentem, fouēdoq; ac calcificādo & fricādo extrema & musculos in furis. Sit autē oleū scyonū, aut quoddā ex mollitēbus & lassitudinē ac dolorē eximētibus,

acopis appellatis. Sed & castoriū unguetō ammiscē- bimus, et in potu exhibebimus. Maximē uero, pdest cōtractis balneū si affuerit. Sin minus, in scaphā aut in solitū immitemus, ita ut oleo multo dulci totū cor- pus, maximē uero cōtractas partes illinamus. Sit au- tē aqua probē tēperata, ut in ipsa diutius manere pos- sit. Porrō ubi cessauit cōuulsio ac purgatio, statim nu- trire oportet, panē exhibēdo uino diluto madafactū, aut in omphacomeitū, his qui ualde sunt euacuati. Si uero caloris sensus circa stomachū post cibū contige- rit, ipsum omphacomeitū aqua calida tēperatū bibēn- dum dabimus. Aliquando uero etiam cum frigida mixtū secunda die dabis. Cibi uero postea boni suc- ci omnes sint, & unum tenue ac ualde uetus.

De purgationis excessu. Cap. cxxxiiii.

Nimias purgationes sistemus aquæ calide potu, & ex- tremarū partū ligatura, & frictione uehemētī, & cū curbitis ad præcordia & dorsum affixis. At abstiniij potus egregiē supprimit uomitū. Si uero adhuc per- seuerare, utemur somniferis dolorē sedantibus. Nam talia rescicandi ut prædicia purgationes sistunt. Et som- nus excretionē sistendū uim habet. Succedit tamē somnus sua sponte probē purgatis per ueratrū, mul- tus & profundus, si nō periculū imminet. Quibus sa- nē in tantū cōcedere oportet, quantū somno tenētur. Si uero sudores immodiē consequantur, sedabimus ipsos corporis uentilatione, & spongiæ ex frigida a- qua aut posca expressæ defensione. Vtemur etiā pul- uillorum adstringentium & meatus obducunt in- spersione, & reliqua cura in cardiacis referenda.

Epihemata purgatoria. Cap. cxxxv.

Medullæ colocynthidis, seminis erucæ, rutę syluestris, elaterij, grani cnidij, lathyridij purgatiū, galbani, ce- ræ, nitri rubri, singulorū drach. iiii. opopanis drac. ii. terebinthinę drach. vi. Tunditur hoc pharmacu- adiecto paulatim felle taurino, quantū satis est. Et si quidē super umbilicū positū fuerit usq; ad pubē, infe- riorē alui mouet. Si uero super uentrē, superiorem purgat per uomitū. Aliud: Nitri rubri, seminis se- curidacæ, medullę colocynthidis, fellis taurini, staphi- dis syluestris, stercoris columbini, radici cucumeris syluestris, scillæ, mercurialis, singulorū æquales por- tiones, tūdit, cribrato, & felle excipito ac melle sus- ficitū, & ubi ad malagmatis formā redegeris, uitior. Aliud quod pollicetur sanguinis per nares educationē, si frōti imponatur. Vbi uero sistere uolueris, inquit, sanguinē, ablato ipso locū diligētē deterges per spō- giam ex posca aut frigida aqua expressā. Si uero imo uentri impositū fuerit quadrangulari nouē digi- torū figura, ciet mēses, & scetus corrūpit. Imponitur & renibus in exacerbationibus. Cōpositio hæc est: Ceræ, galbani, euphorbij, radici lanarię herbę, sing. unc. i. talorum cerusini uforti drach. iiii. succi ab- stiniij drach. iiii. terebinthinę liquidæ drach. iiii. Sicca trita cribrata, rursus terito cū felle utulino, ad strigēntiā crassitiē, & ligda ac eliquata affundito, & unito ac uitior, inquit, uelut admirando. Aliud emplastrū purgatoriū, quo utor, Chezananze appel- latū. Hoc impositū umbilico, mouet inferiorē uen- trē: thoraci uero & stomacho impositū uomitū ciet, donec spleniū cui illitū est tollatur. Menses autē femi- narū ducit, & scetus corrūpit imo uentri & lūbis im- positū. Cōpositio hæc est: Grani cnidij drach. iiii. la- pidis alsiij drach. x. ueratri albi drach. iiii. adipis ca-

prini drach. v. elaterij drac. iiii. succi tithymali drac. iiii. amurcae drac. xii. fellis taurini drac. ii. spuma natri drac. v. farinae lupinorum amarorum sextantē, comae absinthij drach. ii. Reliqua tundito ac cribrato, deinde fel tritū adjicito, mox amurcā, & postea adipe liquefactū affundito, & unitis utor. Aliud um-bilicarij. Et hoc uomitū ciet uentri impositū. Et mēses ducit nō ob uasorum conductionē suppressos, scētusq; corrūpit, imo uentri ac lumbis impositū. Absinthij, succi radidis cydamini, artemisiae, elaterij, singulorum drac. vi. medullae colocynthidis drac. x. radicum cucumeris sylvestris, farinae lupinorum, chelidonij, seminis uiolae albae, singulorum drac. vi. opopanax drac. ii. ceræ drac. c. terebinthinae drac. i. cyprini drac. i. aut quantum satis est. Impositū autē ubi alij commouit, mox ipsum tollere oportet. Aliud, facit & ad colicos. Niri scrup. i. x. terebinthinae scrup. vi. elaterij scrup. iiii. staphidis sylvestris scrup. i. s. castorij, seminis rosamarinij, samplicij, baccharū lauri, grani cnidij, lupinorum siccorū, medullae colocynthidis, singulorum scsquiquintid, scammonij unc. i. fellis taurini unc. i. ceræ sextantē, adipis anserini quadrantē. Aliud, Cucumeris sylvestris succū, & cydamini succum, paribus portioibus, cū melle misceto, & haec exactē unito in sole aut calido cinere, & utor illincens ab umbilico usq; ad pubē. Aliud, Elaterij drac. iiii. colocynthidis drac. i. scammonij, squamę aris, radicum cucumeris sylvestris, singulorum drac. i. lathyridiū drac. i. aut pro ipsis succū tithymali tūndē. Tūdito, cribrato ac terito cū oleo plurimū salis habet, & hapsum lanæ magnū facito, ipsumq; pharmaco imbutū imponito ubi uolueris, umbilico inquā, aut uentri, aut imo uetri & lumbis. Aliud, Mespilorum exēptis nudis scrup. xviii. scammonij scrup. xii. atramentū sutorij scrup. xvi. sagapeni scrup. xxii. lathyridiū scrup. xii. colocynthisid seminis scrup. xii. Trita excipe oleo & utere.

**Cōpositio olei siue ungtij purgatorij.** Cap. cxxxvi. Fellis taurini sextantē, elaterij unc. i. grani cnidij uiridis trientē, lupinorum uiridiū succi sextantē, euphorbij unc. i. medullae colocynthidis unc. i. adipis uulpini recentis sextantē, adipis uiperę scsquiquintid, stercoris muris drac. iiii. succi pæonię drac. iiii. castorij drac. iiii. olei cyprini sexuncē, olei ueteris lib. i. arida cū dīto ac cribrato per tenuissimū cribellū. Adipes autē prēmollito in mortario, præserrim uulpinū: fibris enim reuertū est, deinde ad lentas prunas liquefacto cū oleo, & ipsis reliqua omnia inspergito, & parum ad prunas coquito ac seponito in stanco uasē, diligēter operto, ut ne trāspiret, & deponito in domo superiore nō humecta ad dies xxx. Et postea utere in omnibus & ad omnē affectionē: Citra molestiā enim purgat. Sanat autem cū reliquis etiā mentis perculsionem. Mensura quę in usum assumitur ut plurimū est cochleari orū duorū, in gbusdā etiā unū solū. Inunctio em̄ umbilico pfectā feci euacuationē. Si uero immo dīcē feratur uenter, & uoles suppressere, spongiā uino tepido imbutā ac expressā adhibe, & sistetur. Aliud epithema. Hoc umbilico imponitur, & splenem purgat. Veratri nigri quadrantē, ueratri albi trientē, ammoniaci thymiamatis, niri, utriusq; trientē, scammonia sextantē, piperis grana xxx. cōmusa cribrata excipe terebinthina ut malagmatis formā induat. Et ubi præsricueris locū ac fomēto præspara ueris, formato quadrangulā quinq; digitorū

figura splenem, & imponito. At pectini impositū, scetus corrūpit. Epithema sanguinē ducens, ut hæmorrhoidas iritet, & mēses muliebres. Elaterij, myrrhæ, galbanij, farinae ordeaceę, singulorum drach. iiii. foliorum rutę uiridis drac. ii. fellis taurini quod satis est. Singula seorsim tenuissimē terito, deinde unito, & fellis quod satis est affundito. Vius uero tēpore locū sub umbilico, & partes circūcirca sitas illinito. Alia quando etiā liberos. Ducti mēses & hæmorrhoidas.

**De localibus euacuationibus.** Cap. cxxxviii.

Et de his quidē quę superfluitates quę in toto corpore sunt, purgare possunt, sufficit relata. Tempus est autē trāscūdi ad locales euacuationes. Verū illud meminisse te uolo per totā tractationē, ut primum totū corpus purges, & à superfluitatibus liberes per prædictā purgatoria medicamenta. Et postea per localia euacues. Si enim ante totius corporis euacuationem aut purgationem, per localia auxilia uolueris partiū affectiones curare, in magna mala immiseris egrotū. Ampliorem enim materiā ad debiles locos attrahes.

**Quę oculos purgant & lacrymas prouocant.**

Cap. cxxxviii.

Lacrymas prouocantibus utemur ad oculos diu resicatos, & palpebras scabras ac pruriginosas. Extergetibus uero & repurgantibus ad hebetē usum & infusionis principij. Prouocat autem lacrymas & extergent omnia hæc: mel, oleū uetus, ricininum, amygdalinū, ex nucibus regijs, & fœno græco, lentiscinū, laurinum, anethinum, salsinum, nardinum, opobalsimum. Ex succis autem oculos purgant, succus uuæ acerbae, lactuca sylvestris, lyciū, radices acori succus, itē chamædyros, centaurij, chelidonij, ocymij, ceparū, rutę hortēsis ac sylvestris, quę etiā besalia appellantur, itē mali punici succus, sceniculi, utriusq; anagallidis, marrubij, trifolij, ueratri albi, et anemonis. Ex liquoribus uero spissis, myrrha, sagapenū, opopanax, cyrenacicus, & Medicus, ammoniaci thymiamata, galbanū, thus: ex animatiū, testudinis terrestres sanguis: hepatis caprini cruor, itēque siluri. Sed & siluri sel, & hyanæ, capræ, gallinæ, perdidis, uulturnis, uris, scari, callyonymi, & coracini. Ex adipibus, uiperæ adeps, gallinarū, pisciū fluuialium, castoris testēs. Ex cineribus, hirundinū pulli exusti, lacertæ, ustæ, cornu cerui usum. Ex metallidis, lapis hæmatites, & scissilis, æs usum, atramentum sutorum, chalcitis, mify, alumen omne, squama aris, rubrica, lapis phrygius, iaspis, magnes, moroxus qui & leucographis appellatur, lapis galactites. Ex platis, cortex thuris, ericæ fructus, & quæ eiusdem generis sunt.

**Quę aures purgant.**

Cap. cxxxix.

Mel, uinū mullum, uinū dulce, oleū nucū regiarū, amygdalinū per se, & cū anserino adipe, tritinū cum aceto, myrrha cū alumine, acetoq; ac aqua: spuma natri cū melle & aceto, alumē cū aceto, senecta serpentis cum aceto, sel bubulū, suillū, & omne fel pisciū, betæ succus, solitorū capparidis succus, corticis raphani succus, mercurialis succus, bdelliū, galbanū, castoriū, cassia, ueratri albū & nigrū, herba lanaria, capparidis folia cū oleo cocta, aceti mullum, nitrū cum aqua calida infusum. Cæterū ex prædictis quædam ad pruritus, quædā ad ulcera, quædā ad ea quę in meatum inciderunt, aliqua ad fordis duritiē, item ad sonitus, & graue auditū ac surditates cōmoda sunt. Capitis itē doloribus antiq; & morbo comitali hæc profunt.

Quæ

*Quæ per nares purgant.*

Cap. cxi.

Per nares purgat caput, radicis betæ succus, elaterium, anagallidis ceruleū florē habentis succus, oleū trinitū, amygdalinū, cyclamini radicis succus, & ipsa arida trita infusata, piper, nitrū, atrametum futoriū, mel, rhlaspī, ueratū albū, euphorbiū, herba lanaria, castorī, calamintha, melanthiū, iris, marrubium, anemone. Hęc uero manibus admouentur, propter diurnas capitis affectiones, & ad morbū comitalem, & oculos arguato morbo infestatos. Item ad obtusum auditum ac uisum, & ad narium obstructions antiquas, & in læso olfactu, & ad eos qui caninam conuulsionem passi sunt.

*Quæ humiditatem ex ore trahunt.*

Cap. cxli.

Lēticus & ipse folia, & quod ab ipsa refinaceum desluit, mastice appellatū, cū staphide syluestri, piper, granum cnidiū, sinapi cum aceto mulso, ac nitrū gargarisatum multā pituitā euacuat: rumicis radix cum aceto cocta, pyrethrū, capparis cortex, tæda, mel, oryganū, thymus, pulegium, hyssopū, rhus cū melle, alumen, chalcitis, misy, myricæ fructus, terebinthina cū melle, omphacij succus cū sulphio, cyrenaiscus succus, casia, & omnia quæ ori illini solent. Ceterū quæ ualde efficacia sunt, in diuturnis affectionibus assumenda sunt, ore prius ex oleo colluto, ut ne acrimonia impediatur usum. Adhibēda uero sunt hæc omnibus diuturnis capitis affectionibus, & hebetudine uisus, & graui auditui circa dolorem. Ad linguę itē ac gustus resolutiones, ad parodontas, anginas, pustulas capitis aut faciei, ad caninā conuulsionē. At uero recuratōis gratia, adhibēda est postea aqua calida, sapa, aqua mulsa, lac micarum, panis cremor, aut pitaneæ succus.

*Quæ lac generant ac mouent.*

Cap. cxlii.

Generant ac mouēt lac in potu accepta, pitaneā cū foeniculo cocta præsertim uiridis: sin minus, cū semine. Sed & ipsum foeniculū per se comestū, & anethū, sesamū, anisum, semen lini, cumini, milij farina cocta, tritici decoctum, eruca uiridis, cucumeris semen: foris autē illita uberibus prouocant & mouēt lac, intestina terrea, nigella, fel tauri, ordeī macerati succus, portulacæ succus, adeps anserinus, cera, sulphur, recrémentum ferri. Hæc adhibentur in his quibus lac deficit.

*Pulmonem ac pectus purgantia.*

Cxliii.

Semen urticæ, dauci, apij, thymus, semen raphani, in potu ac cibo accepta, item sinapi, sesamū, nasturtiū, erysimum, cardamomū, cucumeris semen, nigella, piper, ruta, polij, marrubium, bacce lauri, casia, aron, dracuculus, bulbus, cepe, alliū, costus, amomum, spica nardi, sulphur, styrax, galbanū, terebinthina, myrrha, opopanax, scilla, organū, pulegium, hyssopū, abrotonū, bryoniæ radix, amygdalæ amaræ, caricæ, uixæ passæ, nucis pineæ, maximè recentes, mel, sapa, uinū dulce, castoriū, farina erui, picarū nudē, amoniactū, bdelliū, thus, filphū, & succus aris, aristolochia, bacce iuniperi, stoechas, porrū capitatū, cū pitana coctū in cibo acceptū, ouū recēs absorptum, butyrum per se, & cum melle, glycyrrhizæ succus & ipsa radix. His utendū est ad anhelosos & erecta ceruicē spirantes, & ad ueterem tussim. Pleraq; uero ex ipsis etiam phisicis & suppuratū pectus habentibus conueniunt, propter educationē eorum quæ in thorace collectæ sunt, & ad ulcerum repurgationem.

*De suffitionibus.*

Cap. cxliiii.

Suffitus nō commodi sunt omnibus affectionibus circa

thoracē consistentibus: neq; enim in sanguinis spuito idonei sunt, quū per acrimoniā eorū quæ suffiuntur uasa rursum aperiantur: neq; his qui siccū morbum circa thoracē habent: uerū folis anhelosis & erecta ceruicē spirantibus, & quibus thorax ob copiā frigidorū humorū infestatur. Utendū autē est suffitiōibus toto corpore euacuato. Collocādus est homo, & ubi uelibus cōtectus fuerit, iubendus est crura dissipare, & deorsum nuere, ut facies prope genua existat, atq; ita os aperire, quo suffimēto inter crura posito, fumum ore suscipiat. Præstat tamen per infundibulū fumum suscipere. Sunt autē suffimēta hæc, Castorium suffitū humidā & frigida affectionē pulmonis ac cerebri faciat. Similiter aristolochia, bitumē, landarcha, ladanum, solij, paleæ antiquæ, funiculus uetus marina aqua maceratus, terebinthina, chamæleuce, calaminthe, styrax, mastice, thus, erysimū, leporis sterces ac pilij, dorcadis sterces, cucumeris syluestris radix, centauriū, sceniculi semē. At nos habemus suffimigium per experitiā cognitū, quatuor specierū, nimirū styrads, terebinthine, landarchæ, mastices, æqualibus portioibus cōmixtis. Hoc fidē reperit quod anhelosas, & suppuratas, et pleuriticas affectiones sanat, iteq; uisum, quemadmodum & quæ prædicta sunt.

*Quæ tenuia intestina euacuant.*

Cap. cxlv.

Tenuia intestina purgat fructus ithymali, & semen ipsius quātū guttē qnq; carlicis aut palmulis excepte, atriplicis semē, brasicæ succus, cicorū decoctū, thymbre & polypodij decoctū, pulegij decoctū, uitis folia, thymi decoctū, chamæpitys, buryrū recēs assidue delinētū, chanæ ualde coctæ ac comestæ, iusculū infusū per absorptum, oleū omphacinū potatū, rosacē, itē ac riciniū. Agari cū aqua mulsa, sed hoc cū molestia purgat: est enim stomacho incōmodū, ed quod leue sit, & stomacho innaret, aloē cū aqua frigida, aut aqua mulsa, aut lactosa siue lactei reporis pota, iteq; cocto melle excepta ac deuorata, citra molestiā purgat, styrax terebinthina exceptus ac deuoratus, absinthium & abrotonū similiter. At uero tenuiū intestinorū purgatio recētes oburationes, & crudorū humorū generatōes, & libricos rotundos curat. His uero purgatis, etiā uiscæ bilem suscipiētis meatus, qui icuiuo intestino inseritur, propriā actionē minime impediēte perficit. Quin & inflationes & tormina uertiginosa ac uoluuolosa horū purgatio per sanat.

*Quæ sima hepatis purgant.*

Cap. cxlvi.

Polypodij, mercurialis cocta comesta, lathyrides cum aceto mulso, chamæla cū absinthio & aqua mulsa pota, brasicæ succus, cyclamini radix, lactis ferū, heliotropij, scorpiuri appellati succus, galli ueteris iusculū. Hæc auxiliatū diuturnis inflammationibus circa sima hepatis. Nā incipientibus profunt mitiora.

*Quæ gibba hepatis purgant.*

Cap. cxlvii.

Amomi decoctū, flos lunci odorati, acori radix, gentiana cū aqua, agari cū uino mulso. Est autē stomacho incōmodū, radicis lauri cortex cū uino, rheo Ponticum, glycyrrhizæ succus, amygdalæ amaræ præsertim, absinthij coma, anisum, sceniculi semen, spica nardi, radicis quinquefolij succus, uitis semē, dauci semen, perofelinum, cetaurij decoctū, pæoniæ fructus, sesamū torrefactum, lauri, palmularum ossa uicta, symphyton, polygonū, erigeron, smyrniū, hipposelinum, anagallis ceruleū habens florem, fumaria siue chelidonia quæ in sepibus nascitur, securidacæ

h z semen,



semen, cornu cerui usitū, mentā succus & decoctū, calamintha, costus, fenum graecum modicē frictum, bacanum, opobalsamū, radicis myrti syluestris cortex, ordei cremor, lupini, phu, alarū, meon, pix. Hęc sanāte diuurnos circa gibba hepatis morbos, siue cū tumore aliquo sint, siue sola in temperatura addit cū dolore, siue obrutario.

*Splenem euacuantia.*

Cap. cxlviii.

Veratrum nigrum, epithimum, polypodium, scolopēdrium, pæoniæ radix, chamædrys decoctum, item chamæpitys, centaury præsertim minoris, pulegij decoctum, capparix cortex, colocynthidis cremor potus, mercurialis comesta, & decoctum ipsius potum, laryrides cum aceto mulso potæ, chamæsa, aqua marina calida pota, erice fructus cum potoselino, uitis semē. Hęc omnia splenem purgantia, etiā hepatis ab obturatione liberant, & malos habitus, & hepaticas ac splenicās, morbiq; regij & aquæ inter cutem affectiones generari prohibent.

*Renēs purgantia.*

Cap. cxlix.

Omnia incisoria uel prædita, plantaginis radix & folia & semen, arida trita pota, alparagus mycanthinus, pæoniæ radix, cicerum nigrorum decoctum, amygdalæ præsertim amaræ, eryngij radicis decoctum, damasolium, adiantum, apij semen, feniculi, dauci, petroselinij, ammiij, anisi, ligustici, asari decoctum, meon, phu, flos iundi odorati, felsei, acori radix, grāmē, uitis lacryma & cortex, sanguis hirci aridus. Auxiliantur autem hęc pota post remissum inflammationum uigorem: dissoluit enim duros tumores qui fieri parant, & lapides generari prohibent.

*Vesicam purgantia.*

Cap. cl.

Vrinā a uesica ductā, acori decoctū potum, itemq; asari, oleū amaracinum, amygdalæ amaræ cū passo potæ, radicis althææ decoctū, adiantij decoctum, hamatites lapis tritus cum uino potus, gallinarum sterces siccam, anchusæ decoctū, abrotoni, anisi semen, sanguis hirci aridus, auriplicis semen, artemisij decoctū, aristolochiæ decoctum, fabinæ leuissimæ tritæ drachma una cum aqua mullā, in nō febrilendibus cū uisno, balsamij semen, glādis decoctū, bellidum, apij semen, bryoniæ radix, glycyrrhizæ succus, pulegij decoctum, fructus, dictānum, dracunculus, abietis decoctū, rubiæ decoctum, serpyllum, eryngij radix, heliotropium, fenecio, menta, salua, foliorum olei decoctum. Hęc non sunt lapidum generationem in uesica fieri. Et crassities ac feculentas subfidetas. Insuperq; scabiosas & ulcerosas affectiōes sanare solēt.

*Que glādi indātur ad prolektādās urinas.* Cap. cli.

Postquā uero repleta fuerit uesica urina, & cōtrahi nō poterit, necq; urina exprimere, in glādem hanc indere solemus, nitrū aqua dilutū, muriā, sel, cyclaminum.

*Lapides in renibus ac uesica euacuantia.* Cap. clvi.

Hęc lapides frangunt, cardamomum cum cortice radicis lauri potum, cyperus, oleum amygdalinum, paluri semen, bellium, feniculi radix, libanotis, myrti syluestris folia, ceraforum fructus, prunorū succus, amygdalæ amaræ, rumicis radicis decoctum, seminis althææ decoctum, triboli uiridis decoctum, adiantij decoctum, uitis lacryma, apri uesica sicca, lithospermum, tectolithos, betonica, saxifraga, lapides in spongijs, æstrum.

*Vterum euacuantia.*

Cap. clvii.

Sanguinē ab utero ducit insecta & apposita hęc. Ca-

sia cum myrrha, calami aromatici decoctum, oleum amaracinum, uiola alba, thymi ac thymbræ decoctū, centaury radix, & ipsum centarium, opopanax, uitis semē, amygdalæ amaræ, nucum regiarum nucleij usitū cum uino appositū, decoctū absinthij, itemq; succus, sampuchus, felsei, galbanum, lilij radix, chamæpitys, artemisiz decoctum, dictānum, conyza foemina, rubiæ radix, urticæ semen cum myrrha, elaterium, ueratrum nigrum, lupinorum decoctum, raphani cortex, herba lanaria, adeps cerui recens, adeps anseris, resina terebinthina, fel taurinum cum mastiche, muscus qui & splanchnum & hypon dictur, cyperus, unguentum irinum, succus cyclamini, anchusa, quinquefolium, cuminum, fisybrium, heleniū, salua, heliotropium, mercurialis, granum cnidium, uua exemptis granis, fenum graecum, selsamum, nucleus baccarū lauri, amygdali amaræ radix, cochleæ parus, lanæ fucidæ, cælypum, lactucæ syluestris succus, porrum, ceparum succus, calaminthæ folia. Tot quidem sunt quæ in pessos, hoc est, talorum formas excipiuntur, inijciunturq; ac apponuntur. Vitādus tamen est assiduus usus eorum quæ inter ipsa sunt acriora. Solent enim ulcerationes inducere.

*Que in potu sumpta menses ducunt.* Cap. clviii.

At uero in potu accepta sanguinē ab utero ducunt pleraque quidem ex prædictis, & omnia quoque urinantia. Sed & erysimū & asarum cum aqua mullā, calamus aromaticus, alumē, castoreū, ciceri decoctū cum pipere & ruta, radicis asphodeli decoctū in uisno elixate, itē pulegij in uino cocti, radicis eryngij decoctū, abrotoni semē, origani, thymi, thymbræ, rutæ decocti, feniculi decoctum, crethmō, cuminum, sinapi, marrubij semen, & succus & decoctum, sinonium, fibon, oreoselinon, dauci semen, thlaspi, nigella, uiolæ albae semen, carpobalsamū, pæoniæ semē, baccæ lauri, myrrha, cardamomū, cyclaminus, sagapænum, galbanū, semē feniculi, spica nardi, mercurialis, costus, styrax, ceteraurij magni radix, fabina, iris, aristolochia, bryoniarū flos & succus, radicis rumicis decoctū, artemisiz, dictānum. Singula ex his cocta cū uino, aut trita et pota, sanguinē ducere creduntur. Cōueniūt autē hęc his in quibus purgationes impediuntur, uel guttatim purgantur, aut occlusio ueteri adest. Auxiliantur autem & declinationibus, & reatibus sursum uersus, & strangulationibus ueteri.

*Que stercora euacuant.*

Cap. clv.

Stercora euacuat styrax deuoratus, mastiche cū aqua frigida trita pota, scrupul. x. ii. pondere, aloē drach. i. terebinthinae cochlearium, sinapi, allium cum oleo & garo seruclatum, ficus cum nitro, cnicij seminis medulla. Omnia uero prædicta ad tenuia intestina commoda, etiā magna intestina purgant.

*Lumbricos educentia.*

Cap. clvi.

Lumbricos rotundos & latos & ascaridas expurgant ea quæ de tenuibus relata sunt, in potu accepta. Propter uero expellit ipsos, auriculæ muris succus cum melle potus, aut cum zytho, uiriusq; cyathi mensura. Senecio in cibo acceptus, sanonij cum cum fico comestum, abrotoni decoctum, intestina terræ trita cocta cum passo pota.

*Sudores excludentia.*

Cap. clvii.

In potu accepta sudores excludunt, cuminū, baccæ lauri, anisum, uiter, serpillum, calamintha, polij, raphani cortex comestus, costus, fisybrium, dictānum, artemisiz,

artemisiæ, cardamomū, libanotis, mel, lac bubulum, calia, tunc odoratu decoctū, succus cyrenacis ceteris magnitudine deuoratus in frigidioribus morbis, chamædrys, castoreū cū aqua multa, centaurei magni radix, radicis capparis cortex, ligusticum, petroselinū, nigella. Hæc aliquādo cū uino, aliquādo cum uino mulso bibuntur, & sudores mouere creduntur. Sed & pistata comesta sudores citra molestiā dent. At uero sorinsecus illia sudores mouent, nixū cū oleo, ungentū irinū, anethinū, chamæmelinū, laurinū, raphaninū, lycionū, myrobalaninū, althææ, costus, balsamū, aristolochia, calia, calamus aromaticus, libanotis, singula cū oleo cocta. Suffusa uero sudores mouet, castoreū cū pulegio, semē balsami, bdelliū, uiticis semē, ut edum est his ad morbū regimū, & ad eos qui ob frigiditatem, aut cutis adstrictionem, nō sudant.

Que euacuant & corrumpunt pediculos omnis generis circa corporis superficiem. Cap. CLVIII.  
Sandaracha, aristolochia, staphis sylvæstris, sulphur uiuum, cinamomum, calamus aromaticus, calia, pyrethrum, dnis quercinus, cucumeris sylvæstris radix.

De infusionibus sedis.

Cap. CLIX.

Plurima mala quæ in perniciem animalis generantur, propinat uictris suppressio. Sequitur enim ad ipsam uentris adstrictionem, capitis grauitas & uertigo, euerfio stomachi, lanciaio uomitoria, nauisæq; ac prostratus appetitus, oris siccitas & amaritudo, rusticus iniucundi, ac uirosi, spiritus graueolens, somni suspensio, ac iniucundi, inflationes, tormina, uolulsi. Generat itē plenitudinis, et articulares, podagricosq; ac coxendicis morbos, omniaq; auget, & maligniora ac diuturniora mala efficit. Aliquando uero etiā perniciofa ac letalia. Contingit autē infusio num per sedē usus etiā in alijs affectionibus, quarum ex parte mentionē faciam. Ex infusio nibus igitur quæ iniiciuntur, aliæ simplices sunt & teneræ, aliæ acres, alię uero aliū usum ac uim habent. Ex simplicibus igitur, aqua calida ipsa per se ipsam facit, eliciendorum stercoreum gratia, in cōtinuis febribus, malignisq; ac ætuosis, & in his qui ex lōga imbecillitate uires rescolligunt, in quibus difficiles feceris sunt. Calidiorē autē immitimus, inflat enim tepida. Verū aqua & oleo utrum in detentioe duriorū stercoreū, & in his qui uulerosum ac mordacē sensum circa intestina habent. Vitare tamen aquam & oleū oportet, ubi capitis grauitas fuerit, aut stomachus subuerfuit, aut prostratus appetitus obueniret. Rosacē autem pro oleo cū aqua inieciunt, aptū est in ætuosis febribus, & feruoribus excellētibz circa media, & maxime circa colū. Caput autē complet, & minus lubricum est quā aqua & oleū. Immitēdum est autē rosacē quarta aquæ parte. At uero cū ouo & pisanæ succo iniiciuntur rosacē in ætuosis febribus, aut ubi mordacitas circa intestina adest. Chamæmelinū uero oleū, & oui luteū ac candidū, cū pisanæ succo infundimus ad noctē, in ardentibus febribus, iubentes ipsum cōtinere per totā noctē. Nam & somnū lucundum inducit, & causas febris sequēti die secum educit. Buryrū uero cū aqua inieciū morsus & tormina mitigat. Modicū autē esse oportet in his buryrū. Facit et ad eos in quibus propter inflammationē intestini recti desinētur stercorea, & in sordidis ulcerationibus circa intestinū. At fornigraeci decoctū ex aqua citra pinguedinē infundatur in febribus ex pituita accen-

sis, & in mollibus ac mulierosis corporibus, et in intestinorū morsu. Caput autē abūde cōplet. Quapropter nō utendū est eo, nisi caput à læsione fuerit alienū. Maluæ autē decoctū conuenit in torminibus ac moribus, & præsertim si durū subest stercus. Seminis lini uero decoctū in corporibus ac morbis siccis cōuenit. Vitile est & moribus, & nauisæbundis, & ualde siccis febribus. Caput autē cōplet quidē, nō similiter autē uelut fœnumgræci. Pisanæ uero succus stercorea dura dissoluere potest, & intestina extergere, & morbus mitigare. Alicæ succus morbus quidē mitigat, maxime uero cōuenit cardiacis, & qui ex animi deliquio exoluantur. Nam ad hoc quod nutrit, etiā uires reficit insulus. Insupereq; lubricitatem subiectis stercoreibus exhibet. Furfurū succus febribus siccis, & doloribus colidis, & intestinorū ulcerationibus cōmodus est. Exterget enim absq; morsu. Portulacæ succus febribus ac cōmodatissimus est, in moribus ac feruoribus, cū alijs, tū in quibus propter durorū ac acriū stercoreū excretionē, anus autē intestinū rectū læsum, ignis sacri affectionē incurrit. Verū in his mīscere ad succum oportet & ouum, & rosacē. Sed & per se succus portulacæ cōmodus est, ubi sacri ignis ardor in profundo circa intestina cōstitit. Lac iniicitur, ulceratione & inflammatione circa intestina cōstitit, itemq; in renibus & uesica atq; utero. Serum lactis insulum, egregiē stercus educit, & omnes superfluitates in intestinis repertas expellit. Exterget etiā sordidiora intestinorū ulcera. Verū citra coagulū paritur. Oleum per se immīssum calidum, cōmodus est inflammationis intestinis. Idoneum est etiā in extremē senibus, in quibus stercus induratur. Aqua multa cōuenit insula in mīoribus febribus, & in mulierosis corporibus, & in decrepitis, quibus intestinū reatum aut colū perfrigescitū est. Rutæ decoctum, itē anethi, et cumini cū oleo, dissoluit flatus, quapropter colicis immititur. Oportet autē in his esse duas partes decocti, & unā olei. Fœnigraeci succus buryro & terebinthina ammixtis, ita ut sit de utrisque quarta pars succi, maxime mitigat tormina, siue conuulsiones circa intestina. Nā & diu intus manet citra mordacitatē, & superfluitates educit citra turbationem. Vitissimus est etiā ad uteri morbus. At pisanæ succo miscetur buryrū & mellis ualde parū, & fit cōmodus in detentis stercoreibus propter intestinorū ulcerationem, & in sordidis intestinorū ulceribus. Rutæcum oleū cum buryro & terebinthina, uisiter infunditur in colicis doloribus. Aliquādo uero picis liquidæ drach. iiii. aut bituminis drach. iiii. cū rutæ oleo terentes infundimus, & sedat dolores, & pici uisiter euacuat citra molestiā. Aliquando uero lanas sordidas in uino dulci coquimus & excolamus, atq; hoc ipsum oleo rutæcum ammixtū infundimus, & coli dolores sedat, ita ut sint uini mēsuræ tres, olei uero duæ. Si uero neruorū ex quibus testes pendunt, aut uiscera dolor affuerit, etiā petroselinū leuissimē utrius rutæcum oleo infuspergat. In doloribus uero abscessuum, aut doloribus ulcerosis in intestinis, buryrum cū māna thuris immitimus, aut medullā cerui aut uisiter tulli cū oleo. Vbi uero frigidi fuerint morbi, & dolores leni, galbanū cū buryro iniiciuntur, ut sit galbani drach. una, buryri sexcūx. Aut styracis oboli tres cū buryro. Cæterū acris insulus utrim in ischia dicis, lethargicis, erecū ceruicē spirantibus, & frigidis

morbis, & ad eos qui letale pharmacum acceperunt, & in his quæ propter frigiditatem, aut concretionem in grumos, occidunt. Proinde in frigefactis toto corpore, syderatis, ichthiadiscis, ac nephriticis, castoris obol. iiii. tritos cum oleo immittimus addito modico sale. Verum pro sale nitrum addimus, quò bis aut ter promptitudinem ad excernendum facere uolumus. Sal etenim acuatim quidè mordet, non ueluerat autem diu ipse morsus. At nitrum caput male afficit ac replet, & stomachum euerit, quale nihil salii adest. Efficacia autem sunt ad paulò ante relatos, garu à siluro, marina aqua, muria, decoctum centaureæ, colocynthidis, aristolochis, cucumeris sylvestris radidis, agarici, thymi, chamæpityos, seminis rosmarini. Hæc enim & sanguinem ducunt, & hoc ipso affectiones leuant.

De glandibus.

Cap. CLX.

Glandibus subditiss utimur, aliquando ab egrorū imbecillitate, qui infusus uti nō possunt. Aliquod propterea quòd stercora sint apud intestinū rectū, & infuso nō habeant opus: præsertim in febribus uehemētibus ac ardentibus, & materia sursum repente habētibus, in quibus notius est infusiois usus. Nam in his absq; omni molestia educuntur superfuitates insite, per glandes subditas. Cōmodè sunt etiā omnibus frigidis capitis affectionibus, altiore somno preffis ac deliris. Cōtingit etiā ipsorum usus sæpe in his quibus nō excernitur id quod per dytrem immisum est. Præparatur autē diuersimode glādulæ ipsæ. Nam & ex melle coctio, & sale tosto, & nitro præparantur. Et ex cumino & ruta nitroq; ac melle cocto, in quibus inflatio magis infestat. Sed & thymus tritus cocto melle excipitur. Et cydaminus trita cū melle. Et absinthiū, aut abrotonū, aut lupinorū farina cū melle. Hæc autem glandula ad lumbicos cōmoda est. Aut hyssopū & tragoriganū & epithymum cū melle. Hæc in stomachi subuersioe utilis est. Aut granum cniidū cū resina sicca siue melle cocto. Aut pyrethrum cū resina sicca. Aut sinapi cū sicca resina. Aut centaurei cum pice & cera. Hæc cōmodè sunt in partium resolutione. Aut bitumē, radicis panacis parū, hyssopū, galbanū, & resina sicca. Vtilis est hæc glans ad resolutio totò corpore, & propterea facultate excernēdi debiliē habentes. Facit & in resolutione intestini recti. Facit ad ascaridas. Potest autem pro melle resina sicca in usum assumi, aut pix, aut ficus pinguis sima trita, aut uua passa exēptis granis, aut sapo. Optima uero glandula fit ex folijs mercurialis uiridibus tritis ac efformatis & siccatis. In infantibus autē etiā grumus salis inditur, cepa, & ac porrū capitatum.

De tomentis siue floccis.

Cap. CLXI.

Sæpe etiam opus est aliquid subdere, in his qui scissuras aut condylomata in ano habent. dilantantur autē hæc à glandium duritie. Vnde cogimur tomentis pro illis uti. Materia uero horum sunt omnia ante relata, quæ trita cum melle, & tomento siue flocco excepta ano induntur.

De aëre. Galeni.

Cap. CLXII.

Boqus est aër in omni tēpore qui exactè purus est. Talem autē fuerit is qui nō ex stagnorū aut palustris locorum euaporatiōe turbatur, neq; ex barathro quopiam uenenosam aurā concipit. Velut uerbi gratia. Si ex quibusdā doas magnā diuitatem expurgantibus cōturbatur, malus est. At uero & qui nebulosus est, non est bonus. Quemadmodum etiā qui in regione

caua undiq; altis montibus inducitur, malus est & æstuosus ac strangularius. Qui uero in mōtibz altisq; regionibus est, & nullā aurā suscipit, salubrior est, cōmodus erectæ ceruicæ spirantibus & tabidis, & omnibus thoracis ac capitis affectionibus. At qui in humilibz regiōibz purus est, cōmodus est animo deliquētibz ac senibus. Marinus uero hypodiscis et fluidis affectionibus, & præsertim frigidioribus utilis est, & neruis per consensum affectis, & prostratæ appetitæ. Qui uero in petrosis locis est, hyeme quidem grauis est, frigidus enim est: æstate uero æstuosus est. Malus est etiā qui ex metallis exhalat. Qui uero ex argillosis, stomachū exoluit. At ex locis terræ fuluæ, magis priore siccatur. Optimus autē est ex terra nigra. Sed & circa anni tēpora, mutationes aëris fiunt. Et uerno quidē tempore humidus & calidus est aër. Aestate uero siccus & calidus. Autumno frigidus & siccus, hyeme frigidus & humidus. Rursus autem in singulis tēporibus tres differentiæ fiūt, prima, media, & ultima. Media itaq; sincerissimū temporis tēperamentū habet. Prima uero & ultima à uicino tēpore imminuūtur. Sed & luna secundū mēsem quatuor differentiās in aëre operatur. Primus igitur septenarius us à nouilunio usq; ad septimū diē, similis est ueri, humidus & calidus existēs. Secundus uero septenarius usq; ad pleniluniū, æstati similis est. Tertius sextenarius decrescit luna, autūno. Quartus et ultimus, hyemi. Sed & singulis diebus differentiæ aëris fiūt. Matutinū enim tempus humidū est & calidum, uelut uer: Quapropter etiā corpora tū sanorū, tū ægrotorū remittuntur, ut etiā febricitantibus hoc tēpus facillimè tolleretur. At mediū diē, æstati assimilatur. Crepusculū autūno, uespere hyemi. Quin & noctis prima pars ueri assimilatur, media æstati, & reliqua cōsequetur.

De uentis, Adamantij Sophiste.

Cap. CLXIII.

Quandoquidem uero ex terræ exhalationibus uenti generantur, etiā de his paucis tractandum est. Ventos quidem parturit terra, parit autē fuliginosæ exhalationes. Nam caliditas humiditatis inuoluit, sicciores exhalatiōes, & uelut fuliginosæ faciēs, uentos generat. Siccam autē exhalationē nunc accipe ad cōparationē aliorū, uelut si uisū siccus dicamus. Vniuersales uenti duodecim sunt numero. Oriētales tres, eurus, subsolanus, cæcias. Occidentales tres, aphricus, fauonius, thrascias. Vnus autem meridionalis appellatur aufser, & unus septentrionalis boreas: ut sint relati octo. Alij uero quatuor inter relatos medij sunt, et ab angulis mūdi excitantur. Inter orientē & meridie, Euroaufser. Inter meridiē & occidentē, Aphricaufser. Inter orientē & septentrionem, Aquilo. Inter septentrionē & occidentē, Argestes, siue Circius: ut sint omnes uniuersales xii. Alij uero qui uernaculi sunt singulis regionibus, spurij existūt. At uero aliæ exhalationes ex terra fientes, humidiores his sunt quæ uentos generāt. Si quidē igitur modica & tenuis fuerit exhalatio, uapor nubilosus generatur. Si uero amplior & crassior, caliginosus. Si uero adhuc crassior, tenebricosus. Plurima uero ac crassissima humiditate exhalat, uapor diffunditur in ambientē roscidus. Ex his quatuor exhalationibus cōcretales rores & imbres fiunt ac deferuntur: cōgelatis uero pruinae, & nives, & grandines, pro frigoris qualitate ac quantitate. Nulla uero harum uentū generare solet, quū segnes sint & impetū carcat. Et humida quæ exhalatio quæ uapor

vapor appellatur, rores & imbres facit. Siccor autē facit ventos, & est sicca humidē contraria. Quomodo uero sepe simul imber & uetus frigidimus, quia ex alio atq; alio loco afferuntur. Quū enim ex diuersis latitudine locis contrariæ exhalationes sunt, tunc & pluit & flatus fit. Cor autē aliquando post pluuiā uenti fiunt, aliquādo post uentos pluuiā sequitur dicimus, Quoniam caliditas in terra nō habet in illo tempore humorē quē accēdat, & propterea manet ociosa, ubi uero arripit pluuiā ē humiditātē, efflorescit: et per materię incensionē fuliginē exdians uentos efficit, qui iam sanē cōsumpta pluuiā nube, manēt in fermentationē spirātes, aut impellunt id quod ipsos genuit. Pluuiā itaq; hoc modo uentos generat. Ventus autē pluuias hoc modo generat. Ostendimus quod cōmūnis est caliditas utriq; exhalationibus. Verū humiditas quāritate diuersa est. Quum igitur multa fuerit caliditas, larga uero humiditas, tūc appropinquante humiditātē in superficie exurit, & fuliginē simul ac uapores facit. Transpirans autē caliditas ex multa humiditate paulatim immittitur, & non amplius humiditātē exurit, sed diffundit, & uapores pro fuliginē facit. Atq; sic succedit imber post. Et sepe ad multos dies obūnet pluuiā calido exsoluto, & non amplius materiā exurere potente. Cor autem multi & assidui boreales ac annuierarij uenti in æstate fiunt. Quoniam sol sub boreali polo plurimā reperiens humiditātē, partim in niue, partim in aquis cōgelatis, & hāc paulatim eliquis, diuidit quidē in fluuioſū ac stagnorū generationē, effundit autē & fontes in terrā. Et propterea multas exhalationes efficit, quas in flammā exurēs, uenē cū caliditatibus multo tempore in terra occultatis, fuliginosas ipsas reddit, & quod exurit ad uēti diuturni fluxū paulatim redigit. In cōmūni igitur omnis uentus longiorē aëris fructuonem exhibet corporibus, uolēto motu aërem inducēs. Porro locales uenti similes sunt locis ex quibus spirāt, a salubribus locis, salubres, a morboſis, morboſi. Quare ex relatis de aëre, etiā de his cōſectare oportet. Quo uero in summa dicamus, omnes locales uēti uniuersalibus morboſiores sunt. Nā corpora inaequaliter afficiūt, neq; totum aërem cōmouentes, neq; per totū diem spirantes. Maximē enim locales uenti circa matutinū solū tempus spirāt, quos nautæ Apogeos, uelut ē terra eleuatos appellāt. At ex uniuersalibus uentis hi qui a meridie spirant Austri appellati, calidū temperamentū habētēs semper, ferme etiā humidū sunt. Trāsmittuntur autē ad tempora anni, & sūt calidi ac sicci. Et propterea uarios morbos generant. Boreales uero frigido sunt temperamētō, & ideo omnium uentorum saluberrimi, & præsertim in calidioribus ac carnosius corporibus. At uenti orientales uehementissimi sunt, & morbos a siccitate contingentes efficiunt. Occidentales autem humidū sunt ac lenes, et corporibus nostris magis familiares.

De accessione ac significatione stellarij. Cap. CLXIII.

Quandoquidem etiā stellę in celo orientes iuxta tempora a deo ipsis ordinata, & similiter occidētēs, aëra mutant, ut contingat ex hoc etiam uentos aliās aliter spirare: necessarium duxi hic tempora indicare, in quibus earum quę palam aërem alterant, ortus & occasus fiunt. Nam sanorū corpora, & multo magis ægrotorum iuxta aëris statū alteratur. Mense Martio qui Dyftrios Græcis est, equus mane oritur decima nona die. Mense martio die xxxiii. æquinoctiū

uernū est, & maxima aëris turbatio. Mense aprilis hoc est Xandico, prima die intempta nocte pleiades apparēt. Mensis april. x. x. pleiades uesperī occultantur. Mensis april. x. x. pleiades cum solis ortu oriuntur, & est maxima circa aëre turbatio. Mensis aprilis x. x. x. orion uesperī occultatur. Mense Artemisio, hoc est Maio, prima die hyades simul cum solis ortu oriūtur. Mensis maij quarta, lyra uesperī oritur, & aër multū alteratur. Mensis maij sexta, capra mane oritur, & ualde alteratur aër. Mensis maij septima, pleiades mane apparēt, et aër sedari incipit. Mensis maij x. x. hyades mane apparēt, & aër ualde alteratur, pridie aut nudiustertius eius diei. Mensis maij x. x. x. capra uesperī occultatur, & nudiustertius eius diei aër mouetur. Mensis iunij secundā, aquila uesperī oritur. Eiusdem sexta arcturus occidit. Nona delphin uesperī oritur. Vigesima quinta orio mane oriri incipit. Sunt autē solstitia æstiuā, & aër tribus diebus antea ualde alteratur. Mensis iulij tertia orio totus oritur. Decimaquarta procyō, siue canicula mane oritur. Decima nona canis oritur, & contingit maxima aëris turbatio, aliquando etiā nudiustertius eius diei. Vigesima quinta aquila mane occidit. Mensis augusti decima quinta lyra mane occidit, decima nona delphin mane occidit. Et est mutatio æstatis ad frigiditātē. Vigesima octaua uindemiator mane oritur, & malus nauis occidit. Et est finis dierū post exortū canis. Mensis septembris septima capra uesperī oritur. Decima septima arcturus oritur, & alterat sequenti die aërem. Decima nona spica mane oritur. Alteratur aër duobus diebus antea. Vigesima quinta æquinoctiū fit autumnale, & est maxima aëris turbatio tribus antea diebus. Quare cauendum est ne uenam fecerimus, neq; purgemus, neq; aliās corpus uehementi motu moueamus, a decima quinta septembris usq; ad uigesimalam quartā eiusdem mensis. Mensis octobris sexta corona mane oritur, & est uehementis aëris mutatio. Septima hodi uesperī oriuntur. Decima septima hyades uesperē oriūtur, & magna fit aëris turbatio. Vigesima tertia uenā cū solis ortu pleiades occidunt. Et cōtingit pridie maxima aëris turbatio. Mensis nouēbris sexta pleiades mane occidunt, & incipit aër sedari. Vndecima lyra mane oritur. Vigesima prima hyades mane occidunt, & sequenti die turbatio fit circa aërem. Vigesima septima orion oritur, & corona occidit. Mensis decembris prima, canis mane occidit. Obseruari est autē a multis, quod si tempestiua fuerit hæc dies, perseverat plerūq; turbatio aëris ad dies xxxvii. Si uero serena fuerit, per tot dies serenitatem fore significat. Decima hodi mane occidunt. Vndecima capra mane occidit, & perturbatio aëris fit postridie. Vigesima tertia solstitium est hybernum. Mensis ianuarij quarta delphin oritur. Quinta aquila uesperē occidit, & fit turbatio uehementis post duos dies. Vigesima quinta illustris stella in kone occidit. Mensis februarij sexta fauonius spirat. Vigesima secunda malus nauis uesperī occidit, & est turbatio aëris magna. Vigesima quinta arcturus uesperī oritur. Vigesima sexta hirundines uolant & apparent.

De aquis, ex Rust.

Cap. CLXV.

Aquarū potabiliū quinque sunt uniuersales differentię, pluuiā, fontana, puteana, fluuialis, stagnina. Ex his apparere aqua pluuiā leuissimā et facillimē mutabilis, & in alijs affectionibus potu optima, si statim exci-

piatur ac coletur. Verum febris & his qui bilem supernæ ac infernæ reddunt, & regio morbo incōmoda est. Mutatur enim facilè & in bilem trāsīt. Idonea uero est ocularijs medicamentis, ad fluxus aut ulcera destinatis. At his quæ uisum acutiorem reddunt, inepta est. Itemq; ad metallicorum pharmacorum loruram. Adstringit enim amplius quàm fōtana. Quare neq; extergit, neq; concoquit, neq; madescit, & excreções impedit. Diuturnior autem acerbior fit, & difficilius transīt, & ægius secerñitur, tardius item concoquitur ac digeritur. Generat autē destillationes, præsertim si frigida bibatur. Fōtana uero aquæ, quarum fontes ad sepiscitionem erumpunt ex petris stillatiles solè auersum habent, incōstiles ac tardī trāsītus sunt, & tardè calefiunt, ac frigeſcunt. Quarū uero fontes ad orientes erūpunt, & per meatū quendā aut terram purā excolantur, caleſcuntq; ac frigeſcunt citissimè, hæc optimæ sunt, nisi ex clodis quibuscūq; uisum ipsis accedat. At puteana frigida est, tertia, dissilculter excernitur, ægrè digeritur, & propterea æstus so stomacho aut uentri cōmodior est quàm fontana. Fluuiates autē aquæ & stagninæ omnes male sunt. Nisi aqua excepta, hæc enim omnibus uirtutibus exornata est. Nam & in potu luctida est, & moderato tēpore in aluo moratur, siccūq; extinguit, & si quis frigida bibat, minimè moleſtat, & ad cōcoctionem ac digestionē utilis est. Vnde continū, & robustū, & benè coloratū corpus facit. At aliorū fluuiorum aqua egrè cōcoquitur, siccatur, & stuculosa est, & præsertim si uisidas aliquas regiones pertranſit. Meliores autē sunt fluuij, qui per fontes perpetuos fluunt, & alijs fluuijs non miscentur. Stagnina uero aqua, propter cōnosam circūferentiā, limosa & grauis est: & propter stationem ac immobilitatem, uelut mortua & putrefacta. Quare nunquā aliā præſente aqua, exhibēda est hæc debilibus. Porro iuxta terrā quoq; ac regiones, plurimæ aquarū differentiæ sunt. Verū ut in summa dicā, quæ gustui congrua est, & cui inhabitatorū experientiā testimonium præbet, optima censenda est. Nam quæ citò caleſcit ac frigeſcit, & facillè carnes ac alia omnia coquit, ea citò cibos in uentre concoquit. Quæ tūq; uero aquæ ad strictionem, aut falsedinem, aut nitrositatem, aut crassitatem, aut aliud quid in gustu detegunt, male sunt. Ite quæ graue olent, & quæ concretionem superstantem habent, & subdentiā fecidam ac solidam, & quæ instar lapillorum æreis uasis adhærent, & quæ hirudines nutriunt, aut talia quædā praua animalia: & stantes, & palustres, & quæ sunt in metallis aurī & argenti, aut aluminis, aut sulphuris, aut similibus. Et quibus rades insitæ sunt, incōmodè sunt. Et quibus uicinæ sunt calidæ aquæ siue spontaneæ erumpentes, omnes tales malæ sunt. Optimum igitur fuerit talem aquā præcoquere in fictilibus uasis, & frigeſcere, & rursus calfactā bibere. Cæterum in peregrinationibus aut exercitū, fossæ consequenter faciendæ sunt, ab altissimis locis ad decliues, & per has ducenda est aqua, ita ut in totas fossas terrā dulcis ac pinguis mittatur, ex qua fictilia sunt. Semper enim in fossis relinquitur aquæ malicia. In summa, omnis aqua tardè transīt, ægrè concoquitur, & stuculosa est, & præsertim frigida destillationē facit. Si uero ab acceptis in cibo oleribus quis aquam bibat, maius est periculum, ne homo tenuia capitis ulcuscula, & scabiē, &

lepras, pustulas, impetigines, furfures, putrida ulcera, herpes, scalyriales, aut ex his aliqua incurrat, & ad hoc urinas mordaces talesq; etiam egestionē habeat, & præsertim si nitrosa fuerit aqua. Incōmoda est etiā thoracī, arteriæ ulceratæ, nitrosa aqua, renibus item ac uesciæ & omnibus ulceribus. Emendant autem nitrosa aqua, cibi hebetantes ac uinum. Crassam uero, secantes & attenuantes, uelut sunt alſia & similia. Aluminosam, uinum tenuissimū, omnia urinam cientiā, & omnia excretionem impellentia. Videtur porro aqua cōuenire capitis doloribus, hebeti uisui, comitali morbo, articulari morbo, tremulis, resoluſis, per se, & cum melle pota. Commodior est autem his quæ ab uero strangulantur, & qui bilem generant nigram siue flauā, à quibus os uentris roditur & robusto uentri, ac intestino ieiuno, & iuuenibus exudantibus carnosiss, & omnibus pinguis, & nimium purgatis, & ex uulnere sanguinem fundentibus, aut ex naribus, aut alio loco. Commodat & æstusq; febri tempestiuè data. Cōuenit etiam his qui assidue in somnis semen effundunt, & qui aſſis seminis profluuio laborant, in potu accepta: quāquam proſit etiā in ipsa natate, ex eaq; perfundi conuenit mulieribus è fluxu, aut pica laborantibus. Cōuenit singulientibus, & oris graucolentiam habentibus frigida pota. Tepida uero cōuenit morbo comitiali, capitis doloribus, lippientibus, gingiuis dentium coriosis, dentibus perforatis, gingiuarum abscessui, & gingiuis cruentis, faucibus ulceratis, tonsillarum morbis, fluxioni capitis, atræ bilis seruoſi, bilis supernæ ac infernæ erumpenti in principio, & uomentibus in febrī biliosa. Conuenit etiā tepida aqua quæ frigida impedimentū fuerit, & his qui ulcera habet circa seppum transuersum, & sanguinem spuentibus, & rupturis in succingere costas membrana. At uero calida aqua conuenit, ubi oportet excretionem præparare, & ubi quid attenuare, & ubi dissindere, aut liquefacere, aut mollire, aut eluere, aut concoquere, aut discutere uolumus. In uniuersum igitur calida pota hæc potest. Particulatim uero, mucum ducit, & scretum adiuuat, & dolorem omnē mitigat, & præsertim in præcordijs ac intestinis, ructum mouet, & flatum prouocat, urinam ac secessum ducit. Bona est etiā ad concoctionem, ac digestionem, & nutritionem, atq; augmentū. Menses ducit, neruis & cōuulsionibus idonea est. Pleuritidī itē ac peripneumoniæ & angine. An uero nutriat, aut non nutriat, & an sit alimentū uehiculum, non est propositum hic quærere. Quod uero dicere necessarium est, hoc est, quodd sine aqua alimentum concoqui non potest. Sicut neque citra aquam quicquam commode coqui potest. Cæterum aqua lixiuū pota splenis prodest. Et si quis panem cum tali aqua præparatum ipsis præbeat, multum prodest.

De Balneis. Ex Galeno.

Cap. CLXVI.

Balneæ quædam sunt dulcia, quædam qualitate exortia, quædam qualitate aliquam habent. Et quæ aſſiam quandam qualitatem habent, partim ex nostro studio uim habet, partim naturalem uim per se possident. Primum igitur de dulcibus dicendū est, quādoquidem horum usus frequenter existit. Dulcium itaq; aquarum uis humida et calda est, si quidem fuerint teperate. Si uero tepidæ fuerint, humida & frigida. Si uero calidiores æquo factæ fuerint, calida quidem

quidem ipsarum uis est, nō autem similiter humida. Inhorrescere enim cogunt corpora, & meatus ipsorum densari, ut neque extrinseca humiditate fruantur, neque ex internis superfluitatibus quid euacuetur. At enim à temperatis incipiendum est. Temperatę itaque semper humectant per seipsas ac calefaciunt. Continuitatem autem ipsas aliquando aut discutiunt humiditates ex corporis quibusdam partibus, aut mollires, aut concoquere, aut corroborare uirtutem, aut dissolvere. Ad hec tamen etiam quantitas ipsarum non parū confert. Comoda uero sunt talia balnea, dulcia inquam & repera, in febris siccis & humoris exoribus, & praesertim in immodice sitentibus, & in fortī insolatione, & in pustulis scabiosis. Oportet autem & aërem balnei humidum efficere paucissimo & parietibus atque conspersis. At uero calida ex nostra industria parantur balnea, quum frigiditatem infestam sedare uolumus, aut lassitudinis affectum, aut conuulsionem, aut dolorem mitigare. Fiant autem calida, calfactorijs quibusdam aque immixtis, uelut pulegio, origano, hyssopo, thymo, thymbra, salua, folijs lauri, pyrethro, chamæpity, panacis radice, rosamarinī semine, & similibus. Balneis autem discussorijs utimur, aut habitum corporis graciliorē reddere uolentes, uelut in pinguibus, & ex affectione tumefactis, aut toto corpore, aut aliqua parte, uelut ab domine, testibus, pedibus, uelut in hydropicis cōtingit. Utimur etiam in fluidis ulceribus, propter subiectam in toto corpore multitudinem, aut uaricibus ulceri subiectis. Fiant autem discussoria balnea, iniectis aque talibus quibusdam, qualia sunt, sal, nitrum, aqua marina calefacta, & mel aquae ammixtum, aut staphis syluestris cocta cum aqua ex cinere ficulneo aut uitis percolata. Item baccae iuniperi cum eadem aqua coctae, & sulphur eadem aqua elutum, & adarce & alumen cum eadem coctum. At uero mollibus, & lenibus balneis utimur, in inflammatione ac duritie quadam partium. Talia autē sūt malua in aqua cocta, tum hortensis, tum syluestri, & semine lini, & fenicragræ, & meliloti. In fluidis autem inflamationibus, plantago aut polygonum aquae incoquitur, aut malicorium, aut rubi folia. In conuulsionibus autem inflammationem minantibus, utimur his quae iam relata sunt in inflammationibus absque fluxionibus. Maxime uero prodest his aqua & oleum, in quibus malua, fenemgræcum ac semen lini sunt incocta. Si uero duritia est circa inflammationem, praedictis discussorijs utemur.

De balneis naturalibus. Archigenis. Cap. clxvii.

Ex balneis naturalibus quaedam sunt nitrosa, quaedam salia, quaedam aluminosa, aliqua bituminosa, aliqua sulphurelenta, aliqua ferri, aliqua aeris qualitatem habent. Quaedam uero ex his composita sunt. Horum autem omnium uis est ficcare. Aliqua uero unā cum hoc quod siccant, etiam strenue calasciunt. Quaedam unā cum siccando etiam adstringunt, uelut aluminosa, ex parte uero etiam salia, & quae aeris qualitatem habent. Omnia autem sunt comoda humicis & frigidis praeter naturam corporibus, & talibus morbis diuturnis. Quapropter cōueniunt morbo articulari, podagræ, resolutionibus, nephritidi, anhelosis, fracturis calli inductione egentibus, ulceribus fluidis, inflammationibus diuturnis & iam induratis. Et nitrosa quidem ac salia capiti conueniunt,

& thoraci fluxionibus uexato, & stomacho humido, & hydropicis, & tumoribus omnibus. Aluminosa uero, sanguinis refectioni, stomacho uomentis, & his qui immodice ab hæmorrhoidibus euacuantur, & foeminis quae inordinate purgantur, aut nimium purgantur, & quae circa manifestam causam frequenter abortiunt. Profunt & his qui immodice exudant, & tardē concoquunt, & tumoribus furasum. Commodum etiam uaricibus. At sulphurelenta & neruos molliunt, & tenasmi dolores mitigant. Verum stomachū exolunt ac subuertunt. Purgant autem cutem, & propterea conferunt utilitagini albe ac nigrae, lepraes, scabiei, impetiginī, & ulceribus antiquis, articularum fluxionibus, spleni indurato, hepaticę ac utero, resolutis, coxædico morbo, & pruritui. Bituminosa uero caput replent, & sensum infumenta laedunt. Perseueranter autem calasciunt, & cum tempore molliunt, & praesertim partes circa uterum & uescicæ colum. Quae uero aeris qualitatem habent, ori & tonsillis, & uiaę, atque oculis excellenter cōmodant. Ferri uero qualitate praedita stomacho & spleni conuenientissima sunt. Porro quae mixtam qualitatem habent, iuxta dominium mixtorum operantur. Oportet autem ingressus ad naturalia calida balnea circa turbationē facere, quo uis ipsorum remisso corpori allabens immergatur. Nā qui perturbati ingrediuntur, eorum corpus horrescens densatur, & nō suscipit ab aqua qualitatem. Cæterum bituminosis & sulphurentis aquis salientibus, caput supponere non oportet, facile enim inde laeditur.

De frigide lotionē. Ex Galeno. Cap. clxviii.

Frigida balnea conueniunt incupatē sanis. Corroborant enim totum corpus, & cutem duram ac densam efficiunt. Optimum est autem hoc praedictum contra laxationem ab externis. Non autem dico conferre frigidæ lotionem his qui uulgarī uictu temere utuntur, sed solum his qui ex ætate uiuunt, & laboribus ac cibis conuenientibus utuntur. Sint autem neque ex uenere, neque aliis lassati, neque crudi, neque prius uomuisse debent, neque uentre malē affecti esse, neque uigilasse. Alioquin periculosus fuerit eius usus. Oportet autem inuolueri ad frigidæ lotionē paulatim adsuafacere: Et primum quidem in æstate ipsius usum auspicari, & primum non in sinceram frigidam ingredi, sed quae superficiem habet exolutam. Deinde ubi paulatim per totam hyemem adfueuit quis, ita ad frigidam accedere. Sit autem dies in qua auspicatur, & uentis tranquilla, & quāmaxime pro illo tempore calida, & in meridie initium faciat. Qui uero frigida usus est, sit erate circa quintum & uicesimum annum, sit animi alacris & ualde uirilis. Et primum fricetur corporis lineis diutius frictione duriore: Deinde per oleum fricetur consuetum, postea exerceatur, atque ita in frigidam descendat, non lenitē, sed confertim insiliēs, quo in uno tempore omnibus corporis partibus aqua circumfundatur. Nam quae paulatim appropinquat, horrorem inducit. Sit autem aqua uel dictum est, neque tepida, neque purē frigida. Postquam autem egressus fuerit ex aqua, à pluribus per oleum fricetur, donec cutis incalcescat. Et postea cibos plures quā soler ingerat: Nam plures appetunt à frigida lotionē, & melius concoquunt, & minus sitiunt: Quare etiam paucior potus ipsis dandus est.



De infessu in solium ex oleo. Galeni. Cap. CLXIX.  
Infessus in solium ex oleo, conuenient diuturnius cum frigore febrilibus, & lassatis, & dolentibus nervos ossibus incumbentes, & conuulsis, & urinae suppressae. Oportet autem quintam olei partem ad ignem calfacere: Reliquum uero in solium immittitur. Satis autem calidum sit, quod in parua solia balnearum immittitur. Quinta uero pars ad reliquum calfacta adijciatur, arque sic aeger inducatur.

De spongiae usu. Archigenis. Cap. CLXX.  
Spongiae usum assumimus in alijs quidem partibus, aut ad sordes incumbentes detergendas, aut ad sanie, aut sanguinem, aut pus, aut ipsa medicamenta, aut ut corpora à mordacitate aut pruritu uexata mitigemus. Verum in facie, ut spiritum renouemus ac resuscitemus, uelut in his qui animo linquuntur aquam adhibemus aestate quidem frigidam, hyeme uero laetiosam siue lactei teporis. In aegrotis autè cautè hoc faciendum est, non in principio, neque in augmento exacerbationis, sed in uigore ac declinatione. In principijs enim impetuum refocillamus per odoramenta. Vult autem Archigenes in febris ardentis excessu iuxta ipsum uigorem, ut non solum faciei spongiam adhibeamus, sed etiam pectori.

De aspersioibus. Cap. CLXXI.  
Sed, & aspersiones faciei assumimus in aegrotis, ob praedictas causas. Et aestate quidè in ardentissimis febribus frigidam adhibemus, hyeme uero calidiorem. Verum in simplicioribus febribus, & in stomachi subuersione, etiam poscam aspergimus. Cauendum autem ne diutius immoremur, & praeterit in his qui caput quod facie leditur habent. Nam delatio- nis in soporem grauiorem ac periculose frigiditatis initium praebet. Vitur etiam aspersio in oculis fluxione infectis, ocymis decoctum uelut efficaci- simum adhibentes, & ramulorum pinastrorum con- tusorum decoctum. Subijciatur autem mento spon- gia sicca, ut ne defluat aqua ad pectus.

De irrigationibus. Cap. CLXXII.  
Irrigationibus utimur ubi ob aliquam circūstantiam balneum adhibere prohibemur. Et in uigilijs, in fe- bribus, & ad delirantes ipsi utimur, uelut eff deco- ctum chamæmeli, aliquando etiam calicum papaue- ris. Quin & decoctis in oleo calicibus papaueris, ca- put irrigamus, & statim iucundus somnus sequitur. Archigenes autem praeceptorem suum Agathinum ex uigilijs delirantem, coëssit à delirio ac uigilijs liberauit, capite eius multo calido oleo irrigato. At in conuulsionibus caninis oleo scyonio calido, aut aliquo consimili caput perfundendū est. Item in his quibus nerui fortiter sunt afflicti. Si uero frigiditas & tremor ad afflictionem neruorum consequatur, etiam castorium ad scyonium ammiscendum est. Podagricos uero marrubio in aqua aut uino cocto irrigamus.

De infesionibus. Cap. CLXXIII.  
Infusiones assumimus in partibus inflammatis, aut ob balnei penuriam, aut propter uirium debilitatem, aut ob aliud quoddam impedimentum. In inflammatis igitur renibus, utimur decocto foenigraci, maluae horrensis ac syluestris, seminij lini. In calculosis ue- ro, iisdem propter inflammationem, & artemisiae de- cocto, ac rosamarinij, & peroselinij, ac spicae nardij. Ii- dem etiam utendum est in uescica, adiecta etiam ruta.

Ad uterum uero, artemisiae decocto, saluiae, & lau- ri, & similia. Ad colum autem, sinonis & panacis decocto, & lauri ac similia. Ad sedem, meliliodi, ca- licum papaueris & rosarū decocto. Ad fluxiones autem uteri & hemorrhoidas ani, plantaginis deco- ctum conuenit, & polygonij, malicorij, rosarum, ru- borum, ac similia. Ad uulnura uero cōuulsionem denudantia, aqua & oleum. Omnes igitur illinendi sunt, & inducendi usque ad imum umbilicum. Opor- tet autem & partes quae non madefiunt, prius inun- gere, & praeterit caput, & tegere ut ne repleatur.

De humectationibus. Cap. CLXXIII.  
Humectatio differt ab irrigatione, eò quod perseverā- tem ex adhibito auxilio habet utilitatē: Nam aut la- nam aut linteum humectantes impositum partibus affectis post perusionem siue humectationem. Ha- bent igitur minorem uim quam cataplasmata. Videtur autem ipsis ad caput, quod non probè ad cata- plasmata dispositum est, & ad eos qui ob debilitatē ferre non possunt cataplasmatum grauitatem, & ad praecordia inflammata, circa morborum principia, quum intempestius sit tunc cataplasmatum usus. Vitur etiam ad fracturas ac contusiones necessita- te experiente, quando emplastica pharmaca assumere non possumus.

De fomentis, perusione, cataplasmatibus, ac cu- ruitibus. Ex Galeno. Cap. CLXXV.

Fomenta cutem rarefacere solent, & facile transpirabi- lem efficere, & sanguinem in inflammationibus at- tenuare ac discutere, toto nimirum corpore tunc su- perfluuitas carente. Nam superfluitas quae redun- dat in quibusdam per omnem cutem, plus ad cale- scientem partem trahetur quam discutitur. Quapro- pter ante fomenta totum corpus euacuare oportet. Humida itaque fomenta inflammationibus conueniunt à biliosis moribus humoribus factis. Sicca uero his quae à tenui & aquoso sanguine productae sunt. Et leuia quidem fomēta mordacibus humoribus conueniunt: Mordacia uero & attenuantia, crasis ac uiscosiss. At uero calfacere praecordia cataplasmatibus aut irrigatio- nibus, non semper tutum est. Sed in illis solum egro- tis, in quibus nulla superfluitas in toto corpore ob- errat. Alijs omnibus extremum malum est. Cōtin- git autem in plenitudinis morbis, ut diuites magis quam pauperes male curetur. Plerique enim ipsorum praedictis non sustinent uenae sectionem, & quidē quum magis quam pauperes plenitudinis affectio- nibus corripiantur, ut qui etiam magis impleantur & ociosis uiuant. At qui curant ipsos medicis, eò quod relictum est maximum auxilium, arbitrantur se alto- rum usu expleuros esse quantum deest. Et sanè ipsi etiam aegri putantes quietum uictum, negligentiam esse, & quodcunque rādem facere, curationem esse, co- gunt medicos quotidie aliquid praecordijs adhibere, consentientibus sanè etiam medicis in hoc ipsum, ut semper aliquid facere uideantur. Hinc enim sperant se plus lucri facturos esse. Atque sic ipsi efficiunt inflā- mationes per ea quae faciūt, semper aliquid praeco- rdij adhibentes. Proinde contingit in illo tempore inflammationes incipere in diuitibus, in quo iam in pauperibus morbus est prope solutionem. Vena e- nim secta in principio praeterit continens febris, & pauperes, & serui diuitum plerique in quinta die iudicati sunt, aliqui uero in septima. At uero diuites, pleni

plenitudinem & superfluitates plures quam ferui & pauperes habentes, & uenæ sectionis auxilium transgressi, & postea quotidie per calidū oleū ſitū, & laxatorijs cataplasmatīs interdicti, inflammationem quandam conſtatā habent, aut circa hepar, aut ventrē, aut alia uiscera, aliqui in quarta die, aliqui in quinta, aut ſexta in ſexta. Viſiſti autem etiam tu qui eodem tempore dum fomentum adhiberetur diſſiculter ſpirauit, omni ſuperfluitate ad præcordia attracta & coſoliditate. Hic itaq; mortuus eſt, & alij innumerū quotidiē moriuntur, quū cataplasmata inſtar cucurbitæ attrahant ad uiscera ſuperfluitates ex toto corpore. Quidam uero etiā ipſa cucurbita uſi ſunt in præcordijs, hoc unum etiam illi cogitantes, ut uiderentur aliquid ſemper facere circa ægroſum. In principijs igitur dum adhuc ſeruitur fluxiones ad affectum lo- cum, melius eſt repellere ac reprimere, non attrahere ad ipſum. Comoda autem ſunt in principijs adſtringentia cum oleo adhibita: quæ ſimul & firmitatem addunt partibus affectis, ut ne facile afluētes ſuperfluitates ſuſcipiāt, & ſimul ſam in ipſis cōtētarū tenuitate intus reprimūt. Poſtquā uero latio quieuerit per repulſoria auxilia, & denſitas ex adſtrictione inducta partibus affectis, cōducet ſuperfluitates, tunc iam tempus eſt laxare, quo contentæ ſuperfluitates euacuentur: præſertim uero ubi ad hepar aut uentrem impetū fecerint ſuperfluitates, moderatē adſtringentibus ut conuenit in principio. Valde enim principales ſunt hæ partes. Imò ubi etiam tempus iam fuerit diſcutiendi firmatas, tunc quoque partes hæ adſtrictione opus habēt. Quare decocto in oleo abſinthio irrigabimus. In quibus autem fortiore adſtrictione opus eſt, omphadnum ſit oleum, in quo decoquitur abſinthium. In penuria uero abſinthij, meſlinum aut maſſichinum aut leniſſimum ad hoc ſufficiet. Si uero minor fuerit febris, etiam nardinū uigentium addatur. Si uero declinatio febris nō ualde mitis fuerit, à nardo cauere oportet, ut uero meli no. Quo non præſente, roſaceum ad nardinum miſcendum eſt. Similiter etiam cataplasmata compoſitam uim habeant, ex laxatoria ac tenui, & ex amara ac adſtringente. Quòd ſi colum fuerit affectum, aut alia inteſtina tenuia, aut muſculi præcordiorum, aut pellicula aluum & inteſtina amplectens, nequaquam miſcenda ſunt adſtringentia. quemadmodum neq; ſi uſica aut uterus, cum uelut diſtum eſt, neq; influxerit quid ampliùs, neque ſuperfluitas fuerit in toto corpore. At uero renes & thorax in medio reſtatorum ſunt: Neque enim multa adſtrictione in his opus eſt, neq; tamen exoluere conducit. Splene uero inflammato, in principijs adſtringentia miſcenda ſunt. Euacuato uero corpore, etiam diſcutienda. Quin & ſi cucurbitis opus fuerit, preuacuato toto corpore utemur ipſis, non in principio affectionum.

De cataplasmate ex fermento. Ex Lyco.

Cap. CLXXVI.

Hoc cataplasma diſſundere ac eliquare compaſta ualde poteſt, & aculeos inſixos extrahere, & tumores induratos mollire. Oportet autem fermentum diſſoluere in oleo ſufficienti, atq; ſic imponere. Quòd ſi uehementer efflere uolueris, nitrum modicum admiſce: Si uero etiam aceto diſſolueris fermentum, & rurſus coctum per cocturam ſpiſſaueris, conuenientiſſimum erit ad induratos tumores in ſplene ac he-

pate. Si uero thymum & pulegium, aut abſinthium, aut brotonum fermento miſcueris, optimum efficietis pharmacum.

De cataplasmate ex pane.

Cap. CLXXVII.

Cataplasma ex pane efficaciffimum eſt ad omnes inflammationes. Multis autem modis paratur. Nam & frigida aqua maſſaſtis, & tritis, & adiecto modo roſaceo, & coriandri ſucco, commodum ſit cataplasma inflammationibus ignis ſacri. Aut pro aqua, ex aceto paratur, atq; ſic magis conducit ſignificatio. Verum ſi pro oleo, butyrum addatur, commodum ſit cataplasma ad inflammationes ægre concoctiles. Paratur etiam ſic. Panis multa aqua diſſoluitur, ut ſucci ſpiſſitudinem habeat, & huic miſceatur oleum aut butyrum. Deinde coquitur ad compagē. Hoc præſtantiſſimum omnium eſt ad uulnerum inflammationes, & ut citius ſuppurētur. Hoc utimur ubi neruus aut neruoſum quid intus contuſum fuerit. Ego uero etiam picis liquida parum ammiſceo, & utile cataplasma expertus ſum. Hoc et podagricis inflammationibus idoneum eſt. Alia præparatio panis cum melle. Pridiani panis medullam manibus conterimus, & ubi uelut ſimilago diſperſa fuerit, mel in olla caleſcimus, & ſic tritum panem inſpergimus, ac coquimus ad moderatā compagem, deinde oleum moderatum adiſcimus, & uincta imponimus. Hoc cataplasma commodum eſt inflammationibus præcordiorum. Præſtat autem parum aquæ melli ammiſcere. Sic enim in coctura diſſunditur. Farinæ quoq; triticeæ cataplasma eadem ſerme facere poteſt, eodem modo præparatur.

De cataplasmate ex furfuribus. Cap. CLXXVIII.

Furfures in mortario tūdiniſ ac cribramus ut tenuiſſimi ſiant, & utimur ipſis ad tumorem induratum in omni corporis loco conſiſtentem, & præſertim in hepate aut ſplene. Oportet autem ipſos præparare cum aceto mulſo. Aut ammoniacū thymiama cum aceto mulſo terimus, & furfures ammiſcemus, & cataplasma imponimus, atque adhibemus lenticularia uafa uaporatoria aqua calida plena, ut ne frigefiat cataplasma. Aliquando uero ad teſtes inflammationis uiliſſimum eſt hoc cataplasma. Verum ad hos ſine aceto paratur, cum aqua mulſa uidelicet. Commodum eſt hoc cataplasma etiam furunculis, & alijs duris tumoribus actuberculis. Verum ad ueneriū ſacculantes beſtias, furfures aceto imbuti commodiſſimum cataplasma efficiunt.

De cataplasmate ex ficibus.

Cap. CLXXIX.

Ficus pingues exactiſſime contuduntur, ut nihil inalteratum in ipſis appareat. Deinde ungenti irini parum additur, & cataplasma imponitur. Facit autem ad duritiās neruorum, & ad articulos contractos, aut plus iuſto laxatos: & ad duros tumores, præſertim hepatis ac ſplenis. Vbi uero ad relatum cataplasma nitrū parum additum fuerit, rumpit abſceſſus & aculeos extrahit: Si uero ad ficis ita paratas ammiſcueris pulegium, aut origanum, aut thymū, aut abſinthij comam tenuiſſime cribratam, hydropidis cōfert. Sed ſi coquantur ficis probè, & deinde cum decocto terantur, & ordeacea aut triticea farina ammiſceatur, & rurſus coctura fiat ad compagem, commodū ſit cataplasma abſceſſibus qui non facile maturi ſunt. Si uero uoles pinguitudinem adiſcere, aut butyrum ammiſcere, aut rutę folia trita, dolores inteſtino

interflinorum & flatu factos sedabitis. Misceatur autem similiter & cuminum & oleum.

De dropace & picatione, Archigenis. Cap. CLXXX.  
Dropax à quibusdam etiam picatio appellatur, diuturnis autem maximè morbis conuenit. Omnino autè & ante sinapismum assumitur, ut corpus ad sinapi præparetur, & post sinapismum, ut reliquæ affectio= nis excindatur. Simplicissimus itaq; dropax est qui picatio uocatur. Pix arida cum ualde modico oleo liquatur. deinde calida adhuc cuti illinitur, & præ= ralis locis agglutinaur, & priusquam perfectè frigeat auellitur. Et rursus calefacto emplasmate ad ignè agglutinatur, & similiter priusquam frigeat auellitur: atque hoc sæpe repetitur. Vtilissimus est alsiduè uomentibus & crudis ac non concoquentibus, & coeliaci affectionibus, & reliquis paribus alimentum non sentientibus. At uero ad hunc communem dropacem, calfaciendi gratia adiçitur piper, pyrethrum, semen rosamarin, bitumè. Si uero siccare opus fuerit, sulphur uiuum, sal, cinis sarnentorum, Sin lacinare, limnethis, quæ & adarce uocatur, adijci= tur, aut euphorbium. Singula autem hæc trita lique= factis insperguntur. Est autem dropax qui à multis in usum assumitur & Gallas appellatur, hic: Colo= phonix thus redolentis, & resinæ fordidae lignosæ quæ in dolijs affertur, resing à naubis derasæ, quam Græci aliqui apochyma uocant, picis sicca, singulo= rum lib. i. s. picis liquidæ brutæ lib. ii, ceræ lib. iiii, nitri lib. i, bituminis, galbani, adarces, piperis, uera tri albi, piperis, singulorum trientem, sulphuris uiui quadrantem, castorei, ammoniaci thymiamatis, staphidis syluestris singulorum sextantem, olei sicyonii lib. i, opobalsami sextuncem. Alius dropax optima= & probatus, Picis, ceræ, colophonix, singulorū lib. i, nitri sextuncem, bituminis quadrantem, sulphu= ris uiui sesquitiæ, piperis, euphorbij, adarces, sin= gulorum undam i. Cantharidū drach. iiii. olei cy= prini trientem. Vtere. Oportet autem, uelut prædictū est, dropacem calidum illinere, crassitudinem habentem pro ratione uisum ægri, præralis pilis in locis quibus adhibetur. Eos uere qui robusti dropace u= untur, etiam lauare conuenit incumbente dropace, & si fieri potest, etiam exerceri. At dropax conser= tim auulsus, remissum spiritum firmare potest, & ad superficiem reuocare, & propriorum operum commonefacere.

De sinapismo, Archigenis. Cap. CLXXXI.  
Cataplasma ex sinapi sinapismi uocare omnes solent. Est autem efficacissimum auxilium. Verum in acutis morbis nō ualde probatur, paucis exceptis. Nam in solis segnioribus ac pigrioribus, & in acutis affectionibus immergis, sinapi utimur. At in diuturnis ferme omnibus, postquā reliqua auxilia nihil profuerunt, sinapismus efficacissimus reperitur. Quandoquidem igitur in omnibus ferè diuturnis conuenit, præstat ut dicamus in quibus non utendum est ipso. Itaque in ulceratione pulmonis sinapismus non assumitur, neque in alia in profundo exulceratione. Effertur enim ulcera & exacerbantur, ob acrimoniā. Sed neq; in exulcerata cutis superficie, neq; in cartilaginosis partibus, uelut sunt aures aut nasus summus. Exuruntur enim ab ipso, et nigrescunt partes quæ ualde sunt exarces. At reliquæ partes corporis itaq; affectiones, hoc auxilio gaudent, præ=

cipue uero caput, in diuturnis capitis totius itemq; alterius partis doloribus, & in ueriginibus, comitaliq; morbo ac infania. Sed & thoraci commodus est in erectæ ceruicis spiratione, anhelationibus, tussis diuturna. In destillatione uero caput unā cū thorace sinapismo integendum est. Stomachus autem & intestina in omnibus diuturnis affectionibus, & maxime prostrato appetitu, & in renum affectionibus ac lumborū, & in spinæ colicisq; ac uesicæ resolutionibus. Quin & omnes resolutæ ac frigidæ partes hoc auxilio gaudent. Commodum est & arthriticis & ischiadicis ac podagricis. Inditur & in intestinum rectum glans ex sinapi, ubi illud fuerit resolutū, & post morsum ablata glande, infunditur aqua mullā. Modus autem præparandi hic est.

#### Sinapismi præparatio.

Caricas pingues in aqua tepida pridie macerare oportet, frequenter autem die foriter expressas probè conterere, deinde acre sinapi acceptum per se terere, & inter terendum paulatim de caricarum cremore asfunderè, quo facilius teri possit, nō tamen aquosum fiat. Deinde utrunq; per se in massas redigè, & inter se misce prout usus postulat. Si quidem foriter sinapi passare uoles, duas sinapi partes ad unam caricarum. Si uero mediocriter uirulq; parem portionem. Sinapismus, tertiam partem sinapis, & duas caricarum. Cæterum in corporibus molli sensu præditis, & in quibus circa superficiem est affectio, panem pro caricis ad sinapi ammiscere oportet. Sed & hoc noscendū est: Si in aceto maceretur sinapi inefficacius rediditur. Acetū enim sinapis uim discipit. At ubi tenue factum est cataplasma, in omnibus prædictis infarsciatur in lineum, & locis adhibetur. Temporis porro longitudinē in omnibus decernere impossibile est. Quare frequenter leuandum est cataplasma, & caro consideranda an exacte rubefacta est. Et hoc maxime facere oportet in partibus hebetiore sensu præditis. In quibus uero celeriter operari ipsum uolumus, locus spongij ex calida expressis fouendus est incumbere adhuc cataplasmate, hoc est, super lineum spongix adhibendæ sunt. Post sufficientem usum, in balneum ducendus est æger, & in calidum solium ponendus, & pars iterum perfundenda circa inunctionem. Post balneum uero rosaceo illinimus locum. At in uehementi dolore aut etiam ulceratione, hapso lanæ aqua & rosaceo imbuto integendum est, & imponenda est malua cocta trita cum pane. Post sedatum dolorem utendum est cerato rosaceo cum cerusa. In quibus uero balneum adhiberi non potest, in his per reliquum corpus spōgiarum ex calida aqua expressarum fomentum utendum est. Vt in capitis & præsertim frigidis affectionibus, olei calidi perfusionē locus mitigandus est.

Quod caprarum simi pilule cum aceto impositæ priuatim coxendicum morbo conueniunt.

Cap. CLXXXII.  
Caprarum simi pilulæ in aceto tritæ, sinapismi usum exhibent. Priuatim uero ischiadicis, hoc est coxendicum affectione laborantibus conuenit hoc cataplasma, ut quod longe efficacius sinapismo in ipsis compertum est.

Quæ sint alia rubificantia. Cap. CLXXXIII.  
Rubificat nasturtij semen, & calefacit uelut sinapi. Similiter helenij radix, & syluestrium columbarum simus,

simus, quo ualde frequenter uitor. Sed & cum nascitur femine conculo ac cribrato, pro sinapi illo uitor, in ischiade, hemisrania, uertigine, capitis dolore antiquo, in doloribus diuturnis laterum, humerorum, tendinum, lumborum. Et ad hæc in nephriticis ac colicis affectionibus, & arthriticis ac podagricis, quum nondum pori ac duricies callosæ fuerint coactæ. Quin & scilla contusa in mortario, consimilem sinapi uim habet in cataplasmate imposita. Verum ad modicum tempus imponatur, nam diutius immorans locum exulcerat. Vtendū est ipsa priuatim ad erecta ceruice spirantes thoraci imposita. Item in resolutione, quædo non solum motus, sed & sensus tactus defecti. Post hæc autem mitigandæ sunt partes, uelut in sinapismo prædictum est. Priuatim uero scillæ morsus mitigat perfusio olei, præsertim rosacæ.

De Iberide sine Cardamine, quæ & Lepidium uocatur. Cap. CLXXXIII.

Ex his uero quæ ualde utiliter rubificant, est & Iberis, quæ etiâ cardamine uocatur, de qua Galenus in tractatione de ischiade plurima scripsit. Sed & Archigenes ipsa usus est in splenicis ac coxendicibus. Verum in epistola ad Aristonem Archigenes sic scribit de ipsa: Vellem autem te uti etiâ radice eius herbæ quæ nunc hic Iberis appellatur. Habet autem folia uelut nasturtium, uere floridiora, caulem longitudine cu-

bitali ampliorum aut minorem. Et nascitur quidem in inculdis locis: Aestate uero lacteum florē producit, tuncq; efficacissima est. Radices nasturtii odore referrunt. Radices igitur accipe prædicto repore, ipsasq; diligenter tunde, ægre enim conterī possunt: & ad ipsas fuilli inueterati tantum adijce quo emplastri formæ cataplasma fiat, quod non minus horis quatuor impositum habe: Deinde in calidum balneum citra inunctionem ingressus, post modicā corporis exudationem, in solio mordaciore morare. Egressus autem uino & oleo multo perfusus ac dectius, coxendicem lanis puris intege. Atque hic quidem est finis pismi modus. Verum utilitates spe maiores habet, eò quod medicamentum uim possidet, & cum minore mordacitate curet.

De euocandis ex alio auxilijs. Galeni. Cap. CLXXXV. In omnibus diuturnis affectionibus, quum nihil profecerit ulla auxilia, euocantem ex alio curationem, metasyncriticam à Methodicis appellatam, hoc est, quæ meatuum miscellæ corporis statum præter naturam habentem transmutat, facere plerique solent. Ego uero ubi intemperies quædam humida & frigida in affectis partibus est, aut obtusus aut stupidus sensus, adhibeo ipsis pharmaca ex sinapi, aut thapsia, & similibus confecta. At siccis & calidis affectionibus ea non adhibeo.

AETII TETRABIBLI PRIMÆ, SERMONIS  
TERTII, FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

QVARTO SERMONE AETII  
CONTINENTVR.

\*

De sanitate tuenda. Cap. i.	pitis ulcuscula. cap. xxii.	pertingente. cap. xxxviii.
Quomodo infans recens natus sanus cognoscitur. cap. ii.	Ad ulcus Melicerida à mellei humoris similitudine dictum, quoddam dulce appellatur, & Syriacè Sanalia. cap. xxiii.	De la situdine ob siccitatem ac gracilitatem. cap. xxxix.
De infantis educatione. cap. iii.	cap. xxiii.	De la fistula ex uenere. cap. xl.
De nutricis electione. cap. iiii.	Ad sedem infantium procidentem. cap. xxiiii.	De la situdine inibis spontaneis. cap. xli.
Probatio lactis. cap. v.	cap. xxv.	De la situdine ulcerosa spontanea. cap. xlii.
Victus nutricis. cap. vi.	Ad femorū intertrigines. cap. xxvi.	De la situdine tensua spontanea. cap. xliii.
Ad stercentes infantes. cap. vii.	Ad procidentes puerorum umbilicos. cap. xxvi.	De la situdine inflammatoria spontanea. cap. xliiii.
Ad uocem infantium interceptam. cap. viii.	Ad hispidos pueros. cap. xxvii.	Quali curatione ad frigiditates utendum est. cap. xlv.
De dentitione. cap. ix.	Quando ablaclandi sunt infantes. cap. xxviii.	Cutis densata curatio. cap. xlii.
Ad inflammationes oculorū. cap. x.	Victus ratio post ablaclationem puerorum, & aliarū etatū. cap. xxxix.	Quomodo curandus sit æstuosus ardor. cap. xlvii.
Ad albugines puerorum. cap. xi.	Victus senum ratio. cap. xxx.	De matutina frictione. cap. xlviii.
Ad inflammationes ac humiditates aurium. cap. xii.	Victus ratio eorum qui in ocio degunt. cap. xxxi.	De uespertina frictione. cap. xlix.
De inflammatione Striasi Gracis appellata. cap. xiii.	De carniū subuersione. cap. xxxii.	De cruditate. cap. l.
Vt exudet puer in febre. cap. xiiii.	Quomodo graciles renutrire oportet. cap. xxxiii.	De crapula. cap. li.
De aphiba ulcere oris ardente. cap. xv.	Quomodo quis partes attenuatas sanarit. cap. xxxiiii.	De equalibus intemperaturis. cap. lii.
Ad deuoratas spinas aut festucas eximendas. cap. xvi.	De la situdine inibis à gymnasijs, aut itinere obortis. cap. xxxv.	Optimi temperamenti dinotio. cap. liii.
Ad æsiduas sternutationes infantium, & ad grauedines. cap. xvii.	De la situdine ulcerosa. cap. xxxvi.	Temperamenti calidi nota. cap. liiii.
Ad tussis puerorum. cap. xviii.	De la situdine tensua. cap. xxxvii.	Temperamenti frigidi nota. cap. lv.
Ad alui infantium profluuiū. cap. xix.	De la situdine inflammatoria, & ad ossa. cap. xxxviii.	Siccioris temperamenti nota. cap. lvi.
Ad aluiū suppressam. cap. xx.		Humidioris temperamenti signa. cap. lvii.
De pustulis puerorum. cap. xxi.		Calidi & humidi temperamenti nota. cap. lvi.
Ad capitis ulcera, & achores tenuia ca-		

cap.	LXVIII.	Frigidioris uentris nota.	cap. LXXV.	Frigidi & humidi hepatis nota.	cap.
Calidi & sicci temperamenti nota.		Pulmonis nota.	cap. LXXVI.	XCI.	
cap.	LIX.	Cordis calidioris nota.	cap. LXXVII.	Frigidi ac sicci hepatis nota.	cap.
Frigidi & humidi temperamenti nota.		Frigidioris cordis nota.	cap. LXXVIII.	XCI.	
cap.	LX.	Siccioris cordis nota.	cap. LXXIX.	Testiū temperamenti signa.	cap. XCIII.
Frigidi ac sicci temperamenti nota.		Humidioris cordis signa.	cap. LXXX.	Calidiorum temperamenti correctio.	
cap.	LXI.	Calidi ac sicci cordis signa.	cap.	cap.	XCIII.
De capitis dinotione.	cap. LXII.	LXXXI.		Frigidi intemperamenti medela.	cap.
Cerebri temperati nota.	cap. LXIII.	Calidi & humidi cordis nota.	cap.	XCV.	
Cerebri calidioris nota.	cap. LXIII.	LXXXII.		Humidi intemperamenti correctio.	
Frigidioris cerebri nota.	cap. LXV.	Frigidi & humidi cordis nota.	cap.	XCVI.	
Siccioris cerebri signa.	cap. LXVI.	LXXXIII.		Sicci intemperamenti medela.	cap.
Humidioris cerebri nota.	cap. LXVII.	Frigidi ac sicci cordis nota.	cap.	XCVII.	
Calidioris & humidioris cerebri signa.		LXXXIII.		Calidi ac sicci intemperamenti curatio.	
cap.	LXVIII.	Hepatis calidioris nota.	cap. LXXXV.	XCVIII.	
Calidi ac sicci cerebri nota.	cap. LXIX.	Frigidioris hepatis nota.	cap. LXXXVI.	Humidi ac calidi intemperamenti me-	
Frigidi ac sicci cerebri signa.	cap. LXX.	Siccioris hepatis signa.	cap. LXXXVII.	dela.	cap. XCIX.
Frigidi ac humidi cerebri nota.	cap.	Humidioris hepatis signa.	cap.	Humidi ac frigidi intemperamenti sa-	
LXXI.		LXXXVIII.		natio.	cap. C.
Ventris sicciioris signa.	cap. LXXII.	Calidi ac sicci hepatis signa.	cap.	Frigidi ac humidi intemperamenti cu-	
Ventris calidioris nota.	cap. LXXIII.	LXXXIX.		ratio, frigiditate predominante.	
Humidioris uentris nota.	cap. LXXIII.	Calidi ac humidi hepatis nota.	cap. XC.	cap.	CI.

# AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE ME- DICINAE TETRABIBLI PRIMAE SERMO QVARTVS.

\*

## DE SANITATE TVENDA. GA-

LENI PRAEFATIO.

Cap. II.



**Q**U V M una fit ars quae circa hu-  
manum corpus uersatur, duae  
sunt ipsius primae ac maximae  
partes: prior quae sanitatem tue-  
tur, altera quae morbos curat.  
Quandoquidem uero et digni-  
tate & tempore prior est sanitas  
morbo, oportet sane etiam nos prius considerare quo-  
modo quis hanc custodiat. Deinceps uero etiam quo-  
modo quis quam optime morbos curet. Dicitur au-  
tem sanitas dupliciter: Altera exacta, & optima, &  
perfecta, & summa: Altera deficientis quidē ab hac, nō  
tamē in tantum ut animal aegrotet. Et huius graduū  
non parua est in corporibus differentia circa magis  
ac minus. Prius autem recensere conuenit, quomo-  
do quis optimae ac inculpabilis naturae sanitatē con-  
seruet, & adhuc ante hoc mētēnem facere, quam  
sit optima corporis structura. Est autem si quis iuxta  
ipsam essentiam rei exponet, temperatissima, & quae  
formationē partium, ac actionibus ipsarum exacte  
conuenientem habet. Et ad hanc numerū omnem, &  
magnitudines, & compositionem omnium ipsarum  
inter se, actionibus commodat exhibet. Si uero quis  
iuxta notas designare uolet, corpus exacte bene car-  
nosum tale est, quod mediū est inter gracile & mul-  
ta carne obesum: & neque hirsutum est, neque pilis nu-  
dum, neque moderato mollius, neque durius, neque albi-  
dum, aut nigrū, aut uenis oculis aut amplis, aut animo-  
sum aut deiecti animi, aut somnolentū aut uigilans,  
aut hebeti mente praeditum aut uasum, aut ueneri  
deditum aut uice uersa. Si uero etiam omnibus par-  
tibus fuerit exacte inter omnes excessus mediū, erit

perfecto etiam pulcherrimum aspectu tale corpus,  
ut quod sit moderatum, & ad omnes labores ido-  
neum. Habebit autem & alia omnia signa tempera-  
menti boni per singulas partes. De quibus pro uir-  
tibus pauca indicabimus circa finem huius sermonis.  
Multa enim corpora temperata quidē sunt, si ita con-  
tingat, capitibus, uerum intemperata pectoribus, aut  
uentre, aut genitalibus. In quorundam uero artubus  
est intemperies, & plerique in uno uiscere, aut alia qua-  
dam parte. Sed & de his in prauis corporū structu-  
ris postea dicitur in hoc sermone. Caeterum de opti-  
ma structura iam dicamus, cuius singulae partes uni-  
uersam habent inculpabilem essentiam. Dicitur autē  
primum quomodo quis ab initio susceptū eiusmodi  
hominem, per omnem uitam sanum cōseruari, nisi  
si quid extrinsecus uiolentum ipsi accidat.

Quomodo infans recens natus sanus cognoscitur.

Cap. III.

Indicabitur autem sanus infans statim ex natiuitate, pri-  
mum quidem ex eo quod genitrix per totum gesta-  
tionis in utero tempus sana uixit. Deinde ex eo quod  
ubi natus est & in terrā positus infans, ipse eiulatum  
edit cum cōueniente firmitate. Et ex eo quod omni-  
bus partibus ac sensibus integer est, & naturales me-  
atus omnes expeditos habet, uelut sunt aures, nares,  
fauces, urinae meatus, podex. Et quod unicuique  
membrum naturales motus non segnes, neque exolui-  
tos habet, & iuncturarum flexuras ac extensiones,  
magnitudinesque ac figuras, & sensum exactum.

De infantis educatione.

Cap. IIII.

Proinde recens natus infans, hic nimirum per omnem  
structurā inculpabilis, primum ita tractetur, ut ipsi  
umbilicus quatuor à uentre digitis acuto scalpro re-  
sectetur: Reprobamus enim aliam materiam harum  
dinum

dinum ac utrorum, ut ne quid atteratur. Deinde cō-  
tensus in ipso sanguis grumofus exprimitur, & spō-  
gia detergetur, ac lana carpta obtretur. Postea mo-  
derato sale per se tenuissimō conspergimus. Ali-  
quando uero etiam in delicatioribus totum corpus  
succe pisanæ aut fœni Græci depurgare oportet: &  
aqua tepida uiscositatem corpori obstat abluere,  
& sordes naribus insitas digitis exprimere, & os at-  
que aurium meatus purgare, palpebras diducere, &  
oculos detergere, ac oleū ipsi inspillare. Digitis item  
disparare ipsum anum. Consecissim itaq; excernit per  
sedem id quod Græcis meconium uocari solet. Por-  
rō supra umbilicū hapsus lanæ madafactus impo-  
natur, ad umbilicū figuram formatus. Et cuminum  
ipsi inspergere reprobamus, propter acrimoniam,  
etiam si quidam id usurpare soleant. Deinde duplica-  
tus umbilicus, & lanæ inuolutus, leniter in medio  
componatur. Et postea infans pro morē fasciis in-  
uoluatur. Exhibendum est autem ipsi mel per omni  
alimēto, quod optime est desumptum ut desingat,  
reprobato butyro uelut stomacho incōmodo. De-  
inde inspillanda est aqua mulsa tepida. Postea uero  
mater, ubi prius crassum ex uberibus emulcit, &  
ipsa aqua calida fouit, lac præbeat infanti. Præstat es-  
nim non accipere matris lac usq; ad quartam diem.  
Laure uero oportet puerū bis in diē, horarum ali-  
quorū intersitio post cibum. Postquam uero excide-  
rit umbilicus post tertiam aut quartā diem, cochleæ  
testam usam trita loco insperge, aut talum suillum  
ustum, aut plūbium usū cum uino illine, & obliga.

## De nutricis electione.

Cap. IIII.

Præ omnibus his eligenda est nutritrix, neque junior uis-  
ginti annis, neq; senior quadraginta, quæ bis aut ter  
perperit, non morbidā, boni habitus, iustæ magnitu-  
dinis, ampli pectoris, ubera habens moderata, non  
rugosa, papillas neq; magnas, neq; paruas, neq; an-  
gustiores, neq; ualde latas, aut cauernosas. Magna es-  
nim ubera plus quā opus est lactis præparant, &  
hoc manens in ipsis corrumpitur, & infantem lædit,  
simulq; etiam matrem grauatur. Parua uero parum la-  
ctis exhibent. Et magnæ quidem papillæ offendunt  
gingiuas, & impediunt linguam ne inuēt deglutio-  
nem. Paruæ uero ægrè apprehendi possunt, & pro-  
pterea affligunt maxillas. Sed & ciculatum lac per  
angustos meatus, sublinentem os pelliculam ferit, &  
aphtham Græce appellatū ulcus igne caliditatis ge-  
nerat. At lactiores & cauernosæ papillæ acruatim re-  
mitentes lac, suffocationis causa sunt. Præterea con-  
uenit esse nutricem castam, sobriam, mansuetā, mun-  
dam, hilarem, et non tristem. Ego inquit Galenus, quū  
puer aliquando ploraret per totam diem & indigna-  
reitur, ubi uidissem stratum ipsius & uestimenta for-  
didā, & ipsum puerum fordidum; iussi & ipsum, &  
stratū ipsius lauare, & uestimenta mutare, quo facto  
ab ciulatu & indignatione cessauit & obdormiuit.

## Probatio lactis.

Cap. v.

Probandum est lac gustu, uisu, & olfactu. Nam & gu-  
stantibus & olfacientibus iucundum, & uidentibus  
album ac æquale, & inter liquiditatem ac spissitudi-  
nem mediū habēs, ipsum esse oportet. Ad uitiosum  
lac; aut crassum est & calosum, aut liquidum & fe-  
rosius, aut liquidū, aut strias floridas habens, aut spu-  
mosum, aut graueolens, aut fecidū, aut cito aciescēs,  
aut gustanti amaritudinis, aut muris, aut alterius cu-

iudam peregrinæ qualitatis significationem exhi-  
bens. Hæ igitur sint notæ uitiosi itemq; boni lactis,  
ex quibus coniecturam facies mulierem morbosam  
esse, & ad aliam transibis. Cæterum opulentis plu-  
res nutrices esse oportet.

## Visus nutricis.

Cap. vi.

Exercere oportet nutricem moderatis exercitijs, & ma-  
ximè supernis partibus. Cibus autem exhibere bo-  
ni succi & qui facillè digeruntur, & tempore conue-  
nienti, & mensura congrua. Atq; ita etiā potus. Ab-  
stineat a porro, cepis, allio, fallamentis, & omnibus  
fecidis & graueolentibus. Et a plerisq; bellarijs, præ-  
sertim nucleis pincis. Sunt enim oleosi, & propterea  
bilem faciunt, & uentriculo innatāt. Itemq; uenerem  
stimulant. Itaq; penitus ab his nutricem abstinere o-  
portet. Irritatur enim in coitu lunares purgationes,  
& propterea lac corrūpitur, & uitiosum ac paucissi-  
mum fit. Quædam uero etiam concipiunt, quo nihil  
nocentius fieri infanti qui ex ipsa alitur possit. Vbi  
autem immixtū lac, aut corrumpitur, aut etiam  
omnino extinguitur, aut spissatur, aut attenuatur,  
præstat quidem alterius nutricis lac præbere. Sin id  
non permittat res aliqua instans, uictu nutritrix curan-  
da est, ut ne in morbū incidat infans. Extincto itaq;  
lacte, considerādum est an totū corpus, aut una pars  
ægroter, & lac dētem affectionem corrigere oportet.  
Si uero ob penuriam extinctum est lac, alimentum  
augere, & melioris succi cibos dare, & plures aufer-  
re, aliumq; si plus iusto fertur adstringere, & exer-  
citijs supernarum partium uti, & uberum frictione,  
& fomentis per spongias, ceratis item liquidioribus  
ad ubera ex oleo irino aut gleuino. Lini uero semē  
delingere cum melle aut passo. Aut sesamū crudum  
cum palmula passa, quam pareton Græci uocant, æ-  
quis portionibus edendam præbe, & bibat zythum,  
& eadem die ubera lacte replebūtur. Putabit autem  
mulier simul ut acceperit potū, omnia sua membra  
resoluta esse, donec lac in uberibus factū fuerit. Aut  
lumbricos piscatorum, qui in limo fluminis reperiū-  
tur, & intestina terrę appellantur, quinq; aut septem  
terito, & palmulas passas addito, & simul terito, ac  
dato in zytho bibendos prælotæ mulieri scilicet ad  
dies decem: & de multitudine ac bonitate lactis mi-  
raberis. Præstat autem etiā præcedens pharmacum  
similiter cum zytho conterere, & bibendum præbe-  
re. Vinum uero exhibendū est dulcius. Et forniculū  
aut anethum uiride cum pisanā coctum, & forbēdum  
dato. Si uero tenue fuerit lac, balneæ reprobada sunt,  
uelut quæ humores aquosos reddant. In cibo uren-  
dum est alica, ouis forbilibus, pane similagineo, pes-  
cibus ac extremitatibus porcinis, uolucris tene-  
rioribus, carnibus hædinis, & uino dulci. Sin cras-  
sius fuerit lac mulieris, attenuante alimento utredum  
est, ac minus nutriente, & balneis frequētib; Cras-  
sius enim lac abscellus & furunculos circa infantis  
corpus generat, & uenter ipsius cohibetur. Sed neq;  
urinæ pro ratione prodeū, & uomitus pituitosi in-  
festant, & ægrè mobilis ac diffculter spirans puer e-  
uadit, & appetitū perdit, ac decolor fit, & sordes ocy-  
lorum habebit crassas, & mucus similiter, & flatus  
multi ab eo prodeunt. Si uero acris fiat lac, excre-  
tiones per uentrem plures sunt cum mordacitate, &  
appetitus deficit, & pustulæ acerrimæ in corpore fi-  
unt, & præsertim circa supernas partes, imò etiam



Infernas, & infans paulatim gracilefcit. Quare omni modo temperandum est corpus nutritis, balneis dulcibus, & boni succi alimento. Si uero lac quod multum fertur imminuere uoles, cibos minus alentes & paucissimos dato. ubera uero lenticula cocta integrit, aut cuminum cum aceto illinito. Aut lapidem album simplicem, quo ad aedificia uidetur, similiter cum aceto. Aut hyoscyamum cum aceto. Aut linum cum aceto imbutum imponito, & assidue humectato. perfundito autem aqua marina, aut muria calida, aut myrri decocto.

Ad sterentes infantes.

Cap. vii.

Quandoquidem plerique nutrices ineptis, uelut dictum est, utentes cibis, uiciosum lac suum efficiunt, & ex hoc diuersis morbis infantes, qui etiam optimam structuram adepti sunt, obijciunt. Aliquando uero etiam ex foris nec corpori accidentibus morbi accedunt, necessarium est etiam de diuersis affectionibus pueros infestantibus, pro uiribus breui tractare. Si quidem igitur infans crassiore alimēto nutritus, pituitam in uentre colliget, & propterea stertat, lini semen cum melle delingendum dandum est, aut cumini parum cum melle. Et aqua multa instillanda est ori assidue calida. Si uero hec pressura perseueret, oleo medium digitum tingito, & conssillas illinito, & depreffa linguae radice ad uomitum irritato. ubi enim uomuerit, ab omnibus uexationibus confestim liberatur.

Ad uocem infantium interceptam.

Cap. viii.

Ad interceptam in infantibus uocem, ob quancunque causam precedentem (contingit autem hoc maxime suppressa aluo) brasice succum cum modico sale bibendum dato aut instillato. Statim enim soluit alui, & uocem restituit. Sed & glans ano indenda est.

De dentitione.

Cap. ix.

Circa septimum mensem incipiunt infantes proferre dentes, & dum punguntur ac stimulantur uelut ab aculeo, dente gingiuas disparante, inflammationes succedunt ipsarum gingiuarum ac maxillarum & tendinum, ad quas etiam febres omnino consequuntur. Accedit & pruritus auditoriorum meatuum. Et aures humectantur. Aliqui uero etiam lippitudinibus capitis, & sanguis ex oculorum angulis fluit. Pleuriscque uero etiam exturbatur uenter, propter stomachi inflammationem, & uentris exolutionem. Itaque lenire ac pinguefacere oportet tendinem & maxillas, mollium lanarum ac mundarum circumiectis, circa colulum & ipsius neruum, per oleum dulce ac calidum. Instillare quoque auditorijs meatibus oleum calidum. Perseuerare uero in inflammatione, etiam ceram rosaceam liquidum locis imponere. In cibo offerendum est puero cerebrum, maxime quidem leporis coctum aut assatum: Sin minus, ouiculae. Naturaliter enim opitulatur. Sed & melle moderate cocto instillandae sunt gingivae. Efficit enim minime molestum dentium exortum. Nihil uero duri dandum est ipsis ad mandendum, ut ne gingivae callosiores reddita impedimento sint dentium exortui. Balneo autē utendum est febribus remittentibus. Neque studio habendum est ut uenter adstringatur, ut ne materia sursum repens, supernas partes, praesertim oculos laedat, & febres uehementiores efficiat. Sed & nutrit cogenda est ut aquam bibat, & cibos leuissimos ac forbes accipiat. Aiunt autem naturaliter auxiliari dentientibus pueris, colocynthis syluestris radicem, in

aureo aut argēteo canali gestatam. Itemque rubi radicem. Sed & uiperæ, praesertim masculæ, denem, in argento pro amuleto appende. At circa stomachum gestent semper uiridem ispidem de collo suspensum, ita ut stomachum contingat.

Ad inflammationes oculorum.

Cap. x.

Lycium Indicum praesertim, sin minus, Patarici cum lacte diluito, & supernas palpebras cum supercilij illinito. Aliquando etiam ipsis oculis instillato, multo lacte diluito. Mirabiliter etiam facit Nili ex rossis collyrium illitum. Ipsos uero oculos ocymi decocto abluito.

Ad albugines puerorum.

Cap. xi.

Ad albugines puerorum ab eiulatu factas, solani nigri succum illine.

Ad inflammationes et humiditates aurium.

Cap. xii.

Ad inflammationes & dolores aurium, oui cadidum cum lacte muliebri instilla. Aut intestina terre cum rosaceo cocta. Ad humiditates uero aurium, alumen uino dilue, & lanam puram ac mollem in ipso imbuere, & in sole asicca. Et rursus imbuere ac sicca. & ubi ter hoc feceris, lanam sicca alterna. Vsu uero expetente, de ipsa accipe & in aurem inde. Ad uclera uero in auribus, pastillo Musae utere, diluito cum sapa ac modico aceto. Si uero caro superexcreuerit, primum reprime per pastillum Bithynum dilutum cum uino. Deinde utere Musae pastillo, uelut dictum est.

De inflammatione Siriasi Graecis appellata.

Cap. xiii.

Ex affectionibus quae cum febre accidunt, est & siriasis in infantibus appellata, quae est inflammatio partium cerebri & membranarum, adeo ut sinapitis & oculorum cauitas consequatur, cum febre ardente, & pallore, & corporis siccitate, ac prostrato appetitu. Siriasis autem appellata est a sinapitis cauitate. Siros enim apud Graecos dicitur fossa ac corpus cauum, in quo semina seruantur. Quare omnia uelut ad inflammationes facere oportet, ita ut leniamus & mediocriter frigeficiamus caput, coriandri succo cum rosaceo humectantes. Sed & totum corpus ex hoc illinatur, Aut cucurbitae ramenta sinapiti impone. Aut uitis folia, aut portulacum cum rosaceo tufam, sinapiti illine. Aut heliotropij scorpiuri succo sinapiti illine. Aut oui luteum cum rosaceo coctum, & sinapiti illinito, & assidue permutato.

Ve exudet puer in febre.

Cap. xiiii.

Arundinis uiridis medullam terito, & ex ea sinapiti ac pedes illinito, ipsumque pueri uestimentis contegito.

De aphthae ulcere oris ardente.

Cap. xv.

De aphthae ulceribus, & inflammationibus tonsillarum, dicitur absolutissimè in sermone de affectionibus quae perfectis accidunt circa has partes, in octauo nimirum.

Ad deuoratas spinas aut fistulas eximen-

das.

Cap. xvi.

Alumen quo ad coria utuntur cum oleo terito, & gummae illinito, radicem linguae digito ualde comprimens, & facile ipsas sursum efferit.

Ad aspiduas sternutationes infantum et grauedines.

Cap. xvii.

Ocymum siccum tufum ac cribratum naribus admo- ue, ut per respirationem attrahatur, aut insuffla. Idem etiam ad grauedinem facit.

*Ad tusses puerorum.*

*Cap. xviii.*

Nucleorum nucum pinearum modice tostorū drach. iiii. seminis cucumeris parum tosti drach. i. tragacanthi drach. iiii. mellis despumati dodrantem. Præpara & præbe delingendum. Tragacanthum autem in uino ueteri dulcissimo macerato. Aliud Hippocraticum. Vitellum oui assatum, & sesami duplum, & salis granum unum moderatum terito sufficiter, & cum melle delingendum dato. Aliud. Nucleos pineos tostos xxx. amygdalas decoricatas xxx. seminis lini tosti, succi glycyrrhizæ, utriusq; sextantē. Mellis quod satis est, dato delingendū. Probē etiam facit cuminum cum melle. Item ammium.

*Ad alui infantium profluvium.*

*Cap. xix.*

Si aluius infans fluxione laboret, balneum & gestationem reprobamus. Videtur autem humedatione stomachi ex uino & oleo melino. Si uero fluxio extendatur, cenanthen leuissimē tritam, & acaciā, ac mastichen, æquis portionibus singulis tritis, oui luteo quantum satis est excipe, & ex emollito stomachum illine, & dorsum, & hapsium lanæ purpureæ imponere ac deliga. Facit enim contra molestiam. Præ omnibus uero nutriticis alimentis boni succi uti oportet, & poribus adstringentibus. Si uero aluius infans sitinā similia excernat, mentam tritam cum uino nigro, aluo impone ac obliga.

*Ad aluum suppressam.*

*Cap. xx.*

Si uero suppressatur aluus, glande tritanda est, aut ex sola aqua mulla insusum immittendum est. Et mel alimentis ammiscendum. Cæterum florem artemisiæ cum oleo tere, & circa umbilicū affrica, & fluat aluus. At de lumbricis dicitur in uniuersalibus auxiliis in nono sermone.

*De pustulis puerorum.*

*Cap. xxi.*

Lamantia dictum est quod infantes uitioso alimento utentes, uarios incidunt morbos, ut cum alijs & pustulæ & papulæ instar bullarū efferuentes, & humida ulcera in cute fiant, quæ bubastica uocant, & alia consimilia. Itaq; muriam & urinam, & alia quæ alijs qui adhibent, reprobamus, ob acrimoniam. Lauamus autem ipsos rosari decocto aut lentis. Et si ampliori adstrictione opus habemus, myrti aut malicorij. Magis uero ulceratis, cataplasma ex plantagine imponimus: Aut ex seride siue intubo cum pane: Aut ex flore polætæ cum portulaca, aut semperuiuo, aut ueneris umbilico, aut hyofcyamo. Aut rosas uirides aut siccas coctas cum meliloto & palmulis adhibemus. Aut spumam argenti, mellis totum, alumē, cum aceto terito, & myrteum oleum siue rosaceum adijcitur, atq; illinito. Aliud ad bubastica ulcera. Recrementum plumbi & amyli, æquis portionibus cum solani succo terito, & adiecto rosaceo illinito. Aliud pulcherrimum. Cadmiā tritam cum aqua illinito, aut dromiā cum uino. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ, utriusq; trientem, malicorij sicci leuissimē triti sextantem, succi stratiotæ fluuialis quod satis est, utere. Quod si non adsit stratiotis, lentis palustris succum accipe, & utere, aut herbæ uiridis quæ in aquis inuenitur, & stratiotæ similis est, succum ammiscere, probē etiam facit serapiadis tritescularis succus. Aliud. Retritamentum ferri terito cum uino, ac illinito. Valde enim bonum est hoc. Probē facit & emplastrum ex ladano, & emplastrū ex hordeo, oui candido, & rosaceo aut myrteo oleo diluta. Aliud,

ad infantium pustulas ac papulas feruidas post rupturam. Cadmiæ drach. lxx. æris usi drach. lxx. acaciæ, croci, utriusque unciam i. tragacanthi sextantem. Tragacanthum aqua macerato ac terito, & cum ipso reliqua excipito, ac pastillos formato. Et usus tempore cum succo senecionis, aut intubi, aut solani, diluito, & addito rosaceo, illinito. Ego, inquit, succo senecionis aut intubi excipio tragacanthum ac reliqua, & pastillos effingo.

*Ad capitis ulcera, & achores tenuia capitis ulcuscula.*

*Cap. xxii.*

Pharmacum ex cuius usu ego nomen assequutus sum. Spumæ argenti, cerusæ, utriusq; bessem, seminis ericæ, thuris, utriusq; drach. iiii. uino & oleo raphanis non terito ac uitior. Aliud. Acaciæ sulusæ unciam i. ladani trientem, myrrhæ sextantem, opij unciam i. Aqua palustri excipe & forma pastillos, & utere assidue. Aliud. Cochleas albas unā cum testa exustas insperge. Aliud. Aloē leuissimē tritā, cum plantagine arida trita insperge. Aliud. Balauftium aridum tritum insperge. Aut cum aqua tritum impone & illine. Aliud. Herbam quam in Alexandria Liparonem uocant, aliqui uero cnestrum appellant, urito, & cinerem cum uino tritum illinito. Vtere etiam reliquis cum discriminationibus referendis in sexto sermone, de uniuersalibus auxiliis ad achoras.

*Ad ulcus Melicerida à mellei humoris similitudine dictum, quod & Dulce appellatur, & Syriacè Samalia.*

*Cap. xxiii.*

Spumæ argenti, baccharum lauri, æquales portiones terito cum aceto & oleo, & illinito. Sæpenumero eius experimentum fecimus.

*Ad sedem infantium procidentem.*

*Cap. xxiiii.*

Spongidiæ herba podicem assidue deterge. Acaciā cum sapa & uino nigro tritam podici illine. Cochleam usitam tritam quam egreditur prælotæ sedē insperge, & sanabis. Ofiæcorum testas crudas tulas ac tenuissimo cribro excretas insperge. Myrrhi baccas uirides cum uino tritas impone. Vtere autem perfusionē aqua fabrorum, in qua ferrum tingunt. Ego uero semper uero muria tepida, & ualde probē facit. Similiter autem & aqua marina. Vtere etiam dicendis in uniuersalibus auxiliis, quæ suo loco referetur.

*Ad femorem intertrigines.*

*Cap. xxv.*

Myrtum siccam tritam insperge, aut cyperū cum rosis.

*Ad procidentes puerorum umbilicos.*

*Cap. xxvi.*

Procident pueris umbilici, dum aut in euilatu diu & multum distenduntur, aut ex plaga, aut ex casu. Talibus igitur ammium cui muria tritum umbilico illine, & rasuram linei impone, ac ad triduum obliga. Et rursus eo soluto, idem facito. Aut lupinos amaros et ungulam asini usitam, & laterem usitum, simul terito ac imposito, & obligato. Si uero efficacioribus opus fuerit, his quæ ad herniā inguinum referuntur utere. Cironis ad pueros exumbilicæ, ob quancuncq; causam, Resinæ pinus unc. xvi. aluminis scissi dextantem, mellis dextantes duos; Alumen tritum cum melle ad prunas coquito, & ubi bonam compagem habuerit, resinam addito, assidue moueto, & ubi dissoluta fuerit, laminā de hoc pharmacō accipito, & umbilico imposito, ac quotidie alterato. Verum supra laminam plātaginis folia aut hederæ imposito. Aliud. Aluminis scissi uncias x. sedis uini austeri dextantem, gallarum drach. ii.

uino dilue ut ipsiusmodum habeant, & umbilicum illine, & forinsecus spongiam impone, posca imbuitam ac expressam.

Ad hispidos pueros.

Cap. xxvii.

Crastrisibus & pluribus fuliginosis superfuitatibus sub cute collectis, ex quibus pilis generantur, hispidiores infantes fiunt. Itaque caricas urito ac terito, & cum hoc cinere pilis obstitos locos confricato. Ex alio exemplari. Resinā coquito in aqua, & puerum lauato, ac leuiter detergico, ac cum caricarum usturū cinere & sabarum cremore confricato. Aliud smegma corroborans ipsos. Farinā sabrum, dimolix, spumæ nicti, candidi ouorum, & testarū, æquales portiones pro smegmate adhibe.

Quando ablactandi sunt infantes. Cap. xxviii.

Donec firmetur infans lacte nutriatur. Postquam uero solidus factus fuerit, micis panis ex uino mulso, aut uino dulci, aut lacte. Deinde etiam oua sorbilia sumat. Nam quæ mandare oportet, salua in ipsis resplentur. Potus dandus est uinum dilutum. Vbi uero iam intrepide frumentaceū alimentum infans sumit, tunc plerumque circa uigesimalium mensem cōtinuetur, quod plerumque circa uigesimalium mensem cōtinuetur: quod plerumque circa uigesimalium mensem cōtinuetur. Si uero ablactatus morbu incidit, rursus ad lac transferatur. Et ubi cessauit morbus, refocilletur corpusculum, atque sic ablactetur.

Vitiū ratio post ablactationem puerorum, &

aliarum ætatum.

Cap. xxix.

Ablactati infantes in remissione ac hilaritate exercitiorum uersentur, denturque ipsis cibi leues ac boni succi. Verum à multo uino abstinere oportet eum qui bonum corporis temperamentum habet. Nam in humidis ac calidis corporibus, uinū replet caput uaporibus. Neque uero à frigida aqua potu penitus arcere iubeo tales pueros. Sed inter cibos plerumque, & in calidioribus oris, optima aqua uti permitto. A septimo anno ad literas ueniunt, & mitibus ac humanis magistris traduntur. At à decimo quarto anno usque ad uigesimalium primum, conuenit exercitatio in disciplinis philosophicæ doctrinæ. Prohibendi sunt à ueneris usu. Contrahendum est & uberius uinū, & plura exercitia iam sunt assumenda. His uero qui iam in uigore ætatis degunt, uictus ratio remissa cōuenit, tum animi, tum corporis. Et corporis exercitia quæcunque fuerint, pro ratione his detrahenda sunt, & alimenta sensim contrahenda, quum habitus ipsorum frigiditatis principium sumat. Maximam autem optimè constructi corporis notam esse statuo ipsius naturæ promptitudinem, quicquid tamen fuerit agendum, ipsa sui ipsius mensuram exco-gitante in optimis constitutionibus. Nam & dum exerceantur ac fricantur, aut quidvis aliud agunt, tunc primum pigrescunt, quum sufficienter fuerint exercitati. Et sanè etiam à cibis ac potibus tunc abstinent, quum sufficienter fuerint impleti, neque plus iusto appetentes, neque minus ingerentes. Quare nullus timor est de optimæ constitutionis homine, ne uel nimium labore fatigetur, aut cibis nimium expleatur. Ipsum enim sanum corpus omnia sibi ipsi exco-gitat, naturæ motibus impulsu, præsertim si animus ipsius à puero probe fuerit institutus. Plerique enim in improbis moribus educati, dum licetiores aut negligentiores uictu utuntur, bonas naturas corrumpunt. Quemadmodum aliqui uice uersa uicioso cor-

pore à natura producti, moderato uictu & tepestiuis exercitijs, multa naturæ uicia ac delicta correxerunt. At de exercitiorum mensura, & utendi modo, dictum est in præcedenti sermone.

Vitiū senum ratio.

Cap. xxx.

Naturalis senectū est sicca & frigida corporū tempera-tura, ex longeuitate proueniens: quum enim corporū essentia unā cū insita caliditate paulatim defluat, & instrumenta ipsa ulterius quàm conueniens erat sicca fiant, tum actiones deteriores redduntur, tum animal ipsum ex carne & seipso gradilius euadit. Postquam uero adhuc amplius fuerint reficcata, non solū ex carne, sed etiā rugosum efficitur, & membrorū impores, & in motibus ambiguit. Qui itaque affectionē ex scientia nouit, quod uidelicet siccitas est cū frigiditate, is bonus fuerit senū Medicus. Cognoscat enim quod horū correctio per humiditatem ac caliditatem contingit. talia autē sunt, aquarū dulcium balnea calida, & uini boni potus, & cibi qui humectant simulque calidant. Et frictions per oleū mæne moderare fientes. Deinde deambulationes & gestationes citra lassationē, uisum sensus cōsecratione facta: Nō enim parua est etiā in ipsis senibus differentia. Dandus autem est cibis modicus quidem, uerum sæpe. Nam si paululum iustā mensuram senes excefferint, non parum leduntur. Securius itaque est debilibus senibus parum cibi offerre, uerum ter in die. Circa tertiam quidem horam panem probe paratum recentē, cum optimo melle desumpato. Circa septimā uero præfrictis, & cōuenientibus senibus exercitijs exercitatis, ac lotis, prandium exhibendum est, & primū quidem danda quæ uentrem molliū, uelut sunt, olea ex beta ac malua. Deinde pisces petrosos ac pelagios præbere conuenit, postea uero paululū in lecto quiescere, deinde moderato motu uti. Ad uesperam autem cœnantes, à piscium esu abstinere. Accipiant autem cibos boni succi & ægre corruptiles, uelut est gallina aut uolucris aliqua ex simplici iure. Vinum uero senibus utilissimum est. Sit autem ex calidioribus natura. Quale est quod substantia quidem tenue est, colore autē fuluum aut flauum. Atque unum quidem hoc maximū bonum senibus ex uino accedit, quod calidum omnes ipsorū partes. Deinde quod serum sanguinis per urinas purgatur. Quæcūque uero uina pallida sunt aut flaua, & simul crassa, ea sanguinem generant, & corpus nutritiū. Quapropter etiā ipsa aliquando cōmoda fuerint senibus, quo uidelicet tempore neque serosum humore in uenis habet, & ampliore nutrimento indigent. Vt plurimum enim uino urinam ciente opus habent, eo quod aquosa superfluitas in ipsis redundat. At uero à nigris & acerbis ac crasis & similibus uinis abstinere ipsos oportet. Diutius enim in uentre manet, & propterea incommoda funt. Dulci uero si senex ui uelit, post balneū sumat dulce simulque pallidū colore. Non prohibeo etiā uinorū ex melle paratorū usum, et præsertim his senibus qui suspecti sunt de calculi in renibus generatione, aut quos podagra aut articularis morbus infestat. Et tunc in uinū inijciendū est petroselinū solum. Sufficit enim hoc arthriticis. Ad calculosos uero bea-tonica ammiscetur, quæ & cestrū appellatur et saxifraga. Abstinere autē oportet senes ab eduljis & potibus, uiscosum & crassum humore gignētibus. Quæ sunt alica, caseus, oua cocta, cochleæ, bulbi, fungit, lentacula

lenticula, & ostreorum caro, & reliqua suprà relata in alimentorū crassi fucci mentione, sermone secundum. Si uero ex necessitate aliquando contigerit aliquo ex talibus uitā, statim exhibendum est pharmacum ex calamintina, aut ex tribus piperis generibus. Si uero non sit ad manū quid ex his, piper tundendum est & exacte cribrandū, & tum cum obfonsis edendum, tum porui inspergendum. Et calium tunc gustare conuenit. Postquam autē soluta est obturatio, & alius subducta, etiā theriacam antidotū, & mithridaticam, aut aliam quandam ex his quæ ex aromatisbus constant exhibere conuenit. A<sup>l</sup> calium uero usu trāsire statim ad humectantē ac calfacientem uitūs rationē suprà relata. Dandæ sunt ipsīs etiā maturæ & dulcissimæ uirides ficus, ante aliū cibū. Sed & in hyeme caricæ, nisi accidens a<sup>l</sup>iquid circa dextram præsertim præcordiorum paritē adfit. Quando quidē uero serosæ ac pituitosæ superfuitates in senum corporibus, uelut dictū est, colliguntur: urinā quotidie propellere oportet, non per medicatas res, sed apud decoctū cum melle, & uinis urinā clementibus uitā. Venter quoq; per oleum bonū subducendus est, præsertim absorptum ante cibos. Manifestū est autem quod & oleracea omnia præ alijs cibis edere oportet, ex oleo & garo. Emolliunt autem ventrem & pruna ficus, præsertim quæ ab Hispania afferuntur. Damascena uero in aqua multa meracore præmaceretur, aut in ipsa decoquatur. Sed & oliuæ muria conditæ, si fieri potest albæ, præfumentæ sunt. Ventre uero amplius suppresso, etiam mercurialis cocta datur, & cinis cuius pistana, sed & resina terebinthina. De hac uero accipiendum est aliquando ad nucis regię magnitudinē, aliquando ad duarū aut trium, Non enim solū citra molestiam molliſce solet, sed etiam uiscera extergere, & pulmonē & renes. A perfecta dosis eius est unda una. Idoneum est ipsi & hoc. Caricæ pingues accipe, & corium forinsecus ipsi obſisti detrahe, deinde in mortario tūde, & cinid medullā ipsi adijce, decima plus minus caricarum parte. Deinde ambo iuxta misce, ex hoc duarū aut trium caricarū magnitudinē præbe. At uero ex relatis pharmacis nullum unquā largius accipiendū est. Quidam enim gaudet quod cōfestim uehemēter sunt purgati. Verū quanto magis fuerint euacuati, tanto amplius uenter ſequitur per sequentes dies. Suppressa autē aluo ipsorū, infundere oportet oleum solū calidū. Nam & dura stercora hinc educuntur, & lubricitas quædā sit in transitu, & ipsum senū corpus mollescit, instar aridari pellū indurati.

*vitius ratio eorum qui in ocio degunt. Cap. xxxi.*

Qui uitā in ocio degit considerare debet, an in priore uitā exerceri cōſueuit, aut citra exercitationē lauari. Nam quidā hunc morem moderate ferunt, ut aliqui ex ipsis nō assidue ægrotent, ubi corpore facile transpirante præditi fuerint. Atq; talem sanē corporis naturā, ad aliam consuetudinē transferre minimē oportet: quemadmodū neq; illā aliam, eorū qui per multum tēporis interuallū ægrotant. Si uero assidue quis ægrotet, cōsideranda est in ipso causa, an ob plenitudinē, aut propter humorū uitiationē ægrotet. Et si quidē morbis ex plenitudine ægrotare uideatur, scopus tibi erit propositus, ut omnino salubri ipsius diætā cōſerues, quo semper moderatos habeat humores. Si uero propter uitiatos humores ægrotare solet, optimos facere humores. Quidā igitur plenius

dinem coaceruat, quā ea quæ per corpus transpirant pauciora fuerint his quæ accipiuntur. In his itaq; seruanda est symmetria ac proportio eduliorū ac potiorum ad ea quæ euacuatur. Symmetria autem est, ut in utrisq; cōsideremus nos quantitātē, tum eorū quæ ingeruntur, tum eorū quæ euacuatur. Nā qui in priore uitā statim priuquā exerceretur, in balneū ingreſſi sunt, in his nūc frictiōne moderata utendum est, & breui motu. Qui uero exercitabatur ante balneum, his cōſulo ut nunc paululū augeant consuetudinē. Detrahere uero oportet etiā aliquid de cibis, & quantitāte ac qualitate moderatos exhibere. Qualitatē autem dico, uelut in canibus porcinis: celerrimē enim plenitudinē & copiam boni humoris congregant. Itaq; ad olera ducti sunt, & ad pisces similiter ac uolucres, qui non multū nutriunt. At uero in his qui uitiolos humores colligū, nō unus est scopus, quoniam neq; una est uitioli humoris species. Quidā enim frigidiore ac pituitosiore uitiolosum humorē congregāt. Aliqui uero calidiorē & biliosorem. Sicut aliq; atra biliarium. Fugendi itaq; sunt singuli cibi ac potus, qui promptē generare solēt humorē qui in ipsis cōgregatur. Dictum est autem de ipsis abunde, in boni succi & mali succi eduliorū mentione, in secūdo sermone huius operis. In quo sanē de attenuatibus eduliorū dictū est, quæ commoda sunt, his qui crudū appellatum humorē coaceruant, qui semper quidē crassus est, nō tamen semper uiscosus. Porro in omnibus his cōmune auxilium est, moderata ueneris subductio, & maxime quibus ueter est natura durior. Cōmune auxilium est etiam ueneris usus moderatus.

*De carnum subuersione.*

*Cap. xxxii.*

Quam ad immodicā carnium multitudinem deuenit corpus, liquare ipsum ac subuertere oportet. Oſtēsum est autem quod calidius & siccus temperamentum, gracile corpus efficit. Huiusmodi igitur faciedum est carnosorum hominum temperamentum, si moderatū fieri debet. Didiſti autē iam quod uelocia exercitia atq; acuta, & digta attenuas, itemq; eiusmodi medicamenta, sed & animæ curæ, totū tēperamentū calidius ac siccus reddūt, & ipsum corpus tenuius. Attenuas itaq; diætā manifesta est, pharmaca uero uehemētia sunt, rutę semen, & præsertim syluestris cum cacuminibus, aristolochia rotunda, centaurea tenuis, gentiana, & polium. & quæcūq; foriter urinam dēt, uelut petroselinum. Singula enim hæc & per se, & inter se uniuersa mixta, attenuare & euacuare humores possunt. Sed & sal ex uiperis uitis multum attenuat. Quin & ipsa theriaca antidotus attenuat & discuit. Illinatur autem oleo, in quo cocta est cucumeris syluestris radix, & althæa, & gentiana, & panacis radix, & aristolochia rotunda, & poliumq; ac centaurea. Cibi uero non statim à balneis dandi sunt, sed permittendum est ut prius quiescant aut quid cōſuetariū actionum obeant, & rurſus ad secundū balneū ducantur. Præstat autē & balnei aquā disculſoriā esse, si naturalem habere possent. Sin minus, flos salis maris aquæ ammiscatur. Deinde uero edulia magna quidē mole, pauci uero nutrimenti danda sunt, ut impleatur quidē, modicū uero alimentū ex ipsis in corpus distribuatur. Talia uero sunt olera, & panes fordiores, & similia quæ iam in secūdo sermone relata sunt. Vino autē utendum est albo colore, & tenui substantia. Neq; uero

ante cibos potus permittendus est, neq; copiosus potus indulgendus. Sed & semel in die cibū capere melius est, & pro exercitiorum ratione pauciores cibos exhibere. Quin & frictio sicca ex mappis crassioribus, sufficiens est ad attenuandum. Sed & nitro ac asperiore sale frictionem facere conuenit. Multū itaque nitrū in balneis attenuat. Modicum uero, frictamentum est ad carnositatem uberiores, & ad meliorem nutritionem. Prodest etiam insolatio carnosiss. Probe attenuat etiam potum hoc pharmacum. Petroselinū trientē, piperis sextantem, anisi, asari, ueriscus unciā unā. Hoc & lotum ciet, & aluum promouet.

*Quomodo graciles renutrire oportet, Cap. xxxiii.*  
Gracilitas corporibus accedit, quibusdā ex totius corporis intemperatura frigidior ac siccior, quibusdā uero digerēdi facultate, aut nutriendi, aut utriusq; imbecillioribus natura existitibus. Omnes autē sic habentes iuuant edulia boni succi, & exercitia tarda ac moderata, & frictio consimilis. Et in summa, omnia cōtraria relatis ad carnosos. Cōmodum est etiā ipsis picari per dies tres aut quatuor. Nā & digestionis cōfert, & nutritioni. Et multos uidere est crasse factos ex hoc picationis auxilio, & praesertim eos quibus facultas digerendi debilis est. Nutriendi uero facultas nō debilis quidem est, sed ob idoneae materiae penuriam nutrire non potest. Si uero ieiuni lauentur, ante balneū corpus linteis cōfricare oportet, donec rubefiat. Deinde frictione nō ualde dura uti, ut ne constringentes, cutē densam ac duram efficiamus. Oportet autem decoloribus & alimentum non sentientibus iracundia inducere, & commotiones animales.

*Quomodo quis partes attenuatas sanare possit.*

*Cap. xxxiiii.*  
Ex his qui in quibusdā partibus graciles sunt, plerique aut ob diuturnam ipsarum quietem, aut ob deliquationis fracturæ modum, ad hanc affectionē deueniunt. Oportet igitur uires quidem in membro corroborare, largum uero sanguinem attrahere, tū per moderatam frictionem usum post cibum, tū per cōmodos partē motus, & per moderatas aquae calidae affusiones. Hec autem post cibum facere oportet, donec pars rubicunda facta eleuetur, & tunc statim ad perfusionē cessandū est. Oportet etiam picatorū medicamento uti, de quo dictum est in praecedenti sermone, ubi uero frigiditatis sensus circa attenuatam partem fuerit, linteis ipsa perfricanda est, & quodam pharmaco calefaciente. Sed & thapsia illinenda est, aliquando cum melle, aliquando cum cerato.

*De lāsitudine in gymnasijs, aut ex itinere oborib.*

*Cap. xxxv.*  
Lāsitudinem primae ac simplices tres sunt differentie. Quae ulcerosa appellatur, & quae tensua, & quae inflammatoria. Et ad has insuper ea quae ob multū musculorum siccitatem generatur, quam lāsitudinem uocant abusiue, quum non sit lāsitudo, sed siccitas.

*De lāsitudine ulcerosa. Cap. xxxvi.*  
Ulcerosa itaque lāsitudo in superfluitatibus tenuibus simulq; acerbis ac mordacibus generatur. Nō enim in his plenitudinis copia est quae affligit, sed humorum acrimonia, qui exercitiorum tempore, aut aliorum uehementium motuum, ex duplici causa generatur. Aut crassioribus superfluitatibus diffusis quidem ac attenuatis, non autem omnibus excrecitis. Aut

colliquata aliqua pinguedine, uel carne tenera, in uehementibus motibus; necesse est enim a talibus tenuibus humoribus & acerbis pungi ac uelut sauciari cutem & carnes, ut & horror aliquādo fiat, & rigor, quum fortiter fuerint acres & multi. Tumor autem non est oculis expositus in partibus dolentibus. Accidit hec lāsitudo praecipue corporibus uitiosis humoribus ac superfluitatibus repletis. Consequitur & ad recentes cruditates, quū aut immo destius se exercuerint aliqui, aut in sole diutius uersati fuerint. Sed & circa cruditatē in boni succi corpore cōstat, propter immo destius exercitij excessum. Densa autē & horrida apparet his cutis, & dolent uelut qui ulcus habent, alij cutē tantū, alij etiam carnibus sub ipsa. Sanatio porro cōtingit ex eo quod contrariū est affectio. ni. Oportet enim superfluitates discutere, & sedabitur affectio. Discutietur autē frictio multa & mollis cum oleo dulcissimo nulla adstrictione praedito. Quale est dulcissimum sabinum. Maxime enim aduersatur his omphacnum. In prima igitur die largo oleo cū multa frictione utendū est, quo omnino nullus percipiat futurae lāsitudinis sensus. In secunda uero, quo ea quae facta iam est soluitur. Soluti autē ipsam, exercitiū moderatum, & frictio multa, pluribus ministris simul cōtreandibus, quo pars ipsa nō frigeat, & superfluitates celerrimē discutiantur. Hec autem lāsitudo plerūq; extendi solet usq; ad quartā diem. Itaq; quarta die lauentur & cōsueti cibo nutrantur, prioribus tamē diebus pauciores sint ac humidiores cibi, & nihil uiscosū habentes. Sit autē & balneum non moderato calidius. Laxare enim & discutere uolumus ipsum corpus.

*De lāsitudine tensua.*

*Cap. xxxvii.*

Lāsitudo tensua nullam memorabilem superfluitatem in corporibus sitam habet. Verum in musculis ac neruis affectio est ob uehementes distensiones facta, quas per exercitia fecerunt. Contingit enim in his rectas in musculis fibras laborare ac tendi, ut proximae sint diuulsioni. Fit autem haec lāsitudo uiris maxime boni succi, qui nō acuta & uelocia exercitia faciunt, sed magis robusta. Et efficit sane lassatos ualde pigros & ad motum aegros. Non tamen horridi sunt, uelut qui ulcerosam lāsitudinem inciderunt. At uero corpus in his nihil minus quam in ulcerosa lāsitudine, & in musculorum squallore, cōtractum uidetur. Et calidiores quam pro natura cōtingentibus esse uidentur. Sanatio autem in his est tensarum partium laxatio. Frictio igitur his cōueniens est modica simulq; mollis, per oleum dulcissimum tepidum siens, & otium ac quies, & balnea maxime temperata moderato non calidiora, & mora in calida aqua diutius facta. Quare etiam si his talē laueris, magnopere profueris. Hi etiam post balneū unctione opus habent antequam induantur. Et si quidē postea sudauerint, deterfos rursus inungere conuenit. Quin & sequenti die ubi surrexerunt de strato, post desictas superfluitates, & subductam aluū, unctione opus habet, ita ut neq; extremē frigidū oleo, neque dura frictione confricentur. Cibus dandus est his modicus quantitate, uerum boni succi, & nihil uiscosum habens.

*De lāsitudine inflammatoria, ad ossa pertingente.*

*Cap. xxxviii.*

Tertia lāsitudo est, in qua uelut cōtusae ac inflammae

tas sentiunt partes. hæc tunc accidere solet quum ob uehementissimos motus calfacti musculi, attraxerint quid de circumfusus ipsis superfluitatibus. Et sola hæc eleuat musculos præter naturam, ut inflammationi similis sit affectio. Et propterea ex contactu dolent, & calidiores apparent. Dolent autem magis quum moueri uolunt. Si uero circa tēdines aut neruos in profundi eandem affectionē tam appellant, ob sensus profunditatem. Hæc lassitudo accedit ut plurimum hominibus ad exercitiā non aduersis. Sanatio scopos tres habet, quemadmodum omnia inflammata: superflui euacuationem, distantē partis remissionem, & inflammationē refrigerationem. Oleum itaque multum dulce tepidum, & fricationes molliores, & in temperatissimis aquis mora diuissima, tales lassitudines sanant. Si uero etiam paulo tepidior fuerit aqua, magis his prodest. Ita uero & quies multa & assidue inuictio. Cibi dādi sunt his boni succi, uerum pauciores, & nihil omnino uiscosi habentes.

*De lassitudine ob siccitatem ac gracilitatem.*

*Cap. xxxix.*

Alia præterea est quarta affectio, similis quidem lassitudini, sed non est lassitudo, eod quod neque ulcerosam, neque tensiua, neque inflammatiuam affectionem habet, imò neque horrore aliquem, neque dolorē, neque ad motus pigritiam similē lassitudinibus infert: uerū solum gracilitatem cum siccitate. Cōtingit igitur in boni succi & exercitatione utriusque corporibus, quū immo destitutus exercitatus non probe recurata fuerint. Discutuntur enim sic superfluitates, & laxatur diffusa corpora. Et nihil reliquū sit in corpore præter siccitatē, quæ ex immodica euacuatione habet. Quare etiā correctio huius affectionis in appositione ac repletionē euacuati cōsistit. Non potest autē hæc fieri, dum cutis rarefacta est. Proinde cutē contrahere oportet, ac densare, & adstringere. Contrahit autem & adstringit, tum frigida aqua, tum feruens. At si frigida periculū est: ne homo lædatur, qui iam rarus simul ac uacuuus ob exercitiorum copiam factus est. A feruenti uero nulla læsio, sed secunda densitas cuti accedit, ita ut etiā relictus in ipsa calor reuocetur ex seruendis aque solutio. Vnde seruentius calidæ solium parandū est. Existat autem ex ipso statim in frigidum, quo in ipsis maneat firmitas in cute unā cum caliditate. Nam & in sequenti tempore minus discutiuntur, & alimentum facile in carnes & in cutem suscipiunt: quo bono nullum maius ipsis excogitare possis. Vitāda est autem longior in frigida solio mora. Exoluit enim frigida solio, calidæ lodonis utilitatem. Prima itaque die lotus uelut dictum est, cibum accipiat boni succi & humidiorum. Secunda uero recuretur, modicæ simul ac mollis & lenæ frictionis usu, & solio calido. Atque hoc faciat consequenter per multos dies.

*De Lassitis ex uenere.*

*Cap. xl.*

Debilitas uirum sequitur ad immodicū ueneris usum, præsertim in corporibus naturā debilibus. Rarefit autem ipsis & cutis, ex uehementi motu. Et plurima sit per trāspirationem discussio ac exhalatio, & propterea siccitas. Aliquando uero etiā frigiditas consequitur, tum propter raritatem, tum propter caloris trāspirationem ac sudores. Correctio igitur horū est per contingentiā spissantiāque ac corroborantiā cutem. De quorum numero est & moderatum exer-

cidium, & seruentius calidæ aquæ solium, quales item ac somnus uentus. Edulia uero sint multitudine quidem pauciora, qualitate uero humidiora, & moderate calidiora: quo & concoctio bona fiat, & siccitas ex lassitudine corrigatur.

*De lassitudinibus spontaneis.*

*Cap. xli.*

Quum de lassitudinibus ex gymnasticis, aut ex itinere obortis dixerimus, nunc de his quæ fine uehementi motu sponte sunt docebimus: tales enim morbosæ sunt, uelut etiam Hippocrati uidetur. Lassitudines enim, inquit, spontaneæ denuntiant morbos. Sunt autem, & harum tres differentiæ, ulcerosa, tensiua, inflammatoria.

*De lassitudine ulcerosa spontanea.*

*Cap. xlii.*

Spontanea igitur ulcerosa lassitudo, ob uitiosis humoribus clandestine coalitis fit, qui acres & tenues ac calidi sunt, ut corrodant & stimulent ac pungant corpuscula sensu prædita. Et quam diu quidem ipsi in uenis ammixti sunt sanguini, lateat ipsorum uis à sanguinis bonitate superata. Vbi uero in carnes ac cutē trāssumpti fuerint, & per mansionem confirmati, tunc ulcerosam affectionē ac sensum inducunt. Et tunc maxime in talibus augentur, quū moueri uolunt. Considerandum est autem in his, utrum in cute & carne sola uitiosi humores continentur, aut etiam cistanguine intra uenarum uasā. Horum autē signa habes ex urinis, & morsu dæ cutem, & sudoribus. Quando enim unā cum hoc quoddam in urinis apparent uitiosi humores, sensus quoque ipsorum mordax circa cutē contingit, & sudores aleni, tū colore, tum sapore apparent, manifestum est quoddam in uenis cum sanguine uitiosis humoribus continetur, & quoddam in cute sunt ac carne. Si quidem igitur modicus sensus uitiosorum humorum cōtingat, seculū hominem per totum diē seruabimus, quiescere ac dormire iussim. Deinde uesperī multū & pinguis illito, atque temperatissima calida loto, paucissimum boni succi ac forbilem cibum dabimus. Neque uero unum prohibebimus: concoquit enim unum semicrudos humores, si quicquam aliud hoc facit, & sudores ac urinas prolicit, & ad somnum cōducit. Si quidem igitur prædictis quiesuerit hoc symptoma, paulatim ad cōsuetam reducere hominē oportet. Si uero sequenti nocte ac postera die adhuc permanferit, aut actum fuerit, uidendum est de auxilio fortiore. Nam tales ubi uires robustæ sunt, alterū ex duobus facere oportet, ut aut uenam secent, aut purgatione utantur, ita tamen ut decernas uero auxilio magis opus habent, uelut consequenter dicam. Sin uero debiles fuerint uires, minime secanda est uena. Purgandum uero moderate aut omnino non. Si quidem enim cum multitudine sanguinis robustæ fuerint uires, uena secanda est, aut cōsuetæ excretionēs suppressæ mouendæ: uelut sunt hæc morrhoides in sede, & in mulieribus lunares purgationes. At ubi soli uitiosi congregati sunt humores, citra sanguinis multitudinem, ad conuenientem redundancy humorū purgationem ueniendum est. Asfligit autem quandoque bilis amaræ humor, aut argē, quandoque pituita salia aut acida, aut serosi humores. Si quidem igitur ociosior uis habuerit humor, et cibus crassius succi usus fuerit, & præsertim in hyme, pituitosus humor colligitur. Verum in pluribus laboribus & cibus acrioribus, & in æstate, amara bilis coaceruat. In autumno uero, & edulsi eiusmodi, ac la-

boribus



boribus diuturnis, atra bilis. Horum uero notas sumere oportet, & ex colore, & ex hominis motibus, & ex urinis ac sudoribus, & ex siti ac ciborum appetentia. Proinde sanguine prædominante reliquis humoribus, unâ cum uiribus robustis, uenam secabis. Si uero uisiosi humores prædominantur, & uires robustæ sunt, purgatione cõueniẽt utemur. At post uenæ sectionem aut purgationem, nutrire oportet hominem eduljjs boni succi quæ exteriorum quid habet, uelut est pitana: & quæ nulla uiscositate prædita sunt, neque crassi succi sunt, neque multum nutriunt. Utendum est & balneis temperatissimis, & unctiõne ac frictiõne moderata. Sed & reliqua diætæ cura sic facienda est, uelut relaxum est in lassitudine ex gymnasijs generata. Si uero bonus sanguis paucus fuerit, crudi uero humores omnino multi, uires autem debiles: Neque uena secanda est, neque purgatione, neque exercitio utendum: Imò neque omnino motu utendum est, neque lauandum: Nam uenæ sectio bonum sanguinem euacuat, uisiosum autem, qui sanè in magnis uenis circa hepar & mesenterium congregatur, ad totum corpus trahit. At purgatio in his tormina ac morfus efficit, & animi deliquia intetæ, ad hoc quod nihil memorabile euacuat. Crudi enim humores omnes pigri sunt ac ægre mobiles, ob crassitudinem ac frigiditatem. Itaque obstruant omnes arctas uias, per quas oportet id quod in purgationibus euacuratur ad uentrem accedere ac inferri. Et ob hanc causam neque ipsi euacuantur, & aëlios impediunt. Ob eandem uero causam neque exerceri, neque omnino moueri, neque lauari hos conuenit. Omnes enim tales motus humores in totum corpus ducunt, & angustos transitus obstruant. Seruandi igitur sunt in omni quiete, & danda edulia potusq; ac pharmaca attenuantia ac secantia, & crassitudinem humorum confidentia, cura manifestam calfactionem. Nam humores quomodocumque fortiter calfacti, undique per corpus meant. Vtantur igitur in uitæ aceto multo præsertim, aliquando & pitana: Aliquando uero danda est & aqua multa. Possunt enim ferre tenuem diætam, si qui alij idem possunt, propter subiectam crudorum humorum multitudinem. Quandoquidem uero præcordia omnibus talibus eleuata sunt ac inflata, & facile sanè inflantur, quicquid tandem ingesserint: præsterit ipsi dare cum cibo modici piperis, præsertim longi. Melius fuerit & dispositio uti medicamento. Commodissimum est autem ipsis acetum multum, ex solo optimo melle & aceto præparatum: ut sint mellis quidem despumati partes due, aceti uero pars una, plus minus. Præstat enim ex accipiente sensu modum iudicare, non nostris commoditatibus. Nam quod naturæ iucundum est, hoc commodum est. Quod uero iniucundissimum est, hoc maxime aduersarium est. Prodest talibus etiam apomeli, & præsertim aridum factum. At ubi iam attenuati aliquantulum fuerint humores, etiam uinum dandum est moderatum, album ac tenue. Sed & in apomelite ac aceto multo coquendum est aliquando hyssopum & pulegium. Eduljjs uero utendum attenuantibus, citra uehementem calfactionem: qualis est capparitis ex aceto multo, aut ex aceto & oleo. Postquam uero omnia perfecte bona tibi apparuerint, tunc ad familiarem uictum paulatim reducere conare, ita ut mo-

deratis exercitijs utantur, & balneis, & unctiõnibus. Idoneum est autem ipsis unguentum lassitudinem eximens ex abiete paratum, itemq; quod ex populo nigra sit, quorum præparandi modum inter Acopa uocare referemus. Congruũ est ipsis & oleum chamæmelinum, & anethinum. Item sampsuchinum tempore hyberno. Sampsuchinum uero oleum sic præparatur. Coquitur sampsuchus in duplici uase cum oleo. Similiter coquitur & rosamarinus herba. Si uero hæc non habeas, radicẽ cucumeris syluestris, aut althææ, aut bryoniæ, aut betæ albæ accipe, & cū oleo coque, multum enim discutunt.

De lassitudine tensiua spontanea. Cap. XLIII. Tensiua spontanea lassitudo, si sine exercitijs, aut alio quodam motu excitata fuerit, multitudinem nimirum humorum indicat, qui nimia copia solidas animantis partes distendunt, & præsertim musculorum fibras. Vlcerosus sensus non est in hac lassitudine. Sed neque tumor alicuius partis tactum aut uisum cadens. Verum solum grauitatem & distentionem percipit. Manifestum est autem quod sanguine redundante, optimum auxilium est uenæ sectio in cubito. Possunt & uenæ in talis secari. At uero post totius corporis euacuationem, ad distictarum partium laxationem procedendũ est, per unctiões ac frictiões molles, oculumq; ac quietem. Et utendum est balneis temperatis, & cibis citra mordacitatem exteriorum quiddam habebitibus, qualis est pitana, & apomeli, & consimilia. Et ut in summa dicam, post uenæ sectionem eadem cura uti oportet, quæ relata est ante ad tensiuam lassitudinem ex gymnasiolorum exercitijs obortam.

De lassitudine inflammatoria spontanea. Cap. XLIII. Inflammatoria lassitudo quum sponte citra aliquem motum oborta fuerit, tum propter doloris magnitudinem, tum propterea quod cum manifesta inflammatione partium caliditate consistit, coeleuans musculos in tumorem, neque paucarum horarum, nedum dierum duorum aut trium moram ac dilationem tolerat. Sed statim febrem uehementissimam inducit, nisi quis sanguinem detrahendo præueniat. Calidissimus est enim talium sanguis, & plurima opus habent ipsius euacuatione, omnes ferme ab hoc malo apprehensi, & pleriq; ipsorum etiam post uenæ sectionem febriunt. Quare neq; cunctari, neq; parum detrudere conuenit. Sed & cito euacuare, & usq; ad animi deliquium ducere, si nihil aliud amplius impedit. Præstat autem & detractionem repetere in eadem die, ita ut in priore euacuatione homo non animo linquatur. In posteriore neque ferendum est animi deliquium. At quibus hoc modo affectis uenæ secta non fuerit, aut sponte aliunde sanguis eruperit, hi bona fortuna opus habent ut seruentur, & neque seruantur. Si quidem igitur in capite & collo dolores magis hæserint, humeralem appellatam uenam secare oportet. Si uero thoracem & dorsum & lumbos doleant, internam uenam secabis. Sin æqualiter totum corpus, mediam. Si quidem igitur ad uenæ sectionem febris permanserit, curationem facere oportet, quam in febrium tractatione referemus. Si uero sine febre maneant, in prima quodam die ad uenæ sectionem, pitanae succus aut alicæ solum dandus est. Similiter autem & secunda. Si autem & in tertia die sine febre manet, etiam lauato & largo oleo inungito.

inungito. Etiam si autem laueris, moderatum tamen uisum exhibebis ex lactuca, aut si ea non addis, cucurbita: & alicam uelut prisanam coctam. Sed & betta, & malua, & atriplice utendum est, si non addis lactuca. Ex piscibus dandi sunt petrosi, & assellus ex alio iure probè coctus. Viatur aque potu. Aquæ potum dico, non frigida aquæ potonem, sed calidæ. Post tertiam si tolerabilis manet æger, inspergere oportet in potum, uini parum alibi ac tenuis, & de cætero pro ratione reficere, per boni succi & neuinquâ calfacientis diætæ usum.

*Quali curatione ad frigiditates utendum est.*

*Ex Herodoto.*

*Cap. XLV.*

Duplex est frigiditatis curandæ modus. Nam & futuram frigiditatem præcauere oportet, & corrigere iam factam. Quo igitur non capiatur frigiditas, is qui in frigido aëre uersaturus est: neque famem tulisse, neque præuomuisse oportet, neque cruditate perituisse, aut fatigatum esse, aut crapula impletum esse. Frigiditas enim consequens ad ciborum cruditatem, morborum causa est. His uero qui famem perulerunt, frigiditas ad ipsos neruos penetrat, qui nudi quodam modo sunt, & propria materia priuati. Quapropter qui in frigido aëre uersabuntur, totum corpus nardine uero aut gleucino oleo præinungere debet. Plantas autem pedum, cerato ex laurino parato illinere. Aut ipsas lauri baccas cerato exdpi, ac utere. Verum ex ueteribus quidam succum cyrenaicum milij magnitudine, in talibus necessitatibus deuorandum dederunt, cæra oblitum. At uero à conuersione in frigido aëre, desistere non oportet, sed ambulare prius in tepidior loco. Et postea ad balneum ingredi, & in calida aqua diutius morari. Non præsentem uero balneo, ad ignem corpus illinendum est, ac confricandum diligentiùs tum per seipsum, tum per alios. Deinde accipiendum est cibus calidus potentia & actu. Vinum uero neque ualde acerbum, neque nimis uetus dandum est. Tale enim neruofas partes offendit, iam à frigore uexatas, & præsertim uesciam ac renes. Si uero sequenti die frigiditas perseueret, curatio per balneum aut inunctionem conuenit. Et diætæ consimilis, & accopa ex oleo gleucino & amaracino ac similibus præparata.

*Cutis densitate curatio. Galeni.*

*Cap. XLVI.*

Densatur aliquando cutis, tum per uehementem frigus, tum per balnea aluminosarum aquarum, aut aliquid huiusmodi. Fieri potest autem ut & post balneum, & post sudores, aut alio quodam modo rarefacta ac refrigerata cutis densetur. Cognoscitur affectio calore albidior quam pro natura, & cutis ariditate ac desiccata, & quod sic affecti in exercitijs ægre calciant. Neque enim sudant, neque bonum colorem habent. Si uero enim à plurimis exercitijs coacti sudauerint modicum ac frigidum sudorem excludunt. Sanatio horum est calfactio & cutis rarefactio. Utendum igitur est exercitijs, & balneis calidioribus. Præstat autem in prima balnei domo super leui lapide sedentem perfundere. Vngantur etiam oleo quopiam laxatorio, uelut est quod dulcissimum est, uerum duorum aut trium annorum. Viuntur & lauacro natationi apto, calido, temperato diutius. In frigido uero ne immorentur. Neque uero aqua sit ualde frigida. Vbi uero induere se uolunt, inungantur aliquo moderatè calfaciente, quale est anethinum aut cidnum. Ex

ungentis uero gleucinum, aut fuliginem, aut irinum, aut amaracinum. Cibis porro utantur moderatis, nihil uiscofo habentibus.

*Quomodo curandus sit æstuosus ardor. Herodoti.*

*Cap. XLVII.*

Quemadmodum frigiditas famelicis magis lædit, sic ardor repletos. Quare qui in æstiuo sole uersari uolet, repletionem & acrium esum uiter, uinositatem item ac cruditatem, præhumeret autem corpus balneis potabilium aquarum, & cibis humectantibus, prospiciendum est & in mora ipsa sub sole, ut caput tegatur leuiore aliquo uestimento, aut solijs uitis, aut myrti, aut polygoni. Si uero sitis uehemens oriat, non acuatim ingerendum est frigida potum. Plurimum enim hinc præterfuso aquæ inter cutem contingit. Alijs uero ad ardentem pulmonem aquæ frigiditas illapla, tussis & grauedines excitat, aliquibus etiam tabem. Præstat igitur prius faciem frigida proluere manibus, ac pedes, deinde colluto ore paulatim ex interuallis absorbere. Postquam autem discessit a sole, temperata calida se lauet, & in frigida nateat. Si uero non addis balneum, aqua & oleo, aut aqua & rosaceo totum corpus humectetur, & mollibus manibus præfricetur, & tunc in frigidam insiliat; præsertim si asuetus fuerit. Si uero nihil tale adest, aqua perfundatur. Postea potus quidem sit aqua. Edulia uero, lactuca, inryba, cucumis, cucurbita. Vinum quoque dilutius solito sit. Obsonium pisces delicati, domesticæ gallina ex iure albo. A coitu uero abstineat. At ubi caput uehementer calfactum est, aut stomachus adhuc exardet, ut alba & glutinosa sit salua, ut uix sputo reijci possit, & reliquum corpus pigrum apparuerit, ac uelut exsolutum: caput rosaceo irrigandum est, aut rosari succo cum oleo omphacino, aut polygoni succo, aut pampinorum uitis, aut inrubi, aut allicuius similis succo. Totum uero corpus humectandum est aqua & oleo, aut aqua & rosaceo. Super stomachum autem molle linetolum imponendum uti non & oleo imbutum. Aut ceratum rosaceum, aut melinum quod ablinthium habet aut portulacum. Optimum est autem & ablinthij cremorem bibere, ad detergendas biliosas & acres in uentre congregatas superfluitates. Conducit & rosaceum absorbendum dare ad cyathi unius mensuram.

*De matutina frictione. Galeni.*

*Cap. XLVIII.*

Matutinam frictionem assumimus post superfluitatum excretionem, excellenter quidem mollè in plus iusto resiccatis, & in his qui in uehementi frigore uersari uolent, & quibus propositum est frigida lauare, & qui lassitudinis sensum habent, & in quibus cutis densitatem corrigere uolumus cum largo oleo. At uero densitatem ex frigore obortam sanamus, primum quidem scarum, & asperam frictionem usu, deinde frictionibus ex oleo calido. Ad raritatem uero cutis obortam ex balneis, aut frictionibus, aut ob ueneris usum, paucis quidem scissis frictionibus utimur, paucis uero etiam post ipsas, ex oleo frictionibus, & eo quopiam ex adstringentibus. Cæterum humiditates ex multo potu obortas solæ siccæ frictiones curant, per lintea factæ, citra pinguitudinem, aut cura aliqua ex discussoria ui præditis.

*De uespertina frictione.*

*Cap. XLIX.*

Vespertina frictio lassatis, aut resiccatis, aut alimētum

non sentibus comoda est. Prandium in his parcius fiat, & amplius tempus intercedat usque ad coenam, & plenius in quiete. Deinde etiā paululum debuleant. Melius enim est si subductis cibis etiā ventrē exonerauerint. His ita factis, citra periculum frictio assumitur. Frictio fiat cum oleo dulci, ventrē penitus non cōtacto. Perfrictio est enim & ipsos cibos prius cōcoqui, & semicōctum aliquem humorem digerere, & caput perturbare, & stomachum subuertere. Quare nardino unguento ventrē perfundendus est absque frictione.

De cruditate.

Cap. v.

Quot modis cruditas fiat, & quomodo variè resistere oportet oborientibus ex hac corpori detrimentis, in loco de alui affectionibus postea declarabitur. Nunc vero necessarium est dicere quomodo ad urgēda accidentia insistere oportet. Ructu itaque accedente ac iritante, & grauitate circa prae cordia existēte, & ex hac molestia quādā in totum corpus se diffundente, non cunctandū est ad uomitum deuēire, sed aqua plurima tepida hausta cogendus est, ut cibi penitus excernantur. Vbi enim permāserint, & torminum, & dolorū, & grauitatis capitis, & destillationis, aliquādo vero etiā febris, causa sunt. Si uero quis natura difficiulter uomat, aut ob aliam causam uomere impediatur, elaborādū est omni modo ut cibis subducatur, & ex praecordijs secedat. Ad hac erectior decubitus pareat. Adiuuat enim, si quicquid aliud, concoctio. Et si uisulans quis fuerit, propter nimiam expletionem somnū assidue non potens, is immotus permaneat, & eandē decubitus figurā conseruet. Nā assidue conuersiones status pariuunt. Flatus autē materiam sursum uergere faciunt. Si uero perseverarit hoc accidens, etiā pharmaci cōcoctorij ex malis cydonijs preparati, cochlearij mensura danda est. Si uero quis aduersus sit ad frigide potū, & multam sitim percipit, non incongruū fuerit sincerā frigide heminam exhaurire. Celerim enim corroboratum os uentris, quae in aluo sunt expellit. At ventrē nardino unguento illinere oportet, & partes circa praecordia fouere, & extremarū partium frictione uti. Exonerata aluo ad deambulationē procedendum est, tardo progrediendo, ne uapores ex cruditate ad caput allati concutiantur. Postea uero ad consueta uitae munia pergendum est. Deinde succedat balneū, & inunctio ex oleo dulci. Vtilis est & abinthij potus. Cibo uero utendum est facile concoctili ac moderato, & cui addita sunt quae aluo commodant, uelut funerinae & cancri. Deinde olera, beta, malua. Modicē utendum est uino, uerum calidiore. A reliquis uero abstineat, uelut sunt acriū elus, & bellaria, ac placenta ex melle, & fructus dulces. Talia enim omnia aegre cōcoqui ac digerere possunt. Hinc autem somnus imperturbatus succedat.

De erapula. Philumeni.

Cap. li.

Sed & cruditates ex uino obortas, quas crapulas uocant, ferē eodē modo tractare oportet, ita ut cogamus ipsos uomere a tepida aqua, aut sola immisionē digitorū ut pennarū, & in lecto quiescere iubeamus, & turbationē somno sedemus. Et si quis sanē ad frigide potum aduersus sit, & stomachi ac uentris uexationem siue morbum perceperit, dādi sunt ipsi cyathi duo aut tres sinceræ puræ frigidae aquae ex interuallis. Sedata uero turbatione, cibos exhibebimus boni succi, & magis frigefacientes. Potus autē sit modicus, uis-

num album & tenue, dislutus temperatū. Optimus uero in his est uini abinthitae potus a balneo.

De aequalibus intemperaturis. Galeni. Cap. l.iii.

Quā tractauerimus quomodo quis a prima etate usque ad senectutem conseruet hominem optime constitutum: transibimus nunc ad eos qui statim ab initio morbosam corporum constructionem adepti sunt. Duplices autem sunt secundum genus uitiosae corporum structurae. Quaedam enim aequaliter habent repperatas uniuersas corporis primas partes, quae similes appellantur. Quaedam uero inaequaliter. Dico autem aequaliter, quum ad aliquā intemperaturā immutatae fuerint omnes simul corporis partes, frigidiiores quam conuenit, aut calidiiores, aut sicciores, aut humidiores factae. Et per conuagationem, quaedam calidiiores & sicciores, quaedam humidiores & frigidiiores, quaedam calidiiores & humidiores, quaedam frigidiiores & sicciores. Et sanē iuxta instrumentaliū partium compositionē, aliquae aequaliter, aliquae inaequaliter compositae sunt. Vidi enim iam quosdā habere uentrem quidem frigidū, caput autem calidum; alios uero caput frigidū, uentrem uero calidū. Vidi autem & uentrē per accidens assidue bile uexatum, qui non esset natura calidus. Quemadmodum etiam alium frigidē, qui nō esset frigidus. Sic & caput, & hepar & splen, & omnes alię partes, fruuntur aliquando alterius intemperaturae, quā ipsae ex natura nihil laese sint in propriū temperamentum, neque contrario modo dispositae. Proinde de primis optimū temperamentū adeptis a me dicitur, quo hoc exemplum habes quod temperatū est. Deinde de his quī aequalē intemperaturā habēt. Demonstratū est a me saepe, impossibile esse unam aliquam intemperaturā diutius perseuerare. Ipsa enim sibij ipsi necessariō alia quandam acciscit. Illud porro nosse expedit, quod quaecumque corpora morbosam structuram in prima natiuitate habuerunt, ea omnino non perueniunt ad senectutem. Si uero etiam peruenerint, unum quendam morbum diuturnū habent. Proposuius autē in hac tractatione de uitiosam structuram habentibus agere, considerantes quomodo quis ipsa conseruet ut plurimum sana. Prius uero referendae sunt temperamentorum notae, postea consequenter etiam inaequalitatem temperaturarum correctiones.

Optimi temperamenti dinotio.

Cap. l.iiii.

Optimē temperatus est homo quī corpore apparet exactē mediū inter omnia extremē disposita corpora, in graditate ac crassitudine, mollitie ac duritie, caliditate ac humiditate, siccitate ac frigiditate. Et, ut in summa dicā, si animales ac naturales actiones inculpabiles habuerit. Medio item modo se habuerit inter hirsuta corpora ac glabra, & inter nigra colore ac alba. Habuerit autem capillos, dum quidem puer est fuluiores, in uigore uero aetatis flauiores.

Temperamenti calidi notae.

Cap. l.iiii.

Calidius quam conuenit temperamentū totius corporis, nūc dico illud quod proportionē secundū humiditatem ac siccitatem inculpabilem habet. Qui igitur ab initio talē corporis naturā adepti sunt, saniores alijs apparent, & articulata uoce loquuntur, & canit, & citius gradiuntur. Augebitur autē ipsis caliditas pro annorū proportione. Iuxta uigorē autē aetatis palam calidiiores apparent. Quare morbis & aciditibus a flaua bile facile capiuntur: Nā multa caliditas paulatim

latum consumens humiditatem, siccius temperamentum efficit. Hi colore rubicundi sunt, & nigros capillos habent, progressu uero temporis etiam moderatē densos. Habentq; uenas amplas, sunt enim & graciles. Nam pingues & uenas amplas habentes, non natura pingues sunt, sed acquisitum temperamentum habent.

*Temperamenti frigidi nota.*

Cap. LV.

Frigidum ad contactū est his corpus, depile, & pingue. Color autem unū cū capillis, fuluioi his est. Si uero multa est frigiditas, luidi sunt & plumbei coloris, et angustas uenas habent. Si uero quis angustas habet uenas, & gracilis est, is necessario acquisitum temperamentum habet, & non ex natura gracilis est.

*Siccioris temperamenti nota.*

Cap. LVI.

Agrē mobile, & siccum, & squalidum in his fit corpus facile ab omnibus siccantibus. Nam & natura excarnes sunt ac graciles. At cū hoc quoddā graciles sunt & excarnes, amplius etiam durū & asperū apparet tangentibus horum corpus. Gracilitas autem non solum ad naturales consequitur temperaturas, sed etiam ad acquisitas ex longa consuetudine succedit.

*Humidioris temperamenti signa.*

Cap. LVII.

Humidius temperamentum in reliquis consimile est temperato. Verum mollius & carnosius. Nam mollicies ab humida temperatura separari non potest. Quemadmodum sanē & crassities non solum ad naturalem sequitur temperaturam, sed etiam ad eā quę ex longa consuetudine facta est, succedit. Proprium autem est humiditatis etiā grauari corpus ab omnibus humectantibus.

*Calidi ac humidi temperamenti nota.*

Mollius & carnosius est hoc, optimo temperamento. Vbi uero plurimum fuerit augmentum, putredinis facile capitur morbis. Si uero paulo humidius, multo uero calidius fuerit, tales molliores sunt moderatis, & carnosiores, & non paulo calidiores. Nigri autē sunt ipsi capilli, & caro non pinguis. Si uero paulo calidius, multo autem humidius fuerit, molliis his & multa est caro, & color mixtus ex rubro ac albo: & ad contactū paulo sunt calidiores. Quod uero in summa dicam, in coniugatis temperaturis semper prædominantis qualitatē notę præualeat.

*Calidi ex siccis temperamenti nota.*

Cap. LIX.

Calidum & siccum temperamentum hispidius ac calidius est, & gracile. Capitis autem pilos boni habitus & nigros ac multos habet in iuuentute. Temporis uero progressu etiam caluities sequitur. At uenę ipsius amplę sunt, & arterię magnę ac uehementissimę pulsanter. Et sanū & firmum, & articulatū, & musculosum, & minimē pingue totum corpus. Et cutem ipsam duriorē ac nigriorem.

*Frigidi ex humidi temperamenti nota.*

Cap. LX.

Thorax his angustus est, & pili nudus, quemadmodum etiam totum corpus. Cutis autem tenera & alba. Capilli subtili, præsertim in iuuentute, & senescentes non caluescunt. Sunt item timidi, & minimē audaces, ac pigri, & obscuras habent uenas. Et crassi sunt ac pingues, & femoribus ac musculis infirmi & inarticulati, & sunt blęsi. Quod si frigiditas ac humiditas amplius augeantur, color unā cum capillis fuluus euadit. Si uero plurimum augeant, luidus. At si inæquale fuerit qualitatum augmentum, eius quę

magis aucta fuerit proprię notę prædominabitur.

*Frigidi ac siccis temperamenti nota.*

Cap. LXI.

Si uero frigiditas ac siccitas ex æquo fuerint auctę, natura durū & gracile habent tales corpus, albumq; ac non musculosum, & inarticulatū, ac depile, & ad tactum frigidū, pinguitudo tamen ipsi etiam si graciles sint, per carnē disseminata est. Pili & color corporis pro mensurę frigiditatis portione se habent. Porro quum calida & siccā temperaturā, in tempore inclinatę ætatis, sæpe transeat in siccā ac frigidā: habitus talium gracilis ac durus similiter fit, uerum melancholicus est. Et propterea colore nigriores ac hispidiores sunt. Prædominantur autem semper prædominantis temperamenti notę, obscurę uero alterius notę erunt.

*De capitū diuotione.*

Cap. LXII.

Caput paruum quidem uitiosę cerebri structurę proprium signum est. Magnum uero non necessariō bonę. Si quidem enim propter robur insitit uirtutis materiam multam ac bonam creatis factum est, bonum est. Si uero propter solius materię multitudinem, non bonum. Distinguentium uero de ipso tum ex figura, tum ex his quę ab ipso ortum habent. Ex figura quidem, si fuerit conchina. Semper enim hoc signum bonum est. Ex his uero quę ab ipso ortum habent, si ualidam ceruicem habet, & alijs ossibus optimē dispositi est. Et si uniuersum ipsorum neruosum genus bene nutritur, ac robustum est. Et si oculi acri uisui fuerint præditi. At uero acuminata capita defectuosam circa occiput aut frontem eminentiam habent, aut ultra iustum modum auctam. Proinde uel plurimum sicut magna, ita etiam hæc capita uitiosa comperimus. Raro autem & ex his aliqua sunt, bona, efformatrice ipsorum uirtute forti existēte, & multitudinē materię bonam adeptā. Nam qui acuminata capita habent, & ceruice ualida præditi sunt, hi tum alijs partibus omnibus, tum ossibus robusti sunt, ait Hippocrates.

*Cerebri temperati nota.*

Cap. LXIII.

Temperatum cerebrum naturales actiones moderatas habet, itemq; superfluitates quę per palatum, aut aures, aut nares purgantur: minimēq; ledetur ab omnibus extrinsecis quę calfaciunt, & refrigerant, & siccant, & humectant. Talibus pili capitis dum infantes sunt, subtili sunt, pueris uero subtili: perfectis autem flauī sunt, medium quodammodo tenentes inter exactē crispas ac simplices. Nec uero facile caluescunt.

*Cerebri calidioris nota.*

Cap. LXIIII.

Si uero moderato calidius fuerit, uniuersa circa caput rubicundiora ac calidiora erunt, & oculorum uenę conspicuę. Pili his genitis cito in capite oriuntur, ubi multo sunt calidiores temperatis, nigri & multi, & crassi ac robusti. Vbi uero non multo, subtili primum, deinde nigrescunt, & progressu ætatis caluescunt. Superfluitates in palato, & naribus oculisq; ac auribus, pauca his sunt ac matura, quum inculpate sani fuerint. Replentur autem capite maxime, quum incauta diæta utuntur, & grauatur a calfacientibus edulijs, potibus, & odoribus, atq; omnibus forinsecus accidentibus. Et hoc magis adhuc, si non solum calida ex natura fuerint talia, sed etiam humida.

*Frigidioris cerebri nota.*

Cap. LXV.

Superfluitates plures circa proprios meatus hi habent,

Capilli uero ipsi recti sunt & fulvi ac stabiles, & multo tempore à nativitate orientes, tenues ac macri primum. Et citò à frigidis causis læduntur, & iuxta ipsum læsionis tempus destillationibus ac grauedine corripuntur. Neque uero capitis partes ad tactū calidæ sunt, neq; rubicundæ apparent. Et oculorum uenæ inconspiciæ sunt. Et ipsi quodammodo somnolentiores.

*Siccioris cerebri signa.*

Cap. LXVI.

Meatum à superfluitatibus puritas, & sensum sinceritas, signum sunt talis temperamenti. Vigilantissimi uero sunt, & pilos robustos celerrimè ubi nati sunt producent, crispis magis quàm rectos. Citò uero canescunt.

*Humidioris cerebri nota.*

Cap. LXVII.

Pili simplices, & omnino non caluescunt, & sensus caliginosi sunt & superfluitatum copia adest, & somni multi, ac profundi.

*Calidioris & humidioris cerebri signa.*

Ca. LXVIII.

Si uero caliditati affuerit humiditas, utriq; parum excedens modum, bonus color adest, & calor, & uenæ oculorum magnæ sunt, & superfluitates plures moderate maturæ. Et capilli recti ac sublaui. Et non facile caluescunt. Replentur autem & grauantur capite à calefacientibus ac humectantibus. Quum autem ad plurimam humiditatem ac caliditatem uenerit, morbosum fit his caput, & superfluitatibus redudis, & quod facile ab humectantibus ac calefacientibus læditur. Auster his ualde aduersatur, optime autem in aquilonarijs locis degunt. Neque uero uigilare possunt diutius, & ubi ad somnum se ipsos conuertunt, simul sopore premuntur altiore, & uigilijs, & insomnijs uarias imaginationes obuerfantes habet. Visum item habent caliginosum, & sensus non exactos. Si uero una temperatura fuerit intenta, notæ ipsius magis prædominabuntur.

*Calidi ac siccii cerebri nota.*

Cap. LXIX.

À superfluitatibus puri sunt hi, & sensibus sinceri, ac uigilantissimi. Et citò caluescunt: prima capillorum generatio ipsis celerrima est, & probe nutritur. Sunt autem nigro ac crispo capillo præditi, & calidi ad capitis cõtactum, rubicundiq; usque ad uigoris tẽpus.

*Frigidi ac siccii cerebri signa.*

Cap. LXX.

Frigidum ac decolor caput efficit hoc temperamẽtum, quantum in se est. Alterantur enim aliquando partes ipsius, ex humorum in toto corpore temperamẽto. Tales temperaturæ uenas oculorum latentes habent, & à frigidis causis promptè læduntur. Quare etiam inæqualiter sani sunt isti, aliquando quidem capite leuissimi, & meatibus à superfluitatibus puri: Aliquando uero destillationibus ac grauedine ob paruas causas corripuntur. Sensus ipsi sunt in ueniente quidem sinceri, & per omnia inculpabiles. Verum progressu temporis citò contabescunt. Et ut in summa dicam, Omnibus capitis partibus citò senescunt, quare etiam citò caluescunt. Capilli ipsis geniti prodeunt quidem uix, uerum macri ac fului. Progressu temporis frigiditate prædominante siccitati, non caluescunt. Si uero siccitas obtinuerit dominium, parum hi caluescunt.

*Frigidi ac humidii cerebri nota.*

Cap. LXXI.

Humidæ ac frigidæ cerebri temperaturæ soporosos faciunt & somnolentos, & sensibus uisidos, ac superfluitatibus redundantes, & quibus caput facile friget

fiat ac repleatur, & qui destillationibus ac grauedine facile corripiantur. Tales tamen non caluescunt.

*Ventris siccioris signa.*

Cap. LXXII.

Si citò siticulosi sũt, & modicus ipsis succerit potus, & uberiore grauentur, & fluctuationes habuerint sit perfluitate ipsis innante, & edulij siccioribus gaudeant.

*Ventris calidioris nota.*

Cap. LXXIII.

Calidior uenter cõcoquit melius quàm appetit, & multo magis quæ dura sunt & difficulter alteratur. Quæ enim facile alterantur, in ipso corrumpuntur. Gaudet autem edulij ac potibus calidis, & neq; à frigidis læditur, si moderatus contigerit ipsorum usus. At uero calidorum forinsecus allabentium diurnam conuersationem ferre non potest.

*Humidioris uentris nota.*

Cap. LXXIII.

Hi neque situlosi sunt, & ampliore humore clatra molesti ferunt, edulijq; humidioribus gaudet.

*Frigidoris uentris nota.*

Cap. LXXV.

Frigidor natura uenter, bene quidem appetit, non autem bene concoquit, & præsertim edulia quæ ægre alterantur & frigida sunt. Facile itaq; in ipso accendit, & propterea ructum acidum habet. Et gaudet quidem frigidis, læditur autem facile immodico eorum usu. Atque ita etiam extrinsecus allabentium ipsi frigidorum diurnam conuersationem ferre nequit. Cæterum ex morbo constare in uentre intemperaturæ in hoc differunt à naturalibus, quod contraria concupiscunt, non similia, uelut naturales. Si quidem igitur concoquit probe, temperatus est uenter. Si uero non cõcoquit, non omnino intemperatus est. Sed si quidè nidorosus ac fumosus efficit ructus, immo dicitur est ipsi ac feruens calor. Si uero acidus, uicuerit. Sic etiam uentres qui ægre concoctilia probe cõcoquant, immodicum calorem habent. Si uero ipsa non concocerint, debilis est ipsorum calor. Considerandum est autem an ob aliquem humorem alium de in uentre confluentem, hoc ipsis cõtingat. Nam ad pituitosos humores, addi ructus consequuntur. Ad biliosos uero, nidorosi aut uirosi, aut alia quædam peregrinæ qualitates. Communia autem accidentia omnium redundantium in uentre humorum sunt nausæ. Verum si quidem in uentris amplitudine humores innatarint, supernabunt in his quæ per uomitum reiciuntur. Si uero in ipsis uentris tunicis impacti fuerint, frustra lancinabunt per inanes nausæ, ita ut nihil uomitu reiciatur.

*Pulmonis nota.*

Cap. LXXVI.

Non solum uenter situlosos & non situlosos facit, & frigidi ac calidi potus appetentes. Sed etiam thoracem, & pulmo. Verum qui propter horum caliditatem situnt, plus inspirant, & amplius ac diutius estant. Percipiunt autem æstum in thorace, non circa præcordia siue hypochondria Græcis appellata, quæ admodum qui propter uentrem sit uexantur. Etsi autem ubi bibunt, non statim quiescunt: & frigidus potus magis ipsorum sitim sedat, quàm multus calidus. Refrigerat autem ipsos & frigidus aër inspiratus, qui ne alieuat quidem propter uentrem siticulosos. Sic uero etiam frigefactum thoracem habentes, à frigida inspiratione sensibiliter læduntur. Et maxima est hæc frigidum aërem inspirantes, palam sentiunt molestiam ac frigiditatem: sic calidus ipsis est gratus. Sed & pituitosus

tuitosas superfluitates hi cum tulsî rejciunt. At pul-  
monis siccitates superfluitatibus carent, & uocem pu-  
ram habent. Quemadmodum humiditates obscurâ  
& raucam uocem efficiunt, & ubi amplius aut acu-  
tius loqui uolunt, superfluitates ipsis incurrunt.

*Cordis calidioris notæ.*

Cap. LXXVII.

Magnitudo respirationis, & pulsus uelocitas ac densi-  
tas, calidioris cordis notæ sunt, audaciatq; ac ueloci-  
tas ad actiones obeundas impigra. Si uero amplior  
fuerit caliditas, exandescencia & furiosa temeritas.  
Est & thorax ipsis hirsutus, & maxime pectus, &  
præcordiorû partes thoraci uiciniores. Vt plurimû  
uero & totû corpus calidius fit ex calido corde, nisi  
hepar magnopere reluctetur. Sed & thoracis ampli-  
tudo, caliditatis signum est, nisi etiam hic magnope-  
re cerebrum resistat.

*Frigidioris cordis notæ.*

Cap. LXXVIII.

Pulsus sunt moderatis minores, non tamen tardiores  
necessariò, aut rariore. Timidi uero ex natura sunt  
tales, & socordes, ac minime audaces, & pectus pilis  
nudum habent.

*Siccioris cordis notæ.*

Cap. LXXIX.

Pulsus sunt duri, & animi contationem non faciem,  
sed feram & ægre sedabilem tales habent. Efferme  
totum corpus his siccus est, nisi hepar reluctetur.

*Humidioris cordis signa.*

Cap. LXXX.

Pulsus molles, & mores ad iram procliuës, ac facile  
sedabiles. Et totum corpus humidius, nisi hepar res-  
stiterit.

*Calidi ac siccî cordis signa.*

Cap. LXXXI.

Pulsus duri & magni, & ueloces ac densi, & respiratio-  
nes magnæ ac ueloces & densæ. Et sane multò ma-  
gis uelocitas ac densitas ipsarum augefcit, si thorax  
ad proportionem cordis responderit. Hi omnium  
maximè pectore hirsuti sunt, & circa præcordia. Ad  
actiones uero expediti, & animosi, & tyrannicis mo-  
ribus præditi, & celeres ad iram, ac pertinaces in ipsa.

*Calidi & humidî cordis notæ.*

Cap. LXXXII.

Si uero humiditas unâ cum caliditate dominetur, mi-  
nus quidè prædictis hi hirsuti sunt, nihil uero minus  
ad actiones expediti. Verum non adeo ferus est ipsis  
animus, sed ad iram solam prodiues sunt. Pulsus ue-  
ro molles sunt & magni, & ueloces ac densi.

*Frigidi & humidî cordis notæ.*

Cap. LXXXIII.

Pulsus molles sunt. Mores minime audaces, ac timidi,  
& pigri. Sunt autem hi pectore pilis nudo, & mini-  
me furiosi sunt. Nam neq; ad irâ prodiues sunt. De  
thorace ac toto corpore similiter uelut in superiori-  
bus distinguendum est.

*Frigidi ac siccî cordis notæ.*

Cap. LXXXIII.

Pulsus duri & puri: Hi omnium maximè ab ira alieni  
sunt. Quædâ tamen ad irascendum, in irâ perseuerât.  
Sunt autem pectore omnino depiles.

*Hepatis calidioris notæ.*

Cap. LXXXV.

Venæ amplæ, flaua bilis copiosior. Tempore uigoris  
etiam nigra. Calidior est ipsis sanguis. Et propterea  
etiam totum corpus, nisi cor resistat, Præcordia &  
uenter hirsuta sunt.

*Frigidioris hepatis notæ.*

Cap. LXXXVI.

Angustia uenarum, piliuita copiosior, & sanguis frigi-  
dior, & totius corporis habitus frigidior, nisi à cor-  
de calefact. Præcordia & uenter his pilis nuda sunt.

*Siccioris hepatis signa.*

Cap. LXXXVII.

Sanguis crassius & paucus, uenæ duræ, & uniuersus

corporis habitus siccior.

*Humidioris hepatis signa.*

Cap. LXXXVIII.

Sanguis copiosior & humidior. Venæ molliores. Sic  
& totum corpus, nisi cor reluctetur.

*Calidi ac siccî hepatis signa.*

Cap. LXXXIX.

Præcordia hirsutissima. Sanguis crassior ac paucior.  
Amara bilis plurima. Luxta uigorem etiâ atra, Venæ  
narum amplitudo ac durities. Sic & totum corpus  
calidum ac siccum. Nam caliditas ex corde profici-  
scens, frigiditatem ex hepate proficcientem superare  
potest. Quemadmodum etiam frigiditas cordis, ca-  
liditatem hepatis superare potest. At siccitatem hepa-  
tis, cor humidius ad contrariû transmutare non po-  
test. Quare manifestum est quòd ubi amborum tem-  
peratura in idem concurrerint, totum corpus exactè  
iuxta illas afficitur.

*Calidi ac humidî hepatis notæ.*

Cap. XC.

Minus quidem quàm calidum ac siccû præcordia hirsu-  
ta facit. Verum plurimum sanguinè & uenas ma-  
gnas habent tales. Et habitum humidum ac calidum,  
nisi cor resistat. Si uero amplius utriusq; qualitatibus  
naturalem modum exceßerit, facile capitur morbis,  
putredino sis ac mali succi, atq; hoc adhuc magis, si  
amplius aucta fuerit humiditas, paululum uero cali-  
ditas. Si uero uice uersa, modicè aucta fuerit humidi-  
tas, plurimum uero caliditas, uisiosi humores mini-  
me gignuntur.

*Frigidi & humidî hepatis notæ.*

Cap. XCI.

Depile habet præcordium, sanguinem uero operatur  
pituitosiorè, unâ cum uenarum angustia. Et corpus  
totum frigidius ac humidius, si non à corde ad con-  
trarium transferatur.

*Frigidi ac siccî hepatis notæ.*

Cap. XCII.

Frigidum ac simul siccum hepar, corpus modicè san-  
guinis, & angustarum uenarum facit, atq; frigidius.  
Præcordia uero pilis nuda talibus sunt, nisi & hic cor  
superarit.

*Testiû temperamenti signa.*

Cap. XCIII.

Calidum testiû temperamentum uenerereum est, fœ-  
cundumq; ac masculorum generatiuum. Et citò hirsu-  
tus facit genitales partes, & circumscitis moderate,  
Frigidum uero uice uersa. Humidum autem multo  
& liquido semine abundat. Siccum uero pauco  
& moderate crasso. At calidum & siccum, crassissimè  
feminis est ac fecundissimum. Et celerrimè ad coitû  
stimulat animal statim ab initio. Tales etiam celer-  
rimè hirsuti sunt circa genitales partes, & omnes cir-  
cumcirca sitas, sursum usq; ad umbilicum, deorsum  
usque ad media femora. Cœcitatum quidem igitur  
est tale temperamentum ad uenerem, uerum cuius-  
mè satiatur, & si cogatur læditur. Si uero humidi-  
tas ad caliditatem accedat, minus quidem hirsuti sunt  
hi, sed plus feminis habent. Non tamè magis alijs ap-  
petunt, sed multè ueneri minore detrimento sufficiunt.  
Si uero & humiditas & caliditas multum fuerint si-  
mul auctæ, ex ueneris abstinentia magis læduntur.  
At si testes humidî ac frigidi temperamento fuerint,  
partes circumcirca pilis nude sunt. Et tarde rem ue-  
nerem agere incipiunt, & neque ad actionem pro-  
cliuës sunt. Aquosum autem & tenue est ipsis semen  
& infœcundum ac fœminarum generatiuum. Sica-  
cum autem & frigidum temperamentum, prædicto  
quidem in reliquis simile est. Crassius est autè ipsis  
semen, & omnino modicû. Porrò quicunq; totum



scrotum cum testiculis laxatum habet, & uelut exolutum, hi uiribus ut plurimum sunt debiliores. Qui uero contractum habent scrotum unā cum testibus, & uelut adstrictū, robustiores uiribus ferme praediti sunt. Et huius rei signa sumi possunt ex omnibus quadrupedibus animantibus.

*Calidorū temperamentorū correctio. Cap. xciiii.*  
Quandoquidem in calidis interuenturis biliosa spersitas redundat: considerare in his oportet, utrum subit ipsis bilis cum secessibus ac extremis alui, aut ad superum uentrem procedit. Si enim subit, nihil moliri oportet. Si uero ad superum uentrem fertur, per uomitus euacuare a tepidæ aquæ potu. At si ægre uoment, uinum dulce tepidæ aquæ permixtum bibendum dato, atque sic uoment. Exercenti autem sunt exercitio non ueloc ac concitato, sed tardiore ac molliore. Quidam uero ex uehementi calidis omnino non opus habent exercitijs. Sed sufficit ipsis desubulatio, & balneum, inñutis oleo cum mollibus manibus. Hi etiam post cibum balneis gaudent, & aliqui ipsorum crasse facti sunt ob talem dietam. Vinū his conuenit aquosum, tenue & album. Nam fulua calida sunt, item ualde uetusta. Quare his ualde aduersantur. Attendendum est autem in omnibus qui post cibum lauantur, ne hepar affectum sit: Extremē enim læduntur tales, si post cibum lauentur. Qui uero cū siccitate calidi sunt, circa ætatis uigorem maxime opus habent humida dieta ex edulijis ac balneis, & concitatorum ac multorum exercitiorum abstinentia. Quare ætatis tempore citius lauentur, & post cibū rursus, nisi aliquid ex uisceribus affectū fuerit. Proderit his & frigidæ potus, si nihil impedierit. At siccoribus temperatis ualde aduersatur uenus. Abstinere item ab ardore, lassitudinibus, uigilijs, curis, & omnibus moribus acutis. Biliosi uero ira perdit exardescunt, & in acutas febres incidunt. Verum excessus quantitatem considerare oportet, & pro portione aucti caloris, augere etiam frigefacientem ac humectantem uictus rationem.

*Frigidi temperamenti medela. Cap. xc v.*  
Quicumque frigidioris natura sunt, circa siccum uero temperamentum ac humidum moderate se habent, minus uictiosi sunt ad corporis robur ac sanitatē. Excitare igitur oportet ac corroborare ipsorum caliditatem. In humiditate uero ac siccitate totius dietæ medium eligere.

*Humidi temperamenti correctio. Cap. xcvi.*  
Humida natura in puerili ætate fluidis & plenitudinis morbis corripiuntur, & insuper putredinosis. Opus igitur habent pluribus exercitijs, & exacta in uentre concoctione. Nam cibi qui in hoc corripuntur, putredinosorum morborum materia sunt toti corpori. Quapropter ante cibum hi loti, & naturalibus calidis aquis uentes, magnam opem sentiunt. Scopus enim in ipsis est ipsas corporis partes humidas seruire. Atq; hoc commune est omni temperamento. Nam contrariū, ipsa inquam siccitas, omnium animalium corpora citius ad senectū perducit. Quare

re si quidem possibile esset semper cōseruare humidū temperamentū corporis, uerus profecto esset sophista Philippi sermo, qui obdientem ipsi immortali fore promisit proinde diuissimē uixerit, qui minime resiccatur. Quum autem humida dieta superfluitates & humorum multitudinē generet, difficile est congruam tenere proportionē, ut neq; morbis corripantur, neq; cito senescant. Quantum igitur ad temperamenū attinet, qui humidissimi sunt, diuissime uiuunt. Et sanē etiam plus alijs sani funt, ubi corpus fuerit corroboratum: quemadmodū etiā robustissimi sunt, omnium eandē ætatem habentiū, usq; ad extremam senectutem. Et propterea laudatur hoc temperamentum ab omnibus ferē medicis ac philosophis, qui corporis elementa exactē cognouerunt. Et quidam solum hoc naturale esse putauerūt. Melius enim alijs progressu temporis euadit, quā ab initio sit deterius. Quare qui tali corpori corrigendo praefectus est, ea quæ desunt ipsi providere debet, per exercitia ante cibum stentia, & balnea ac cibos idoneos: & per plures excretiones tum per urinas, tum per uentrem contingentes. Nihil autē uetat & apoplegmatisimis pituitam ac capite trahentibus uti, & purgationibus temperatis; & prae omnibus, edulijis boni fucci, & uini urinae proritantis potu.

*Sicci temperamenti medela. Cap. xc vii.*  
Balneum ficcis corporis temperaturis omnibus commodissimum est. Temperata autem sit & dulcissima aqua. Et si bis aut ter in die lauentur, magis conferet. Sed & uniuersa dieta humectans sit. A lassitudine uero & curis ac uigilijs abstinentium est.

*Calidi ac sicci temperamenti curatio. Cap. xc viii.*  
Calidum ac siccum temperamentum uarijs curationibus subiacer. Non tamen iniucundus est similiter frigefacitium usus. Nam iuxta siccas dispositiones necessarium est, non solum uicinas uentri partes, sed etiam totum corpus gracilius fieri.

*Humidi ac calidi temperamenti medela. Cap. xc ix.*  
Quod si humida intemperatura est cū caliditate, adstringendum eduliorum usus utilis est. Sunt autem hæc austera citra caliditatem. Et sanē etiam frigidus potus ipsis commodus est.

*Humidi ac frigidi temperamenti sanatio. Cap. c.*  
Humidi uero cum frigidityte temperamenti, optimæ medelæ sunt omnia acia ac calida. Misceatur autem ipsis etiam acerba, citra manifestam frigiditatem. Optima item medela est his modicus potus. Sic autem uinum calidum fortiter & adstringens, ac ualde uetusum. His uero etiam ea quæ forinsecus adhibentur proportionē respondeant.

*Frigidi ac humidi temperamenti curatio. Cap. ci.*  
diatē predominante.  
At si frigiditas humiditatem superauerit, uictiose sunt tales temperaturæ, & hæc maxime fluidis morbis corripuntur. Prodest autem ipsis illuuiēs, & exercitia pura, & ratio uictus attenuans, & unguenta moderatē calefacientia.

## INDEX EORVM QVAE IN

QVINTO SERMONE AETII  
CONTINENTVR.

\*

**Q**uod oportet medicū naturae operum gnarum esse. cap. i.  
 Quod citra praenotionem morbi, fieri nequit ut probe cures. cap. ii.  
 Quae sint bona signa. cap. iii.  
 Quae sint mala signa. cap. iii.  
 Quae prima dies totius morbi dicenda sit. cap. v.  
 Principium morborum trifariam dici cap. vi.  
 Quid est febris. cap. vii.  
 Quid est exacerbatio. cap. viii.  
 Quid est remissio. cap. ix.  
 Remissionem dupliciter dici. cap. x.  
 Quod est principium febrilis accessio- nis. cap. xi.  
 Augmenti particularis exacerbationis signa. cap. xii.  
 Vigoris particularis exacerbationis signa. cap. xiii.  
 Declinationis particularis exacerbationis signa. cap. xiiii.  
 Quod est principium totius morbi. cap. xv.  
 Quod sit augmentum totius morbi. cap. xvi.  
 Vigoris totius morbi cognitio. cap. xvii.  
 Declinationis totius morbi cognitio. cap. xviii.  
 Quod declinatio totius morbi in iudicationibus confertim sentibus, sensum nostrum aufugit. cap. xix.  
 Quod seruandus aeger quatuor temporibus totius morbi pertransit. cap. xx.  
 Virum tardius aut citius morbus iudicetur. cap. xxi.  
 Quomodo praescire oportet, an iudicabitur morbus, aut non, et quando. cap. xxii.  
 Future id iudicationis signa. ca. xxiii.  
 Quomodo praescire oportet, bona ne an mala iudicatio futura sit. cap. xxiiii.  
 Qui sint boni iudicatorij dies et qui mali. cap. xxv.  
 In quibus ambigua est dies principij morbi, et nulla praenotatio facta, de repente contingit iudicatio, quomodo ambigua inuenire oportet. cap. xxvi.  
 De notis ex pulsibus. cap. xxvii.  
 De urinarum notis, et primum quae sit naturalis. cap. xxviii.  
 Qualis urina optima in aegrotis. cap. xxix.  
 Quod non omne alba subsidientia bonum significat. cap. xxx.  
 Quid indicet tenuis et pallida urina.

cap. xxxi.  
 Quid indicet tenuis et salua. cap. xxxii.  
 Quid indicet rufa urina. cap. xxxiii.  
 Urina tenuis mista, et postea turbata. cap. xxxiiii.  
 Urina crassa mista, et crassa manens. cap. xxxv.  
 Urina crassa mista, et postea desidens. cap. xxxvi.  
 Urina tenuis mista, et talis manens. cap. xxxvii.  
 Differentiae urinarum oleosarum, et quid significant. cap. xxxviii.  
 Quid significant eruinae subsidientiae. cap. xxxix.  
 Quid indicent surfuraceae subsidientiae. cap. xl.  
 Quid indicent laminae subsidientiae. cap. xli.  
 Quid indicet polentaceam in urinis. cap. xlii.  
 Quid indicet graecolens urina. cap. xliii.  
 Urina nigra quid significet. cap. xliiii.  
 De egestionum notis. cap. xlv.  
 De egestionibus iudicatorijs. ca. xlvi.  
 De vomitus praenotione ac significatione. cap. xlvii.  
 De eruptionis sanguinis ex narib. praenotione ac significatione. ca. xlviii.  
 Quod et per haemorrhoides, et mulieres purgationes sepe soluitur morbus. cap. xlix.  
 De significatione ex sudoribus. cap. l.  
 Abscessuum signa iudicatoria. cap. li.  
 De sputorum significatione. cap. lii.  
 Signa perfecte ac fideliter soluti morbi. cap. liii.  
 Signa morbi non perfecte soluti. cap. liii.  
 Praenotio diei qua moriturus est aeger. cap. lv.  
 Quod etiam hora mortis aegri praenoscere possit doctus Medicus. cap. lvi.  
 In acutis morbis mortem non esse praedicendam. cap. lvii.  
 Febrim diuiso, et de diarijs febribus. cap. lviii.  
 De diarijs ex lassitudine febribus. cap. lix.  
 De febris febribus ex uigilijs, et cura, aut tristitia, aut ira. cap. lx.  
 De febris febribus ex ardore. cap. lxi.  
 De febris febribus ex frigore. cap. lxii.  
 De febris febribus ex grauedine et destillatione. cap. lxiii.  
 De febris febribus ex cutis densitate. cap. lxiiii.

cap. lxv.  
 De febris febribus ex fame. cap. lxvi.  
 Dieta communis omnium diariarum februm. cap. lxvii.  
 De febris febribus ex inguinis inflammatione. cap. lxviii.  
 De diarijs febribus ex cruditate oboritis. cap. lxviii.  
 Curatio diariarum febrium multarum dierum, quarum aliquae ex mutatione diariarum generantur, ob cutis oburationem. cap. lxix.  
 De febris febribus continentibus, siue synochis. cap. lxx.  
 De uene sectione. cap. lxxi.  
 De frigidae aquae exhibitio. ca. lxxii.  
 Dieta in febribus continentibus. cap. lxxiii.  
 Vniuersalis doctrina de febribus putredinosis. cap. lxxiiii.  
 De febribus putridis. cap. lxxv.  
 Communis dieta omnium febrium putridarum. cap. lxxvi.  
 De febribus continuis. cap. lxxvii.  
 Cura febris ardens. Phil. ca. lxxviii.  
 Tertiane exquisita dinotio. cap. lxxix.  
 Tertiane exquisita curatio. ca. lxxx.  
 Tertiane spuriae curatio. cap. lxxxi.  
 De hemitritico, hoc est, semiteriana. cap. lxxxii.  
 Quartane exquisita dinotio. cap. lxxxiii.  
 Quartane curatio. cap. lxxxiiii.  
 Quotidiana febris dinotio. ca. lxxxv.  
 Quotidiana febris curatio. ca. lxxxvi.  
 De epialijs febribus. cap. lxxxvii.  
 Communis auxilia febrium per circuitum repentium. cap. lxxxviii.  
 De ignis sacri circa uiscera affectionibus. cap. lxxxix.  
 De colliquate. cap. xc.  
 De febribus quae in calidis ac siccis teporibus sunt, circa inflammationem ac putrefactionem. cap. xci.  
 De febribus hecticis ac tabidis. ca. xcii.  
 Hecticae febrium curatio. cap. xciii.  
 De popularibus passim uagantibus, et pestilentibus morbis. cap. xciiii.  
 De peste Ruffi. cap. xcvi.  
 De his qui ob crudorum humorum multitudine, animo linquantur. cap. xcvi.  
 De his qui animo concidunt, ob flaua bilem os uentris ledentem. cap. xcvi.  
 De his qui ob tenuis humores animo concidunt. cap. xcvi.  
 De alijs animi deliquij causis. cap. xcix.  
 De dolore animi deliquium inducente. cap.

cap. c.  
De animi deliquio propriè dicto. ca. c. i  
De his qui ob uentris profluuium, aut sanguinis eruptionem, aut immodici sudoris euacuationem animo linquuntur. cap. c. ii.  
De his qui ob humerum copiam, animo linquuntur. cap. c. iii.  
De his qui ob quandã uteri affectionem animo linquuntur. cap. c. iii. i.  
Ad eos qui ob stomachi debilitatem animo linquuntur. cap. c. v.  
De his qui ob uitiosos humores, uenæ tris rodentes, animo linquuntur. cap. c. vi.  
De his qui ob pituitã in stomacho collectam animo linquuntur. cap. c. vii.  
De animi deliquio ob sortem frigiditatem. cap. c. viii.  
De animi deliquio, ob multam caliditatem. cap. c. ix.  
De animi deliquio, ob inflammationem,

aut malignam febrem. cap. c. x.  
De animi deliquio ob siccitatẽ. ca. c. xi.  
De animi deliquio ob principalis membræ obturationem. cap. c. xii.  
De animi deliquio ob repentinam euacuationem. cap. c. xiii.  
De animi deliquio propter affectus. cap. c. xiiii.  
De capitis dolore in febribus. ca. c. xv.  
De uigilijs in febribus. cap. c. xvi.  
De graui sapore. cap. c. xvii.  
Quomodo lingue asperitas in febribus curanda sit. cap. c. xviii.  
Quomodo sitis curanda sit. cap. c. xix.  
De aurium dolore in febribus. ca. c. xx.  
Anris suppuratæ curatio. cap. c. xxi.  
De lippitudine in febribus. ca. c. xxii.  
De oculorũ obscuratone. ca. c. xxiii.  
Fluxus sanguinis narium in febribus curatio. cap. c. xxiiii.  
Vesicæ & urinæ difficultatis in febribus curatio. cap. c. xxv.

Lamborũ doloris curatio. ca. c. xxvi.  
Vlcerationis circa os sacrum in febribus curatio. cap. c. xxvii.  
Vlcerationis circa scrotum & anum, in febribus curatio. cap. c. xxviii.  
Pustularum in febribus curatio. cap. c. xxix.  
De tremoribus in febribus. cap. c. xxx.  
De cõulsibus in febribus. cap. c. xxxi.  
De iucundis ac commodis potionibus in febribus. cap. c. xxxii.  
De potione pharmaci ex capitibus pauperis. cap. c. xxxiii.  
Omphacomelitis preparatio. cap. c. xxxiiii.  
Mellis rosacel preparatio. ca. c. xxxv.  
Hydrosistapreparatio. ca. c. xxxvi.  
Apomelitis preparatio. ca. c. xxxvii.  
Hydromeli & Crustuminati preparatio. cap. c. xxxviii.  
Cydonati preparatio. cap. c. xxxix.  
Aceti nulli preparatio. cap. c. xl.

# AETII MEDICI

## GRAECI CONTRACTAE

MEDICINAE TETRABIBLI SECVNDAE

DAE SERMO PRIMVS, ET EX

ORDINE QVINVS

TVS.

### DE FEBRIV COGNITIONE AC CVRATIONE.



**S**ALVBRIS diætæ præcepta ad conseruandam sanitatem cõmoda ac necessaria, iã antea præscripta sunt, didicisti itaque ex ipsis, qualis & cuiusmodi diætæ usus, tum ipse quantum eius fieri posset, maximè sanus esses, cum tuæ curæ commissis singulis cõuenientem sanitatem conseruares. Quandoquidem uero dãm nobis ipsis sæpe contingit, ut negligentiore diætã utamur, aut ut propter aliquas actionum circumsstantias, aut ob ambientis nos aëris uiolentiam, læsi aliquando morboris struatur acuturam aut diuturnarum affectionum corripiamur. Præstat etiam de ipsis morbis tractare, & ab uniuersalibus febriliũ morborũ notis auspicari, tum quod hi magis abundat omnibus ætatis communibus, tum quod nõ periculo ualeant, turbantq; ac tumultum repentinum inducunt, ob symptomatum accidentium copiam.

Quod oportet Medicum naturæ & operum gnarum esse.

Cap. i.

Quare circa prognosticum Hippocratis & alios eiusdem libris, Medicum exercitũ esse oportet, & naturæ opera nosse. Naturæ enim sunt morborum medicæ. Adiuuare igitur naturam oportet ad salutem certatim aduersus morbum. Sic enim natura, ubi Medicum ea quæ oportet facientem auxiliariũ accipit, & ipsum ægrotum obediẽtem, & nihil in diætã delinquentem, morbum facile superari. Oportet autem cooperari etiam ministris, & extrinsecã, quod nihil his quæ rectè sunt resistat.

Quod citra prænotionem morbi fieri nequit ut probe cures.

Cap. ii.

Propositum est autem nobis partem eam quæ de signis ac notis morborum tractat, prius exponere. Nam citra hoc ut prænoscas in quid desinet morbus, fieri nõ potest ut modus diætæ tibi probe suppetat: & præsertim in acutis, & citum periculum inducentibus morbis.

Quæ sint bona signa.

Cap. iii.

Facies bonis signis prædita, poteris enim uel ex sola facie cõstante ac firmam prænotionẽ sumere, priusquã ægrotum contingas: dico autẽ ex sensibus in ipsa, uisus, auditus, olfactus. Et ad hæc ex respiratione, sine qua uiuere non datur, & quæ indicat nobis dispositionem cordis. Adest autẽ & loquendi instrumentũ in facie, ipsa lingua, quæ ostendit nobis rationalis animæ paratũ robur ac debilitatẽ. Bonũ signũ est & decubitus decorus, prout maximè consueuit etiã in sanitate se facile conuertere. Bonum signũ est & totũ corpus ad portandũ facile esse, & æqualiter ac leniter calidum, & sitis quantũ eius fieri potest exors. Item sanã esse mentẽ, & bene se habere ad ea quæ offeruntur. Bonũ signũ est facilis spiratio, & ordinatus pulsus motus. Ex his enim & quæ adhuc referentur, cognoscemus tũ robur, tum debilitatẽ, triũ animæ actionũ. Nam sanam esse mentẽ, & nõ defluere corpus in decubitu ad pedes, cerebrũ per omnia sanũ esse indicat, Faciei uero floriditas, & facilis spiratio, & pulsus ordinatus, cor sanum esse arguunt. Quandoque enim florida sit facies cum difficili spiratõe, uelut in peripneumonici fieri solet. Ac sitis exortẽ esse, & bene

se habere ad ea quæ offeruntur, naturale facultatem in hepate & toto corpore sanam esse indicat. Bonum signum sunt & somni boni, & sudores per totum corpus temperati & æquales ac moderati, & oportuno tempore apparentes. Bonum item signum est præcordia doloris expertia ac mollia esse. Et ad hæc fecessu alui & urinarum ac sputorū expeditos esse, & bona concoctionis signa.

*Quæ sint mala signa.*

Cap. IIII.

Totius faciei ac temporū collapsio, oculi fixi ac caui, lacrymæ inuoluntariæ, & alba oculorum in somnis apparentia, si non adfectus fuit sic dormire, & defluere corpus ad pedes, & præter morem pronū iacere, dentibus frendere, totū corpus inæqualiter callesci ac frigeri, & ad portandū difficile esse. Item sitis inter insuperabilis, & ardor internarū partium externis frigidis existentibus, excessus mentis & uelut delirium quoddam aut stupiditas, sopor profundior, auersio totius appetitus. Frigiditas oboriens ex inflammatione thoracis ac costarū, difficulter spirare, & frigidum respirare, & foras multū expirare, intrā uero parum inspirare: hoc enim iam futurū cordis mortificationē indicat, quemadmodum etiam pulsū interceptum esse, aut malè ferire. Facilem enim spirationē inquit Hippocrates, putare oportet ualde magnā uim habere ad salutē, in omnibus acutis morbis, qui cū febre fiunt, & in quatuordecim diebus iudicantur. Malum signum sunt & uigiliæ cōcomitantes, aut etiam somni sientes quidē, uerum turbati. Sudores frigidi & inæquales, & non per totum corpus, & aliquando nullū figuram præ se ferentes ac uiscosi. Frigiditatem enim fortem hæc indicant. Et non in debito tempore apparere sudores malū est, & sudores statim febrem sequi. Item suppressio retrimentorū alui, & maximè uelicæ, & aliarum excretionum. Idem etiam si hæc præcedant, & alicuius perniciōsi notæ ferāt: & præsertim urinae graueolentes ac crassæ & nigrae. Tales enim in acutis ac malignis morbis omnino periculū significat. Præcordiorum distictio, & principalium partium inflammationes maximæ, cerebri inquam ac cordis & pulmonis, & membranae costas succin-gentis, hepatisq; ac uentris: ubi enim aliquis ex talibus morbis adest, ualde mala signa apparentia periculosa sunt. Oportet autem uniuscuiusque signi uim perdiscere. Vnum enim aliquando signum forte ac fidum, plura signa infida ac debilia uinct.

*Quæ prima dies totius morbi dicenda est.*

Cap. v.

Principium totius morbi dicere oportet, illud tempus quando homo febrile inceptū adeo manifestē, ut continuatam corporis sibi solutā esse putet, & non amplius in publicū prodire ualeat, & consueta uitæ munia obire, & propterea decubitus opus habuit. Non enim idē est displicentiā habere & febrile. Qui enim caput dolet, aut displicentiā habet, & corpore grauius est, potest ferē in principij consueta facere, do nec præualens ipsi morbus uires eius deiciat.

*Principium morborum trifariam dici.*

Cap. vi.

Principium propriè dicitur impartibilis illa ac indiuisibilis primi morbi impetus inuasio, in qua uictus homo decubuit. Principium etiam dicitur quod per dilatacionē nominant, quod usq; ad tertium diē extenditur. Principium quoq; dicitur proprium ac necessarium, quod uelut partem totius morbi, principium nominamus: quod sanè non dierum numero

cognoscitur, sed exacerbationum qualitate, & concomitantium accidentium lentitate. Nam in augmento & morborum & symptomatum accidentium incrementum fit. Exacerbationes enim anticipant, & longius extenduntur in augmento, & symptomata grauiora fiunt. Principium igitur totius morbi dicitur, donec apparuerint manifesta & bona concoctionis signa. Si quidem igitur principium breuis temporis fuerit, morbum uelociter soluendum ostendit, uelut etiā Hippocratē uidetur. In pleuritide inquit, si spūmum statim appareat, in principio quidem breuis fit. Si uero posterius appareat, prolongatur: morbus ipse uidelicet. Quæ igitur die apparuerint in superfluitatibus quæ excernuntur manifesta concoctionis signa, in ea dicimus principij totius morbi cessasse, & incipere ipsum augmentum. Concoctionis enim signa nunquam malè apparent.

*Quid est febris.*

Cap. vii.

Febris est calor præter naturā, cordis & artiarū, uitalem firmitatem ledens, ex profundo emergens, & acris ac mordax ad tactum allabens, præsertim circa thoracem, & ubi arteria magnæ sitæ sunt. Verū ad talem calorem inæqualitas quædam & inordinatus motus pulsibus accedit iuxta ipsam febri speciem.

*Quid est exacerbatio.*

Cap. viii.

Exacerbatio, quam paroxysmū Græci uocant, est motus morbi particularis, a remissione ad deterius. Particularis autem motus dictus est, ad discretionē uniuersalis morborum augmenti.

*Quid est remissio.*

Cap. ix.

Remissio est particularis exacerbationis temporaria quies symptomatum corpori coincidentium.

*Remissionem dupliciter dici, comprehenditur enim ex interuallum.*

Cap. x.

Ex remissionibus ea quæ sincera est, cognoscitur ex quiete concomitantium ad exacerbationē symptomatum circumscripta. Et propterea dicitur Interuallū, quemadmodum in his qui per circuitum quandam exacerbant, uelut tertiana, quartana, quotidiana, capitis dolor, morbus comitalis, podagra, & cōsimiles. Quæ uero insincera est & non pura, depræhenditur ex symptomatum diminutione, quemadmodum in continuis maximè febribus contingit. Nam in his ante absolutam morbi solutionē, non contingit pura remissio: Declinationem enim prioris potius febris exacerbatio excipit.

*Quod est principium febrilis accessionis.*

Cap. xi.

Principium febrilis exacerbationis, sermè est cōtracta extremarum partium omnium, & maximè nasi. Et quandoq; etiā frigiditas totius corporis. Et aliquando tussicula parū irritans, unā cū frigiditate irruens. Item oscitatio & partium corporis extensio, aut nauisea, aut uomitus, aut animi deliquium. Et capitis dolor, aut alterius cuiusdam partis, & in profundum somnum delatio. Pulsus insuper paruus & contractus, tardè feriens ac relidens: Et symptomatum ad præsentem morbum concomitantium irritatio.

*Augmētū particularis exacerbationis signa.*

Cap. xii.

Iuxta augmentum exacerbationis, aliorum quidē accidentium incrementum & unio accedit, contractio uero & frigiditas cessant. Et pulsus inæqualis emicat. Et corpus calefit quidem, uerum non exactè.

*Vigoris particularis exacerbationis signa.*

Cap. xiii.

Iuxta uigorem exacerbationis, calor æqualiter diffunditur.

diur, & particulatim distribuitur, per totū corpus, Et pulsus totam augmenti magnitudinem accipiētes, ad subiectæ materiæ proportionem extenduntur, itemq; reliqua exacerbationis accidentia. Tunc vero iam tempus est ægroto potum dare.

*Declinationis particularis exacerbationis significatio.* Cap. xiiii.

Declinatio est ubi incipiunt aliqua, aut omnia prædicta accidentia minui. Et pulsus ad ordinatum quoddam modum morum deueniunt. Aliquando uero & humores exundant. Et calor nimirum contabescit. Quodq; etiam somni boni concurrunt, si longum tempus inter accessiones futurum est, uelut in puris remissionibus fieri solet. Contingit enim in quibusdā morbis, ut exacerbatio posterior prioris declinationem excipiat, uelut in febribus continuis apparet.

*Quod est principium totius morbi.* Cap. xv.

Iam antea dictum est, quod principium totius morbi illud tempus didimus, quando per morbi uolēdam uires hominis uitæ, principii decubitus factæ sunt.

*Quod sit augmentum totius morbi.* Cap. xvi.

Augmentum totius morbi est, quum exacerbationes consecutæ horum aneuererint, & longiores ac maligniores, & cum pluribus ac grauioribus accensibus factæ fuerint.

*Vigoris totius morbi cognitio.* Cap. xvii.

Quum exacerbationes statim acceperint, & similiter per omnia consequenter conserint, & concomitantia symptomata neq; detraxerint, neque addiderint, tūc iam in uigore esse morbus dicitur. Vigor enim uehementior morbi totius pars est, quādo etiam bonæ iudicationes uel maxime fieri solent.

*Declinationis totius morbi dinotio.* Cap. xviii.

In declinatione totius morbi, contraria augmento fiūt. Remoratur enim exacerbatio consecutæ horę impetum, & modico tempore occupat. Et symptomata leniora ac simpliciora fiunt, & bona tolerantia ac resmissio adeest per omnia.

*Quod declinatio totius morbi in iudicationibus consertim sentibus, sensum nostrum effugit.* Cap. xix.

Quicumque morbi in uigore consertim iudicantur, & perfectam solutionem recipiunt, eorum declinatio difficulter comprehendī potest, ut neq; sensui manifesta fiat. Imo neq; commodum est de ipsa inquirere. Satis enim est cognoscere quod morbus fideliter, securæ ac perfectæ solutus est.

*Quod seruandus eger quatuor totius morbi tempora pertransit.* Cap. xx.

Si quidem igitur sine periculo fuerit morbus, acutēq; moueatur, & ad hæc bona & commoda signa affuerint egroti, quatuor morbi tempora citò pertransit, & manifestum est quod citò seruabitur. Si uero his contraria affuerint, ante uigorem plerumq; morietur.

*Utrum tardius aut citius morbus iudicatur.* Cap. xxi.

Tardiusne an citius iudicabitur morbus, ex morbi magnitudine, & motus uehementia, manifestum fit. Nam magni morbi citò mouentur. Quod uero citò mouetur, etiam citò iudicatur.

*Quomodo prænoscere oportet, an iudicabitur morbus, aut non, ex quo.* Cap. xxii.

Magni morbi qui & citò & uehementer mouentur, omnino iudicantur. Parui uero & obscurores, & qui debiliter mouentur, si diuturni sunt, soluuntur tan-

sum paulatim citra iudicationem. Raro uero & ad abscessum tales procedunt. Terciana enim epāsi intermitat, tamen quia citò & uehementer mouetur, iudicatur. Quartana uero, quia diuturna est, paulatim fere soluitur. Item omnes qui pigrius mouentur. Naturam itaq; morbi inspicere oportet, an biliosus sit, aut piquiosus, aut arabilis. Deinde anni tempus, & ægroti etatem, & temperamentum, ac studium, & prægressam uitæ rationem. Imò & regionem, & statum ambiētis nos aëris. Postea uero considerare exacerbationem circuitus, uelut antea dictum est: & an intermitant, siue non, uelut in continuis ac continētibus febribus uidere datur. Si enim festinauerint, & semper anticipauerint conuenientem horam, & uehementiores facti fuerint, & per tertiam occurrerint, breui iudicationē futuram indicant. Si uero pigre moueantur, & eadem hora irruerint, & quotidie contingerint, tardam fore iudicationem significant. Considerandæ insuper sunt & superfusitatum concessiones, an bonæ sint, & an in diebus indicatiuis fiant, uiribus robustis. Si enim morbus statim ab initio ostenderit omnia signa extra periculum, in primo quaternario iudicationem promittit. Si uero in quarta præsignificarit, septimam non transgreditur. Leuissimæ enim febres & in signis securissimis fientes, quarta die quiescunt, aut citius, inquit Hippocrates. Maligniores uero & in signis grauissimis fientes, quarta die occidunt, aut etiam citius.

*Future iam iudicationis signa.* Cap. xxiii.

Vbi iam affutura est iudicatio, non parua turbatio in ægri corpore præcedit, & præsertim in nocte iudicatoriam exacerbationē præcedente. Quibus enim iudicatio futura est, his nox grauis est ante exacerbationem, inquit Hippocrates. Grauitates enim & uigiliæ, & deliria, & graues sopores, & spirandi difficultates, & uertigines, & sensus obuii, & dolores capitis, colli, stomachi, ac multarum aliarum partium adfunt. In quibusdam uero aurium sonitus. Et splēdores oculis obuerfantur. Et lacrymę inuitæ fluunt. Et urina supprimitur, & labium concutitur, & alia quæcūq; pars tremula efficitur. Et cōtingit obliuio ac ignorantia præsentū. Et uehemens rigor aliquando incidit, aut ardor antea non factus, & in summa exacerbatio ante solitam horā irrūpit. Et multus sonor ac sitis intolerabilis sequitur, & uociferantur ac exiliunt uelut consternati. Et decubitus figuram seruare non possunt. Et timor impendit uidentibus. Ac imperitus medicus uidens symptomatum accidentium tempestatem perturbatur, & cum familiaribus ægri calamitatem deplorat, & per condolētiā occultat imperitiā. Verum generosi medici est non turbari, neque ignorare quod eueniatur est: sed ex præsentibus prænoscere, non solum quod iudicatio futura est, sed etiam qualis futura est.

*Quomodo prænoscere oportet bonane an mala iudicatio futura sit.* Cap. xxiiii.

Optimam iudicationem, quam etiam solam simpliciter iudicationem nominamus, non per coniecturā, uelut alias, sed constanter quis prænoscere poterit. Omnia enim signa in talibus morbis statim a principio citra periculum apparent. Quemadmodum rursus in morituris, ut plurimū ab initio omnia mala apparent. Primum omnium igitur considerare oportet ægri

ægri vires. Deinde concoctiones ex urinis ac secessibus & spuit. Nullū enim unquā perire vidimus, ex his qui ob præostensam bonā concoctionem iudicati sunt. Terrio quod in vigore & totius morbi, & particularis exacerbationis, & in die testabilius dicatio contingit. Consequenter autem & speciem morbi, & mores. Speciem dico, tertianam, aut quartanam, aut quotidianam, aut aliquam aliam. Mores autē, an sint moderati & leues, aut mali ac maligni. Et mores præcipuē indicabunt tibi, an seruiabitur, an morietur. Et in affectionibus quidem thoracis ac pulmonis attendere oportet spuit, neque uero urinarum inspectio negligenda est. Considerandæ uero sunt etiam egestionēs. At in febrilibus absque inflammatione alicuius uisceris, urinis maximē mentem attendere oportet. Ceterum in perniciosissimis morbis primum ac maximum signum est futuræ mortis citra iudicationem extrema uirium debilitas: Non enim excitantur ad pugnam. Secundum si nullum omnino fuerit ac ne minimum quidem concoctionis signum. Imō etiam si præmanifesta fuerit iudicatio, dies, futuram iudicationem simul præmanifestat, & malam fore indicat. Ad hæc uidendum est an magnus sit ac malignus morbus, nō tamen citō moueatur. Magnum autem dico peripneumoniam pulmonis abscessum, semitercianam, febrem ardentem, & confusiles. Velut uerbi causa, contingat ut uideatur in quarta die primum in urinis nubeculata gra, aut simile quiddam in medio ipsarum pendens, aut subsistentia nigra. Sint autem & omnia accidentia pernicioſa, morietur quidem talis homo. Verum si quidem celeriter moueatur morbus, in sexta: si uero tardē, in septima.

*Qui sint boni indicatorij dies, & quinta li.*

Cap. xxv.

Septima ab initio morbi dies omnium maximē semper perfectē soluit ac fideliter, & bene ac citra periculum, & manifestē ac signanter. Septimæ uero fidem decimaquarta maximē imitatur. Propinqua autem ipsis est nona & undecima. Et huic propinqua est decima septima, & quinta. Post has quarta. Et post hanc tertia, & uicesima. Sexta uero sæpe quidem iudicat, uerum plures iudicationes malas, aut etiam letales inducit, aut certē non perfectas neque fideles. Reuertuntur enim morbi qui in sexta die iudicantur, etiam si soluti esse putentur. Si uero etiam perfecta iudicatio, id quod rarum est in sexta, contingat, tamen cum periculosis ac grauibz accidentibus contingit. Proinde sextæ naturam nulla alia dies imitatur est. Si uero aliquando in octauam diem aut decimam solutio morbi acruata exciderit, assimilatur quodammodo ei quæ sit in sexta: Raro enim in his morbus soluitur, & neque fideliter, neque bene neque perfectē: sed & obscure ac minimē signanter. At mediō quodā modo inter primas bonas reuelatas, & inter postea malas, tertiadecima locata est, neque similiter reprobanda uelut mala, neque tamen similis bonis existens. Quod si bona iudicatio futura est, oportet omnia prius iudicata esse, in urinis præsertim, imō etiam in alijs signis. Tertia igitur & quarta ac quinta dies statim ab initio præiudicantur. Quarta uero septimam præiudicat, & septima undecimam. Undecima uero decimaquarta. Decimaquarta decimam septimam, decima septima uige-

simam. Terminis porrō acutorum morborum est decimaquarta. Quare si hanc transgressus fuerit morbus, ab acutis excidit.

*In quibus ambigua est dies principij morbi, & nulla præiudicatio facta derepente contigit iudicatio, quomodo ambigua inuenire oportet.*

Cap. xxvi.

In quibus nulla præiudicatio die facta, derepente contigit iudicatio, & in quibus nō exactē cognoscimus principium morbi, in his respicienda sunt signa, & ambiguum reperiatur, si ad exacerbationum proportionem, & ad diem naturam, mentem aduertimus. Si enim imparibus diebus facta fuerit exacerbatio in intermittentibus, aut seipsa uehementior facta fuerit in continuis febrilibz, æstima præsentem iudicationem imparis diei propriam esse. Si uero in paribus exacerbetur, illarum proprie iudicatio erit. Nam ad uehementiores exacerbationes omnino sequuntur iudicationes. Cæterum ad ipsam diem naturam sic animum aduertere oportet: si ambiguum sit utrū nonæ aut decimæ diei iudicatio sit. Si enim accidentia omnia mitiora fuerint, & citra periculum ac bona facta fuerit iudicatio, & consequuta fuerit ad iudicationem bona tolerantia, nonam potius esse iudicatoriam diem dicere oportet. Si uero periculosiora & mala facta fuerit iudicatio, & cum grauibz accidentibus, & grauis tolerantia post iudicationem sequatur, decimam diem magis iudicatoriam fuisse dicendum est.

*De notis ex pulsibus.*

Cap. xxvii.

Quum iam expectatur iudicatio, ante omnia pulsus tangere oportet. Nam altus pulsus, quemadmodum etiam uehemens, omnis bonæ iudicationis nota est, & constat signum iam adesse morbi iudicationem. Si uero uehementer ac fortiter ferit digitos, & cum hoc etiam magnus fuerit, & ad distentionem magis quàm ad contractionem festinarit, motus externi potius signum est. Externum autem motum dico, sanguinis eruptionem ac sudores. Internum uero, uentris exturbationem ac uomitus. Si quidē igitur magnus fuerit pulsus, & undosus, & simul mollescat, unā cum hoc quod etiam ipsam arteriæ corpus humectum est, & ad distentionem magis festinat: per sudorem futuram iudicationem sperare oportet. Si uero magnus simpliciter fuerit ac uehemens, & magis ad distentionem quàm ad contractionem festinabit, sanguinis eruptionem per nares fore significat, ubi uidelicet simul testimonium præbuerit signa in sanguinis eruptione referenda. Si uero uehemens quidem fuerit, non autem magnus, & durior seipso factus fuerit ac inæqualis, & ad contractionem magis festinarit, inclinatione iam ad intestina facta, per uentrem iudicationem facturam expectare oportet.

*De urinarum notis, & primum quæ sit naturalis.*

turalis.

Cap. xxviii.

In febrilibz maximē morbis, notæ ex urinis commo dissimæ sunt. Quandoquidem uero quicquid est præter naturam ex naturalibus inuenitur, à naturalibus initium faciamus. Urina igitur optima est in sanis ac optimo habitu præditis hominibus, subfusca aut subflaua, & moderatē crassa, & talis manens colore, qualis mixta fuit, & leuē ac albam & æqualem subsistentiam habens omni tempore, copiam uero pro potuit ratione. At in foeminis naturalem urina-

nam



nam colore albiores uirili esse conuenit, & subsidiam habere ampliores. In puerili uero aetate, multum crassam subsidientiam habere oportet, propter puerorum uoracitatem, & inordinatos ac intempestuos morus. Leuem autem subsidientiam Hippocrates uocat, coherentem ac indiuulsam indicare uolens. Aequalem uero dicit, ut per totum semper similis minigatur, & non hodie quidem concocta, cras uero cruda: & ut neque subsidientiam, aut totam diffusionem in aequalem habeat. Proinde in naturali urina querimus colorem, & diffusionis compagem, & quae in ipsa diffusionem obiter feruntur, uelut est nubecula, aut simile quiddam in medio pendens, & subsidientia siue resistentia quae fundum occupat. Manifestum igitur est quod urina in aliquo ex istis mutata, cruditate in uenis indicat.

*Qualis urina optima est in aegrotis.* Cap. xxxix.  
Optima igitur est urina in aegrotis quae similissima est sanis, subpallida aut subflaua, albam ac leuem & aequalem subsidientiam habens. Defectuosior est, quae id quod in medio pendet albam ac leuem & aequalem habet. Crudior autem adhuc haec est, quae nubeculam talem habet. In qua enim flatus est in profundo crassus ac crudus, si quidem paucus fuerit, permittit materiam ad fundum uasis deferri, diuidens autem ipsam, uiri non permittit. Si uero redundauerit crudus in profundo flatus, eleuat subsidientiam ad medium diffusionis urinae, & facit id quod in medio pendet. Si uero adhuc amplior fuerit crudus in profundo flatus, eleuat subsidientiam, & ad supernam superficiem diffusis urinae liquoris attollit. In quantum igitur flatus diuidere ac eleuare ualet ipsam subsidientiam, in tantum crudior em urinam putes. Si uero neque subsidientiam, neque quid in medio pendens, neque nubeculam habuerit urina, nosse oportet quod natura nondum humorem concoxit. Si uero aliquando habet subsidientiam, aut illud in medio pendens, aut nubem, aliquando uero non, pugnam indicat naturae aduersus morbum, atque hinc modò cruda est, modò non. Ac uero in tertianis exquisitis & in diariis febribus, nubecula sola, aut illud in medio pendens, ad morbi solutionem sufficit. Aliquando uero etiam urinae solum boni coloris facta esse.

*Quod non omnis alba subsidientia bonum significat.* Cap. xxxix.  
Saepe uero albus color eius quod in urinae fulura siue diffusionem fertur, idiotas decipit, ut subsidientiam bonam putent quae bona non est. Contingit enim in crudum ac album humorem una cum urina excrementum subsidere, & bonae subsidientiae imaginationem exhibere. Quandoque uero hepate aut renibus affectis, pus excernitur cum urina, & subsidens decipit artificem. Verum primum distinguendum est, an homo antea affectus habuerit renes, aut hepar, aut aliam quandam partem per urinam expurgari solitam. Deinde etiam graucolens reperitur urina pus habens. Crudus uero humor à bona subsidientia distinguitur, per inaequalem subsidientiam substantiam siue compagem. Non enim coherens sibi ipsi manet, sed in paruas uelut arenulas diuiditur. Et omnino non leuis est, quemadmodum uera subsidientia. In bonis igitur urinis, primum supernè apparet nubes. Deinde subdescendens facit id quod in medio pendet. In fine uero subsidens in fundo uasis, nimis

rum ubi perfectè fuerit concocta. In crudis uero humoribus, statim ab initio ad fundum uasis multa copia sededit, una cum hoc quod mali coloris est tota fusura. Postea uero etiam paulatim concoctus ac attenuatus, circa medium fuluræ urinae conspicitur, & facit id quod in medio pendet. Quum autem amplius attenuatus fuerit ac concoctus, in superficie diffusionis urinae consistit, & nubecula facit, deipitque idiotas ut putent morbum ad deterius procedere.

*Quid indicet tenuis & pallida urina.* Cap. xxxix.  
Tenuis & pallida urina, cruda quidem est substantiae compage, concocta autem mediocriter colore. Debiliter autem indicat etiam haec natura, quod colore quidem concoxit, uelut quae res facilis sit; non autem etiam compage, propter difficultatem. Si uero per multum tempus haec fertur, periculum est ne sufficere possit homo, donec concoquatur morbus. Nam quae ualde tenuis est, mala est. Indicat enim cruditatem, in quaerit calorem id quod tenuis est depascere oportet.

*Quid indicet tenuis & fulua.* Cap. xxxix.  
At tenuis in substantiae compage urina, & fulua colore, melior est quam pallida. Et tamen repræhensione non caret propter substantiam.

*Quid indicet rufa urina.* Cap. xxxix.  
Rufa urina cruditatem indicat, non mortem. Verum tempore opus habet ad concoctionem. Est enim ex sanguine terso, nondum ualde concoctionem adimpleto, neque proprium colorem. Et propterea diuturniore morbum significat. At in febribus continuantibus, ob sanguinis multitudinem consistentibus, excernitur urina rufa & crassa, & subsidientia rufa, & colore, & fuluræ compage, & subsidientia cruda.

*Vrina tenuis mista & postea turbata.* Cap. xxxix.  
Vrina quae tenuis mingitur, & postea foris turbatur, cruda est propter flatus crassi redundantiam. Indicat autem naturam incipere concoquere.

*Vrina crassa mista, & crassa manens.* Cap. xxxix.  
Vrina quae crassa mingitur, & crassa manet, & non desidet, qualis est iumentorum, significat uigere crassum flatuum ac humorum uelut fermentationem. In his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt, propter humorum turbationem ac euaporationes.

*Vrina crassa mista, & postea desidet.* Cap. xxxix.

Quae crassa mingitur urina, & postea desidet, indicat humorum fermentationem quiescere, & quodammodo attenuari. Et separationem ac secretionem incipere.

*Vrina tenuis mista, & talis manens.* Cap. xxxix.

Extremam cruditatem tenuis & alba urina significat. Non enim aggressa est in his natura concoctionem. Contingit autem hoc aut ob uirium debilitatem, aut propter oburationem, aut ob morbi longitudinem. Nam in quantis diuturnissimis, in principio ob crassitudinem & intrastabilitatem materiae, urina excolata tenuis uocatur. Mingitur autem tenuis, etiam ob hepatis oburationem aut renum. Verum cognoscitur ex locali dolore. Mingitur etiam aliquando tenuis & album in febribus ardentibus. Febris enim phrenitidem imminere significat. Non igitur autè urina, quia non manet in uasis ipsa bilis, sed leuitate sua ad cerebrum decurrit. Si quidem igitur non adest in

his phrenitis, scito ipsam iam affore. Si uero adest, & urina tenuis ac alba mingitur in ardentissima febre, ut plurimum mortem pronunciat. Non enim tolerare possunt vires cerebri iam prostratæ ab ardente febre, acrimoniam ac mordacitatem bilis iam putrescentis.

*Differentia urinarum oleosarum, & quid significant.* Cap. xxxviii.

Solet febris primum pinguedine eliquare, postea carnem, postremum etiam ipsa solida corpora inuadit. Pinguedine igitur liquefacta oleosæ urinae excernuntur. Paulatim autem liquatur pinguedo, unde & principium habet, & augmentum, & uigorem. In principio igitur colliquationis, ita oleosi coloris facit urinas, ut ambiguum sit, aquosæ ne sint an oleosæ. In augmento uero oleosæ fiunt, ita ut notabiliorem oleosil mixturam habeant. In uigore autem colliquationis totæ urinae pro totum, tum in colore, tum in substantiæ compage, uelut oleum sunt. At hæc pinguedo eliquata, aut renum solum est, aut totius corporis. Si igitur renum solum fuerit, cõsertim excernitur talis copia, imò & calor sensus amplior circa renes contingit. Si uero totus corporis fuerit, paulatim additamentum facit.

*Quid significant eruiæ subsidentia.* Cap. xxxix.

Quando consumpta est pinguedo, deinceps caro liquefit, & eruiæ subsidentia in urinis fiunt. Sed & hæc aut renum solæ sunt, aut totius corporis. Si quidem igitur in febribus apparuerit talis urina: totius corporis affectionem esse indicat. Si uero non, in renibus solum. Et rursus, si cruda sunt urinae, totius corporis est malum. Si uero concocta est urina, eruiæ autem sunt subsidentia, renum affectionem indicant.

*Quid indicent fursuracæ subsidentia.* Cap. xl.

Quum febris pinguedinem consumplerit, & maiorem carnis partem, & in profunditatem uasorum irruerit, fursuracæ subsidentia fiunt, angustiores quidem laminae, uerum crassiores ipsi. Et hæc similiter aut ex toto corpore, aut ex uesica excernuntur. At si quidem febris affuerit, ex toto corpore. Si non, ex uesica. Et si quidem cruda fuerit urina, corporis est affectio. Si uero concocta, solius uesicæ. Sed & localis adest dolor.

*Quid indicent laminae subsidentia.* Cap. xli.

Quum ipsæ solidæ partes affectæ fuerint, primum in superficie deraduntur, & quæ in urinis subsident laminae fiunt. Sed & ex uesica sola talia excernuntur. Si quidem igitur fuerit febris, totum corpus afflictum est. Si non, uesicæ affectio est.

*Quid indicent polentaceum in urinis.* Cap. xlii.

Quum febris post occupatam profunditatem, & maiorem & longiorem profunditatem inuaserit, fiunt talia fursuribus crassiora, & uocantur polentacea. At duo significant hæc polentacea. Aut enim sanguinis assationem indicant, aut fortem solidorum colliquationem. Si quidem igitur alba fuerint polentacea illa, solidorum corporum affectio est. Si rufa, sanguinis.

*Quid indicent graueolens urina.* Cap. xliii.

Graueolens urina putrefactionem indicat, & futuram naturæ mortificationem.

*Vrina nigra quid significet.* Cap. xliiii.

Omnes nigrae urinae statim etiam crassæ, omnino perniciosæ sunt. Raro enim aut nunquam inueniuntur tenuis & nigra. Nam niger color accedit urinis, dum

expurgatur atque bilis humor, aut ipsa atra bilis, tum quæ ob frigiditatem, tum quæ propter nimiam assationem facta est. Et utris quidem ac foeminis nigrae urinae pessimæ sunt. Pueris uero aquosæ. Minus autem perniciosæ fiunt nigrae urinae, his qui debilem habent splenem, quibus non ex adustione, neque ex perfrigeratione, nigrescit ac liuescit sanguis, quædam modum in alijs quibusdam contingit: sed ex melancholici humoris diffusionione. At hæc tres differentia crassitudinem substantia habent. Necessario igitur etiam crassæ reperiuntur nigrae urinae. Proinde in acutis morbis perniciosissima est omnis urina denigrata, & præsertim quum & graueolens fuerit & crassa, & nigram substantiam habuerit. Fieri enim non potest ut seruetur æger ex acuto morbo, qui talem urinam minxit: Et si quidem substantia fuerit nigra, perniciosissimum est. Si uero id quod in medio pendet nigrum fuerit, minus malum, aut non similiter malum. Si autem nubecula fuerit nigra, adhuc mitius & non similiter malum. Nigra porro urina, aliquando indicat frigiditatem, aliquando caliditatem, siue superaffationem. Si quidem igitur prius mixta fuerit liuida urina, deinde sic nigra fiat, frigiditatem causam habet. Si uero flaua præcellerit, & postea nigra inuenta fuerit, ab ampliore nimium caliditate superaffata nigra facta est. Scire tamen oportet præcium est quoddam & in febribus quartanae declinatione, & in melancholici delirii solutione, uirga apparent nigrae ac crassæ. Splenicis autem ut plurimum talis urina mingitur, quando debilis fuerit splen. Nullam enim concoctionem ac distributionem melancholicæ superfluitatis facit.

*De egestionum notis.*

Cap. xlv.

Quoddam de urinis antea dictum est, hoc etiam in egestionibus cognoscere oportet. Dico autem, qualis sit naturalis egestio. Nam ab hac euariatio in aliqua parte, cruditatem indicat. Optima igitur est egestio mollis & compacta, & leuis, & iuxta consuetam horam, quàm maximè prodians, & ad proportionem comestorum, colorata quidem moderatè bilioso humore, hoc est, subfulua, & non valde graueolens. Quæ enim talis est, naturalis est. Et manifestum est quoddam significat sana esse omnia circa ventrem ac intestina. Si uero aliqua parte a relatis euariauerit, præter naturam iam dicitur, uelut est, ualde graueolens, aut crassa, aut sicca, aut dura, aut distorta, & non humori ammixta, & quæ cum stridore & uelut strepitu quodam præter rationem excernitur. Tales enim omnes concoctoria actionis debilitatem indicant. His adhuc deterior est exactè fulua. Est enim bilis intemperatæ ac puræ signum. Nigra uero egestio, atrae bilis signum est, aut sanguinis adusti. Liuida uero intestinorum frigiditatis ac mortificationis. Pinguis autem & oleosa, pinguedinis colliquationem significat. Viscosa uero ipsorum solidorum corporum colliquationem indicat. Quæ autem uaria est colore, & ualde graueolens, uariorum humorum excellentem putrefactionem significat. Cæterum in omnibus his considerare conuenit, an edulia talia fuerint, aut intestinum ex more fluxione laboraret, quum debile sit.

*De egestionibus iudicatorijs.*

Cap. xlv.

Si porro iudicatio alicuius morbi per ventrem futura est, nihil quidem præiudicans, uelut in alijs, neque

quæ

quicquam proprium ac firmum præsignificans habet. Verum ex eo quod adsunt quidem iudicationis signa, non autem adsunt signa uomitus, aut eruptionis sanguinis narium, aut sudoris, colligere datur. Considerare tamen oportet ex alio egesta, an plura prodicere quam prius ante iudicationem. Indicant enim inclinationem hac magis fore, & præsertim ubi minutæ fuerint urinæ. Insuper autem & grauitas notabilis, & dolor, & tensio circa præcordia & lumbos, ventris excretiones præcedunt. Quandoquidem uero & per hæmorrhoidas, & per locos muliebres, iudicatione fieri possibile est, communia etiam amborum sunt signa quæ nunc sunt relata. Verum considerandum est an horum quid ex more expectetur. Si quid igitur in principio morbi aut augmento, uenter perseveranter liquidiora egerit, aut uelut biliosa quædam pura, & febris perseverat, & bilis magis augetur: tunc & ardentior & periculosior ut plurimum est morbus. Si uero in uigore multum exturbetur aluus sua sponte, serè morbi solutionem efficit. At circa uigorem aliquando in morbis diuturnioribus uenter exturbatur, omnè materiam morbum facientem deterit. Verum in acutis morbis, & nigra pura & graueolentia indudentia, præsertim in principio pessima sunt. Quibuscumque enim morbis inchoantibus bilis atra sursum aut deorsum prodierit, morale est. Et rursus quibuscumque ex morbis acutis, aut diuturnis, aut ex uulneribus attenuatis, bilis atra subierit, postmodum ei usque diei moriuntur. Non autem simpliciter si quid nigrum exernitur, iam etiam hoc atra bilis est. Potest enim & sanguis è proprijs locis excidens, & tempore aliquo manens frigescere in grumos congelari. Atram itaque bilem cognoscemus ex eo quod ad terrâ fusa, ipsam radat ac fermenter, uelut acerrimum acetum.

De Vomitus prænotione ac significatione.

Cap. XLVII.

Instante iam iudicatione, uomitus fore expectare oportet, si pulsus fuerit uehemens, & ad contractionem magis festinaret, & durissimus existens ac inæqualis. Cordis item punctura & uehemens oris uentris morbus adest una cum capitis dolore, & uerrigines oculorum, tenebris simul obuerfantibus. Et labium concutitur, & saliuæ multa ac tenuis defluit, & nauisæ infestant, & infernæ præcordiorum partes frigida tangentibus apparent. Omnia enim hæc coincidunt, bilioso ac mordaci humore in uentre ac stomacho coaceruato, mordentibus ac simul contrahente totum stomachum infernè. Vnde & labiū concutitur, & saliuæ defluit. Si uero cum his etiam rigor accesserit, rursissime uomunt. Quod si etiam ebos recens ingesserint, & maxime potum, citò uomunt. Utilissimum est uomitus pituitæ ac bilis quam maxime mixeretur. Vomatur autem non crassus. Nam sinceriores, hoc est, non mixti, reprobantur sunt. Tales enim & cum uiolenta & landinationibus ac molestia uomuntur, una cum hoc quod signum sunt, solâ bilem prædominari. Quin & uarij prærehendi merentur, uelut sunt liuidi & nigri ac porracei. Mali enim sunt hi inquit Hippocrates. Si uero omnes hos colores idem homo uomuerit, perniciosum est. Deteriores tamē sunt liuidi ac nigri, in acutis & ardentibus morbis sientes, & præsertim si fuerint graueolentes. Attendere uero oportet & in his, num sanguis conflu-

xerit in uentrem, & tempore quodā in ipso moram traxerit, & grumulos excernatur. In plurimis enim tale quiddam contingit, ex circuitibus quibusdam. Et non solum nihil molesti infert, sed etiam tolerantiores seipsi fiunt, ubi hic per uomitū fuerit reiectus.

De eruptionis sanguinis ex naribus prænotione ac significatione.

Cap. XLVIII.

Si sanguinis ex naribus eruptio futura est, propria signa præcedunt hæc. Splendores oculis obuerfantur, eod quod flauus est humor. Obscurus autem est uisus, propter multitudinis sursum uersus lationem. Quapropter etiam lacrymantur oculi. Facies rubicunda est, & præsertim male. Præcordia distenduntur circa dolorem, difficultas spirandi adest, propter trāstrum sanguinis per thoracem. Capitis item dolor, & temporum pulsus fruens simul cum iudicatoria exacerbatione, & non in principio morbi existens. Collum dolet, & deliria sæpe ac exultationes fiunt. Pulsus autem alti sunt, & magni, & ad distentionem magis festinant. Si uero cum his omnibus etiam nares scalpat, iam adest tempus ut sanguis erumpat, & præsertim quum dolor fortiter circa frontem ac tempora incutitur. Quod si etiam sano sanguis erumpere consueuit, augebit sanè etiam hoc ualde semper tuam. Atque hæc sunt signa iam futuræ sanguinis eruptionis. In principio uero apparentia crudo existente morbo, periculum significant, & tales plerumque moriuntur. Si uero facta iam concoctio, præsertim in urinis, hæc signa appareant, circa uigorem morbi comode conspiciuntur. Soluunt autem tales sanguinis eruptiones etiam uiscerum inflammationes in febris, quādo maxime ex directo fiunt, uelut inflammato hepate, ex dextro nare: inflammato splene, ex sinistro. Vnde de facillimum iam fuerit etiam medicum prædicere, utra naris sanguinem emissura sit, occasione ex dolente parte accepta. Soluunt etiam sæpe sanguinis ex naribus eruptiones phrenitidem, non tamen lethargum aut peripneumoniā.

Quod & per hæmorrhoidas, & muliebres purgationes, sæpe soluitur morbus.

Cap. XLIX.

Vidimus in multis etiam per hæmorrhoidas prius existentes in sede apertas, morbum soluiti. Similiter & in foeminis menstrua purgatione facta. Oportet autem & in his pregressa concoctione, in morbi uigore excretionem fieri, quo bona & iusta iudicatio fiat. Præcedit & in his notabilis grauitas, & dolor lumborum, imò etiam imi uentris dolor ac distentio.

De significatione ex sudoribus.

Cap. L.

Febrem per sudores soluendam cognoscemus ex eo quod ardentissima est, qualis est quam inde Causum Græci uocant. Biliolus est enim hic morbus, & ubi fortiter motus fuerit, rigorem efficit. Si quidem igitur pro ratione suppressa fuerit aluus, aut urina, iudicatione propinqua existente, rigorem expectare oportet. Si uero amborum suppressio facta est, & non adsunt signa uomitus aut eruptionis sanguinis, sudor necessario erit multus, & hoc magis fiet ubi augescere exacerbatione ægri mente moti fuerint, & forinsecus calidiores facti, & uapor quidam calidus ex corpore ascenderit, qualis anrea non cōtingit, uelut uidere est in recens lotis. Pulsus item his sunt magni & alti & ueloces, & ad distentionem magis festinantes ac uelut undosi. Et arteriæ tunica mollis ac humida apparet. Superficies autem totius corporis pruriginosa

riginosa & mollis, & quibusdam horis rubunda. Hęc in exacerbatione iudicatoria bona, concoctione prægressa, & iudicatoria die bona existente, salutare & solutorios sudores significat. Manifestum est autem quod moderate calidum esse oportet solutorium sudorem, & per totum corpus fieri, & pro ratione leuare, & tolerantiores facere ægrotum. At frigidi sudores cum acuta quidē febre mortales sunt, cum mitiore uero, longitudo morbi significant.

*Abcessuum signa iudicatoria.*

Cap. LII.

Si ad abcessum conuertatur morbus, salutariter se habente ægro, ad hoc maximē animū aduertere oportet. Durante quidem febre & continua existente, & urinis tenuibus ac crudis semper existētibus, & subsidentia non habentibus, si postea apparuerit in aliqua inferiori parte, uel ut cruribus aut circa iuncturā aliquā, aut grauitas, aut tensio, aut ardor, aut dolor, absq; manifesta causa, in ea parte abcessum fore expecta. Si uero æger derepente difficulter spiras, citō quidem a difficili spiratione liberatus fuerit, successerit autem dolor & grauitas capitis, & alius sopor ac surditas, huic in glandulis circa aures abcessum fieri necesse est. Fuit autem abcessus magis in hyeme, & senioribus qui trigessimū annum excesserunt.

*De sputorum significatione.*

Cap. LIII.

In peripneumonidis ac pleuritidis affectionibus, sputa propriē appellata, subsidentis in urinis similes sunt. Ac nihil omnino expuere, sed solum sicce tussire, est uelut in urinis quum extremē crude sunt. Si uero incipiat æger humida & perfecte cruda educere, obscura est & incerta talis transmutatio, & desinit primum morbi tempus, hoc est principium. Vbi uero inceperit spuiere pauca & maura, & semper plura ac facilius educte, tunc augmentum esse dicimus. Quum autem exactē fuerint concocta ac mollia, & non ægre eduncuntur, tunc instat uigoris tempus. Vbi uero concocta fuerint, ac citra molestiam educuntur, & imminuta est copia, & dolor non amplius fuerit, & homo facile spirat, ac bene tolerat, uigorem cessasse putandum est, & morbum iam declinare. Cæterum ante alia animū aduertere oportet, utrū citius aut tardius sputa exussire incipiat, quemadmodū etiam Hippocrati uidetur. In pleuritidis inquit, si sputum statim appareat, in principio quidem breuis sit: si uero posterius appareat, prolongatur morbus ipse uidelicet. Quæcunque igitur sputa subflaua sunt & subfulua & subspumosa ac tenuia, solius cruditatis notæ sunt, & nihil notabilis mali indicant. Quæ uero purē flaua & fulua & uiridia ac spumosa sunt ac uiscosa, insuperq; nigra, mala sunt. Nam excepto sanguine quicunque alius humor purus fuerit, malam affectionem indicat ex calore generatam. Sanguinea igitur & pituitosa sputa, moderata sunt. Flaua uero ac nigra, mala. Considerare uero oportet & educationis ipsorum modum. Si enim facile expiuntur, iudicium est quod talia bona sunt. Si uero ægre educuntur, mala: & præsertim si nigra, aut liuida, aut æruginosa fuerint, aut ualde graueolentia, ut prunis iniecta graueolant.

*Signa perfectæ ac fideliter soluti morbi.* Cap. LIII.

Perfectæ ac fideliter solutum esse morbū putare oportet, quum in idem simul conuenerint omnia solutoria signa. Siue igitur in uigore statim & conferim ac cōstanter iudicatus est morbus: siue paulatim de-

clinando fideliter solutus est, ex his sanē cognoscere poteris. Primum enim & maximum signum bonæ ac fidelis iudicationis, sunt concoctiones superfluitatum apparentes in diebus indicatiuis, cum uirū fortitudine. Deinde si in impari die iudicatio facta est, & adhuc insuper, si febris soluitur ego iudicato, & ipse æger ab omnibus accidentibus liberetur, & colorator fiat tum in facie, tum reliquo corpore, pro eua cuationis ratione: & subtiliore pulsu præditus, ac fortior dum assurgit, & bene toleras per omnia, & maxime circa concoctiones ciborum ac digestionis: & si omnes naturales actiones inculpate facit, et corpus pro refectionis ratione roboretur: & color ex non naturali in naturalem transmutatur. Hęc est optima iudicatio, & oportet ipsos confidenter renutrire conuenienti uictu ac balneis uidelicet. Si uero defectuosa facta fuerit iudicatio, morbus reddiuiare solet.

*Signa morbi non perfectæ soluti.*

Cap. LIIII.

Suspectos de recidua cognoscemus, ex eo quod putatur quidem solutus esse morbus, perseuerant autem consimiles prioribus urinae ac pulsus. Et quod adhuc pallidus est æger, & difficulter tolerat, & reliqua contraria omnibus prædictis bonis sunt. Et in summa, quodles præter rationem solutus est morbus, bis ipsum reuerti timor est.

*Prænotio diei qua moriturus est æger.*

Cap. LV.

In perniciosis morbis considerare oportet exacerbationes per singulos insultus, an quotidie, aut alternis, aut alio modo fiant. Si uero febris est non intermittendum generis, uide an in imparibus diebus, aut paribus, æger magis intoleras seipso sit. Nosse enim dare oportet quod in illa die aut nocte, in qua magis intolerans seipso sit æger, morietur: Et si morbus multo plus uires excedit, citō morietur: Si uero uires parum resistunt, differri poterit ad unā atq; alteram diem. Fieri autem non potest ut moriturus ad declinationis morbi tempus deueniat. Raro uero in declinatione morbi aliquid mori cōgit, nisi alius morbus priori succedat. Neq; uero necessariū ad uigoris tempus peruenit moriturus: sed ut plurimum in principio aut augmento ægroti moriturus.

*Quod etiam horam mortis ægri prænoscere possit doctus medicus.*

Cap. LVI.

Quum quatuor sint particularis exacerbationis tempora, obseruare oportet qua hora die aut noctis grauior exacerbatio irruere solet. Insuperq; in qua parte exacerbationis æger seipso grauior factus est, nimirum an circa accessionem, aut augmentū, aut uigorem ipsius exacerbationis. In illa enim hora, in qua languidior, aut præter solitū magis pulsu destitutus factus fuerit, morietur. Et in accessione quidem exacerbationum moriturus, ob inflammationem magnam in partibus principalibus, aut propter multitudinē crassiorum ac uiscosorum humorū acruatam intrōdūctorum, ut transitus spiritus perfectē obturentur ita ut suffocetur ac uelut extinguatur natura, quemadmodum si quis uiridium lignorū copiam accumulet in flammam. In uigore uero exacerbationū moriturus, emota natura per uiolentiam ac uehementiam morbi, Eodem modo congit ipsos etiā in exacerbationis augmento mori. In declinationibus autem exacerbationum moriturus, exoluta ipsis per uiolentiā uitali firmitate. Obscurior enim & collapsus semper fit pulsus in perniciosis exacerbationis declinationibus.

Diffiuit enim tunc una cum alijs in corpore, etiam febrilis calor. Atque hinc idiotæ melius re habere imaginantur. Aegri uero aut ad exonerandum alium surgentes, aut alio motu facto, animo inlinguuntur, alij qui uero paucio ac uiscoso sudore exdufo moriuntur.

In acutis morbis mortem non esse prædicendam. Cap. LVII.

In acutis morbis consuetudine uti non oportet, in quibus maximè repentina mors, aut periculum ingruit. In his enim faciliè transiit & ardentior est humor, & uehementissima febris uolentia. Et de his morbis Hippocrates pronundauit: Acutorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones, neque sanitatis, neque mortis.

Februm diuersorum, & de diarijs febribus. Cap. LVIII.

Ex morbis ob interperiem orientibus unus est & febris ipsa, calore præternaturali ad tantam immoderatum euecta, ut angat hominem, & actionem lædatur. Differentia huius caloris maioris ac minoris ratione distinguuntur, & iuxta subiectum siue materiam, aut ipsum cordis corpus calore occupare, aut humores, aut aëream essentiam. Incipit igitur hæc præternaturalis caliditas, aliàs ex alio de prædictis, & nisi soluta fuerit, progressu temporis similiter reliqua duo genera afficit. Et si quidem in spiritibus permanserit hic calor, diariam febrem efficit. Si uero humores occuparit, febrem putridam incendit. Si uero ipsum cordis corpus iniuria affecerit, hæticam ac habitualement febrem facit. Nam alij febricitantes faciliè solubilem affectionem habent, uelut calefactum in sole lignum. Aliqui uero ægrè solubilem, uelut accensum ab igne lignum, ut etiam fumum edat. Quidam uero planè exuruntur, uelut lignum ad carbonis naturam adauctum. Tria igitur sunt genera, diariæ, putridæ, & hæticæ. Primum itaque de diarijs tractabimus. Fiunt hæc febres, uelut dictum est, citra humorum putrefactionem, solo spiritu feruescente, & propterea diariæ appellantur; Nam ubi loti sunt ægri in prima huius febris declinatione, & cibum boni succi ac humectum acceperint, non amplius secundario febricitant. Proprium autem & inseparabile signum diariarum febrium est urinarum coccio in prima die, & caloris iucunditas. Verum post exacerbationem sedatam, certior habebis cognitionem. Nam articularum motus, per omnia assimilatur motui sanorum, quod nulli alij febri adest. Et ipsa bona ægri tolerantia maximum liberationis signum est. Et urinae multo meliores post exacerbationem quam in febris principio tibi apparebunt. Et si ipsis dum lauantur, neque horror aliquis insuetus acciderit, neque alia aliqua iniucunditas, & post balneum consequenter bona tolerantia manserit, cōfidenter nutrire potes ipsum, & uinum exhibere intrepidè bibendum, quantum in præsens moderatè est. Faciliè uero à talibus febribus capiuntur hi fa quibus defluxiones corporis non uaporosum, sed acre quid ac fumosum habent. Quare si quando suppressus fuerit coaceruatus in ipsis calor, febrilis efficitur. Auspicientes uero ac externè læssentes harum febrium causas, lassitudines, frigidaes, uigiliae, curæ, tristitia, irascutia, rigor, ardor ac exustio cutis, ut difficulter transpiratione admittat.

De diarijs ex lassitudine febribus. Cap. LIX.

Qui ex lassitudine febricitant, autem sicciorem quam qui ex alia quadam diaria febre laborant, habent, Et

hoc maximè cōtingit his qui simul frigefacti sunt ex multa lassitudine, ut etiā post febris uigorem permaneat ipsis siccitas. Et pulsus his parui sunt. Qui uero non nimium fatigati sunt, his humiditates quædam, aut uapor calidus ex profundo effertur. Magni autem sunt & his pulsus. Oportet autem istos statim, post exacerbationis declinationem, in balneum ducere. Et accurate simul ac molliter modico oleo dulci tepido perfricos, aquarum dulcium lauacris lauare. Sed neque si in aëre balnei ipsos morari iusseris, quicquid læseris propter frigiditatem. Postea quietis studiū prodest.

De febricitibus ex uigilijs, & curæ, & tristitia, aut ira. Cap. LX.

Eos qui ex uigilijs febricitant, distinguit etiam coloris species. Est enim subhumida. Sed & oculorum motus manifesti sunt, uix enim atollunt supercilia. Et causi sunt ipsis oculi, imò etiam siccit. Pulsus autem densiores sunt omnibus ob uigilijs, curam, ac tristitia febricitibus. Qui uero ex ira febricit, his neque cautitas oculorum adest, neque color ille. Et calor his est amplior, & uelut ex profundo emergens. Et magni sunt his pulsus. Omnes igitur relati neque fritionibus, neque balneis multis opus habent. Sed multi olei perfusione omnino non adstringentis. Atque ubi parum defricti sunt, pro more lauentur.

De febricitibus ex ardore. Cap. LXI.

Febricitantes ex ardore statim ab initio perfrigerantibus sanare oportet, & balneis pluribus dulcissimarum ac temperatissimarum aquarum. Oleum autem modicum adhibendum est, & omnino non affricandum. Sint autem quæ adhibentur capiti frigefacticia, omphacium & rosaceum ex ipso præparati sine sale. Facere autem hæc possumus frigida, uas in quo continentur suspenses in puteum ut aquam contingat. Sed adhuc magis saliens aqua frigida, oleum frigefacti, & magis adhuc nix forinsecus uasi circumposita. Perfundendum est autem sicut ex oleo sic frigefacti, lana moderatè excepto, ita ut manum in sublimè leuemus, & hoc inde sinenter faciamus, usque ad febris declinationem; atque ita in balneum dulcium ac temperatarum aquarum ducamus, accessu solo aëris balnei per transitum concessio.

De febricitibus ex frigore. Cap. LXII.

Si quis frigefactus febricitarit, suppressis uidelicet fumosis transpirationibus, quæ per cutem sunt, & hic in balneum ducendus est in febris declinatione. Caput autem calfaciendum est & ante balneum, & post balneum, in declinatione, ex unguento amaracino aut nardino.

De febricitibus ex grauedine ac destillatione. Cap. LXIII.

Qui ob grauedinem febricitant lauare non oportet, priusquam ex concoquatur, si ex frigidityte aut cruditate destillatio facta est. Caput autem humectandum est frino unguento aut amaracino aut nardino. Si uero ex ardore facta est destillatio capite calfacto, & instar cucurbitæ attrahente materia ex locis subiectis, hunc statim in balneo dulcium ac temperatarum aquarum ducere oportet, & in frigida immergere, & sub saliente locare. In balneis autem frigefactentibus caput humectare. Sunt autem ea moderata, propter balneum.

De febribus ex cutis densitate. Cap. LXIII.

Densatur cutis aut ex frigore, aut acerba qualitate ipsi præter aduersitudinem allapsa. Quale quid accidit etiā his qui in aluminosa aqua lauantur. Arctissima est

his cūdis, ut etiā tacto cognoscatur. Imò & calor is motus, levis quidem iuxta primā manus admotio- nem apparens, acris efficitur, si diutius tactus perse- ueret: Vrinæ autem non uelut alijs fuluæ sunt. Quæ re non accusamus in his quòd alimentum non sen- tiant, unde corporis moles contrahitur. Neque uero oculi caui ac siccī sunt. Verū sunt quibus humidiores & prominentiores esse uidentur naturalibus, ed quòd non contigit transpiratio in ipsis, sed materiæ magis inuis conduduntur. Vnde neq; pulvis paruī sunt uelut in tristida, aut cura, aut uigilijs, & ualde immoderatis exercitijs. Curare porro eos oportet aquarum dulcissimarū ac temperatissimarū balneis, post exacerbationis declinationē, & præcipere ipsis ut aliquandiu in balnei aëre morētur, asfunderētq; est ipsis oleum dulce tepidum, & fricatio mollis ac moderata adhibenda. Tenus autem uictus præscri- bendus est, & uinum dandum tenue & album.

De febribus ex fame.

Cap. LXV.

Si ob famē fiat febris, exacerbatione declinante in bal- neum ducantur, & plurimo oleo tepido dulcissimo perfusi leuissimè fricentur, & plurimo tēpore in ca- lido solio morētur. Egressi deinde ac uiribus refecti rursus in balneum ducantur, & in calidum soliu lo- centur. Postea egressis post balnei turbationē sedatā, dāda est aqua calida potanda, deinde pitāna succus: aliquando etiā pisces petrosi in iure albo parati.

Dietæ cōmunis omnium diariarū febrium. Cap. LXVI.

Dietā in febribus diarijs omnibus cōmunem scopum habet, ut sit ex edulij boni succi & quæ omnino cō- coquantur, & nusquam circa meatus detinentur: his quidem qui ex ardore aut ira februnt, quæ simul fri- gefaciunt ac humectant: frigefactis uero, minus alen- tia & moderatè calfacientia. His autē qui uigilantur, aut tristes fuerunt, aut curis uexati, humidus & so- mnificus cibus congruus est. Fatigatis autem, pluri- mus & maximè nutrens. At in quibus intemperatura corporis calidior ac sicciō facta est, eos oportet ali- quando circa primum exacerbationis impetum nu- trire. Vinum autem dandū est omnibus qui ex dia- rīa febre laborant, aquosum, tenue ac album, quòd & concoctionem adiuuat, & urinas ac sudores pro- pellit. His uero qui uigilantur, aut tristes fuerūt, aut curis uexati, magis intrepidè uinum datur. Sed & fatigatis nimium, dandum est quātum superare pos- sunt. Iratis autem priusquam ab affectu omnino li- berati fuerint, minimè tutum est uinum dare.

De febrientibus ex inguinū inflammatione. Cap. LXVII.

Si quidem citra lacscentem externā causam, inguinis glandularum inflammatio fiat, multitudine sangui- nis plerunq; in uniuerso corpore indicat. Nam & ca- lor in his amplior est quā in prædictis, & facies ru- bicūda ac tumida apparet. Oportet igitur celerissimè uenā secare priusquam materia in inflāmato putref- cat, ac febrem putridā accendat, post uenæ sectionem utendum est tenui digtā, usq; ad perfectā liberationē. At inflammato inguini, ante uenæ sectionē adstrin- gentia ac repellentia imponenda sunt, post uenam se- ctā, laxantia ac moderatè discutientia. Cæterū qui- bus propter offensionem digitorum pedis, aut aliud quid tale, inguinis inflāmatio facta est, & ea de causa febris diaria consequta, tales ne interrogat quidem Medicum quid facere oporteat, sed ulceri ex quo in- guinis inflāmatio facta est prospicientes, lauantur

citra exacerbationis declinationem. Prohibendum autem est uinum omnibus ex inguinis inflāmatio- ne febrientibus, donec inflāmato fuerit soluta. Et uictus ratio tenuior ipsis constituenda est.

De diarijs febribus ex cruditate obortis. Cap. LXVIII.

In corporibus ex malis humoribus uiciatis cruditates orientes citissimè febrē accendunt. Minus autem sit malum, si ob cruditatē alius infra erūpat. Non paruū autem malum est, si fuerit suppressa. Februnt autem aliqui etiā in quibus profluuium uētris ob cruditatem fit. Si quidē igitur sola corrupta euacua- ta esse apparuerit: laudandi sunt ac nutriti di in febris declinatōe. Si uero plus iusto euacuatio fiat, melius est nutrire citra balneū, prospiciendo uentri ipsi. Cu- ra uero uentris dupliciter fiat. Si enim non amplius feratur ipsa aluus, abstinendum modicum aqua mace- rans coquito cum oleo in duplici uasculo, & ex hoc locus circa uentrem humectatur. Deinde hapsūm lang purpureæ oleo imbuiti uentri imponito. Si uero de- bilis sit os uentris, mastichen cū ungento nardino ad strigementitā crassitudinem redige, & purpuram ex eo imbutā impone. Sint autem ea quæ imponun- tur ad tactū calida: tepida enim robur uentris exole- uūt. At si adhuc feratur aluus, melius est optimo me- lino uti pro nardino, cū modico uino. Cōmodum est ad hæc & mastichinum. Si uero etiā uentri exura- tur post euacuationē, melino similiter utaris, aut ce- rato ex ipso parato. Nutriti di porro sunt adhuc fluē- te aluo, ex polenta & panibus paucissimum acetum habentibus. quos hinc oxylypes Græci uocāt. Inspe- genda est autem polenta succo malorū puniceorum, aut pīrorū aut malorum, præsertim coioneorū. Vel in ipsorum decoctū, aut myrrorū. Si uero fluxus cessarit, alica detur, & gallorū testes, & pisces petrosi in iure albo parati, & fructus adstringentes. Si uero inappetentes fuerint, ut auerſentur cibos, ex cōcocto rio medicamēto ex malorum cotoneorum succo ac melle composito, cochlearium unum aut duo dāda sunt. Si autem non affuerit id quod ex succo cōposi- tum est, detur id quod ex carnibus cotoneorū para- tur, cui nihil omnino pipēris additum est, aut ualde exiguum quiddā. Si uero supprimatur aluus in his qui ob cruditatē ex diaria febre febricitāt, si quidem cibi adhuc in uētre continētur, plurima tepida pota, digitis aut pennis immisisis, per uomitū iubebisimus id quod molestū est rejicere, deinde præcordia foue- re, & quietē agere. Si uero cibi itā descenderūt ad in- testina, reclinatis ipsis ita ut partes circa caput & sto- machū sursum urgentes habeat, foueatque uenter, & somnus concilietur. Post somnū autē glandula sub- detur, ad superfluitates quæ descenderunt educēdas, aut per mitiorē dysterem, quale est fursurum deco- ctum, euacuatio fiat. Dietā sit tenuissimā, quæ pluri- mam exterioriā uim in se habet. Quòd si inflatio ac- cesserit, incoquere oportet in oleo cuminum, aut ru- tā, & insundere per sedē. Euacuata uero aluo, statim nutriantur. Si uero etiā citra molestiam dormie- rint, post ridie lauentur, adhibentes uentri ungentum nardinum cum modico uino. Et post balneū simili- ter tenui uictu utantur. Si uero etiā tertia dies fe- brem aliquam induxerit, neq; sic timendum est, sed similiter lauandum, ac moderatè nutriendum. Dare autem oportet talibus ante cibum aliquod conco- ctorium, oxyporium à cita penetratione appellatum



medicamentum, & præsertim quod ex cotoneis malis sit cochlearij mensura.

*Curatio diariarum febrium mularum dierum, quarum aliquæ ex mutatione diariarum generantur, ob cutis obturationem. Cap. lxxix.*

Quædam febres propter obturationem uasorum circa autem sunt, ex diariarum mutatione, quæ non probe curatæ fuerint statim ab initio. Cõtingit hoc maxime in corporibus uisiosis humoribus præditis, quum multũ fuerint uoraces. Nam in talibus circa primã ac secundã diem aliquantisper, non est in pulsu putredinis signũ, sicut neq; in urinis, cruditatis: dũ enim prolõgatur quidem declinatio, & nõ amplius iuxta proportionem remittit, suspecta est affectio: si enim nõ transpirauerint perfecte, necesse est putrefactos esse uisiosos humores. Si quidẽ igitur puer aut senex fuerit ægrotus, uenã secare non expedit. In medijs autẽ ætatis, robore præsentẽ ægrotò, uenã secetur, si sanẽ etiã plenitudinis signa affuerint in corpore. Detrahendũ est autem pro uiribus, & obturationis magnitudine: maior enim febris ob uehementiores obturationes incidit. Minor autẽ ob minores. Euacuata uero multitudine, & rarefactis meatibus, fumosæ ac fuliginosæ superfluitates transpiratẽs pauciores fieri poterint. Periculosum enim est aperire potentibus obstructions, uel ante euacuationẽ. Quæ enim uim exterioriã habent, exhibitã dum exhalant simul attrahũt quid ex crassis ac uisiosis humoribus in uasis, & duplicat in angustis meatibus obturationes. Si uero etiã extrinsecus cui ad moueatur exterioriã, periculum est ne attrahant etiam aliud quid ad meatus obstructos. Quod igitur secure & intrinsecis exhalatio, & extrinsecis attractio contingat, utilissimũ est euacuare pro uiribus corpus: post euacuationẽ uero non longa facta dilatio, aliqua exterioriã edulia aut pharmaca dare. Eduliorũ quidẽ loco pitãsanã & aquã mulsã, pro pharmacis autẽ, acetum mulsũ ex solo aceto ac melle paratũ. Quæ enim in aceto mulsò coquuntur aliã, uelut calamintha, & similia calida, febres accendũt, uelut etiã uinũ. At post tertĩã diem, neq; putredinis humorũ signũ in pulsibus præsentẽ, neq; in urinis cruditatẽ, & ubi hora suspecta in qua febris accessit in prima diẽ transiit, confidẽter iam hominẽ lauare oportet. Si uero etiã circa decimã horã suspectus tibi fuerit paroxysmus siue exacerbatio, lauare oportet ante horã sextã. In balneo uero corpore præcalẽfacto illinire oportet oleo dulci tepido, & moderatius cõfricare, postea depurgare & abluere forinsecus corpus. Eligenda ab hoc quædam moderate extergentia, qualis est ordeacea farina & fabacea. Deinde immiscere in solũ calidã temperatã, deinde etiam in frigidã. Si uero circa decimã horam, ut ita demus, turbatio quædam suspecta sit, nihil exhibendum est præter aquã cui incocta est hyssopus & parũ apij. Deinde si nihil mali insulerit hora, nutriantur: Si uero etiam quid attulerit, omnino moderatum apparebit. Quare & lauare poteris possidide ac nutrire. At ubi magna facta est obturatio, necessariũ putrefactio contingit. Vnde curatio in putredinosa febre referenda, etiam his congrua est.

*De febribus continetibus, siue synochis. Cap. lxxx.*  
Condensens febres nominatur, cuius ab initio usq; ad finem una est exacerbatio, nullã alterius exacerbationis principij significationẽ faciens. Corporibus q;

no habitu præditis, & multo sanguine refertis, & ætati calidæ peculiaris est continens febris. Conflatur enim ob calidi sanguinis copiam nõdum putrefacti, & eò quod nõ transpirat, feruore solũ caliditatẽ exacerbat: quemadmodũ nouum uinũ solet in dolij: tempus autem talium febrium maxime uernum est. Sunt autem differentie febres continens tres. Nã aut equalis permancet magnitudo ab initio usq; ad solutionem, aut additamentũ facit, aut detractionem: hoc autem contingit prout maiores aut minores sunt transpirationes, ex eo quod densior aut rarior est habitus corporis affecti. Est autem multa copia quæ in talibus affligit, & feruorem sanguinis ebullientem cõsequenter febris accendit. Aliquãdo uero etiã crassitudo, Scopus igitur curationis in ipsis est euacuare copiam, & extinguere calorem præternaturalem, & crassitudinẽ secare, si quidem affuerit. Deinde ueterẽ bonam temperaturam debilitatis paribus reparare.

*De uena sectione.*

*Cap. lxxxi.*

Si ualidæ sunt uires, & ætas permittit, & nihil aliud fortiter resistit, sanguinis tantum auferre oportet, quantum uires tolerant. Præstat autẽ si uires adsumt, usq; ad animi deliquium ducere. Quibus uero nõ sit uena secã est, hi ad extremum periculum deueniũt, ut aut suffocentur, aut animo linquantur, nisi uirium robur, aut larga sanguinis erupio, aut multus sudor, ex manifesta pernicie ipsos eripiat. Nam multitudo in his non amplius a uenis contineri potest, obturatur ac distendit corporis molẽ, & propterea ipsum aliquando dirumpit, & uasa maxime in naribus aperit. Ea grata festinare oportet ad sanguinis detractionem, quantum uires ferunt: quò uasorum natura ex transpiratione ac uentilatione, naturale temperamentum conseruãt, iuxta morem ab initio humoribus domineatur. Verum animaduertendum est & ad ipsius uenæ sectionis scopos. Præcedente enim ciborum cruditate, eousq; uenę sectionem differre conuenit, donec tibi satis esse uidebitur concoctio ipsorũ in uentre peracta, itemq; scesilis superfluitatũ in intestinis. Si uero suspectam habes post uenę sectionem, aliam fore sanguinis euacuationẽ, uelut muliebrem purgationẽ, aut hæmorrhoidiũ in sede fluxum, relinquere oportet in uenę sectione tantũ sanguinis, quantum per alios locos euacuandum putas. Quare siue menses fuerint moti, siue hæmorrhoidis aperta, totum negotiũ naturę permittito. Si uero non tantũ quantum oportebat euacuatiũ fuerit, tunc uenã secato, quo ex utriq; compositis perficiatur quod conuenit. Aupus est ad uenæ sectionem habitus corporis durus, multus sanguinis, densus, & ægrè transpirans. Status aeris humidior. Resistit uenæ sectioni puerilis ac senilis ætas, temperamentũ calidum, accitũ ualde, & tempus ac regio cõsimilis, & qui natura humidiores sunt, & præsertim cum caliditate, & qui raro habitu præditi sunt. Insuper quibus os ueris aut amara bilis ualde uexatur, aut debile est, aut ultra iustum subillĩ sensu præditum; hi enim omnes facillẽ transpirant, & in uenę sectione animi deliquijs corripuntur, ex quibus ægrè reuocari possunt. Similiter autẽ etiam si uiginti annorũ fuerit is cui uena secãda est, uerũ humidus & mollis, & pinguis ac albus corpore, & paruas uenas habuerit: huic aut omnino non uenã secabis, aut parũ detrahes: omnino quidẽ non, ætatis tempore & in reliquis eiusdẽ ordinis: parum uero, alijs temporib;

temporibus ac reliquis cōstitutionibus. Proinde alii qui in animi deliquiū collapsi in ipsis medicorū manibus, nō sunt reuocati. Quare si quis euacuasset citra uirū dissolutionem, non periissent. Aliqui uero per omnē deinceps uitā, totum corporis tēperamentum frigidius habuerūt, propter immōdiā euacuationē, ut quidā in malo corpore ac habitu uitam degerint: quidā uero ex hoc ipso pernicioso morbis correpti sint, ab aqua inter autem, & erectæ ceruicis spiratione, hepatisq; ac uētris debilitate, & semi sideratione: optimū igitur est, quēadmodum nos semper facere uidisti, nō dierum numero animum aduertere, neq; soli multitudinī, sed uirū robori, in omnibus quidē, uerum maxime in continentibus febribus: si enim uires conferuentur, non solum sexta ac septima, sed etiam sequentibus diebus uenam secabis.

De frigide aque exhibitione.

Cap. LXII.

Si aliquando coactus fueris curare ægroti, qui non solum antea uenæ secandæ auxilium omisit, sed etiam nunc aut propter timiditatem ægroti, aut cognarum sanguinē detrahare prohibearis: ad frigidæ exhibitionem deueniendū est exacta præscriptione facta, quantū ex ipsa fieri possit detrimentū. Nā si hoc paruum uel omnino nullum futurū est, danda est in potu frigida sincera quantū eger eius uoluerit. Tunc autem danda est frigida, quum in urinis uideris cōstitutionis signa. Neq; autem in principio, neq; in augmento danda est frigida, sed in ipso uigore totius morbi, ac particularis exacerbationis. Oportuno enim tēpore data frigida, corroborat solidariū partū naturam. Corroborata uero natura præattenuatos humores aggreditur, ut bonos quidē detineat, inutiles uero eijctat, aut per uētre, aut per uomitus, aut sudores. Si uero frigidæ potor fuerit eger tēpore sanitate ualde confiderent frigida dato, ipsa expertentia doctus, omnia uiscera frigidæ familiaritate sustinere. Si enim omnino aliqua pars adeo frigida esset, ut ab ipsa læderetur, sanitatis itaq; tempore euident detrimentum ostēdidisset. Quum autem nulla pars in sanitatē læsa sit, ne in febre quidem lædi poterit, quū maximum propugnaculum habeat in profundo ardentis calorī multitudinē. Quapropter his qui modicum sanguinem, & minimū carnis habent, frigidæ potus periculosior est. Citō enim ad solidas animalis partes penetrat carnis nudatas. Quapropter etiam habituales febres, neq; sincera, neq; multa frigida opus habent: Tenuia enim sunt in ipsis ac modici sanguinis corpora. Vnde quū magni detrimenti timor immineat in ineptis, à frigidæ exhibitione abstinere oportet, & ut alijs auxilijs, quæ obturatione reserant, & multitudinem euacuant, & seruento febris mitigat. At uero detrimēta ex intempestiuo frigidæ potu orientia hæc sunt: Viscosos ac crassos humores attenuari ac transpirare frigida impedit. Quare siue inflammatio fuerit in aliquo uiscere, siue ignis facer, siue indurata, siue mollis ac laxa affectio, frigidæ potus ad huius sanationē nihil cōfert: sed euestigiō quidē non modicam affert lenitatem, eod quod febrem iam factā extinguit. Manente autem intus causa, quū ex frigida densatum fuerit corpus, aliam febrem accendit priore grauiorem. Atq; hæc quidē detrimenti species contemni poterat. Verum pleriq; debilia habentes uiscera, citius ac facilius à frigidæ exhibitione læduntur. Quibuscūq; enim stomachus siue gula adeo

fortiter affectus est, ut perdidit actionē, & uix potuerit deglutire: Alijs uēter Iesus est, ut uix cōcoquere potuerit: Alijs hepar, ut ex hoc in aquā inter cutē incidere. Alijs colū, aut pulmo, aut renes & uesica, aut aliud quid à frigida læsum, debile ad propriam actionem factū est. Quidā ipsorum statim erectæ ceruicis spiratione, aut alto sopore, aut lethargo, aut uirū abscessu, aut conuulsionibus, aut tremoribus, aut siderationibus corripuntur. Et ut in summa dicam, Omne neruorū genus & caput ipsis affligitur. Noui quod formidinem tibi induxerim per ea quæ retuli, ad frigidæ exhibitionē. Verum uidisti me sæpe ipsa oportune usum esse, & in quibus dare oportet. Et semper utilitatem assequutum esse, citra ægri læsionem.

Dieta in febribus continentibus. Cap. LXIII.

Quibus uena secta est, his ego post duas uenæ sectæ horas, semper do modicum pulsant succum, & iubeo quiescere. Et postquam ex somnis surrexerint, rursus similiter pristinæ succum exhibeo, & in hoc perseuero usq; ad tertiam diem. Quarta ferē semper in balneum duco. Tales enim oportune uena secta uiribus robustis, & ad animi deliquiū euacuat, necessariō sequitur non longē postea uentris secessus, attenuatis uidelicet humoribus, & leuatis ac corroboratis uiribus. Aliquando uero etiā bilis uomitus. Ad quæ statim etiā humiditates per totum corpus aut sudores succedunt. Quare confiderent hos lauato quarta die. At uero tempus exhibēdi cibi in febribus continentibus, tum his, quæ tam relate sunt, tū his quæ postea referentur, quæ sanē unā solum ab initio usq; ad finē exacerbationē habent, est bona ægri tolerantia & cōsuetudo. Tunc enim ipsis cibi dandi sunt, quando tolerantissimi sibi ipsis esse uidentur. Et illo præsertim tēpore diei, in quo etiā prius morē accipiendi cibi habuerunt: maxime enim tolerant peritulerint cibos isto tēpore acceptos. Robustis igitur uiribus, & dū uigor morbi breui expectatur, tenuissimo uictu uelicer. Vbi uero uires ægræ sunt, non licet tenui uictu uti, citra magnū detrimentū. Quare alimentis tantum apponendū est, quantū roboris uiribus detractū est.

Uniuersalis doctrina de febribus putredine

sis.

Cap. LXXXIII.

Transpirationis angustia ac impedimentum meatuum obscurorum totius corporis obturationem facit, per quos fumosæ & fuliginosæ superfuitates quotidie transpirant. At obturationis affectio quā parua fuerit, & probe tractata, diariā febrem efficit. Quum autem siue propter magnitudinē, siue imperitiā Medicorum consuetū diariū tempus exccellerit, aut continentem, aut aliā quandam ob humorū putrefactio nem accendit febrem. At uero transpiratio multiformiter impeditur, & dum densantur meatus propter siccitatē, aut adstrictionē cutis: & dum obturantur propter multitudinē & crassitudinē ac uiscositatem humorum. Dū itaq; quotidie fumosarū ac fuliginosarū superfuitatū trāspiratio impeditur, naturalis in nobis calor affligitur. Alius uero præter naturam corporibus accedens, primū humores propter humiditatem putrefacit ac corrūpit: Progressu uero tēporis etiā pinguedinem ac carnem, & ipsa solida corpora inuadit. Est autē putrefactio essentia putrescentis corporis ad corruptionē transmutatio, à calore præter naturam fiens. Putrescentes igitur humores, aut intra uasa arctati, continuas & nunquā intermitte-

tes usq; ad perfectam morbi solutionē febres efficiūt, aut per totū corpus delati, & extra uasa elapsi, quando febrem per circuitū accedentem, & interualla habentē accendūt, uelut tertianā, quartanam, quoridianā, aut aliā consimilē. Causa uero cur nō excidant extra uasa humores in febribus cōtinuis, est aut multitudo, aut crassitudo, aut uiscositas ipsorum. Quē admodū igitur dum inanizata corpora putrescunt, primū abijcimus ex ipsis quæ iam putruerūt, deinde reliquū in aëre frigido suspendimus, & perpirationes perfrigerantes molimur. Eodē modo sanabimus in humanis corporibus putrefactionē, quod quidē iam corruptū est omni modo euacuant. Reliquum uero gestationibus moderatis & transpirationibus perfrigerantibus, ad exactam ac naturalem proportionē reducentes. Proinde ubi prius de non intermittebibus febribus tractauerimus, mentionem faciemus deinceps & reliquarum.

*De febribus putridis.*

Cap. LXXV.

Quum in omnibus uasis, & præsertim maximis, circa alas ac inguina, ac cōsimilibus, sanguis calidior æqualiter redundans putruerit, febrem putridā continētē efficit. Plerumq; uero in corporibus multi sanguinis ac carnosus, & densō habitu præditis, & superfluitatibus calidis referis hæc generatur. Proinde his iam febribus pulsus maximus, ac æqualis ac uehemens est, & qui cōpagem arteriæ necq; duriorē, necq; molliorem habet. Ad tantā uero uelocitatē ac densitatem uenit, ad quā magnitudinē ipsa febris uenit. Atq; hæc quidem ambabus cōmunia sunt, huic uidelicet, & prædictæ cōtinenti citra putrefactionē febri. Verum huic præcipua putrefactionis signa in urinis, & pulsibus, & caloris specie adlunt. Curatio uero harū febriū, in utroq; genere cōmunicat, tum in eo quod cum putrefactione, tum eo quod sine hac est. At essentia quidem & uniuersa ipsarū natura, ex genere putridarum est. Verū quatenus una est tota ipsarū exacerbatio, ab initio usq; ad totius morbi solutionē, eatenus cōmunicat cum cōtinuēdi absq; putrefactione. Oportet itaq; etiam curationē ipsis in hoc solum cum illis continetibus cōmunem esse. Per alia uero omnia bifariam secari, ita ut quosdā medēdi scopos ex genere putridarū accipiamus, quosdam uero ex propria ipsarum essentia. Sanguis enim est qui in hac febre putrefactionem suscepit. Sic uero etiā alias differendas putrefactorum humorum sanare cōuenit, iudicationem paritū ad putrefactionē sumendo, paritū ad propriā uniuscuiusq; differentia, uelut pituita, aut utraq; bile. Quandoquidem igitur putridarum febrium septem subiecta sunt præter naturam, a quibus iudicationes sumuntur, nempe copia humorum, & crassitudo, & uiscositas, & obstructio, & transpirationū suppressio, & putrefactio, ex febris non habēs interuallum, unāquancq; sanē ex relatis affectionem sanare oportet per cōtraria. Copiam per euacuationem. Crassitudinē per secantia. Viscositatē per extergentia. Obstruccionē, aperientibus. Transpirationū suppressionem, si quidē propter cōstrictionem cutis facta est, per diffundentia: si uero propter densitatē, per rarefacientia. Deinde putrefactionem, extergētib; & alteratib; ac transmutantib;. Febrem autē, per frige factia. Quū igitur uires fuerint fortes, uena & his secanda est, nisi cruditus uenteris, aut alterius cuiusdā partis prohibeat, uelut antea dictū est. Nam

ex his quæ de illis diximus, considerare oportet conuenientia etiam de his. Quandoquidē uero necq; obstructio necq; putrefactio curari potest per solā uenæ sectionem, quum alijs auxilijs opus habeant, referuare aliquid sanguinis oportet ad curationis rēpus, ut ne necessitas aliqua ingruat, ob inopiam, interpetitū nutriendi. Quantū enim ad talem febrem atinet, omni non no nutrire oportet: Quātum uero ad sanguinis euacuationem, nutrire opus erit. Quare ex duobus alterum necessarium erit, ut aut nutrientes febrem augemus; aut non nutrientes, uires dissoluamus. Melius igitur, uelut dictū est, relinquere sanguinis proprium alimentum animalis partibus. Et ipsum contentum esse modicis sorbitionū exhibitionibus, uelut sicut pitana & aqua multa, quibus ut medicamentis magis quā alimentis opus habemus. Si uero ob aliquā causam relictū fuerit uenæ sectionis auxilium: hominī per tenuem uictum connutrito, quum iam concocti fuerint humores, & crassitudo ipsarum fuerit præattenuata, febre in uigore existente, dabimus frigidam aquam, uelut in superioribus cōtinentibus febribus, nisi quid ex illic relatis prohibeat exhibitionem. Quod si uero etiam frigida potiois auxiliū fuerit relictum, alijs auxilijs utendum est, quæ obstruccionē aperiunt, & multitudinem euacuant, & seruiorem mitigant, uelut antea dictum est, & deinceps consequenter referetur.

*Communis diæta omnium febrium putridarum.*

Cap. LXXVI.

In omnibus putridis febribus in cōmuni putrefactos humores expurgare oportet, per urinā, & uentrem ac sudores. Hoc enim cōmune est omni putredini. Si uero aliquando sua sponte ad os uentris impetū fecerint, per uomitus euacuantur: Alioqui non oportet ægrē uomentes præter naturam irritare, ut ne uires oris uentris exoluantur, quibus maximē in morbis opus habemus. Eligenda uero sunt quæ citra calefactionem ac resiccationē prædictas euacuationes perficere possunt: Velut est pitana succus, & aqua multa, acetum multum simplicissimum, & fauorū mellis elotorum cremor, apomeli Græci uocat, & radicis apij decoctum. Aqua itaq; multa ad secandos crassos humores, & detergendos uiscosos, & promouendas excretiones, optima fuerit, in febribus ex coarctatione ac putrefactione obortis, & præsertim continetibus putridis. attamē febrilem calorem auget. Quare si immodica fuerit caliditas ab aqua multa abstinentum est, & utendum pitanae succo. Si uero obstruccionē ægrē solubiles esse iudicauerimus, acetum multum dandum est: quanquam & hoc si quis immodicē uiatur, intestina radit, & tulsim mouet, & neruofas partes lædit, ut difficile sit reperire tale auxiliū, quod nihil lædens multū prosit, atq; hoc cōtingit propter cōplexum affectionū præter naturā in corpore. Quapropter his qui faciliē à quacūq; re exhibita læduntur, melius est ut pitanae succo utantur, donec ualidius alimentū accipere possint. At si alius nō egerat, aqua multa cum solo oleo infusa eluatur. Totū uero corpus forinsecus ante euacuationem discussorij dissilare nō oportet, post euacuationē teo discussorij uti licet. Pharmacis autem utendum est tepidam caliditatem habentibus, uelut est olei chamæmelinum, & in hoc tempore, inter discutendum in qua, etiā uinum aquosum, porū omnes excretiones mouet,

movent. Cōcoctione uero manifesta in urinis apparet, etiam lauari licet, dulcis & potabilis aq̃ balneo.

De febribus continuis.

Cap. LXXVII.

Febres continuæ eiusdem generis sunt cum intermittētibus siue interpolatis. Eiusdem autem generis dico cum tertiana exquisita, febrem ardentem (causum Græcis dictam) exquisitam, & cū quotidiana, eā quæ quodidie exacerbat, & tamen nō intermitit. Nam & febris ardens omnes alias exquisitas tertianæ notat seruat, & in hoc solum ab illa differt, quod cum rigore non irruit, neq; intermitit. Et quæ quotidie exacerbat, similiter omnes notas habet cū quotidiana. In eo uero quod non intermitit, eiusdē cum illa generis est. Eodem modo etiam quæ per quartā exacerbatur, non autem intermitit, eiusdem generis est cū quartanis. Et manifestum est quod neq; rigor exacerbationes præcedit, neq; sudor consequitur in hac febre, quemadmodū neq; in febre ardente. In febre ardente rigor superueniens soluit ægritudinem. Differt autē febris ardens a continente putrida, eō quod hæc ex sanguine putrefacto conflat, & a principio usq; in finem unam habet exacerbationem. Febres autem ardens ex flaua bile putrescente incenditur, & alternis diebus exacerbat, & quidam habet febris imminutionem ac uelut remissionem. Continens uero putrida similis manet usq; ad solutionem.

Cura febris ardentis. Philum. Cap. LXXVIII.

Est igitur febris ex flaua bile putrefacta incensa, continua ardentissima, & neq; medicis, neq; ægris bonū ordinem exhibet. Lingua enim in his arida est, & nigra ac aspera. Morfus item uentris, ac sitis intolerabilis, & uigiliæ. Aliquando etiam delirium. Primum itaq; leniter ac blandē hanc febrem aggredi oportet. Vbi uero concoctionis signa apparuerint in urinis, & morbus iam uiguerit, acrius insitare, & ad frigidē potum accedere. Nisi & hic aliquid prohibeat ex his quæ de continētibus febribus relata sunt. Prima uero auxilia in febre ardenti sunt. Decubitus in locis frigidis, qui ad purū aërem patent ac perflantur. Stratum molle & sepius renouatū. amacula assiduē permittata, & satis gracilia & non sordida. Lectus sit abunde amplus, quo possint mēbra calefacta subinde ad alias atq; alias eius partes transferri. Et per scabellum aër ignauior cōcietur. Epithemata cōueniunt pectori ac stomacho imposita, palmulæ cū uino & rosaceo, aut melino tritæ. Sunt & frigescentia commoda, uelut sunt pampini uitis triti, seris, polygonis, plātago, ramenta cucurbitæ, lactuca, rumex acutus. Sin gulis autem ammiscantur micæ panis præmedactæ, aut polentæ. Oportet tamen assiduos horum usus deuotare. At uero panniculi linei complicati moderate graciles aqua & oleo calido imbunt, & pectori ac stomacho impositæ, ardētem febrem mirifice mitigant. Sed & aqua & oleum calidum, aut aqua & oleū rosaceum, ex alto in pectus delata per lanē manipulū, uehementiā ardoris facile obtundunt. Oportet autē abunde calida esse aquam & oleū, aut aqua & rosaceum. Tepida enim partium firmitatem exolunt. Si uero parum nitri his ammixtū fuerit, sudores excludere poterint. In ardentissimis autem febribus etiā aceti parū ammiscēdum est. nā & hoc quod debet facit. Cibi porro offendi sum humilidissimi, & nihil acre habentes, uelut sunt lactucæ, caules cum posca aquosā seruēfacti, & cucurbitæ similiter cum

posca. Sed & pisanæ succus tenuior dandus est absq; sale, aut alio additamento. Et aliquando post cibum aquam frigidam cochariij unius aut duorum mensura absorbeant. Aut sit potius ipsorum potus in totum lactei teporis. Sed & aqua frigida fracta colluctanda ac gargarillanda præbeatur. Et rosarum succi cochariū absorptum stomachum refrigerat. Quin & alia animi oblectamenta procurentur. Folia uitis uiridia, item myrti ac rosarum pro pauimentū spargantur, & aqua frigida frequenter irroretur. Et aque salientes in uicinia fontium edant. Tempus autem frigescentium epidematum ac similium, est uigor exacerbationis. Nam in principijs ac augmentis exacerbationum, dum adhuc inæqualiter affectum est, & caliditas circa uiscera residet, si hæc adhibeantur, diffundunt quidem sensum, uerum repellentia caliditatem in profundum, maius detrimentum inducunt, incluso intus seruido calore, & rursus febrem ardentē efficiēte. At in uigore exacerbationum, ex passa caliditate per totum corpus, facile exingui poterit ea quæ adhuc reliqua est circa uiscera. Nam & melius spirantes, & minus sticuli sunt, his in tempore adhibitis. Et ipsorum rosco uapore excludo, ad somnum conuertuntur. Cæterum instante iam uigore totius morbi, & nullo prohibente ex his quæ in continētī febre relata sunt, tempus iam est frigidæ exhibendæ. In quibus igitur confidimus, nullum ex uisceribus, neque caput, uelut dictum est, læsionem incursum, sinceram sanē frigidam exhibemus. In quibus uero metus est, atque is uel minimus impedimento est, pro prima uice fractum exhibebimus potum siue frigidam. Frangitur autem si quis temperatæ aquæ calidæ cyathum unum, ad quinque frigidæ puræ sinceræ ammiscuerit. Atque talis potio suspectis corporibus exhibetur. Quidam uero olei rosacii cyathum frigidæ exhibendæ affundunt, & sic exhibent. Ipsum enim rosaceum non ualde frigescent, & oleositas eius corporibus intus oblita, non permittit ipsa a frigida aqua lædi. Et simul firmitatem quandam exhibet uentri rosaceum, & lubricitatem, propter oleositatem. Quidam pro rosaceo, melinum exhibent. Porro balneum illis solum cōuenit in ardenti febre, qui citra tumorem aliquem inflammatum, aut erysipelatum ægrotant, ubi concoctionis signa apparuerint in urinis. Quod si quis iuuenis sit carnosus, tempore astitas, & constitutio ne calida ac sicca, febre in uigore existente, & concoctione in urinis apparente, citra uisceris aluius inflammationem, & in lauacrum frigidæ notariorum seipsum iniiciat, atq; nater, sudores utq; commoueat. Si uero etiam ad frigidæ balneū aduersus fuerit, ualde confidenter hoc auxilio utatur. Quibusdam enim statim uenter biliosa egescit. At si moderata est febris, & uires robustæ, unā cum cōcoctionis signis, profunt ipsi balnea dulcissima ac temperatarum aquarum, & ex ungentis chamæmelinū, præsertim si aëri ambiens, frigidus fuerit. Nam si aliquando contigerit, ut frigidum existente ambiente æger fortiter a febre exuratur, modicam salutis spem de ipso habere oportet. Si uero neq; concoctionis signa affuerint, in tali aëris statu, neq; uires fortes habere apparuerint, tale seruari impossibile est. Quare neq; lauabis ipsum, neque inunges rarefacientibus medicamentis, neque uinum dabis, neq; frigidā. In quibus enim desperata

est salus, uanum est auxilia multos seruantia imperi-  
torum calumniæ exponere. Proinde ego sanè Me-  
dicos quosdam noui methodi ignaros, qui imitati  
sunt ea quæ à nobis feri solent, & uisunt his auxi-  
lijs, in his qui penitus mortui fuerunt, & neq; quic-  
quam profecisse, & oportunum ipsorum usum suspe-  
ctum ac horrendum fuisse. At nos & temporum oc-  
cassiones, & auxilia describimus, in his qui seruari  
possunt. Nam qui incurabiles sunt ægri, his neq; oc-  
cassio neq; auxilia commodant.

*Tertianæ exquisitæ dinotio.* Cap. LXXIX.

Febris tertiana exquisita in corporibus natura bilioso-  
ribus omnino consistit, & in ætate uigoris, & maxi-  
mè tempore æstiuo, & in locis calidis ac siccis tempe-  
ramento, & in tali ambientis nos æris fiat. Sed &  
uita in laboribus, & curis, ac uigilijs, ardoribusq; &  
paucò alimento, eoque calido & sicco. Et immodicus  
calefactiui ac siccantiu potioniu ac medicamentorum  
usus, apta sunt ad febrem tertianam. Quum igitur  
gignatur tertiana, ex flaua bile putrefacta, ac mo-  
ta, & extra uasa lata, statim à principio rigorem infi-  
gnè inducit, qui à quartanæ febris rigore in hoc dif-  
fert, quod in tertianis pungi ac uulnerari corpus ui-  
deatur. Nam in quartanis inualso uehementem per-  
frigerationem habet, & magis in profundo. Quoti-  
dianam uero neq; rigor omnino præcedit, sed magis  
circumfrigesunt. Est etiam in tertianis febris or-  
do pulsuum exquisitus, & æqualis. Excitatur autè  
in progressibus exacerbationum pulsus ipse ad uehe-  
mentiam ac magnitudinem & densitatem. Sitim e-  
tiam inducit tertiana, maximè in uigore, & hominè  
exurit, ut se denudet & abijcet uestitum, & magnū  
ac densum spiritum ducat, & uelut flammam quan-  
dam efficit, & frigidam bibere expetat. Et paulò post  
calor æqualiter per totum corpus extenditur. Quod  
si etiam manum inteceris corpori, iuxta primū con-  
tractum calor multus & acris occurrit, qui uelut cū  
uapore quodā affertur. Vincitur autem paulò post  
à manu, & sanè tam etiam bibere tempus est ægro,  
atq; ubi bibit, statim multitudinè calidi uaporis per-  
cutem remittit, prænuntiam sudoris, & uomitus bi-  
lis apparet, & aliquando etiam uenter egerit. Urinæ  
uero his sunt biliosæ & subflauæ ac subflauæ, & mo-  
deratè crassæ, & paulò post aut nubesculæ albam, aut  
quiddā in medio dependens bonū effundit. At si sul-  
uiores fuerint urinæ, & neq; quid in medio pendens,  
neq; nubescula, in primo circuitu apparuerit, ad septē  
circuitus extendetur morbus. Verū exquisita tertiana  
quæ in prima die ostendit in urinis subsidentiam  
albam acleuem, & æqualem, tertium circuitum non  
transgreditur. Hæc febris in integrā febris quietem  
desinit post exacerbationem, uniuersum exacerbatio-  
nis tempus duodecim horarum ad summum facies,  
& non plurius. Atq; hanc exquisitam tertianam no-  
minamus. Quæ uero diuturniorem habuerit exacer-  
bationem, eam appellamus extensā. Si uero quoti-  
die exacerbauerit, cum rigore irruens uehementi, ha-  
buerit autem omnes prædictas notas in pulsibus, &  
urinis, & reliquo corpore, hanc duplicem tertianam  
nominamus. Et hoc contingit propter multitudinè  
& crassitudinem & bilis inæqualitatem.

*Tertianæ exquisitæ curatio.* Cap. LXXX.

Tertianam igitur exquisitam uelut à flaua bile cōmota  
sientem, humectare ac frigidare quantum eius fieri

potest, conuenit. Et quæ quidem in supernū uentrem  
confluunt, euacuare per uomitus. Quæ uero infernū  
subeunt, similiter per infernā excretionem. Sed & u-  
rinis ac sudoribus uia aperienda est, & uenter quidē  
mollibus infusis euacuandus est. Urinæ autem pro-  
pellendæ sunt, apio & anetho in potionibus macera-  
tis. Et si concoctionis signa apparuerint, confidenter  
etiam abstinthij comam aqua multa macerata ac  
excolaram dabis. Balnea uero ipsis cōueniunt, ex a-  
qua calida potabili temperata, & neq; nitrum, neque  
aliud quiddā tale in balneis adhibere, sed aquam &  
oleū præcalēfacto corpori circūfundere, & in calidæ  
solum locare, ac hortari ut in ipso moretur quātum  
eius fieri potest. Eos uero qui balneum amant, etiam  
si bis laueris, non peccaueris. A uiuo uero abstinen-  
dum est penitus priusquā cōcoquatur morbus. Vbi  
uero cōcoqui incipit, tenue & aquosum ac modicū,  
primum dandum est, prope solutionem uero, ube-  
rius. Cibi qui humectant ac frigidant, omnes cō-  
modant tertianis exquisitis. Quantitas uero in ipsis  
tanta sit, quantū probè concoquere possunt. Et ex o-  
leribus quidem cōueniunt atriplex, blitū, malua, la-  
tūca, & cucurbita. Ex reliquis autē pisanæ succus,  
& sorbitiones ex alica, & pisces petrosi, & ex uolu-  
cribus quæ mollem carnē habent. Ex alijs alas, & gal-  
lorū testes, & suillos pedes, ac cerebella, & paruorū  
porcellorū extremas partes dare conuenit. Sorbēdi  
sunt etiā ouorū utelli, & fructus gustandi non ægrè  
concoctiles. Abstinentium uero ab omnibus dulci-  
bus & acribus, & salis, nidorosisq; ac uirosis edu-  
lijs ac potibus. Et à ueteribus ac natura calidis uinis.

*Tertianæ spurie curatio.* Cap. LXXXI.

In non exquisitis tertianis, neq; lauare statim ab initio  
bonū est, sed quando iam apparuerint signa conco-  
ctionis: neque quotidie nutrire, sed satis est alternis.  
Quies autem & calfactio præcordiorū ipsis condu-  
cit, & sorbitiones cōcoctu faciliores. Infusa item in-  
ferni uentris non ualde mollia. Et si sanguinis detra-  
ctione opus habuerint, neq; hæc relinquantur, sed sta-  
tim ab initio distinctione facta, uelut in Sermone de  
uenæ sectione dictum est, moderatus sanguis auferatur,  
quantum in præsens satis est. Totus uero diætæ  
status non frigidans, sed etiam quid de incisório ac  
calfactório modo assumat. nimirū uelut crassiore bi-  
le subiecta, & nō ualde calidiora. Maximè uero con-  
tulerit ipsis pisanæ succus, iniecto pipere & hyssopo  
aut origano. Sed & nardi spicam cū aqua multa cō-  
cta bibendā dato. Et alia quoq; quæ urinā dant, præ-  
terquā extremè calfaciētia ac siccantia. Maximè quoq;  
abstinthij cremor assidue dādus est post septimā diē.  
Sed & acetū mulsū multis profuit potum. Et alia  
quod lene purgatoriū, bona cōcoctione in urinis ap-  
parente. At uero uomitus ab accepto cibo, usq; adeo  
cōmodus est his qui in hac febre perseverant, ut mul-  
tos nouerim statim perfectè liberatos ex huius usu.

De hemitritia, hoc est, semitertiana. Cap. LXXXII.  
Febris semitertiana appellata, fit pituita putrefacta ad  
putrefactū amaræ bilis humorè ammixta, & est ex  
duabus febribus cōposita: quotidiana enim cū circū-  
frigefactione irruente, tertiana uero cū rigore, febris  
ex ambabus mixta, horrorem inducit, & de rigore  
quidē minus, plus autē de frigefactione, id quod ex-  
temitaibus permixtis contingit. Itaq; neq; absolutū  
nomen

nomen huius febris imposuerunt qui hæmicitatē dixerunt. Duplex est autem modus generationis eius. Aut duabus exacerbationibus uno tempore coincidentibus: Aut statim ab initio utriusque inter se permixtis. Quum igitur tertiana prædominatur, horridior febris fit, & iuxta accessionē etiam aliquid rigoris assumit. Statim uero talis etiam calidior est & æstuosior, & quendā bilis uomitum, aut egestionē, aut sudorē inducit. Vbi uero altera pituitosior febris præualeat, prædominatur quiddē frigiditas extrematū, uerum modici sunt horrores: & non sunt siticulosi, neque æstuosi. At ubi æquales magnitudine fuerint, & tertiana interpellata, & quotidiana cōtinua, inuasio quiddē exacerbationis cum horrore contingit. Et quum pituitosa febris dominatur, cōtractiones sūt ac horrores. Quum autē biliosa febris præualuerit, acutatum incallescunt. Atque hæc quidem est semitertiana exquisita, ex tertiana intermissione & quotidiana cōtinua cōposita, ambarum febrū temperatura æquali existente. Cæterū semitertiana nō exquisita, aut biliosum humorē habet, aut pituitosum. Quā igitur ex utriusque relaxis humoribus semitertiana febris cōsistat, etiā curationē mixtā esse cōuenit. Quare ex his quæ de tertiana relata sunt, & ex his quæ de quotidiana dicuntur, curationem cōponere oportet.

*Quartana exquisita dinotio.*

Cap. lxxxiij.

Quartana exquisita omnem ætatem inuadit, præcipuè tamen inclinātam. Hippocrates autem in libro de septicario, uigoris ætatem dixit. Idem asserere uidetur, eundem hominē non his quartanam febrem incidere. Verba eius sunt, Primum quidem quartana febre idem homo bis neque capitur, neque unquam captus est, neque de cætero corripitur, si semel sanus fiat, & hoc propterea: iuxta propriā uniuscuiusque hominis naturam, & ætatem uigoris contingit. Necessarium enim est uigentem hominis naturā in hoc tempore quartana febre corripī. Præterito autē uigore, exolutam esse & à quartana, & ab inuasionē. At uero naturæ corporum magis arabilariæ hanc febrem perferunt, & ex temporibus Autumnus, & præsertim ubi ipse seipso fuerit frigidior ac siccor, & inæqualis. Edulia item ac potiones, & totius uitæ uictus siccus & frigidus tempore existens, quartanarū febrium signū est. Et lienes autē. Hæc autem febris nō statim à prima die omnino irritat cum rigore: Sed aliquando ex alijs in hanc fit transmutatio, ex his quæ erroneæ ac inordinatæ uocantur. Verum in progressu rigor accedit, & cum augeſcente etiam rigor augeatur. Sensus autem ægrotis contingit, non uelut pungetur & stimuletur cutis, uelut in tertianis contingit, sed & perfrigerantur uehementer, & uelut franguntur usque ad ossa. Proinde audire est ægros dicentes, quod ossium lassitudine tenentur, & carnem cōstringi imaginantur. Pulsus porro sunt parui, obscuri, ac tardi & rari in principijs accessionum, uelut in nulla alia affectione. Etenim iuxta inuasionē quartanarū arteria tibi ligata esse uidebitur, & inuorsum retrahi, ac prohiberi à regressu. Quare etiam si iuuenis fuerit æger, tamen senilis extremæ ætatis mori arteria imitatur. Si enim ægrotantis naturalem pulsum noueris, aut in principio exacerbatiōis alterius morbi affueris, nihil aliud expectaueris quo minus pronūcies, irruentē à principio febrem quartanam esse, ad eō immēsa quendā mutatio pulsus ad raritatem ac

tarditate fit. Vrina uero his in principio quiddē albæ ac tenuēs & aquosæ, nimirum propter materiæ crassitudinē percolatæ. Progrediente uero morbo, pro ratione colorationis sūt, & subsidentia habet crassam. Sequitur autē sudorū copia circa exacerbationis declinationē. Ex Rufo. Quartanæ igitur à splene initium fontes, diuturniores sunt. Fiunt autē manifeste ex colore, & cruditatibus, & quod uenter non facile egerit, & ex splenis tumore, & quod ad sinistram magis se reclinet. Est autem periculū ne progressu temporis etiam in aquam inter eum incidant. At uero propter hepar inflammātū quartanarij, coloris sunt albicantēs, & toto corpore tumidi, & urinæ his sunt ualde rubræ, sandaracham referentes. Et ad contactū tumor dextri præcordij occurrit. Et hi etiā magis difficulter spirant quàm splenici, & subfusi sūt, & postremo in hydropem ineuitabilem delabuntur.

*Quartana curatio.*

Cap. lxxxiiii.

In principio igitur moderatē ac leniter tractādi qui ex quartana febris laborat, ita ut neque medicamentū aliud quod forte adhibeamus, neque euacuationē, nisi sanæ sanguinis ualde abundare uideatur. Tunc enim moderate sanguinē auferre oportet. Et si diducta uena sanguis fluens niger ac crassus fuerit, cōsidenter euacua: Talis autē in splenicis maxime reperitur. Vbi uero flauus ac tenuis apparuerit, statim cohibe. Secūda est autē uena, aut interna, aut media, in sinistro cubito, si splenicus fuerit homo: Aut in dextro, si circa hepar fuerit affectio. Diata uero sit flauis expers, & bona. Venter autem molliatur quantum eius fieri potest, per consuetos cibos. Si uero hi nihil profecerint, inuisus per dytenterum utendum est, primum quidem mollioribus, postea acribus. Prohibendæ sunt carnes porcinæ, & omnes uiscosæ ac tardi transiūs. Item frigida ac humida edulia omnia. Vino utendū est pauco, alio & tenui, ac moderatē calido, uolucris autē mōtanis. Et piscibus mollis carnis, ac facilibus cōcoctionis, & nihil uiscosum habentibus. Vtendū est etiam salamentis ac sinapi. Et per dies aliquot accipiendū est pharmacū ex tribus piperis generibus, & dioscolitacum appellatū. Et si piper solū tritum quodidē acciperint, recte utique fecerint. A frictionibus autem & deambulationibus & alijs consuetis, non penitus arceantur. A balneis uero abstineant, frictionibus contenti, quæ ualde profunt. Et si breuis fuerit ac nō ualde uolenta quartana, non malū fuerit in intermedijs diebus cōsuetā exercitia contingere. Atque hæc quiddē in principio ac augmento faciēda sunt. In uigore uero morbi tenuiore uictu utendum est, & iubendū sunt ægri diu quiescere, & uisceribus proficiendum est, adhibitis fomentis ac cataplasmatibus mollire ac laxare potētibz, & status dissoluere. Talia uero sunt, farina ordeacea, & semen lini, iris, cumini, chamæpitys, & ruta in aqua mulla cocta. Oleum quoque à fomento cataplasmati miscendū est. Oportet autem primum olei fotu per paucos dies irrigare, atque ita cataplasmatas uti, in die uidelicet adhibitis, si æger ferat. Epithematis autē utendū est polyarchio, & eo quod ex styrace paratur, & similibus. Cōsequenter autem etiā urinam citius utendū est. Et aqua mulla in potu exhibenda, in qua cocta est ruta & anethū. Quod si cōcoctionis morbi signa euidenter apparuerint, confidendum est statim pharmacis humores nigros euacuantibus, & nō semel, sed sæpius, si opus fuerit.

Conuenit



Conuenit autem Epithymū quartanis potum, & Verrarium nigrū maxime prodest, eo quod citra molestiam euacuat ea quæ molestant. Et uinū dulce in uacuum colocynthidis calicē infusum. Omnibus tamē miscendū est apium, aut anisum, aut dauci semen, ius candidatis gratia. Alsiduē etiam beatæ ac ostreorum decoctum bibant. Conueniunt his quoque aloëdaria Oribasij, quæ sic habent. Aloës drach. c. spicæ nardī, alari, mastiches, croci, xyloballami, singulorum drach. vi. calsiæ drach. xii. epithymi drach. xvi. ueratri nigri exempta medulla drach. viii. forma pilulas magnitudine erui cū pulegi decocto, & exhibe pro uiribus. Possunt & cū melle cocto pilulæ formari. Ego uero etiam uerarum internum adieci. Vendum est & uomitibus à dibo, & à raphanis, si nihil impedierit. Plerique enim ipsis alsiduē usi, partim perfectè à morbo liberati sunt, partim facile peruleserūt. Nam unā cū hoc quod euacuant ea quæ stomachum infestant, etiā facilius concoquant tales. ubi uero nihil tam prohibet, etiā album uerarum dandum est, primum quidem raphanis infixum uelut in Sermone de purgatorijs dictū est, postea uero etiā ipsum per se. Qui uero uomere non possunt, his uehementius infernè purgatis dandum est medicamentum ex uiperis, theriaca appellatur, & reliqua quæ ad tales febres laudantur. Inter quæ est & familiare illud nobis omnī probatissimum, quod recipit succi cyrenais, & piperis, & myrrhæ troglodyticæ, & soliorū rutæ uiridis, singulorum æquales partes. Singula scorim leuissimè teruntur, & rura cum melle trita excipiuntur, fituntur pilulæ, de quibus aliquibus obolus unus, alijis duo exhibentur. Aliud Asclepiadæ, hoc etiā somnū facit, quo etiam ipse uxor piperis longi, myrrhæ troglodyticæ, succi papaueris, castorij, singulorum pares portiones, efforma & utere, obolus unum aut dimidium exhibens cum aceto mulso, duabus horis ante accessione. Aliud ac quartanam, facit & ad arthriticos; hoc in quartanis dato prælotis duabus horis ante accessione, drachmæ unius pondere cum aceto mulso. Arthriticus uero cum aqua mulsa. Bituminis unc. i. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. solijs mentæ uiridibus leuissimè tritis drach. x. ac utere uelut prædictum est. Cæterū qui in principijs talium pharmacorū aliquid exhibuerunt, aut omnino ante uigorem, hi sæpe simpliciter quartanam duplicem fecerunt, aut omnino maiorē ac difficiliorem effecerunt. Aut duplicē antea triplicem reddiderunt, aut omnino duas difficiles ac maiores effecerunt. Noui ego quandam medicum qui ausus fuit è tribus quartanis correato dare theriacā ante morbi uigorem. Deinde autis omnibus accidentibus, quum febris continua successisset, hominē peremit. Archigenis. Quartana febre laborantibus, inquit Archigenes, trifoliū bitumen oleis seminis drac. i. in tribus aquæ mulsæ cythis exhibere soleo. Mirificè etiā ipsis prodest bitumen ipsum iudatum tritū potum cum uino diluto drachmæ pondere. Verum pharmacū minimè molestum, & sæpe successum sortitū expertus sum ego hoc, maxime in quibus splenes tument, & hydrops initium capit. Hederæ corymbiferæ folia quinq; cū myrrhæ troglodyticæ magnitudine sabæ trita, in aquæ mulsæ dulcoris hemina exhibentur. Sed & castorium potū rigores mitigat, & morbosam carnē coësumit, & concoctionibus in uenis opulatur, & se-

gniciem ad mortū eximit. Rusti. Absinthij cremor humores uentrē infestantes deterget, & concoctioni auxiliatur. Vnde neq; saluā colligunt qui absinthium bibunt. Mitigat etiā inflammationes hepatis ac splenis, & urinas impellit, & menses muliebres. Arsi æger aduersus fuerit, & habitus uentris euacuatione gaudet, & mordaces humores cedant, lac recens multum aluminū aut equinū, quibusdam dedi, quos magis purgare uolui. Alij uero caprinum, propter familiaritatem & parabilitatem. Exhibui autem ab initio heminas tres, & progressus sum usque ad sex. Deinde intermissi uno circuitu, similiter à tribus heminis incipi, & addita quotidie hemina, ad sex progressus sum, et postea detracta quotidie hemina una, rursus per duos circuitus quieui. Et simul morbus dissoluebatur, & corpus nutriebatur. Oportet autē animal boni succi esse, cuius lac exhibebimus. Si uero alicui nō accessit, neq; nidorosum sit, neq; per uentrem erumpit, etiā in suspecta die, sorbitionis loco moderatè dandū est, multo tempore ante accessione, & buccellæ panis modicæ superingeret. At uero morbo in uigore cōstituto, apparente manifestissima cōcoctione, nullo uiscere læso, aduersus tēpore sanitatis, etiā aquam frigidā exhibui duarum heminarū mensura, instante iā propē inuasiōe, & reuera à multis rigorē prohibui, non parū sæpe etiam febribus cōceptis. Melius est autē etiam forinsecus calefacere corpus cyprino aut sicyonio, ante exacerbationes quidem, ut ne rigeant; sedatis autē exacerbationibus, ut ne ab extrā allabentibus perfrigerentur. Dioscoridis porro dictū prodesse his qui quartana tenentur febre, hæc in potu accepta etiā ante accessione. Plantaginis radices iiii. siccæ tritæ in uino bibuntur. Verbenacæ rectę quartas à terra geniculus tritus cū uino potatur. In tertia uero tertius. Radicis tritæ libanotis drach. i. in uino exhibetur. Quod si oleo illeue ris totum corpus, extremitates autem ex ungento aliquo ad rigores destinatō inunxeris, & ægrotum quiescere siueris, non expierit uigorem.

Quotidianæ febris dinotio.

Cap. lxxxv.

Quotidiana febris in pituitosioribus naturis consistit, & tēpore hyemis, & in humidoribus ac frigidioribus cōstitutionibus. Et senes quoq; magis infestat & pueros, propter edacitatē, & præsertim eos qui in humidis ac frigidis regionibus degūt, & uitā ociosam agunt cum repletionē, atq; hoc magis ubi post cibos alsiduē balneis utantur, et adhuc multo magis ubi ipsi cibi natura sunt pituitosiores, & inordinatus est ipsorum usus. Hæc igitur febris neq; cum rigore irruit statim in prima die, sed tēporis progressu nō rigor, sed circumfrige factio ægrē cōcalefcens ipsis accedit. In pulsibus autē manifesta ordinis cōfusio, & inæqualitas adest, tēpore irruptionis exacerbationis præteritis, & uelocitas ac uehementia motus ipsis nō adest. Nō autē exurit febris hæc ægrotos, neq; dēsum respirationē facit, neq; crebras efflatiōes, neq; frigidæ expectantiam excitat. Sed hæc febres minimè siticulosæ sunt. Vomūt autē pituitosa. Et quæ per uentrē inferant ipsi euacuantur, frigidiora, pallidiora, crudiora, & aquosiora omnino sunt. Exudant autē nequaquā in primis diebus, neq; ad perfectā febris quietem deueniunt. Albus est ipsorum color. Urinæ albæ & tenues in primis diebus minguntur, postea uero crassæ ac cōturbatæ. Hic humor quotidie exacerbatur, desinit autem

autem in quiete febris non integram, uniuersum tempus faciens horarum plerūq; octo & decem. Quapropter etiam amphemeris febris Græcis uocatur, de ambabus enim participat, die ac nocte.

*Quotidianæ febris curatio.*

*Cap. LXXXVI.*

In quotidianæ febris curatione aceto multo uisum in primis diebus, & his quæ urinas probe impellere possunt. Et tota diætæ forma secūdi usum habeat. Circa uigorem uero uentri prospicere oportet, & præsertim ori ipsius. Et postea uomere à cibis & raphanibus & purgatorijs pituitam euacuantibus uti. Reliquam diætam ad communes scopos respectu factò compertis, ut scilicet attenuante diætâ, & pharmacis incisorijs ac attenuantibus utaris.

*De Epialis febribus.*

*Cap. LXXXVII.*

Prædicti generis, pituitosi inquam, est & febris quæ priuatim à leni afflictione Epitola appellatur, quum simul & febricitant & rigent, & utrunq; percipiunt eodem tempore in omni corporis parte. Pituita enim acida, & uitrea appellata, citra febrem quidem, rigorem inducit. Si uero putredo aliqua moderata ipsis accedat, febre epitola efficit. Si uero amplius putrescat, præcedit quidem rigor, sequitur autem febris, exuperata frigiditate à multitudine caloris, ut omnino non appareat iuxta augmenta & uigores exacerbationum. Fortassis autem & pituita uitrea acidam qualitatem habet. Curatio porro consimilis est his quæ quotidiana febre laborat, incisorio curationis modo amplius aucto.

*Communia auxilia febrium per circuitum respondentium. Dioscoridis. Cap. LXXXVIII.*

In communi ad omnem circuitum acrigores uiliter exhibentur ea quæ sudores mouere possunt, & sunt hæc. Seminis myrrinij drach. i. datur potida ex uino duabus horis ante accessione. Item aristolochiæ drac. i. & iris drach. ii. & calaminthes decoctū cum castorei drac. i. in quantis & quotidianis. Chamædyos item decoctū absiduè potari, quartanæ et quotidianæ soluere solet. Caroi quoq; semen, ferulæ semen, uerbasci radix, aut succus cū uino. Aliud, quod ad omnem circuitū, & maximè ad quartanas datur, duabus horis ante accessione. Facit & ad calculosos, ac dysentericos, & stomachicos. Est etiā anxiosus ac desperatus, & lippientibus cōmodum. Seminis hyoscyami albi, seminis apij, seminis anisi, styracis, singulorum drac. ii. croci drach. x. opij drac. ii. castorij drac. ii. myrrhæ drach. ii. cū aqua ad fabæ ægyptiæ magnitudinē formato, & cū duobus aquæ cyathis exhibeto. Aliud ad omnem circuitum. Aphrodæ. Seminis hyoscyami, myrrhæ troglodytiæ, opij, styracis, singulorum drach. i. croci, zingiberis, aloës, singulorum drac. x. & obolos ii. excipe melle, & exhibe nuda cis ponticæ magnitudine, cū aquæ cyathis iii. præ illis extremitatibus ac cruribus, & sine ut dormiant. Ego uero etiā castorij drach. i. adieci, & mirificè uisum suā declarauit. Vtere etiā confidenter antidoto pœonia, & ea quæ ex sulphure cōstāt. Miram enim efficaciam habent aduersus omnem circuitum, præsertim quartanas ac quotidianas febres. Cæterū quæ trita cum oleo illinuntur, profunt omnibus qui per circuitum exacerbantur cū rigore, sicut enim corpus, & sudores mouet. Sunt autem hæc. Chamæmeli flos eripis, & in pastillos efformatus, ac in umbra siccat; & usu expetente cū oleo tritus ac illitus. Semen

uicibus cum oleo, semē libanoidis, flos salis, nitrum, spuma nitri, bacca lauri, pyrethrum, smyrnii semen hypericum, calamintha, cächryon, castorium, conyzæ, costus, granum cnidium, cū nitro, oleo & aceto oleum amygdalinum, cyprinū, irinum, gleucium chamædryis, staphis agrestis. Asclepiadæ unguentum ad accessiones cum rigore. Hoc sæpe tertianas depulsi inquit: Spumæ nitri drach. ii. myrrhæ drach. ii. piperis grana xx. ceræ drac. i. olei cyprini, aut irini, aut gleucini, aut amygdalini sexuncem, liquefacta aridis ammiscantur. Vfus est hora ante accessione. Magis autem confricandi sunt pedes, unde horrores inidum sumere uidentur. Aliud ad tertianas. Grani cnidij, spumæ nitri, piperis, æquales portiones excipe irino, & ad strigimentum crassitudinem redige, & utere extremitates leniter confricans. Hoc medicamentum sudores cit, & per duos aut tres circuitus sanitatē reducit. Aliud, ad quartanas, tertianas, ac reliquos circuitus. Myrrhæ drachm. vii. casie drach. x. piperis drach. x. staphidis agrestis drach. iii. nitri drach. iii. ceræ sexuncem, Cyprini aut alcerius talis libr. i. Myrrham uino dilue, & staphidem & reliqua contunde accriba, & cum myrrhâ tere, ac cerato affuso excipe. Vfus autem tempore pharmacum cum pari cyprini portione illine.

*De ignis sacri circa uiscera affectionibus.*

*Cap. LXXXIX.*

Fiunt aliquando ignis sacri affectiones circa aliqua uiscera, febrem ardentē ac habitualē inducentes. Et si quidē circa uentrem fuerit ignis sacri, erysipelas Græcis appellatus, febrem ex his accensam lipyria nominant. Si uero circa hepatis uentrem febre fumosa. Si circa pulmonem, algidam. Talis autē febris frigefaciens tibus ac humectantibus opus habet edulsi ac potibus, & his quæ extrinsecus imponuntur. Quum igitur febris habitualis alitū morbum ammixtū non habet balneo indiget, quædammodum etiā alię omnes caliditates ac siccitates. Si uero affectio fuerit circa uiscera ignis sacri, à balneo quidē abstinere oportet in totum. frigida uero in uigore morbi utendū est contentiosa, sic autē appellare solemus, quum semel frigidissimam & multā damus. Ante uigorem autē frigida nō est danda, nisi ab ægroto cogamur, cui mos sit frigidam bibere, & qui sitim non ferat. At forinsecus imponenda sunt frigefaciencia, & si nihil profecerint, tunc etiam frigida potus exhibeatur, aut edulia potius frigefaciencia conueniunt autē maximè lactucæ humidæ ac dulces, pura frigida elotæ. Atq; sic quidē acceptæ optimæ sunt. Si uero opus fuerit aliquando ad præces ægrotū, in suauitate ipsarum mitigare, acetum multæ aquæ frigida ammixtū, ad indinātū cōcedemus. Sit autē acetū exactè separatū ab omni uino, sa qualitate. Forinsecus autē etiam ipse lactucæ succus aptus est. Imò etiā semperuiui, & intrybi, portulacæ, atriplicis, solanij ac plataginis, cū pane fisco trito, & modico bono rosaceo, & his quæ similiter resiccant. Optimū uero est id quo nos utimur, iuxta uiam acerbarū tempus. Expressum enim ipsarū liquorum in mortarium conijcimus cū portulacis uiridibus, tūdimus, & utriq; liquore in uas mitimus, osculumq; eius diligenter obturamus, atq; sic uas in aquam immittimus. Melius autē est etiā niue uas obruere. Vfus autē tempore potentiam tenuissimā amisco, & postea subigo, ut liquidius euadat medicamentum

amentum, idē duplicid linteolo insarctū præcordiis impono, non immorari sino, sed ubi tepidum factū fuerit tollo, ac alterū impono. Atq; hoc semper consequenter facio, donec eger sentiat profunditatē quædam modo perfrigeratam, & à sibi liberetur. Ammissemus autē aliquando etiā oleum omphacinum, aut rosaceū, ubi circa præcordia fuerit ignis facer, insulam matris naturam habēs. Vidi mulierem supinam decubentem in terra & uoce destitutā, habētemq; pulsum formicātem, unā cū manuum ac pedū perfrigeratione. Putabā autem calidā esse affectionem. Nam simul cū relatis pelsimis signis, densiorē uidebam respirationē factā. Hoc autem signū est magni doloris, ac calidi morbi in præcordiis ac thoracis partibus existentis. Dixit autē quidam ex astantibus se audisse mulierem dicere, quod arderet eius stomachus, & frigida potiois magnā cupiditatē haberet. Quapropter etiā in paulatino facit, inquit, uenans frigiditatem. Itaq; confusus dedi ipsi per cochleariū aquā frigidā, iterum atq; iterū immittens ipsam ori eius uiolenter. Videbā autem labia ipsius placide aquam intus attrahere. Et ratio dñatus ipsam expetere frigida potū, propter insitā uentris feruidā affectionē, rursum amplius exhibui. Post hoc autē oculis quoq; annuere incepit, indicans sic me facere debere. Accepta itaq; cōfectione ex papaueris capitibus cōfate, diacondion appellata, parū de ea cū uino cnidio & aqua frigida, per cochleariū ori insidi. Et ex hoc nimirum paulo post sensim loqui cepit. Quare rursum amplius de hac potione dedi, uino emmeleo pro cnidio accepto, cū modica aqua. Ori itē uentris semper uiuū & lactuam, cū pane trito & rosaceo imposui. Frigida autē hæc adhibui propter affectionis caliditatem, & tempus æstatis, donec frigiditatem abunde fendiret.

De colliquatione, Philagrii.

Cap. x c.

Colliquatio nominatur quā excernitur quid per uentrem, non ex comestis aut concoctis, sed ex humoribus ex toto corpore in ipsum cōsuentibus, quod simile quidē est bili quæ assidue per uomitū reijcitur, ac per uentrē secedit. Differt autē ab ipsa febris graueolentia, & quod egestio suluior apparet, & caliditū dinē habet frigiditatis, aliquando etiā oleosam, aut adiposam. Colliquatio autē appellatur hic morbus, quoniā recens cōpacta essentia pinguedinis ac carnis ab ardentissima febre dissoluitur ac colliquefcit. Et ubi iam diuturnū est malū, etiā ipsarū solidarū partium essentia ex parte eliquatur. Quapropter grauiissima omniū est hæc febris. satis autem clarū est quod extinctioris medelis utimur, ita ut ualde frigidam aquam potandā exhibeamus, & cataplasmata & episthemata frigescentia thoraci ac præcordiis imponamus. Et ibos humectates ac frigescentes demus. Dicitur etiā de his in tractatione de febribus ardentibus. Dicitur item consequenter in sequenti capite.

De febribus quæ in calidis ac siccis temperaturis sunt, circa inflammationem ac putrefactionem. Cap. x c i.

Quicūq; tēperatura biliosa, & habitū graciles & naturā aridi, & stomachū subtili sensu præditū habentes, & qui facile in bilē efferuescit: hi ubi famē aut uigilias pertulerunt, aut nimis delassati sunt, & præsertim in profectioe ac æstiuo sole, aut tristitia affecti sunt, aut grauius curis pressi, promptē ab horribis ac febribus corripitiur. Nā habitus in biliosis naturis, ob famē ac omnia relata, facile in bilē efferuescit. Et

primū quidē inæqualitatē peripiunt, postea etiā horrore. Et si quidē in motibus perseuerarint, aut cibum nō acceperint, statim febricitāt. Mordaces enim humores ac uapores per sensitiua corpora delati, horrores ac rigores generāt. Et propterea horrente ac de sata cute, uelut quæ ex natura in his aridior est, cohi-betur fuliginosa ac fumosa superfluitas, antea trāspirare solita, & sic febrē accendūt, nisi talis cibū accipiēdo uelut dixi præuerterit. Offendi autē tibi alia quos qui sic febricitarunt, & maximē qui ex longo morbo se recolligebāt. Quibus unī in foro obuati factus horrore incipiente, introducto ipsi in officinā quandā, panem ex uino diluto exhibui, & euestigio horrorem sedauī, & febrem prohibui. Alios uero in suas domos abire festinantes, in principio horroris, aut paulo post triuiui. Et in summa, quibus adhuc sunt principij exacerbationū epidemia in talibus tēperaturis, his omnibus panē ex uino diluto citō exhibui, & horrore statim sedauī, & febrem prohibui. Quanto enim citius ipsos nutries, tanto magis febrē impediēs. Si uero aliquando paulo tardius ipsos nutriui, febris quidem facta nō est. Calor autē modicus ipsis accedet, ut si diutius moreris nutrire, tali caliditate excalefecit, ambiguum ut sit an febrem appellare ipsam oporteat. Si uero duæ horæ post horrores inidum factæ fuerint, manente adhuc horrore etiā tunc nutrire oportet. Verū prædicere quod febricitantibus hi febre nō molesta, ad quā exudationes consequentur. Et hoc factū, & lauare oportet, & rursus nutrire. At postquā sedatus est horrore, incipitq; febris cū cōtractione, nō amplius nutriendi sunt illo tēpore. Declinat uero exacerbatio statim alatur, & ne expectetur donec febris integrē quiescat. Detur etiam potus aqua calida in uigore amplior. In omnibus enim squalētibus affectionibus nō cessant exacerbationes priusquam aut balneis, aut alimētis humectantibus reijcitur. Quodsi uero etiā declinatione incipiat: Alios autē uigore exacerbationis instante nutrio. Fames enim in his tēperaturis, maximē febricitantibus, nō simpliciter nodua est, sed si quid aliud perniciosa. Aut enim ex fame in arduentes febres incidunt, ex quibus si nō morte præcūti fuerint, in habituales delabuntur, & ex his rursus in tabē. Aut statim ab initio habitualis febris ipsis coincidit. Proinde à principio sic nutrire oportet eos qui talē tēperaturā habent. Quum uero aut ex lassitudinibus, aut ira, aut curis pluribus, aut uigiliā, aut tristitiā, aut ex omnibus simul cōmissis, corpore uehementer reficcato, febris inuaserit, qualidā quidē habens cutē, ardentem aut caliditatem, tamen profectū est talē hominem habituali febre corripiendū esse, & præsertim in æstate, & sicca ac calida cōstitutione. Opus igitur habent tales humectantibus ac frigescentibus eduljis ac potibus. Qui enim tēperatura calidi ac siccī sunt, hi etiā necessariō uires debiles habent. Non enim fieri potest, ut corpus calidum ac siccū, ubi febricitat uires ualidas habeat. Cōuenit igitur quā celerrimē per pisanæ succum, aut sorbitiones ex alica nutrire, & paululum panis insuper exhibere, atq; sic per frigida potum agrum curare. Extinguitur enim statim ac sedatur febris per se, si non inflammatio aliqua ipsi adest, neq; humorum putrefactio. Si tamen magnum detrimentum futurū cōsecutis, exhibitionem eius inhihe, & per ea quæ extrinsecus corpori adueniūt ac adhibentur,

curationem molire. Forinsecus autem adueniūt, aër nos ambiens, & quaecūq; humectare ac frigidificare solent medicamenta. Et ad hæc aquarum dulcīū balnea. Si itaq; ambiens nos aër temperatus fuerit, ut eadem est eo uelut habet, nihil amplius moliendo. Si uero aut multum calidus est aut frigidus, calido quidem uice uersa excogitanda sunt subterraneę domus, frigidaq; ac quę uentis perflantur ad septentrionem conuersę. Auras quoq; ipsis quasdam proprias excogitabimus. Aliquando ex Euripis in quos plures aquę salientes se præcipitant. Aliquando aqua frigida ex uasis in uasa transfluente. Hęc uero statim etiā somnum cōsiliant. Respergenda est etiam domus assidue frigida aqua pura. Et rosę multę; aut uitium pampini, aut myrtus per terram sternantur; aut alię quędā plantę frigidificantes. Arrenda est ab ingressu hominum copia. Nam & hoc domū calfacit. Si uero frigidissimus est aër, uelut in hyeme maxime, per tegumenta corpus fouetur. Frigus enim densat ac constringit cutem, & humorū qui intus aduritur defluxiones transpirare prohibet. Maiorem enim ex frigida inspiratione utilitatem fore nōscendum est, quā ea est quę ex cutis refrigeratione condingit. Similiter autem & in his quę forinsecus imponuntur, eligenda sunt frigidificantiā citra fortem adstrictionē, densationemq; ipsius cutis. Et nō solum quę frigidificiunt, sed etiam quę cōpage corporis fuerint pardum tenuium, quantū eius reperire est in frigidificantiis aut citra ammixtionem alterius uehementius qualitatibus. Est autem simplicissimum medicamentum ex humectantibus ac perfrigerantibus, quod & ad ignem sacrum utor, & ad pudēdorum inflammationes in principio. Ceram albilissimam in duplici uase liquato; & in aquam frigidā diffundito, ac manibus emollito diu eam eluens. Deinde similiter ipsam liquatam, in aliam aquam diffundito, & rursus tertio idem facito. Ad hanc autem ceram sic lotam, rosaceum ex optimo oleo omphacino preparatum adijcitur, ut sit quidem cerę unc. i. rosacei uero triens. Hęc similiter in duplici uase liquato, et ab igne ablata mo ueto, donec aliquantulum frigesiant. Postea in mortarium diffunde, & pistillo fortiter tere, aqua potabili ac frigidissima paulatim infillata quantam satis est. & tandem siccili puram aquam habente excipe, & aquam quotidie permuta. Hoc pharmacum tenui lineo inductum impone, non super totum pedus, uelut quidam faciunt, neque super tota præcordia, sed illo maxime loco in quo multę caliditatis sensus percipitur. Permutetur autem pharmacum semper priusquam manifeste calefactum. Aliud episthema opifimum. Rumicis acuti succus polenta tenui ammixta, duplicato lineo detrito excipiat, & frigidus imponatur. Facit & portulacę succus, & semperuiui, cum uis acerbę succo & polenta. Item tribuli uiridis succus, & polygoni, ac seridis, & lactuę cum polenta. Sed & ipsa horū folia trita imponitur. Bonum pharmacum etiam hoc est: Palmularum pinguium carnem exemptis membranis, cum posca meratore ad flacciditatem usq; coctam, & cū tenuissima polenta tritam impone. Si uero aridus hoc uidebitur, ex prædicto cerato parum, aut rosacę optimi minimum quiddam ammisce. Bonum etiā pharmacum est rosarum succus cum tenui polenta. Et ipsę rosę trita; impositæ. Et hæc quidē assumimus mul-

tum frigidificare uolentes. Si uero moderate hoc facere uoluierimus, non modica est copia emplastrorum leniter perfrigerare potentium. Ego enim noui, impositum aliquando frigido medicamento præcordijs, hominem euestigio difficulter spirasse: alium autem statim uisuiisse. Et paulo post amborum accedens quicūq; frigido pharmaco sublato. Balnea porro dulcium ac calidarum aquarum, aut potius temperatarum, utilissima sunt omnibus siccam ac calidam temperaturam habētibus. Lauandi autem sunt quę admodum hectici, in secunda balnei domo, corpore ex aqua & oleo calido perfuso, & ipsis statim in temperatę aquę solum locatis. Deinde etiā in frigidatōlium. In frigida tamen moram diutius trahere nō oportet. Si uero inflammatio alicuius uisceris accedat, balneum reculare oportet. Illud tamē nōsse expedit, quod si quando inflammatio principalis partibus in calibus febribus ac corporibus coinciderit, omnino morientur. Et præsertim si pulmonis, aut mēbranę costas luccingentis, aut uentris, aut hepatis inflammatio fuerit. Nam quācumq; inflammationes harum partū attingit, minime nutrire oportet. Quārum uero ad uirium debilitatem, sæpe nutrire oportet. Quare necessarium est ut aut dum non nutritur, uires exoluamur; aut dum nutritur, inflammationes augamus.

De febribus hecticis ac tabidis. Cap. xxi. Hęcica, hoc est, habitualis nominatur febris, quā ad tantā immodestiam uenerit caliditas præter naturā, ut in habitu sit ipse solidas essentia similis corporis cordis. Et propterea ægre solubile habet structuram. Primum igitur calor præternaturalis eliquat, & resiccat, ac cōsumit essentiam in partibus uelut ex humore, concretā, qualis est pinguedo & caro: Deinde uero propriam humiditatem cōsumit, et quā corpora nutriuntur: Quę sane circūfusa est ac instar roris dispersa, circa omnes animalis partes. Hinc autē transit ad carnosum genus, quod fibris & membranis paribus solidorum corporum insitū est, quod sanē discindentes coqui tollunt, fibras uero abijciunt. Exactum autem eius complementū in hoc est, si ipsa solida, similium partium essentia scior facta est, quando & iabida febris uocatur. Duplex est autem genus hecticarū febriū. Quędam enim ex ipsis post febres ardentes plerūq; fiunt, aut usq; adeo in longum extendas, ut teporis progressu humorē corporis cordis cōsumperint. Aut manente adhuc humiditate scietes, & cordis corpus occupātes, hinc incēduntur; quemadmodū lucernarū flamma ex funiculo, si perstite adhuc in lucernis oleo. Et hæc quidē una est ipsarū generatio: Altera uero quā ab initio statim iruerint, primā generationē diatrijs similē facientes, ob tristitiam, & iram, & lassitudinē ampliorem simul cū ardore factam. Has igitur non difficile est curare. Eas uero quę in tabem procedūt, sanare impossibile est. Naura enim ipsarum calida est & sicca, simile quiddam patiente corde, quale quid patitur funiculus in lucernis, ubi plurimū fuerit exustus. Qui enim exustus est comminuitur, ut neq; si largum oleū affuderis, luculentam flammam excitare possis. Proinde parua hæc & infirma flamma circūcirca tremitt, semper amplius minor euadens, donec fuerit extincta. Facilis autem cognitu est hæc febris. Priusquam enim cōrigeris pulsus ac caliditatem, oculos immo-

dice cauos uidebis, uelut in foueis quibuscumq; siccis, & gramas in ipsis reperies siccas, & squalidam quandam affectionem, qualis his fieri solet qui per totum diem in sole aestiuo multum puluerem percitant. Perit autem & ipsorum coloris uitalis flos. Et cutis circa frontem sicca est ac circumsensa. Et plerumq; palpebris nistant, uelut somno grauati. Est autem haec affectio non somnus, sed impotentia uigilandi. Et tēpora sunt collapsa, ut loci caui appareant. Et quid aliud quam ossa & cutis sunt in totum; super etiam si de nudatum consideraueris uentrem, neque aliquid intestinum, neque uiscus aliquid saluum esse putes, & praecordia uehementer retracta esse ad thoracem; & cutem totam siccam ac obaridam; & si distenderis digitis apprehensam, uelut corium quoddam producit. Febris itaque exacte tabida incurabilis est uelut dixi. Tabesit enim in ipsis totum corpus, instar arboris extremē arefactae, aut ob flammā uicinatam, aut ob uehementem ac immo dicam siccitatem. Atq; haec est quam senectam ex morbo uocant. Tale enim corpus sic in his qui secundum naturam ad extremā senectam perueniūt citra febrem, paulatim extincto in ipsis insito calore. Verum eorum qui secundum naturam conseruerunt, mors sine molestia cōtingit, ob frigiditatem ac siccitatem imminens. Tabida uero febris non solum sicca, sed calida affectio est. Haec igitur uelut dixi incurabilis est. Illud porro omnibus febris hēctica communis est, ut debiles sint & æquales semper, à prima die usq; ad extremam respirant. Maximum autem & minimum ambigui naturae ipsius signum habebis, si cibum homini praebueris. Alimento enim accepto accenditur calor, & pulsus augeatur ad magnitudinem ac uelocitatem. Et quod in ipsis contingit simile est ei quod accidit in calce ac lapidibus calefactis. Si enim frigidissimam aquam ipsis affuderis, multo calidiores apparent, uaporosa in ipsis caliditate, ab humida essentia irrigata. Donec igitur aliquid humiditatis essentiae seruetur hēctica solum febris est. Quomodo uero in periculo uenerit, ut non amplius superest aliquid humiditatis, exacta iam rabes, Marasmus Graecis dictus, consistit. Nos autem eorum solum curationem aggredimur, quae sanari possunt.

*Hēcticarum febrium curatione.* Cap. xxiij.

Hēcticas febres omni modo statim refrigeramus, priusquam progressae in tabem desinant. Caput autem curationis ipsarum in humiditandibus ac frigefaciētib; consistit, tum his quae foris adhibentur, tum quae intra corpus accipiuntur. In quibus est & aer qui inspiratur. Omnes igitur hēcticos, etiam si iam principium tabescentis acceperit, absque hoc ut alia febris ipsi sit implicata, aut propter humorū purgationem, aut cum principalis partis inflammatione, considenter lauato, citra omnem tamē laborem, ut ne uires exoluantur. Deseratur itaq; æger in lecto ad balneum. Praeparata autem ipsi sindone calida, in ipsa ad primam balnei domum gesserit. Sine autem quatuor qui sindonem teneant, in singulis angulis unus deinde in prima domo nudatus, ad secundam portetur. In qua toto corpore ex oleo tepido dulcissimo perfusus, ad tertiam domum feratur, & in solium locetur. Sit autem aer balnei temperatus, & humidus praeparetur, parietibus aqua calida respersis. In ipsa uero solij aqua temperata abunde quiescat, moderatē

in sindone uestus, nulla corporis perfusione siente, neque item capitis perfusione. Hinc autem extractus à quatuor adolēscentibus sindonem gestantibus, in frigidam aquam conferim; mergatur, ne minimum quidem morae in ipsa trahens. Statim autem alius paratam habens sindonem aliam, ipsi inijciat, & alius aliam simili modo, demissus autem in lectum, mollibus linteis lenissimē detergatur. Postea uero unctus & uestibus contentus ad domum in lecto reseat. Sit autem & domus balneo uicta. Eos quidem igitur qui iam tabescunt, lauare oportet uelut dictū est. Qui uero in hēctica febris sunt, nondum tabescentes, hi etiam citra sindonē lauari possunt. Deserendū tamen & hi sunt ad domū suae in lecto, siue in uehiculo quopiam, aut lectica; Deinde eleum ipsis insundendum, uelut dictum est. Et postea ad calidā aquam ducantur, ut in illa immorentur. Deinde ad frigidam prodeant, ut nullam omnino moram in ipsa trahant. Atque ita deersit ad inunctū ad domum reducantur. De balneis igitur satis dictum est. Consequens est ut de alimentorum uiribus addamus. Quod quidē igitur frigidus & humidus conuenit ei cibos hēctica febris profuturos, omnibus manifestū est. Tales autem sunt, prisanæ succus frigidus acceptus, & alica uelut prisanā praeparata, conuenit etiā panis aqua frigida madefactus. Verum nullius horum frigiditas sincera sit, uelut potus. Nam quae bibuntur, & cito calefunt, & meatus penetrant. Quae uero eduntur aut sorbentur, diutius in uentre perseverantia, perfrigerant ipsum, si immodicē fuerint frigida. At ubi iam diuturna est febris, lac asinium dandum est, diligentiam ad uersionē habita, ne in uentre in casum coaguletur. Hoc uero aliquando etiam ipse æger nos docebit, ut qui suae naturae habet experimentum. Quādoque autē nos ipsos depræhendere oportebit paulatim ad eius usum progrediendo. Fugienda est autem quārum eius fieri potest, mellis mixtura in omnibus hēctica febris. Dandum uero est primum lac asinae in cubiculū adductae, quo calidū adhuc lac potetur. Si quidē igitur probe fuerit concoctū, & non corruptum, copia eius augeri potest, ut in exhibitione cyathus dimidius addatur. Reliqua uero diata facienda est, uelut in siccis uentris intemperaturis, uelut in proprio loco dicitur. Quāto autem hēcticarum febris caliditas maior illis est, tantō frigidioribus auxilijs opus habet, & diligentia ampliore, ut ne damnum aliquod cōsequatur, ex fordiorum auxiliorum usu.

*De popularibus passim uagantibus, ac pestilētib; morbis.* Cap. xxiiii.

Populares & cōmunes morbos uocant eos qui simul multis hominibus coincidunt: quorū uelut generatio, ita & causa cōmunis est. Communia itaq; edulia praua, morbos cōmunes pariunt. Item uitio se aquae potus, & aeris immodicia, & labores conuulsi reliqui. Fames, & repletio, praeterit ubi post magnam indigentiam, abundantia succedit. Sed & regionis natura sepe communes morbos inuexit, aere quem inspiramus à putredinosa euaporatione inquinato. Causa uero talis putredinosa euaporatio, aut moruorum multitudo est, uelut in bellis contingere solet. Aut paludes quaedam, aut stagna, aut barathra alia quod profundum in propinquum, uenulosam ac prauam exhalationē remittunt. Haec igitur assidue contingere solent, sed & ambiens nos aer, temperamēta assidue



assidue peruerit, dū aut immodice calidior, aut sic-  
dior, aut frigidior, aut humidior euadit. Nam reli-  
quis causis non omnes simul obnoxij sumus, neque  
per totū diem occurramus. Aër autem nos ambiens  
forissecus omnibus circūfusus est, & per inspiratio-  
nē trahitur. Necesse igitur est ut ad mutationes eius,  
iuxta temperamētū ipsius coassiciantur etiā ani-  
malium corpora. Aliquando uero ambiens nos aër  
humidior ac calidior factus, pestilētē constitutiōē  
inducit. Et quia sunt in corpore humores ex uitio-  
uictu ad putrefactionē idonei, principij sit pestilētis  
febris. Quare si quis moderatis laboribus, & uictu  
modesto ac castigato utatur, in totū illisus manet per  
omnes eiusmodi affectiones. Et nos sanē hoc prae-  
sentes, statim incipiente tali constitutiōe, quaecūq;  
corpora humida uidemus, omni modo siccare cona-  
mur. In his autē quae natura sicciora sunt, pristinam  
naturam conferuamus. Quae uero superfluitatibus  
redūdant, purgationibus sanamus. Obturationes au-  
tem meatuū apertius ac extergemus. Et in summa  
sanitate corporibus custodiuius, contraria adhi-  
bentes. Et quādoq; refrigerationibus usi sumus, si ita  
opus esset: quādoq; uero calfactorijs. Sed & rogo  
ingenti extructo & intenso, aërem ad caliditatem ac  
siccitatem transmutare quis potest, humidum & fri-  
gidum factum, quemadmodum Hippocrate Ache-  
nis fecisse dicunt. Itemq; Acronem Agrigentum.

De peste. Ruffi.

Cap. xcvi.

Omnia horridissima in peste fieri possunt, & nihil oc-  
culetur, uelut in singulis morbis. Plurima enim &  
uaria sunt, dysuria uaria, bilis uomitus, praecordio-  
rum distentiones, dolores, sudores multi, extremita-  
tum frigiditas, profluvia biliosa, tenuia, flauofo, urinae;  
alii aquosae ac tenues, alij biliosae, alij nigrae,  
malas subsidentias habentes, & pessima ea quae in me-  
dio uasis dependent. Sanguinis narium destillationes,  
æstus in thorace, linguae torrefactio, uigiliae, conuul-  
siones uolūtæ. Sed & ulcera praua & carbunculosa  
& perniciofa, in peste fieri possunt, & in reliquo cor-  
pore, & in facie, ac tonillis. Si uero solerti ingenio  
quis praedixis sit, futuram pestem praenoscet, atten-  
dens anni temporibus, quae & mala sunt, & in bruta  
animantia imperum faciunt. Si enim ambiens nos  
aër, pestis causa fuerit, uoluerum generis prior inter-  
itus erit. Si uero ex prauis de terra exhalationibus  
hoc contigerit, quadrupedum animantium prior  
corruptio fiet. Quum autem haec tecum expendes-  
ris, amplius etiā illud cogita. Quale est praesens an-  
ni tempus, qualis totus annus, hinc enim comperies  
quomodo uictus rationem optime constituas. Ver-  
bi causa: Debebat esse, si recte res fieret, tempus siccū,  
nunc uero humidum factum est. At si quidem humi-  
dum factum est, necesse est etiā uictum resicantem  
constituere, quo excedens humiditas cōsumatur. Res-  
picienda sunt etiā studia hominum, an non ad sa-  
nitatem conducant, & ea prohibere. Ventris quoq;  
cura habenda est. Si uero superior uenter pituitum  
habuerit, uomitu euacuetur. Quibus autem sanguis  
abundat, his uena secetur. Bona est & per urinas pur-  
gatio, & quaecūque alia. Si uero æstuosus fuerit  
aeger, & flamma usque ad pectus ascenderit, non fue-  
rit alienum refrigerantia pectori adhibere, & frigi-  
da potum dare, non plaustrum exhibendo, uinctur  
enim ab ampliori in uentre caliditate, & plus nocet,

ac amplius exurit. Sed & multa & acuatim frigi-  
da danda est, ut copia eius flama extinguatur. Si ue-  
ro ardor occuparit interiores partes, extremitates au-  
tem & superficiei frigidae fuerint, & praecordia dis-  
tendantur, & uenter colliquamenta partim sursum,  
partim deorsum mittit, uigiliaeque affuerint ac dely-  
rium, & linguae asperitates, his calfactoria fomenta  
adhibere oportet, ut calor ad superficiē corporis tra-  
hatur, & quibuscūq; id fieri potest modis conandū  
est, ut calor ex profundo ad externa educatur.

De his qui ob crudorum humorum multitudinem,  
animo linguuntur.

Cap. xcvi.

Quidam febricitare incipiunt, ex magna crudorum hu-  
morum copia collecta, unā cum hoc quod os uetris  
male affectum est, aut ex cruditatibus, aut aliis. His  
inflata sunt praecordia, & totū corpus maiorem na-  
turali mole habet. Et color alij quidē albidior & a-  
quosior sit naturali. Alij autem nigrior ac liuidior  
euadit, quos plūbicolores aliqui appellant. Pulsus ue-  
ro omnij minores sunt, quā pro caliditate ratio-  
ne, obscurioresq; ac omnino inaequales. Si quidem  
igitur hi humores copia sua vires grauauerint, & cras-  
situdine ac multitudine meatus animalis obturauerint,  
multis de causis perniciofa est affectio, & animi deli-  
quium inducens, cum quod animal nō nutritur, cum  
quod suffocatur: & quod tēperamenti symmetria al-  
teratur ac corrūpitur. Etiam crudi humores nutri-  
re nō possunt prius quā cōcoquantur. Multi uero  
grauant aut obturāt transpirationes, & calorē extin-  
guunt. Si uero neq; obturauerint, neq; grauauerint, hi a-  
nimi deliquia quas syncopas uocant, nō inducūt, sed  
omnino animo exoluūtur tales, si nō frequentius a-  
lantur. Danda est autē eis copia, nō pro una uice, ne-  
que cibi crassi aut uisibus frigidi, sed ex genere at-  
tenuantium & calefacientium. Sic etiā medicamenta  
ipsis danda sunt, quae homo febricitans accipere po-  
test, attenuantia ac calefacientia. His cōmodum est  
uinctū aquosum album ac tenue, nisi ualde febricitā-  
rint, quod tamen non adeo contingit in relata affec-  
tione. Debiles enim sunt his febres, & adhuc magis  
si fuerint senes. Vinum autem dandum est ipsis ad sin-  
gulos cibos, & potius ad uesperam & noctem, non  
mane & usque ad meridiem. Iuuenibus uero nō sta-  
tim ab initio uinum deur. Nulli porro talium sa-  
guinis ablatis citra maximum detrimentum fieri so-  
let, etiam si euacuatione indigent. Imò neque uenae  
sectionem, neq; purgationem ferunt, qui haec etiā  
citā hęc derepente animo concidunt. Quomodo igitur  
hos sanare oportet, qui egent quidem euacuatio-  
ne, euacuanda uero non ferunt, nullum equidem in-  
ueni in his euacuationis modum praeter restrictio-  
nem. Incipere uero statim ab initio morbi conuenit,  
primum à cruribus superne deorsum per linea mo-  
deratē aspera. Deinde etiam tota manus confricren-  
tur, superne deorsum. Postquam autem artus satis ca-  
lidi apparerēt, & timor fuerit lassitudinis sensum ipsis  
accessurum ob multitudinem frictiois, oleo laxan-  
te utendum est, quale est quod dulcissimum est. Abs-  
stinendum autē ab omphacino, & omnibus adstrin-  
gentibus. hyemis autem tempore etiā discussorio  
utendū est, quale est oleum sicyoniū, & chamae-  
linum, aut aliud simile, uelut anethinum. Postea ue-  
ro oleum detergeatur, & progressus ad totam spinā  
fiat, & hęc similiter fricetur, primū per linea, deinde



oleo. Postea rursus ad cura progressus fiat, & rursus ad manus, deinde rursus ad spinam, ita ut per totam diē hoc agamus in domo lucem habere puram, & minime humecta. Sit autem & caliditate moderata domus. Commodissima est his aqua mulla, in qua coctum est hyssopum. Verum neq; cibi, neq; sorbitio, neq; aqua ipsis danda est, neq; permitteudū ut large bibant, sed aqua mulla sola utantur per primos tres dies, ita ut per successionē fricemus, & illud solum tempus remittamus, in quo somnus ipsos occupat. Ad hunc autem conducit maxime amplior frictio. Sed neq; amplior somnus talibus commodus est, neq; enim humores discuti permittit, & viscera grauat. Vt siq; igitur moderatis natura opus habet, somno & uigilijs. Si quidem igitur pulsus ipsis ualde paruus & fortiter inæqualis est, extremum periculum imminet, & facere oportet quæ dicta sunt, nihil aliud curiosius conando. Si uero firmitatē & magnitudinem moderatam habuerit, & non fractus neq; molis fuerit ac equalis, uentrem considera, & dysterem adhibe confidenter, si non probe egestionem faciat. Contingit enim ex aquæ mullæ potu, ut probe euacuetur omnis superfluitas, quæ in primis uenis congregari solet, iuxta simas hepatis partes & mesenterium. Si uero superfluitatū impetus amplius quam oportet in uentrem fiat, primum amplius ipsam decoquito. Talis enim minus alimul subit. Si uero etiā postea superfluitas humorum amplius feratur, neq; sic sistere oportet, sed pro aqua mulla pisanæ succū dare. Si uero ferri adhuc perleueret, sorbitionem ex alica dato, pulsus nimirum in hoc sequens. Aliquando enim derепente mutantur ad debilitatem, aut inæqualitatem, aut paruitatem, quo tempore conuenit exhibere panē ex uino diluto, neq; uentre uidelicet, neq; hepate inflammato. Nam si inflammationē fuerint hæ partes, corpore crudis humoribus repleto, desperatus est æger pulsibus ita mutatis. In talibus igitur ægrotis si mortem prædixeris, & nullum strenuum auxilium adhibueris, te ipsum inculpātū seruabis. In quibus autē spes est salutis (est autem in omnibus citra inflammationē ita ægrotantibus) quum à principio susceperimus ipsos, turpissimum mihi uidetur ut animo concidat æger. Si uero perceptor aliquando crassos esse humores, semper acetum mullum dabis pro aqua mulla. Et si quidem æstas fuerit, & æger frigida potor, huic frigidū acetum mullum dabis. Hyeme uero omnibus calidū. Aduersissima sunt his balnea, & ær nos ambiens multū calidus aut frigidus factus. Quare neq; lauare cōuenit, & redinare tempore æstatis in domo frigida, hyeme uero calida. Leguntur enim ualde ex uroq; excessu. Nā in balneis, & æstate, & omni caliditatis incremento, crudi humores diffunduntur, & per totū corpus diffluunt, ut periculum sit etiā ad pulmonem & cor peruenturos esse, & quandoq; etiā ad cerebrū recursum esse. Mesenterium igitur est circa hepar & uenas ipsos permanere. At uero in domibus immodicē frigidis, & hyeme, & omnino in frigido ambiente, humores crudi incocti permānēt, & oburationes hepatis augent & exacerbant, si parua fuerint. Si uero nō fuerint, generantur propter crassiciē detenti ac impacti. A cataplasmatibus autem & persufusionibus abstinere oportet, donec multitudine paritū euacuetur, paritū concoquatur. Qui enim hæc in talibus affectionibus adhibent, ipsi

inflammationes per ea quæ faciunt efficiunt, non animaduertentes præcordia lædi. Hæc igitur facienda sunt à prima die, ubi ipse inceperis curationem. Si uero ubi iam animo concidit uocatus fueris, præcoris dijs non inflammatis, dabis ipsis panem non multū uino fuluo madefactum. Et si quidem fuerit æstas, aut regio natura calida, aut cōstitutio calida, cū aqua frigida. Sin contra, cum calida uinum dabis. Postquā autem sedatum fuerit eiusmodi animi conditi accedens, experiendum est ut calidæ potum exhibeas. Nam ad totam curationem melior est calida, crudorum humorum concoctionem adiuuans. Statim uero & in his ad frictionem deuenies, eo quo dictum est modo.

De his qui animo concidunt, ob flauā bilem os uentris ledentem. Cap. xcviij.

In quibus ob flauam bilem os uentris ledentem animi deliquium contingit, his exhibendus est frigidus potus, sit tamen hic uinum calidum natura, fuluum, tenuē, & uetus.

De his qui ob tenuēs humores animo concidunt. Cap. xcviij.

Qui ob tenuēs ualde humores animo concidunt, ut citissime tum per sudores, tum per obscuram transpirationem exoluantur, contrario modo curentur his qui ob crudos humores animo linquuntur. Nos enim paulatim euacuamus, eō quod uires acuatam euacuationem nō ferant. Qui uero ob tenuēs humores animo concidunt, paulatim assidue nutrimus. Si uero à principio hos exceperimus, uiribus adhuc robustis, non paulatim alimus. Possunt enim hi amplius alimentum semel exhibitum superare. Quem admodum autem diximus priores perniciose affectos esse, ubi uiscus quoddam inflammationum fuerit; Eodem modo etiam hos incurabiliter habere putandum est, si aliquod uiscus fuerit inflammationum, uiribus iam languentibus. Neq; enim possibile est ipsos assidue nutrire, sed in declinationibus solum. Neq; si non nutrierimus possibile est ipsos seruare. In talibus affectionibus letalis cōstitutio elerrime sit in facie; Nasus acutus, oculi caui, tempora collapsa, & quæ deinceps recensentur. Et siue amplius excreuerint, siue uigilauerint, aut tristitia affecti fuerint, si non citius alantur, statim talem faciem habent. Si igitur proper uigilias, aut tristitiam, aut ampliorē excretionem, tale factum fuerit, parum mali esse puta. Si uero citra hæc, perniciosum. Atq; hoc magis, si statim à morbi initio sic habuerint. Non enim dubitant ad ipsius concoctionem. Nutrire igitur ipsos tunc necessarium est, & eum ipsorum densare, & ærem domus frigidum præparare, uelut dictum est de his qui ex sicca intemperie febricitant. Vnguenti quoque sunt adstringentibus ungentis, & cibi exhibendi non ualde promptè defluentes. Et neque aqua mulla, neque pisanæ succus eis exhibendus est, sed panes, & sorbitiones ex alica, & fructus austeri, ac ægrè corruptiles, tum per se ipsi, tum cum pane & alica ex aqua cocta. Dentur etiam ipsi ouorum fortibulum uittelli soli, & gallorum testes, & cerebella suilla probe allata, aut bene cocta. Nam crudiora extreme lædunt. Et in summa, omnia facienda quod crassior materia fiat, & cutis densetur, & transpirationes impediuntur. Prodest his uinum aquosum ab initio post cibos acceptum,

De alijs animi deliquij causis.

Cap. xci.

Sunt & aliæ quatuor causæ, ob quas homines animo concidunt. Dolor uehementis, uigilia, euacuatio immodica, & in delyranibus ipse motus. His quintam si libet adde, principiorum intemperiem. Celerrima igitur perniciës instat corde affecto, consequenter aut tem cerebro.

De dolore animi deliquium inducente. Cap. c.

Dolor est repentina temperamenti mutatio, & futura continuitatis solutio. Non enim quæ paulatim fit alterationis, animal dolore afficere potest. Apparet enim corpora non solum dum acueratim ad non naturalem habitum ducuntur, molestiam habere mutationem, sed etiam dum ad naturalem habitum reducuntur, nisi paulatim id contingat, dolore affici. Proinde eos qui in uehementissimo frigore iter fecerunt, ac uadim calefactos dolore affici scimus circa unguum radices adeo ut ferre non possint. Querimus igitur quomodo ægrotantes dolent, nullo forinsecus accedente ipsis dolorem inducente. Necessarium est in corpore talem quandam causam querere, quæ calfaciens uehementer, aut perfrigerans, aut essentiam aliquam sensitiui corporis diuidens, angorem nobis inducat. Et primum sanè considerabimus cuius nature esse oportet id quod corporum diuisionē facere poterit. Necessarium igitur est aut rupturam, aut contusionem, aut erosionem esse affectionem, in qua continuitas diuiditur. At ruptura fit ex tensione, contusio ex grauitate, erosio ex mordaci qualitate. Quum igitur foris nihil fuerit quod dolorem inducat, aut tendens, aut grauans, aut mordens, sed ex seipso aliquid horum patitur corpus, omnibus nimirum manifestum est, quod ab aliquo intrinsecus fit. Attensio quidē ab essentia distendēte corpus ipsum continens fieri potest, aut ab immodica siccitate. Contusio uero ab aliquo tumore duro adiacente. Morfus autem ab acri humore. Considerandum igitur est in doloribus, an sit humor multus, aut flatus transitum non habēs, uelut in colicis. Aut grauis moles, uelut in inflammationibus & tumoribus induratis. Aut humor mordax, aut affectio siccā, uelut in conuulsis. Aut frigiditas uehementis, Aut caliditas. Et horum singulorum correctio ritē faciēda est. Stupidus itaq; dolor ex frigida fit affectione. Pulsariū autem dolor proprius est magnę inflammationi. Si uero uelut ab aculeo infixio, aut uelut à cerebro perforati quibus sibi uideatur, crasi intestini, quod colum nominamus, hæc doloris species existit. At uero in re nibus cum grauitate quadam dolor est in uno loco firmatus, circum lumbum dextrū aut sinistrum, retrorsum magis. In colo uero dolor ex loco ad locū transit. Pungitiū autem dolor circa membranas consistit. Qui uero profliens dolor appellatur, contingit in uehementibus hemicranijs, dimidia capitis parte affecta. Cognoscitur ex hoc, quod uelut à radice quadam, à primario affecta parte dolor initium sumens, celerrimē ad adiacētes utrinq; partes fertur. Quapropter ad ambas extremitates contingentibus distentionibus, etiam nerui ad utranq; partem distenduntur. Minimē ad latitudinem distentos dolores nerui ipsi habent. At uero membrana subter omnem cutem distenta, tensiuos & stupidos dolores inducit. Quæ uero inter carnem sunt membranæ, dolores uelut diuellentēs faciunt. Sunt enim multæ, &

inæqualiter instat, & forinsecus ipsam carnem ambiens. Cæterū circūctarum ossibus membranarū dolores profundi sunt. Et ipsorum ossium doliū imaginatio inducunt. Quum igitur nulla externa causa doloris appareat, prægressā causam & diætā cōsidera. Si enim fuerit præter cōsuetudinē ociosior, aut cibis pluribus homo usus est, aut multū nutritibus: Aut cōsuetā excretio suppressa est. Si quicquā horū, aut omnia apparuerint, multitudine est doloris causa. Et propterea quā celerrimē homo euacuetur. Sic enim cū omni securitate tibi licebit his quæ fluxiones repellunt uel in partibus dolore affectis. Si quidē igitur multitudo fuerit quæ distendit, uiribus fortibus existētibus, uena secetur, & ex magna uena inflammatae aut dolenti parti propinqua sanguis auferatur. Si uero debiles fuerint uires, reuulso fiat & deriuatio sursum, aut deorsum, aut urinique, aut per frictions. Vitisos autē humoribus solis infestantibus, purgatio fiat. Ambobus autem cōcurrentibus, utrisq; euacuationibus utendū est, primum uenæ sectione, postea purgatiōe. Si uero his factis dolor remanet, manifestum sanè est circa partē affectā im pactum esse id quod molestat. Manifesta est etiā curatio, per discussoria siens medicamenta. Eodem uero modo etiā propter spiritum flatuosum, aut pituitam uiscosam fiēte dolore, uelut in colicis per fomenta & irrigationes medemur. Si uero tumor grauis aut contundens, dolorem effecerit, tumor ipse curandus est per attenuantia ac rarefacientia. At si ob mordacem humorem dolor fiat, aduersissima his sunt attenuanda ac calefacientia, anethum autem uiride in oleo coctum, dolorem eximit, & somnum inducit, si affecta pars oleo calido irrigetur.

De animi deliquio proprie dicto. Cap. ci.

Hæc uero de animi deliquio dictum est, quod syncopē Græci uocant, hoc est, animi concissionem. Tale uero quiddā est & quod proprie animi deliquiū, hoc est, lipothymia uocatur, itemq; exolutio. Et nomē quidem animi deliquiū unū est: Causæ uero ipsius plures, & curationes iuxta singulas species. In tantū autem de ipsis nūc dicemus, in quantū quis his satis cognitis, resistere possit exacerbationibus derepēte incidentibus. Differt autē animi deliquium à syncopa, quod animi deliquiū derepēte incidit, sensu & motu hominē priuans, & omnino non sudant: Syncope uero, & uigilantes, & dormientes inuadit, & omnino cum sudoribus qui syncopici appellari solent.

De his qui ob uentris profluium, aut sanguinis eruptionem, aut immodici sudoris euacuationem animo linquuntur. Cap. cii.

Qui ex bilis supernæ ac infernæ excretionē, & alui fluxionibus, & alijs immodicis euacuationibus animo linquuntur, his aqua aspergenda est, & nasus apprehendendus, & os uentris confricandū, & digitis aut penni immisissis landinandum, & ad uomium cogendum. Manus & crura pluribus & uehementioribus uinculis deligētur: manus in euacuationibus infernæ sentibus: crura uero in supernæ sētib. Au xiliatur etiam in talibus euacuationibus uinū aquosum uetus frigida diluunt. Balnea uero fluxionibus in uētre commoda sunt, uerum his qui ob sanguinis eruptionem, aut sudorem immodicorū euacuationem animo linquuntur, aduersissima sunt. Ad frictionem enim hi indigent & frigiditate, non laxatione.

done. Vinum uero frigida dilutum uelut dictū est, etiam his commodum est. Neq; uero extremitates ligare conuenit, neq; uomere, neque omnino moueri. Sed densari his conuenit ac frigeri. Quapropter aërem domus frigidum paramus, frigidos uentorum flatus inducentes, & pauimenta adstringente qualitate sternerentes, uelut myrto, rosis, pampinis uitis.

De his qui ob humorum copiam, animo linquuntur. Cap. ciii.

Qui ob humorum copiam animo linquuntur, plurimum fricentur & calefiant, & manuum iuncturae ac malleoli ipsi deligentur. A cibo uero & uino, ac balneis omnino arcantur, si febricitant. In potu autem detur acetum multum.

De his qui ob quandam uteri affectionem animo linquuntur. Cap. ciuii.

Similiter etiam hae quae ab utero affecto exoluantur ex aceto multo curandae sunt. Et crura fricanda ac liganda, maxime his quae ab utero strangulantur, & in quibus retractus aut loco motus est uterus. Cucurbitas quoq; inguinibus & femoribus affigimus, Et naribus quide odoramenta graeulenta adhibebimus. Vtero uero beneolentia, & laxare ac calefacere potentia medicamentā ad mouebimus. At uero his quae ob immodicam mēsum euacuationem animo linquuntur, manus magis deligabimus, & fricabimus, & cucurbitam pectori affigimus.

Ad eos qui ob stomachi debilitatē, animo linquuntur. Cap. cv.

Ad eos qui ob stomachi debilitatem animo linquuntur, cataplasma utemur ad stomachum roborantibus, ex palmulis, uino, polēia, croco, aloē, mastiche. Et irrigationibus ex absinthio, & oleo melino & mastichino ac nardino, & uino. Et si stomachus exuratur, ammiscenda sunt etiam frigiditatis, uelut est ramentorum cucurbitae succus, aut lactuca, aut portulacae, aut solani, aut iuteybi, aut rumicis acuti, aut uuae acerbae. Hic autem non solum frigiditatis, sed etiam adstringit. Prodest etiam generose ipsis extremarum partium frictio. Si uero ex horum usu melius habuerint, eos quidem qui stomacho exurunt statim ad balneum ducere oportet. His autem qui quandā frigiditatis sensum habent, parum dandum est de medicamento ex tribus piperis generibus constante. Aut ipsum piper album.

De his qui ob uitiosos humores, os uentris rodent, animo linquuntur. Cap. cvi.

Quicumq; uitiosis humoribus os uentris mordentibus exoluantur, his aqua calida data uomere iubeto. Si uero aegre uomant, stomacho & pedes ac manus prius foueantur. Deinde digitis aut penitis immisis uomant. Si uero uomitus non contingat, uentris excitationem adiuuare oportet glandulis subditis. Si uero ex his melius habuerint, comam absinthii in aqua multa coctam, bibendam dato, & omnibus modis stomachum corroborato, tum per ea quae foris imponuntur, tum per ea quae intra corpus sumuntur. Non tamen a principio hoc facere conuenit, neq; absinthium praebere. Sed posterioris post uitiosorum humorum euacuationē, ubi iam pura facta fuerit aluus.

De his qui ob pituitā in stomacho collectā animo linquuntur. Cap. cxi.

Si pituita multa & frigida in stomacho collecta, exo-

lutiones fieri contingit, stomachū oleo calido in quo absinthium coctū est, plurimum rigabimus. Deinde aquam multam dabimus, in qua hyssopus aut simile quid commaduit. Item acetum multum & piper, & pharmacum ex tribus piperis generibus constans, & id quod diopsitidū appellatur. Et tota rationis uictus summa ad incisorū ductū sit destinata.

De animi deliquio ob sortem frigiditatem. Cap. cxviii.

Exolutiones ob sortes frigiditates, similiter ut bulimo, hoc est magna fame ex frigore oborta, correpti curantur, ita ut omni modo ipsos calefaciamus. Vinū igitur dandum est ipsi calida dilutum, & cibi calefacientes. Fricandi sunt etiam ac fouendi iuxta ignem.

De animi deliquio, ob multam caliditatem. Cap. cxix.

Qui ob multam caliditatem animo linquuntur, aut in aëre suffocante uersati sunt, aut in balneo diutius moram traxerunt, eos roborare oportet confectim quidem frigida aqua aspersa, & uentilatione facta, & aëro ad uentum conuerso. Fricandum est etiam ac lancinandum os uentris. Et consequenter uinum & cibi dandi.

De animi deliquio, ob inflammationem, aut malignam febrem. Cap. cx.

Qui ob inflammationem magnitudinem, aut uehementis febris malignitatem, animo linquuntur in ipsis accessionibus, & artus perfrigeratos habent, eos fortiter fricare oportet ac fouere, & crura ac manus ipsorum deligare, & iubere ut uigilent, & ab omni cibo ac potu abstineant. Optimum est autem in his praenolle quod futurum est, & ipsum ante exacerbationem lenire ac mitigare.

De animi deliquio ob siccitatem. Cap. cxii.

Sed & eos qui ob siccitatem animo linquuntur in exacerbationum principiis, optimum est praenoscere. Si enim duabus aut tribus horis ante accessionem nauitrueris, & manus ac pedes ligari iusseris, non interibunt. Oportet autem cibos esse concoctos faciles & stomacho commodos. Si uero etiam uehemens periculum fore suspicaberis, panem ex uino dabis, aut alicam coctam uino infuso exhibebis. Si uero modicum syncopam fore speras, uinum ne dederis, sed mala punica, aut alia poma, & adstringentes fructus cibis ammisceris. At post exacerbationem non est necessarium fructibus uti. His uero qui derepente in periculum incidunt, uinum calidum dandum est, & panis, & alica omnino modica. Si enim aut amplius dabis, aut cibos concoctioni resistentes, hi qui sic affecti sunt iusto cabuntur.

De animi deliquio ob principalis membri obturationem. Cap. cxii.

Qui ob principalis partis obturationem animo linquuntur, his acetum multum dandum est, & potiones ex hyssopo, origano, pulegio & melle, & cibi incisiua ut praediti. Crassi enim & uiscosi magno his detrimento sunt. Quare ab ipsis abstinentum est. Fricandi sunt artus & ligandi, & potionibus urinae cientibus utendum, ex apio, perosellino, dauco, & similibus. Vbi uero manifesta consequitur utilitas, etiam uino aquoso ueteri utendum est.

De animi deliquio ob repentinam euacuationem. Cap. cxiii.

Si ob repentinam & acuatam factam abscessus rupturam

pturam, aut sectionem, aut euacuationem, uelut in hydropicis, animi deliquium contingerit, statim quidam odoramenta reuocentur, postea uero sorbitio- nibus probe concoctilibus nutriantur.

De animi deliquio propter affectus. Cap. cxiii.  
Si propter tristitiam, aut gaudium, aut timorem, aut iram, aut terrorem, exolutio fiat, per odoramenta, & narium ex oris apprehensiones reuocatos, ad uo- mitu cogito. De cardiacis & bulimo dicitur suo loco in stomachi affectionum tractatu.

De capitis dolore in febribus. Cap. cxv.  
In his quibus in febribus caput dolet, uitanda est mul- ta lux: Lædit enim uisum, & membranas ad motum ducit. Utendum est autē frictione pedum, & extre- mitatum deligatione, ac constrictione. Vitanda est etiam caliditas à carbonibus, aut lucernis, aut sole & fumo. Item inuicundi & humiditate refert odores. Et clamores, & iræ, & frequens potus, ac collutio oris. Nā aut statim ab ore, aut humecto stomacho, uaporum multitudo ad caput deferitur, quod aliàs tam ignitum est. Maxime uero irrigationibus la- gioribus utendum est, ex oleo opihacino, aut opti- mo rosaceo, lanæ manipulo excepto, & digitis ex- alto expresso, & instar salientis aër istu quodam delabente. Quòd si non resistat aër ambiens, frigida sit irrigatio, aut per se, aut ex nostro studio. Aucto autem dolore, etiam in aurem rosaceum fundatur. Si uero tempus permittat, & dolor cū ardore quo- dam innitatur, ocymi succus aut polygoni, aut men- tæ, ex tertia aut quarta parte rosaceo ammiscetur. Et tunc etiam parum aceti ipsi diligenter ammiscetur, maxime in quo acetum fuerit coctum. Perseue- rante uero dolore, ad uenæ sectionem deueniendum est, si nihil aliud fuerit quod prohibeat. Odoramen- ta quoque non incommode assumuntur, myrtus, ro- sa, pulegium. Cataplasmata uero conueniunt in sin- cipite ac fronte, polygonum trium cum flore polen- tæ, & folijs seridis ac plantaginis. Si uero dolor ue- hementer incumbat, hyoscyami folia uirida aut pa- paueris cum micis panis. Præstant autem amygda- læ amaræ madefactæ ac decorticatæ, & cum micis impostæ temporibus ac fricti. Optima uero est aloë fronti illita cum aceto. Aut crocomagma. Et intesti- na terræ trita illinuntur, & celerrimè mirificè opitu- rantur. Vtēr porro in ipsis facile solubilis præpare- tur. Considerandum tamen ne stomachus uehemen- ter infestatus, caput ad consensum perducatur. Et conan- dum ut quæ molesta sunt per uomitus euacuentur.

De uigilijs in febribus. Galeni. Cap. cxvi.  
Si uigilie nimium infestauerint, manus & crura deli- gari iubebimus, eò tempore quo ad somnum con- uerti solent, & hortamur ut assidue aperiant ac clau- dant palpebras, donec satis fatigati fuerint. Deinde repente soluimus ligamenta, & tollimus lucernam, & multam quietem esse iubemus. Ex Herodoto & Philumeno. Pultuaribus uigilantium subdantur capita papaueris, aut radices papaueris nigri, aut mala mandragoræ, aut hyoscyamus. Odoramentis autem utendum est, papauere uiridi, & lactucis, quæ meconitis appellantur, & menta, & coriandro ac rosis. Nos autem minus horrenda faciei prolutio- nem uitimur, incoctis in aqua calicibus papaueris ni- gri, & meliloto. Aut calamintha, aut pulegio, & melius facit. Odoramentum uero optimum hoc est.

Papaueris albi calicum tostorū, corticis radicis man- dragoræ, æquales portiones terito, & uino ac pauco rosaceo subactas olfaciendas exhibeto. Suffumigium autem somnifico utendum est tali. Styrcis, amomi, ammoniaci thymiamatis, bdellij scythici, corticis ra- dicis mandragoræ, opij, singulorum æquas partes præparato & suffito in lignis cupressinis. Mirificè facit etiam berenices suffumigium, similiter suffitū: Ducit enim ad somnum. Descriptum autem habe- tur in tractatu de theriacis, Sermone inquam deci- mo tertio. Vngento uero somnifero utere hoc. Sty- racis sextantem, rosarum siccarum unc. i. feminis hyoscyami nigri unc. i. baccarum myrti nigrarum unc. i. olei rosacei lib. i. Vini ueteris odorati quan- tum satis est. Contusa & cribrata terito cum uino, & adijcto oleum, & unitis uitior, illitis ex eo naribus intrinsecus ac extrinsecus, & fronte. Imponendum est etiam fronti serpillum cum meliloto in passo co- ctum. Item semen ocymi, & atracydis semen, hy- oscyami semen & folia, similiter & solani halicacæ bi, itidem faciunt. Illine etiam frontem ex cyphi cum uino, & crocomagmate. Si uero perseverarit uigi- liarum symptoma, frontem & tempora aliquo pa- stillo dolore eximentia illine. Et si nihil profice- rit, prædicare ei difficultate, ad dolorem eximentia, in potu exhibenda procede. Est autem minus mo- lestum, & sapore iucundius omnibus pharmacis fo- mnicis, id quod ex calicum papaueris decocto ac melle componitur. Cuius compositionem paulo post in hoc Sermone referemus. Vt ere & catapla- smate optimè ex palmulis maceratis aut coctis in ui- no, & cum polenta tritis, adiecto modico rosaceo, aut melino. Pectori enim impositum quodamodo præparat ad somnum.

De graui sopore. Herodoti. Cap. cxvii.  
Perfectam curationem eorum qui in grauem soporem delapsi sunt, in sequenti Sermone de capitis affectio- nibus trademus, in quo etiam de phrenitie docebi- mus. Nunc autem dicere necessarium est quomodo quis urgentibus symptomatibus resistere possit. Pro- inde spongia posca imbuta, non ualde frigida, fa- ciem detergere oportet, & extremitates fortiter de- ligare. Odoramenta uero adhibeantur insidioria uim habentia & excitatoria, & maxime casiorum. Et in exacerbationum remissionibus cucurbitæ dorso ac spinæ efficaciter assigantur. Perseuerante uero morbo, etiam sternutatoria in exacerbationum rem- issione adhibeantur. Cauendum autem est à lacer- narium usu. Caput enim inde repletur. Sit autem et ciborum materia insidioria uel prædita. Habent autem uim excitandi etiam in ipsis, ea quæ sequenti Sermo- ne ad lethargicos describuntur, tum per se, tum cum aceto naribus admoda.

Quomodo lingue asperitas in febribus curan- da sit. Cap. cxviii.  
Lingua in febribus aliquando siccatur, & opus habet humectatione. Aliquando uero exasperatur magis aut minus, & diffringitur, aut nigrescit, aut carbo- nis speciem induit: quod à uiscerum inflammatione contingere solet. Si uero ipsa quidem lingua, ue- lut dictum est, affecta fuerit, præcordia uero mollia reperiuntur, periculosum signum est. Humectare au- tem ipsam oportet, feminis lini decocto in ore dente- ro. Efficacius id erit, si myxæ cum semine lini fuerint

coctæ. Sed & digito in hoc succo madesfacto linguâ contricabimus, simul detrahentes etiam fordes dentibus adhærentes. Deinde colluant os aqua pura, aut spongia pura detergeant. Deinde rosaceo diligenter illinantur. Sed & ipsum rosaceum melli ammixtum egregie efficax est. Et portulacæ succi in ore detentus, locos humectat. Et rhus cularius aquæ, aut aquæ mulsæ ammixtus. Et prunorum damascenorum aut myxarum ossa in ore detenta midgant. Sæpe etiam lactucæ caulem ad oliuæ magnitudinem defectum, aut de symphyti radice, in ore tenendum dedimus, & quod oportuit fecit. Sint autem cibi mordacitatis exortes, & omnino non adsurgentes, leuesq; ac forbiles. Si uero etiam præcordia inflammata fuerint, horum curationem facere oportet. Principium enim & finis interaneorum lingua est. Si uero diutius durarit linguæ asperitas, adipem anserinum si affuerit, sin minus, gallinaceum, aut qui adhuc præstantior est phasianicum duplici uasculo liquoato, & digito in ipso intincto, linguam abunde fricatio. Si uero adhuc perseuerarit asperitas, butyro recentius similiter utere, facit optimè, sed in principio eo uti non conuenit.

*Quomodo sitis curanda sit. Philumeni. Cap. cxi.*  
Sitis duplex est, altera ob humiditatis inopiam; altera ob caliditatis redundandiam. In febrilibus itaque ambæ affligunt. Nam caliditas in his multa est, & siccitas succedit, multa humiditate per uolentiam febribus consumpta. Si quidem igitur sine detrimento bibere possent quando uellent, hanc sanè sitis medellam suam amplectereretur. Quandoquidem uero & mensuram & tempora potus decernere oportet, leuimenta quedam sitis excogitanda sunt. Nam in tempestiue sumptus potus, non solum sitim non extinguit, sed etiam uice versa augeat. In principijs enim acerbationum omnes materiæ febres accendentes, ad profundum declinant, & propterea sitim intendunt. Daus autem in illo tempore potus à materiæ multitudine superatur, & simul uiciatus accessio fit mali. Quare in principijs & augmentis potus exhibitionem prohibere oportet. In uigoribus autem, primum per gargarismos, & per collusiones oris, squallorem corporis mitigare oportet. Deinde declinatione incipiente potum dare. In remissione uero etiam nolentes aliquando cogantur potum assumere, ut ne humore indigat ex acerbationis accessione delati resiccentur ac exsurgent. Mitigare autem aliquo modo sitim oportet olei frigidissimi irrigatione, aut rosacæ instar salientis delabentis. Sed & auxilia ad febres ardentes relata, & ea quæ ad linguæ asperitatem dicta sunt in ore retinenda, sitim mitigant. Omnibus autem præstat lactucæ semine commansum, & radix dulcis appellata, & cucumeris semen. Oportet autem post horum commanducationem collusionibus ac gargarismis uti. Sint autem & cibi omnes humectantes. Cataportio sitim extimens. Ex Dioscoride. Seminis cucumeris drach. viii. tragacanthæ drac. iiii. tragacantham tulsam ac cribratam ouorum crudorum recentium candido dilue, & ex contritis simul cataportia efforma, eaq; in umbra sicca, & unum sub lingua tenendum præbe, ita ut dissolutus liquor absorbeat. Dato etiam cremore malorum cydoniorum absorbedum, aut pirorum, aut omphacij succum, aut hydrorofatum, aut mel rosas

ceum cum aqua calida. At uero in sanis, sitis ob siccitatem facit medella est somnus. Concoquit enim humores. Sitis autem ob caliditatem, medella sunt uigilie. Caliditas enim in uigilijs circa superficiem expanditur. Sitis uero ob caliditatem edulorum facit, aut ob multum uini potum, medella est frigiditas potus.

*De aurium dolore in febribus. Philumeni. Cap. cxx.*

Aurium dolor in febribus fit, & aut ipse febrem auspicatur, aut succedit, & periculosiores febres efficit. Succedit dolori atque inflammationi etiam uigilie. Si uero perseuerarit, etiam mentis emotiones. Hippocrates autem letales fieri dicit in his dolores. Siquid moderatus est dolor, & in principio, rosaceum tepidum auribus instilletur. Aut candidum & aquosum oui, cum lacte mulsebræ, forinsecus autem hapso lanæ oleo imbuto, in quo anethum coctum est, aures obtinentur & integantur. Caput item rosaceo irrigetur, aut oleo omphacino. Si uero dolor amplius intendatur, & uenæ sectio assumatur, & alius irriteretur. Postea quoque forinsecus per ambitum aurium cataplasma ex pane, aut semine lini imponatur, hyofciami aut papaueris uiridibus folijs simul contritis. Butyrum autem per oleo in cataplasma misceatur. At in dolorum exacerbationibus, fouendi sunt loci spongijs aqua & oleo calido imbutis, donec dolor sistatur. Vehementer enim hæc midgant, & rursus prædictum emplastrum imponatur. In stillandum est etiam auribus oleum amygdalinum, aut rosaceum, in calice papaueris ad calidum cinerem a lesatum. Aut inestina terræ in rosaceo cocta instilla. Aut ascellos sub hydris stabulantes, aut araneos.

*Auris suppurate curatio. Cap. cxxi.*

Suppurata inflammatione & eruptione per meatum facta, ubi lana specillo obuoluta pus eduxerimus, primum aqua mulsa eluimus; deinde uino mulso; Postea aceto mulso; deinde modica nitri spuma aceto mulso ammixta. In meatum uero indemus nostrum medicamentum lana exceptum, quod egregie facit. Est autem alumen, liquidum, mel, & rosaceum, æquis portionibus singula modice cocta. Optimè facit & Mulsæ pastillus optima sapa & modico aceto dilutus. Cæterum de sonitu & audiendi difficultate, inter communia auxilia dicitur. Nolle tamen oportet pessimum signum esse in acutis febribus auditus difficultatem. Nam aut lethargum, aut mentis apprehensionem, aut parotidas perniciosas, aut aliud quoddam periculum minatur. Raro autem permanet audiendi difficultas in aliquo qui morbum superauit, sed simul cum morbo intercidit. Et enim aliquando per circuitum repetit in exacerbationibus augescens. In remissionibus uero simul discedens. Quo contingente auditorum meatum exaccare non oportet; sed solum caput irrigare cum his quæ in febribus ad capitis dolorem conueniunt.

*De lippitudine in febribus. Cap. cxxii.*

Silippitudo in febribus fiat, abstinere oportet ab omni medicatione. Infundendum est autem oui tenuæ & candidum cum lacte. Et foris illinendū glaucium, aut Nili collyrium ex rosas, aut aliud quoddam ex croco, ex his quæ fluxiones repellunt quæ refrigeratione. Si uero dolor uehementer uexet, somnificum fiat per spongas, & hapsum lanæ ouo imbutus pro more

more imponatur. Si uero augeatur dolor, etiam panis imponatur, in calicem papaueris ac meliodi decocto madefactus, cui oui assati utello, aut etiam cocti, addito modico rosaceo. Aut psyllium feruenti aqua madefactum imponito. Suppurata inflammatione collyrijs dolore eximendis utendum est.

*De oculorū obscuratōne. Philumeni. Cap. cxxiiii.*  
Fieri solet circa morborum solutiones, aut etiam ubi vires recolligunt acri, circa utrunque oculum aut circa alterum obscuratio, ut uix uidere possint, uelut per caliginem quandam, & ut aliquando quædam ante oculos uideantur pilis similia. At dum oculi considerantur, puri apparent. Rarissime uero in talibus circumstantijs, circulus pupillæ aut minor aut amplior reperitur. Ipsum porro obscuracionis oculorum accidens, ut plurimum seminis in somno effusione prægressa, iuxta morbi solutionem, aut resolutionem euestigio incidit. Et est signum debilitatis spiritus uisui ac nervosæ partis. Itaque in perfecta corporis conualescentia, etiam usus actio integrè restituitur. Quapropter à localibus auxilijs abstinere oportet, & neque fomenta, neque illitiones adhibere. Verum resectorij totius corporis ductus usu, hoc ipsum accidens corrigere.

*Fluxus sanguinis narium in febribus curatio. Cap. cxxv.*

Fluxum sanguinis è naribus in quarta die in febribus scientem, pessimum signum Hippocrates dicit. Multitudinem enim significat in toto corpore, aut in capite. Destillat enim sanguis aut ob compressionem, aut ob densacionem meatuum. At uero uberior potest ei, multitudinem & laxare, & minuire potest. Paulatim igitur euacuationem facere oportet inde, unde natura impetum habet. Hac ratione facta, ausus fui in destillationibus in quarta die scitibus, per graminis cauliculum, uelut mors est, uas narium laudare. Non autem oportet modico fluxu contentum esse, sed pro uiribus detrahare. Sufficiente autem facta euacuatione, consueto more eundem suppressere.

*Vesicæ & urinæ difficultatis curatio in febribus. Philumeni. Cap. cxxv.*

In principio pessimarum febrium etiam hoc accidit, ut uesica doleat, & paulatim ac cum dolore urinam emittat. Et hoc non solum molestum est, sed etiam signum quod tota pars nervosa doleat. Est enim totum corpus crudioribus humoribus refertum. Confluit autem ex ipso acruata multitudo in uesicam, quæ amplius distenta ad actiones suas inefficax fit, & periculum suppressæ urinæ inducit. Proinde imo uentri, pectini, ac inguinibus, lana pura oleo dulci calida aut scyonio imbuta imponatur. Præstat autè rutam, & anethum, & apij semen in oleo cocta esse. Aut cuminum tritum lanæ inspergere. Si uero dolor augeatur, etiam cataplasmata post irrigationes adhibeantur. Et in intestinum rectum oleum & butyrum cum foenigræci decocto infundantur. In mulieribus uero & in utero, & in intestinum rectum. Si uero inflammatio urgat, & rubor cum magna caliditate in summo uentre appareat, etià uenæ sectio adsumatur. Dieria autem sit tenuis & exquisita. Vtanturque pitana, aut alica lota ex aqua mulsa, aut ouis forbilibus. Post hæc etiam mica panis probe lotæ exhibeantur. Deinde malua friabilis assumatur, & pora-

rum capitulum pluribus aquis costum. Et pisces terrerim. Infessio quoque apparetur usque ad umbilicum & totos lumbos, ex artemisia, foeni Græci, pulegij decocto, & oleo ammixto. Progressu uero temporis, castorium lanæ inspergatur. Cæterum potus ita affectis commodissimus est, post augmentum quietum, cucumeris satui semen, quod præacratum decorcitur, & tritum datur cochlear, mensura cum aceto cyathis tribus. Et moueri quidem urinam citra molestiam. Dolores autem euestigio soluit. Reliquis autem urinæ cistibus, quam diu febres perseuerarint, in totum abstinentum est, ut ne urinæ copia ad uesicam delata, ipsam distendat, & malum augeat.

*Lumborum doloris curatio. Cap. cxxvi.*

Lumborum dolores fiunt plerumque in febribus prauis statim ab initio, & permanentes maximas uexationes inducunt, & repente dissipati, periculoso fore morbum indicant. Circa primos igitur dies irrigatione ex uino & oleo utendum est. Deinde spuma nitri, & uinum dulce mari mixtum, & oleum, simul unita & lana fordida excepta, locis adhibeantur. Tales autem irrigationes uehementiam quidem doloris mitigant, dolorem autem non omnino tollunt. Progressu uero temporis uenæ sectione utendum est. Deinde cucurbitæ loco adhibendæ. Postea cataplasma parabimus ex semine lini & foeno Græco, & hoc in sacculum coiectum lumbis supponemus, ut super ipso decubitus fiat. Deinde irrigatio ex oleo rutaceo fiat. Et cerata ex cyprino facta adhibeantur. Venter autem à principio facile solubilis per cibos paretur. Vehementer autem prodest ipsi dyster, ex decocto cutumæ ris syluestris & melle solo infectus. Euacuat enim pituita & citissime allevat, nisi uehemens fuerit febris.

*Vlceratione cirea os sacrum in febribus curatio. Philumeni. Cap. cxxvii.*

In diuturnis & alijs habitum eliquantibus febribus, consumpta carne, super nudis ossibus decubitus fit, & eminentes maxime ipsorum partes, dolorosas & ægrè curabiles ulcerationes habent, eo quod per stratum trahantur. Non solum autem ob curationis difficultatem graues sunt ulcerationes: dilatantur enim & profundæ fiunt, & crassa labia habet, proferuntque & usque ad nuditatem procedunt: sed etià notatæ sunt à ueteribus, uelut hæc affectio perniciose portendat. Quapropter antequam immedicabilis fiat, curacionem eius aggredi oportet. Primum itaque ubi locus rubicundus & dolorosus fieri incipit, circulum laneum iuste magnitudinis loco subdemus, quo affecta pars per uacuum firmata, à compressione liberetur, & decubitus minime ærumnolosus fiat. Postea uero ceratum ex rosaceo aut myrteo oleo paratum, quod recipit spumam argenti, cerussam, ordeum tritum imponemus, subiecto uidelicet ex lana circulo. Idem faciunt etiam omnia sedis cerata. Et adhuc magis id quod residet in greis uasis in quibus aqua coquitur, quod uelut testa adheret fundis ipsorum, si cerato rosaceo ammiscetur. Reperitur autem etiam copia in æneis balnearum uasis. Item ceratum ex melle, quod quatuor hæc æqualiter recipit, spumam argenti, oleum, ceram, mel. Diluitur autem rosaceo, & mirifice facit. Adhibeatur etiam fomentum per spongas. Si uero inflammatio fiat, panis cataplasma locis imponatur, cum solano, aut polygono, aut plantagine, aut brasiæ folijs. Si uero



uero pascendo proferpat, ulceratio, lenticula cocta cum malicorio imponatur. Utendum est & medicamentis ad nomas paratis, cum rosaceo dilutis. Item emplastro uiridi Epigonij. Et pastillo qui Corax appellatur, & Andronis aut Musæ pastillo cum sapa. Contra autem & repressa nomia mitoribus communibus auxilijs utendum est.

*Ulcerationis circa scrotum et anum, in febribus curatio. Philumeni. Cap. cxxviii.*

Sæpe in ægotantibus exulcerantur partes hæ, quandoq; ob solam negligentiam. Aliquando uero etiam a prauis & acerbis humoribus, & malignis febribus. Itaq; reperire est ita affectos etiam mente læsos, & non percipientes dolorem, neq; animaduertentes seruere, nisi is qui curam ipsorum gerit ex odore cognoscat. Primum itaque per spongiam fouendus est locus ex aqua leniter calida. Deinde illinendus myrteo aut rosaceo oleo. Et postea scrotum myrto sica leuissimè trita conspergatur. Deinde ex candido oui, cum cerussa & modico rosaceo aut myrteo illinatur, ut ne exarescat. Si uero illitionum inquinamenta non ferant, ceratum molle præparetur ex rosaceo, quod cerusam & argenti spumam habeat, & utriusq; ouorum costos. Cõuenit etiam ceratum butyrum, & quod ex anseris aut gallinaceo adipe paratur. Et emplastrum siue ceratum ex ordeo. Et omnia ad sedem parari solita. Si uero nome succedat, utendum est curatione in ossis sacri ulceratione relata. Cibi uero exhibeantur ipsis dulciores, pro facta de febribus consecratione. Ventris quoque cura habeatur maximè locis circa sedem alleuatis.

*Pustularum in febribus curatio. Herodoti. Cap. cxxix.*  
In febribus istis aliquid sunt pustulæ circa labia & nasum, iuxta febrium solutionem. Verum in principijs febrium non simpliciorum, sed à prauis humoribus ortarum circa totum corpus exoriuntur uibices similes culicum morbis. In malignis autem & pestilentibus febribus exulcerantur, & quedam ad carbunculorum speciem accedunt. Omnes autem multitudinis corrupti & habitum erodentis humoris signa sunt. Quæ uero in facie oriuntur, omnium malignissimæ sunt. Deteriores autem sunt plures quàm pauciores, & maiores quàm minores, & quæ citò delentur quàm quæ multo tempore durat. Deteriores item seruantes quàm quæ pruritus inducunt. Et quæ quidem succedunt aliu suppressa, aut moderatas egressionem faciente, bonæ sunt. Quæ uero fluente aliu & uomitibus uexantibus sunt, malæ. Si uero succedentes aliu resiccent, bonæ. Sequuntur ad pustulas, febrium malignitas, & plerumq; etiam animi deliquia. Eas igitur quæ circa febrium simpliciorum solutiones sūt circa labia & nasum, rosaceo illinere oportet per se, aut cum cerussa & spuma argenti. Cõfert etiam pastillus ex croco, myrrha, & alumine, quæ iridem uocant. Et niger pastillus, qui recipit crocum magmaticum, balaustrum, atramenti sutorij, myrrhæ, & aloës, singulorum partes æquales. Teruntur hæc cum uino uel collyrium, & in pastillos efformantur, & usus tempore cum aqua aut lacte illinuntur, aut cum uino, ubi adfrictionem augere uoluerimus. Agglutinantur autem hæc post illitionem, aut sine hac, pellicula palmulæ ossi adherente, aut membrana oui. At uero pustulæ uibices referentes current uenesectione in principio, si nihil impederit. Solent enim

reuerse intra corpus periculum asferre, si nō per uocatus, aut per aliu acrimonia secedat. Quapropter etiam alius per pituitiam succū, & oua, & oleum chamemelinum molliatur. Detineant autem uespri infusum per totam noctem. Sed & ciborum contractio ne utendum est, quod undiq; multitudo tollatur. At in accessionibus propter succedentes circa stomachum uehementissimos morbus, aqua tepida data uomere iubemus, digitis aut pennis immissis. Cibi uero exhibeatur contemperandi uim habentes, uelut est pituitia succus, aut alica cum aqua mulsā. Si uero febris ardens infestet, illinatur corpus aqua & oleo, nitro modico ammixto. Pustulas enim circa superficiem retinet, & materiam in profundo aurahit, & profunditate refrigerat, & sæpe sudores excludit, qui aerium humorum multitudinem in uaporē diffillare possunt. Cæterum in pestilentibus & carbunculosis, uenæ quidem sectionem adhibemus statim in principio, non autem cibi contractionem. Fames enim peiorem materiam facit, & uires in his confindit, quas integras seruare uolumus in omnibus febribus, maximè pestilentibus. Si quidē igitur admisserint loci, illinendæ sunt pustulæ pharmaco crasso, ex rosaceo & cerussa, & thure ac uino dulcissimo. Aut ex spuma argenti & manna thuris cū rosaceo. Reliquæ uero partes cerato integantur ex eadem materia parato. Conueniunt etiā ipsis omnia cerata & emplastra quæ ambustis adhibentur. Et pustulas quidem circa faciem, calidè prolutione mitigabimus. Quæ uero in reliquo corpore sunt, per spogias diutius foueantur, maximè prurientes. Si uero serpentina fuerint ulcera, etiam calcis uiuæ parum ammiscetur: mirificè enim resiccat, & persipiente ipsarum sistit. Quæ uero iam depascunt, lenticula cocta cum malicorio ac melle, aut plantagine, aut polygono, aut rosis cum pane integantur. Bonum est etiam his caprianum lac, ad humorum prauitatem contemperandā. Oportet autem quartam partem lactis aquam ammiscere, & simul coquere assiduè uersando, donec dimidium de toto supersit. quo neq; in casei naturam transiens exarescat, neq; seruata odorifera fiat, propter febrē detinentē. Declinatione uero facta, per medicamentū purgatorium idoneum materiam euacuentur. Postea autem Antidotus theriaca detur, aut michridatia, aut alia quedam ad letalia uenena, & uirus eiacularia facta. Nam humorū fortis mutatio per corruptionem facta, uenenofo pharmaco similis est. Fiunt porro aliquando pustulæ magnæ colore albæ, modicum pruritus inducentes, redundantes in scemoribus, natis, lateribus, & summa uentris plerumq; parte. Origanum autem ex multa læta & alba materia habent. Hæc uero cum toto corpore curantur. Neq; enim grauem morbum minantur, si saltem modico uictu quis utatur. Quod si febres in his urentes fiant, commodum fuerit frigidam dare in exacerbationum uigoribus, morbo in uigore existente, nisi uiscera habeat quæ faciliè læduntur. Fiunt etiam aliæ quando pustulæ rotundæ, inæquales, subalbidæ, aut subrubræ, cum eleuatione carnis. Aut uariis similes, qui in facie oriri solent, & duræ sunt, ac multū pruritus inducunt, ut uigiliam causa fiant, dum indecens adest cupiditas ad scalpendum. Consequitur autem hæc plerumq; ad febres intermittentes, & minimè grauem indicant morbum. Quapropter cõueniend

nient tempore æger in solum calidum intente insi-  
deat. Utendum est & his quæ foris illinuntur, uelut  
est oleum myrteum aut lentiscinum cum myrto, aut  
manna thuris, aut cimolia torrefacta, aut alumine li-  
quido, aut farina fabarum. Aut sesamum ritum cum  
modico aceto illinito. Si uero pruritus urgeat, lini-  
teis crudis aut per spongas ex aqua seruenta foueto.  
Si autem exulcerata fuerint, utendum est ceratis ad  
ambusta destinatis, præsertim eo quod ex ordeo pa-  
ratur. Porro quæ ualde rubræ sunt, pessime existunt.  
His autem deteriores sunt liuidæ, nigræ, & tumidæ,  
similes existentes carnis compunctis, redundant  
autē in facie & pectore, & uentre, lateribusq; ad dor-  
so. Tales à principio aggredi non oportet, sed differre.  
Si enim non successerit, in eum qui curationē ag-  
gressus aut pollicitus est, culpa recidit. Si uero per-  
manerint hæc usq; ad uigorem, & non progredian-  
tur in petus, non omnino negligere oportet, etiā si  
raro, attamen aliquando opem ferre, & oportuno  
tempore medicamentā adhibere, atq; magna animad-  
uersione curare. Quæ enim post mortificationem su-  
perficiei ex alto emergunt, quid aliud significarint,  
quam uitam aliquo modo ab internis effugisse.

De tremoribus in febribus. Herodoti. Cap. xxx.

In malignis febribus fiunt tremores. Constantur enim  
ex uitatio uisus, & frigida potu, & postea, ac mul-  
tū, & ex immo dō rei ueneræ usu, & similibus.  
Abstinentium itaq; est ab his quæ nocuerunt, & ex-  
hibenda quæ prodesse possunt. Necessē est autem o-  
mnino affectam esse in omnibus spinalem medullā.  
Quapropter tota spina contegenda est, & affecte par-  
tes, lanis sicyonio aut potius galeino imbutis: aut  
cerato liquidore ex aliquo tali parato, aut ex oleo  
rutaceo. Rigandum est etiam caput in primis diebus  
oleo dulci. Si uero protrahatur morbus, anethino in  
accessionum interuallis. Deinde adhibeatur cucur-  
bitæ à primo uerticulo usq; ad lumbos, impositis ca-  
taplasmatīs iisdem partibus unā cum præcordijs, ex  
eruda ordeacea farina oleo & aqua diluta ac cocta.  
Integantur autem hæc lanis oleo ueteri aut sicyonio  
imbutis. Cibi exhibeantur sorbiles calidi. Prouide-  
dum etiam ut facile solubilem faciamus alium, per-  
manendumq; in hoc ductu, donec febres minuantur  
aut soluantur. Progressu uero temporis si persevera-  
rint tremores, cōmunis auxiliorum modus uelut in  
alijs tremoribus adhibeatur. Ita ut alterius in olei ca-  
lidi solū locemus, & ante solij insellum & postea,  
sicyonio aut antiquo oleo illinamus. Aliquando es-  
tiā castorium ungento ammiscendum est. Si uero  
perseuerarint dolores, etiā in potu exhibeatur casto-  
rium. Et ceratū imponatur ex ipso paratum. Et com-  
munia ungenta ad resolutionem in usum assumantur.

De cōuulsionibus in febribus. Galeni. Cap. cxxxii.

Conuulsiones plerunq; fiūt propter repletionem ner-  
uorum partium, qua ratione etiā fortiter inflam-  
matis accidere solent. Insuperq; ob inordacā tenuem  
humorem, neruofas partes erodent. Et propter for-  
tem frigiditatem congelatio simile quiddam efficien-  
tem. Fit etiam conuulsio ob excellentē siccitatem.  
Sequitur autē maximē ad perniciosas phrenitidas,  
& tum propter febris uehemētiam, tum ob intentos  
& agrestiores motus. Et ex his qui se cōuulsi sunt,  
nemini cōseruatum esse ipse uidi, neque qui uidisset  
audivi. Proinde prædictæ tres conuulsionis species

sepe curantur. Incurabilis est autem ea quæ ob ner-  
uorum partium sic siccitatem. Aliquando uero in  
ore uentris humor tenuis, & aeris, ac maximē æro-  
ginosus, conuulsiones fortes & syncopam inducen-  
tes efficit, ut frigidæ exudationes fiant. In his aqua  
tepidā in potu oblata, digitorum aut pennarum im-  
mersione, uomicum mouemus. Si uero circa intesti-  
na morsus sensus contingat, præsanā succum per clu-  
sterem inijcimus. Damus autem cibos ægre corru-  
piles, uelut est aliqua cum mali punici granis, & simi-  
lia. Si uero nihil tale fiat, cōuulsiones per totum cor-  
pus sientes similiter ut tetanicos, qui antrosum ac  
retrosum conuelluntur, curabimus. In partialibus  
uero primum partes contrāctas blandē contrāstabi-  
mus, & dolores ipsarū mitigabimus, molliorq; ue-  
sicabimus oleo sicyonio antequā calefacto. Si uero  
adhuc perseuerent, etiā castorium ammiscetur, &  
reliqua relaxantia ungenta adhibeantur. Qui uero ob  
siccitatem conuelluntur, propter febris uiolentiā,  
& præsertim delirio præsentē, his lauandum est ca-  
pitū multa calida dulci ac temperata aqua. Manus  
quoque ac pedes multa calida perfundantur. Deinde  
oleo dulci calefacto caput irrigetur, & manus ac pe-  
des illinantur, & amiculis foueantur, & quies indu-  
catur. Quod si sanguinis multitudo adsit, & conuul-  
sionem inducat, uena secanda est. Deinde cucurbitæ  
affigendæ cum scarificatione. Et si quidem crura fue-  
rint contrāctā, postremo uerticulo cucurbitæ affiga-  
tur. Manibus uero conuulsis, septimo uerticulo, &  
ei quod humeri articulo subiectū est cucurbitæ assi-  
gemus. Si uero toto corpore ab affectione immūnū,  
labium contrahatur aut palpebra, graue hoc accidēs  
ducentū est. Derractiones autē sanguinis per cicur-  
bitas in his fiant à ceruice & primis duobus uerticu-  
lis. Caput uero oleo anethino calido irrigetur. Vbi  
autem tempus balnei oportuni apparuerit, lauetur,  
& in aqua potu adhuc seruetur. Si uero uinum ex-  
hibere opus fuerit, modicū & aquosum præbeatur.

De iucundis ac commodis potionibus in febribus.  
Philamenti. Cap. cxxxiii.

Duplex robur & admirandum simul auxilium exhi-  
bet, id quod etiam naturæ ob iucunditatem gratum  
existit. Venit enim ubi quod blandum est lusepit,  
& in se complexus est, tenet et probē concoquit pro-  
uiritibus, maximē si fuerit quantitate moderatū. Ex-  
citatur enim natura, & actiones sepe ab affectionum  
feritate misere afflictas suscitāt, ac morbo repugnat  
iuxta duplicem modum. Ipsum quidem malum pā-  
lām contrarietatis natura castigans, uires autem anti-  
mal gubernantes consolans, & excitans, ac forti-  
cās, ad superandum morbum. Omnes igitur homines  
ut plurimum dulcibus gaudēt potibus, & præsertim  
si adstrictionē, & caliditatem, & quādam eiusdem  
generis qualitates habuerint ammixtas. Quale est ui-  
num dulce, & uinum mulsum. Verū hos potus non  
autum est in febribus exhibere. At eos quos nunc re-  
feremus, etiā si magna animaduersione opus habeāt,  
tutus tamen quā prædictos exhibere possumus.

De potione pharmaci ex capitibus papaueris.  
Galeni. Cap. cxxxiiii.

Sumatur autem in manus medicamentum ex papau-  
ris capitibus, quod optimum potu est iucunditatis gra-  
tia, & optimum ad calidas ac magnas afflictiones cir-  
ca uiscera consistentes, & totum corpus apprehen-  
dentes,

dentes. Item febricitantibus, & cholericis in quibus bilis infernè ac supernè eripit, affectionibus. Et his qui delirij in febrilibus ac uigilijs affliguntur. Prodest & tuisi frequè ex tenui fluxione factæ, quæ ex capite calidiore in pectus defillat. Preparatur autem hoc modo. Capita papaueris moderatæ magnitudinis decem numero unâ cū ipso semine, recentia, neque ualde mollia, & neque dura, in aquæ pluuiæ optimæ sextario uno per diem ac noctem macerare oportet. Deinde ad ignem non fumantem coquere, donec flaccida appareant, & expresso liquore, & per panniculum rariorem excolato, mellis optimi desumpti dimidium aquæ mensurâ ammisce, & agitando coque ad compagē mellis Attici. Præstat autem per passum Creticum, aut per sapam, mellis loco præparare, ubi fluxus fuerit ualde tenuis. Ammisce etiam aliquando ad hoc pharmacum glycyrrhizæ radicem, ut unâ cum papaueris capitibus coquatur. Si uero hæc non affuerit, succum ipsius sicum injicio. Si uero contineatur in pulmone humor delapsus educatione indigens, melius est per mel ipsum præpare. Datur moderata mensura duorū cochleariorum. Augebis autem & minues copiam, pro corporis magnitudine cui id exhibes, & pro ætate, animiq; tempore ac regione. In omnibus enim his ad frigiditatem declinantibus, minimum dabis. Ad caliditatem uero, plus. Sed & desillationis quantitatis ac qualitatē respectu, plus aut minus dabis. Certè ex eo quod ex capitibus papaueris Thebaici præparatur, datur ad summum uncia una. Talis est descriptio Galeni huius pharmaci. Ego uero semper in usu eius quod ex passio præparatur perseuero, aliquando mel ammisces ad eius exhibitionē, aliquando acetū multum, aut mel rosaceū, aut omphacomei, aut aliud quoddā pharmacum hepaticum, aut splenicū, aut stomachicū, & uires eius ad præsentē semper affectionē transmutans. Exhibeo autem ipsum non solū somno indigētibz, ad uesperā, & ad tulsim; Sed etā in sania laborantibus post uenę sectionem & febricitantibus uehementer, & quibus os uentris intolerabiliter perustum est, et in igne sacro, atq; alias calida affectionē thoracis & pulmonis, hepatis item ac intestinorū & mesenterij. Et non solum semel, sed iterum, & non solum in febrili uigore, sed etiam ante uigorē, & ante manifestā concoctionē, in quibus uigiliæ, aut caliditas acris & magna hominē affligunt. Præstat autem ea quæ sexcentis feci in huius pharmaci exhibitione recensere. Et enim in febrilibz putridis ante morbi uigorē, & in his qui ex hepatis, aut splenis, aut pulmonis affectionibus ægrotant, acetū multum simplex exhibitioni eius ammisceo. In uigore uero febrili, omphacomei, aut mel rosaceū adicio. In rarioribus quidem corporibus, & qui os uentris debilius & non appetens habent, omphacomei. his uero qui dulci potu gaudent, & qui medicatum aliquē humorem, aut biliosum in uentre habent, mel rosaceum. Atq; hæc quidem in febrilibz affectionibus. Vrinæ autem stillicidium ex uenarū acrimonia obortum, magnificè sedat maximè in balneo, & ante balnei ingressum largè darū. In quibus etiam uisus rationem pleniorē & melioris succi esse iubeamus. Sed & in nephriticis ac lūbis calidioribus mediū uim habet. At uero his qui urinę profusius laborant, & quibus bilis supernè & infernè erumpit, exhibeo frigida ammisce, præsertim in cas-

lidioribus temperamentis. Oportet autem in bilis supernè ac infernè effusione, habitum corroborare forissecus per adstringentes irrigationes, & similia, atque sic pharmacum exhibere, cum omphacomei calido temperatum. Si uero thoracem humoribus repletum per tulsim euacuare uolueris, acetum multum uariè ad eius exhibitionem ammisce, & calidum exhibito.

*Omphacomei preparatio. Cap. cxxxiii.*  
Botri uuæ acerbæ accipiantur qui iam maturescere incipiunt. Deinde in domo temperie moderata ad biduum uel triduum expandantur, & resiccati exprimantur, & liquor uasè uitreo excipiat, & optimi mellis desumpti pars una, ad tres succi partes ammisceatur, & ad dies aliquot ad solē exponatur hoc pharmacū, donec feruere desuerit ac quieuerit: Deinde in domo superiore seruetur ne putrescat. Hæc autē proportio tibi pro regula sit in optimo melle & optimo uuarum acerbarum succo. Augebis autē & minues quātitatem mellis, pro tenuitate aut crassitie succi. Viendum est ipso in tenuibus ac diuturnis uentris fluxionibus, ob calidas affectiones factis. Et in his quibus os uentris appetentiam nullam habet, propter caliditatem. Et in his qui humectum stomachum habent, post uentris per uomitus euacuationē. Et in prægnantibus mulieribus, & quæ terram aut carbonem, aut alia quædam aliena edunt, ubi per picram ex aloë purgationem feci, omphacomei exhibeo. Bonum est & his qui ob excedentem uentris euacuationem, animo linquuntur.

*Mellis rosacei preparatio. Cap. cxxxv.*  
Mel rosaceum tres partes succi rosarum exunguiū excolato accipit, & mellis partem unam. Coquitur autem ad solem calidum expositum ad plures dies, eodem modo quo omphacomei, et postea adseruatur. Si uero turbulentus fuerit aer, aut frigidior, quando mel rosaceum paras, ammixto optimo melle ad rosarum succū, & per rarum panniculum siue lineum excolato, similiter ad lentum ignem coquito, donec quartam aut tertiam succi partem cōsumpseris, atq; sic exceptum medicamentū uelut dictū est adseruato. Et ubi calidiorē uideris aerē, uelut omphacomei insolato. Adstringit equidē leniter, & propterea frigefacere potest. Habet usum exterioriæ æe melle. Habet & subamari quiddam & leniter acre, unde ori cōmodum est calidam quandam inflammationē habēt, propter calidi floris influxū, itemq; in acris biliosis fluxionibus in uentre, ubi uidelicet affecti prius uomuerint. Exhibemus etiam ipsum his qui uentre excurrunt, citra humorum superfluitatē, atq; hoc absq; uomitu. Item febricitantibus, uigore iam totius morbi instante, & particularis exacerbationis. Sæpe enim in febrilibz morbis etiam unica portio larga sufficit in conuenienti tempore data, ad affectionis solutionem, tum per sudorem eruptionem, tum per uentris subductionem. Inter reliquos enim potus mel rosaceum conuenientissimus est his quibus acres humores per uentrem subire uelis.

*Hydrosorati preparatio. Cap. cxxxvi.*  
Rosarum recentium exunguiū, & per diem ac noctem præsecatuarum lib. i. mellis sextar. i. aquæ pluuiæ ad tertias decoctæ sextar. iiii. commiscebo hoc modo. Aquæ pluuiæ sextar. ix. coquito donec tres reliqui fiant, & ad ablatam ab igne aquam feruentem præ-

siccitas rosas iniñce, & uas pluribus operimentis probe connectum adserua. Sequenti uero die aquam excola, & rosas non expressas adijce, ut ne aliqua aqua fiat, & coiecto melle in mortarium, & probe trito, aquam cum iplo uinito, & fistilibus uasis præsertim recubans ac crudioribus excepta, ad paucos dies insolato, & in domo in qua uinum repositum est adseruato. Hoc multò magis quàm mel rosaceum frige facti.

*Apomelitis præparatio.*

Cap. cxxxvii.

Apomeli sic præparare oportet. Fauos accipe melle plenos, colore quidem albos, uerùm mel pellucidum continentes, & mel ipsum manibus exprime, & ad aquam fontanam optimam ammisce. Et si quidem crassius fuerit mel, quatuor aquæ partes, ad unam mellis ammiscemus; si uero liquidissimum fuerit mel, tres aquæ partes ad unam mellis adijcimus. Si uero sicciores tibi uidebuntur faui, ipsos in tenues partes comminutos in mēsuratam aquam mitte, & manibus sufficienter tere, exprime, excola, & metire, & congnosces quantum mellis addere oporteat. Deinde in ollam nouam miscimus, in qua prius aqua fuerit seruata, propter terream qualitatem, & ad ignem non fumantem coquimus, detrahentes semper inter ebulliendum insidentem spumam, aut cerosam partem. Postquam autem nec spuma, neque quicquam fecis superintulerit, & octaua aut septima pars de tota mensura decesserit, ollam ab igne tollimus ac frige fieri sinimus. Et post perfectam perfrigerationem, sequenti die id quod superne fluitat detrahimus, & in uasa fistilla recentia ac crudiora transfundimus, & in uinaria cella adseruamus. Est autem apomeli exterosiora ac incisoria uel præditum, & biliosa pro alui ductu, & ad urinam sciendam conducit, & febres putridas ad solutionem præparat. Calidis tamen & siccis naturis aduersatur. Et in morbis calidis, & præcordiis inflammatis nocuum est. Et nec solum sedat, imò etiam augeat. Nocuum est autem ante sorbitiones. Nam post cibum datum nocuum est.

*Hydromeli & crustuminati præparatio.*

Cap. cxxxviii.

Cap. cxxxviii.

Hydromelum sic præparatur. Succus malorum lib. vi. mellis lib. xii. aquæ ad tertias decoctæ lib. xviii. Alia præparatio. Malorum dulcissimorum & odoratissimorum, ac friabiliorem carnem habentium, corticem & interna grana detrahito, deinde contusa excocto, & succum per panniculum purum ac densiorem excolato. Sumito autem succi sextar. i. mellis sextar. ii. aquæ pluuiæ in coctura ad tertias redactæ sextar. iii. Postquam igitur præcoctis aquâ ad tertias, adijce ad ipsam mel, & ubi efferverint simul, ab igne ablata quodammodo frige fieri sinito, & sic omni spuma detracta, malorum succi adijcto, & uasis fistilibus excipito, obliuio, & in cella uinaria reposito. Vidim autem eo post dies quadraginta. Quum autem rosas exiguas ad hydromelium ammiscere uolueris, undam rotarum per dies ac noctem in ipso macerato, deinde excolato adseruato. Bonum enim colorem inde acci-

quirit, & non accedit. Eodem uero modo etiam ex crustuminis, & alijs pitorum generibus præparare potes.

*Cydonati præparatio.*

Cap. cxxxix.

Præparatur etiam ex uinalis cydonijs magnis, cortice & internis granis exemptus, deinde contulis & excoctis, & lucco per panniculum excolato. Sumantur autem succi sextar. iiii. Mellis sextar. vii. aquæ pluuiæ ad tertias decoctæ sextar. xii. Primum aquæ aquæ sextar. x. xvi. coquimus, & ubi reliqui fuerint sextar. xii. mel adijcimus, & quum ebullierint, ablata ab igne ollam aliquatenus frige fieri sinimus. Postea detracta superstante spuma, succum cydoniorum adijcimus, & unita excipimus, ac uelut hydromelum adseruamus. Aliquantum uero ut ne præparata potio corrumpatur in hyeme propter frigus, mel prius desumpimus, & succum excoctum ad ipsum iniijcimus, & in fistili obliuio per totam hyemem seruamus. Postea in uere aquam ad tertias decoctâ, uelut dictum est, accipimus, & mel cum succo ipsi ammiscemus, atq; sic utimur. Idem facimus etiam in malis, & crustuminis acalij psiris. Quomodoque uero præparauerimus cydonatum & hydromelum, & ante hyemem, & post hyemem insolamus ipsum per dies quadraginta, cauentes ab imbribus ac uentis, & sic in uinaria cella reponimus. Melius igitur est præparare id quod citius melle seruatur sub caniculæ aestu. Potest etiam rosarum exungulum, & per dies unam siccaturum uncia una, ad sextarium mellis desumpti adijci, & aqua uelut dictum est sub canis estu coqui, & uniri, & sic excolari, ac per dies quadraginta insolari. Conuenit hoc quod ex succo malorum cydoniorum præparatur, morbis qui adstrictione & exstersione opus habent, qui internis partibus exulceratis sunt, ore, stomacho, uentre & intestinis. Auxilia etiam scabiei in uenis. Et renibus ac uescicæ, in quibus sursum ac squamosæ & capilliformes urinarum sunt subidentæ.

*Aceti mulsi præparatio.*

Cap. cxi.

Acetum mulsum componitur ex optimo melle, & pelliculissimum aceto, ita ut sint mellis partes duæ, aceti pars una. Hæc proportio pluribus corporibus conuenit. Variari tamen potest semper pro gustus & temperamenti ægroti ratione, ut habeat, quod blandum ac gratum est naturæ. Coquitur ad mellis compagem, & exhibetur calida temperatum. Potum extergit uiscosos humores, & crassos attenuat. Quapropter uiscera omnia ab obturatione libera, hepatis, splenis, uentrem, mesenterium, & renes. Commodum est enim his, siue in febribus, siue circa febres decur. Aquæ uero multæ ammixtione, uehementia uirium ipsius exoluitur. Tulsim autem mouere que non est, & intestina radere acetum mulsum, Hippocrates & Galenus dixerunt non in corporibus crassis & glutinosis humoribus refertis, sed puris & non redundantibus superfluitatibus. Aut his quæ ex tenui & acri fluxione laborant, & quæ neruolas partes ualde subtili sensu præditas habent.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN

SEXO SERMONE AETII

HABENTVR.

**D**e hydrocephala affectione. Cap. i. De lethargo.

Cap. iiii.

De caro.

Cap. v.

De phrenitide.

Cap. ii.

De catacho & catalepsi.

Cap. iiii.

De comate.

Cap. vi.

n De aetia.

De uertiginosis. cap. VII.	De conuulsionibus aut distentionibus. cap. XXXVIII.	Resiccantia ac cicatricem inducentia achoribus. cap. LXXV.
De insania. cap. VIII.	De Tetano siue distentione & conuulsione. cap. XXXIX.	Smegmata ad achoras, furfures, asperitatem, & scabriciem. cap. LXXII.
De melancholia. cap. IX.	De capitis dolore distinctiones. ca. XL.	De aurium affectionibus. cap. LXXIII.
Curatio melancholiae. cap. X.	De dolore capitis ex ardore aut caliditate oborto. cap. XLI.	Ad dolores ex frigidityte. ca. LXXIII.
De insania lupina aut canina appellata. cap. XI.	De dolore capitis in febribus. ca. XLII.	Ad dolores ex aqua medicata. cap. LXXV.
De incubo. cap. XII.	Ad capitis dolorem ex ebrietate, & meri potu. XLIII.	Ad dolores ob humorum crassitudinem. cap. LXXVI.
De morbo comitali. cap. XIII.	Perfrigerati capitis medela. ca. XLIII.	Ad aurium sordes. cap. LXXVII.
Que arguit morbum comitalē. ca. XIII.	De capitis dolore a stomacho. ca. XLV.	De sonitu aurium. cap. LXXVIII.
Que collabentes comitiales excitant. cap. XV.	Que ex natura capitis dolorem inducunt. cap. XLVI.	Ad auditus difficultatem ac surditatem. cap. LXXIX.
Auxilia ad comitiales. cap. XVI.	Ad dolore capitis ob plagā. ca. XLVII.	Ad aurium inflammationes. cap. LXXX.
De his qui ex stomacho primario affecto, comitales morbi modo conuelliuntur. cap. XVII.	De cephalaea. cap. XLVIII.	Ad aures absq; ulceratione humectas, quae uelut exudant, & seorsum humorem excludunt. cap. LXXXI.
De his qui ex parte aliqua habet morbi comitales causam. cap. XVIII.	De hemierania. cap. XLIX.	Ad ulcera in meatu auris. ca. LXXXII.
Curatio senum ac puerorum comitali morbo correptorum. cap. XIX.	Communis curatio cephalae & hemieraniae. cap. L.	Ad corruptiones ac factores aurium. cap. LXXXIII.
Curatio ualde senū comitaliū. cap. XX.	Epithemata ad capitis dolorem. cap. LI.	Ad superex crescentes in aurium ulceribus carnes. cap. LXXXIII.
Curatio puerorum recens natorum comitalium. cap. XXI.	Que naribus indita caput purgāt. ca. LII.	Ad uermes in auribus. cap. LXXXV.
De fatuitate. cap. XXII.	Apoplegmatismi pituitam per os a capite debrabentes. cap. LIII.	Ad sanguinis ex auribus eruptiones. cap. LXXXVI.
De memoria amissa. cap. XXIII.	Smegmata & puluilli inspersiles, caput densantes. cap. LIII.	De calculis aut alijs corpusculis in aurem illapsis. cap. LXXXVII.
De commorisis a cane rabioso, aut his qui aquam timent. cap. XXIII.	De alopecia. cap. LV.	Ad affectiones aurium extra meatum. cap. LXXXVIII.
De cerebri inflammatione. cap. XXV.	De defluio capillorum. cap. LVI.	De parotidibus. cap. LXXXIX.
De erysipelate cerebri. cap. XXVI.	Ad supercilia pilis denudata. cap. LVII.	De narium affectionibus. cap. XC.
De syderatione. cap. XXVII.	Tingentia ac nigrescencia pilos. cap. LVIII.	Ozenarum curatio. cap. XCI.
De resolutione. cap. XXVIII.	Ut sulci pilii fiant. cap. LIX.	Polyporum curatio. cap. XCII.
De supercilij aut palpebrarum resolutione. cap. XXIX.	Ut albi pilii fiant. cap. LX.	Ad ulcera in naribus. cap. XCIII.
De conuulsione canina. cap. XXX.	Ut crispi pilii fiant. cap. LXI.	Ad sanguinis e naribus eruptionem. cap. XCIII.
Linguae resolutae curatio. cap. XXXI.	De his quae pilos corrumpunt. cap. LXII.	Quomodo sanguis e naribus elicatur. cap. XCV.
De instrumenti uocalis resolutione. cap. XXXII.	Que pilos extirpant. cap. LXIII.	De narium obturatione, & odoratus oblesione. cap. XCVI.
Deglutitionis resolutae curatio. cap. XXXIII.	Pilothra pilorum. cap. LXIII.	De sternutatorijs. cap. XCVII.
Vesicae resolutae curatio. ca. XXXIII.	Que pilos attenuant. cap. LXV.	Ad sedandas redundantes sternutatorias. cap. XCVIII.
Colis resoluti curatio. cap. XXXV.	De furfuribus siue porriginē. ca. LXVI.	
Intestini recti resoluti curatio. cap. XXXVI.	De morbo pediculari. cap. LXVII.	
Cruoris aut alterius cuiusdam membri resoluti curatio. cap. XXXVII.	De achoribus & reliquis pustulis capitis. cap. LXXVIII.	
	Ad capitis scabriciem. cap. LXXIX.	
	Ad parua & densa ac rubicunda capitis ulcuscula. cap. LXXX.	

# AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABILI SECVNDAE

SERMO SECVNDVS, ET EX

ORDINE SEXTVS.

De cerebri, capitis, & nervorum affectionibus, aurium item ac narium.

DE HYDROCEPHALA AQVOSA

capitis affectione, Leonide.



YDROCEPHALA affectio appellata est ab aquoso humore in capite collecto. Plerumq; igitur aquosus humor colligitur. Aliquando autem secūctus aut cruentus. Sēper uero lentus consistit, aut ex obscura, aut ex ma-

nifesta causa. Ex obscura quidem, localibus uasis, seu spōte rarefactis, & aquosa in ipsis essentia, quae cum sanguine permixta est, depulsa & in unum locū congregata. Atque ex huiusmodi causa aquosus humor colligitur. At uero ex manifesta causa fit, uasis localibus ex plaga aut contusione ruptis, & sanguine in ipsis praetereffuso, & deinde rarefacto, ac in essentia secūctam, aut cruentam dissoluto. Frequentissime uero huiusmodi affectio ex tali causa in infantibus, qui obstru-

obſtrex functionis ſuę in experta, & durior manu  
rem tractans, corpora aliqua in capite infantis attri-  
uerit. Colligitur autē hic humor in hydrocephalis,  
aut inter cutem et membranā caluam ambientem,  
ſive muſculum temporum. Aut ſub membranā calu-  
uam ambiente, inter ipſam & os capitis. Aut ſub calu-  
a, inter os & cerebri membranā. Maiores autem  
noſtri dicūt etiam inter cerebri membranā & ipſum  
cerebrū colligi, id quod pernicioſum exiſtit. Si qui-  
dem igitur lēſus humor fuerit collectus ſub cute ex-  
tra membranā caluam ambientem, aut inter hanc  
mēbranā et os capitis, tumor adest iuxta capitis par-  
tem ubi collectio facta eſt, concolor, citra dolorem,  
mollis ad tactum, cedens ac tranſiens ad digitorum  
contactum. Et ſi quidē ſua ſponte fiat ab initio, dolo-  
ris exors & concolor eſt locus. Si uero ex plaga, aut  
contuſione, primum quidem rubicūdus & doloro-  
ſus fit tumor, poſtea uero lenefcēt humore & in te-  
nuem eſſentiam tranſeūte, tumor concolor citra do-  
lorem euadit. At ubi collectio ſub calua facta eſt, in-  
ter os & membranā cerebri, ab initio dum modicus  
eſt humor, caput grauatur, et uertigines aſſidue ſiūt,  
& ſenſus hebetantur, uisus inquam, auditus & reli-  
qui. Quum autem redundauerit humor, future capitis  
os multitudinē diſparatur, & propterea caput  
magnum fit, & locus collectionis apparet. Humor  
enim ad digium cedit. In comuni igitur in colle-  
ctione ſub cute, & in ea quę inter membranā calu-  
uam ambientem & ipſum caluę os fit, iſſe aggreſ-  
ſionibus utimur, ad humoris excretionem. Et ſi qui-  
dem paruus eſt tumor, apex ipſius unica ſectiōe di-  
uiditur: Si uero maior, duę aut tres ſectiōes ſiunt,  
aut plures iuxta magnitudinis proportionem, in lo-  
cis ad effluſionem commodis. Non oportet autem  
uelut in abſceſſibus, poſt chirurgiam limnicos traſſe  
mittere, ſed ipſas ſolas ſectiōes lināmētis diſparare.  
Nam poſt humoris excretionem, corpora in ſis fa-  
cile agglutinantur. Quapropter linamentorum uſu  
in ipſis contenti ſumus. Poſt indita lināmēta, ſi in-  
ſans fuerit cui chirurgia adhibetur, deligationē pro-  
pter grauitatem reſuſamus, uerum lana ouo imbuta  
imponatur, & caput pileo contegatur. In robuſti-  
oribus autem lināmēta forinſecus cuſtodiantur, &  
deligatio fiat. Poterit autem a tertia die conglutina-  
tio adiuuari, per emplauſtrum quoddam glutinatio-  
rium. Quod ſi ſub temporū muſculo collectio fiat,  
expectare oportet donec humor reſiduet, ut ne muſ-  
culus incidatur. Et poſtea a lateribus muſculi ſectio-  
nem facere. Et ſi quidē humor in profundo ſub muſ-  
culo contineatur, duę ſectiōes ſiant utrinq; a lateri-  
bus muſculi ipſius. Deinde corpusculū ſecurē per ſcal-  
pelli manubrium excoridentur. Poſt totius autem hu-  
moris excretionem, curatio fiat uelut dictum eſt. At  
ſi ſub calua collectio facta fuerit, ſtudent expectare  
oportet, & quum redundauerit humor, & future  
fuerint diſparatę, ſaſtigium locū diſſecare, & con-  
ſequenter facere uelut in capitis ſuturis diſparatis.

De phrenitide. Ex Poſſidonio.

Cap. 11.

Phrenitis inflammatio eſt membranarum cerebri cum  
febre acuta, delirium & mentis percuſſionem indu-  
cens. Raro autem ab initio phrenitis cū febre in-  
cipit, plurimis uero a quarta aut quinta aut ſexta in-  
cipit, & adhuc ſerius, cum ipſo ſerme periculo inci-  
dens, ut iam aliqui ſeptima, aliqui nona delirare in-

ceperint. Differentię autem phrenitidis plures ſunt,  
ſed tres principaliffimę. Aut enim imaginatiua ſa-  
cultas ſolum læſa eſt, ſeruatur autem ipſis ratiocina-  
tiua & memoria. Aut ratiocinatiua ſolum læſa eſt,  
ſeruatur autem imaginatiua & memoria. Aut etiam  
imaginatiua læſa eſt, ſeruatur autem memoria. At  
uero ubi memoria deperdit eſt in febrilibus mor-  
bis, ſimul perit omnino et ratio, & imaginatio. Pro-  
inde anteriore cerebri parte læſa, imaginatio ſolum  
læditur: Medio uero cerebri uentriculo læſo, ratio  
peruertitur. Poſteriore autem circa occipitum parte  
læſa, perit memoria, & cum ipſa omnino etiam re-  
liquę duę facultates. Quibus igitur imaginatio læ-  
ſa eſt, hi iudicant quidem recte, imaginatur autem  
peruerſe. Quibus uero ratio ſolum læſa eſt, imagi-  
nantur quidem recte, iudicant autem nō recte. Qui-  
bus autem memoria læſa eſt, nullus antea factorum  
meminerunt, imō neque omnino recte imaginatur,  
neque iudicant. Conuenit itaque parū magis læſę  
auxilia adhibere, & tamen neq; alias negligere. De  
memoria itaque perſita priuatim paulo poſt dice-  
mus. Nunc uero quomodo phreniticis curare opor-  
tet dicendum eſt. Aeger igitur decumbat hyeme  
quidem in domo tepida, æſtate uero, frigida. Quies  
autem imperanda eſt & ipſi ægroto, & omnibus  
in domo, & uicinis. Et qui quidem ad lucem eſſerunt  
tur, in tenebroſa domo decumbant. Qui uero ad  
lucis ſplendorem reſipiſcunt, in lucida domo degāt.  
Si quidem igitur phrenitis cū febre ab initio in pri-  
ma die, aut ſecunda, uſq; ad quartam irruat, & non  
ex tranſmutatione alterius morbi ſuccedat, & urinę  
fuerint ſubcruentę, & facies rubicunda, & ætas ui-  
goris, & bona corporis habitu ad eſt, & omnia  
ſigna ſimul indicant ſanguinis multitudinem, uena  
cubicū ſecetur, ea quę media eſt, & pro uiribus detra-  
hatur, & nō uſq; ad animi deliquium. Minus autem  
quā oportet auferatur, ob plurimam quę in ipſis  
ex uehementi motu contingit diſcuſſionem ac exha-  
lationem, & propter laſtitudinem. Sed & ſectio mo-  
derata fiat, ut ne æger clanculum brachij uinculum  
exoluat. Cōſequitur enim periculum ſanguinis eru-  
ptionis. Quod ſi ob aliquam cauſam, uenę ſectiōis  
auxilium relinquatur per clyſteres uentrem euacua-  
re oportet, cum ſurſum aut pitane ſucco, modi-  
cā niri ſpuma ac pauco melle. Caput autem roſa-  
ceo magis tepido irrigetur. Nam cerebri membrana  
inflammata, frigiditas roſacę non eſt tuta. Imō neq;  
caliditas. Frigidum enim deſat meatus, & ſuperflui-  
tates in capite diſcuti non permittit. Quod uero ual-  
de calidum eſt, feruorem duplicat. Quare æſtate exa-  
ctē tepidum roſaceum adhibendum eſt, cum modico  
aceto: hyeme uero moderatē calidum. Commōdum  
eſt & chamæmelinum ex æquo ipſi ammixtum, ſi  
ambiens frigidiſſor fuerit. Si uero uehementis fuerit  
delirium, poſt factam euacuationem, uelut dictum  
eſt, per uenę ſectiōnem aut clyſteres, capitis papau-  
eris in oleo coctis caput rigato, & faciem aſſidue  
proli proſcriptio ex aqua, in qua papaueris capita  
ſunt cocta. Frontē uero ſomniſero aliquo paſtillo il-  
line. Oliſcant etiam aſſidue ſomniſica, in præcedēti  
ſermone conſcripta ad uigilias. Et ſub ceruical capita  
papaueris ſubdantur, aut mandragorę mala. At ue-  
ro autē malis, dandum eſt etiam ſomniſerū ex ca-  
pitibus papaueris pharmacum, cochlearij menſura



plus aut minus, pro viribus. Dandum est autem id quod ex melle præparatur, non quod ex passio, propter uinositatem. Deur autem hoc pharmacum in exacerbationis declinatione: Si enim datur fuerit in uigore, trahit quidem ad somnū, febris autem excitatur, & eger ad ambo partitus, grauius fert quod contingit. Dato uero pharmaco quiescere sube. Præstat autem mel rosaceum ad pharmacum ex capitibus pauperis adijcere, contemperat enim acrimoniam, & alium subducit. Quapropter etiam aquæ quæ bibitur, mel rosaceum in uisus bonū est, in exacerbationis uigore. Cæterū absiduū usum stupefacientium pharmacorum, potionum, irrigationum ac illitionum uitare oportet. Facile enim in his qui immo die perfrigerantur, transitus fit à phrenitide in lethargū, quando etiam perniciosus fit morbus. Quare ubi delirium moram traxerit, serpyllum aut spondylium in oleo coquantur: Craslos enim uapores transpirare faciunt. Quum autem manserit facies etiam post uenæ sectionem incontracta & rubicunda, cucurbitas occipito affige, & moderatis uulnusculis impactis cutē scarifica, & ad libræ mensuram sanguinem detrahe. In cibo porro dādus est pituita aut alicæ succus, aut micæ panis sæpe lotæ cum rosaceo melle. Mitigata uero febris, dentur oua sorbilia, & lactucæ feruē factæ, quæ cumque moderate humectant ac frige faciunt, unaque trium, propter uirium debilitatem.

De lethargo. Archigenis & Posidonij. Cap. 111.

Lethargi principio duo sunt. Quibusdam enim sepium transierunt & uiscera primario affecta, cerebrum ad consensum ducunt. In quibusdam uero cerebrum affectionem aufpicatur. Et quibusdam statim ab initio affectio incidit. Quibusdam autē ex mutatione alius cuius acuti morbi. Nam à phrenitide maxime in his qui per stupefacientia pharmaca perfrigerati sunt, transitus ad lethargum fit. Quin & à continente febre mutatio in lethargū fit sæpius, itemque ex alijs plurimis morbis, præsertim in quibus plures euacuationes subsequuntur sunt. Aliquando etiam in diuturnis febribus, per circuitū contingit ægrotos somno immergi, uelut in quotidianis fit & semitertianis, quandoque etiam quartanis. Et alij quidem cum conuulsione & contractione neruorum in soporem deferuntur. Alij pedetentim facta accessione. Et alij quidem unā immersionem sustinent, in quo extreme periclitantur. Alij in circuitibus in somnum deferuntur, & rursus reuocantur. Proinde considerare oportet speciem declinationis in soporē. Qui enim per circuitum somno immerguntur, manifestior pulsus habent. Qui uero semper affecti sunt, minutissimum & egrè mobilem. Hi uero etiam dum excitantur, aliena loquuntur, & obliuiosi sunt. Qui uero per circuitum afficiuntur, nihil tale patiuntur. Et alij quidem cum grauitate & elata respiratione in somnum deferuntur, ut & sterant, & singultus ac suspiria edant dolorem indicantia, quæ reuocati neque eloqui possunt, propter rationis lesionem. Alij uero quietissime dormire uidentur. Et alij quidem perfrigerati artus, & rugosi ac pallidi sunt, et corporis miscella ferè cõgelatur. Alijs uero diffunditur, & uelut rorem effundit circa exacerbationis declinationes. Qui igitur hac affectione occupati sunt, his hæc adsumt. Præcordia reuelluntur, uenter contrahitur, & uiolenter ab absidentibus excitati, rursus in somnum deferuntur, & obliuio ipsis.

Nam dum sæpe ad mictionē urgētur, porrecta ipsis matula, se in manibus ipsam tenere obliuiscuntur. Aucto uero malo, totū corpus segne redditur ac uelut mortificatur. Supini autem decumbētes, ad pedes defluunt, distensis manibus ac cruribus. Nasus quibusdam destillat. Os ipsis hiat, & forior eius hiatius succedit. Inferna mandibula uelut resoluta ac laxata uidetur. Atque hæc quidē adsumt lethargicæ affectionis. At uero curationem ipsorum aggredientes in domo lucida ad splendorem ipsos locamus. Sit autem domus tepida. Pedes & manus confricuntur. Odoramenta excitatoria exhibeantur, uelut est castorium, funiculus lucernarius extinctus, plix liquida, bitumen, galbanum. Suffusa quoque lethargicos exciāt, lapis gagates, bitumen, castorium, peucedanum, sulphur, galbanum, sagapenum, cornu ceruinum, hirci fordes, abrotonum, silphium. Sternutatoria quoque naribus admoventur. Si uero multitudo humorum in corpore est, si quidem sanguis fuerit redundans, uena secetur secunda die, & pro uiribus euacuetur. Si uero pituita læta & lentior materia fuerit, uelut in lethargicis redūdare solet, attenuantia exhibere oportet, & quæ crassiciem scare possunt, ita ut his quibus neuosa pars læta non est, acetum mulsum exhibeamus: quibus uero læta est, decoctum apij, feniculi, adianthi, & similia. Sed & alius efficacior infuso elatur, & glandes subducit, ex ruta, nitro, cumino, & melle coctum. Caput autem rigetur in principio quidē serpillio in aceto & oleo cocto. Verum in intus affectionibus peucedani radicē pro serpillio in aceto coquito, & cum oleo capiti adhibeto. Bonū est ipsis & oleum trinitum. Tremoribus autem & contractionibus succedētib, castoreum cum modico aceto terimus, & oleo addito caput irrigamus. Si uero præcordia sint inflamata, in principio cataplasmata adhibeantur, ex polline aut pane, & malo cotoneo cocto, aut pampinis uitis. In progressu uero, semel lini ad pollinem aut panem amisceatur, & ablinthium, & althææ folia cocta. Postea uero ex ordi farina, & feno Græco, & althææ radice cataplasmata sunt. Omnibus autem ab sinu humi amisceatur. Sit autem latū linteū, ut utrinque latera, & pectus sub manibus amplecti possit. Post cataplasma uero partes nudas sinere non oportet, sed cerato nardino aut cyprino conterege. Reiro autē dorso ceratum ex sicyonio factū imponere, quod terebinthinam & bacca lauri tritas infarsas habet. Et si quidē inflato adsumt amisceatur cataplasma is ea quæ flatus discutiunt, uelut sunt cuminum, bacca lauri, ruta, & similia. Si uero quid induratum fuerit, & libanotis addatur, & farina fabarum. At uero in diuturnissimam lethargicis uiribus præsentibus danda est hiera ex colocynthide. Et sternutatoria adhibenda, ex uerratro albo, struthio, pipere, castorio. Et naribus insundendum elaterium cum lacte, aut cydamini succus, aut ipsa radix sicca trita infusillanda, & ori ac palato sinapi cum melle illinendum. Deinde occipito cucurbitæ affigendæ cum multa flamma, item circa primum & secundum uerticillū, sanguis quoque detrahendus ex posteriore capitis parte. Postea de crassissimis capitis sinapissimus adhibendus ex caricis cum sinapi aceto macerato. In tremenitibus uero etiam castorium sæpe potandum detur. Affectione autem declinante æger ad balneū ducatur, & in megame moradidore uiuatur. Velut est sex usta, sinapi, pyrethrum, piper,

piper, bacce lauri, calx uiua, niter uero duplum adi-  
ciatur. Cibi porro sint tenues & incisorij ac resica-  
ntes. Et cum condimentis parau, apij, anisi, cumi-  
ni, pipere & bacis lauri. Et ex uolucris conue-  
niunt, gallina domestica, columba, aucula montana,  
nax, & perdix. Ex piscibus, petrosi, Ex oleribus, por-  
ri, asparagus, petroselinum, chamaedaphnē. Vinum  
aquosum, tenue, album subadstringens. Sed & reli-  
qua curatio iuxta eundem modum fiat.

De catocha & catalepsi. Cap. iiii.

Mediam inter phrenitidem & lethargum affectionem  
reperies, quæ species est delirij siue mentis. Medici  
autem catochā & catalepsi, hoc est mentis occupa-  
tionem & apprehensionem uocare solent, ex humo-  
re atræ bilis magis contingens. Periculosior est autē  
hæc affectio quam lethargus. Verum in febribus le-  
thargo similibus consistit, & aliquando dormire, ali-  
quando uero palpebras apertas habent, aut nictant,  
aut intēte uident, & uelut fixos oculos ac palpebras  
habent, & penitus immobiles, adeo ut neq; si quis ma-  
num oculis ipsorum obtendat, eos claudant. Voce in-  
super ac sensu priuantur, neq; audientes neq; respon-  
dentes. Admovent autē manus suas aliquando ad ca-  
put & oculos ac nares, uelut qui uelluntur, atq; hoc  
non sentiunt. Pulsus sunt parui, languidi, ferme defi-  
cientes. Spiritus aliquando densus, aliquando rarus.  
Esper interualla quadam magnam spiritum ducit.  
Aluus & urinae supprimuntur, nō præ siccitate: Ha-  
bent enim multū humorem, sed propter sensu stu-  
piditatem, & gramæ his subaridæ in angulis oculorū  
fixæ sunt. Et aliquando uidnos parietes attingūt. Et  
in summa, neq; phrenitidis omnino similes sunt, neq;  
lethargidis. Quandoq; etiā ob sanguinis multitudi-  
nem confertim caput occupant, & ipsum superim-  
plētis sit hæc affectio: quemadmodū uidimus in ado-  
lescente quodā multo sanguine repleto. Qui quū tri-  
duum exegisset, neq; claudens palpebras, neq; ad ue-  
hemētes uociferationes transuēns oculos, neq; res-  
pondens, quartā die sanguinis eruptione larga per  
nares facta, ab omnibus molestiis cōsistim liberatus est.  
Quare si eger multo sanguine repleto appareat,  
circa dilationē uenam supernā in cubito secā, & pro-  
uolubus detrahe. In alijs autem primū uentrē per cly-  
ster eluere oportet, si simpliciore infuso immisso, ue-  
lut est fursurū succus cū spuma niri & melle. Postea  
uero etiā polypodij radix cū fursuribus coquatur.  
Caput autē primū irritetur oleo dulci tepido. De-  
inde si caput calidius apparuerit, caput papaueris in  
oleo coquatur. Si uero frigidius, serpilli. Et si quidē  
facile solubilis fiat aluus ex prædictis infusis, in ipsis  
perseuerandū est. Si uero sistatur, ueratri nigri radix  
cū fursuribus coquatur. Potus ipsis cōuenit apome-  
li, aut aqua mulla pro tempore diutius cocta. Quod  
si urinae crasse fuerint, etiam anethi & apij decoctum  
detur. Cibi sint, prisanæ succus & similia. Aqua his  
aduersatur, auge enim inflammationem, & fluctua-  
tiones facit, & splenes excitat, & sitim nō sedat. To-  
tum autem corpus oleo anethino inungatur, maxi-  
mè chymē. In quibus uero etiam tremor succedit,  
castorij drach. i. cum aqua mulla ori infundatur.

De caro. Posidonij.

Cap. v.

Quum frigidū & humidū humores cerebrum occupāt  
caros appellata Græcis affectio succedit, hoc est, capti-  
uis percussio, cum debili febre. Consequitur sensum

stupor, & totius corporis immobilitas, cum princi-  
palium actionum læsione, oculi uero ipsorum sem-  
per sunt clausi. Differt autem caros à lethargo, quod  
lethargici interrogati respondeant, & non omnino  
sine uoce decumbant. Verum qui in caron collapsi  
sunt, somno profundissimo tenentur, ut dum pun-  
guntur sentiant quidem, non tamen loquantur, neq;  
oculos aperiant. Curandi uero sunt & hi similiter  
uelut lethargici, ita ut magis incisorium & attenua-  
torium curationis ductū faciamus. Stomachi quoq;  
cataplasmata, unā cum hoc quod calefaciant, etiam  
corroborandi uim habere oportet.

De comate. Posidonij.

Cap. vi.

Soli uapores calidi & humidī, & subiectis partibus ad  
caput in febribus delati, & ipsum impletēs, affectio-  
nē faciunt, quam Medici coma nōmināt. Cognosci-  
tur si somnus amplior naturali fiat, & in somnis pe-  
regrina loquuntur, & corpore inæqualiter habent,  
& infernā mandibulā inter dormiendū laxatam. Et  
sæpe excitati cōsertim rursus in somnū deferuntur, &  
caput humidius habent. Curantur ex irrigatione ro-  
sæci, aut chamæmelini cum aceto. Sit autem acetum  
acerimum. Si uero frigidus appareat caput, anethi  
num cum oleo dulci ex æquo permixtum ac calfa-  
ctum adhibe. Et in summa, in quantū intenta est fri-  
giditas, in tantum calefactoria augentur, ut etiā pu-  
legium aliquando & rutā in oleo coquamus. Glan-  
des quoq; sedi subdantur, quæ multum irritare pos-  
sunt. Nutriantur autem pulsanæ succo, & apometige.

De uertiginosis. Archigenis & Posidonij. Cap. vii.

Vaporibus calidis & acribus ad caput delatis, & ani-  
male in cerebro spiritum eueritentibus, primū he-  
betudines quadam in oculis sunt. Postea etiam au-  
rium sonitus assidui, & auditus grauitates, atq; hæc  
maximè contingunt circa ebriorū cōtentionem, & ubi  
ex somno exurgunt, augescēte affectione, uertigi-  
nes & obtebrationes oboriuntur, ut putent se ui-  
dere omnia circūferri. Contingit hoc etiam ubi cōi-  
sertim ex fellis surrexerint, cruditate quadā pregressa.  
Perseuerate uero diutius malo, ex facili occasione  
uertigine afficiuntur, ut etiam concidant aliquando,  
maximè ubi in circulum circumuertantur. Nā quod  
alijs ob multas circuitiones contingit, hoc illis ex  
una. Sed & si alium quandam circumuerti uiderint,  
uertigine afficiuntur, aut si trochum, aut tale quid cir-  
cumuerti conspiciant, idem perpetuantur. Spiritus  
enim uiuosus ad trochum qui circumuoluitur alla-  
bens mouetur, & simul cum illo circumferitur. Atq;  
sic inæqualem & turbulentum ac inordinatū humo-  
rem, ac spiritus motum efficit. Facile uero corruptū  
tur hac affectione quibus consuetæ excretionēs sunt  
suppresse. Sed & cruditates & ardores assidui, &  
ebrietates, affectionem hanc efficiunt. Cōsequitur &  
alui suppressio, & propterea multa inflatio, & uri-  
narum tenuium ac paucarū excretio, materia ad ca-  
put accurrente. Graciles autem in totum ferme sunt,  
& pigri ad omnem aggressionem. Si quidem igitur  
ea quæ oculis obuersantur sanguinolentiora se uide-  
re putant, ad insaniam magis apti sunt. Qui uero pur-  
purea uident, ad morbum comitalem. Si igitur ui-  
res robustæ fuerint, & nihil aliud aduersetur, uena  
secanda est, siue principij affectionis fuerit, siue tem-  
pus iam progressum fecerit. In uenæ autem sectione  
uitandum est ne acuatim euacuemus, eo quod ex

qualibet occasione concidat. Quare pluribus detra-  
ctionibus ex quibusdam intervallis vitæ congruâ  
mensuram explebimus. Irrigetur autem caput tem-  
poris sectionis venæ aceto & rosaceo, polygona aut  
heretæ succo amixto. Et lana consoluta rosaceo  
aut penandino madefacta eodem tempore utri im-  
ponatur. Si uero quid sanguinis detractione impe-  
diat, velut grauitas, aut aliud quid ex saepe relatis,  
subducatur alius, primum per clysterem ex furfurâ  
succo, spuma nitri & melle. Postea uero pica ex aloë  
compositio assidue detur. Si uero accidentia perseue-  
rarent, etiam uehementioribus purgatorijs uideum  
erit, ita ut ad redundantem humorem pharmaca ad-  
aptet. Ex efficacioribus autem purgatorijs commo-  
dant his quæ sceniculum in aceto mulso coctum ha-  
bent. Et quod ex palmlis, ruta, & scammonia præ-  
paratur, quorum compositiones relatæ sunt in pur-  
gatoriolum Sermone. Sed & piquita ad capite per os  
detrahentibus, & gargarismis uideum est, ex origa-  
no, pulgrio, & aceto mulso. Postea uero etiâ anagali-  
dis succus naribus infundatur, aut cydamini, aut ra-  
dis betæ, aut elaterii cum lacte. Sed et nitrum cum  
nigella tritum, & oleo ueteri ammixtū, generosum  
per nares purgationem facit. Post hæc autem ad bal-  
neum ducantur. Tale uero frictorijs caput corrobora-  
rans ipsis cōuenit. Lapidis asij unc. i. spumæ nitri al-  
bæ unc. i. iris unc. i. floris iunci odorati sextans. Ex  
hoc quod satis est accipe, & sincipiti insperge, modicam  
aquam calidam irrorans. Deinde ubi lauisit, &  
caput calida non madefecisti, sed solū abluisti, egres-  
sus de solio frigida ter aut sæpius madefacito. His uero  
qui ualde calidum caput habent, etiam rosaceum  
cum aceto saepe adhibeas, & ipsum ex salientibus a-  
quæ in balneo frigefacias. Et si quidem ex his celsis-  
sime affectio, cessandum est ad medicacionis molestia. Si  
uero perseuerarit, arteriæ in capite iuxta tempora su-  
pra aures incidantur, uentre prius euacuato, aut per  
hieram, aut per clysterem. Postea uero confrictorijs  
fortioribus utendum est, quæ ad insanos referuntur.  
Cibi sint boni succi, facile concoctiles, flatus exor-  
tes, omnino stomacho commodi, uentri commodi,  
urinam dentes. Vinum modicum sit, album & te-  
nuissimum, & non ualde uetus. Cōueniunt his bal-  
nea naturalia aluminosa. Maxima uero & prima ac  
ultima in his præseruatio ac curatio est, ut suppressæ  
excretiones commoueantur, & officij sui commo-  
neantur, maxime in mulieribus.

De insania. Archigenis ex Posidonij. Cap. viii.  
Insania fit circa febrem, multo sanguine nō putrefacto  
ad cerebrum confluyente, qui aliquando purus est, &  
multitudine solum affligit, uelut in ebrijs. Aliquando  
uero flaua bile ammixta. Præcedit insaniâ capitis de-  
bilitas, uelut in podagra debilitas pedū semper ad-  
est. Tunc autem dolent, quum materia locis influxe-  
rit. Si itaq; ob solum sanguinem insania fiat, hæc cō-  
sequuntur. Ritus immodicus ipsis commouetur ui-  
dentibus sæpe ob oculos imagunculas quasdam risu  
dignas, & hilaris est ipsis facies, & assidue canunt.  
Aliquando enim ex contingentibus euaporacioni-  
bus sonitus circa aures adsunt, ut putent se tibicinis  
quosdā audire. Seruiatur in ipsis memoria, uelut ex  
cantilenis quas familiares habent coniectare licet.  
Lesa est autem imaginatio & ratio. Si uero flaua bile  
lis ad sanguinem fuerit ammixta, & mordacæ ipsum

effecerit, uelut ex ipsa stimuletur ac pūgatur cerebrū  
& membrana eius, iracundi & temerarij & percussio-  
res aciniuiosij sunt. In quantum enim bilis sanguis  
ni mixta est, in tantum mutatur uindictatem, & auget  
uitiosum ac irā. Si uero amplius fuerit bilis superflua  
sana & crassifluida, & ipsi corpori cerebri ac membrana-  
rum insit uti agglutinata, pungatq; ac diuellat,  
serina deliria efficit. Quidā enim iam propriam car-  
nem gustarunt, & domesticos uelut insidiosos tra-  
ctarunt, occiderunt, percussērunt, uulnerarunt. Cōtin-  
git autem eundē hominem aliquando risu immodico  
eo tenēti, aliquando irā & indignatione. Nā in fame  
ac inedia tolerata, & ex acrioribus ac salustioribus ali-  
mentis, & in pluribus modis ac turbacionibus, san-  
guis seipso acrior efficitur. In cōtrario uero itau, mī-  
tior. Sæpe autē etiā nullo auxilio adhibito, per mo-  
dicum cibum & cōmoda alimēta, progressu tempo-  
ris id quod lædunt consumitur, & cerebrum ut a super-  
fluitatibus intactum manet, & parū mentis emotio-  
nis intervallum ac defectus & intermissio consequi-  
tur. Quibusdā per circuitum quædam intruit affectio.  
Alijs semel in anno. Alijs bis, aut sæpius, coarctuarū  
uidelicet paulatim eo quod molestū est. Corripuitur  
tur hac affectione pauci ante uigorē ætatis. Plurimi  
in ipso uigore, & post ipsum. Viri magis quam mu-  
lieres. Et ex illis magis qui animalibus affectiōibus  
diuturni, uelut sunt irrisores, risu multo & incen-  
pestuosiores, intracitabiles, iracundi, curiosi, auari,  
potiores, item & assidua crudelitæ laborantes. Et qui-  
bus consuetæ excretionēs suppressæ sunt. Et propterea  
etiam mulieres aliquando insanant, quibus men-  
tes suppressæ sunt. Insanitæ uero sunt infantiæ species,  
quas exponere superfluum est. In delapsis igitur  
in hac affectionem, prædictorum proemia quædam  
præcedunt, uelut risus præter rationem non assuetus  
id facere, & facili occasione irascuntur, & aurium so-  
nitus adeſt, & splendor oculis obuertantur: Et uul-  
gilia adsunt intentæ, & curæ per uices repetentes ac  
peregrinæ, grauitas item & uibratio capitis. In pro-  
gressu uero temporis omnia hæc intenduntur, & apa-  
petentijs ipsis putidiores sunt, & ad uenerem proci-  
piunt. Et ideo assidue seminis in somno effusiones  
ipsis sunt, & oculi cauantur, simulq; intenti ac fixi  
consistunt. Atq; hæc cōsequuntur usq; ad perfectam  
mentis emotionem. Oportet igitur doctum medicū  
agri curam gerentem, his apparentibus, aut quibus-  
dam ex ipsis, facere quæ oportet. Si itaq; tales notas  
tenuem exhibere conuenit, forbilem, liquidum, non  
percellentem, uentri commodum, & qui nequitiam  
sanguinem generare potest. A uino abstinentiū est  
petitus. Vbi uero per triduum hominem eo uictu  
curasti, aliquam cubiti uenam secato, præcipue quā-  
dam supernam. Si uero non appareat, mediam. Aut  
si hæ non appareat, uenas circa talos perquirito, ma-  
ximè in mulieribus, eō enim momento etiam men-  
ses impelluntur. Quod si neque hæ appareant, ad eas  
quæ in summis manibus ac pedibus sunt, transeundiū  
est. Studendū enim est ut prius per uenę sectionē ge-  
nerosa euacuatio fiat, atq; sic affectu parū curado  
sequatur. In uenæ autē sectione pro uiribus euacua-  
tionem facere oportet. Exinde enim feruore, euesti-  
giō quidē considerantes sūt. Simul autem & locus  
alijs auxilijs datur. Quandoquidem uero aliqui in  
prima

prima detractione generose ferunt euacuationem. In repetitis autē detractionibus animi deliquia incidit, cōuenit hos in prima detractione euacuare quantum opus est. Sic enim multū de flatuosa & uaporoſa superfluitate cōuacuantur. Itaq; pulsus aſiduē tangere oportet, dū sanguis fluit. Et si cōdiderint, reſeruare ad repetendā detractionem. Sæpe enim recuperatis uiri huius poſtera die detractionem repetimus. Aliquando etiā tertiam ſectionem ſeruantes appoſito ſale. Caput uero irrigare oportet roſaceo cū aceto, aut polygoni ſucco, aut oleo cenāthino, aut melino. Lana autē forſidida oleo ſmbuta ſincipiti imponatur, & frequētius renouetur. Poſt euacuationē omni modo procurandus eſt ſomnus. Sanguine enim euacuato ſi ſuccelleſſerint uigilie, acriores & ſeriores ipſos faciūt. Quapropter cōſiderens pharmaciū ex papaueris capitibus dā bimus, quod ſomnū inducit, cū piſanæ aut alicæ ſucco, aut cū aqua. Iucundum enim fuerit, & poſtea ſomnus ſuccedet. Pleriq; enim ipſorū omnia ſomniſſica cōtinentur. Quapropter etiamſi prima die eo accepto dormierint, inſermiſſa die una, rursus dādum eſt de eo cōſideritū unū. Soler enim uel ſolū poſt uenæ ſectionē perfectē liberare ab affectione, unā cū cōueniente diæta. Cauendū tamē eſt ne cōſequēter ipſum exhibeamus. Stupeſcit enim ſenſus. Stundendū etiā eſt ut uenire ſacile ſolubile ſciamus, tū per cibos, tum per diſſyeres. His autē factis, a localibus auxilijs incipere oportet hoc modo. Sanguinē a uena in fronte eleuata media detrahare cōuenit, ita ut per phlebotomū inſtrumentū ipſam diuidamus nō ſacta impulſione, uelut quidā ſacere ſolent, propter maximas inflammationes inſtrumentū caluā ambientis, quæ ſæpe ſaſaſaſa ipſa ſuccedere ſolent. Detrahenda eſt autē ſanguinis libra ſerme una. Poſt hanc euacuationē, in his qui ſanguinē bilioſorem, inſermiſſis quinque diebus, detur pterā ex aloē, cochlearij magni menſurā cum aqua muſſa. Deinde etiam per nares caput purigenū, radicū betæ ſucco inſuſo, aut elaterij, aut atramentō ſutorio cō laſte. Sternutatoriū quoq; ad triſidē ex uerato albo & herba lanaria. Sed & per os pituita detrahatur, per maſtiche & ſtaſpidē aſgriam. Et per gargarillaſione aceti muſſi, in quo cōtinetur eſt pulegiū & hyſſopū. Subducatur etiā aluus purgatorijs ex centaurea, & ex gentiana. Sed & ipſa per ſeipſam radix gētiana cōmoda eſt poſa drachmæ unius pondere cū aqua muſſa. Datur & ariſtolochia eodē modo. Prodeſt autē maximē ipſis ſcortuli magni ſylueſtris radix & ſemē, ex aqua quodidie poſa. Et radicis bryoniæ drachma una. Poſtea uero ſanguifuge toti capiti directiſſe aſſignantur, & præſertim ſincipiti. At in mulieribus ſtudentum eſt ut menſes moueamus. Deinde uiribus reparatis per dies ſeptem Galeni hieram dato, quæ maximē ob ſtoſchadis copiam euacuat. Dato autē drach. iiii. ex aqua muſſa. Deinde rursus naſiſuſoria adhibeantur. Declinante uero affectione ad balneū ducantur. Friſtoriū autem commodum ipſis in balneō, hoc eſt, tridis illyrice, lapidis aſij, manne, thuris, ſpumæ niri albæ, punſidis, buccinorum uſtorum, floris iunci odorati, apij, caſiæ, roſarum ſecarum, ſingulorū unc. i. iuncto & cribrato, ac uſitor in prima balnei domo, inſpergens ſincipiti quantum ſatis eſt, & aquam tepidam irrorans, ita ut ſaris longam morā in domo trahat quō uires pharmaci uſque in profundum diſtri-

buantur. Deinde capite leniter deterſo & abluto, ubi lotus eſt ita ut caput nō madererit calida, ex ſolio exeat, & frigida iterum atq; iterum irriget. Si uero ualde calidū caput habuerit, etiā ſæpius frigida perafundatur. Poſt hæc per rubificatoriū ex ſinapi & caſicis caput corroboretur. Et per interualla quædam pituita per os detrahatur, & naſiſuſoria adhibeantur. Diæta uero ſtatuatur tenuior, concoctū ſacilis, uenæ tri cōmoda, ſtutus exors, uim cōtemperandi habens. Vini uſus his rarus ſit. Si uero reliquæ affectionis ſuperſuerint, ad ueratum albū deueniēdum eſt. Modus autem utendi relatus eſt in Sermone de purgantibus medicamentis. De cætero uero admodū nendi ſunt, ut ab omnibus edulijs & poribus bilem gignentibus abſtineant. In uere autem quōtannis uenam ſecent gratia præſeruatiōis. Deinde etiā purgentur, & præſertim ſi bilis magis redundarit. Mulieribus uero menſes conſuetō tempore proritentur ut fluant citra impediementum. Sed & in alijs cōſuetæ excretionēs procurentur.

De melancholia. Ex Galeno & Ruſo. Cap. ix. Quæmadmodum in apparentibus corporis partibus, aliquando omnibus eadem temperatura apparet, uelut in malo corporis habitu, elephantiaſi & hydropiſi: aliquando uero una quædam pars, aut amarabilis, aut pituita, aut atræ bilis humore ſuſcepto, ipſa ſolum temperaturam mutat: Sic etiā circa cerebrum fieri poteſt, ut aliquādo toto in uenis ſanguine atræ biliario ſaſto, ex cōmuniſſo detrimenti ratione etiā cerebrum lædatur. Et rursus ut alio tempore, ſanguine in toto homine illaſo permanente, ſi qui iuxta ſolum cerebrum eſt alteretur. Et contingit hoc dupliciter, aut aliunde conſuente in ipſum, aut generato in loco atræ bilis humore. Generatur autē a caliditate multa indigena, aut ſlauam bilem, aut craſſiorem & acriorem ſanguinem adaſſante. Plerunq; uero partes circa præcordia primariō affectæ, caput ad cōſenſum perducat, & deſylum efficiunt, aut ipſa bile cerebrum occupante, aut aliqua uaporis melancholici exhalationē, quæmadmodum in morbo flatuoso & præcordiali appellato. Nil enim rationi noſtræ obſtat, aliunde & ex alia parte principium & generationem affectionis eſſe. Nam os uentris quomodocūq; affectum ſacile ad conſenſum ducit cerebrū ob cōgnationem, per maximos duos neruos qui ex ſuſpennis ad ipſum deferuntur. Perducit etiā ad conſenſum cor ipſum ob uicinitatem. Similiter quoq; ſeptū tranſuerſum, quod etiā ipſi inſeritur. Communitas eſt etiā ſtomacho ad ſpinalem medullam, qua parte & incumbit, & colligatur uerticulis colli. Principium itaq; eiſmodi melancholici plerunq; ex cruditatibus: Flatus enim ipſis ſuccedunt multū, qui ſacile eleuantur, & circa præcordia diutius morantur, & ructus ipſis acidi conſequuntur, nullo eiſmodi cibo accepto. Ventres plerunq; ipſis ſicciflumi, ſomni parui diuulſi, inſomnia turbulenta & peregrina, uſbrationes corporis aliæ aliàs, uerigines capitis, & ſtaruum ſonitus circa aures. Et alijs quidem caput plenum & graue eſſe uidetur, alijs uero leue & uacuum, alijs ſiccū. Quidam neq; omnino caput ſe habere putant, ad quem excogitaſſe dicitur Philotimus ſupra reliquam curationem plumbum pileum, a quo grauat ſcaput ſe habere intelligeret. Fiunt etiā mente capū, & timidi, & miſericordes, & lacrymantur ac

deserta persequuntur. Quidam etiā dæmones ab inimicorum præfugijs sibi immisos esse putant. Alij venenosum pharmacū accepisse suspicant, & suspicio nem ipsorum confirmat uiriosi ac peregrini ructus qui ipsis adiungunt. Est morbus hic omnifarius & nō facili enumerabilis. Velut uerbi causa circa timores, Alius amicissimos timet, alius oēs homines. Et alius ad lucē prodire timet, & tenebras persequitur. Alius fugit caliginosos locos, Pleriq; tamē in tenebrosissimis locis degere cupiunt, & in monumentis ac solitudinibus. Quidam uero etiā aquā timent, & uinum & oleum, & omnē liquorem, uelut qui morbi sunt à rabioso cane. Et in summa, Melancholica dysuria multiformia quidē sunt, ob particulares corruptas imaginationes. Vnum uero omnibus ipsis, cōmune est: Timor & tristitia. Tristitiam enim omnes præter rationem, & neq; si interrogas habent quod dicant cur tristitent. Non pauci uero ipsorum mortem timēt, & alia quædā nullo timore digna. Sunt etiam qui mortem uolenter exoptant. Quod igitur ob atram bilem rationnalis animæ principia occupatam, timor sit, & tristitia, & mortis formido, nihil miri est. Videmus enim etiā extra corpus nihil nobis ita horrendum, uelut sunt tenebræ. Quum igitur uelut caligo quædā rationali animæ parti circūfusa fuerit, necesse est timere hominē, ut qui causam timoris scit in corpore circūferat. Sicut enim in profundis tenebris pueri timent, itemq; adulj imperiti: Ita etiā atræ bilis color, uelut tenebræ rationis locū obumbrans timores efficit. Quapropter omnium symptomatum singulas accidentiū causas enarrare impossibile est. Pleraque enim multam difficultatē habent, uelut uerbi gratia. Cur fugiunt uelut horrenda, quæ non sunt horrenda. Alia uero persequuntur uelut bona, quæ nō sunt bona. Et cur alius domesticos timet, alius uero omnes homines, & huiusmodi. Plurimorum uero symptomatum causas medicū dicere, non est difficile, uelut, qui sibi uidetur uas fictile esse, propter siccitatem hoc patitur: frigidus enim & siccus est melancholicus humor; similiter etiā qui cutē suam siccis pellibus similē esse putat. Qui uero putabat se caput nō habere, fortassis ob leuitatē hoc passus est, quam status uetosis sursum latus ipsi exhibuit. Cur uero appetunt melancholici plures cibos: nū quia frigescit ipsis os uentris? Cur autem aliqui ipsorum uini potiores sunt: num quod frigiditas calidatione opus habet? Cur autē occidunt seipso; num quia à maioribus malis liberari se putant? Nisi fortassis talē opinionē induunt, quod bonum est mori, quod barbaris quibuscūdam uidetur. Cur autem cruditates assidue ipsis fiunt: num quia turbatū & superfluitatibus plenum est ipsorum corpus, & propterea etiā uenter intemperatus, ut qui semper ex atræ bilis humore perfrigeratur. Cur autem alij plerunq; ipsis siccantur: & num quia flauis superna circa præcordia consistunt, & non ualde infra secedunt? Necessē itaq; est ob hoc ipsum etiā uentres siccos esse. Ex multa uero retentione, aliquando coaceruata ac colliquata egerunt. Oculis autem plerunq; nictant, & oculi ipsis prociidunt, & crassa labia habent, propter crassum flauum. Atri uero coloris, propter humoris diffusionem, Hirsuti uero pleriq; ipsorum sunt, propter multitudinē crassam superfluitatum. Veloci uero plerunq; lingua sunt, & balbi, & grati li uoce præditi, ob linguæ incontinentiā. Motus enim

condiatiores à statu sunt. Quicquid autē conditiōe mouetur, citō desinit. Et prodigiū sane fuerit etiā aliorum symptomatum causas reddere, si quis ex his progressum facere uolet. Porro nigrescit aliquādo hichumor supercalefactus, aliquādo superfrigefactus. Nūquale quiddā patiuntur carbones, dum uruntur lucidissimū ob flammā existentes, extincta autem flamma nigrescentes: tale quiddam circa duri sanguinis colorem frigiditas facit. Videmus enim etiam in externis, quædā corpora liuida fieri ac denigrari à frigiditate. Et rursus excessus caloris resiccans ac colūmēs humiditates à quibus calor nutritur, humores nigrescit, quemadmodū etiā sol fructus, & hominū corpora. Hæc igitur sunt quæ ante curationē Medicum cognoscere oportet. Quæ uero discenda sunt ut quis ita ægrotantibus opē ferre possit, ita tempus est subiungere. Nō parum autē refert ad curationem, nosse unde morbus initiū habuit. Cognoscere itaq; oportet quoddā duplex est melancholiæ species. Quidā enim ex natura & temperatura ab initio atrā bilem habet. Quidā uero ex mala diætā postea id temperamentū acquisiuerunt. Et est hæc species levis semper & tristis. Qui uero ex flauæ bilis superaffatione in delyrium incidit, audacioris & iracundioris alij sunt, & percussores, & omnia horrenda faciētes, & maximē tēpore quo bilis superaffatur. Quia uero tēpore ipsa extincta fuerint, tristes, moesti ac timidi sunt. Quum igitur totū corpus melancholicū sanguinē habuerit, à uenæ sectione principium curationis facere conuenit. Quum autē solum cerebrum, æger uenæ sectione non habet opus, nisi multo sanguine redundarit, & præseruationis gratia detractionē faciamus. Cognitio uero an totum corpus melancholicū sanguinem habeat, aut iuxta solū cerebrum talis sit, ex his à te fiat. Nigrioris & hirsuti, & qui uenas amplas habet, apertissimi sunt ad atræ bilis generationē. Aliquādo etiam homines colore rubicundi, cōferunt in melancholicam temperaturā transeunt. Consequenter autem ab ipsis, flauū, & præsertim ubi uigilijs, & laboribus pluribus, & curis, & tenui uictu, aut melancholicis edulij fuerint usi. Ad hæc si suppressa est hæc morrhœis in sede, aut alia excreto cōsueat, aut mulieribus menses, nec parū confert anni tempus, & aëris status, & regio, & ægri ætas ac studiū. His omnibus præcōsideratis, ubi speraueris in totius corporis uenis melancholicū sanguinē contineri, certissimū experimentū adhibeto, ex uenæ cubiti mediæ præsertim sectione. Si enim effluis sanguis nō uidebitur atriabilius esse, statim cohibeto. Si uero talis apparuerit, quantum pro ægri corporis habitu satis fore putaris, euacuo. At uero tertiā melancholiæ differētiā, cuius principij à uentre herere diximus, & quæ æstio præcordialis appellatur, sæpe ex relatis cognoscitur. Primū enim incipiūt uentris symptota, uelut sunt inflationes, rugitus, ructus acidi ac uiriosi, & quod uenter resiccatur, & quod in scelsibus ac uomitibus & ructibus alleuamur, & quod ipsi ægri percipiunt omnes uexationes circa præcordia consistere. Quæadmodū igitur dū quibuscūq; sæpe ex uentre fuliginosa quædā aut fumosa, aut omnino crassiorū uaporum exhalatio sursum fertur, uelut in suffusos oculos habentibus, aliqua ob oculos uersantur. Eodē modo etiā nunc dū melancholica exhalatio ad cerebrū, uelut fuligo aut fumus fertur, melancholica quoq; symptomata



promata circa mentem cōtingent. Quum igitur melancholici delirij propria symptomata apparuerint magna, circa uērem uero aut nihil molestū, aut minimum fuerit, in his cerebrū primariō affectū esse putandum est, uelut prædictū est.

*Curatio melancholiae. Galeni.*

Cap. x.

Melancholia ex cerebro primariō affecto oboritur, per balnea asidua, & diætā boni succi humidam ac flatus exortē curare oportet, citra aliquid efficacis auxiliij, nisi ob rēporis longitudinem humor affligens agrē euacuetur: quando sanē magis uarias ac fortiores curationes adhibere oportet. Incipientē autem affectio nem curare cōuenit. Nam inueterata ac aucta, agrē tractabilis euadit. Rursi. Siue autē cerebrum primariō affectū fuerit, siue præcordia, cōmunia sunt subducentia uentrē auxilia. Primū igitur bonæ concoctionis curā habere oportet. Postea uero purgare primum epithymo & aloē. Horū enim etiam parum quotidie acceperit, prodest tamē moderatē & paulatim subducēdo. Postdonij. In quibus sanguis redū dare apparuerit, statim ab initio uena fecetur in cubito, & præsertim in quibus cōsuetæ sanguinis excretionēs sunt suppressæ. Verum in mulieribus quibus menses defecerunt, uenā in talo secare oportet. Et in singulis pro uiribus sanguinem euacuare. In quibus autē uitia humores magis redundant, præparatum per uictū egri purgabis per hierā Ruffi, aut Archigenis, aut Iustii. Si uero utriq; redūcent, facta prius uenæ sectione purgato. Postea interpositis aliquot diebus, alui per clysteres euacuato, primū cū surfurum succo, spumaq; nitrī ac melle. Deinde etiā polypodij radices cōtusas, aut epithymū cū surfuribus coquito. Post triduum a clysteris usu, deur ipsi pica ex aloē cōpositio, quæ supra reliqua oīa, etiā epithymū accepit. Præparāda est autē, uelut Themison fubet, ita ut aloē accipiat drac. c. mastiches, croci, spice nardi, cinamomi, aut casie dupli, asari, carpopalsami, singul. unc. i. His uero etiam epithymi sextans addatur. Detur autē cochlearij magni copia cum aqua malsa. Deturq; ipsis ex modicis interuallis iterū atq; iterū. Deinde rursus per uictum reparatis uiribus, rursus dato hieram Ruffi, aut Archigenis, aut Iustii. Sit autē pondus drach. ii. cū aqua malsa, & salis cochleario paruo. Melius est autē per euacuantia quotidie leniter uentrē subducere. Atram uero bilem ducit amaracus, & cunila appellata, drachm. ii. pondere aquæ malsæ insperfa & pora. Conduct & lactis sero alui subducere. Sed non de caseis dandū est serum. Præstat enim quod a lacte per cocturā separatur. Sit autē lac equinum, aut si non possit haberi, bubulum. Lac ipsum in ollā nouam mittatur, & fici ramulo agitetur. Postquā autē ter aut quater ebullierit, acetum multum irroretur. Deinde per colatū in potu detur. Et primū quidem ammiscendū est mel, quum autem uenter subire inceperit, nō amplius addatur mel. Accipiat autē æger hoc serū per heminas, nō infra quinque heminarū mensurā. Ab omni uero euacuatione uitendū est malux femine leuissimē trito, duarū drachmarum pondere, cū aquæ cyathi tribus. Egregiè enim facit. Quare sæpe ipso uictum est. Optimū est & pulegij decoctū sæpe bibere, & ante purgatoria, & post ipsa. Et similiter ceterarū parui. Absinthij autem decoctū & asidū & cōsequēter præbe. Stomacho enim & uentri in his commodū est. Et neq; statu

multū in uentre fieri permittit, neq; secessum penitus reficari, & urinae ciet, & concoctionē probe adiut, adeo ut ego ex huius solius usu nouerim quosdam a morbo liberatos. Danda sunt etiam urinā mouenda, anisum, daucus, petroselinū, asarum, nardus: & his adhuc amplius sceniculi magni syluestris flos, & radix. Chamæpitys autem & chamædrys, proptius accipienda sunt, ita ut singula hæc cū aqua coquantur, aut arida trita potioni inspergatur. Cōmodæ sunt etiam euacuationes per sudorē, & labores, & balnea fientes, & per illitiones in sole, qualis est quæ cū oleo chamæmelino fit, & cum oleo ac nitro. Quod si habitus permiserit, rursus per hierā purgato. Conuenit autē neq; præcordia negligere, & maxime ubi accesserit Medicus, curationis ipsorū cōiecturā facit. Fomēta igitur cōueniūt ex oleo, in quo cocta sunt ruta, anethum, serpyllū, absinthiū, artemisia, pulegiū, uitiū semē, bacce lauri, aut folia tenera. Hæc enim dolores mitigat, & flatus minuūt, at uero in inflationibus stomachi cū morfu, cumini & pulegiū in aceto coquere oportet, & per spōgas stomachū fouere. Aliquādo etiā alumē aceto inspergimus. Cataplasmata autē habeat aut anisum, aut apium aut cumini in oleo præcoctū. Et cyperus leuissimē trita, & iris, & libanotis cataplasmati addatur. Permitantur autē diutius, & ante & post cibū. Ablato autē cataplasmate præcordia cōtegantur, aut lana amplissima, aut leuissima & pura pelle agnina, præillitis locis ex nardino. Vtendū est etiā cucurbitarū adhibitione, ad flatus quidē inanīū, ad inflammationes uero ac duricias, cū scarificatione. Postea uero ceratis ex cyprino utendū est, & polyarchio, & quod ex styrace paratur, & quod ex seminibus fit, & similibus. In progressu autē curationis, etiā rubificatione ex cariacis ac sinapi uiti, ualde proderit, & cōcoctiones reuocat. Nā & uetri robur addit, & si quis dolor in præcordio resistat, eū eximit. Vtendū est etiā acrisbus simegmatis ad præcordia, & picatorū medicamentis, hoc est, pice sicca per seipsum liquefacta, aut cum modico oleo. Calida autē imponitur cuti, & uetri ac dorso adhibetur, ac finitur donec sua sponte decidat. Quare licet cū ipsa lauare, & quod paulatim disparatur sufficere aufferre. Valde uero prodest eis stercus bubulū aridū aceto mulso infartū ac impositū. Profunt etiā bulbi cum nitro aut alumine triti ac impositi. Sed & his ad bubulū stercus ammixtis utile fit cataplasma, & præsertim ubi morfus ab ipsis circa stomachū percipitur. Cæterū in quibus cōuulsiones asidux corpori adsunt, confert etiā castorij potus, & illitio corporis ex castorio cum oleo sicyonio. Conuenit & moueri & exerceri ipsos pro uiribus ante cibos. Balnea uero probe cōcoquendi non sunt ualde necessaria, nisi lassitudini alicui mederi uelis. Qui uero non bonū uentrem habet ad concoquendū, huc cōducit frequētius lauare, aut ieiunio, aut post peritum cōcoctionem. Post balnea, cibos damus concoctū faciles, flatus exortes, ex alio secedentes, exacta consideratione facta quomodo ex singulis homo afficitur: non enim omnes ad omnes cibos similiter dispositi sunt. Plerūque tamē cōueniunt panes ciliانو cocti probe præparati, Vlosures nō pingues, non uirosæ, montanæ. Qua gallinarum mollia. Pisces perossi & molles carne. Herinacæ uero marini plurimum præstant ad iucunditatem & utilitatem. Vitanda sunt omnia in signis



stagnis degentia, & in paludibus. Ex carnisbus conueniunt hœdinae, & lactentium animalium, & ex his magis extremæ partes probe coctæ. Non inutiles sunt etiâ uulvæ, & uentriculi, & pedes suilli. Ex oleribus ad cōmunem usum cōferit dulcia. Acroria uero aliquando danda sunt pharmaci loco, uelut est asparagus palustris, petroselinum, & similia. Moderata uero copia omnia accipiantur. Vinum sit tenue & albu & nō ualde uetus. Non autē acuatim detur potus inter cibum, neque magna copia potus exhibeatur, ut ne cibi in uentre fluitent. Acetum quoque acerrimum cochlearij mensura post omnē cibum absorbatur ubi iam uult dormire. Sed & plerique obsonia in aceto tincta edere conuenit. Præstat autem aceto ammiscere parum de scilla, & ruta, & aristolochia tenui. Posidonij. Cōmodum est autē ad inflationes tale oxyponum præparare. Ligustici, seminis apij, zingiberis, thymi, singulorum unc. i. mellis desumpati quantum satis est. Dato cochlearij dimidium mane, & uespere similiter. Quod si mellis dulcedine auersentur, salem concoctorum eiusmodi ipsis præparato. Scillæ assatæ unc. i. salis ammoniaci quincuncē, seminis apij, feniculi, thymi, petroselini, anisi, sinonis, zingiberis, singulorum drac. iiii. panis puri sicci quincuncē, piperis sesquiunciam. Ex hoc cochlearij mensura edendam dato cum cibo, prout uoluerit. Detur etiâ ipsis antidotus theriaca ex quibusdam interuallis, & præsertim hyeme, & inchoante uere. Rusti. Vomant ex lōgio ribus interuallis etiâ a cibis. Verum a raphanis, aut origano, aut thymo ieiunent. Non tamen fortioribus uomitorijs utendū est. Sunt enim talia nocua in his, ærumnā uentri ac stomacho addentia, iam antea ex morbo afflicto. Videntur enim aliqui ex efficacioribus uomitorijs melancholia correpti. Proinde operæpretiū esse nosse, quod multi sic ægrotantes, in tempore curationis nihil cōmodi perceperunt. Dimissa uero curatione restituti sunt, natura ante curationem præualeat cōtra morbos debiles ex medela factos. Quapropter naturæ remissionē dare oportet. Videntur enim uia cū curationibus affligi. In quiete uero inualescere, & superare morbos iam antea attenuatos.

De insanīa lupina aut canina appellata. Ex Marcello.

Cap. xi.

Qui morbo lupino siue canino appellato corripitur, in februario mense noctu exiunt, per omnia imitantur lupos aut canes, & usque ad diem monumenta maxime aperiunt. Cognoscere autem ita affectos ex his signis, pallidi sunt, & uisu imbecilli, & oculos secos habent, & nō lacrymantur. Videbis etiâ ipsos cauos oculos habere, & linguā siccam, & saluā omnino nō profundunt. Sunt quoque situlosi, & tibias habent exulceratas immedicabiliter, propter assiduos casus & canum morsus. Ac talia quidem sunt signa. Nosse uero oportet melancholici speciem esse hunc morbum. Quem curabis tempore accessionis uenā secando, & sanguinem usque ad animi deliquium euacuando, & ægrum boni succi cibis nutriendo. Vt autem balneis dulcibus. Deinde sero lactis per triiduum usus, hiera ex colocynthide Rusti, aut Archigeni, aut Iusti purgetur, iteratque iterum ipsam fumēs ex interuallis. Post purgationes etiā theriaca ex uiperis utendū est, & alia adhibenda in melancholia iam antea relata. Ad uesperam uero inuadente iam morbo, irrigationibus capitis somnum inducere solitis

utendum est, & talibus quodam odoramentis. Nares item opio illinantur. Quandoque uero etiam somnificam in potu exhibeantur.

De incubo. Posidonij.

Cap. xii.

Qui incubus appellatur non est dæmō, sed magis præludium & procœmium morbi comitalis, aut insanie, aut syderationis. Nam cruditates ex uoracitate affectionē præcedunt. Dum enim uentriculi cerebri uaporibus crasis ac frigidis implentur, prohibent hi facultates per neruos transire, & morbum ægrè excita bilem efficiunt, & qui uix ad rectā actionem perducitur. Vnde etiâ immobiles penitus tales permanent. Præcedit enim incubus suffocatio, uocis priuatio, grauitas, & immobilitas. Per multā uero anxietatē aternuato ac discussu spiritu, & apertis meatibus derepente exciditur. Cauendum igitur est a malo dum in principio est. Inueteratū enim & assidue incidens, quodam ex relatis morbis inducitur, dum paulatim in uentriculis cerebri crassius humor coacueratur. Quæcūque enim pariuntur comitali morbo correpti in exacerbationibus, eadem perpetuorum incubo presti dum dormiunt. Si quidē igitur sanguis redundat, uenā in cubito secare oportet. Si uero uisiosi humores magis prædominantur, purgatio facienda est per hierā Archigeni. Maxime autē opitulatur ipsis hoc. Corticis ueratri nigri drach. i. scamoniæ obol. iiii. anisi, aut dauci, aut petroselini parum. Dieta uero sit tenuis & penitus flatus exors. Auxiliatur etiam ipsis niger præoniæ fructus, si quindecim grana trita cum aqua in potu exhibeantur. Rigare uero oportet etiā caput oleo anethino calido, & pileo cōtegere ubi cubitum uadit æger.

De morbo comitali. Galeni.

Cap. xiii.

Tres sunt morbi comitalis differentie. Omnibus autē cōmune est, cerebrum affectū esse. Aut primario cōstitū in ipso affectione, aut per cōsentum oris uicinis. Rarō autē fit etiam tertia species ex parte quadam, in qua incipit affectio, & deinde sensibiliter ægroto ad caput ascendit. Atque hanc speciem in puero quodā uidi, qui principii alitudo in crure habebat, & postea per tempus quoddam per femur & lumbos ac ipsi nā ad collū & usque ad caput ascendebat. Vbi uero caput pertigisset, nō amplius sui cōpos erat. Tale quiddam contingit etiā in his qui a scorpio, aut aliqua asila uenenū eiuculante bestia icti sunt. Quidam enim ictus a scorpione, grandine se impeti putare dixit. Et erat totus subfrigidi, & frigidū sudorem excludēbat, & medicamentis adhibitis uix seruatus est. Non igitur impossibile est circa aliquos non principales partes eiusmodi essentia generari, citra externā causam. Et hanc ipsam ubi in neruosa parte cōstitit, uiam suā per continuitatē ad neruorum principium transmittit. Posidonij. Cōuulsio sequitur ad morbum comitalem, eō quod principii neruorum affligitur ab instantibus ac molestiis exhibentibus. Quemadmodum enim stomachus, dū aut alimentū copia grauiatur, aut ab acri humore morderetur, non solū singultū, sed etiā conuulsionē inducit. Sic etiā principium neruorum ad talem motū perducitur, dum reijcere conatur quicquid tandē fuerit id quod ex primario affecta parte ad ipsum affertur. Cæterum ordinati aut inordinati circuitus ipsis sunt iuxta dietæ modum. Aut enim per omnia æqualiter dietā habent ægri, aut inæqualiter & inordinatē. Irruente igitur comitalis morbi exacer

exacerbatione, conuulsas & obortas partes deligare oportet, inungereq; ac dirigere. Deinde disparato ore pennā oleo illā immittere, cyprino præferatim, aut irino, aut narcisino, & uomitū irritare, quo incumbentes stomacho humores extrahantur. Oportet etiam odoramentis sensum irritare, uelut peucedano aut succo cyrenaico. Perseuerante uero exacerbatione, Medicus confidenter cogens, ac mandibulas diducens castorij ori infundat, & succum cyrenaicum cum aceto mulso. Reuocatis autem ipsis, per sedem infundatur centaury ac calaminthæ decoctū, aut aristolochiæ. Deinde recuperatis uiribus, per hieram Galeni ex colocynthide purgetur. Eiusmodi sanè est recentis & acuti comitalis morbi curatio. Deinceps autem quæ ad inueteratū demolitiōē pertinent trademus. Oportet itaq; ægros in longo aequo potu continere, & in curationis aggressionē, si nihil impedierit, uenam secare, & intermissis diebus quatuor aut quinque corpus reficere, ac sic infra euacuare, maximè per ueratū nigrum, aut colocynthidē. Veratū autē corticem siccum tundere ac cribrare oportet, & eius drach. i. cū aqua mulla præbere. Aut modico pipere addito melle excipere, & catapotia deuoranda dare. In colocynthide uero electo semine, & relicta mella, uinū dulce infundito, ac per noctē sistito. Mane uero uinū excolatum ac tepescitū bibendum dato. Post sufficentem purgationē lauare ipsos oportet. Tertia deinde diē cucurbitas affigere præcordijs ac dorso cum scarificatione. Deinde intermissis aliquot diebus ac refecto corpore, purgare per hieram Galeni ex colocynthide. Postea uero etiam capiti cucurbitas affigere. Et sequenti diē cataplasma capiti adhibere, ex pane cocto cum aqua mulla, amygdalis amaris simul cōtritīs, aut serpillio, aut calamintha, aut mēta, aut ruta. Et hoc faciendum est per triduum, postea radendum est caput, & illinendum peucedani succo in aceto diluto. Aut spondylium, aut serpillū, aut iris in aceto coquatur, & facta intermissione, rursus ex hiera drach. i. i. solum dato. Deinde sternutatorijs utendum est, & pituitam per os ducentibus, & naribus rursus, ita ut cyclamini succū naribus infundamus, aut ipsam radicē siccam tritam infusilem, aut elateriū cum lacte. Et rursus factū interstitio, clysteri ex centaury & colocynthide utere. Deinde sinapismū capiti adhibere, & eduliorū acriū esu per intervalla utere.

Que arguant morbum comitalem. Cap. xiiii.

Argumentum comitalem morbum & eo affectos collabi faciunt, sufficit, bitumen, lapis gages, cornu ceruini, odor hepatis caprini assati, & ipsum hepar dū edidit.

Que collabentes comitales excitant. Dehinc.

Cap. xv.

Si magnum pedis ægri digitum diuiseris ex quacunque parte, & destillante sanguine labia ipsius collapsi illeueis, statim excidabitur. A sclepiadæ odoramentum excitans comitales. Sagapeni, pipēris, castorij, amygdalarum amararum, radicis peucedani, spondylii, galbani, singulorum drach. i. filiphij drach. i. opobalsami drach. i. aceto dilue ac pastillos efforma. Vsu uero experiente aceto dilue ac naribus subline. Vtendum est hoc in exacerbationibus. Facit & ad uterū strangulationes. Pharmacum hoc repositum seruatur in area pyxide, quam naribus ægri ad mouebis. Aliud. Galbani, spondylii aut serpilli, æruginis rase,

castorij, acori, singulorum drach. i. i. i. succi peucedani drach. i. i. aut radicis drach. i. i. succi cyrenaid drach. i. i. opobalsami drach. i. i. pipēris grana x. i. i. i. amygdalas amaras decorticas x. x. x. picis liquidæ quātum satis est, aceti tantundem. Excipe & utere.

Auxilia ad comitales. Dioforidis. Cap. xvi.

Ad comitales facit rutæ syluestris semen cum aqua potum. Et spondylium eodem modo. Item radicis bryoniæ drach. i. i. seminis siue fructus balsami drach. i. i. Cardamomi drach. i. i. Ramentorum loti arboris cremor. Foliorum quinquefolij drach. i. i. quotiē die pota. Testudo terrestris cocta ac delineta. Lafer cum cibo acceptum. Summe uero prodest castorij post aliquam purgationē acceptum, ad dies quinque aut plures, drach. i. i. pondere cum aqua mulla. Et ebarris ramenta magnopere profuisse cognouimus, ad dies quinque aut plures. duorum cochleariorum mensura quotidie pota cum aqua mulla. Ex Asclepiade. Oxallidem siue rumicē acutum, uiridem præferim, quotidie dato à prima lunæ usque ad trigessimā. Eadem oxallis herba uiridis data cum uino delysanibus, in naturalem statum eos restituit. Aliud, ut ne assidue cadant inquit Archigenes, Eryngij montani appellati, cuius folia angusta & parua, & flores auricolores & oculorum speciem præferentes. Huius radicem cōstitutio ac diligenter cribratam reponito. Et ex hac mystra duo ad dies quinque dato, sufficiens tibi melle adiecto, ut elegantis crassitudinem habeat. Et hoc factio ex intervalis ut trecentos sexaginta quinque dies expleas. Qui enim hoc pharmacum per annis pacium, hoc est trecentos sexaginta quinque dies sumis, ab hac affectione non corrumpitur. Aliud. Scillæ allatæ internæ partis tritæ, anethi, singulorum acetabulum, apij acetabula tria. Excipe melle, & nudis ponticæ magnitudine exhibe cum aceto mulso. Et qui bibit si potest, currat. Sin minus, conditæ deambulet. Aliud Asclepiadæ. Folij olæ x. v. & castorij cum aceto mulso usus est Themison. Facit ad comitalem morbum & elephantiasim. Est & hæc theriaca bona. Seselis drach. v. scordij, castorij, cinamomi, seminis uisfolij, singul. drach. v. i. staphidis syluestris drach. i. i. gentianæ drach. v. i. i. aristolochiæ drach. v. i. pyrethri drach. v. i. i. euphorbij drach. v. i. plaris albi drach. x. opobalsami drach. i. i. succi cyrenaid drach. i. i. Excipe aceto mulso simplici, & dato comitalibus cum aqua mulla drachmas tres, & elephantiasim uero affectis scilicet drachmā præbe. Aliud. Quo Serenus utebatur ad comitales, cui nullum toporati potest. Idem concoquit & euacuat. Castorij, ueratū nigrū, scammoniæ, singulorum drach. i. i. opopanis, cumini thebaici, centaury, nitri, sulphuris uiui, abrotoni, ammoniaci thymamatis, seminis rutæ syluestris, absinthij, singulorum drach. i. i. coacta & cribrata excipe aqua, & efforma pilulas fabæ Aegyptiæ magnitudinis, & unam quotidie præbe cum aceti mulsi cyathis i. i. i. Diuina huius compositionis uis est. Recipit autem simplicia x. i. i. & habet drach. x. v. Aliud. Coagulum leporis quotidie teiui natus bibat erui magnitudine aqua dissolutum. Si non adest leporinum, hoedino utatur. Aliud Archigenis. Ad comitales, & qui per circuitū cōuelluntur, & à uolulo uexantur, & ex diuturno capitis dolore laborant. Castorij, abrotoni, radicis panacis, pyrethri, croci, singul. drach. v. i. i. seminis rutæ syluestris, myrrhæ, piperis

piperis, singulorum drach. iiii. Terito in aceto mulso scallitico, & pastillos drachmales formato, & unū exhibeo non febricitibus cum aceto mulso. Febricitibus in remissione ac intervallo cū aqua mulsa per triduū. Deinde interposito triduo, rursus per aliud triduum dato. Facit etiam ad arthriticos. Ducti mulseribus menses, si novies per intervalla velut diximus bibatur. Aliud consimilis usus. Castorij, piperis, radices panacis, singulorum drach. vii. pyrethri, staphidis sylvestris, abrotoni, seminis rutæ, zingiberis, acori, dauci, singulorum drach. iiii. croci, tridis, cardamomi, singulorum drach. ii. Dato ex hoc arido cochlearium cum aqua mulsa. Facit ad comitiales, resolutos, & tremulos.

De his qui ex stomacho primario affecto, comitiales morbi modo exacerbantur. Galeni. Cap. xvii.

Quando stomacho primario affecto fit morbus comitialis, oportet ægro præcipere ut bonæ concoctionis studiosus sit, & circa horam tertiam panem accipiat probe preparatum, ex uino ueteri albo & tenui diluto ac leniter adstringente. Dato autem ipsis etiam amarum ex aloë pharmacum sæpe in anno. Dicitur autem amplius de his qui ex stomacho comitialis morbi modo affliguntur, in Sermone de stomachicis. Multum uero prodest ipsis fœli, & spodylij radix ac semen, & aristolochia, cum aqua trita pora. Auxiliari his magnifice & uenæ sectio talis & poplite, si assidue fiat. Noui etiam puerum qui omnino non corripiebatur comitali, ex quo pœoniæ radicē gestabat magnam & recentem de collo suspensam, ut indefinenter stomachum contingeret.

De his qui ex parte aliqua habent morbi comitalis causam. Posidonij. Cap. xviii.

Quibuscumq; uero ex alia manifesta parte morbus comitialis principium habet, uelut in prædicto puero ex crure: Post totius corporis euacuationem, unguentis locum prius excalescere oportet. Deinde episthema ex seminibus imponere. Et ex emplastris quæ rarefaciunt & intemperiem transmutant. Quale est quod Eberietas appellatur, & quod ex althea paratur, & mnales inscripuit. Postea uero phoenicidnū appellatum. Post temporis autem interstitium dropaces ac sinapismi loco adhibeantur. Et sic quidem adolescentes ac iuuenes, & inclinæ ætatis homines, fortiter curare oportet.

Curatio senum ac puerorum comitali correptorum. Cap. xix.

Senes autem & pueri affecti hoc modo curentur. Corporis equidē euacuationes in his uitare oportet per purgantia medicamenta. Imbecille est enim & senibus & pueris corpus, ad resistendum fortitudini purgationum. Per clysterem uero euacuandi sunt præsertim senes, ex centaurea, aristolochia, polypodio ac anetho. Sed & manducationum usus senibus conuenit, & gargarismatum, ac eorum quæ naribus induntur. At uero pueris simplicissima insula immittantur. Frictoriorum quoque ac sinapismorum simpliciorum usus pueris adhibeatur. Senibus autem efficiatorum. Sed & antidoti præscriptæ senibus sunt exhibendæ.

Curatio ualde senū comitalium. Posidonij. Cap. xx. Valde senibus cōsulendum est, ut uictu solum calido ureantur, & ut bonæ concoctionis rationē habeant. Impossibile est enim eos qui cum hac affectione cō-

senuerunt, humana ope curari, ac à morbo liberari. Quibus autem temperaria est affectio, ac aliquibus occasionibus allapsa, etiam si ualde senes fuerint, ab ipsorum curatione desperandum non est.

Curatio puerorum recens natorum comitalium.

Posidonij. Cap. xxi.

Afficiuntur etiam recens nati pueruli à morbo comitali, & difficilē curationem habent, non tamen desperatam. Possunt enim ipsorum matres aut nutrices calidis cibis ac potibus nutrirī, quo lac semper calidius ac tenuius fiat. Possunt etiam capita infanum puluisculis calidioribus conspergi, uelut est cyperus, adiantum, iris. Oleo item anethino assidue illini, & irino, ac amaracino calidis. Lauari quoq; possunt, ita ut caput non rigetur, neque calida, neque frigida. Nisi ubi opus fuerit sordes detergere per spumam nitri ac mel, & sic caput solum calida ablueri, non autem immergere. Dandum est etiam ipsis mel despumatum ad delingendum. Et collo alliganda est pœoniæ radix recens, ut semper stomachum contingat.

De fatuitate. Cap. xxii.

Fatuitatis quoq; ac delyrii curationem aggredi oportet à principio generationis ipsorum, si partes corporis uniuersæ, & præsertim capitis, moderatē se habuerint, & si rationem antea moderatam ac integram habuerunt, postea uero dementes apparuerunt. Oriuntur ambæ affectiōes frigidiore cerebro factio, aliquando ex sola qualitate, uelut fieri solet in profectiōibus dum pluuia caput frige facit, aut etiam uehemens uentus. Aliquando uero etiam modica pituita ad cerebrum illapsa. Differt autē fatuitas à delyrio, quod fatuitas quidem consequentia & dicit & facit; Delyrium autem transgressionem inconsequentem habet, & sermonem alium alij cōnectit, ita ut posterior nihil commune habeat cum priore. Delyrium item senibus plerumq; accidit. Fatuitas autem & in pueris, & adolescentibus, ac reliquis ætatibus, ex prægressis quibuscum morbis consequitur. Cæterum curatio amborum morborum cōsimilis est ei quæ ad comitiales relata est, per calefactoria auxilia similiter fiet, non tamen similiter succantia.

De memoria amissa. ex Rusto ac Galeno. Cap. xxiii.

Memoriæ detrimentum sæpe in quibuscum morbis factum esse compertum est, læsa simul etiam ratione. Ita ut affectio quidem utraq; eadem sit, intendatur autem quādo unā cum memoria etiam ratio periret, quod sane fatuitas appellatur. Pereunt autem ambo hæc in lethargo, & omnibus affectiōibus soporiferis. Unde etiam curatio ad prædictas affectiōes descripta adhibetur instantibus iam morbis. Continēgit autem hoc etiam ex peste, quemadmodum accidit in peste Athenis facta. Si uero irruerit aliquando ex aliquo prædictorum morborum, soluto iam in totū, & in obliuionē transiente, considerare oportet qualitate magis prædominantem, hoc modo. Sola quidem humiditas redundans, profundos ac longos somnos facit. Sola uero siccitas, uigilias. Si uero frigiditas fuerit cum humiditate, soporiferæ ac stupidae affectiōes fiunt. Si uero humiditas fuerit cum modica frigiditate, memoriæ detrimentum & fatuitates succedunt. Quum autem multa sit differentia temperaturarū, pro maioris ac minoris ratione, multiformis sit uarietas causarum animales actiones laedentium. Obseruare igitur oportet somnos eorum qui

qui memoriam perdidit, aut intelligentiam: Intelligentiæ enim amissio sanitas est: utrum somnolenti sine ualde, an moderatus ipsis sit somnus. Ita enim repereris intemperatam prædionem. Insuper autem considerandum est utrum multa excernantur per os & nares de humoribus ex capite delatantibus, aut sicce appareant partes hæ. Si quidem igitur frigiditas sola est, calefacere solum cõuenit, non item siccare. Si uero cum siccitate fuerit frigiditas, calefacere ac humectare. Atque ego sane noui quendam qui ferme memoriam amiserat, & ratione læsus erat, ob studium & uigilias circa disciplinas. Alium item uis nitorem ob uineæ labores similiter affectu. Et uterque ipsorum palam à calefacientibus ac siccantibus lædebat: Ab humectantibus uero simulque calefacientibus opem sentiebat. His autem prædistinguis quæ rationem annexamus. Si igitur ob purgationes quasdam, aut alias immodicas euacuationes, aut animi deliquia, fractis uiribus, memoriæ detrimentum succedat, refectoria diæta uti cõuenit, nihil aliud curiosus moliendo. Roboratis enim corporibus & collectis uiribus, restituitur etiam memoria. Eodem uero modo si propter extremam senectutem accesserit memoriæ detrimentum, non oportet curiose quid moliri, sed solum cõueniente diæta contentum esse. Quibus autem repente deficit memoria, alia uero sana esse uidentur, in his comitalium successurum timere oportet, aut resolutionem, aut etiam syderationem. Et in summa magnum quoddam malum in ipsis comperies. His igitur sufficiunt aliquando præseruationes à morbis imminentibus. Dum enim morbi aduentum prohibemus, ex hoc etiam memoria conseruatur. Prohibent autem prædictos morbos, primum attenuans & incisoria diæta. Deinde etiam purgationes cõueniunt, & similia. Si uero ex morbis uelut dictum est irruerit, uelut lethargo aut peste: horum curationem cõtenuosius aggredi oportet. Summa uero medela est in calidando uniuersum ipsum corpus, intrinsecus ac extrinsecus, iuxta mensuram euacuationis habitus naturalis. Calefactoria quæ ferme talibus cõueniunt æstate quidem oleum per se calidum: hyeme uero irinum cum aceto acrisori, aliquando serpillio, aut spondylis, aut calaminta in ipso cõcto. Aliquando etiam nitro iniecto & pipere, aut bacis sauri. Commodum est etiam castorium cum oleo occipiti adhibitum. Auxiliatur autem his maiorem in modum hieræ Rusi purgatio. Quandoque enim inquit huius solius purgatione usus, multum proficit in purgando, quum nihil boni secum detrahat. Incipit enim superne à capite derahere, & postea etiam alias partes petrantis, nullam uiolentiam, nullum dolorem inferens, non ardorem, non stomachi dolorem, non sitim. Verum semper pro euacuationis ratione alleuat. Unde etiam stomachum corroborat per purgationem, ut ciborum quoque appetentia augeat. Creditur etiam post purgationem per hieram, eborris ramentum memoriæ optulari, drachmæ pondere pocum cum aqua mulla, & similiter cerui cornu. Quin & castorium similiter drachmæ pondere potum, post purgationem cum aqua mulla magnopere prodest. Maximum auxilium est: & uerari albi potio, non uelut quidam putant postremum, sed ab ipsa recte etiam quis incipere possit. Quid enim opus est diu & multum laboribus fatigari, quum ex ma-

ximo auxilio maximam medelam consequi liceat. Quare citra omnem formidinem ueraturum dandum est, priusquam eger per morbum excolatur, & uires auxilij exiles fiant. Commoda sunt quoque sternutatoria ex ueratro albo & castorio, naribus admota post euacuationes, & quæ naribus induntur ac insunt duntur: & quæ pituitam per os detrahunt. Alimentum uero cõuenit friabile & aliquo modo calefactorium ac attenuatorium. Ab oleribus autem omnibus frigefacientibus abstinendum est, & à fructibus ac bellarijs, caseo: & ac lacte, & à cibis crassefacientibus ac instantibus. Alia enim ex ipsis spiritum cõturbant, alia defant. Acroria uero ex interuallis exhibentur, uelut sunt alia, thymbra, origanum, pulegium, & raphani. Sed & horum copia uitanda est. Semper autem cruditas cauenda. Nam cruditates omnino re magis mentem uitant. Vinum his cõuenit tenue, album, & non ualde uetus. Per moderatam enim caliditatem tum alia non pauca potest, tum animam mæsu facit & ad tripudia aptam facit, motum ei præbens cõtinuum ac sedatum. Multus autem atque potus, & adhuc magis uini, pessimus est. Caput enim ualde humectat. Multa autem humiditas obliuiofissima est. Somnus sit moderatus, & à repletione fiat. Veneris uero usus sit rarissimus. Neque enim ad totam sanitatem conducit, neque ad animæ rationationes. Imò & tristitia inducit, & lancinatio illa in costu cõtingens, conuulsioni quodammodo cognata est. Et perfrigeratio quæ succedit cõgelat quodam modo ac stupefacit intelligentiam. Ceterum post purgationes uniuersales ac locales, etiam sinapismus occipitis commodus est, & post sinapismum, balneum. Cruditas autem & lasitudo penitus uitentur, tum aliarum corporis partium, tum maxime capitis ac ipsius mentis: Vitandi quoque uehementes ardores ac frigora. Ambo enim caput replent. Vitanda & edulia crassefacientia, & instantia, ac humectantia. At uero si quis ex his progressum faciat, etiam in sanis qui humidius caput habent, uisus rationem commodam præscribere poterit, ut quis optima memoria præstet.

De cõmorsis à cane rabioso, aut his qui aquam trahunt. Ex Ruso & Posidonio. Cap. XXXIII. Quum canes natura calidi ac siccis sint, per æstatem ex ambiente nos aëre aliam caliditatem ac siccitatem acquirunt, & ob immoderatam intemperatam insaniunt, & hæc insania rabies uocatur. Patiuntur autem hoc magis in illis regionibus, in quibus maxime & inæquales ambientis mutationes inordinatæ sunt. In quibus & hyemes uehementes sunt, & æstus excellentes. Insanientes autem canes, & si uehementi correpti potum non admittunt, eò quoddam insanitum. Unde etiam magis intenditur ipsis ueneni malignitas. Signa canum rabiosorum hæc sunt. Muti sunt & adeo delirij ut ne familiarissimos quidem cognoscant, sed hos primum attingant. Cibum auerantur, & fusciloli quidem sunt, non tamen bibunt, & plerumque anhelant. Ore autem hiant, & linguam exerunt, ac saliuam largam & spumofam profundunt. Aures item inclinant, & caudam laxatam habent, se gniusque incedunt & uelut somnolentiores existunt. Si uero etiam current, uelocius solito currunt inuesti pestiue ac inordinatæ. Huiusmodi canes fugere oportet. Omnes enim qui à rabioso cane mori sunt, si ne-

glesti fuerint, aut male curati, in affectionem timoris aquae incidunt. Et hoc maxime patiuntur qui uitio-  
sis humoribus repleti sunt. Vnde quidam statim ubi  
commorbi sunt, aquam & alios liquores timet. Alij  
post quadraginta dies. Alij post longius tempus.  
Conantur autem ipsis grauior perturbatio; quum  
aquam, aut aliud quoddam pellucidum speculum ui-  
derint. Aspiciunt enim faciem suam rubicundam, ac  
toruere nudentem, atque ira plenam. Fieri autem potest,  
ut quemadmodum aliqui dicunt, etiam canis a quo  
morbi sunt imaginem in aquis apparere imaginem  
tur. Recordati autem formae canis, cōferunt ab im-  
modico timore corripuntur. Hoc uero patiuntur  
omnes immodicam siccitatem. Nam philosophus quidam  
morbus a rabioso cane, & generoso animo affectio-  
ni resistens; & in consequens ratus canem in balneo  
apparere: apparebat enim ipsi quemadmodum etiam  
alijs hoc modo affectis. Ratiocinatus igitur & sic se-  
cum loquutus; Quid canis & balneo commune est?  
superauit affectione, & sanatus est ab affectione, ubi  
citra timorem bibisset. Quum igitur aliquis a ra-  
biofo cane commorbus est, ei quam celerissime per re-  
ceptam curationē auxiliari oportet, etiam si paruus  
& in superficie consistens fuerit morbus, de hac recer-  
ti, quod nullus ex his qui non probe curati sunt effu-  
git. Primum itaque uulnus maius facere oportet,  
osculo ipsius per scapellum diuiso ac dilataro. Deinde  
etiam fistulis incisis omnem circum circa locum  
uulnicare, eo studio ut effluxum sanguinis multum  
per locum efficiamus. Vlcus uero cūterijs ignitis  
amplioribus inurere. Deinde porrum imponere,  
aut panem cum sale trito, aut ceptas, aut allium. Et  
ubi cruste exciderint, ulcera ad dies quadraginta aut  
sexaginta a cicatrice areere. Et si ad cicatricem perue-  
nerint, rursus per cinerem uitae aut fulcurem, & si  
nulla ulcera resolueret. Hac de causa bonum est etiam  
folia marrubij, & anagallidem imponere. Hæc uero  
etiam a ceraste serpente morbis magnopere auxi-  
liatur. Vlcus autem perfundendum est chamæmeli,  
& radicis rumicis acuti, quem oxallidem uocat, de-  
cocto. Noui ego quendam senem, qui ubi quis mor-  
bus esset a rabioso carne, sola oxallide curabat. Nam  
& ulcus decocto perfundebat, & herba inungebat, &  
de ipsa bibendum dabat. Et hoc pharmacum uelut  
robustum ualde laudabat. Mingunt aut homines qui  
ipsam acceperunt multa & intempera. Et propter  
ea morbum regium hæc expurgat. Nos uero etiam  
impedignem ex ipsa cum aceto confictam depellit  
mus, & pruritu auxiliamur per eandem radicem.  
Videtur etiam ipsa ad morbus canis rabiosi cum  
alijs auxilijs. Similiter facit etiam syluestris rumex  
aculeatus, radicem habens oblongam, uelut raphanus  
paruus. Commodum est etiam ipsis pharmacum Ga-  
leni ex picæ brutia. Est autem hoc. Pids brutæ lib. 1.  
opopanacis quadrante, aceti hemina 11. Opopa-  
nacei cum parte aceti terito. Residuum uero aceti  
ad picem adijce, & coque donec acetum consumatur,  
atque ita ad tritum in mortario opopanacem diffun-  
de, & unita excipe ac impone, & hoc pharmacum per  
dies quadraginta aut sexaginta utere, & non permit-  
tere ultus cicatrice induci. Bonum est & theriacam  
antidotum ex uiperis oleo rosaceo diluā. Vulneri im-  
ponere. Sed & aridum hoc ipsis cōuenientissimum  
est. Salis fossilis drach. viii. chalcitidis drach. & vi,  
Hæc

scilla drach. xvi. rutæ uiridis drach. iiii. æruginis ra-  
fæ drach. iiii. seminis marrubij drach. 1. Reponitur  
siccatum in sole, in ærea pyxide. Vere primum sic-  
co, donec crusta inducatur. Deinde cum rosaceo, do-  
nec crustæ exciderint. Sed & potamogeton cum sale  
impositus non permittit incidere in affectionem tra-  
moris aquæ. Vere autem hæc herba & humida &  
sicca. Danda est antidotum theriaca in potu per pri-  
mos tres dies, nouis auellans magnitudine. Neque es-  
nim aliquid noui, qui cum accipit aquæ timore cora-  
reptum. Nec uero ab alijs auxilijs abstinentendum est;  
sed danda maxime est antidotus celebris ex cancrijs  
fluuiatilibus. Est autem compositio eius hæc. Cancro-  
rum fluuiatium magnorum uiuorum, in uase æris  
rubri uisum cineris dextantem, gentianæ quicun-  
cem, thuris unc. 1. preparandum est hoc pharmacum  
mense Augusto luna decima octaua. Si uero non as-  
fuerit quod sic præparatum est, nihil de hoc curiosus  
sis, sed quocunque tempore paratum exhibe uelut di-  
ctum est. Præstat tamen lignis uitæ exustione ipsos  
rum facere. Dato cochlearij mensuram cū aqua cali-  
da ad dies quadraginta, si ab initio hac potione usus  
fuerit. Si uero non ab initio, sed post aliquot dies, da-  
to quotidie cochlearia duo, donec impleueris qua-  
dragina dies. Facit quoque per seipsum cinis cancro-  
rum potus, & cum melle uulnere impositus. Præpa-  
ratur quoque antidotus ex nucibus, etiam febricitanti-  
bus tam conueniens. Nam supra hoc quod affectioni  
resistit, agere somnum conlatis. Compositio eius  
hæc est. Sagapeni drach. 11. opij thebaici drach. 11. ci-  
ci sesquicrupulum, lycij indicis scrupulos x. & dimi-  
dium. carnis nucum iuglandium non ualde ueterum  
drach. x. excipe & exhibe drach. 1. cum aqua pluuiæ  
li calida ad noctem, post uigorem febris. Ita ut ma-  
ne quidam antidotum ex cancrijs, uespero uero ex nu-  
cibus præbeas. Quod si hæc antidotum non adint, da-  
to confectionem cyphi appellatam, siue eam quæ ex  
regibus xxxvi. constat, siue eam quæ ex xxxviii. par-  
ratur, habueris; commodus est etiam succus cyrenæicus  
aut parthicus, sabæ magnitudine deuoratus. Quidam  
hepar ipsius canis, qui momordit coctum, præbere  
commorbo. Mergi quoque itur asfarum datum cū  
oleo ac modico sale commodum est. Adiunt enim ita  
efficax ipsum esse, ut eger euestigio aquam petat. Sed  
& hippocampus marinus assatus comestus prodest.  
Sanguinem enim ipsius amoræ aquæ inducere dicunt,  
& formidini aquæ resistere. Vnde iterum atque iterum  
hippocampus edere iubent. Et ipsos hippocampus  
cum acri acetum tritos ulceri imponunt, & hoc phar-  
maco sepe rabiem superant. Quin & catuli coagu-  
lū cū aqua datum, utilissimum ab ipsis bibitur. Et ubi  
semel ipsum acceperint, assidue cōmouet ipsis potus  
cupidiatere, & bibunt etiam alios liquores intrepide.  
Oportet autem catulum non multior diu diem esse;  
sed recens narū & adhuc lactentem. Prodest ipsis etiam  
leucanthemum herba pota. Tantam autem eius uim esse  
aiunt, ut si ex ea fundum poculi subliniar, ac exhibe-  
atur, ipsi libenter potum accipiant. Idem etiam de  
chamæmelo traditur. Vtilissimum autem est ipsis  
bitumen Iudaicum potum cum aquæ cyathis tribus.  
Datur ex ipsis perfectis scrupulus unus, aut uelut a-  
liud exemplar habet, drachma una. Vtiliter etiam da-  
tur syluestris fici uirgultorum cortex siccatus ac uis-  
sus & cum aqua potus. Et lycium indicum. Et abio-  
thium,



thium, & scordium, & centaurea parua. Aristolochia, artemisa, chamædrys, bryoniae radix, polium, laser, cancrorum fluuiatum decoctum multo anetho cum ipso cocto. Substernitur autem commodè & infernuntur ipsis ursa pellis, & phocæ. Sed & hyanæ pellis efficacissima est, ut ipsis insecta uelociter mentē in integrum restituit. Quin & pellis hyanæ exusta, ita ut cinis in potu detur, affectionem formidinis aquæ sedat. Cognitionem autem an homo à periculo liberatus sit, ex his sumitur. Vltus nuchus regis leuissimè tritus integre. Sequenti uero die solue, & cataplasma gallo aut gallinæ edendū obijce. Si enim ex eius esu nō mortui fuerint, tunc ulcus ad cicatricē perducto, nimirum uelut liberato agro à periculo. Vere autē eodem etiam ab initio ad dinonem. Si enim galinæ esu cataplasmatīs prima die impositi ulceri nō moritur, scito non à rabioso cane hominem mortuum esse. Si uero mortua fuerit, uice uersa. Primum enim ne attinget quidem. Si uero à fame coacta edere rig morietur, si rabiosus canis fuerit. Hoc igitur quod tūc alterare oportet, donec ex eius esu gallina non moriatur. Cæterum ulcus ipsum optime ac tuissimè ad cicatricē perducit antidotus theriaca, cum rosaceo diluta. Vleeribus autem ad cicatricem perductis, ueratrum album præbeatur ad totius affectionis destructionem. Nam & rabiosi canes hoc cū potentia accepto uomunt, & statim resipiscunt à rabie liberati. Fieri etiam poterit quod opus est, si per Rusticam infra purgaris, ubi quid prohiberi ueratri acceptationem. Danda est etiam quotidiè ueratri purgationem, sed tanquam auxiliare medicamentum, nuchæ ætellanæ magnitudine, cum cyatho decocti saluæ, aut herbarū sideridis, quam heracleam appellant. Quiddam etiam sola ipsa utuntur, & multum prodesse dicunt, & propterea etiam Alyssum, ab eo quod rabiem extimat, ipsam nominant. In uidu indigentia & repletio usanda sunt, & magis indigentia. Nam indigentia humorum malignitates augent, quod nequaquam commodum est ulceri maligno. Quapropter alimentum moderari oportet, quo & probe concoquat corpus, & succulentissimum ex bono fucto fiat. Quin & egestionum quotidianarū & mictionum cura habenda est. Ad hoc autem faciunt & prædictæ radices, & scandix comesta, & sceniculum. Cichorium autem tum uenrem, tum urinam mouet. Cichorium uero syluestre etiā stomacho commodum est crudum comestum. Appellant ipsum aliqui serm, aut picridem. Osmodus est & brasice asparagus, & asparagus palustris, & rumex horrensis, & agrestis, & acutus. Erax piscibus qui tenent carnem habent gammari & cancri, & herina ceteræcentes cum iuno mulso. Ex carnisbus exurentes partes, & uolucres omnes montanæ, concoctu faciles ac boni fucti. Vinum tenuē & albū, non ualde uetus. At uero præseruationis gratia singulis annis appropinquante eotempore, per hieram præpurgarī oportet. Et instante tempore theriacam antidotum accipere per triduum.

De cerebri inflammatione.

Cap. xxv.

Cerebrum inflammatum sæpe ita intumescit, ut etiam suturæ capitis disparentur, & dolorum maximum ac exurentem compressis membranis inducit. Consequitur nauſea & stomachi multa, & bilis uomitus, & rubor maxus in facie consistit, & oculi prominent, & facies intumescit, itemq; totū caput. His ergo uena

secunda est a cubito. Oportet quoq; à naribus & uenis sub lingua sanguinem euacuare. Vere etiam irragationibus capitis, quarum usus alijs ad inflammationes adhibetur, & cataplasmatibus humectantibus & concoquere ac maturare potentibus.

De erysipelate cerebri.

Cap. xxvi.

Fit & erysipelas, hoc est, ignis sacer, in cerebro, & patitur æger hæc. Dolet totum caput, & uidetur pili flammā in potu habere. Et facies ipsius frigida est, itemq; præcordia. Et os licatur. His igitur uena secunda, & præter uenam sub lingua incidantur. Forinsecus autem adhibe capiti frigescentia ungenta, & pafillos quibus ad erysipelata uitimur.

Desyderatione. Ex Galeno.

Cap. xxvii.

Syderatio propter repetitum exitum, indicat humorem crassum, aut frigidū, aut uiscosum implere principales cerebri uentriculos, & non propter intemperiem totius essentia eius fieri. Magnitudine itaq; periculi, ex magnitudine lesionis respirationis coacta. Quum enim respirationem multū impeditur, & uix fieri uideatur, non paruam morbosam affectionē coacta in cerebro factam esse. Est autem syderatio Græciæ apoplexia appellata, priuatio sensus & motus totius corporis, una cum lēione principalium actionum, de repente incidens. Ex Archigene. Syderationis affectio ex natura magna est, & uehementer acuta. Contingitq; ut qui periculū effugerunt in diuturnū morbum incidunt, resolutionis aliarum partium, aut etiā totius corporis, aut etiā uoluntatis rationis. Sensibus autē magis accidit affectio, & magis in hyeme, & constitutione frigida, & ex uehementibus cruciatibus, & ardoribus uehementibus, & immodico uinum potu ac ebrietate. Talia enim habiti perfrigerant. Et in tumma qui in hanc affectionē collapsi sunt, uientes sunt cum mortificatione, aut cū tota sensus priuatione. Primum igitur corpus oleo calido inungendū est. Caput autē rigidum rosaceo cum aceto. Coquendū est autē in aceto serpillum aut spondilium. Odoramenta quoq; adhibenda sunt, castorium, opopanax, & galbanum. Et aperto ore, instillandū est acetū multum. Et pinna oleo cyprino, aut irino, aut narcisismo imbutæ immittendæ sunt, & uomitus prouocandus, & sedes assidue illinenda cū ruta & cumino, addito nitro ac melle, ad flatus prouocandos. Si uero hec nihil profecerint, clysteribus utendū est ex decocto fursurum, & cucumeris syluestris radice, & centauro, nitroq; ac melle. Aut ex muria cum melle ac oleo ruta cœo. Entendū autem est ut quod infusum est, emittatur, per iñtorum ac uentris frictionē. Et si opus fuerit etiā digiti in sedē immittantur & obturamēta educta. Hæ peractis uena secunda oportet periculo prædicto. Detractio autem fiat à dextrā manu, & copiatius qui detrahitur diuidatur. Commouere enim oportet tantū, non excolere uires, & calorē extinguere. Insipientium etiā pulsus in euacuatione, & faciei color, ac respiratio. Et si nihil mali cōsequitur, etiam repetenda est detractio. Post uenæ sectionem, adhibeantur odoramenta excitatoria, & uiscificationes. Et corpus totum inungatur. Et si qua pars resoluta fuerit insigniter, hapso lane integatur. Sicyonio autē pingui ueteri oleo imbuto. Qui uero ad uenæ sectionem iniepi sunt, primum ad uomitum, uelut dictum est, commoueantur, & sedes ipsorum illinatur his quæ flatu educunt. Deinde post illidones, cucurbitis cō-



cusere conamur magnis & fortibus, rectorum iuxta lumbos affixis, & ubi per tempus aliquod atraximus, transferimus ipsas utrunque ad pectinem ac inum utrem. Saep enim expresserunt ea quae in ventre sunt, & simul cum expressione reuocant morbo occupatos. His uero nihil efficientibus, aliquando ipsi ausi fuimus ori hieram infundere. Et quia fuscipere non possent, quantum oportet, per dycterem infundimus. Et priusquam quicquam egeretur, accidens concurrentia reuocantur, ne ad ampliore aggregationem. Et sane permittit haec affectio, ac co-actum uel temere omnia sentare. Haec igitur in necessitate sunt. Vbi uero tolerare possunt, etiam reliqua auxilia annecte. Febris tamen occupat hominem, alios prima, alios secunda die, & exhibet ipem salutis ipsa calamitas febris. Sed nec negligenda est. Verum si qua resident in intestinis, ea educere oportet. Si deorsum repant, per dycterem. Si sublimia sint, per purgatorium inferne pharmaci, & maxime per hieram Archigenis. Post purgationem cucurbitae praecordis ac capiti affigantur cum scarificatione. Si uero aliqua compunctio etiam inferius fiat, illic quoque scarificatio adhibeatur, praeteritum in mulieribus, iuxta uteri regionem. Quod si ad aliam quandam affectionem transitus fiat, curatio ad illam adapteatur. In summa uero prouidendum est in syderatis, ut facilius fiat per alium ac urinas excretio. Curandum est autem ut accipiant cibos quotidie quidem, uerum pauca & leues ac calidos, & exterioria uel praeditos, plerumque cum melle eductos.

*De resolutione, ex Archigene, lib. i. Cap. xxviii.*  
Quum omnes nervi sensum simul ac motum amiserunt, Syderatio appellatur affectio. Si uero iuxta alteram partem, siue dextram, siue sinistram hoc contingit, Resolutio uocatur, illius partis uidelicet iuxta quam facta est. Constat haec affectio, humoribus multis viscosis ac crassis nervos obturantibus, per quos motus uoluntarii perficiuntur. Manifestum igitur est quod redundante humore euacuare oportet. Nec uero apud principium in his reperire datur quam a uene sectione, si quidem permixti aetas, habitus, tempus, studium, praegressus uitae, & reliqua quae prohibere solent uenae sectionem. Oportet autem moderatam detractionem facere, ut ne perfrigerentur. Frigiditas enim cum siccitate, uelut dictum est, affectionem inducit. Quapropter solum imminuenda est materia paululum per uenae sectionem, & praeteritum in profectioni aetate. Detractio uero fiat a sanctoribus partibus. In hoc autem tempore coniecta esse oportet mellebra, hapso lanae oleo, sicyonio aut glucinum iunctura. In profectionibus aetate etiam castorium inspergendum est irrigationi. At in his qui derepente resoluti sunt, uelut ex ardore, praestat irrigatio ex lanis succis, & oleo ac aceto, aliquando etiam nitro. Saep uero irrigatione renouare oportet. Cibis conuenientibus modicis. Sint autem prohibitiones alicuius horae, & alicuius praesentis. Interpositis diebus quibusvis a uenae sectione, alius subducatur, primis dycteribus. Deinde etiam per aloa & polypodi, ac colocynthidis cremorem purgetur. Conuenit etiam hiera Archigenis pro uitis accepta. Post purgationem cucurbitae affictis partibus adhibeatur. Si uero haec ineptae fuerint, uicinis affigatur. Post cucurbitas utendum est cataplasmatibus ex semine lini, & feno graeco, ac ordi farina, cum oleo uinari coctis,

& pulueribus inspersilibus ammixtis. Aut etiam emplastris quae acciperunt picem, resina, mannathuris, aliquando etiam bitumen. Egrege facit & acetum coincta, & calamintha, ac ruia, & conyza. Postea uero etiam nitrum ammixcemus, & in muria cataplasmata coquimus. Modicum autem aquam esse oportet, quae & ipsa in coctura consumatur. Postea autem pro lini semine, farinam loliaceam & fabaceam adhibere conuenit. Optimum est & erysimum. Deinde cerata & unguenta adhibeantur. Alius autem semper facile solubilis sit. Cataplasia ad resolutiones, tremores, & opisthotonicos. Succus cyrenais, piperris, galbani, singulorum drach. i. passio dissolutio ac facta cataplasia, & dato ex eis obol. ii. & his acceptis absorbeant aquae melle cochlearia duo aut tria. Aliud ad tremulos, resolutos, & opisthotonicos. Myrrha, castorei, styracis, piperris, & qualibus paribus utere. Aliud. Opopanax, uiscagapeni, castorei, myrris, succi cyrenais, piperris, uiscagapeni, singulorum drach. i. praepara cataplasia & exhibe, & insuper absorbeant aquam mullam. Unguenta uero idonea sunt huiusmodi. In aliquo ex praedictis oleo scilicet macerare oportet in sole ad dies quadraginta. Si uero tale oleum non affuerit, in praesens scilicet sextantem in oleo sextario coquere oportet. Similiter etiam canchry, hoc est libanoidis semine utendum est. Ammixendum est & ceræ parum, & galbani, & propolis, aliquando etiam castorei unc. i. & adares ac euphorbii, sing. drach. i. & niri drach. i. Commoda est quoque ranunculus herba similiter preparata. Manifestum est autem quod a lentioribus incipere conuenit. Sed & cerata ex his parati possunt, adiecto pyrethro, bacis lauri, nitro, sinapi. Malignata uero conueniunt ex bacis lauri, & quod uiride appellatur. Saep uero sufficit ceratum cyprinum, largo sinapi ammixto, quod malagma uisum exhibet. Conueniunt etiam singmata ex fece uini, & aceto, & combusta adare, euphorbiae ac calce uini parata. Sed & dropaces ipsis commodissimi sunt. Sint autem leuia omnia quae imponuntur, propter corporum debilitatem. Reuocat autem sensus etiam diaphanum aqua illita aut cum aceto, post dropaces. Item illitio ex cantharidibus. Verum ulcerationes ex talibus sientes citissime citius includere oportet. Quin & si opipini ipsis commodi sunt, & postea balnei. Utendum est post purgationem etiam potionibus ipsis conuenientibus. Castorium itaque assidue ipsis datur drach. ii. pondere cum aqua mulla. Et opopanax magnitudine fabae, cum castoreo, & sagapeno erui magnitudine ab ipsis deuorentur. Item succus cyrenais eadem magnitudine. Sed & farnetorum uitis uiridum decoctum, a ieiuniis assidue potum ualde prodest paribus corporis resolutis. Vtilissima est etiam post purgationes & alias euacuationes, hierica ex uiperis anidous, & mithridatica. Est & simplicius pharmacum ualde celebre ad huiusmodi affectiones, hoc. Castorei, seminis rutae syluestris, opopanax, cis, sing. obol. ii. pyrethri obol. i. acori tantum, & peris gran. x. Cum aquae melle cyathis ii. dimidii huius totius primi dato, robusto uero totum. Vniuersa uero cyrasso, ac capite iniungatur. Hoc enim radix est & principium totius affectionis. Quapropter illiones ipsius sint, castorei, pucedanum, bacca lauri, & menta. Haec modico acri aceto exapiatur, addito irino

irino ungeto, ut liquidioris ceræ crassitudo fiat, & illinatur ex hoc totū caput usq; ad frontem. Sed & odoramenta eiusdem generis adhibeantur. Postquā autem alius efficaciorē clystere præuacuata est, & totū corpus iam minus superfluitatum habet, cucurbitæ capiti adhibeantur, qd scarificatione, primū quidem tali quæ multum sanguinem extrahere potest, Deinde uero moderatiore. Hoc autem auxilium sæpe adhibendū est, leuibus & inanibus cucurbitis primū in capiti circumpositis, & deinde locis agglutinatīs. Sic enim affixæ nihil minus quā repetita sanguinis detractio possunt. Tonsura uero non solum cucurbitarum gratia, sed etiam per seipsum assidue fiat. Si uero ambiens nos aer non fuerit frigidus, etiam rasura commoda est. Stasim autem prædictis illitionibus caput modicè confricandum est. Postquam autem detracta fuerit materia, etiā ternuatiōis & pituitam per os ducentibus utendum est. Ego uero etiam crustas inurare non dubitarem per ignem, aut per medicamentum. Vnam quidem circa occipitis cauitatem, quo loco spinalis medulla inidum habet, duas autem ab utraque ipsius parte. Tres aut quatuor in uertice. Vnam ex his in medio capitis, tres circum ipsam. Vlcibus enim diutius fluidis permanētibz, non despero perfectam restitutionē. Reliqua diæta sit attenuatoria, uentri cōmoda, nihil uiscosi aut uisosi habens. Et quæ urinam diem alimētis ammiscetur. Utendum est etiam potionibus relatis ad morbum comitalem, & uentis ad arthriticos referendis. Quum enim communia sint hec, superfluum est eorum etiam hic meminisse. Si uero fuerit æstas, etiam in totum detegantur loci, & denudati aëri exponantur. Quibusdam enim hoc tempore principii recuperationis actiōnem contingit.

De supercilij aut palpebre resolutione. Cap. xxi.

Si supercilij aut palpebra fuerit resoluta, curabūtur ungentis calidioribus & acrioribus fronti illitis. Palpebra uero collyrio ex sandice & germinū oleæ succo illinatur. Optimum autem in ipsis, & maxime in supercilio relaxato, hoc. Mastichē cū succo balsamicæ nō longe terito, & disticta frontis cute, fronti crassius illine. Perseuerante uero affectione, palpebrā quidem sutura curat. Supercilij uero fasciæ de frōte ablatio.

De conuulsione canina. Cap. xx.

Caninam conuulsionem uocant mandibularium musculorum resolutionē. Distorquetur igitur in obliquum os, nasus, & oculus, & in summa, dimidia faciei pars. Auxilia itaq; resolutæ parti adhibeantur, non oppositæ. Decipiuntur enim aliqui, qui mandibulam ab opposita parte distrahi putant. In communi igitur ipsis commodant omnia in resolutione relata. Nā & sanguinis detractio, si nihil prohibuerit, & purgatio, & clyster, & cataplasma, & ungenta, & malagmara, & sinapismi, & taphasi usus, cōducit. Priuatim uero deligatura quæ ad opposita reducit. Et sanguinis detractio à uenis sub lingua. Et cucurbitæ duobus uerticulis impositæ. Et quæ pituitam per os detrahunt, itemq; quæ per nares. Iam uero etiam acrioribus illitionibus utendū est ad oculū affectū, præsertim collyrio ex sandyce & germinū oleæ succo.

Lingue resolutæ curatio. Cap. xxxi.

Si lingua fuerit resoluta, uenæ sub ipsa secantur, corpore uniuerso prius euacuato. Et cucurbita sub mētum ponatur. Et quæ pituitam per os detrahunt, & collu-

tionem ex sinapi, & linguae exercitia adhibeantur. Reliqua item occipito ac collo uniuerso admouentur, uelut sunt illitiones acres, & epithemata, & sinapismi.

De instrumenti uocalis resolutione. Cap. xxxii. Resoluitur & uocale instrumentum; scilicet inquam muscoli, & extremitatis asperæ arteriæ, imò etiam thoracis superiores. Spiritus itaq; in ipsis supprimuntur. Quidā etiam gracilem uocē acquirunt. Alij uix loqui possunt. Et alijs aliter uox impeditur. Proinde de post uniuersalia auxilia, etiā thoraci adhibeantur ea quæ antea enumerauimus. Et gargarismi acres ipsis exhibeantur. Priuatim uero ad ipsos utendum est spiritus detentione, & coaceruata expiratione, & continua uociferatione. Post hæc autem per uictum ac exercitia uniuersum corpus corroboretur.

De gluttoniæ resolutæ curatio. Cap. xxxiii. Si deglutitiō resoluta fuerit, hoc est, delarix ciborum promptitudo: nā si stomachus, hoc est, gula resoluta fuerit, pernitiē inducit: calida omnia adhibenda sunt. Priuatim uero conandū est ut cibi indatur quā penitissimè, ut ne ad asperā arteriam dilabatur. Cucurbitæ quoq; mento affigantur. Et ungenta ulsurpantur ad partes luxta tonsillas acris, ex castorio, sagapeno, succo cyrenaco præparata. Gargarismi itē ex sinapi. Et quæ cōmala pituita ducit. Fortisecus quoq; adhibenda sunt illitiones cōmunes prædictæ ipsi mēto.

Vesicæ resolutæ curatio. Cap. xxxiiii.

Vesicæ resolutio siue detinuerit urinas, siue inuoluta sit excreuerit, isdem communibus auxilijs curabitur, circa pectinem & maxime circa intercapedinem inter anum ac scrotum adhibitis, quia parte firmum est uescicæ collum, quem locum quidam sran, id est case nulam appellant. Utendū est autem supra prædicta, irrigationibus pectinis ex ungeto nardino, & malagmarino sulfino, ac sicyonio, in quo cocta est eryngii radix, cyperus, cardamomū, ruta. Sed & sedes his illinenda est. Post cōmunia uero auxilia, etiā per infusa in annum conandū est reuocare uescicæ actiones. Sunt aut hæc, à principio quidē castorium cū oleo sicyonio, aut ruta, aut cumino, aut anetho in oleo cocto. Deinde centaury & colocynthidis decoctum, ita ut modò cū aqua, modò cum pilanæ succo simul coquantur. Optime facit & anagallidis succus. Et origani ac thymi decoctū. Omnibus autem ammiscendum est oleū sicyonium & castorii. Aliquando etiā opopanace & galbanū in ipsis eliquamus, si frigoris sensus ipsis affuerit. Infundimus etiā per colem oleū sicyonium cū castorio aut opopanace. Quandoq; etiā silphij in oleo coquimus. Priuatim uero in his qui urinas detinent cathetere in instrumento immisso ad urinas prolestandas utimur. Et post urinae euacuationem, cathetere adhuc infuso, aliquod ex prædictis infundimus, angustissima fistula ad utrē parata, quæ catheteri adaptari possit. Et mirū est quanta inde utilitas emergit, ex infuso uidelicet post urinas excretas. Utendū est autem in urisq; etiā urinam cietibus, per interualla: Velut est sion, & iunci odorati flos, ac similia. Utendū & aceto ac uino scillino. Dicitur autē de his amplius in Sermonē de affectionibus uescicæ.

Colicæ resolutæ curatio. Cap. xxxv.

In colicæ resolutione urinae excretionem non impeditur. Seminis autem excretio & coitus impeditur. Oportet igitur auxilijs ad uescicā relatis uti. Priuatim

uero nunc etiā coxendicibus calefactoria adhibere. Etiam quoque tendiginem sciētā, de quibus suo loco dīcētur, exhibere. Facit autē cum reliquis pūdendum cerui semori uelut uena alligatum. Et carnes ipsius cōmēstā, & potypī marini, & herinacē. Et ex uolueribus iturni. Castorium autē in omni resolutione commodum est: Caudē uero sunt in ipsis omnia frigida edulia ac potiones.

*Intestini recti resoluti curatio. Cap. xxxvi.*  
Intestino recto resolutō omnino inuolūtariē sterēora exēcrētur. Aliquando uero etiā sistuntur. Itaque etiā auxilia eadē sunt quā in uesica sunt resāta, coxendicibus adhibita. Pruram uero in his resāta additā rētia & corroborantia, nūc pingula & leuia, per dyltē rem infundimus, & rursus mordacia ac lancināntia. Proinde cupressi ac rubi decoctū adstringit, maxime ubi immolēcegerit: Suillus aqūē & anserinus adeps, & oleū malua maxime pinguedine ac tenui, ubi sterēora supprimuntur aut acra existunt. Muria uero & colocynthidis decoctū, itemq; centaury, ā rēmisiā, conyzā ac thymi lancināt ac mordēt. Egre gie facit & trifoliū bitūmē oleūis decoctū. Quū autē rem frigiditatis sensus affuerit, comodū ē rētiā filpīū, & gentiana, & bryoniā radix, in omnibus inlūsis sedis. Ego uero aliquando etiā acopon lasitūdine extima ex ex euphorbiā paratūm diluūt, per dyltērem cūm foeti grāci decoctō immisi, & bene succēssit.

*Crisus aut alterius cuiusdam membri resoluti curatio. Cap. xxxvii.*  
Si crūs aut manus, aut aliud membrum resolutū fuerit, commūtia auxilia in resolutione resata adhibeātur, & exercitiā moderata unicuique parti congrua. Utendum est etiā in omni resolutione uigentis quā ad arthriticos referentur. Cibi uero sint in omnibus faciles cōcoctū, attenuatū, uentri commodi, nihil uiscosū, aut mali sūci habentes. Vinū sit albulū, reuē, & non ualde uetus. In summa uitanda est corripit, frigiditas, ardor, odium, lasitudo, coitus, uini multi potus. Ex epistola Archigenis ad Marsum, potio resolutis conueniens, de qua sic ait: Optimum est hoc pharmacum, & ad euoluendū affectiones ualde a me probatum. Castorij, seminis rūrē syluestris, opopanax, singulorum obolos ii, pyrethri, acori, singulorum obolum unum, piperis grana x. Cum aqua mulse cyathis ii, dimidium ex hoc primum dato: robusto uero totum. Indicat autem obolum habere si liquas res.

*De consulsionibus aut dissectionibus. Cap. xxxviii.*  
Quū itādem a principio, aut non multo post principium morbi, sunt consulsionē, & permāserint, ex repletionē originē ducunt. Quū autem multas sudoribus praegressis, aut uomitibus, aut uentris excretionibus, aut sanguinis eruptione, aut post uigiliā, aut famē, aut motus multos & uehementes conuulsae fuerint, ad euacuationē consequuntur. Et ubi etiā in sanis contigerit aliquas partes repente conuelli, ob repletionē fieri necesse est. Si uero ex febris bus ardentibus succedit consulsio, ob uehementē inflammationē totius corporis, & maxime neruosaū paratūm siccitatem contingit, & est huiusmodi malū maximum ac fere incurabile. Quū igitur corporis partes antrosum distendantur, emprosthotonus appellatur, quū retrorsum, opisthotonus, quū uero aequaliter in utraq; partem tenduntur, tetanus uo-

catur, consulsionē itaq; ob uehementē siccitatem ne rō cura uerit. Eas autē quā ob plenitudinē aut inflammationē sunt curaturis, plenitudinem quidē euacuandō, inflammationē uero, proprijs ipsius aut adhibitis. Fit etiā consulsio in his qui uehementē ob uomitibus lancinantur, & sedatur ubi quā molesta sunt per uomitū fuerint resecta. Auxiliatur consulsionis succus centaury tenuis potus, & leuē cūm atēro mulso aut posca. Castorium autē non solum potum, sed etiā foris illitum commodat. Atq; ex his beatis his qui ob plenitudinem conuelluntur.

*De Tetano sine dissectione & consulsionē. Cap. xxxix.*  
*Archigenē.*

*Quid significet tetani nomen, iam ante dictū est. Corripuntur autē hac affectione cum ob alias causas, ite sue dictū est, tum ex uulneribus; & in foemina ex abortu. Verū tetani ex uulnere stēntes non ita sanantur. Neq; autē pueris, neq; senilibus consulsio fit tetanica. Infantes enim magis infecti morbus comitā. Iis. Quare negligendū non est, sed uena secanda, si dīstentio ex uulnere cōsequatur. Cōpia uero detrahenda est in illa quidē, sed tamen non usq; ad antm dēli quūm. Et paulo post exhibeatur alica cū aqua multa. Sit autē modicum quod exhibetur. Et ex aqua & oleo tepido argi illinantur, & in solio desiccat infra umbilicē. Oportet autē & partes quō non madescit p̄rē illinere, & praefrētū caput, & probe cōtegere ut ne impleatur. Vngenta autē & illidones adhibeantur ex oleo sicyonio & gleucino, aut irino, aut oleo ueteri. Conueniunt & ugentia lasitūdine extima modēte calfacientia, uelut ei quod scetidū appellatur, & quod ex sampsuchū sit, & quod ex populo nigra, & similia. Quorum cōpositiones in Sermone de arthriticis referentur. Si uero non a uulneribus, sed ex repletionē fiat tetanus, post uenae sectionē, uigentis magis lancinantibus utendum est, quā ad artem habet, & similibus. Deinde etiā cataplasma tā locis affectis adhibeantur, quā laxare ac discutere possint simulq; lenire. Et haec maxime musculis circa collū & maxillas ac spinā adhibeantur. Horum autē materia sit foenum graecū, & semen lini, & farina ordacea ac loliacea. His addatur terebinthina resina, & galbanū, & mel ac oleum multū, in quo decocta sunt ruta, conyza, aut artemisia, aut libanotis. Infartiatu etiā aliquado ammoniacum thymatama. Sin autem mollissima ac leuia cataplasma. Sed & fomentum adhibeatur incumbētē cataplasmate, ex uesica magna & oleo calido semiplena. Aut ex sale frictō, aut ex millo in sacculis. Sed & cataplasmata in saccos cōsecta imponantur, ut fomentum dura inquit namēti fiat, & praefrētū si capiti id imponere oportet. Vitandae autē sunt asiduae irrigationes capitū. Caput enim inde repletur. Occupet cataplasma & irrigatio, ceruicē & maxillas ac totā spinā usq; ad lumbos. Inpergatur irrigationibus castorium. Et cū turbata cū scarificatione locis affectis omnibus affigatur. Temporis autē successū etiā folia ex oleo assumantur moderate, bis aut ter in die, ita ut quinta olei pars ad ignē calēat, reliquum in solium mittatur. Domus autē calida appareat. In potu conueniunt optimū apomeli, & radices filpī decoctū, & ipsa trita, & hyssopi decoctū, & succi cyrenaei magnitudo erūt deuorata, & myrrha troglodytica magnitudo fabae. Ex omnibus autē minime offendit, & maxi*

& maxime efficax est castorium tritum datum co-  
chleari mensura. Post hæc commodat sedis illito-  
nes ex ruta & opopanax. Auxiliatur & olei in-  
fusa rutacei cum terebinthina. Danda est ipsis &  
Arctogenis hiera drach. 12. pondere cum par. casto-  
ris, aut pulsanæ succo ac melle. Deinde quædam ex  
alijs dantur, & ipsum castorium per se.

De capitis dolore distinctiones. Ex Galeno. Cap. xli.

Quæ circa distinctionem doloris capitis auxilia desce-  
pserunt, maius demeritum quam emolumentum  
his qui eis fidem habuerunt, attulerunt. Neque enim  
omnes ob unam affectionem caput dolent. Sed cum  
ipse affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum sin-  
gularum propria existit. Vnam enim affectio est iuxta  
intemperiem simplicem, altera humorum complexu.  
Alia iuxta humorum qualitatem. Tertia uero mul-  
titudinem tantum ipsorum humorum contingit.  
Quarta quum multitudo hæc transitus humorum  
ab uaporum obfuscitate. Ead has adhuc alia, quum  
ob imbecillitatem in aliquibus capitis partibus spi-  
ritus flauosus innascitur. Vehementissimè igitur ca-  
pitis dolores fiunt iuxta caliditatem ac frigiditatem.  
Moderati uero iuxta siccitatem. Ad humiditates autem  
nullas consequitur dolor. Eodem modo quum  
ob redundantes humores, siue iuxta omnes capitis  
partes, siue iuxta unam, quancumque tandem dolor  
contingit, uehementior quidem ob calidos ac frigidi-  
dos, moderatior autem ob resiccantes circa calidita-  
tem aut frigiditatem manifestam oboritur. Hume-  
scentes autem penitus nullum dolorem inducunt,  
quantum ad qualitatem ipsorum attinet. Nam ob  
multitudinem, circa quidem obfuscationem, grauatur  
caput. Cum obfuscatione uero dolores inducunt. Si  
uero multitudo mordacem qualitatem habuerit, do-  
lorem augebit. At uero spiritus flauosus, & uapo-  
rosus distentionem efficit circa mordacitatem.

De dolore capitis ex ardore aut caliditate ob-

ortio. Cap. xlii.  
Capitis dolores ex ardore solis, aut caliditate obortos  
sanant quæ frigiditatem uitam habent, circa manifestam  
adstrictionem. Optima uero ex ipsis sunt quæ essentiam  
tenentorem habent. Quapropter nihil melius  
est ab initio quam optimam rosaceum frigidissimū  
factum, & simpliciter assusum. Sit autem rosaceum eo  
anno factum ex oleo omphacino, circa salis ammix-  
tionem. Proximum a rosaceo locum habet chamæ-  
melinum, ubi moderatam frigiditatem inducere uo-  
lumus. Quum enim uehementer frigidificare uolue-  
rimus, semper uisum succum ammissere conuenit, aut  
polygoni, aut lactuce, aut uisæ acerbæ, aut portulac-  
e, aut pampinorum uitis, aut psyllij, aut intybi. Pa-  
ueris autem & mandragoræ succus uehementer  
frigidat. Quapropter nocturnus est. Cæterum Eras-  
stratus maximum præseruatum in calidioribus ha-  
bitibus esse dicit, ubi quis in sole uersaturus sit, si spō-  
giam latam, densam, aqua imbuiat, & probe expres-  
sam capiti imponat. At si dolorosa caliditas in capi-  
te inualescar, unā cum spiritu flauoso, ab initio qua-  
dam curatione perrepulsiua utendum est, quæ ex  
adstringentibus ac frigidantibus contingit. Postea  
uero ex mitigatorijs ac concoctorijs medicamen-  
tis aliquid ad repulsiua ammissere oportet. Deinde  
etiam ex discussorijs quippiam addendum, paulatim  
de tractis pharmacis quæ repellunt.

De dolore capitis in febribus. Cap. xliii.

In capitis doloribus in febribus coincidentibus, uen-  
secanda est in prima aut secunda remissione, si nihil  
impedierit, & præsertim in bono habitu prædictis ac  
multo sanguine repletis. Animaduertendum est autem,  
ne ob exhalationes ex uentre fiat, aut propter aluum  
suppressam. Si uero posterius post septimā irruans  
præuacuata memorabiliter per dyctem aluo, cum  
curbita occipito aut ceruici affigantur. Et caput ex  
olei irrigationibus mitigetur, rosacei quidem, in ca-  
lidioribus, & hora æstatis, cum modico aceto, chamæ-  
melini uero in non ualde calidis. Anebini autem  
in frigidioribus habitibus, & in hyeme, quinta aceti  
parte addita. Frons uero illinenda est ex cythereo cō-  
fessione in frigidioribus. Crocomagmate autem in  
calidioribus. Porro medele doloris capitis ex febrili  
magnitudine, oborti, in febrium tractatione supra-  
descriptæ sunt.

Ad capitis dolorem ex ebrietate, & meri potatione.

Cap. xliii.

Vina temperie calida maxime generant capitis dolo-  
rem, ut quæ omnino quidē uaporibus caput replent,  
aliquando uero etiam humoribus, calidis. Proinde  
opus est multitudinem quidem euacuare, & caliditatem  
uero frigidare. Rosaceum igitur aut tale quoddam  
non ualde frigidū factū est capiti adhibere. Somnum  
item ac quietem. Et ubi talia per totum diem fuerint  
adhibita, in uesperam lauare oportet, & boni succi,  
cibis nutrire, non tamen calefacientibus. Qualis est,  
pulsanæ aut alicæ succus, & panis ex aqua, & oua,  
forbilla sine garo, & lactuce feruēscitæ. In potu o-  
mnino utendum est aqua. Post omne uero cibum, pa-  
rum dandum est de malo punice, aut piro, aut pomo,  
aut uua passa. Sequenti uero die laquare, & boni succi  
cibo nutriat. Et si nimium tenue album modicum  
dentur. Cæterum præsumpta ebrietatem arcent hæc.  
Amygdalæ amaræ quinque aut septem a ieiunio co-  
mestæ. Vinum abstinentes aut myrteum præsum-  
ptum. Et ipsæ myrti hæc præsumptæ. Brasice cau-  
liculi præcomestis. Ebrietatem autē extinguunt postea  
ingesta, centaurij tenuis decoctum, ceruinum cor-  
nū, uerbacæ rectæ semen cum aqua.

Perfrigerati capitis medela. Cap. xliiii.

In capite recens frigidatō, rutaceo oleo calido, simplici  
irrigare oportet. Si uehementiore caliditate opus ha-  
buerit, parum euphorij oleo insicitur, aut unguen-  
tum irinum illinatur, aut amaracinum, aut lauri-  
num, aut serpillinum, aut nardinum. Frons quoque  
talibus inungatur, & narium ac aurium meatus  
illinantur.

De capitis dolore a stomacho. Cap. xlv.

Quidam etiam si modicus in uentre, & maxime circa  
os ipsius, humor acris fuerit collectus, statim caput  
dolent, humoribus in uentre prauos uapores ad ca-  
put mittebunt, ut aliquibus ipsorum suffusus similia  
symptomata accidant ex exhalationibus, si non cibū  
ingesserint. Et propterea famem ferentes læduntur.  
Augebit enim ipsius huiusmodi humorū malignitas  
propter inedia. Oportet itaque sic uexatos sanare, ita ut  
nihil capiti adhibeamus, uerū quam ciuissimè mole-  
stos uentris humores euacuemus, aqua tepida exhibita  
in potu, et immixtis penīs uomitu proritato, deinde  
de uero, et modicū iteratū cibū boni succi et si to-  
macho cōmodus detur, si fieri potest, lous post uomitu.

Sin minus, ante balneum. Atque hic tantus sit ut ne lædantur dum lauantur. A cena uero parum bibant, & sequenti die mane abstinio & eadem diæta utantur. Et de cætero quotidie circa horam tertiam aut quartam modicum panem accipiant cum olusis albis, aut cū uua passa, aut aliquo huiusmodi, per experientiam reperto, eod quod singulis optimum est. Aliud enim aliq optimum est, iuxta naturę proprietatem. Interpositis autem horis duobus balneum petant. Pessima porro affectio est, ubi uisiosis humoribus in uentris tunicis absorptis, aut ineluisibiliter infarctis, nauææ ac lancinationes inducuntur. Quibus optimum auxilium est aloë pharmacū, quod aloës quidē habet drachmas centū, reliquorum uero quę recipit singulorum drach. vi. croci uero drach. iiii. aut minus, crocus enim caput percussit. Datur ipsi ex hoc pharmaco drach. i. cum aque cyathis duobus. Cauenda autem sunt in omnibus, & præsertim his, edulia natura capitis dolorem inducentia.

*Que ex natura capitis dolorē inducūt. Cap. XLVI.*  
Non solum in his qui caput per stomachi consensum dolent, sed etiam in omnibus capitis affectionibus, uitanda sunt quę natura capitis dolorem inducunt. Sunt autem hæc uisiosis semen, abstinēti succus, lactis surus, glandes quercinæ comestæ, oliuæ nigre, mecylla, eruum. Hoc etiā articulos exoluit. Amplius autem lædunt myrrha, thus, hederæ corymbi. Menter uero perturbant lentilæ fructus, crocus, puceædanum, cyclamīnos sicca cum uino pota, styrax modicus quidem potus, tristitiam discutit, multus autē turbulentos somnos facit.

*Ad dolorem capitis ob plagam. Cap. XLVII.*  
Si uulnus ob plagam facta fuerit, glutinatorijs & inflammationem arcentibus pharmacis utendum est, postquam ulceris labia fibulis impositis constrinxerimus. Si uero usq; ad pelliculam os caluæ ambientem plaga penetrer, ducta pellicula caluariam ambiēte, oisq; conscalpro, iuxta concauationis modum curare oportet. Condingit autem non parū sæpe, in casu præsertim ex sublimi facto, ut quædam partes circa cerebrum aut membranas eius abrupantur, quando sanē etiam periculum uehementius & acutius imminet. Optimum itaq; fuerit in his, nisi ætas prohibeat, & nisi uitalis facultas debilis appareat, a uenę sectione curationis initium facere. Quod si aliter quid uenę sectionem impedit, alium per dysterem euacuabis, reuulsionis simul ac euacuationis gratia. Deinde auxilijs ad inflammationes commodis utemur. At uero membranam cerebri fauciatam, inquit Archigenes, probe glutinat calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inspersa. Deinde butyrum, & rosaceum, & adeps suillus infusus, uerus, si mul mixta & tepesfacta infusa.

*De cephalæa. Galeni. Cap. XLVIII.*  
Cephalæa inueteratus & ægrē cedens capitis dolor appellatur, qui ex facili occasione maximas exacerbationes habet, adeo ut neq; strepitus, neq; uocem uehemētiorē, neq; lumen splendidi, neq; uini potū, neq; odoramētā caput replētā tolerare possint, neq; item mori. Sed in quiete ac tenebris ob dolorem magnitudinē decubare uelint. nā uelut a malleo sibi pertundi uidentur: quidā uero uelut contundantur aut distendantur, & quę circa caput sunt sentiunt. Non paucis autem usq; ad oculorū radices, dolor progreditur,

Habet autem hæc affectio aliquando continuos dolores, aliquando exacerbationes & interualla, siue ordinata, siue inordinata. Intermitunt enim aliquando eiusmodi exacerbationes, uelut in comitiali morbo correptis, interceditq; tēpus aliquod quod omnino accusari non potest. Manifestū igitur est hanc affectionem consimilem aptitudinē capitis, ut faciliē lædatur, uelut in cephalalgids, habere. Verū ut maiorem debilitatem deueniūt in hac affectæ capitis partes. Equidam ex eis cerebri membranas doliūt. Quidam uero membranā tantum caluariā ambiētē. Dolores igitur cum grauitate, humorū multitudinem indicant, cum mordacitate uero aut humorū aut uaporum acredine. Cum pulsū autē inflammationē. Cum tensione uero, si quidem citra grauitatē ac pulsū fiat, status tenuis & uentosū multitudinē demonstrent. Si uero cum pulsū, membranosi corporis inflammationē. Si uero cum grauitate distentio fiat, humorum multitudinē inra membranas cōtinentiam. Et dolores quidem in superficie hærentes, membranæ os caluæ ambientis affectionē significat. Qui uero in profundo sunt cerebri, membranarū. Quibus enim affectio inter caluariā est, his dolores usq; ad oculorum radices procedunt, eod quod oculorū tunica ex cerebri membranis ortū habent. Si quidē igitur humorum aut uaporū multitudinem repereris causam, si quidē propter totius corporis repletionē facta est, uniuerso corpore euacuato capitis dolorē sanabis. Si uero uelut debile existēs caput, ad se sublatos humores ac uapores susceper, materiam reuellere oportet in totum corpus, atq; ita particulæ mederi. Per clysteres itaq; reuulsio fit, & ligaturis extremitatū, & plurius infernarum partiū constrictionibus. Interdum etiam sanguinis detractio. Caput autem curabis, quado quidem reuulsio, ut oportet, per repulsorias irrigationes. Post totius uero corporis euacuationem iam caput euacuabis ac discussorijis uteris. Deinde his quę corroborare possunt. Repellit igitur oleum omphacinū, & rosaceū per se, & cum aceto, & quod ex papaueris capitibus, & oleo teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, ac mēta uiridi preparatur. Adhibeantur autem remedia tepida quidē, ubi frigidior & crudior fuerit humorū multitudo. Frigida uero, ubi calidior & biliosior extiterit. Discussit autem oleū dulcissimū calidū, & hoc magis in ueteratum, item scyoniu. Si uero crassior fuerit humorum multitudo, spondylium aut ferpillū, aut pullegij comam, aut calamintham, aut menā oleo incoquens, multitudinem euacuabis. Eadē hæc etiā robur parti addit. Quapropter usq; ad perfectam curationem eis uti conuenit. Omnium porro maximē discutit, & mirificē corroborat, uerbenaca recta, præsertim uiridis, Imo etiam arida cum radicibus, & simul cum ferpillio, oleo incocta. Coniungenda etiam ad ea crocodiliadis maximæ circa aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se uerbenacam, si oleo incoxeris, caputq; indurigaueris, omni capitis dolori antiquo, ex frigidityte aut ex crassiss humoribus oborto medeberis. Maximē etiā profunt sub aquario uase nascentes aselli, millepede appellati, si cū oleo coquantur.

*De hemicrania. Ex Galeno. Cap. XLIX.*  
Affectio dolorosa iuxta dimidiam capitis partem contingit, quam hemicraniam appellant, & ut plurimum per circuitum exacerbatur. Fit autem propter influxum



influxum uaporum aut humorum, siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum. Et aliquibus cōtingit ut extra caluariā doloris sensum percipient. Quibusdam autem in capitis profunditate penetrat. Alii qui uero temporū musculos uehementer dolent. Diuisione autē ex his quæ de cephalæ dicta sunt fiat. Proinde purgare ipsos oportet, aut prius uenā secare, atque sic localibus auxilijs uti, ita ut quis tum per digitos suæ manus, tum per lineæ, dimidiā frontis partem, & maximē circa temporū musculum, confricando, excalfaciāt, ante exacerbationis tempus hoc faciens. Post exacerbationē uero hemicanrijs appellatis pharmacis utendum est, si quidē multa caliditas in doloribus percipiatur, his quæ refrigerans quippiam habent, non præsentē uero caliditate, his quæ multum calefaciunt. Vtriusque uero aliquid ex his quæ robur addunt miscatur, quod adstringentem habeat facultatem. Optimū porro est ungentū quod habet euphorbiæ, unct. ceræ quadrante, olei dulcissimi lib. 1. Ex hoc dimidiā frontis partem unā cum temporū musculo illine. Cōmodissimum est ad frigidās affectiones, ut saepe ex unico elus uisu ante balneum, dolor cessat. Sic autē affectus prodest etiam in aurē insulum oleum tepidū, modico euphorbio adiecto. Satis est enim si ad librā olei, drach. iiii. euphorbiæ addatur. Cæterum naturali quadam ratione aut potentia, euphorbium ad hemicanricos facit sic adhibitum. Terito ipsū cum aceto, & si quidē dextrū tempus dolet, illinito sinistrū; si uero sinistrū dolet, illinito dextrū; & celerim sanā dolorē. Itē in festina tertio terito, & dolēs tēpus illinito, mirifice faciūt. Si mulier utere carne cochleari. Vtere etiā paulo post describendis cōibus omnis doloris capitis auxilijs.

Communis curatio cephalæ & hemicanriæ.

Ex Archigene & Galeno.

Cap. I.

Inueterata & ægrè solubili cephalæ aut hemicanriæ existēte, principium curationis à uenæ sectione, aut purgatione facere cōueniūt, alio prius per dysterem euacuata. Manifestum est autem quod multo sanguine referis uenam secare oportet. Vidaris autem huius moribus, referri, purgandi sunt. Et deinde irrigationibus cōmodis utendum est. Et à naribus sanguis detrahendus, deinde pituita per os decubitus, & his quæ naribus induuntur utendum. Postea raso capiti illinendum est id quod ex scammonia & peucedano acaloe constat. Epithema terito conuenit ex amygdalis amaris, & thureæ myrrha. Emplastrā uero ex aspergario, & quod ex scilla constat, & nigrum ex cucurbitene syluestri, conueniūt pustulas locis inducentia, & quæ in profundo sunt ad superficialē transferentia. Non incongruum est etiam malagma ex bacca lauri. Nos autē uidetur cataplasmate ex cantharidis bacis, & melle facit, dum per longū tempus uulsi sita ab hoc pharmaco sentia sanie manāt. Oportet autem munitam esse uesciam per lactis potum ac frigidationes, eō quod facili ab uigenti ex cantharide laedatur. Perfeuerante uero affectione, secunda sunt autē circa aures, & præsertim quæ in temporibus sunt. Quidā etiā uestione profunda uisunt in cephalæa, qui hoc solum ea quæ sunt in quibus uisus causæ teritur madret. Adhibentur autem cautēria nucleiformia, ubi magis dolor heet. Et licet uisus ad os uere quoque in discenda. Barbari uero luniformem diffusionem faciunt circa anteriore capitis partem, ut

pra fronte, à sinistra aure usque ad dexteram, pelliculam caluam ambiētem exuolentes, & capitis os deradentes, caput tamen muniētes. Et nō potest temere assumpta esse uideri his qui malī difficile tractationem nouerunt, propter quam neque talia auxilia maiora quam opus est existunt. Veratrum autē non minus cauterijs prodest, imō etiam magis. Inducendi igitur sunt prius per uomitū à raphanis. Deinde dandum est ueratrum. Ego uero sum his tum cōmitalibus, ueratū albi bulbum tritum & in puluere redactum exhibui drachmæ unius pondere, uelut in Sermone de purgatorijs dictum est. Purgatur enim hinc efficaciter cum ualde multa excretionē. Deinde interpositis quibusdam diebus de furculis exhibeo drach. ii. Amplius enim hinc lancinantur quam excernunt. Et rursum teritiō similiter præbeo. Nam ad affectionem iam firmatam, & in ipsis ut ita dicā celsibus fixam, non est aliud efficacior modus. Post hæc reparatis uiribus infra purgamus, per interualla quædam per nostram hieram, quō illuc repere cogamus materiam sursum uergentem. Vitare autem oportet frigiditatem, ardorem, lassitudinem tum reliqui corporis, tum ipsius capitis, per uisum, auditum, olfactū & gustum, & præcipue tactum. Vitanda sunt etiam acriora edulia, uelut ceparum, alliorum, & similia. Item ea quæ inflant, & quæ difficulter transuehantur sunt casei, lac, fungi, tubera, bulbi, rapa. Eligantur autem ueniri commoda & quæ facile concoquantur, friabilia, non pinguis, non uirosa, stomacho grata, urinam densa. Fugientiū est etiam mel & omnia dulcia. Vinum uero album & tenue sit, & non ualde uicius, neque ualde odorum, & copia moderatum. At uero stochadem herbam cōdam cum aqua, aut aqua multa, in omni capitis dolore, uelut solum & maximum remedium exhibito. Aliud ad omnem capitis dolorem. Os cerui usum & tritum cum rosaceo dolenti loco illinito. Aut ocymum tritum imposito. Aut mentam cum aceto tritam bis in die illinito. Aut rumicem syluestrem & gallas simul tritas temporibus ac fronti illinito, & euestigio sanabis. Aliud. Stercus hirundinum antequam in terram cadat, unā cum luto quod in nido reperitur, aceto in ligneo uase madefacto ac illinito. Aliud. Pilulas capri stercoreis tritas illinito ac alligato, atque hoc maxime ac uespere facio, & sanabis. Aut nasturtium ore refectum cum aceto & rosaceo terito. Et cerati crassitudine imposito, & citissime medeberis. Aut intestina terræ trita illine. Aut cochlearum carnis cinerem, stercore bubulum, quibus æqualibus portionibus cum aceto trita illine. Quidam uero ex nostris præceptoribus, inquit Galenus, hoc utebantur ad hemicanrias, piperis drach. ii. crocomagmatis drach. ii. euphorbiæ recentis drachmæ dimidiū. Si uero uerus fuerit, drachmā unam, stercore columbarum in agris degentium drachmæ dimidiū, aramenti scitioris boni drachmæ dimidiū. Terito cum acerrimo aceto, & illinito tēporis musculū & dimidiū frontis, ac totā affectam partem. Crocomagmatis præparatio. Croci drach. centi, myrrha troglodytica drach. quinquaginta, rosarum siccarum drach. quinquaginta, amyli recentis drach. quinquaginta, gummi drach. quinquaginta. Teruntur cum uino. Ad capitis dolorem temporibus illinitur. Miscetur eū in præparatione aliorum pharmacorum. Aliud quod nō solum



hemicanicis commodat, sed etiam omni inueterato capitis dolori, illitum. In dolore quidem capitis, à tempore ad tempus per totam frontem, in hemicanicis uero dimidiæ parti affectæ. Croci drach. xv. atramenti futuri drach. x. aluminis drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. opij, omphacij sicci, chalcidis crudæ, singulorum drach. iiii. gummi drach. xv. Cum uino salerno uelut collyrium terito, & pastillos formato. Et usus tempore cum posca, aut aceto meraco illine. Aliud. Scammonæ drach. vi. croci drach. ii. comæ hederæ drachm. vi. sulphuris uiui drach. iiii. anisi drach. viiii. seminis apij drach. viiii. diligenter terito & cum ocyini succo pastillos efformato. Hoc multo rosaceo dilutum irrigatio fit capitis lethargicis commoda. Verum in capitis dolore cum aceto adhibetur. Aliud pharmacum non solum in his commodum, sed etiam ad uirginosos faciens. Radicis peucedani drach. iiii. irisidis, myricæ drach. ii. æruginis, acori, singulorum drach. i. spondylii drach. iiii. piperis nigri drach. ii. & dimidiâ, serpilli drachm. iiii. myrrhæ drach. ii. castorij drachm. ii. & dimidiâ, baccas lauri x x xv. rutæ irisidis drach. viiii. mentæ uiridis drach. iiii. opij drach. i. Vino excipe & forma pastillos. Vfus autem tempore, aceto & rosaceo dilutus illine. Sed & cerato rosaceo excepti fronti imponuntur, uelut malagma. Pastillus qui non solum hemicanicis prodest, sed etiam ischiadicis. Thapsiæ drach. iiii. euphorbij drach. iiii. succi medicij drachm. iiii. myrrhæ drachm. i. opoponacis drach. i. Confusa simul ac trita cum uino efforma, & utere cum aceto. Alius. Radicis peucedani drachm. iiii. croci drach. i. myrrhæ drach. iiii. opij drach. i. Cum aceto formato pastillos; & utere cum aceto in irritationibus. Euestigio soluit dolores. Alius ad omnem capitis dolorem & hemicaniam, per multam experientiam cognitus. Succ abstinij, succi hederæ, stercoris caprinij, cochlearum una cum testis exustarum, chartæ uisæ, baccarum lauri, bulborum, thuris, euphorbij, acramenti scriporij, crocomagmaris, gallarum, foliorum raphani, uticellorum oui, succi maluæ, æquales portiones terito cum aceto, ac formato pastillos, ac utere cum aceto.

*Epithemata ad capitis dolorem. Cap. li.*

Amygdalarum amararum, floris uiuidis, radicis peucedani, mentæ uiridis, uirgularum rutæ, baccarum lauri, serpilli, spondylii, castorij, singulorum unci, rosarum siccarum sextantem. Dissolutum cum aceto, & excipe cerato rosaceo. Deinde in linteum infarta, derasis capillis, toti capiti imposito, & per fasciam deligata usque in sequentem diem serua; & rursus exsoluto, ac renouata imposito. Aliud malagma, ad omnem capitis dolorem. Aeruginis drach. iiii; æris ussi drach. iiii. Iquame ferri stomonacis appellati drach. i. teræ cimolij drach. i. chalcidis crudæ drach. i. puimicis crudæ drach. i. cærebinthinae unci. cære septuaginta, olei ueteris quinquaginta. Aridis leuissimè tritis liquibilia liquifacita affunde; & emollito ac uitior. Si uero durius esse uideatur, oleo amygdalino emollis; & utere uelut dictum est. Facit etiam fronti ac temporibus impositum. Facit quoque mirifice emplastrum nigrum Archigenis corio inductum, & dolenti tempore impositum. Euestigio enim soluit dolores. Habetur autem inter auxilia ad orthopnoicos descripta Sermonis octauo capite

quingagesimo septimo.

*Que naribus indita caput purgant. Cap. lxi.*

Quod si necessitas postulari, etiâ per nares caput purgare oportet, post totius corporis euacuationem. Anagallidis succo naribus infuso, aut cydamini. Aut ipsa cydamini radice insufflata. Aut elaterio cum lacte infuso. Cæterum pharmaco parabili sæpe usus sum nigella pridie in acri aceto macerata, & deinde cum aceto trita, ac naribus infusa. Facit etiam ad narium oburationem. Aliud. Hederæ succus aut calamintæ, per narisuforium instrumentum naribus infusus, multum mucum ducit. Aliud. Nucleum specilli in aquam tingito, & eo atramentum futuri leuissimè tritum excipito, & nares penitissimè indito. Hoc multum purgat, & dolores euestigio leuât. Aut atramentum futuri lac te tritum infundito. Purgat maximè ictericos. Aliud. Nigellæ tritæ drach. viiii. spumæ nitri drachm. i. salis ammoniaci drach. i. oleo uetiri aut iirino, aut cyprino dilue; & tomentum specillo obuolutum medicamento immerge, & ex eo nares assidue illine. Et defluet quicquid caput infestat. Hæbeat autem pharmacum compagem cerati liquidioris, & seruetur in cornea pyxide. Aliquando pro spuma nitri elaterium adhiçito, & facit ad diuturnas lippiudines, ac morbum comitalem. Ducit enim multam humiditatem. Aliud citra molestiam purgans, & confestim dolorem extimes. Cydamini siccæ drach. viiii. irisidis siccæ drach. i. nitri rubri drach. i. Ego uero elaterium pro nitro adiecti, & probè trita per stipulam insufflaui; sursumque autrahère iussi, & postea deorsum indinari, ut collectus humor deflueret. Sed et per sternutatoria caput concutere oportet, quæ deferibuntur in Sermonehoc inferius ubi de narium affectionibus agemus.

*Apophegmatisimi pituitum per os à capite detrahentes. Cap. lxi.*

Nitri semissem, staphidis syluestris quadrantem, anisi trientem, foliorum lauri uiridum sextantem, uuarum passiarum uinacels exemptis quantum satis his excipiendis. Ex hoc commanducandum præbe pro una usque quadrantem, & commanisa expuere iube. Aliud quod commansum; caput purgat. Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis syluestris, singulorum æquales portiones uuarum passiarum carne excipe, & manducanda præbe. Verum post horum usum, sale ac melle recurrentur. Aliud caput purgans; quod neque caput dolere permittit, neque oculorum caliginem fieri. Prodest & auribus & dentibus. Et quis per tempus ipso utitur, in nullam ex his affectionibus iniecit. Est autem optimam. Sampsuchi sicci, irisidis illyricæ, pyrethri, hyssopi, nitri, piperis, seminis apij, radicis panacis, staphidis syluestris, singulorum drach. iiii. Si uero ulm eius intendere uoles, adijce etiam myrrhæ drach. iiii. Singula primum seorsim, deinde simul terito cum aqua, & formato pastillos, pauco melle ammixto. Vfus autem tempore, melle & aqua diluito, ac pro gargarismate utitor. Aut oleo cyprino aut iirino, aut ueteri ammixto naribus infundito. Smegma densans caput, nitri Bernicarij semissem, baccarum lauri, sinapis, sampsuchi, singulorum sextantem, cyperi unciam i, secis uini usque uncia i. Hæbe smegmate

smegmate in balneo illitro defricetur. Oculis autem linctum multiplex aut spongia prætendatur. Aliud. Niri affati lib. i. baccharum lauri lib. ii. staphidis syluestris, sinapis, singulorum lib. i. radices cucumeris syluestris semissem: Vtere uelut dictum est in inueteratis affectionibus. Smegma capitis, faciens ad defecillationes & aquosam capitis affectionem, experimento constans. Niri affati uino extincti semissem, iridis, aristolochiæ, helenij, singulorum unc. i. aceti multum quantum satis est. Contusa ac cribrata aceto multo permisceto, & præfalo sinapiti ante balneum illitro, & breui tempore finito, ac affricato. Smegma ad omnem capitis dolorem & oculorum fluxionem, experimento constans. Helenij, myrrhæ, calami aromatici, farinæ lupinorum, farinæ erui, sulphuris uiui, spumæ niri, æquales portiones prisanæ succo excoque, & pastillos forma. Vfu uero postulantem, prisanæ succo dilutus utere. Hoc smegma in balneo sinapiti, inspergere oportet, capillis antea inter se disparatis, ut corpori auxilium adhaereat. præcipe recte ut os claudatur, quo per nares calidus æther uehementer attrahentes subiectam materiã citius transmittant. Sapo Constantini reficisc fluxiones. Balauitiorum sextantem, myrrhæ, landarachi, spicæ nardi, singulorum sextantem, costi, aloës, gallarum, thuris, malicorij, foliorum rosarum, sarcocollæ, singulorum quadrantem, saponis gallici lib. i. decocti lupinorum amarorum sextarium i. Arida confundito ac cribrato, & cum liquidis conterito, saponis adiecto, & pastillos formato ac utitor, ubi opus fuerit dilutus quantum satis est cum uino, & illines ante balneum sinapiti præfalo. Deinde paulo post affricans & abluens. Sapo Andreæ comitis ualde celebris: Floris tunc odorati, casij, cyperi, amomi, folij malabathrij, costi, singulorum unc. i. gallarum sesquiunciam, nardi celticæ, aluminis, iridis, fecis uini antiqui usque, gypsi iusti, niri, singulorum scrupul. xii. rosarum siccarum scrupul. vii. salis scrup. viii. resarum purpurarum usurarum quadrantem, saponis gallici lib. i. lupinorum decocto trita accipe ac utere. Xeromyrro, hoc est unguem secum ad capitis fluxione laborantis curationem minime uanum. Iridis helenij, floris iunci odorati, singulorum lib. i. rosarum siccarum quadrantem, amomi, costi folij, gallarum singulorum semissem. Vtere post balneum, præillito capite ex uino austero, & tunc insperge. Aliud optimi. Iridis quadrantem, gallarum unc. i. casij, costi, folij, spicæ nardi, balauitiorum, rosarum siccarum, carposallami, singulorum sextantem, myrrhæ drach. iiii. Osmunditio ac cribrato, & præillito capite ex uino austero inspergito, maxime post balneum. Alius puluis inspergitur Theodosij, caput resiccas. Gallarum, balauitiorum, singulorum trientem, cyperi sextantem, spicæ nardi, folij, corticis thuris, corticis pinus, nardi celticæ, singulorum unc. i. iridis sesquiunciam. Conuisa ac cribratis utere. Alius ualde bonus. Iridis quadrantem, gallarum, rosarum siccarum, singulorum sextantem, aluminis unc. i. Vtere uelut dictum in capite calidiore. Alius puluis ad caput humidum, a quo tum oculi, tum alia partes fluxione infestantur. Radices peronæ unciam i. aluminis scissi unc. i. baccharum lauri drach. iiii. cyperi sextantem, nardi celticæ semissem, contusa cribrata insperge. Hoc ego sæpe experaui sum. Puluis caput corroborans, facit & ad eoa-

qui oculos assidua fluxione laborantes habent. Florum mali puncti satui unciam i. gallarum unciam i. cyperi, iridis, helenij, singulorum trientem, seminis rutæ syluestris, quod Harmala & Besala uocant, sextantem, radices chamæleonis nigri sextantem, carposallami unc. i. floris iunci odorati sextantem, aristolochiæ, rosarum siccarum, myrri siccæ, nardi celticæ, singulorum unciam i. xyloballami sextantem, amomi, malicorij, staphidis syluestris singulorum unc. i. conuisa cribratis utere. Aliud smegma reficiscans omnigenas fluxiones, & præsertim acres, & subcrassas, multo experimento comprobatum. Milij quadrantem, ladani sextantem, floris iunci odorati sesquiunciam, seminis rosarum sicci sesquiunciam, aluminis liquidi sextantem, spicæ nardi unc. i. sinapis sextantem, iridis, acadæ, piperis, staphidis syluestris, singulorum sextantem, costi, folij, pyrethri, singulorum unc. i. calami, musci quem sphagnum siue hypnion uocant, singulorum sesquiunciam, niri rubri lib. i. Nirum uriso & aceto multo extinguitur, & ad reliqua trita ammisceto, ac utitor ita ut sinapiti inspergas, & paulatim affriccs.

#### De Alopecia. Cap. LV.

Quemadmodum plantæ aliquæ ob humoris inopiam resiccatæ, corrumpuntur taliquæ uero ob humoris alieni aut ipsarum natura attractione. Eodem modo & capilli, aut propter humorum ex quibus nutriti consueverunt inopiam, aut propter eorundem uitiationem corrumpi solent. Et propter inopiam quidem humorum, caluities contingit: propter uitiatos uero humores alopecia & ophiasis: unum quidè amara secundum morbosam affectionem malum, non minus uero iuxta figuram habentes diuersa. Serpenti enim similis lesa, capitis pars in ophiasis apparet. Alopecia autem sic appellata est, quoniam uulpius frequenter accidit hæc affectio, uelut tradunt. Humori igitur præuolenti redundantiã causa est affectio. Quales autem sint hi, ex colore cutis capitis cognoscas. Si enim albidior est, pituita: Si nigrior, bilem atram: Si pallidior, bilem flauam significat. Et sanè redundantes uitiatos humores, euacuare oportet, aut per pillulæ ex aloë & colocynthide, aut per Galeni hierac ex colocynthide. Si quidem atræ bilis humor redundauerit, uerato nigro ad ipsam ammixto: Si uero amara bilis, scammonia: Si pituita, ipsa per se ipsam detur. Post totius corporis purgationem, pituitam per os ducere melius est, atq; ita localibus auxilijs uti. Hæc autem discussoria uitiatum humoris esse oportet, & essentia tenuium partium. Si uero supra hoc quod discussit uitiosos humores, apertum fuerit pharmacum ad bonum sanguinem attrahendum, optimum sanè tale fuerit. Porro præfalo capite loci lintheo cõfritare oportet, ac cõfiderare. Si enim post modicam frictionem pars rubescit, affectio sanata facile putato. Si uero post multam frictionem rubescit, sanatio difficilis. Deinde Thapsiam recetem triam, uiribus ipsius larga aqua ammixtionem exolutis, illinere. Considerare autem oportet post thapsiæ illitionem, num ob uehementiam ultra quam conueniencem rubescerit. Hoc manifestum erit, si flauior colore euaserit. Periculum est enim ne exuratur cutis, si nossepe ipsa utamur. Proinde aut ad aliud mollius transire oportet. Aut ipsa uti uelimus, uim ipsius exolueret, per cetaria aut ad ipsam ammixtionem, Animad

Antimaduertas autem ne alopecia ulceretur, quod si fiat, anterino adipe aut alio quodam tenuium partium illine. Adhibeantur autem hæc auxilia in aëre calido, citra auram frigidam in sole, hyeme uero in balneo. Ex reliquis porro pharmacis huiusmodi affectionibus convenientibus calidissimus est euphorbium: Minus autem ipso calida est thapsia, post thapsiam uero sinapi, & nasturtium, iuxta alium autem modum adarce: Deinde nitrum berenicarum, & sulphur, & spuma nitri, & utrumque ueruarum, & eruce semen, & oleum laurinum, & alcyonium utrumque, ustum & non ustum, & pix, & cedria, & radices calami sepiarij, & cortex, ambo usta. Et murinum stercus, & anserinus adeps, & maxime ursinus achyena: Et amygdalæ amaræ totæ usta, & uiperæ pelvis ac caput ustum. Et fortibus quidem ex his ceratum liquida ammisce: Imbecilliora uero oleo laurino aut pisce liquida excipe. Et diuturnas ac ægre curabiles affectiones, per sortia curato, incipientes uero & curatu faciles, per debiliora. Critonis medicamenta ad alopecias. Pilorum ursi ustorij, radicem calami ustorij, adiantij usti, foliorum fici ustorum, panniculi Cilicij usti, singulorum æquales partes adipe urfino & cedria excipe. Vnus autē tempore, loco forō & per fici folia conficito, ac per nitri detersio, pharmacū illine, Archigenis ad alopecias. Verbenacam rectam in sole cum aceto tritam, loco prius per nitrum præparatam illine, & raram linteum superimponere, hoc præmadefacto loco tollendum est. Aliud. Alcyonium durius ad lucernam exurito, & opobalsamo nō adulterato extinguit, & cum eodem tritum illinito. Adhæret enim in totum, & non dissidet donec pilus fuerint exorti. Aliud. Equinus dentes exure, ac utere cum aceto. Ad diuturnas autem alopecias egregie facit thapsia succus cerato exceptus, ac loco impositus, ut nihil aliud facere satagas. Decedit enim summa superfides, et sanies effluit, & pilis sua spōte enascuntur. Aliud. Squamam ferri stomatidis diu cum aceto in sole tere, & modico oleo addito illine. Aliud, ad alopecias & pilorum defluuium ac uittigines inueteratas. Buccina usta cum oleo ueteri terito, ad strigmentitiam crassitudinem, & præparatam conficito loco illine. Insigne hoc est. Aliud Asclepiadis. Spumæ nitri partes ii. salis ammoniaci parte i. hæc usta & cum acerrimo aceto ad strigmentitiam crassitudinem trita, illine & affrica, donec pharmacum in profundum penetrat, alopecia prius leuiter confalcata ut locus pilis commodè densetur: & hoc bis per diem facimus. Aliud. Marrubium uiride tritum illine. Aliud. Perdici herbe uiridis folijs locū assidue confrica. Aliud. Spœrididis, hoc est cupressi folia trita cum aceto adhibe. Aliud. Herinaceorum marinarum testas uistas cum melle illine. Aliud. Herinacei terrestris pellem, aut caput ustū, adhibe cum melle. Aliud. Alcyonij drachm. i. sulphuris uisti drachmā i. muscarum tostatorū ut resiccantur, cyathos ii. Muscas per se terito, alcyonium uero urito, & sulphur ussum & consummum ac tribratum cum aqua contere, & fel suillum & acetum paulatim siccis affunde donec strigmentum totum fiat. Deinde axungiam à rotis curruū derafam, & in manu emollitam, ut emplastrum forma fiat, ammisceto, & præparatam ac conficitis confidenter, uelut optimū, illine. Aliud. Herinacij terrestris uisti cinis pice liquida exceptus, alopecias remouet. A-

liud. Sorani, quo etiam Archigenes usus est, & id uehementer laudat. Alopeciam præscalptam & conficitam, deinde in superficie scarificatam, ceparum aut raphanorum corricio trito integre, addito melle. Aut cum his confrica, & nasturtij semē, & muscerdas, & piper, & ueruarum album, æquis portionibus cum aceto illine. Est enim ualde insignis. Aliud Archigenis. Rhos culinarij drach. iiii. sinapis drach. ii. cum aceto illine. Aliud. Cantharides uistas, & tritas cum melle affrica. Aliud. Corij noui partem lanuginosam, in aëro uale ustam, cū oleo antiquo, aut melle, aut aceto tere ac illine. Citò pilos producit. Aliud. Cyclamini radicem uiridem tritam illine. Aut sicca ustam adhibe. Aliud. Felis stercore cum sinapi ac capere, addito aceto utere. Aliud. Allium ustum cum rosaceo illine. Aut betæ radicem eodē modo. Aliud. Ungulas asini uistas, asphodeli radicem ustam, alcyonium, nitrum, æquis portionibus oleo ueteri excipe, ac utere. Aliud. Herinaceorum marinarum cum testis exustorum drach. ii. muscerdas drachmam i. aceto dilue, ac illine loco præfrito. Aliud. Alcyonij usti, cornu ceruini usti, cyperi usti ex toto, æquis portionibus utere cum aceto. Aut abrotonum usti cum oleo uetustissimo adhibe. Ad alopecias & caluiciem ac pilorum raritatem ægre curabilem, in capite, in mento, & in supercilijs. Pilorum ursi unciam i. radices calami quadrantem, filicis cum radice quadrantem, castaneorum hispidi corticis quadrantem, lanarum succidarum pinguisimarum sextūcem, capita muscarum xxx. muscas quinque sine capitibus. Omnia in nouam ollam cōiecta, in furnum positum exurantur. Deinde cinerem terito. Habeas autem in uino Aminæo prius trita, ladani unciam i. folij maslabahri unc. i. myrrhæ sextantem. Et adijciatur his olei ueteris sextans, olei cedrini unc. i. atque ita aridissimis inspersis excipe. Deinde ubi linteolo alopeciam perfricaueris, & leui scarificatione usus fueris, aut cepa, aut scilla, aut fici folijs exscalperis, pharmacū ipsū illinum affrica. De cetero uero locum rigido ac aspero linteo conficito, & hoc modo illinendo usque duos menses progreditor. Quod si amplius in hac curatione perseueraris, etiam caluiciem persanabis. Aliud Oribasij. Muscerdarum unciam i. stercoris cameli exusti, ordi usti, singulorum pugillum unū, foliorum lauri ustorum manipulum unum, excipe sorde ab axibus derafa, hoc est, qui à rotis curuum deratū, & in manu emollitam, ut emplastrum forma fiat, ammisceto, & præparatam ac conficitis confidenter, uelut optimū, illine. Aliud. Herinacij terrestris uisti cinis pice liquida exceptus, alopecias remouet. A-

De defluuii capillorum. Cap. lvi. Est & alia capillorum affectio, quæ ex raritate cutis, & penuria essentia pilos generantis consequitur. Quapropter etiam curatio hoc modo læforum, non eundem scopum cum alopecijs habet. In alopecijs enim scopus est, ut uiciatus humor consumatur. In his uero, ut habitus capitis corroboretur, & boni succi alalatio procuretur, & cutis densitas ac raritas moderata reuocetur. Solut autē hæc circa pilos affectio plerumque his qui ægrotant accidere. Raro uero etiam citra morbum. Et plurimi ægrotantes circa pharmacum, per resicentē corpus uisum breui sanati sunt. Quare pharmacum in ipsis sint quæ moderate citem densant, cum hoc ut nō perfrigerent ipsam. Quæ enim ualde adstringunt, omnino etiam frigefaciunt, & alimētū affluxum repellunt. Vnde etiam amplius pilis defluunt. Quapropter moderate adstringentia ammisce

ammiscere oportet hume&atibus pharmacis, quale est ladanum, & oleum lentiscinum, quæ ex natura sua adstringunt & moderate calefaciunt. Itaque neq; expertus sum, neque mente concipere possum, aliud præstantius fore medicamentum ad defluos pilos, eò quod ex ladano & lentiscino oleo paratur. Si uero non affuerit lentiscinum, crudo & immaturo oleo utendum est. Illud autem manifestum est, quod raro capiti pharmacum crassius adhibere oportet. Verum ad cutem deconsio, liquidius. Quod si magnum fuerit pilorum defluuium, & coniectes magnam cutis capitis raritatem factam esse, oleum myrteum pro lentiscino, ad ladanum ammiscere. Potes & unguentum nardinum ammiscere in ætate frigida & tempore hyemali. Commodum est etiam ad hæc pharmacum, unguentum illud diuini foeminarum, spicatum appellatum, & quod Salca appellatur. Quare his uel solis diuites uel iubeto. Cleopatra porro inquit, ad defluos pilos utere hoc: Terram cimoliam solidissimam in uino austero macerato, addito mororum succo tanto quantum combibere potest, & semen hyoscyami tenuissimè sufficiente mensura adijcto, terito, ac passillis formato, eosque in umbra siccatos in fistili nouo reponito. Vsu uero expetente, aqua dilutos affricari iubeto. Deinde reficatos elueto, & per dies quinque rursus illinito. Vtere hoc in capitis calidioribus. Facit etiam ad faciei ac colli imperigines. Aliud ad defluos pilos. Verbenacam rectam uiridem unà cum radicibus in oleum omphacinum coniectam per plures dies insolato, & oleo excolato utitor quotidie pro communi. Si uero non affuerit uiridis herba, siccam unà cum radicibus consumam ac cribratam oleo ammiscere, ut strigementum spissitudinem accipiar, & ubi per aliquot dies siueris, utere. Et minime uanum medicamentum comperis. Aliud ad pilos ex morbo defluentes. Chamæleonis nigri radices uiuo coctas crassius capiti illine. Aliud. Sambucum usum, & cerato liquidissimo exceptum illine. Auget hoc pilos, & cutem densat, & defluere non permittit. Sed & narcissinum unguentum illium pilos defluere non sinit. Aliud. Ladanum & rosas in uino ueteri terito ac illinito. Conseruat enim pilos, eosdemque nigros facit. Aliud conseruans pilos: idem etiam nigrefacit. Myrti baccharum nigrarum sextar. i. uirgulorum myrti sextar. i. feminis apij sextar. i. adianti sextarij dimidium, ladani tantundem, uini nigri sextarios v. Coquito ad perfectam dissolutionem. Et ubi tertia pars restat, adijcto olei omphacini aut alicuius unguenti sextar. ii. ac rursus coquito. Postquam autem bis aut ter ebullierit, expressum ac excolatum humorem diligenter reponito. Vsu uero expetente, in præstis omnino utitor, bis per diem illinens ex eo capillos. Cæteri in pueris pulchros ac densos pilos facit, nucis testa usta ac uino trita, & illita. Aliud. Locust arboris folia trita illinito.

Ad supercilia pilis denudata. Cap. LVII. Vt ne defluant pilis neque à supercilijs, neque alia corporis parte, melanthum usum & cum aqua tritum impone, ubi pilos emergere uolueris, præsertim uero in supercilijs. Aliud. Apes plurimas uistas ac oleo ammixtas illine animaduersione habita ne alii locum coniungas, ubi pilos nasci non oportet. Aliud.

Adamantem lapidem cum aqua tritum illine: quod si albos producere uoles pilos, cum aceto eundem terito.

Tingentia ac nigrefacientia capillos. Cap. LVIII. Medicamenta quæ albos pilos tingunt ac nigrefaciunt, ex austeris ac acerbis composita magnopere laudant. Non enim solum in superficie, sed etiam in profundo cutem alterant, usque ad locum radicum pilorum. Detrimentum uero foeminis utentibus illic accidit, aliquando ad morbum comitalem, aut syderationem, aut ueternum, aut soporem profundiorum: Aliquando uero etiam destillationibus ægre solubilibus corripuntur, ut tabes consequatur. Et scio multas foeminas mortuas esse, ex perfrigeratione à talibus pharmacis inducta. Magis autem laeduntur quæ frigidius temperamentum habent. Cæterum quæ citra læsionem adstringentium pilos nigrefacere uolunt, cedria illinantur. Illinantur autem tribus uel quatuor horis ante balneum. Deinde lotæ confricentur. Oportet autem ipsam citra olei ammixtionem adhibere, in capitis uehementi refractione ac calefactione indigentibus. In alijs uero oleum ammiscendum est. Nam unà cum hoc quod consumit humiditates, etiam pilos nigrescit, & defluos corrigit, & non defluos habitiores efficit. Idem facit & pix liquida cum oleo adhibita. At uero Archigenes pilos nigrefacientia suis describit. Radicis capparis corticem cum lacte asinino ad tertias coquito, & trita in noctem imposito, pilis antea confrictis. Aliud. Radicis ilicis corticem aqua coquito donec mollis euadat, & imposito. Aquam uero cocturæ affricato. Aliud. Quod intrinsecus in anemona nigrum est, cum oleo myrteo tritum illinito. Aliud. Corticis salicis succum cū oleo affrica, summe denigrat. Aliud. Lapis Alabandinus uocatus, colore subnigricans cum suluedine ac pelluciditate, quo mulieres ad ornatum utuntur, tritus & cū uino nigro ac oleo omphacino affricatus, superficie pilorum nigrefacit. Aliud. Malum punicum uiride immaturum accipe, & collum eius diligenter repera, quo id quod amputatum est, congruum operculum fiat. Deinde electis granis, & tenuibus membranis intus relictis, in uacuum mali calicem sesami illoti drach. iiii. injice, & thuris tantundem, utrisque uicissim locatis donec impleatur, & tunc proprium operculum impone, & luto aut fermento triticeo obline, & in dibano torreo. Postea uero lutum aut fermentum adime, ipsum uero malum punicum leuissimè tere, & in uitreo uase repone. Deinde præfricto ac reficato capite modicum de pharmaco ad paucum oleum ammiscere, ac pilos illine. Et hoc quinque repere, hoc etiam crispus ipsos facit. Quidam pro sesamo ac thure, nigellæ ac gallarum contusarum, singulorum drach. iiii. in mali punici calicem coniungunt. Aliud quod pilos denigrat, ac crispus facit. Oportet autem per terram cimoliam pilos confricare, & tunc denigere. Præstat quoque caput prærasum esse, & crassius medicamento illinere, uitata fronte & omnibus uicinis partibus. In multis celebre factum est, & est ualde necessarium. Sulphuris fullonici, atramenti sutorij, gallarum, calcis uiuæ, spumæ argenti, singulorum sextantem, ferruginis unc. i. Singula seorsim terito, & cum aqua ad ungenti formam reducto, ac

confidenter uitior nihil ueritus calcem. Non enim urit, ed quod uis ipsius a reliquis est oppressa. Hoc & ligna & cornua & lanas tingit. Aliud efficac experimento cognitum. Denigrat pilos ad miraculum usque. Foliorum fici nigrae, foliorum uitis nigrae, foliorum mori, singulorum lib. i. Omnia in aqua pluuiali per diem unum macera, deinde diligenter coque, & praefatis pilis impone. Aut si hoc nolueris, radicibus pilorum liquidius illine. Aliud quod pilos nigrefacit. Ladani, gallarum, amygdalarum amararum depurgatarum, sedis uini, foliorum adianti, singulorum sexuncem. uini è uinaceis expressi (quod loram uocant) sextar. iiii. Omnia in uas aereum stanno obductum conijce, & ad tertias coque. Deinde excola, & in alio uase paruo ad mellis consistentia coque, & ad haec ungenti Mendefij, aut alterius huiusmodi, parem mensuram adde, & conqualata reponere, & hoc quotidie utere. Sit autem plumbum potius quam stannum, id metallum quo aeneum uas obducitur. Aliud quod à canis praeseruat. Colocynthidem sylvestrem perforato, & interna probe repurgato. Deinde ipsam oleo expleto, & integrum hyoscyami albi semen adijcito, & per diem unam sintro. Et hoc per annum semel commode illinito. Aliud barbam nigrefaciens. Recrementum ferri & plumbum in aceto coquito, donec tertia pars restiterit, & illinito, atque ab oleo penitus abstineto.

*Vt fului pilii fiant.*

Cap. lxx.

Fuluos pilos faciunt lupini crudi, & nitru cum aqua illitum: Ioti arboris ramentorum decoctum. Ligustri folia trita cum herbae lanariae succo impofita. Fex uini ueteris usta, & cum oleo balanino trita, ut iustam spissitudinem habeat. Hoc ubi dormitum ire uoles, illine, & mane flauit erunt.

*Vt albi pilii fiant.*

Cap. lxx.

Hirundinis simum cum felle taurino tritum illine, & albi euadent. Aliud. Verbasci albi florem urito, & aceto extinguito, & ad smeagm ammixto uitior.

*Vt crispi pilii fiant.*

Cap. lxxi.

Spumam salis cum myrrha affricandam praebe. Aliud. Carpasi succum illine, & manebunt crispi acri gri. Aliud. Asphodeli radices urito, & tritis cum uino uitior. Aliud. Semen lini uino maceratum modice coquito ac excolato, & ad succum oui candidum ammisceto, & ex eo uesperis pilos conficito, ac caput obligato. Postera uero die in balneo abluto, & hoc saepe factio. Verum in his qui caput habent quod facile perfrigeratur, in balneo illinito, & illa die non abluto. Aliud celebre. Nucem pineam integram uiridem bonam unam, iridis scrup. xii. myrti unc. i. baccarum myrti unc. i. polytrichi sesquunciam, ladani sextantem, gallarum unciam i. mastiches Aethiopice unciam i. pampinorum uitis sextantem, lacrymae palmae arboris scrup. xii. adipis urini scrup. xii. seminis betae scrup. xii. rhois coriarij scrup. vi. aluminis scissi scrup. vi. olei omphacini sextar. iiii. succi aremisae, succi serapiadis tritesticularis, succi polytrichi, succi asphodeli, succi anagallidos, singulorum quadrantem. Misce ac utere.

*De his quae pilos corrumpunt.*

Cap. lxxii.

Eorum quae pilos corrumpunt tres sunt differentiæ. Nam quaedam proprie pilothra appellantur, quaedam attenuatoria, quaedam omnino ipsos extir-

pantia. Quae igitur ipsos penitus extirpant, periculosi usus sunt. Aliquando enim non solum illitas partes corporis, de cætero penitus superflue reddunt, sed & usque ad caput & mentum, superciliaque ac palpebras, nuditas pilorum procedit. At uero attenuatoria & pilothra minime periculosum usum habent.

*Quae pilos extirpant.*

Cap. lxxiii.

Pilos penitus extirpare dicitur thynni hepar putrefactum, ranarum in arundinibus degentium sanies, testudinis marinae sanguis, uitis albae lacryma, lacryma hederæ, itemque bryoniae, scolopendra marina, stellæ marinae. His ammiscitur nitrum, amurca & cedria, & oleum quod insulsum appellatur: Item Alcyonia & sandaracha, & his similia. Aliud. Vtrique sylvestris semen cum oleo tritum fortiter affrica, & desuunt pilis. Tardius autem circa pubem puerorum pilos enasci facit, aliquando uero etiam eos qui sunt, extirpat, uitis lacryma cum oleo illita, & humor qui ex uiridi fermento dum uritur exudat. Aliud. Succus thymali charactæ cyathum i. uini & olei singulorum cyathum i. misce, & illine in balneo: Et ubi modicum sudaueris, & deinde per strigilem confricueris, reperies pilos in strigile. Qui uero post dies quadraginta exoriscunt, lanuginosi erunt. Aliud. Asellorum sub hydris stibulantium drachm. xii. sandarachæ drachm. iiii. calcis uiuæ drach. viii. auripigmenti drach. viii. lixiu ex ligni sciulnei cinere excolato heminas ii. aceti cochlear. ii. Omnia unita in ossa coquito, donec experimentum ubi facienti, illita pilos tollunt: Et utere in balneo uelut dictum est. Aliud. Buglosae si & semperuiui succum, æquis portionibus cum stercore hircino terito, & uitreæ tabellæ excepta densari sinito, ac uitior in balneo. Aliud. Bulbum hyacinthi purpureos flores habentis cum thure & amygdalis amaris terito, & oleo assuso uncto, & in balneo ungitio ex hoc: itemque circa balneum quotidie, & paulatim pilii corrumpentur.

*Pilothra pilorum.*

Cap. lxxiiii.

Ex his quae pilis denudant, & pilothra appellantur, utile est lixiuium, & auripigmentum, & sandaracha, & calx uiua. Manifestum est autem uehementiam ipsorum frangi, debiliorum & liquidorum ammixtione, pulsang inquam aut oryzae succi. Crito itaque tale pilothrum in libris de ornatu describit. Calcis uiuæ partes ii. auripigmenti partem i. Haec in mortarium plumbeum coniecta, aqua calida aut pulsang succo affuso terito, & ubi nigra facta fuerint, in balneo illini iubeto. Hoc statim corpus glabrum facit, & pilis enascens tenuis emergit. Aliud. Oryzam, fabas, cicer, prisanam, simul in aqua coquito, & ad hoc decoctum primum calcem ammisceto sufficiens, & prout moris est, agitato: Et ubi dissoluta fuerit, auripigmenti unc. i. inpergito, unito, & myrrhae tenuissime tritæ unc. i. mastiches unc. i. pumidis torrefacti drach. iiii. opobalsami cochlearia ii. adijcito. Aliud. Sandaracham cum hyoscyami succo tritam illine. Aliud. Fructus fici sylvestris sexuncem, & foliorum eius sexuncem, herinacium terrestrem integrum uiuum, succi aconiti, hoc est, iridis sylvestris lib. i. ueratri nigri lib. i. sedis uini usta lib. i. caricarum pinguium nigrarum lib. i. auripigmenti auriculoris trientem, costi trientem, calicis trientem,



carpobalsami trientē, olei sextar. i. Omnia confusa cum herinacio terrestri uiuio, in duplici uase cū aqua coquito: Sint autē aquae marinæ lib. v. donec aqua fuerit cōsumpta. Et ab igne ablata per tridū finito, & ubi sedata fuerint, excolato, ac utere oleo in prima balnei domo antequam sudare incipiunt.

Quæ pilos attenuant.

Cap. lxxv.

His quæ pilos attenuant uti poterit medicus, in his quæ duros ac magnos pilos habent. Sunt autem talia extensoriæ & attenuatoriæ facultatis. Quemadmodum autem in omnibus alijs medicamentis differentia secundum excessum & defectum est, ita etiam in extensorijs. Ordei itaq; farina & fabarum, & erui, spumæ niri ac nitrū, moderatiorem usum habet. Quæ uero his fortiora sunt, in his quæ duros ac magnos pilos habet cōueniunt. Quale est nitrū ustū, & niri spuma & aphroditrū, & testæ calainæ. Item sepia testa usta ac non usta, & hēillū ac clibanī testæ, & pumex ustus ac non ustus, & murici ac purpurarum ac reliquorum ostræorum testæ, alcyoniæ, ac herbæ lanariæ radix. Veratrum item utrumque, & bryoniæ radix ac dracunculi, aristolochiæ ac panacis radix, & canchry ac huiuscemodi. Quod si odorata hæc facere uolueris, cyperū & melilothum, & rosas siccas, & iunci odorati florem & iridem, & melissophyllum ammiscabis. Diuisibus uero narum celticam & indicam, amomum, solium malabathri, myrrham & costum. Attenuat etiam pilos cinis farmentorum uitis, & scilueus, & ex thyma lis, tritus & in balneo affrictus. Et ab exustis uinaeis cinis, & alumen fissum, & stercus caninum fissum. Aliud smegma illustrans cutem, & pilos lanuginosos faciens, ualde bonum. Mora crudissima cum terra cimolia ac nitro, æquis portionibus trita adseruato, ac uitior. Puluillus attenuans pilos in balneo, multo experimento constans. Punicis costis, testarum sepia ustarū, niri, cimoliæ æquis portionibus utere confideret. Alius. Testarum purpurarum ustarū sextantem, alcyoniū sextantem, niri bessel, cimoliæ bessel, punicis un. i. omnia tosta terito, & uitior in balneo, ac miraberis. Alius, quo usi sumus in cubicularia. Calcis uiuæ ex marmore factæ lib. i. auripigmenti un. i. staphidis syluestris, cimoliæ testarum sepia, radices bryoniæ sicca, aluminis scissi, singulorū drach. iiii. cerusæ un. i. sampsiuchi, aloës, ueratri nigri, singulorū scrup. vi. Coniunctis ac cribratis utere, in iij. dies ex eo in familiare pilothum drach. iiii. & ouorum candida. iiii. Deinde pilothū ablue, & rursum siccū affrica, & quotidie in balneo hoc utantur. Aliud smegma attenuatorum, & lanuginē producent. Farinæ fabarū, pumicis, similaginis, spumæ niri albæ, singulorum choeniceas atticas ii. fœniculi cum pisana cocti, & postea aceto multo eloti ac ficati, uisq; ac cribrati choenices ii. saponis gallici lib. ii. Saponē reliquis antea tritis ammiscæ, ac manibus subige, & utere.

De furfuribus siue porrigine.

Cap. lxxvi.

Quibusdam se calpenibus, furfuribus similia sæpe ex capitis cute decidunt. Contingit autem hæc affectio auidiosis serosis humoribus, quoq; consumere scopus est in eius curatione. Itaq; discussoria ac extensoria adhibenda sunt pharmaca, ubi per purgatorium medicamentum prius totum corpus euacuauerimus, ut uitiatis humoribus fuerit restitutus. Quidam

etiam aliqua adstringentia ad discussoria ammiscuerunt, quo per ipsa affecta pars corroboretur, ut ne facile in seipsam suscipiat influentes serosos humores, sed resistat, eosq; repellat, ueluti est furorū atramentum, & similia. Deterget itaque furfures in capite: Cimolia cum betæ succo aut fœnigræci, aut utriusq; simul ammixtis. Aliud. Fabam unā cum cortice molito, & cum betæ succo uitior. Aliud. Furfurum dimidiā choeniceam in aquæ sextar. i. macerato, deinde diu manibus terito, & succum excolato, & ad ipsum aceti heminam dimidiā addito, & ad spissitudinem coquito, & sic affricato. Deinde betæ, aut fœnigræci, aut lupinorum decocto abluito. Aliud. Terræ cimoliæ, sulphuris uitii, æquales portiones terito cū aceto, & affrica in balneo, & calida aqua ablue, & illine non solum in balneo, sed etiam citra balneum. Aliud. Spumæ argenti, olei rutacæ, aceti, pares portiones terito & illine. Hoc multo experimento constat. Aliud. Cucumeris syluestris radicem coquito, & decocto uitior. Archigenes de medicamento ex bryonia dicit, præ omnibus, inquit, hoc tibi pareatur. Si igitur iuxta pondus preparare uoles, sic facito. Cimoliæ sexuncem, niri quincūcem, farinæ fabaceæ quadratē, corticis aridi radices cucumeris syluestris sextantem, bryoniæ sextantem, farinæ ordecæ ac lupinorum, singulorum un. i. Aliud. Cimoliæ lib. ii. niri bryoniæ, corticis radices cucumeris syluestris sicci, farinæ fabarum singulorum lib. i. farinæ ordecæ ac lupinorum, singulorum sextarij dimidium. Singula seorsim leuissimè terito, mensurato ac unitis uitior in balneo. Archigenes dicit, ad furfures farinam fœni græci, & nitrū, & cimoliam, cum betæ succo affrica, & sel bubulum aut suillum addito aceto illine. Deinde post horā ablue, & atramentum sutorio ac nitro cum modico oleo tritis illine. Aut cuminum, & myrobalanum, & sabaceam farinam, æquis portionibus cum aqua lictiij terito, & affricato. Aut amygdalas amaras decorticas, cum aqua aut aceto tritas affrica. Postquam uero resiccati fuerint pilli, calida aqua ablue. Aut maluā syluestrem in aqua marina, donec decima pars supersit terito & affricato. Aut nitrū & pumicem, & fecem uini, pari portione cum aqua calida affrica. Aut spumam niri, & atramentum sutorium, æquis partibus cum uino adhibe, ter aut quater in mense. Hoc adeo efficax est, ut nihil reliquum faciat. Aliud. Thus tritū cū aceto illine. Aut scorpiuri succum illine. Aut scilla assato, & ubi mollis facta fuerit, expressum succū oleo ammixto illine. Victus sit status exors, nihil ex crasso humore præditis habens, uelut sunt tubera, fungi, bulbi, legumina, & carnes bubulæ ac similes. Sin autem quæ ingeruntur uentri cōmoda, concoctu facilia, & melcibus addatur. Ad inunctus confert aceti cum sapa. Condimentū sit cuminum, apsiū, sceniculum, aliorū parcus sit usus. Et maxime ab omnibus bellarijs abstinentum est. Vinum utile est tenue & albū. Iuacunditatis tamen gratia etiam uinum dulce & uini multum permititur. Ex fructibus uua arefacta optima est, deinde ficus ante cibum. Postea malti punicum post omnem cibū. Et amygdalæ uirides cōmode sunt ante cibū. Et bono cōcoctionis porissima ratio habenda est. Deambulationes lenes plurimæ



mane ac uesperī optimā sunt. frigida lotio balneis præstat. Verum in calida se lauant incommoda est multa in aëre conuersatio. Et capitis persusio solis melior est. Et post hæc large per frigidam refrigerat. Dormire ad satietatem commodū est. Ab ira & indignatione, in solatione; ac uehementi frigore abstineant, itemq; ab omnibus quæ caput replent.

De morbo pediculari.

Cap. LXVII.

Pedicularum generatio quibusdam acuatim in capite cōdngit, multis humoribus moderate calidis in profundo cutis collectis, ubi etiā pediculos generari contingit, nō in superficie cutis, in qua furfures consistunt. Itaq; pharmaca ipsorum necessariū est siccat esse, & quæ magis ex profundo attrahere ac euacare possunt. Lupinos igitur in aqua coquito, & decoctum ipsorum affricare iubeto. Aut myricæ decocto, aut aqua marina, aut muria meraca cum aceto perfundito. Aut hederæ succū melle mixtum illinito. Aut perdicij succum dormitū cum illinito. Aliud ad pediculos capitis, ac totius corporis. Ligu stri florem cū uino tritum, capiti ac toti corpori affrica, ubi dormitū ire uolet. Aut staphidis syluestris partes ii. sandarachæ & nitri, utriusq; parē i. adhibe cū aceto. Aut rhoem culinariū cum oleo tritum illine. Aut alumine cū oleo trito utere. Aut ueratrū albū, & staphidē syluestrem, ac nitrū, æquis portionibus cum oleo trita, in balneo adhibe. Aut rumicis syluestris radice cū oleo in balneo utere. Aut modico pipere cū multo oleo utere. Aut oleū lauriniū aut raphaninū illine. Si uero pili denudati sunt, staphide syluestri cū aceto & oleo utere. Aut alumine liquida cū oleo. Prodest itē ipsis porus allij drachmarū duarū, cū organī triti drachma una ex aqua mulla.

De achoribus & reliquis pustulis ca.

pilis.

Cap. LXVIII.

Vulnusculum quod achor Græcis appellatur, in capitis cute consistit, tenuia foramina habēs, per quæ tenuis sanies effluit mediocriter uiscosa. Similis autē est ipsi alia affectio, quæ Corion, hoc est, fauus appellatur. Quæ quia foramina maiora habet, humores mellis similes cōtinentia, Meliceris uocatur, hoc est, fauus mellis. Proinde scopus in his est ut humores affectionē facientes euacuemus. Si uero adhuc influxerint, ut prius influxionē impediamus, euacuat primum corpore per purgatoriū medicamentum, in initio sumpto à uenæ sectione, si æger ferre potest. Deinde purgatorio utimur sero lactis præparato ex aqua mulla, ammixtis ad ipsum epithymū drach. iiii. Relata est autē seri præparato Sermonis secundi capite nonagesimo sexto. Si uero intemptatus est laevis usus, colocynthidem perfectā acdpe, & semen ejice, & in ipsam tomentū siue pulpam adhuc habentem, sapam aut uinū mullum infunde, & per diem ac noctem macerat sine, & postea calefactū exhibe. Deinde uero etiā caput purgandū est per ea quæ naribus induntur, & quæ per os pituitam extrahunt. Conueniunt autē ipsis secantia & diffusoria medicamenta, eō quod uiscosus est humor qui affectionē generat. At uero incipientes achoras, ubi totum corpus superfluitatibus caruerit, per adstringētia ac repellentia curabis. Talia autē sunt myrrū, & pini cortex, & rubi folia imposita, plantago imposita, oleæ syluestris succus affricatus, salicis folia & flos imposita, similiter polygonū. Quadam uero prohibēt ne

achores augeantur, simul reprimētia quod influit, si multq; cōcoquentia ac discutientia quod iam cōtinetur, ut quæ mixtas uires habent, quibus sanē post principiiū uti oportet. Tale est oleū myrteum & rosaceū & lentiscinum, rubi succus cū oleo, portulacæ succus cū oleo, Iadanū cum uino illitum, ligustriū & lētes. Quædā uero antiquis & moderatis auxiliantur, discutientia & extergētia citra sensibilem caliditatem, nō tamen aliquid irritans habentia. Quibus utendū est maximē ubi dolor aliquis cū achoribus affuerit. Sed & in his ad debillioribus initiū facere cōuenit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est, & Crætica ac Samia terra, pompholyx sitē ac spodium, & spuma argenti & Cadmia tenera, & adiantū cum rosaceo illitū, & fœnigræci decoctū affricatum, & malua trita cū loliacea farina imposita. Aut mellilotū cū farina fœnigræci ex uino impositū. Item cicerū decoctum, & ipsum cicer coctū impositū, necesse radice cōmanse ac illitæ, quod si his nihil effeceris, siccū ex charta pharmacū illine cū aceto. Si uero acrius tibi uideatur, spumā argenti parī portione adde. Si uero nō affuerit siccū pharmacū ex charta, chariā ure, & cinerem eius aceto subige, ac utere in his qui durā carnem habent. Quædā porro uehementē ad eū uim habēt, ut ualde crassos ac uiscosos humores euacua re possint, ipsosq; dissoluere achoras, etiam si tam in scirrhum indurati fuerint. Talia sunt chalcitis, sex uini uis, sandarachæ, & calx. Acetū autem forissimū est omni tempore ad achoras, & discutiens & repellens. Sit autē acerrimū. Discutit etiam optimē lilij radix affricata, & thus cū aqua & nitro, & lupinorū amarorū decoctū affricatum, & cucumeris syluestris radix cocta, & fici folia cum aceto trita, bulbi cū nitro affricata, rutæ folia imposita, farina fœnigræci cū nitro affricata, thus cū aceto illitum, malicoriū cum laurino oleo illitum, allii cum cauliculo ustū, ac cinere cū oleo illito. Hoc ualde bonū est. Aliud. Mueller quædā nubes regias mandebat, & puero achoras habentē imponebat, & sanatus est. Aliud. Radices anchusæ uitas, ac cū oleo ad strigmentū spissitū dinē tritas, illine cū penna, & sanabis. Aliud. Thy mū urito, & cinerem cū uino & oleo subigatū illinito. Aliud. Cnestriū quam in Alexandria liparona uocāt urito, & cinerem cū uino tritū illinito. Aliud. Buccinarum ustarū cinerem cū aqua adhibeto. Si hoc salutare pharmacū non solū ad achoras, sed etiā ad omnem popularū eruptionem. Quod si inderis in achoras inflamatos & dolētes, dolorem prius liquido medicamēto concoctorio mollienteq; ac leni mitigabis, quale est parhygrū, & omnia ad sedem parata, & quæ ad carcinomata descripta sunt. Fari nā itaq; sabacæ uino madesacta ac tritam, ut emplastrū formā acquirat, imponito. Facit & ad seruiciora & agrestia in capite pustularū genera. Aliud ad maximos & inflamatos dolores, leniens, dolorē extimens ac percurans. Collyriū quod asper appellatur, aut aliquod ex Libianis appellatis, aut consimile quoddā cū modico hyoscyami succo terito, & adiecta sapa ac rosaceo illinito. Alia pinguis cōpositio, ad achoras, pustulas, papulas feruidas, intertrigines. Est & ad sedem bona. Spumæ argēti drach. viii. foliorū rutæ tenerorū drach. x. v. Aceto dilue, & rosaceo aut myrteo excepta pennis illine. Hoc magno experimēto nobis constat. Alia similis, Spumæ argenti

gēti drach. iiii. cerusē drach. vi. sulphuris uiui drach. iiii. ceræ drach. iiii. rosacei aut myrtei quantū satis est. ut liquidi cerati spissitudinem accipiat. Liquida sicca assidue, & unitis utere. Hæc ad totius corporis pustulas cōmoda est. Alia ad humidos achoras. Ladani drach. viiii. cerusæ tāundē, sulphuris uiui drach. viiii. utere cū uino & myrteo oleo. Aliud pharmacum. Ladani, baccharū myrti nigrarū, spumæ argēti, sulphuris uiui, seminis hyoscyami, malicorij, æquas portiones terito, & uino ac myrteo, aut rosaceo oleo affuso utitor. Aliud ad feruidas, saniosas & impetiginosas papulas. Verbenacæ supinæ drach. viiii. acaciæ drach. viiii. myrrhæ drach. ii. uino austero trita illine. Aliud. Faciæ & ad eas quæ in mento sunt. Baccharū myrti, malicorij, atramenti sutorij, spumæ argēti, æquales partes tritas cū uino & oleo myrteo adhibe. Emplastrū ad achoras ueruosissimos. Resinæ pinus sicca, ceræ, adipis suilli, aut bubuli, æquas portiones simul liquatas in aquā excolato, & diutius manibus emollitis utitor. Aliud. Quo usus est Aegyptius in Palladio Magistriano in Alexandria, ubi medicorū auxilia frustra tenasser. Colophonizæ semissem, ammoniaci thymiamatis sextatē, galbani scrup. iiii. opopanis scrup. iiii. olei drach. iiii. mastiches, ceræ, singulorū unc. i. resinæ pinus lignosæ drach. iiii. æruginis scrup. iiii. Quod si magna affuerit acrimonia, æruginem ne adicias. Hoc abcessus discutit, & tam ruptos euacuat ac sanat.

Ad capitis scabriciem. Cap. lxxix.  
Rutam & alumen terito cum melle, & præralis pilis illine. Aliud. Sulphur uiuum & staphidem syluestrem terito, & picis sero ammixto illinito.

Ad parua & densa ac rubicunda capitis ulcuscula. Cap. lxxx.

In paruis ac densis & rubicundis capitis ulcusculis, mamarū papillis similibus, à quibus etiam faves effluit, caput radito, & semen lini tritū ac melle subactū imponito. Aut cōchyliū urito, & cū aqua tritū imponito. Aut emplastrum ē lolio imponito. Et ubi euacuat fuerint humores hoc sublatū myrsinā appellatū imponito. Cæterū ad rubicūdas papulas in capite, cerulam cū laurino illine. Aut pini corticem cerato. Aut testam clibanī cū aceto aut uino. Aut betam coctā impone. Aut betæ succū ad ceratum rosaceum quantum eius admittit, adijce & impone.

Resiccantia & cicatricem inducentia achoribus. Cap. lxxxi.

Spumæ argēti drach. xxi. caldis uiuæ tantundē, acetū unc. i. rosacei tāundem, utere. Aliud ualde bonum, quod humida ulcera resicat, & cicatricem includit. Spumæ argēti, cerusæ, ordeī usti, æquales partes cum rosaceo aut myrteo illine. Emplastrum melinum, resiccans omnē fluxionem, & cicatricem inducens, præsertim in antiquis ulceribus. Spumæ argēti, cerusæ, salis fossilis, singulorū lib. i. aluminis scissi semissem, atramenti sutorij semissem, olei lib. ii. acetū sextar. i. oleum, spumam argēti, & salem, ac ceru sam coquito, singula per se & simul leuissimē trita. Vbi uero nō amplius inquinauerint, aluminē & atramentū aceto diluta, ad pharmacū ab igne ablātū & aliquo modo frigefactū paulatim adijcitur, unito, & in mortario diffundito, & probè mollieto, utitor.

Smezzata ad achoras, furfures, asperitates, ac scabriciem. Cap. lxxxii.

Quod si in declinatione fuerit affectio, & omnino ad cicatricem uergat, ad totam affectionē eradicandam huiusmodi smezzatis in balneo utendum est. Teræ Cimolizæ lib. ii. niri rubri tantundem, myrobalani lib. i. myrrhæ, irisidis, piperis, singulorum unc. i. nardi cellicæ, costii, calizæ singulorū unc. i. contusito, cribrato, ac utitor in balneo.

De aurium affectionibus. Cap. lxxxiii.  
Aurium dolores sunt, tū ob frigiditatem à uentis inductam, aut à frigidis aquis, aut ipsè medicatis, in quibus homines se lauant: tū ob inflammationē cutis in meatu, aut nerui auditorij in profundo. Fit etiam dolor propter spiritū flatuosū, quā trāsitiū non habet.

Ad dolores ex frigidityte. Cap. lxxxiiii.  
Dolores itaq; à sola frigiditate obortos, calcificationem celerrimē curant. Cepa igitur aut allium in oleo seruēfactū frigiditates omnes sanat. Ego uero euphorbio modico ad multū oleū ammixto utor. Aut pipere exactissimē trito cū uino & oleo. Prodest & amarandinum, & optimum nardinum, & laurinum. Sed & ruta in oleo dulcissimo cocta maxime facit.

Ad dolores ex aqua medicata. Cap. lxxxv.  
Quum medicata aqua circa auditorij meatum cōtinetur, oleum assidue infundere conuenit, ita ut aurem eluamus, & per mollē lanam detergeamus, & deinde rursus infundamus. Magnopere uero ipsos mitigat omni candidum cū lacte muliebri tepidum infusum. Omnia enim quæ adhibentur, moderate calida sunt. Prodest ipsis & anserinus adeps. Sed & exustio per os aquam attrahit. Aut per aurundinem, uelut per aquæfuseum instrumentū (siphonē Graeci dicunt) exustione facta, ceparum succū cum anserina adipe instilla. Valde enim mitigat. Si uero quis uino pede auris affectæ proximo exillat, indinans quodammodo seipsum, aquam facile excernit.

Ad dolores aurium ob humorū crassitudinē. Cap. lxxxvi.  
Si dolor auris cū capitis grauitate obortus fuerit, crassif & pituitosi humores causa doloris existunt. Dinotio autē ex prægressa diætā tibi continget. Nitrū igitur ac spumā niri auricularibus pharmacis miscibus. Veratrū item album ac nigrum, & amygdalas amaras, & æ aristolochiis ea quæ ad manū est, & cucumeris syluestris ac bryoniæ radicē, & centaury magni radicē, & parui cōmā, & iridem, & calsiā. Et in summa, omnia amara citra mordacitatem ac molestiam meatus purgant, & extergent, & crassos humores impios secant.

Ad aurium sordes. Cap. lxxxvii.  
Ad aurium sordes ungentū nardinum tepidum instilla, & sequenti die per specilli cōcauum eas quæ expositæ magis sunt expurga, & rursus nardinū infunde. Si uero locus durus fuerit, aut etiā sordes duræ, nitrū torrefactū ac leuissimē tritum in aurem insperge, & acetum calidum instilla, & apposta lana pernoctare sine. Postera uero die, aqua & oleo calefactis elue.

De sonitu aurium. Cap. lxxxviii.  
Sonitus in auribus plerunque ex flauoso spiritu generatur. Fiunt etiam aliquando ob sensus auditus subtilitatem, ex euaporationibus. Dinotio cōtingit tibi primum ex temperatura & habitū hominis. Deinde etiam ex omni prægressa diætā. Sed & ex eo quod aut paulatim, aut accuratim fit sonitus, inuenire

uenire datur affectionem. Quin & ex eo quod hoc sonitus accidens aut per interualla redit, aut perpetuo permanet, affectio cognoscitur. Exacta uero diuotio hec ita te fiat. Si enim quis putet à spiritu flatuoso exitum non habente, sonitum fieri, & secantia ac atrenuantiā adhibeat, & nihil proficiat unā cum hoc quod etiam his quæ pituitam per os ducunt utatur. Tunc sanè ob auditus subtilitatem, sonitum fieri cōiectet. Ego uero in talibus ammisce ex his quæ sensum stupefaciunt, uelut est mādragoræ succus, & opium paucissimū. Aut oleū in quo intestina terræ cocta sunt infundo. At uero ad sonitus ob flatuosū spiritū generatos, talia cōmoda sunt. Apollonij ad sonitus ac bombos & sibilos derepente fientes. Accetum acerrimū calefactum infilla. Aut acetum cū rosaceo calefactū infilla. Si uero perseuerarint, cuminum, rutam, anethum & nigellā, cū aceto coquito, & rosaceo adiecto uitro. Aut colocynthidis medullam in oleo coquito, & oleū infundito. Si uero adhuc remanet ampliori tempore, omnibus amaris & acerbis, & attenuatorijs ac discussorijs utere, quæ paulò antea descripta sunt ad eos qui ob humorum crassitudinem aures dolēt, ita ut singula cū aceto coquas, & mel addas. Facit autē ad inueteratos sonitus, castorium & spica nardī, æquis portionibus cū aceto & rosaceo. Aliud ad sonitus diuturnos, Herbarum lanariæ, croci, castorij, ueratri albi, æquales partes tere cum aceto, & informa pastillos, & utere cū uino. Cæterum ad sonitus ex morbo, fomento per absinthij decoctum adhibito, acetum cum rosaceo infunde, aut raphani succum cū rosaceo. Aut aloē optimam cum uino mulso. Si uero adhuc perseuerarint, ueratro nigro cum aceto cocto utere.

Ad auditus difficultatem ac surditates, Cap. LXXXIX.

Qui difficultatē audiūt, per hieram ex aloē, aut per capraporia ex colocynthide purgati sunt, & pituita per os detrahenda est, & caput omni modo reficadum ac corroborandum. Utendum est & attenuatoria dextra. In ipsam uero aurem immittenda sunt pharmacæ quæ findunt ac secant, acetum uero uiscosos ac crassos humores. Quorum sylua iam antea relata est in his qui ob humorum crassitudinem aures dolēt. Fomenta ad grauē auditum, Apollonij. Ad audien di difficultatem derepente oborā, & ex capitis dolore, absinthij cum aqua in olla coctum per arundinē pro fomento adhibe, ita ut alterā arundinis partem cavitati auri adaptes, alterā uero foraminis operculi ollæ inferas, quo uapor qui exhalat ad auditorium meatū allabatur. Aliud. Baccas lauri aut folia in aqua coquito, & similiter utere, aut origanū, aut hyssopū eodem modo, aut aquā marinā cum aceto similiter. Est & hoc optimum, urinā tauri, aut bouis, tertiam aceti partē addita, pro fomento adhibeto. Ite myrum cōtustum similiter coctū adhibeto. At uero circuli ex lana auri circumdare oportet, ut ne loci uicini amburantur. Eloriones porrò his conueniunt, acetum acre albū, cum pari aquæ mensura, & nitro leuissimè trito calefactū infunde per multos dies. Et postea aqua calida elue, atq; sic subscripsi infunde. Quæ auribus in auditus grauitate infundantur. Porri succū irino ungento ammixto infunde. Veratri nigri radicem cum aceto tritam, & melle exceptā, in aurē inde, & per dies quinque sine Capræ recens maciatæ cornu urina eiusdē exple, ea

maximè quæ in uesica ipsius reperitur, aut alia asseruata, & cornu in fumum ad dies nouē suspende, ac utere. Clauos caligariū ueterum numero centū, in uino Amingo ad dies septē macerato, & donec sepius ebulliat coquito, excolato, & adseruato, & usus tempore quātum satis est calefactū infundito. Hoc usque ego surdū curauī. Aliud. Aphodeli radicē in oleo coctā adhibe. Hoc etiā in ueteratā audiendi difficultatē sanat. Optimus est etiā cucumeris sylvestris radicem aut foliorum succus cū aceto infusus. Aut capræ urinā & fel eiusdē simul calefacta infunde. Aut castorium cum baccis lauri & aceto. Aut ueratrū nigrū cum aceto terito, & melle diutius cocto excipito, & collyria ad glādis figurā formato, & in meatū indita per triduiū finito. Aliud. Nasturtij seminis quantū satis est, & nitri parū, siccus pinguis carne granulis exceptis excipe, & collyria meatui auri congrua est forma ac inde, & per triduiū sine. Hoc sordes multas ducit, & statim alleuat. Aliquādo uero pro nasturtio sinapi conijungimus. Vtere hoc etiā ad aurium sordes. Multū quoq; opitulatur ad auditus grauitatem spōgia in tenues partes cōcisa, ac intorta & melle imbuita meatui indita. Idē cōmodum est ad enascentem in auditorio meatu superflūā carnē. Aliud. Omnis piscis fel infusum prodest, itē perdicis, & capræ. Aliud. Fel tauri cū anguis senectū tritissima aceto exceptum, & meatui inditū, grauem auditum soluit. Quidā cum rosaceo indunt. Aquæ uero fomentum adhibere oportet. Aliud. Saluæ succū cū oleo omphacino in aurē infilla. Vtere, est ualde cōmodum. Aliud. Herinacē terrestris fel cum oleo infunde. Aliud. Veratri albi drach. iiii. castorij drach. i. spumæ nitri drachmam i. infunde cum aceto, & utere uelut optimo. Vtere etiam pastillo ex amygdalis amaris cum aceto mulso. Descriptus est ad aures purulentas.

Ad aurium inflammationes.

Cap. LXXX.

Moderatas & non pulsantes inflammationes sanar rosacū cum aceto tepelactū. Et glaucium in core medica tritum cum uino dulci ac modico aceto. Si uero uehemētior fuerit inflamatio, dolores quidē mitigat, teneat, ac candidū oui cum lacte muliebri tepidū infusum. Optimū uero ad ipsos pharmacū est nardinum unguentum, cū modico medicamētō Basilico appellato, aut cū adipe anserino, aut phasianino. Vbi uero magnus est dolor, necesse est stupefacientibus sensum uitā, ita ut ad lac muliebri, & oui cādium modicū opij ammisceamus. Ammisceundū est & castorij, ad uehemētiores dolores pari mensura, ad leuiore dupla proportione. Nos autē opij & castorij cū sapa probe conterimus, & tepelacta infundimus. Oportet autē omnino non cōtingere auditorij meatum tempore doloris. Et fomentū adhibere per auricularij specillū, lana mollissima circumdatum, ita ut lanā tepido Basilico medicamētō, cum nardino aut alio ex his quæ infunduntur tingamus, & ad principij auditorij meatum indamus, & pharmacū in profundū destillare sinamus. Et hoc aliquid facere oportet. Postquam uero repletus est meatus, lanā superne obdito. Quod si æstas fuerit, & multæ caliditatis sensus agrū circa inflammatā aurē uexarit, fomentum per rosacū bonū fiat. Mitigat porrò seruētis inflammationes tepida cū rosaceo infusilla, auriculæ muris succus, & polygoni, & portulacæ, & ranctorū

cucurbitæ succus. Ite aranei cū rosaceo cocti, & asela si sub hydryis stabulantes similiter, & intestina terræ eodem modo. Et blattæ domesticæ interanea cū rosaceo. Et oleū amygdalinū achysocycinū. Medicamentū auriculare ē succis, ad inflammationes quæ ægrè transmutantur: citò enim ipsas suppurat. Succus ramentorū cucurbitæ, succi calami, succi perdicij, succi brasicæ, singulorū cyathum unum, nitri costi, myrrhæ, croci, singulorū drach. ii. i. unguetū nardinū unc. i. aluminis liquidi unc. i. acetū scillidici sextante, melissæ optimi lib. i. excipe & reponē in vitreo uase. Et usū postulante, cū nardino aut rosaceo diluto utere. Aliud, ad diuturnas & ægrè transmutabiles inflammationes. Galbanī drach. vii. leui taurinī drac. iiii. ceræ, colophonix, saponis, singulorū drach. iiii. picis drach. i. Colophonix, picem, seu liquefacto, & galbanum cū cera præmolitum adijcto, & deinde etiā saponē, & excolaris utitor, ita ut in cote cum aqua aut oleo aliquo diluas. Ad maximos dolores. Aloē optimam usū multo dilutā instilla, aut lanas succidas aceto resu facto, & instillato, in superque ipsam lanam in aurem indito. Quod si midius facere uelis, cum aceto aut sapa coquito.

Ad aures absq; ulceratione humectas, quæ uelut exudat, & serosum humorem excludit. Cap. lxxxii. Misy in linteolum illigatum & prunis obrutum, exurito, & unā cū exusto linteolo terito, & per arundinem insufflato. Aut gallas terito, & linteo illigatas exurito, ac similiter utitor. Aut alumen in testa exustū, & oleo præafuso tritū insufflato. Porro postquam penitus sedata fuerit inflammatio, castorij cū oleo infundatur, quo derinitū ex afflicto se soluat.

Ad ulcera in meatu auris. Cap. lxxxiii. Recentia quicquid ulcera glandium curat solū cum aceto tritum, & omnia ex ipso collyria, & quæ ex croco, itemq; ex rosis fiunt & appellationē habent. Curat etiā eadem collyrium Damocratis ex myrrha. Quæ uero purē manāt citra dolorem, & moderate hoc patiuntur, per eadē curantur. Quæ uero fortiter pure manant, per pastillos. Qualis est Andronis & præsertim Musæ, cum sapa & modico aceto infusus. Quod si etiā hæc superentur, recrementū ferri cum acerrimo aceto, in caniculari æstu ad solē terito, & pastillos efformato, & utere cū aceto. Si uero nō est canicularis æstus, recrementū ferri leuissimē tritum cū aceto ad prunas coquito donec resiccet, & utere cū aceto. Aurij elotiones. Cæterum Apollonius ad aurij ulcerationes talia scribit. Vino multo calido frequenter ipsas elue. Aut myrrū cū uino coquito ac utitor. Si uero fordidū fuerit quod prodit, malicorium & lentē cum uino coquito, & tepidū infundito. Post elotiones autē cōueniunt ad infundendū, sel bubulum, & maximē pordinū, in malcorio tepesactū instilla. Idem facit & caprinū sel, & omnis piscis sel rosaceo ammixto. Aliud optimū. Alumen scillidum tritū, cum sapa & aceto in seruētū cinere coquito ad mellis spissitudinē, ac utitor. Facit etiā omne alumen cū polygوني succo, & Erasistrati Panachrestos appellata ab omni moda utilitate, liquida. Habetur autem inter ocularia medicamēta. Aliud. Aluminis fisci, croci, gallarum, æquis portionibus utre cū uino. Auricularis cōpositio ad dolores magnos, & pus albū. Amygdalas amaras decoratas viii. spumæ nitri albę drach. iiii. thuris drac. iiii. opij

drachmas tres, croci drach. iiii. galbani drac. ii. myrrhæ drach. i. aceto trita excipe, & forma pastillos ac utere, si dolor adest, cū rosaceo. Si pure manāt, citū uino multo, aut aceto aut sapa. Si uero auditus grauitas affuerit, cum aceto ad diuturnas ulcerationes. Aloēs, thuris, myrrhæ, singulorum drach. iiii. misyos dra. ii. efforma cum aceto, & utere resolutis cū aceto aut rosaceo.

Ad corruptiones ac fectores aurium. Cap. lxxxiiii. Malicorij & lentis decocto elue uelut prædictū est, & utere subscriptis. Aluminis fisci libram unam, atramētū futoriū drach. viii. myrrhæ drach. viii. crocomagmatis drach. viii. uini dulcis myti sextar. iiii. Alumen cū uino coquito, & ubi ad compagem redactū fuerit, reliqua prius trita cum aceto adijcto, & unitis utitor cū sapa & aceto. Aliud, ad purulentas & graueolētes aures. Vri sel instilla, si uero aridum fuerit, cum aceto & sapa diluto utere. Summē enim prodest. Aegyptium pharacum ad omnes relationes affectiones, etiā si fuerint cōgenitæ. Amygdalarū amararū drach. ii. piperis albi drac. ii. fabarū Aegyptiarū internam partem drach. ii. pōdere, croci, myrrhæ, opij, thuris, castorij, singulorū drach. ii. omphacij drac. iiii. atramētū futoriū drach. iiii. spumæ nitri drach. ii. Terito cum aceto in quo malicorium coctum est, & excipe ad strigimētū tam spissitudinem. Vfus autem tempore quantum satis est de hoc pharmaco excipe, & nardino ungento dilutum instilla.

Ad superexcrecentes in aurium ulceribus carnes. Heraclide Tarentini. Cap. lxxxv.

Aeruginis drach. viii. squamæ æris drach. iiii. mellis hemina dimidiū, hoc est dodramē. Arida trita melie excipe, ac coque ut rubicūdum pharacum euadat, & utere super eminentē locum hoc ponens. Aliud. Aeruginis drachmas quatuor, atramētū futoriū drach. iiii. succi marubij cyathos tres, mellis quantum satis est, præpara & utere uelut dictū est. Aliud Apollonij Memphisæ deprimit omnē superexcrecentē carnem, citra dolorem. Aluminis fisci drach. iiii. misyos usti drac. iiii. æruginis drach. ii. lemnij sigilli drac. ii. gummi drac. ii. (aliq; singulorū totum cias pro drachmis habet). Terito cū aceto, & forma pastillos, ac utitor cum uino aut aqua. Deprimit & cicatricē inducit. Facit & ad nares exulceratas.

Ad uermes in auribus.

Cap. lxxxvi. Vermes in auribus aut generatos, aut extrinsecus illapso, amara & acris in summa occidunt, uelut sunt, capparis foliū aut succus, cedria, urina humana uet, singula cū melle: aut aristolochia trita infusilla: aut calaminthæ succū infunde. Aut uerarū album cū uino: aut colocynthis decoctum, aut ceterarū, aut absinthij, aut polij cum uino: aut scordij, aut marrubij succum, aut elaterij cum aceto. Facit & malug horrentis aut syluestris succus: maximē in his que sunt inflammata.

Ad sang uinis ex auribus eruptiones. Cap. lxxxvii. Ad sanguinis ex auribus eruptiones, ut ne in grumos coeat, porri succum & acetum mixta infunde, & sanguinē sistet, & grumos dissoluet. Aut malū punicum in aceto coctum infunde. Aut gallum in aceto coquito & excolato, & rubi succum misce to ac infundito. Aut polygoni succum cum modico aceto, aut acaciam, aut amurcam, aut lycium cum aceto instillato.

De calculis aut alijs corpusculis in autem illa=

plis.

Cap. lxxxvii.

Si calculus, aut faba, aut consimile quid in meatu auris illapsum fuerit, elue. Aut specillum lana obuolutum resina tinge, & extrahe. Aut per glutinosum aliquod pharmacu aut dropacem idem facito. Quod si non successerit, sternutorum naribus inde, & os obitura acnare. Nam iuxta contingentem spiritus extensionem id quod incidit effluit. Hoc autem aliter fiat, donec exciderit. Si uero intus manserit, auris inflammata cõuulsiones inducit. Optime uero eorum quæ illapsa sunt eiectione adiuuari conuulsio, ita ut si puer fuerit, pede teneatur, & cum concussione in caput eleuetur. Si uero perfectæ ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabula secundum affectum aut rem redinatu, caput ad tabula firmare iubeto: Dein de leuata tabule circa caput parte deferri finito, id quod sæpe repetito. Mouebitur enim quod incidit, & ad expeditiores meatus partes progredietur, atque ita angusta & cõcaua specilli parte immissa scite extrahito. Si uero faba aut consimile quid in aure illapsum, in ea maneat, madescentibus ac tumefactis dolores inducat, impossibile est ipsum integrum eximere. Quare per specilli concauum industrice partem ad diuidere ipsum oportet, atque sic particulam extrahere. Deinde sapam aut uinum dulce calidum insundere ac lenire meatum ex laniatione ostensum.

Ad affectiones aurium extra meatum. Cap. lxxxviii.

Foramina in pulpis aurium in pueris inflammata, oleo quod in ærea lucerna ærugine contraxit, assidue illine, & sanabis. Ad cõfusas autem aures, myrrham, mannam thuris, terram nigram, quæ quidam pro smegmate utuntur, cum aceto ad ceram spissitudinem unita imponento. Philagrii ad cõfusas aures. Mannam thuris aut ipsum thus, & aloem, cum uino & rosaceo terito & imponento. his etiam cochleas paruas integras tritas, si haberi possunt, addito. Aliud. Intestina terre cum modica terra ex qua accepta sunt, tere & impone. In quibus uero fractæ sunt aures, inrinscæ expeditorem cõcauitatē cartilagineam figulina terra expleto, & resicari finito, ac solanum cum cerusa illanito, donec in integrum restituantur. Si uero inflammatio ad contusionem accesserit, meatui quidem butyrum, repidum, aur adipem asnerintum, aut gallinaceum instilla. Aut etiam ocymum succum cum aliquo ex relatis adipem. Forinscæ uero cerusam cum solani, aut pollygoni, aut coriandri succo illine. Aut putamen mali punicum dulcis in uino cõctum ac tritum obline. Aut glaucio utere. Emplastrum autem hoc adhibeto. Sandacis lib. i. olei lib. i. aquæ semissem. Coquito simul, donec non amplius inquinent, & utere.

De parotidibus.

Cap. lxxxix.

Parotides ex genere sunt inflammationum. Fiunt autem glandulis circa aures affectis. Non tamen utrimque in ipsis, uelut in alijs partibus inflammationis, in principio repellentibus. Imò uice uersa attractorijs utimur, assilgentem humorem ex profundo ad cutem attrahere cõtantes, & naturæ opem ferre, quæ per humorum ex loco in locum, impetuosum illapsum, febres curat. At uero quum uehementi impetu fluxus illabitur, nihil nos curiosius agentes, omnia naturæ permittimus. Si enim aut cucurbita, aut pharmacu quoddam

humores ex profundo ad cutem attrahēs adhibuerimus, uehemens dolor hominē occupat, ut ex ipsis & uigiliæ succedant, & febres intentantur, ac uires exoluantur. Mitigare igitur tunc potius cõuenit, & non humorum influxui optulari, per cataplasmatum maximè leniēdum usum, quæ ad hoc quod moderatè humectata habent caliditatem, per quam mitigare dolores ualent, etiā influentes humores cõcoquere possunt ac suppurare. Vbi uero suppurati fuerint, discutere ipsos aggrediemur. Si uero duricia cum dolore apparuerit, emollientia ad attractoria miscébimus. Proinde ubi uehementis dolor obdinet, & humores adhuc influunt, butyro utemur locū assidue illinentes, aut adipem suillum, aut butyrum & adipem simul liquefaciemus, & modica cera adiecta, ut mollius ceratum fiat imponemus. At uero moderatas parotidas, in quibus neque multa copia influit, neque dolor uehementis adest, neque suppuratio expectatur, facillè curabimus per fomenta ex muria, & cataplasmata ac pharmaca discutitoria. Quale est Mnasæ emplastrum, & emplastrum ex succis, & his adhuc magis ea quæ molliora sunt & ceratiformia, ex butyro & celypo parata, quæ assumunt ostrea usita, aut buccina, aut purpuras. Quale est & hoc. Adipis anserini ueteris insulsi sexuncem, butyri unciam unam, ceræ sextantem, ostreorum uisorum tritorum sextantem. Liquebilibus liquatis ostrea inperge, & unitis uterè cõfidenter. est enim efficacissimum hoc. Aliud ualde bonum. Apochymatis sexuncem, picis bessellem, ceræ quadratam, colophinis sextantem, adipis utulini sesquialteram, bituminis sextantem. Reliqua liquato ac excolato. Bitumen uero cum modico aceto terito, & liquata ad ipsum affusito, & emollitis uitior. Quin & in induratis ita ac diuturnis parotidibus, buccina usita & omnia ostrea adipi ueteri porcino liquato ammixta, uelut dictum est, citra omnem molestiam discutit omnes diuturnas ac induratas inflammationes. Quapropter utendū est in durioribus? parotidibus albo emplastro ex buccinis, quod Ariobarzanum appellatur, & eo quod Dionysia appellatur, & ex miffy paratur. Describatur etiam in sermone de emplastris. Ego uero soleo parotidas puerorum & mulierum solo butyro curare.

De narium affectionibus.

Cap. xc.

Ex genere tumorum præter naturam polypi in naribus generantur. Eius generis uero ulcerum ozæna. De excretionibus autem præter naturam sunt sanguinis eruptiones. Ozæna itaque ex acrimia & putredinosa humorum influxu sunt. Nam si solus humor fuerit, incurabilia ulcera facere solent, non tamen graueolentia. At polypus appellatur, polypus marini carni iuxta essentia proprietate, & colore & compage similis, ex crasis & uiscosis humoribus generatur. Cæterum curatio utriusque communis est, ozænae & polypo, ut primum caput resicetur ac corroboretur. Manifestum est enim quod utriusque humorum redundancia naribus ex capite influit. Quomodo uero caput roborare oportet, iam dictum est, ubi de capitis dolore egimus, ubi diuersa smegmata & epithemata descripsimus, quæ incipiti ac toto capiti præsertim imponuntur. Verum ad ita præscripta optime ad ipsos facit emplastrum ex anemiona capiti impositum. Itaque hoc Myrrhæ unc. i. thuris unc. i. cochleas integras v. ouorum cãdida ii. Omnia in mortario cõtusa ac mixta illinito, linteo capiti superimposito, & finito per dies ix.

Atque

Acque ita postea localibus auxilijs utere.

Ozenarum curatio.

Cap. xci.

Postquam itaq; per prædicta caput corroboratum præparaueris, ad nasi curationē procedes, scopum propositū habēs in ozenis, ut affectam partem per pharmaca mixtam usum habentia resifices, repellentia uidebunt ac discussoria. Repellunt igitur austera & acerbā, quæ in communi adstringentia appellantur. Discussunt autē siccam & calidā usum habentia. Arctigenes autem ad dolores in naribus & ozenas talia describit. Calaminthæ succū infunde. Aut ipsam siccam trita infussa per arundinē. Aut erug succum alsidue infunde. Aut mel in nasum stillato, & per sternutatoriū concussione facta, tectoria ulceri obducta excutito. Deinde ueratrū album cū multo nasturtij semine naribus attrahere iubeto, & postea a murcam cū melle illinito. Aut ranunculū succum cū alumine liquido in nasum instillato, & attrahere iubeto, atq; hoc facito donec perfanaueris. Si uero antiqua fuerit affectio, etiā acetum accerrimū ammisceto. Meatus autem nasi ex hoc illinito. Spicam nardi & misy, æquis portionibus trita cū uino austero ad strigmentiam spissitudinē illine, & lana obtusa. Optime uero facit ad ozenas atramentū sutoriū melle cocto exceptū, & chalcitis eodē modo, & ærugo, & squama æris, & floridum medicamentū ori destinaum. Et hoc, chalcitidis crudæ drach. xii. cadmiæ drach. viii. terito cū aceto ad multos dies sub caniculæ seruire, & exiccato, utere cū uino ipsūm diluēs, aut siccum insufflans. Aliud. Mysios, chalcitidis, myrrhæ, singulorū drach. iiii. atramentū sutorij drach. iiii. aluminis scissi, gallarum, squamæ æris, singulorū drach. iiii. aluminis rotundi drach. ii. thuris drach. i. aceti lib. i. Omnia trita simul coquito in æneo uase, & ubi ad mellis cōpagem redacta fuerint ablatis utere, linamēto indincto & naribus penitus sine indito. Siccus puluis illi ad ozenas. Fructus ericæ, myrrhæ, nitri, malicorij, singulorum drach. iiii. croci, costi, singulorū drach. ii. trita infussa. Alius. Aluminis scissi, myrrhæ, singulorū drach. iiii. sandarachæ, rhois culinarij, salis ammoniaci, croci, costi, singulorum drach. ii. trita infussa, naribus prius uino mulso collutis. Aliud Theodori ad graueolentiā nariū. Amomi, myrrhæ, casij, rosarum siccarū, æquales partes tritas cū uingento nardino diluæ acutere. Aliud. Myrrhæ, casij, rosarū, singulorum æquales portiones confusas ac cribratas melle excipe, & mane ac uesperis illine, donec malum cesser. Aliud. Hedichro cū uino mulso trito utere. Aliud, Lucundū appellatū. Myrrhæ drach. iiii. casij drach. iiii. floris iunci odorati drach. iiii. rosarum siccarū drach. i. terito cum uino mulso ueteri, reposito ac uitor illinens ex eo nares. Aliud. Cyperi quadrantē, sandarachæ, aluminis scissi, myrrhæ, croci, singulorū unc. i. aridum infussa. Aliud Apollonij ad polypos. Veratrū & origanum trita infussa. Aliud. Veratrum nigrū & sandaracham, æquis portionibus cum oleo terito, & lana excepta naribus indito. Aliud. Atramentum sutoriū, eruginem, lafer, æquis portionibus, cū oleo illine naribus per specillū lana obuolutū, ad dies nouē. Deinde uoellula trahæ ac exime. Aliud ad ozenas quo alsidue uetur. Ad passillum Musæ adijce chalcitidis drac. vi. aliquādo etiā xii. & ueratrū albi drachmas

ii. Vtereq; cū uino mulso. Aliud. Auripigmētū tritū per specillū large admoue. Vbi uero intumuerit & eminuerit, ueratro nigro arido trito moderato utere, & in septem diebus ut plurimū nasus uacuuus redditur. Deinde diphryge trito cū melle expurga. Aut auripigmētum, calcē, & ueratrū albū trita cum melle adhibe. Aliud celebre. Myrrhæ drach. iiii. chalcitidis drach. iiii. casij drach. iiii. spicæ nardi drach. ii. mysios drach. ii. ueratrū albi drach. i. Vtere sicco, & cū uino mulso. Aliud bonum. Mysios torrefacti drach. viii. iridis drach. iiii. croci drac. i. excipe melle ac illine. Aliud. Aluminis scissi unc. i. myrrhæ unc. i. thuris sesquiunciā, muscij herbe quæ & dorcadias appellantur drach. iiii. æruginis drach. ii. salis ammoniaci scrup. iiii. terebinthinae unc. i. mellis trientē, aceti quantū satis est. Aliud, fact & ad polypos. Aeris usi, squamæ ferri stomomatis, aluminis scissi, singul. unc. i. myrrhæ unc. i. thuris sesquiunciā, aristolochiæ, uerbenacæ rectæ, squamæ æris, æruginis, singulorum unc. i. aut omnium æquas portiones, adhibe aliquādo uino diluta, & per linamentū inde. Aliquādo uero cum compositione ex moris, aliquādo cū melle. Aliquādo etiam siccū infussa, aquā in ore continere iubens. Aliud cuius uilitatē nō cōtemperis. Centaurij tenuis usi, polij usi, chamæmeli usi, singulorū drach. viii. æruginis, squamæ æris usæ, radicis cydamini siccæ, myrrhæ, aloēs, malicorij, singulorū drach. iiii. tritis utere prout uoles. Aliud, ad ozenas, & erosiones, & nomas, & crassitudinē, & omnia nariū uitia: Succū foliorū uitis albæ quadrantē, mannæ thuris, atramētū sutorij, chalcitidis, aristolochiæ, singulorū drach. iiii. terito & ficcato ac insufflato. Pastillus ad ozenas Cyri Archiatri Edellæ. Cadmiæ ter usæ ac uino extinctæ, plumbaginis, plumbi usi, spumæ argenti, spicæ nardi, thuris, foliorū cupressi, herbæ fabinae, gallarum, Lycij indicij, gummi, singulorum drach. iiii. ceruæ, glaucij, folij, balauftiorum, floris iunci odorati, malicorij, aloēs, acaciæ, singulorum scrup. viii. florum rosarū & foliorum singulorum scrup. vi. cōsula & cribrata terito cum aceto, & formato pastillos, ac utere cum uino, aut fapa.

Polyporum curatio.

Cap. xcii.

Iam antea dictū est quod ex crassissimis ac uiscosis humoribus polypos generatur, & propterea mixta materia opus habet, adstringēte & secante, & discutiente, ac siccante. Quorum sylua talis est. Aluminis scissi, myrrhæ, sandarachæ, singulorū drach. iiii. atramētū sutorij usi drach. i. gallarum drach. i. tritis utere, ubi prius nares uino odorato elueris, ita ut postea per specillū nucleū illinas. Vtere etiā his quæ ad ozenas præscripta sunt. Aliud. Soreos drach. ii. chalcitidis tostæ drach. ii. fructus myricæ drach. i. croci drac. i. myrrhæ drac. i. trita infussata uelut dictū est. Aliud. Chalcitidis tostæ drach. ii. mysios drach. ii. amomi drach. ii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. i. terito & uitor siccis. Aliud mirabile. Soreos quadrantem, aluminis scissi quadrantem, gallarum sextantē, myrrhæ sextantē, utere sicco. Aliud ad polypos, ozenas, ægilopas, & quæ circa sectionem ac uisionem remouere uoles. Disparat etiam ossa corrupta. Ramentorum æris rubri unc. i. salis ammoniaci sextantem, aluminis rotundi quadrantem, aceti accerrimi heminas



vi. Arida trita adfecto aceto æris rubri uase exci-  
pe, & ad solem exponere ac pistillo æneo sub canicu-  
lari æstu agita, donec resiccet. Deinde trita uase  
siccili reconde. Vfus autem tempore aqua in ore te-  
neri iube, & per arundinem naribus insuffla. Ad po-  
lypos & ozænas. Sinapi tritū aquæ misce, ac sub-  
igito, & collyria gladii forma formato. Deinde gra-  
dile linteolum sinapi obducito, quo ipsum extrahe-  
re possis ubi uoles, & naribus indito, principio lin-  
te foris relicto, & totam diem finito, & excidet po-  
lypus. Aliud ad polypos & ozænas ac superex-  
crecentē carnem. Aluminis scissi scrup. i. x. alumi-  
nis rotundi scrup. vi. atramenti sutorij scrup. vi. chal-  
cidis scrup. x. vii. myrrhæ scrup. x. viii. squamæ  
æris scrup. ix. thuris scrup. iiii. gallarū scrup. xii.  
confusa cribrata terito cū aceto uelut collyrium, &  
formato pastillos. Vfu uero postulat, quantum sa-  
tis est cū melle contere, & linamētum intinge, ac na-  
ribus inde, & ad diem unam sine. Altera uero ex-  
trahe, & sequetur polypus, quod plerūq; fieri solet.  
Aliud Oribasij. Squamæ æris drach. viii. sandara-  
chæ drach. iiii. gris drach. vi. ueratri nigri drach. ii.  
Siccum hoc insufflato, & uelut optimo uitior. Nā  
in diebus decem manifestam utilitatē declarat. Ne-  
chepios rex ad carnē in naribus enatam. Squamam  
æris, & squamā ferri, ac alumen scissum, æquis por-  
tionibus terito ac insufflato, aut per specillum adhi-  
beo, aut in linamento uitior. Asclepiadæ ad po-  
lypos. Atramētū sutorij drach. i. diphyrgis usti drac.  
ii. calcis uiuæ drach. ii. sandarachæ drach. ii. sicca  
adhibe. Aut linamētum intortū aqua madefactum  
ac pharmino imbutum inde. Aliud quo Antipater  
usus est. Atramētū sutorij, sandarachæ, æquales par-  
tes tritas insuffla, & per specillū admoue. Aliud.  
Atramētū sutorij usti drach. iiii. rubicæ sinopicæ  
drach. i. trita insuffla. Naturale Apollonij ad po-  
lypos. Nyctioracem iugulato, & calido ipsius san-  
guine polypum illinito: Reliquū uero in sole sicca-  
to ac reponito, & aridum tritū inspergit. Aliud  
etiusdē ad exulceratos polypos, & ad ozænas. Dra-  
cunculi radicem aridam tritam insperge, facit & suc-  
cus ipsius illitus. Aut cupressi folia, aut pilulæ ficus  
carne exceptæ. Facit & salua imposita. Et laser cum  
atramenti sutorij, aut ærginis pari portione. Ga-  
lenus autem ad polypos inquit & ozænas compe-  
ri egregiē facere subscripta. Primū quidem id quod  
ex malis puniis paratur. Sin autem æquali nu-  
mero ac magnitudine ex tribus generibus accepta,  
de austeris, de dulcibus, & de acidis. Oportet autem  
ipsa recentia matura contundere, ipsaq; tota confrin-  
gere exactē, quo succus ex ipsis exprimi possit. Quē  
modicē coctum reponimus in stanneo uase. Quod  
uero restat solidum & crassum, diligenter in mortario  
tundito, & ualde bene in pila terito, ac collyria  
formato, oblonga, & crassitudine & longitudine  
differentia. eaq; siccato. Et usus tempore congruū ex  
his collyrium in nasi meatum inde, in quo polypus  
existit. Nam cetera mordacitatem & consensum tol-  
lit polypum longiori tempore. Si uero humidior  
& mollior polypus ubi uidetur, amplius accipies  
de austeris puniis malis: Si uero durior, de acidis.  
Quandoquidem autem molestum est semper colly-  
rium ferre, cōuenit ab eius usu interquiescere, & in-  
terim dum collyriū non adhibetur, succo expresso

uti, & ex ipso internas oris partes illinere, hiantē æ-  
gro, eo maxime loco quo nasus ad palatū perfora-  
tus est, atq; hoc per pennam, aut lanā specillo obuol-  
utam. Cæteri ex siccis pharmacis noui aliquando di-  
phryge polypū consumptū. Cōuenit in ipsis quoq;  
prædictū collyriū ex malis puniis siccum, leuissi-  
mē tritū ac insufflatum. Aut per specilli nucleū na-  
ribus inditum. Omnia autē hæc asidue facere oportet,  
ut nunquam desit medicamentū loco affecto. Fa-  
cile enim ab influente humiditate eluitur. Philagrij.  
At in eunuchis & molle corpus habentibus, & pro-  
pterea nullam mordacitatē ferentibus, rosas siccas le-  
uissimē tritas adhibe, misce enim profunt molli-  
bus & humidis corporibus. Nā plerq; quæ effica-  
citer polypos eximunt, exacerbant quodam modo  
ubi scopum non contigerint. At uero in diuite quodam  
qui odoratum pharmacum expetebat ad ozæ-  
næ curationem, pastillo hedychroo usus sum, sub-  
egit ipsum cum uino ueteri odorato. Et mirum est  
quā breui affectio curata est. Relata est autem hu-  
ius preparatio in theriacis descriptione.

Ad ulcera in naribus.

Cap. xciiii.

Ulcera in meatibus nasi simpliciora semper curantur per  
pastillos Andronij, & Pasionis, & Polyidæ, & Mu-  
sæ, & Bithynum appellatum, aliquando uino dulci  
ipso exoliens, aliquando austero. Et quandoq; per  
acetū uinosum aut acre, ita ut ab affectionū sympto-  
matibus, pharmacorū uisum inueniamus. Archigenes  
autem pingulibus emplastris eiusmodi ad ipsa usus  
est. Plūbi cremētum tritum, cū uino ueteri ac myr-  
teo oleo, æquis partibus in siccili uase coquito ad  
prunas, semperq; agitato. Et ubi strigementoso fa-  
ctum fuerit pharmacum, ablātū in pyxide plumbea  
seruato. Oribasij ad nariū ulcera. Spumæ argenti  
drach. vi. cerusæ drach. vi. plumbi usti & loti drach.  
i. ii. myrrhæ, aloës, singulorum drach. ii. gallarum  
drach. i. uino & myrteo oleo diluere utere. Facit etiā  
ad sedis uisā. Aliud Oribasij. Atramētū sutorij  
drach. vii. aluminis scissi drach. vi. gallarum drach.  
iii. malicorij drach. i. Ex uino aut aceto terito. A-  
liud etiusdē, ad simpliciora in meatibus nasi ulcera.  
Spumæ argenti drach. vi. cerusæ drach. viii. malico-  
rij drach. i. aluminis scissi drach. iiii. terito cū ui-  
no & affuso oleo myrteo, in plumbeo uase seruato  
ac uitior. Optime faciunt ad eadem: Asteris colly-  
ria, & Libiana appellata, & præsertim Cleonis ac  
similia, cum uino & oleo myrteo diluta.

Ad sanguinis ē naribus eruptionem. Cap. xciiii.

Sanguinis ē naribus eruptionē sistit soliorū urticę succus  
per linamētū inditus. Et ipsa folia trita frōi imposi-  
ta. Itē chalcidis arida trita linamēto excepta ac indita.  
Oportet autē linamentū lucernarū frigida aqua  
tinctū in chalcitide obuoluere. Sistit & lysimachij  
herbæ succus, & anthyllidis. Et ferulæ pars lanugino-  
sa cū aceto indita. Thus cū polygono aut porri succo  
afinini stercoreis recētis succus, cū porri succo, & ace-  
to per linamentū inditus. Aut stercore idē uisū insus-  
fla. Aut spōgia noua pice liquida imbuta inde. Aut  
hippureos succū, aut ipsam herbā trita inde, & frōi  
imponere. Aut saluie folia trita adhibe. Aut ouorū  
testas urito ac terito, & de his duas partes sumito,  
& de galla omphactide partem unā, & linamēto a-  
qua aut aceto tincto excepta indito. Frōi uero bul-  
bis tritis cū porri succo aut aceto integito. Aut gya-  
pium

ipsum oui candido subactum fronti ac naribus im-  
ponito. Magis autem facit lapis specularis translu-  
cidus cum aceto. Aliud. Cochlearum carnes cum  
aceto tritas adhibere. Aut cochleas usas ac tritas,  
fronti ac naso cum aceto imposito. Apollonius au-  
tem inquit, cochlearum carnes cum thure tritas na-  
ribus indito, & sanguis sistetur. Iisdem etiam fron-  
tem intege. Aut siccum ex anemona pharmacū em-  
plastri forma fronti impone. Aut emplastrum ex sa-  
licibus. Optimum autem est hoc, ex cuius usu sape  
laudem assequutus sum. Lapidem molarem ferue-  
factum ac ignitum acerrimo aceto extingue, & ua-  
porem naribus admoue, ac sistetur. Commodū est  
& per spongias fronte frigidescere, & caput in subli-  
me leuare, & manuum iuncturas inguināq; ac ge-  
nua deligare. Apollonius porro ait, pedis ē directio  
naribus unde sanguis erumpit, magnum digitū ligato,  
& mulsum ac aegre sisti se sinentem sanguinis la-  
tionem sedabis. Commodum est etia cera aures ob-  
turare, & in ore aquam pluuiam frigidam conti-  
nere. Sed & cucurbitam occipiti affige cum scarifi-  
catione. Et circa uiscera magnam cucurbitam adhi-  
be, si dextra pars sanguine manarit ac hepar: si si-  
nistrā, ad splenem. Aliquando etiam uenam scire  
cogimur. Sūme uero facit hoc Rhodarij & ochræ  
æquales partes cum aceto in oppositum nari autem  
infilla. Nimirū si dexter nari meatus sanguinē fun-  
dit, in sinistrā autem: si sinister, in dextrā. Sed & quæ  
ad sanguinem spuentes deferibuntur potida præbe.

Quomodo sanguis ē naribus elicatur. Cap. xcv.  
Mentam tritam melle exceptam ad collyrij formam  
redige, ac naribus inde. Aut rubiæ radicem leuissi-  
mè tritā oleo subige, & naribus penitissimè illine.  
Aut graminis florē, aut summā eius apriorē partē  
naribus inde, & obtorque donec sanguis erumpat.

De narium obturatione, ex odoratus oblesione.  
Galen.

Oculis & linguae ac uniuerso corpori sensum ac motū  
suppeditat cerebrū per neruos. Verū odoratus sensus  
intra caluariā est in anterioribus cerebri uentri-  
culis uaporosum quandam spiritū habentibus. Cæ-  
terum necessarium est prius nosse quomodo nasus cō-  
structus est, & quæ corpora meatibus ipsis cohae-  
rent. Quū itaq; nasus habeat mediū interseptum, &  
duos memorabiles meatus, qui sanè apparent, unus  
in singulis naribus: nosse oportet supra nari partes  
urinq; ipsorū dextram ac sinistrā bisariam findi.  
Et altera quidem pars ad internā oris partem circa  
palatum uergit. Altera uero reuera uelut in intro fe-  
rebat, ad ipsum cerebrū ascendit. Sunt autem in ce-  
rebro duæ propagines oblongæ ac rariæ, principiū  
quidē ex anterioribus uentriculis habentes, progre-  
dientes autem ad illā caluariæ partē, unde nasus in-  
itum habet, iuxta hanc uero partem etia ossa colifor-  
mia sita sunt, per quæ inspiratio & expiratio iuxta  
cerebrū cōtingit, & superficialitatis in ipso expurgan-  
tur. Sed & crassa cerebri membrana, qua parte colifor-  
mia ossa cōtingit, tenuibus uernis perforata est. Et  
per hanc primum excolatur crassiores cerebri  
perforitates, quas mucū appellamus. Et hæc deferun-  
tur, primū quidem ipsam membranam penetrant,  
postea uero per coliformia ossa excolatur, atq; sic in  
nari meatus incidit. At in transgressu per hos mea-  
tus, aliquando pars aliqua ex his quæ deferuntur,

præterfluit in os, per prædicta foramina ex naso in  
palatum, & præsertim ubi fuerit mucus ille visco-  
sus ac crassus. Reliquū autem quod excretiones per os  
ex palato, per creatum. Excretionem autē ex naso,  
per uiolēdoris efflacionis ac sternutatoriorū usum.  
Respirationis equidem ac olfactus gratia facta sunt  
foramina cerebri in nares. Vitur autē ipsis natura  
ad retrimentoꝝ cerebri purgationem. Proinde o-  
doratus latio nō in meatibus nari est. Sed aut ante-  
rioribus cerebri uentriculis ad intemperiem perdu-  
ctis, aut meatibus in ossibus colatorij obturatis,  
mucosae destillatione ut plurimū prægressis, aut his  
partibus perfrigeratis uel humectatis. Nam & aer  
qui palam per inspirationes attrahitur, tū nares ali-  
quando perfrigerat, tum uicinas ac cōtiguas partes,  
& hoc maxime ubi ambiēs nos aer frigidus factus  
est. Archigenis. Primum igitur cōuenit eos qui olē  
facienti facultatē lesam habent, aut colatorios mea-  
tus obturatos, in siccoribus locis diuersari, quales  
maximè sunt maritimi, & gymnasijs pro uiribus  
uti, itēque unctiōibus singulis diebus, ita ut crea-  
tum habeant collum, & per alios conficerent. Ca-  
put quoq; pectine perfricare oportet, & nitro deter-  
gere in balneo, & aqua marina adhibere, ac ca-  
put perfundere, marina calida affusa. Deinde etiam  
aquæ frigidaē modicè immergere in egressu. Opti-  
mum est & in marina aqua assidue natare. Utendū  
est & medicamentis quæ naribus indita caput pur-  
gant. Cæterum tota uictus ratio attenuatoriæ sit fa-  
scularis. Quare etiam acritū rerum elus ex interuallis  
adhibeat. Domus in qua degunt, moderate calida  
sit, pro temporis anni ratione. Somnus diuturnus  
incommodus est ipsis. Dum autem dormiūt, ceruicæ  
illa sublimia habeant, & in latum reclinantur, & non fe-  
cundū affectum partem, uelut si contingat unum ex  
colatorij meatibus esse obturatū. Quotidiana itaq;  
uictus ratio talis sit. Claro autem instante aere, pri-  
mum uentrē expurgare tenta, per Archigenis ex co-  
locynthide hieram. Deinde hirudines sublimiori na-  
si parti adhibe, & multū sanguinē trahere sine. Post  
tertium autē diem, splenio ab intermedio supercilio-  
rum usq; ad malam obturatā nari partem intege, sit  
autem factū ex emplastris discussoriā uim habent-  
ibus. Quale est melinū Serapionis, & emplastrum  
Icelij, & nigrum Archigenis, & quod ex tithymalli  
succo paratur, & quod ex scilla, ac consimilia. Horū  
autem usus nō fiat infra quindecim dies. Post hec p-  
tra ex aloë assidue uenter subducatur. Cōmodus est  
enim frequenter ipsis usus. Postea pinū per os du-  
cēbus utendū est, ex staphide syluestri ac mastiche.  
Postquam autē sufficiens euacuatio per os facta est,  
emplastro ex agarico, aut ex cāchry, aut malagma-  
te ex bacis lauri, aut aliquo consimili nasus integra-  
tur, & frōs usq; cūis rubificatione. Solē enim ita  
mucosam humiditatem per curē attrahere. Postea ue-  
ro sternutatorio utendū est, primū simpliciore, deinde  
de efflaciore, quale est ueratrū albū leuissimè tritū.  
Tertia deinde, aut quarta die ad sternutatorij usum  
dedū est caput, & sinapis? adhibēdus usq; ad frō-  
rē. Deinde lauētur. Et post multos rursus dies si o-  
pus fuerit, rursus caput per narisforū instrumentū  
purgetur. Sic autē efflax medicamentū quod adhibe-  
tur. Quale est clateriū cū lacte, aut cyclamini succus;

Aut ipsam cydaminum siccam tritam insuffla. Aut cucumeris syluestris radicem. Aut nigellā tulsam ac cribratā, & oleo uetustissimo addito probe tritam, per nares infunde, & pharmacū per respirationem uehementius attrahere iube. Aquam autem ægro in ore tenendam exhibe. Hæc ego usus sum in quodam adolescente, qui ex mucosae distillatione diuturna olfactus sensum læsum habuit, & ubi consequenter per tridui hoc auxilium usus esset, magnopere auxiliū perdiscebat. Quarta uero die atra & uehementius per inspirationē pharmaco, fortē mordacitatem in profundo capitis sentiebat, & quā hæc paulatim immīneretur, postera die penitus conuuluit. Vtiliter etiā nigella assumitur cum aceto. Cōuenit autem post horum usum, post tridui uidelicet, sinapismū frōti adhibere, facieiq; ac naso, & postea lauare. Sed & odoramenta assidue adhibeantur odorata hæc, Nardissus, sisymbrium, serpillum, lilij folia, uiolæ, menta, politū, ruta syluestris, & thymbra. Omnium uero utilissimū est castoriū aceto dilutum. Quin & potum castoriū tritum cum aquæ mulsæ cyathis tribus, præ multis auxilijs proderit. Efficacius autē red datur, aceti scilicet cyatho dimidio addito. Aut uero acetum scilicet quotidie à ieiunis trium cochleariorum mensura acceptum, utilissimū ipsi existit. Cæterum post hæc omnes laniationes, si adhuc affectū aliquo auxilio opus habet, adhibendum est etiā a raphanis uomitus, ita ut ipsi concisi aceto mulso aut garo madescant. Sequenti uero à uomitus die, æger absinthij decoctū bibat, aut pulegiū. Et post hoc imponendum est naso emplastrū ex scilla, cuius experientiam feci, relinquendumq; aliquo tempore ut uaros in loco excidet, & strigmentosam humiditatem extrahat. Habetur autem hoc emplastrū in Sermonis de emplastris tractatu. Atq; hæc omnia etiā bis ac ter & sæpius adhibenda sunt, ad pertinaciores affectiones.

De sternutatorijs, Hippocratis. Cap. xcvii. Sternutatio fit calefacto cerebro, aut humectato eo quod in capite uacuum est. Aer itaq; intus existens erumpit, sonitus autem fit, quoniam per uacuum & angustum spiritus transit. Consideremus autē quomodo sternutationes capitis grauitatem sanāt. Fīūt equidem sternutationes, maximis inspirationibus prægressis, & efflatione celerimē sequente. Appello autem efflationem, acuatam expirationem. Habet enim cerebrum duas hæc facultates, per quarum alteram superfluitates in anterioribus uentriculis excernit ad seipsum contractas: per alteram uero alas nati expandit, & spiritū attrahit. Quum itaq; à spiritū grauatur, tunc ipsum excernit per contractionē sui. Si uero obturatis in naribus uis, impeditur ex-

cernere grauante spiritum, aut mucum: tunc uiolēto motu ad sternutationē procedit, depellere conans ea quæ meatus obturat. Vnde sternutationes capitis grauitatem, uel ut dictum est sanant. Imò etiam affectiones quasdam circa cerebrum consistentes. Quales maximē sunt, lethargus, & profundī sopores, ac cōsimiles. Tales enim per sternutatoria maximē curantur. Sed & ad solem respicientes ad sternutationē iritantur, diffusi uelut arbitror à caliditate crassī cerebri spiritibus. Extrudunt autem sternutationes etiā mucus ex cerebro crassos ac uiscosos, per uehementem spiritus impetum, etiam hos foras cōiijciētes. Porro sternutationem mouet, ueratrum albaum, herba lanaria, piper, castorium, cydaminum, euphorbium, nitrum, herba ptarmica, hoc est, sternutatoria appellata, cumini, singula seorsim ac simul leuissimē trita & admoda. Non autē hæc insufflari oportet, sed motū pyxidem naribus admouere, aut per specillū nucleum naribus penitissimē indere. Et simplicia quidem sunt hæc: Sunt & composita ex ipsis adeo conflata, quale est hoc. Sternutatoriū Heraclidæ Tarentini. Cumini Aethiopici, piperis, herba lanariæ, castorij, singulorum æquas portiones, contusas ac cribratas in græa pyxidem reponere. Vfus autem tempore agitata pyxidem aperi, & naribus adhibe. Aut per specillū penitissimē inde. Aliud. Piperis, ueratri albi, herba lanariæ, euphorbij, castorij, succi cydamini sicci, æquis partibus utere uelut dictum est. Aliud ad diuturnos capitis dolores, ueriginē, capitis grauitatem, & comitālē. Veratri albi drach. iiii. nitri rubri, herba lanariæ, castorij, piperis, singulorum drachmam unam, utere uelut dictum est.

Ad sedandas redūdantes sternutationes. Cap. xcviij. Redundantes sternutationes sedant ea quæ etiam grauedinem sanant, oleū rosaceum naribus infusum, & oleum dulce, & ungentum nardinum. Olfactu uero sedant sternutationē, anisum, ocymī festucae sicca tula, nigella sicca trita. Aut thymum fermento oblitum, & cinere obrutum, & ubi tostus est, tritū adhibe. Singula uero hæc raro linteolo illigata olfacienda dato. Sedat sternutationes & grauedinem, etiam myrrha per se, uel cum thure & uino odorato trita, illitis hinc naribus. Facti & menta, & he dychroon, & cyphi. Sed & aqua tepida fronti aspersa sternutationes sedat. Quin & si ab utraque nasi parte, iuxta magnos oculorum angulos uenas sitas digitis compresseris, sternutationem sedabis. At uero Apollonius naturale auxilium prodit ad hoc, ut pueri non sternutent. Ciconiæ, inquit, pennæ in domo habeantur, & impossibile est ut sternutent.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

### SEPTIMO SERMONE AETII

HABENTUR.

- D**e natura oculorum. cap. i. De inflammatione ob plenitudinem, & De frigida oculorū interperie. ca. xi.  
 Quot & quæ affectiones circa sinum & chemosi oculorum. cap. v.  
 Gulas oculi partes sunt. cap. ii. De balneis. cap. vi.  
 Perturbationis oculorum curatio. De uini potu. cap. vii.  
 cap. viii. De ueni sectione. cap. viii.  
 Inflammationis oculorum superficialis De purgatione. cap. ix.  
 curatio. cap. x. De fomento. cap. x.  
 De illabētibz in oculum animalculis.

- De illabentibus in oculum animalculis  
aut paleis, aut arena. cap. xvi.  
De calce uina in oculū illapsa. c. xvii.  
De ulcerationibus ab igne. cap. xviii.  
De his quæ oculo infiguntur. cap. xix.  
De fūgillatione. cap. xx.  
De puncturis oculorum. cap. xxi.  
De uulneribus profundiorib. ca. xxi.  
De ouiformis humoris excretionē. ca=  
put xxi.  
De oculi prolapsu. cap. xxiii.  
De ulcerationibus superficialib. ex hu=  
morum influxu obortis, nubecula, ca=  
ligine, epicaumate, encaumate, ca=  
put xxv.  
De argemo. cap. xxvi.  
De fosulis, & concauis ulcerum gene=  
ribus. cap. xxvii.  
De suppuratione aut ungue. caput  
xxviii.  
De pusulis. cap. xxix.  
De carbūculis in palpebris. cap. xxx.  
De canceratis oculorum ulceribus. ca=  
put xxxi.  
De malignis oculorū ulceri. c. xxxii.  
De myocephalis. cap. xxxiii.  
De staphylomat. cap. xxxiiii.  
Staphylomatū chirurgia. cap. xxxv.  
De ulceribus cicatrice indigentibus. ca=  
put xxxvi.  
De cicatricibus & albuginibus. caput  
xxxvii.  
Materia attenuans cicatrices & albu=  
gines. cap. xxxviii.  
Auxilia ad cicatrices & albugines. ca=  
put xxxix.  
Albuginum tinctura. cap. xl.  
Ad glaucos oculos ut nigras habeāt pu=  
pillas. cap. xli.  
De perurorum curatione. cap. xlii.  
De aspretudinibus, ac densitatibus, sy=  
cosiq; ac callis cap. xliii.  
De oculorum debilitate. cap. xliiii.  
De myopia. cap. xlv.  
De nyctalope. cap. xlvi.  
De hebetudine oculorum. cap. xlvii.  
De obscuritate oculorū. cap. xlviii.  
De resolutione oculorum. cap. xlix.  
De glaucedine. cap. l.
- De suffusione. cap. li.  
De mydriasi, hoc est, pupille dilatatio=  
ne. cap. lii.  
De tabe pupillæ. cap. liiii.  
De macie oculi. cap. lvi.  
De expressione oculorum. cap. lv.  
De confusione. cap. lvi.  
De his quæ in albo oculi nascuntur. ca=  
put lvii.  
De pterygijs. cap. lviii.  
Pharmaca ad pterygia. cap. lvix.  
Chirurgia pterygiorum. cap. lx.  
De carnis in angulo magno increment=  
to. cap. lxi.  
Chirurgia incrementi carnis in angu=  
lo. cap. lxii.  
De sanguinis ex angulis eruptione. ca=  
put lxiii.  
De concretionē palpebrarum ac con=  
tractione. cap. lxiiii.  
De pediculis palpebrarum. cap. lxv.  
De pilis pungentibus palpebrarum, &  
de duplici pilorū ordine, itemq; mul=  
tiplici quam phalangosam uocant.  
caput lxvi.  
Pharmaca ut enulsi pili non renascan=  
tur. cap. lxvii.  
Agglutinatoria pilorum. cap. lxviii.  
De sutura palpebrarum sursum uersus.  
caput lxix.  
De sutura palpebrarum deorsum uer=  
sus. cap. lxx.  
De euerfione palpebræ. cap. lxxi.  
Chirurgia euerfionis palpebrarum. ca=  
put lxxii.  
De lagophthalmis. cap. lxxiii.  
De lippitudine dura. cap. lxxiiii.  
De lippitudine sicca. cap. lxxv.  
De lippitudine scabra. cap. lxxvi.  
Curatio lippitudinis duræ, siccæ, sca=  
bræ. cap. lxxvii.  
De defluuio pilorum palpebrarū, quod  
uitium & madarosis, & pilosis, &  
milphosis à Græcis appellatur. ca=  
put lxxviii.  
De abscessu in palpebris. cap. lxxix.  
De calculo palpebrarum. cap. lxxx.  
De grandine oculi. cap. lxxxi.  
De ordeolo siue præputiola. caput  
cxl.
- De ganglijs, atheromat. sciatomat. &  
meliceridibus palpebrarū. caput  
lxxxii.  
De uarietibus palpebrarum & malignis  
agnatis eminentijs. cap. lxxxiii.  
De agilope. cap. lxxxv.  
De uestione agilopis. cap. lxxxvi.  
De anchilope. cap. lxxxvii.  
De carnis in angulo magno decremen=  
to. cap. lxxxviii.  
De his qui tempora incurrunt. caput  
lxxxix.  
De arteriarum sectione. cap. xc.  
De caluarie circuncisione. cap. xci.  
De frontis per submissum scalpellum  
excoriatione. cap. xcii.  
De uasorum sectione. cap. xciii.  
De musculorum temporum cataplasma=  
tis, agglutinatorijs, ac illitionibus.  
caput xciiii.  
Totius capitis illitiones. cap. xc.  
Cataplasma oculorum lippitiū. ca=  
put xcvi.  
Illitiones oculorum. cap. xcvi.  
De aridis collyrijs. cap. xcvi.  
De liquidis collyrijs. cap. xcix.  
Collyria ex croco, & ex succis diuersa  
sa. cap. c.  
Collyria unius diei, monohemera ap=  
pellata. cap. ci.  
De collyrijs sistentibus. cap. cii.  
De lenibus collyrijs. cap. ciii.  
De lenibus & albis collyrijs. ca. ciii.  
Collyria libyana, & tephra ac spodia.  
caput cv.  
Collyria ex thure. cap. cvi.  
Collyrium Cleonis. cap. cvii.  
Collyria ex rosis uiridia ac alba, ca=  
put cviii.  
Collyria diasmyrna, & chiacia appella=  
ta ex uino. caput cix.  
Collyria ad aspretudines, & exterso=  
ria. cap. cx.  
Collyria enstacta, hoc est, instillatitia  
appellata. cap. cx.  
Collyria ex cornu ceruino. cap. cxii.  
Collyria Nardina & Theodotia. caput  
cxiii.

# AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABIBLI SECVNDAE

SERMO TERTIVS, ET EX  
ORDINE SEPTIMVS.

\*

*De morbis oculorum.*

DE NATVRA OCVLORVM. Cap. I.



VRATIO circa oculos varia est & diuersa. Nā & ipsa particula, oculus inquam, non simplex est, sed compositione sortitus est ad suam essentiam cōstituendam, tunicis nimirum & humoribus, insuperque palpebris ornatus. Natura enim neruos à cerebro ad oculorum regiones descendentes, uisuos uidelicet, & partē duarū membrarū cerebrum complectētum, quā cū ipsis neruis excurrit, augēs & uelut dilatas, tunicis oculorū originē essentiae largita est, ut quae omnīū intīmam tunicā reiformē appellatā, ex neruo uisuo cōstruatur. Acnoformem uero tunicam huic praeposita, ex tenui membrana produxit. Similis est enim acino uuae, & figura, & colore, & rotundiore foramine perforata est iuxta pupillā. At uero tunica quae ambabus his forinsecus praetenditur corniformis uocata, ex crassa membrana originem habet. Quae uero his omnibus foris obducta est, alba illa quam agnatam appellamus, ex pellicula forinsecus osli capitis circumfusa, quae circūossalis & circūcalualis appellatur, generationē habet ex propaginibus corporum oculo circumdatorū. Ceterū humores in oculo tres sunt: Intimus omnīū est qui in cauitate reiformis tunicē cōtinetur, uitriformis dictus: similis est enim & colore, & substantia uitro fuso. Exterius autem ab hoc situs est ad finē reiformis tunicae, humor glacialis siue crystallinus, qui etiā discoformis & lensiformis appellatur: similis est enim colore quidē glacie, figura uero lentis, aut disco. Forinsecus autē circūfusus est, ouatus siue ouiformis humor: similis est enim colore & substantia, humorī albo ac tenui in ouis. Omnīū igitur intimus humor uitriformis, ad hoc ut glaciale alat constructus est, qui uero forinsecus ipsi circūfusus est ouiformis, ad hoc ut hunc humectet factus est, & ad hoc ut ipsum à solis splendore iniuria affici nō permittat. Palpebras porro cōstituit tunica agnata: ex his autem singula ē naturali statu emota, oculum aegrotare faciunt.

Quot & quae affectiones circa singulas oculi partes sunt.

Cap. II

Quae proprie dicuntur lippitudines, & chemoses, & perturbationes, & tumores, & suffusiones ex plaga, & pterygia, affectiones sunt tunicae agnatae. Eadem etiā ulceratur, & carbunculo infestatur, & cancerosam affectionē habet. At lippitudo dura & lippitudo sicca, cōmunes affectiones sunt palpebrarū, & ipsius oculi. Ceterū circa externā palpebrarū superficiē, pustulae aquosae, melicerides & steatomata. Verū ex his quae circa internā palpebrarū cōsistunt, est densitas, alpretudines, sycofes, grandines, calculi, cōcretio, cōdusio. Et lagophthalmi appellatur, qui-

bus superna palpebra reuulsa est, ut oculū cōtegere nō possit. Ectropij uero quibus inferna palpebra euerfa est. Sed & mutilationes & corrosiones, & ulcerationes in palpebris cōsistunt. Circa palpebrę uero extremitatē fit trichiasis, hoc est pilī pūgentes, & destituti pilorū, quod madarosis & pilosis dicitur. Fit & morbus pedicularis, ac porrigo, & paruus instar ordet abscessus. Sed & Milphosis, id est, pilorū nuditas, affectio est extremitatis palpebrae. Rubicunda enim his est palpebrae ala, colore militū, hoc est, minū referens, unde etiā Miltoxis uitiū appellatur. At uero anguli afficiuntur quidē etiā in Aegilopis, sed nō soli. Carunculae autē naturalis supra iustū modum incrementū, & eiusdem decrementū, solorū angulorū affectiones sunt. Porro, circa tunicā corniformē, consistit caligo, nubecula, argemon, epicauma, coeloma, bothriū, ruptio, prolapsio, unguis, pus, pustula, carbiculi, cāceratae affectiones. At circa acinoformē tunicae sunt, prolapsio, myocephala, staphylomata, pupillae dilatio, quae mydriasis & platycoria appellatur, tabes, cōfusio, pupillae distractiones. Suffusio uero circa ipsum foramē acinoformis siue uniformis tunicae cōsistit, hoc est, iuxta pupillā. Sed & ouiformis humor amplior seipso factus, aut crassior, exactū uisum impedit. Quin & imminutus idē humorē crystallinū reficet. Quae uero glaucoedō appellatur, siccitas est uehemens humoris crystallini. Obscuratio autē obturatio est nerui uisui, ut omnino non uideat, qui sic affectus est, pura tamen apparente pupilla. Laesos etiam oculos habet, circa hoc ut aliquid mali appareat circa oculos qui nyctiploes appellantur. Tororum uero oculorum manifesta laesio est, quae expressio uocatur. Est autem prominentia oculi uelut extra positi. Ceterum curationis tractationē à simplicioribus & superficialibus morbis in oculis incipiendam putamus.

*Perturbationis oculorum curatio.*

Cap. III.

Perturbationes oculorū à fumo factas, & ardore, aut puluere, aut alio cōsimili, facili curabis, si iusseris aegri à laedente causa discedere, uelut sole aut fumo, aut alio simili. Deinde oculos lauare, primum aqua tepida dulci, postea etiā frigida. Iubendus est etiam splendorē auersari, & oculos claudere. Ex his enim sedatur malū, nulla alia re adhibita, sed solū indigentiorē uisū. Si uero ex ardore oborta sunt perturbationes, ampliore potu utendum est. Si enim somnus successerit profundior, etiā lippitudo formidata cōcoquetur, quare neq; à balneis abstinendū est. Verū dicta exquiritore utendum. Perseuerate uero affectione quiescere oportet, & palpebras illinere collyrjjs ex croco, aut rosis, & maxime collyrjo Nili ex rosis. Granas autē, & glutinationes noctu circa oculos sistentes, expurgat, & probē suauit pota aquosissima, & ipsa aqua per se frigida affusa. Et aliquod ex

siccis

sicis delacrymatiis appellatis, præsertim quod croceum procatlepticum, hoc est, præoccupatiuum, siue perseueratiuum, appellatur.

*Inflammationis oculorū superficialis curatio. Cap. IIII.*  
Quod si inflammatio superficialis fiat in tunica agnata, & dolor uehementis non adsit, repulsoria in ipsis adhibenda sunt colliria, ita ut uehementia mordacitatis ipsorū, per oui ammixturenem mitigemur. Plurimū enim tenuis oui liquor cū collirijs Monohemeris, hoc est, diarijs appellatis, sufficit ad curandas superficiales & incipientes lippitudines, citra magnā inflammationē, & uehementem dolorem. Sæpe enim ita inflammationes mitigauit, ut homo ad uesperam balneo usus sit, & postriede collirio nardino ad restitutionē in integrū, & corroboratōne se illeuerit. Ammisceatur autē ad colliriū nardinū circa primā illititionem, minimū quiddam ex repulsorijs, circa secundā adhuc minus. In quibus igitur collirijs dominantur adstringētia, plurimū liquorē oui esse oportet, modicū uero collirij. In quibus autē præuaalent concoctoria, uelut est nardinū, ea crassius adhibenda sunt. Fomentū adhibendū est his per spongiā, si moderatus est dolor, semel aut bis: Si uehementior, melius est uel quinq; uicibus uoti animaduersione tamen habita ad oculi qui curatur sensus subtilitatē aut hebetudinē: Quicūq; enim oculi secundū naturā uenas amplas habet, & sanguine plenas, itēq; qui glauci sūt, omnino nō ferūt colliriorū adstrictiōne. Quare aquosiora in his colliria adhibere oportet.

*De inflammatione ob plenitudinem, & chemosis oculorum. Cap. v.*

Si plenitudo in toto corpore subiecta est, & inflammatio in oculis magna sit, & dolor uehementis adest, non amplius sufficit colliriorū usus ad talē affectiōne. Vario itaq; opus habemus in his medicatiōnis diuersū. Et oportet prima ac maxima auxilia adhibere. Quorū etiam Hippocrates in aphorismis meminit, ubi ait: Dolores oculorū soluit meri potus, aut balneum, aut fomentū, aut medicamentū purgatoriū, aut uenæ sectio. At non eidē homini omnia auxilia hæc adhiberi iubet. Sed alij uenæ sectiōne, alij purgatoriū pharmacū, alij fomentum, alij balneum, alij uini potum. Itaque a balneo incipimus.

*De balneo. Cap. vi.*

Balneum cōuenit his quibus inflammatio tumida in oculis est. Est autē tumor mole quidē laxus, sed ad tactū frigidior, & colore albus, & qui influit fluxus, minus mordax est, & minus calidus. Non neq; chemosis in ipso oculo subrubra est, neq; diffentia. Hæc autē affectio magis in senili ætate contingit, & pleniorū hyemis tempore, & magis feminis pinguis. Et ut cōpendio dicā, omnibus frigidū ac pituitosum cerebrū habentibus, inflammatio tumida contingit. Quum itaq; omnia relata signa uideris, confiderenter balneū assumito: adeo enim ægrum leuatur alio auxilio nō habet opus. Oportet autē magis in ære morā trahere, & oculos plurimū fouere sicciore fomento per spōgias multū expressas. Quod ubi feceris, palam percipies tumorē in calido ære disparuisse, & interim ægros penitus ab affectiōne liberatos. Si uero quid ad perfectā curatiōne defuerit, nardini colliriū in balnei turo infillatū. At si moderatus apparuerit dolor, etiā crassius colliriū adhibe bis, præcalescat uidelicet in corē, ita ut loto, uelut dictū est, & a balneo egresso, humiditatē diligenter

per spongiā detergeas, & sic idē colliriū illinas, obseruas ne quid ex ipso in oculū præterlabatur. Solent enim magnū damnum excidare. Quare neq; sudatibus illinēdū est. Fit enim in balneo humorū diffusio, & præterlappum colliriū mordacitate quadā inducta, materias faciliē ad oculū trahit, & duplicat inflammationes. Si uero relata affectio durabilior fiat, & fluxionis essentia, ad frigiditatem magis ducatur, tum sinigmata capitis in balneo adhibenda sunt, & pulueres inspersiles post balneum. Et primū quidē simplicibus uti oportebit. Si uero causa perseuerarit, etiā ad cōposita transeundū est, quorū sylua talis est. Baccæ lauri, nitrū tostū uino extrinētū, sampsuchus, sex uini lauri, & similia. Puluisculi uero mulieribus præsertim cōsueti adhibēdi sunt, qualis sunt ex iride, & apij femine, & cypressi pilulis, & ugentis siccis appellatis. Oportet autem nō immoedice calida esse, neq; acra quæ adhibētur, sed leniter calida, & habere adstrictiōnem ammixtā. Horū uero cōpositiones iā relatae sunt in præcedit sermone. Smegmata igitur in balneo iniicere oportet scilicet, pilis prius inter se disparatis, quo auxilium corpus contingat, precipiendūq; ut in balneo os claudat, quo calido ære uehementē per nares attracto, subiectā materiā citius trāsmutent. Post balnei autē detersis capillis, puluisculi inspergātur, uelut dictū est. Et de balneo quidem hæc tenus. Consequēter etiam de uini potu.

*De uini potu. Cap. vii.*

Vinum attenuat, & incrassatos humores trāsmutat. Et sepe per accides aliquid horū euacuationē facit. Cōuenit autē esse uinū colore fuluū, & substantia tenue, & nō uetus, neq; uehementē adstringens. Dandū est autem uinū his maximē qui ipsi aduerti sunt, & qui sicci ac frigidi intemperiem magis prædominantem habet. Videtur enim societate quandā ad balneū habere uinū ipsum. Quū igitur euacuatione ac trāsmutatione humorū opus fuerit, balneū assumendū est. Quū autē trāsmutatione, & renutritiōne, ac humectatione & calefactione, moderatāq; euacuatione, uino opus habemus: miscere igitur uinū oportet aqua calida nō multa. Sic etiā meracius quā pro cōsuetā tēperatura. Sit & aqua quæ adstrictiōnis purissimā, & sumi ac odoris exors, & ualde feruida, quo etiā seipsa tenuior euadat, & sufficiat ad amplioris uini tēperaturā. Sit & poculū in quo exhibetur amplius, & conetur eger oculos inter potandū aperire. Sic enim exoluta obstructiōne, & multa naturali ac saluberrima lacryma influēt, a dolore liberabitur. Statim enim laxantur palpebræ, & seipsas magis mobiles fiūt, ac leuiores. Illud uero considerare oportet, anne caput hominis facile lædatur, italem enim caput faciliē lēditur ex uini potu. Cæterū ad reliquas affectiōnis oculi, collirio uti oportet, primū leni ac dulci infillatū, ad accessoriā perturbationem curandā. Et ubi oculi in quieto statu fuerint, & a feruore inflammationis liberati, tunc repulsoriū colliriū adhibeat: quale est quod Hermolaus appellatur, & cōsimilia sistentia appellata. Dū enim rubor adest, & inflammatio, adstringentibus collirijs uti non oportet. Concludis enim per adstrictiōnem materiam reliquā, dolorem maiorem faciunt. Et de uini potu hæc tenus. Dicendum & de uenæ sectione.

*De uenæ sectione. Cap. viii.*

Adhibenda est uenæ sectio, si nihil ex sæpe relatis impedierit, in dolore oculorū, in his quibus multa ocu-



lorum diffusio est, & multus rubor, & ad contactū refusus, & ardor, & lacryma multa ac calida, & chemosis iuxta corniformē & agnatā tunicā, ut à uehemēti inflāmatōne palpebræ euerteretur, ut uix oculi uis operiant, & subrubra appareat tunica agnata, & maiori tumore prædita est, & totū corpus sanguine repletum. Secūda est autem potius superna in cubito uena, humeralis appellata, faciendāq; est maior festio, ad hoc ut crassior sanguis euacuetur, ueloxq; animi deliquiū succedat, quo dolor eximatur, & inflāmatōnis feruor extinguat. Euacuato autē toto corpore, collyrijs & reliqua curatione, reliquæ affectionis percurrentur. Utendū est autem collyrijs, qualia sunt cygnaria, & Libiana, ita ut aquoſiora calida sintilemus. Fomenta in his nō ualde adhibenda sunt, sed per spongiā ex aqua tepida leniter deterſio fiat. Alimēta danda sunt lenia, facilia, cōcoctu & ad digerendū ueniri cōmoda, urina cēta, nihil acré & salum habētia aut crasi humoris aut ægrē cōcoctile. Post inflāmatōnis depulsiōnē, nardīnū aquosius instillandum est usq; ad perfectam sanitatem. Et uenæ quidē sectionis hætenus mentio facta sit. Transiendū est hinc ad purgationem.

## De purgatione.

Cap. ix.

Si neq; ætas, neq; anni tēpus, neq; stomachi in primis debilitas, aut alterius cuiusdam uisceris, neq; aliud quoddā maximum impedimentū fuerit, purgatio assumenda est, in his quibus tenuis & multa lacryma defertur, aut falsa, aut acris, aut frigida. Et uniuersum corpus uisitatū humoribus referūt, & caput superfluitatibus redundās, & aluus asidūc suppressa. & copiā ex hoc malarū superfluitatū congregās. Et ad hæc uehemens doloris uexatio adest. Nam in uenæ sectione plenitudinē totius corporis suspectā habemus. In purgatione uero uisitosos humores auersamur. Purgatoriorū autē natura nō una est, sed plures. Luxta redundantē enim & affligentem humorē, pharmacorū materia euariat. Si quidē igitur aluus asidūc fuerit suppressa, aloē ipsi exhibenda est, cū brasice succo trita, & in catapotia redacta. Si uero pituita magis redundarit aquosa, exhibe pharmacū ex euphorbio, pipere, & sale ammoniac præparatum. Si uero bilis abundarit, picrā ex aloē dato, scammonia leuissimē utriusq; duobus scrupulis, aut minus additis, pro uiriū ratione. Si autē atrā bilis humor dominatur, addatur ad picrā dosim, epithymi scrup. vi, & scammonia obol. iiii. Cæterū post sufficientē per purgatoriū euacuationem, si quidē simplex & sine uulnere fuerit affectio, adstringētibus collyrijs utendū est: quale est Hermolaus, & similia. Et hæc per instillationē adhibenda sunt. Si uero uulneratus fuerit oculus, teneris utendū est. Qualia sunt cygnaria, & Libiana. Iam igitur Aphorismi Hippocratis scopus, quantum in præsens opus est, relatus est, hoc est, quomodo ad maximos dolores ac inflāmatōnes diō instare ac reniti oportet. Quando quidē uero in multis maxima auxilia relinquuntur, uenæ sectio maximē & purgatio, considerandum sanē est quomodo tales tractare oportet. Proinde cū uniuersalibus iam relatis signis, etiā peculiaria quadam circa oculū signa uidere est, totū morbi redarguentia ac indicantia. Gramæ itaq; & lacrymæ apparēt, aliquādo glutinosæ ac crassæ, aliquādo tenues & ciliō desiliantes. Et aliās falsæ, aliās acres, aliās mordā-

ces. Et quādoq; calidæ, quādoq; frigidæ. Grama itaq; statim in principio lippitudinis apparēt, magis cruditatis signū est, & diuturnā lippitudinē fore significat. Oportet itaq; in talibus leniter curationē facere per dulcia collyria instillata, & reliquū consimilem ductū, quo temporis progressū concoctio uere fiat. Nā repulſoria collyria, quā sint ferē uiribus frigidiora, obſtructionē & corporū codensationem faciunt, & dū humorū materias concludūt, maximas inflāmatōnes ac graues dolores inducūt. Aliquādo etiā ruptōnē tunicæ corniformis faciūt, propter humorū diffusiōnē, & maximē ubi rubor adest, & inflāmatio, & materiæ multitudo in oculis subiecta est. italia uero collyria sunt quæ ex uberiore opio & acacia præparantur. Quale est quod Antoninus, & quod Hermolaus appellatur, & quæ Pelaria appellantur, & his similia. Quidā enim collyrio Antonino amplius usq; unā cū dolorū augmētō, etiā uim uisui in iuriā affecerūt. Nā per immodicā perfrigerationē, portulicæ mortificationē magis induxerunt.

## De fomento.

Cap. x.

Fomento utendum est multo, maximē si in principio crassissimæ gramæ apparuerint, quo ipsæ extenuentur. A balneis autem penitus abstinendum est. Aliquando etiā à uino. Cibi exhibendi sunt modici, ueniri cōmodi, ac attenuantes. Quod si duriorē aluum habuerint, per betarū ac surſurū decoctū eluant, cū melle ac sale. Os autē per pharmacum ex moris illinatur, ad materiæ euacuationē. Aut per collutionem aliquam pituita per os derahatur: pleriq; enim maxillares musculos læsioni obnoxios habentes, manducationem ægrē ferūt. Postea uero, uelut dictū est, simplicia collyria infundantur. Et si quidem calida fuerit affectio, Libianis collyrijs utendum est. Quale est quod à nobis ad huiusmodi affectiones experientia cognitū est, & in Hergetomis reperit, & ab ipso Tephro appellatū est, pompholygemq; nō habet. Vnde etiā nos descriptionē ipsius delegimus. Nā pōpholyx rara inuenitur, & faciliē adulteratur. Optima est quod est pompholyx colore non alba, sed magis ad liuedinē uergens. Signum optimæ est, si in prunas inſperſa, auricolorem ignis speciem efficit. Utendum est igitur collyrio Tephro appellato, ad lippitudinem à calido humore obortā. Si uero non affuerit hoc alio quodā ex Libianis appellatis utendum est, aut cygnario. At si inflāmatio affuerit, cū lacrymæ calidæ influxus, hecatontarchiū collyrium aquosius instillare conducit, si non ulceratus fuerit oculus. Et si quidē inflāmatio prædominatur, addenda sunt ad hecatontarchiū quædā nō adstringētia collyria. Si uero influxus magis præualeat, ipsum per se ipsum aquosius infundatur. Omnibus autem præstat, in quibus gramæ crassæ sunt ac uiscosæ, id quod ex uino paratur, & Isthethi inscribitur, cum albumine oui inſusum, atq; hoc aquosius, ut coloretur solum ouū ex collyrio. Cuiusſimam enim opem affert citra aliud auxiliū. Post collyriorū usum, si punctura aliis quā aut mordacitatē, aut caliditatem perceperit, solum albumen oui calefactum infundatur. Nam lacryma ex supernis partibus delata, apud palpebram colligitur, & arenæ imaginationē exhibet. Et quidā Medici fidē habentes his quæ ab ægro dicuntur, uelut si aliquid sub palpebra arenæ, inuersam palpebram spongia detergent. Et uidentur sibi in præsens quidem

quidem ægrū ab omni suspitione liberare. Verum maximū detrimentum in posterū ipsi inducunt. Dū enim exasperat palpebrā, pungiūm dolorē con- duplicat. Proinde his quæ ab ægris dicuntur, nō ual de attendere oportet. Doloribus enim perturbati, ignorat id quod ipsos ledit. Cōuenit igitur post col- lyriū usum, largo fomēto uti; hinc enim lacrymæ in- fluxus dissoluitur. Deinde solū otī cadidum præca- lesa sū infundere. Statim enim a punctura liberantur. Rarefact enim albumē oui meatus & per ulsco- sitatē facili euacuat, lacrymā & meatus obducit, ac humorū acrimoniā cōtemperat, & ipsorū tenuitatē ad iustam spissitudinē transmutat. Et in summa, siue punctura infestari, siue nō, infundendū est oui cadi- dū per seipsum, post collyriorū usum. Omnē enim morbosam putredinē deterget. Nā collyriorū essen- tia quomodocūq; tenuis fuerit, tunicis tamen oculo- rum ac palpebris insidet, aspretudinē quandā indu- cit, quæ ubi oculū cōtingit, minime bona censenda est. Quidā porro dolorē obtundere uolentes, & ca- liditatē & acrimoniā edulcare, lac pro ouo infundūt. Decipiunt autē seipsos ex ignorantia, pro paruo so- latio, diuturnā affectionē ægro propinantes. Idem enim faciunt quod hi qui uulneri pinguia adhibēt, & carnē superexcrecentē augent. Sed & quī lac fa- cilē alteretur, à caliditate in oculo prætere naturam acrius euadit. Et de calida quidem lippitudine hæte- nus. Consequenter etiam de frigida dicendum est.

De frigida oculorum intemperie. Cap. xi.

In frigida oculorū intemperie minus quā in calida dolores sunt. Tardius autē curatur, & si successerit in his inflammatiō, tumida fit & colore uelut plūbea. Plerumq; autem oculus his nō ualde perturbatus est, neque rubicundus. Lacryma uero ipsi defussil per paruū angulū, aliquando etiā per magnum modica ac frigidissima. Progressu uero temporis etiā palpe- bræ inflāmur, & puncturæ cōsequuntur. Confla- tur hæc affectio humorib; pituitosis ac frigidis in ca- pite redundābus. Aliquando etiā ex mora in aëre frigido, & maxime post balneū. His igitur tēpesti- uē præuacuat per dysterē balneū adhibeatur. Sed & uinū dandum est, uelut paulō antē in aphorismo Hippocratis dictū est. Infundendū est autē ipsis inci- piente lippitudine collyriū nardinū Zoili ad aquo- siorem compagem dilutū. Et quātum lacrymæ im- minuantur, tantū collyrii cōpagē inspissetur. Sicq; tibi hic uniuersalis scopus curationis oculorum, ut pro decremento influentium humorum, crassescas compagem collyriorum quæ adhibetur. Declinan- te uero lippitudine nardinum collyrium aqua dilu- tum per specilli nudum palpebræ sublinatur.

De oculorū inflatione. ex Demosthene. Cap. xii.

Inflari oculum dicunt, quū absq; manifesta causa intū mescēs, decolorator & pituitosior ac fortiter pruri- ginosus fit cū fluxione. Cōtingit autē hoc plerumq; inferioribus, pruritu ab angulo ad nasum incipiente, uelut si quis à musca aut culice sit commorlus. Fre- quēs est hæc affectio in æstate. Curatur spongiæ fo- tu. Deinde palpebrā intrinsecus subline melle per se, & cū croco trito. Commodat & liquida Erasistrati pandectros. Illinendæ sunt & palpebræ forinsecus cū melle. Cōducit & euacuare alutū. Deinde etiā la- uare, & temperata calida aqua caput perfundere. Et post balneū dare uinū. At si pruritus uehemens est,

& ætas ac reliqua permiserint, & nihil aliud obstece- rit, uena secanda est in cubito, aut alius purganda. Prodest & aqua marina assusa præsertim hyeme.

De tumore oculorum.

Cap. xiii.

Tumere oculum dicunt, ubi palpebrā forinsecus eleua- ri contigit, decoloratorēq; esse ac grauiorē, & ægre mobilem. Itemq; dū pallidior apparet. Aliquando etiā album palpebræ aliquantulū excedit nigrum. Est autē tumor laxus forinsecus circa palpebrā ob- ortus, qui digito cōpressus citō cedit, & citō rursus repletur. Est & ut plurimū circa dolorē, & concolor naturalī habitus. Fit autē plerumq; ad fluxionē aquo- sa. Curandi porro sunt tumores qui circa solas pal- pebras forinsecus sunt, circa oculi cōsensum, præuca- tuata per dysterē aluo, solis illitionibus, præmissis fomentis per spongiā. Laxi uero tumores & conco- lores, præuacuat similiter aluo, & præmissis fo- mentis, melle illinatū intrinsecus palpebræ subli- to. Prodest & Erasistrati liquida illita. Vendū etiā ad ipsos apophlegmatismis ex melle cōcto, uua passa, thymo & pulegio. Acriora uero uitanda sunt, uelut est staphis syluestris, & similia. In quibus autē oculus condolet palpebræ, præuacuat aluo, & inedia imperata, spongiæ fomentū adhibeatur. Aliquando etiā faciei perfusione utendum est, & præsertim ubi pruritus cōsequitur. Deinde abstinētiū aut hyssopū tritū superne illinatū cū melle. Si uero corpus debi- le fuerit, lentem coquito, & per colum culinarium, aut cribrū, aut rarum panniculum fex lineum exco- lato, & ammixto melle expressum liquorem illina- to. Quod si ætas fuerit, crocum cum uino mulso illa- line, aut cū coriandri, aut solani, aut intubi succo. Fa- cit & glauciū. Oculus uero Erasistrati liquida sub- linatur, aut aliq; alio medicamento quod pluri- mam humiditatem ex oculis ducere potest.

De tumore indurato.

Cap. xiiii.

Fiūt etiam indurati tumores forinsecus circa oculum, plerumq; renitentes ad cōtactū ac duri, progredietes usq; ad malas & supercilia. Hoc autē maxime con- tingit ex carbunculosis affectionibus, & diuturnis lippitudinibus præcipuē in mulieribus. Oportet igitur ubi palpebræ simul intrinsecus fuerint crassescē- tæ, ipsas euertere, & collyrijs exasperationis destina- tis confricare. Si uero forinsecus solū fuerit affectio, nequaquā oculus sublinatur. Sed frictio rotius cor- poris & induratae partis adhibeatur. Post hæc impe- randum est ut oculos claudant; quo interim diutius confricētur. Deinde subscriptū collyrium oculis illa- linatur. Thuris drach. vi. gummi drac. vi. aluminis fisci drach. i. malicorij drach. i. Trita ex aqua illine, & siccatari permittit. Ad uesperam autem linteū mola- le & lana superligetur. Imò etiā interdū, si fuerint. Deambulatione utendū est multa & lenta. Vitanda sunt balnea, sol, & reliqua calfactoria, legumina item & bellaria. Ira etiam & derentio spiritus, & uomitus, & coitus tollatur.

Viceriū in oculis cōmunit curationē. Seueri. Cap. xv. Exulceratur oculus aliquādo extrinsecus aliqua re illa- labente. Aliquādo ex humorū influxu, aut erosione tunicæ agnatæ, siue corniformis, aut palpebrarum, aut angulorū. Curanda autē sunt in cōmuni omnia in oculis quomodocūque fientia ulcera, uniuerso corpori præ omnibus prouidentia adhibita, quo id quod redudat in habitū tollatur, per uenæ sectionē,

aut purgationē, aut clysterem. Si uero rei circumstantia omnibus his opus habuerit, omnibus utendū est. Dieta uero constituenda est cōtraria afflictioni, ita ut tenuem humorē inspissemus, crassum autem attenuemus, & uiscosum secemus, corruptorū & acriū temperamentū inducētes, & undiq; naturale temperamentū aegro exquirētes. Alius autē facile solubilis semper per cibos reddatur. Et fricatio multa infernarū partū fiat. Viēdum & deambulationibus pluribus lentis, & aquae potu. Et balneū rarissimē adhibendū. Collyria uero tenera ulcerato oculi infundantur. Quale est quod Aster appellatur, cōmodissimum ad uleera medicamentū. Sed & alba cygnaria colore appellata, & praesertim quae ex foenigraci succo paratur. Si uero sordidū fuerit ulcus, cū foenigraci succo collyria diluere oportet, & sic infundere. Viscositates enim ipsius facile remouet sordes. Possidet autē cum uiscositare etiā laxatioriam facultatem. Quare saepe in ulceribus ipso solo foenigraci succo nisi perfectius quod opus fuit. Si uero multa fuerit sordes, ad foenigraci succū parū mellis addere cōuenit. Oportet autē foenigraci exactissimē purgare, & saepe abluerē, ac pura dulci aqua madefacere in fistili uase probē torrefacto: (uitare enim cōuenit aeneum uas ad eius cocturā) postera uero die diffusa aqua, aliā purā adijcere, & ad lentum ignē fumū nō edentē coquere. Reijciatur autē primū & secundum decoctū, quo omnis amaritudo excludatur. Deinde purissima aqua affusa, & olla probē operta, coquito ad cōpagem mellis liquidioris. postea per lintēū excolato, foenigraco nō expresso, sed sicco sponte defluente cōtenuis, utere uelut dictū est. Ceterū decoctū hoc usq; ad secundā, aut ad summū tertiam diem seruare oportet. Inueteratū enim acius euadit. Postquam autē pura facta sunt ulcera, ad foenigraci succo abstinendū est. Et si profundiora fuerint ulcera, libia nō utendum, aut potius collyrio ex thure. Vbi uero incarnata fuerint ulcera & explanata, aut etiā adhuc paulō profundiora, adhibēda sunt collyria quae cicatricē inducere possunt, quale est Cleonis. Et de cōmuni quidē ulcerū curatione sufficiēti relata. Cōsequēs est ut dicamus quomodo ad singulas affectiones instare oportet. Et primum dicendum est de ulceribus ab extrinsecus illabentibus oboritis.

*De illabentibus in oculum animalculis aut paleis, aut arena, Democritensis.* Cap. xvi.

Si in oculū incidit culex, aut aliud quoddā animalculū, altero oculo clauso, & affecto aperto, animalculum sua spongia prohibet. Si uero palea, aut arena, aut tale quid incidit, tunc etiā idem facere tenta. Si uero permanserit, digito exime. Aut potius aquam, aut lac aut aquam nullam instilla. Si autē amplius oculo adhæserit per pharmacā quoddam nō inquinās, & nō acre eripe, quale est qd ex melle paratur.

*De calce uiuā in oculū illapsa.* Cap. xvii.

Si calx uiuā in oculū incidit, aqua quidē & lac insusilla uariāt & exurit. Verū albumē oui infusū, uāstiorā calcis obrūdit, & eo adhuc magis oleū rosaceū.

*De ulcerationibus ab igne.* Cap. xviii.

Quae ab igne sūt ulcera, duriores crustas faciūt. Quapropter frequentius humectentur lacte infuso cum albumine oui. Collyrijs autem utendum est ex stibio, & quod Cleoni inscribitur.

*De his quae oculo infinguntur.* Cap. xix.

Si in oculum infusus fuerit aculeus, aut ovisculū, forci-

pe extrahatur, atq; hoc attentē in directū, ne frangatur. Si uero nihil eminerit, sed æquale corpori fuerit, specilla duo accipito, & nucleis ipsorum utring; admotis, oculum cōprimito, ut quod infixū est, in medio consistat. Vbi uero prominuerit, uolūta exatrahatur. Deinde turturis aut columbae sanguis infundatur, aut albumē oui. Si uero statim eximi non poterit, oculis infusus & cataplasmatīs ad inflammationes congruis curetur. Nam post dies aliquot suppurata punctura, id quod infixum est eripet.

*De sugillatione.* Cap. xx.

Sugillatio dicitur quum ex plaga quadā, ruptis aut cōtulis uasis in oculorū tunicis sanguis sub tunica subierit, & statim quidē cruentus color oculi fuerit, postea uero liuidus. Sic affectos curare oportet cōmuni praedicta ulcerū curatione, per uenae sectionē, aut purgationē, & quae cōsequuntur, infuso cādido oui tepido, aut sanguine turturis uel columbae. Supernē uero imponēda est lana uino & rosaceo ac ouo imbuta, & deligato leuīs adhibēda. Postera die oculus saepe foueatur per spongiā cum ablinthij aut hyssopi decocto, forinsecus autē lana imponatur. Quum uero oculus ab inflammatione liber factus fuerit, melle, aut Erasistrati liquida illinatur, aut collyrio aromatico. Bene facit & solani succus cū melle infusus. Et thus sufficit cum pari bitumine. Ceterum ad inueteratas sugillationes probē facit hoc. In aeris rubri uas pueri incorrupti urina mittito, & aereo pistillo in sole ad multos dies terito, ut multū succum remittat, & siccatū melle excipito, ac utitor. Apollonius autē Memphites ad sugillationes ac uibices, tale collyrium prodat. Lapidis haemaitae, sanguinis asinini de corde siccati in sole, æquales portiones cū urina pueri incorrupti tere, & cardamines iberdidis appellatae succum adijce ac simul tere, & infunde. Aut collyria ex his efforma, & usus tempore cū muria instilla. Aliud. Lapidis haemaitae drach. iiii. sanguinis columbae siccī drach. iiii. sanguinis asinini drac. iiii. gummi drac. ii. terito ac utitor, uelut dictū est.

*De puncturis oculorum.*

Cap. xxi.

Omnes puncturae in oculo, quales a stylo aut aliqua cōsimili re fiunt, post cōmunem praedictam curationē, sanguine turturis aut columbae statim ab initio irritato, aut oui candido. Et ab initio quidē utāda sunt fomenta & cataplasmata calida. Post quartam uero aut tertiam diem, toto copore praevacuato, spongijs foueto, & cataplasmata ad inflammationes destituta imponito. Collyria uero adhibeantur leuissima, etiā si impura appareāt ulcera. Viēdū igitur est spodiaco, & tephro, & astere, ac similibus. Facit & collyrium Nili ex rosīs aquosum cū ouo instillatū.

*De uulneribus profundioribus.*

Cap. xxii.

Quum profundius & maius factū fuerit in oculo uulnus, ut periculum sit ne effluant ex oculo humores, animaduertendum est ne inflammatō succedat, & febris subsequatur. Prae omnibus igitur uenae sectione utēdum est, si uires sustineant. nullum est enim ex fscatis auxilium ab initio. Si uero uenae sectio reelinquatur, purgatorio idoneo utamur. sin minus, clysteribus aluum subducentibus euacuatio fiat. In oculum uero calidum oui instilletur. Et cataplasma adhibeatur ex ouo simul confuso utello, cum rosaceo & uino, ita ut leniter tepesfactum & lana exciprum imponatur. Sequētib; diebus fomentum fiat ex decocto rosarum aut meliloti, & infundatur lac mullebre

muliebre cum ovo tepidū. Cataplasmata adhibeantur ad inflammationes descripta, & maxime id quod ex capitis papaueris, meliloti, croco, & pane paratur. Illinenda est etiā frons ac tempora modico apio cum croco. Sint autem leuia cataplasmata, & super na palpebra sola ex his integratur, quo aperiri possit oculus, & lacrymas influentes excernere. Oculis quoq; leuiter deligetur. Si uero aliqui cataplasmata ferre nō possint, his palpebræ, ac tempora, & frons collyrio Nili ex rosīs illinātur: Si uero uehementiores sunt dolores, caput pilis denudetur, & cucurbita occipiti ac uertici affigatur. Et in noctē quaedam dolorem excitantia in potu exhibeantur. Circa quartam uero aut septimam diem Nili collyriū ex rosīs instilletur aquosissimum usque ad perfectā curationem. Cibus dandus est forbilis, boni fucci, uentri cōmodus: oportet enim uentrem semper probē solubilem esse. A uino uero abstinentum est usq; ad declinationem. Cauenda sunt autem & quæ caput repleant, & fluxionem irritant.

De ouiformis humoris excretionē. Cap. xxiii.

Si puncto oculo ouiformis humor excernatur, ut etiā oculus aliquantulū contrahatur, reliqua quidē similiter, uelut dictū est sūt, ut ne inflammation succedat. Verum post inflammationis ac ulcerationis declinationem, balneum conducet, & uinum tenue moderatum. Et cibus boni fucci, quo humor probē reanuriatur ac rursus expleatur.

De oculi prolapsu.

Cap. xxiiii.

Prolapsus totius oculi, ex uiolēta quadā capitis plaga contingit, aut ex ulceribus carbunculosis, aut internis uasis ac pelliculis, quibus adhaeret oculus, ruptis aut laxatis. Procidit enim quibuscūq; totus oculus foras, ut a palpebris cōtegi nō possit. Aliquando etiā usq; ad malas & supercilia procidit. Atq; hoc maxime cōtingit ex casu ab alto loco, aut ex plagis capitū uiolētis. Periculosa est autē affectio. Itaq; curatio statim adhibenda est, per uenæ sectionē, aut purgationē. Sed & reliqua adhibeantur quæ relata sunt in cōmuni ulcerum curatione. Contrahendus est cibus, & postea in ouo & rosaceo ac uino simul cōtus sis lanam imbue & impone. Deinde uero cataplasma ex meliloti & papaueris capitibus adhibe, cui addita sunt hyoscyami folia cū pane aut psyllio mo dicē madafacto. Assidue uero aliterentur cataplasmata, ut ne calefactæ partes suppurent. Sequentibus diebus remittēte inflammatione, cucurbita occipiti cum scarificatione affigatur. Præsentē uero inflammationē, cucurbitæ sunt ineptæ. Assidue autē ouum & lac tepida instillantur. Remittēte uero inflammatione, collyrio Nili ex rosīs cum ouo utendum est. Aut etiam mellis sumi exortis parum ipsi ammiscēdum, ad sanē excernēdum. Simul autē sub palpebrā subiiciendus est specilli nucleus, ut ne concretio aliqua fiat, quōd si prolapsus magnus factus fuerit, & nulla spes est ut uisus restituarur, cataplasmae suppurationis utendū est, qualia sunt quæ ex polline sūt. Sed & lenem cum melle imponere oportet. Et inflammatione declinante balneum petendum est.

De ulcerationibus superficialib. ex humorum influxu obortis, nubecula, caligine, epicaumate, & encrimate. Cap. xxv.

Quæ ex humorū influxu sunt superficiales ulcerationes, diuersimodē nominātur: caligo enim est ulcus superficiale in nigro oculi factū, consimile caligino

so aëri, colore cæruleo, quod multū locum nigri occupat. Quū uero in pupilla factū fuerit, nō facile ægrī uidēt. Nubecula autē uocatur profundius ac minus caligine ulcus in nigro, & est colore albus. Epicauma uero dicitur, quū nigrum oculi in superficie exasperatū, inustū fuerit, & colorem chereit præ se tulerit. Encauma uero est ulcus ut plurimū ex febre fiens, cum crusta impura, in nigro aut albo. Et in nigro dū sit in profundo, plerumq; in purgatione, maiore tunc carū corrosione cōtingēte, humores paulatim foras effunditur, & totus oculus effluit. Has igitur superficiales ulcerationes, cū febre aut sine febre fiētēs sanare oportet, alio per dytērē præuacuat, ita ut collyriū Nili ex rosīs aquosius instilletur, & in ipsis interuallis infunduntur collyrii, lac infundamus. Præteritis deinde aliquot diebus, ammiā scendū est ad Nili collyriū, chiacū appellatū Apollonij, aut aromaticum. Deinde uero etiā meracis his utendum. Citō enim cicatrices, easq; tenues & ferē non apparentes inducunt.

De argemo.

Cap. xxvi.

Argemum est ulcusculū circa iridis circulum factum, partē albi, & partē nigri occupans, & album apapares. Quum igitur profundius & fordidū factum fuerit circa iridis circulū, & citius repurgatum, aliquādo procidit tunica uiuiformis. Quapropter meatu obducētib; pharmacis in ipsis a principio utendum est, quo ulcera ab inflammatione liberentur, & tunica oculi subnutritia crustam rejiciat.

De fossulis, & concauis ulcerū generibus. Ca. xxvii.

Fossulæ appellantur quū in nigro sunt caua, angusta, & pura ulcera, puncturis similia. Concaua uero uocantur, rotūda & ampliora fossulis ulcera, & minus profunda. Nō igitur ipsa purgare oportet per acra collyria, sed potius per mitia renuire, & maxime ea quæ fossulæ appellantur. Concaua uero diuturna primū leniter detergētib; curabimus, & deinde ad renutrientia transibimus, qualia sunt quæ ex thure sunt. Vbi uero explanata fuerint, aut etiā adhuc cauiora sunt, Cleonis collyrio utendū est. Si uero fordes multæ ulceribus insitæ fuerint, aqua multa instillatur. Nos autē ad sœnigræci decoctū paratū uelut antea dictū est, modicū mellis ammiscuimus, & citius rē quæ sita assequuti sumus. Vimur etiā in causis ac fordidis ulcerib; collyrio Theodoti Seueri aquo siore cū ouo, & citra omnē dolorē repurgat, & cæterrimē ad cicatricē perducit. Meminisse uero etiā in his oportet prædictę cōmunis ulcerum curationis.

De suppuratione aut ungue.

Cap. xxviii.

Suppurationes in ulceribus fiētes diuersas appellationes habent. Vnguis enim dicitur quum a profundiore ulcere pus defluens, & inter tunicas illapsus, & in circulo iridis figuratum, simlem ungui resedat imaginem præ se fert. Ampliore uero pure collecto, & dimidium nigri occupante, aut per totam corneam tunicā pellucētē, suppuratum est oculum dicimus. Fīūt autē hæc etiam circa exulcerationem, dolore capitis, aut lipitudine prægressa. Continēntur etiam inflammatione prægressa, propter ampliore humorum repletionem diruptis quibusdam uasis, & sanguine ex ipsis profuso suppuratione. Consequitur autem ad suppurationem dolor uehemens pulsatorius, & rubor circa oculum totum, & temporum dolor. Curatio facienda est ab initio reiectis somētis, per alui per dytērē euacuatiōnem

tionem. Deinde per uenæ supernæ in cubito sectio-  
nem. Ita ut postea etiā uenam circa magnū oculi an-  
gulum secernat, circa collī ligatōē aliā fieri solī-  
tam. Sed & cucurbitā occipiti affigemus, aut hiru-  
dines temporibus. Deinde collyrijs ad inflāmatio-  
nes destinatis utendū est, & maximē Nili ex rosis,  
cum ouo aut lacte aquosius infusillato. Post tertīā ue-  
ro diē fomētum per spongīā adhibendum est, mo-  
deratē primum, deinde paulatim semper facta ma-  
iore accessione. Et collyria quidē meatui obstruē-  
tia uitanda sunt. Venditū autē cūctis forijs ac leniē-  
tibus, maximē chīaco Apollonijs, & similibus ex  
myrrha paratis, quæ dialysyrina appellantur: Quæ  
enim uehementer discutiunt ac resiccāt, statim quidē  
multā tenuioris euacuatōē faciunt. Quod uero re-  
liquum est & crassius cōdensat, & ut agrē dissolu-  
pōsit resiccāt. Galeni. Medicus quidā apud nos ex-  
pertissimus ophthalmicus eriam capitis cōcūstone  
multos sanauit. Et locabat quidem ipsos in sella ere-  
ctos, & utrūq; à lateribus caput apprchēdebat, atq;  
ita cōcutiebat, ut nos manifestē uidereemus pus deor-  
sum ferri, & infrā manere, propter grauitatē uideli-  
cet. Quū igitur in superficie fuerit pus, & ulceri con-  
digū, dum purgatur ulcus omnino etiā in uaporē  
exhalat pus: quum uero ulcus superficiariū fuerit,  
& superius. Pus autē amplius, & in profundo inferi-  
us ulcere, & à pharmacis non excolatur, oculū sub  
pure perpingere oportet, acu obliquē circa fridē &  
coronā appellatā immisso, & pus excernere. Atque  
hanc chirurgiā locis non inflāmaris adhibere opor-  
tet. suppurationes autē in albo tunicæ agnatæ fites,  
scalpro uenæ sectorio ex inferna parte diuidito, &  
tunicā agnatā leniter subexcoriato. Cæterū post hu-  
moris euacuatōē, in utriusq; uel cādidum infusilla-  
to. Deinde integrū ouum cū uino multo cōquassa-  
to, & molli lana exceptā oculo superponito ac deli-  
gato. Postera uero diē fomētum ex aqua calida per  
spongīā adhibito, & ouo infuso, rursus prædictū la-  
næ hapsū imponito, & post tridū collyrio Dio-  
nis illinito, aut quopīā ex his quæ ad perspicuitates  
adhibētur. Est autē Dionis collyriū hoc. Spodij dra-  
chm. i. i. thuris, squamæ aris, myrrhæ, acaciæ, spicis nardi,  
opij, singulorū dra. i. gūmi drac. vi. ex dpe aqua plu-  
uiali. Vbi uero expetere infundē cū candido oui, &  
prædictū lanæ hapsū superpone. Si uero postquā  
inflāmatio cessauit, caro ex diuisione prominuerit,  
prædictum collyrium cū lacte dilutum illine. Pro-  
bē etiā deprimit & repurgat chīacū Apollonijs.

De pustulis.

Cap. xxix.

Pustulæ sunt & in albo, & in palpebris. Plerūq; ue-  
ro circa corniformem tunicam. Et aliæ in superficie  
sunt, aliæ in profundo: cōstat enim tunica cornifor-  
mis ex quatuor uelut membranis corpusculis, den-  
sissimis ac fortissimis. Aliquando igitur sub prima  
membrana pustulā fieri contingit, quando etiam co-  
lorem nigrorē præ se fert. Aliquandō sub secūda aut  
tertia cōstitit, quando sanē etiā albidior pustulæ co-  
lor sit, eò quod in profundo tunicæ corniformis oc-  
cultatur: naturalis enim pustule color niger est. Tu-  
nica uero corniformis alba est, & cornibus simili-  
ma. In quantū igitur in profūdo corniformis tunicæ  
pustula occultatur, in tantū colorē alsimilat, & ma-  
iorem dolorē inducit, & molestior est. Nā siue ob  
plenitudinē rupta fuerit pustula, siue ab acrimonia  
corrofa, ut tunica ulceretur, facilis curati est superfi-

ciaria ulceratio. Difficilis autē profunda. Periculum  
est enim ne reliquū corniformis in profundo tenue  
existēs rumpatur, & uiformis procidat, ac effluat  
oculi humores. Præsertim si iuxta pupillam ruptio  
fiat. Facta enim iuxta pupillā ruptione, etiam si pro-  
more acri, tamē aliud quid graue cōsequitur. Nam  
inducta ulceribus cicatrice, homo non uidebit, pro-  
pter inductas cicatrices. Quandoquidē uero aliquā-  
do etiā ob corniformis corrosione uiformis tuni-  
ca procidit, & superficialis pustulæ imaginatiōē fa-  
cit, operæpretiū est de his exactius distinguere. Pus-  
tula itaque superficialis, similiter undiq; nigra est,  
nō tamē nigredinē exactē saturata. At in uiformi  
tunica pars quæ procidit, aut nigra est, aut cærulea.  
Quod uero maximū signum est, fundum prolapsæ  
uiformis per circulū reperies albū. Alba est enim  
colore corniformis tunica, qua rupta uiformis  
procidit. Sed & pupillæ magnitudo imminuitur in  
uiformis prolapsu, aut sanē omnino euariat secū-  
dū figuram: nō enim pupilla exactē cōseruat rotū-  
dum figurā in prolapsu, sed iuxta partē quandā ue-  
lut diuulsā apparet. Proinde relatis signis diligenter  
intendere oportet, & affectiones inter se distinguere.  
Nā iuxta affectionū differētiās etiam curationē ua-  
riare oportet. In prolapsu enim uiformis, magis  
adstringētibus ac repulsorijs utimur. In pustulis ue-  
ro his quæ leniter discutiūt. Curadæ igitur sunt pus-  
tulæ ita ut caueamus primū multiloquij, sternutaa-  
tiones, iras, spiritus, detētiōes, darū splēdorē, deinde  
cōtrahendū est etiā potus ac cibus, & ad alui eua-  
cuatiōē acridi dysterere utendū est. Tērandū quoq;  
ut lacte aluus soluatur, in quibus id neq; acelsit, neq;  
in nidorē uertitur, neq; uomitu reijcitur. In talibus  
enim uitandū est lac, & utendū gallinæ iure, aut cni-  
ci succo, aut aloē, aut per simplicius quoddam aluus  
soluenda. Vitanda sunt etiā uehemētiōra purgatiua,  
& maximē quæ stomacho sunt magis infesta. Deli-  
gationes autē & multos lanæ hapsos in his reprobamus.  
Valde enim nocent nō solū in his, sed etiam in  
omni lippitudine, ex humorū acrimonia facta. Ca-  
taplasmata igitur adhibere oportet, ubi inflāmatio  
affuerit, maximē in principio, leuia quiddē, sed lata.  
Sunt enim cataplasmata tenuibus ac mollibus lin-  
teolis illinēda, & super totū oculū imponēda, super  
cilio ac mala & tēpore simul cōprehensio, & sinē-  
da, quā diu fuerint simula. Postquā uero siccata  
fuerint, tollēda & alia imponēda. Adhibeantur ea  
quæ ad inflāmationē cōgruūt, uelut est tenue ouorū,  
& uellit ouorū tritū cū croco ac modico opio, mo-  
deratōq; passo ac pane. Conueniūt etiā adstringētia,  
uelut sunt mala cydonia cocta, aut malicorium in a-  
qua coctū. Verum uitandū est, uelut dixi, ne oculus  
in his diutius deligetur: est enim nocētissimum hoc.  
Mitigata uero inflāmatione, etiā ab emplastris absti-  
nendū est, propter grauitatē. Collyria uero in princī-  
pio cōueniūt, Nili ex rosis, cū lacte dilutū & infusū.  
Proficiatē autē curatione, adhibendū est id quod ex  
thure, myrrha, ac croco paratur. Postea etiā nardi-  
na. Forissecus autem illinēdæ sunt palpebræ colli-  
rio Nili ex rosis, frons uero acacia & hypochithide,  
cū croco & modico opio. Fomēta ab initio tepida  
adhibeantur. Nam intentā à principio inflāmatio-  
nes exacerbant. Postea uero caliditatē intendere  
oportet. Deambulationes & alij motus ab initio nō  
conueniūt. Balnea uero & reliqua uaporatoria fo-  
menta

menta post principium. A uino abstinere oportet per omnē curationē, & aqua calida in potu uti, & di-  
bus molles ac faciliē concoctiles accipere. Fugienda  
est in his sanguinis ex fronte aut uenis angularibus  
detrahitio: prociat enim oculus, & maxime si infla-  
mato simul affuerit, aut profundior exulceratio.

De carbunculis in palpebris Seueri. Cap. xxx.  
Quandoquidem carbūculi sunt ex genere pustularū,  
& sunt hi quoq; aliquando in palpebris, oculumq;  
ad maximū consensum perducūt, age & ad hos pau-  
ca auxilia proferamus, dinotones ipsorū primum  
exponentes, quū sint etiam alij quidam abcessus pal-  
pebrarū, qui imperitis carbūculi uideri possint. Nā  
& ordeolum tuberculū, & panī, & uari circa palpe-  
bras sunt, sed cum tumore quodā hæc, & serē circa  
inflammationē, & non cū uehementi dolore. Carbu-  
culi uero ruborē ab initio habent, ut oculū sibi peru-  
ri putent; tumorem uero aut eminentiam nō statim  
inducunt. Nam ob immodicā caliditatem, uel ru-  
ptionē quandā carbunculus sustinet, & quod effluit  
ex ipso quū sit acre ac mordax, superficē quidē car-  
bunculi resiccat, & crustā inducit, uicinis uero locis  
morbū inserit. Cōsequitur igitur ad ipsos fortis in-  
flamatio, tū ipsius oculi, tum partium circūstarum,  
& maxime glandularum circa aures, ut quandoq;  
magnarum ulcerationum, & rupionū oculi causa  
sunt, insuperq; prolapsū, & nuditatis palpebrarū.  
Et cicatrices a carbunculis crassæ fiunt, & alsidue ul-  
cerantur. Et in reliquo quidem corpore sanguis qui  
effluit ex carbūculis niger reperitur, propter super-  
affationē. In oculis autē sanguis nō omnino ex car-  
bunculis manat, eō quod necq; redūcit in oculo san-  
guis. Vnde plerunq; etiā albi colore sunt carbūculi  
in palpebris. Et si quidē emotio affectionis cito con-  
tigitur per cōuenientem curationē, carbunculus pe-  
nitens disparat, si uero durauerit, & ægrē discuti pos-  
terit, necessariū locus nigrescit. Proinde incipientibus  
carbunculis nō statim ad cataplasmata & illitiones  
progredi oportet, sed per dytferem primū aliuē eua-  
cuare. Deinde lactē moderate cocto purgare. In san-  
guineis corporibus etiā uena secanda est. Postea per  
spongias fomentū adhibendū, primū ex simplicio-  
ribus. Adstringentibus enim & frigefacientibus, &  
aliquando etiā resiccantibus pharmacis usi, hos sana-  
bimus. In principio igitur, quū feror adest, humo-  
rem extinguere conantes, coriandri trito ruborem  
oculi illinimus. Et solanū cum passo tritū & carbu-  
culo adhibitu, statim ipsum abolet. Atq; hic ductus  
in principiis magnopere prodest. At frigefaciētia ca-  
taplasmata oculo in carbunculis adhibita, repellunt  
quidē id quod influit carbunculo, & externas infla-  
mationes sedant, uerū periculū est ne in ipsum oculū  
impetū faciat; hoc enim solanū aliquando perpetra-  
uit. Adhibitu enim cū passo statim quidē tumorem  
aboleuit, oculus autē hinc repletus est. Cæterū car-  
bunculos ita depascentes uarie curare oportet. Nam  
quod desinit acre ac mordax existit, ut etiā uicinos  
locos depascatur, & periculū sit ne oculus lēdatur:  
soler enim erosio his cōtingere. Conuenit igitur spō-  
gia detergere, & oculū moderate perfundere, rosa-  
rū, aut rubi, aut pampinorū uitis decocto. Sit autem  
tepidius decoctū, aut potius lactei teporis. Quod si  
etiā sordidi sūt loci, ex eo quod nome depasces præ-  
ualuit (sæpe enim etiam palpebræ excidunt) ad hu-

iusmodi fluxiones etiam hypocythidis succū aque  
ammiscemus, & myrtū & acaciā passo diluta lo-  
cis illinimus. Oportet enim pro corporis curandi ra-  
tione, etiam materias eligere maximē medias. Val-  
de enim efficacia pharmaca loci nō sustinent, qualis  
est ærugo, & similia. Per mordacitatem enim etiā sa-  
luti spem habet oculus, hac quoq; priuatur: ne-  
uofæ enim partes & præsertim carnibus denudatæ,  
a uehementer mordacibus læduntur, ut etiā cariem  
inducant. Malicoriū itaq; ex malis pumidis addis cū  
lenticula feruefacimus, & de rasa interna parte, cum  
modico melle terimus, & ex eius usu magnopere  
profectumus: celerem enim purgationē facit, & hu-  
mores qui oculis inferiuntur, quodammodo suppri-  
mit. Nā pingula nomas augent. Aucta uero nomas,  
in uino malicoriū coquere oportet, & per se circa le-  
nticulā imponere. Crustas autē magis malicoriū co-  
ctum tritum cū melle impostum resoluit. Sunt &  
cōposita pharmaca carbunculis conuenientissima.  
In principiis enim feruorū, pastillus ex halicacabis  
illitus excellenter extinguit. Frigefacit enim & resic-  
cat moderate: Si uero cōtrahere oportet carnem fua-  
per excrecentē, Musæ pastillum aridū tritum adhi-  
bemus. Si uero incarnatione opus est, ipsum Musæ  
pastillum cū sapa dissolutum illinimus. Et si cicatri-  
cem inducere intendimus, rursus pastillū ex halica-  
cabis assumimus. Apollonius autē ait: Ad carbu-  
culos oculorū hoc pharmaco utimur. Spodij drach.  
iiii, lapidis scissilis drach. ii, croci obol. iiii, myrrhæ  
paululum torrefactæ obol. iiii. Terito cū uino odo-  
rato donec arecant, & pasci cretid, aut alterius non  
acris hemina ammisce, cōtere, excide ac subline. Dis-  
parat crustas, & purgat ulcera, siue extra palpebras  
affectio fuerit, siue intrinsecus in profundo. Facit &  
ad fluxionē ac inflammationes. Si uero dolor oculum  
uexarit, hoc collyriū illine, & excisigū siftere nomē.  
Recremeti plūbi triti loti & euicicati drac. iiii. spicæ  
nardi drach. i, gummi drac. iiii, foliorū oleæ centum  
uigini succū. Succum aque hæmina adfolia adiecta  
exprimito, excolatoq;, & ad reliqua cōterenda uti-  
tor. Facit & collyriū Nili ex rosīs cū ouo infusum.  
Maximē uero Nardinū candido inscriptū, per sub-  
missionē palpebræ sublitū, usq; ad perfectam cura-  
tionē: oportet enim ubi pura facta sunt ulcera, fomē  
to præmissio, specilli nucleū lacte tingere, & palpe-  
bris submittere, atq; angulos inter se disparare, ne di-  
storta cōcretio fiat. Et ob hoc neq; oculū deligare o-  
portet, maximē post ulcerū purgationē. Nam circa  
principia si inflammationes maximæ & distentiones  
fuerint, lēdulae coctæ cataplasma cū pane imponere  
cogimur. Sed & psylliū impositū inflammationes mi-  
tigat. In doloribus enim aliarū oculi inflammationū  
adhibitu, fomū inducit. Sine autē leuissima catapla-  
mata. Sed neq; diu in cataplasmatū usu perseuerare  
oportet. Augēt enim putrefactionē, & oculum ma-  
gnopere lēdūt, uelut etiā in pustulis prædictum est.  
Postq; igitur aliquatūlū mitigauim⁹ inflammationes,  
statim a cataplasmatīs, tū in carbūculis tū in pustulis  
abstinebim⁹. At uero in locis circa aures per cōsensū  
inflammatis, splentium ex cerato butyrino imposito.

De canceratis oculorum ulceribus. Cap. xxxi.  
Vlcuscula in nigro oculi scitā, cicatricem nō recipien-  
tia, parua, dolorosa, parua uasa habentia uaricosa,  
cancerata dicuntur. Et aliquando quum cicatricem  
acceperit



accepisse putantur, resoluuntur citra manifestā causam. Fiunt autē in his punctorijs discursus usq; ad tēpora. Et cōsequitur in ipsis fluxus humoris moderatē acris ac tenuis. Et albū in oculo itemq; nigrū, semper rubicundū est. Et auersantur cibū. Augentur autem ipsi uehementer dolores, illitis acrioribus medicamentis. Cōtingit hæc affectio maximē senioribus, ex diuturnis lippiudinibus. Et feminis quibus menses defecerunt. Curatio porrō adhibenda est, habita totius corporis cura, cū prædictione quod fieri non possit ut perfectē sanentur, sed fieri posse ut mitigentur, primū per conuenientem dietam; deinde etiam per pharmaca dolores lenire potentia. Dieta igitur huiusmodi sit. Postquā a lecto surrexerunt, corpus moderate illinant oleo dulci. Caput autē medico rofaceo aut omphacino. Et utridi sindone oculo prætenta, deambulare iubeto in tenebroso ac nō uentoso loco, cū silentio & abscq; alia diffensione, ita ut neq; caput agitent, quantū eius fieri potest. Postquā autē ampliore & lenta deambulatione usi fuerint, ad domiciliū tenebrosum, & nō ualde lucidū se recipiāt, & rursus ab alio corpus ipsorum illinant, excepto capite, cōfrictis maximē subis ac infernis partibus. Postea uero lactis moderatē coctū, remota cōcretionē superstante, heminae mensurā accipiant. Nā acrimonia quæ affluit hebetat, & alium facile solubile facit. Si uero ineptus sit ad lactis potū, pollinē polentę passō moderatē calido diluto inspergito, & forbendū dato: Postea si fame uectur, duobus ouis forbilibus utatur, & somnium diurnū utent. Circa decimā autem horā cōfrictū assumat panem purū, cum obsonio quodā uiscosum quippiā habente, uelut sunt oua forbilia, cerebellum porcinū duabus aquis coctum. Ex piscibus muræna, torpedo, glauciscus. Ex oleeribus malua, atriplex, lactuca. Assumenda etiā alica ac oryza, & laganū in gallinæ iusculo coctū, & pedes suilli ac tali probē cocti. Omnia uero sint moderata. Vinū bibant & tenue subadstringens, & ipsum moderatum. Ab omnibus autē salsa mētis & leguminibus penitus abstineat. Item a balneo, nisi necessariū hoc fuerit, aut lassitudinis gratia, aut tardæ concoctionis. Atq; tunc tardandū in ipso est, sed citō exeundū. Doloře uerō & fluxione obortā illinantur pharmaca lenia ad pura ulcera cōuenientia, uelut est spodiactū, & collyriū Cleonis, & similia. In oculū autē assidue infundendū est ouū, aut lac muliebre tepidum. Mitigar etiā lentis decoctū infusum, aut plataginis, aut portulacæ. Verū ad temporū dolores utendū est collyrio Nili ex rosīs. Si uero ad uehementēs inflammationes cataplasmatīs uti cōgimur, cataplasmatē ex papaueris capitibus utendū est leuissimō. Antea enim dictū est quod fugere oportet cataplasmata in oculis calida affectionem habentibus. Ammiscedum est autē cataplasmati ex papaueris capitibus, in his & crocus, & lac muliebre.

De malignis oculorū ulceribus.

Cap. xxxii.

Fiunt & alia maligna ulcera, partim a magno angulo initū sumenda, partim a nigro, partim ab albo, & oculū citō corrodū, & præsertim in corporibus uitiōsis humoribus referēs, & quæ acurium rerum usu uita sunt. Sanies etiā ab ulcere manat multa ac grauolens, & sequuntur dolores uehementēs ac febres. Sæpe etiā alui fluxus. Depascuntur etiam aliquādo ulcera uicinis oculis locos. Curandæ uero sunt

etiam huiusmodi nomæ, per prædictæ dietæ usum. Veruntamen eiusmodi exhibenda sunt quæ aluum non solūt. Vnde in his magis uoluerit genere utendū est, maximē montanarū. In oculū uero infundendū est lac, aut ouū, & prædicta collyria. Si uero nome transgressa fuerit oculos, curatio ita fiat. Poma pholygem optimē lotam, ex muliebris lacte illinere oportet, & superimponere, sanie prius per aquam elora, deinde per lac. Facit similiter & cerusa lota ac siccata, & cum lacte adhibita. Et plūbi lotura siccā, quæ cōfrictio plumbeo mortario cum plumbeo pistillo colligitur. Facit & plumbi recrementum lotum, & amyllum. Singula cū lacte muliebris. Cataplasmata uero si coacti fuerimus adhibere, mala cydonia cocta adhibeantur, aut rosæ uirides, aut siccæ uinō macerata, polygonum item ac solanū, & semperuium, & seris cum polentæ polline. Si uero uasa in fronte ac temporibus fuerint eleuata, etiam sectionis uasorum rationem habere oportet.

De myoecephalis.

Cap. xxxiii.

Quum ulcera quæ propter erosionem aut ruptionem corniformis tunicæ fiunt, profunda euadunt, pars aciniformis tunicæ procidit, & quod prolapsum est nigrum aut cæruleum apparet. In circuitu uero circa fundum eius partis quæ procidit, labia corrosæ corniformis tunicæ alba apparēt. Et si adhuc magis pars prolapsa durauerit, labia ruptionis tunicæ corniformis callosiora facta adhuc magis alba apparent. Diuisa est autem omnino in uisiformis siue aciniformis tunicæ prolapsu pupilla ipsa, ut omnino nō appareat, aut & situ & figura immutata. Et per hæc discriminatur myoecephalon à pustula. Dicitur autem myoecephalon, quoniam figura simile est capiti mulsæ. Repulsorij autē & adstringētib; opus habet pharmacis, qualia sunt maxime quæ ex uino fiunt. Est autem & hoc celebre ad ipsum: Cadmiæ, æris, chalcididis crudæ, singulorū unc. i. æruginis drachm. iiii. myrrhæ troglodyticæ drachm. ii. & dimidiā, croci drach. iiii. salis ammoniaci drach. iiii. gummi drach. iiii. Excipe uino ueteri adstringente. Aliud, ad pterygia, carnis incrementum iuxta magnum oculi angulum, aspritudines. Exterit etiam cicatrices. In alio exemplari reperi, etiam staphylomata facere. Misys crudī drach. xii. cū aquæ cochleario terito, deinde croci leuissimē triti drach. xx. adiuncto, ac rursus terito, & additis myrrhæ drach. iiii. excipio ac utitor. Post illitionē uero ex ipso factam, spongiam teneram imposito ac deligato. Aliud bonum. Facit & ad data staphylomata. Misys crudī sextantem, croci unc. i. gummi unc. i. tere cum uino & utere. Misificet etiam facit in ipsis theodotij Seueri, & si quidem inflammatio non affuerit, crassius illine; si uero affuerit, cum ouo infunde. Adhibeatur ipsis quoque conueniens deligatio. Et inflammatis cataplasma ex papaueris capitibus impones. Aut psyllium aqua calida madefactum. Collyrium Hori faciens ad myoecephala cum Theodotio. Facit & ad diuturnas tenues fluxiones. Cadmiæ, squamæ æris, croci singulorum drachm. viii. opij drachm; xii. misys usi, myrrhæ, acaciæ, gummi, singulorum drachm. iiii. Excipe aqua.

De staphylomate.

Cap. xxxiiii.

Differentiæ staphylomatum plures sunt. Nam & causæ affectionis variæ sunt, plerūq; tamē quomodo cuncq;

cuncq; factū fuerit staphyloma, uisum destruit. Appellatur autē staphyloma, quum corniformis tunica fuerit eleuata, & eminentiā acino uuē similem fecerit. Fit autem aliquando humoribus sub aliquam corniformis tunicē striam collatis, à quibus humoribus coactā corniformem tunicā sustinere contingit ac eleuari & incuruari, facereq; staphyloma clarea ruptione. Fit hoc etiam ex pustula quadam inter strias corniformis tunicæ satis profunde cōsistente, quæ tunicam eleauit, non tamen rupit. Appellanti etiam staphyloma quam ob corniformis tunicæ rupturam, magnus uniformis tunicæ prolapsus factus fuerit. Differt hoc à primo, quoniam in illo eleuatio sola est tunicæ corniformis, unde etiam tota moles albidior apparet. In hoc uero ruptura quoq; facta est tunicæ corniformis, & quod prolapsum est, cæruleum aut nigrū apparet. Quum autē maximum factum fuerit staphyloma, ut extra palpebras trāgrediat, & induretur, ita ut ipsa corniformis circum circa callosa facta sit, & talem affectionē cōstringat, clauus appellatur, quoniam per omnia clauī capiti similis existit. Hæc igitur affectio quomodocunque fiat, duobus malis subiacet, uisus uidelicet detrimentum, & figuræ deformitati. Et sic quidē affectū oculū ad naturālē statū reducere, impossibile est arti. Figuræ uero deformitati consiliū cōtingere potest, maxime per chirurgiā. Quæcūq; igitur staphylomata recentia sunt, & propter inflammationē eleuata sunt, tunice, curāda sunt cataplasmatū ad inflammationes descriptori usui, & simili quoq; diæta. In quibus autē sub corniformis strias humores aliqui collecti eleuationē fecerunt, si dolor affuerit, semen lini cū fenogrecō ex aqua mulsa coctā imponemus. Declinantes uero doloribus, farinā fabaceam cū rosīs aut semine lini ex aqua impone. Aut buri folia, aut bryoniæ heros immaturos, cū butyro & terebinthina, æqualibus portionibus impone, & deliga. Ad dolores uero cōuenit etiam solani succus cum lacte muliebri infusus. Collyriū autem ad non inflāmata staphylomata cōmodū hoc est. Alcyoniꝝ drac. iiii. salis ammoniac. unc. i. spumę niri drach. i. lachrymę oleæ syluestris drach. i. gummi sextantem. Excipe aqua. At Theodoriū Seueri brasicæ spongę dilutum, & crassius oculo adhibitu, unā cū spongę deligatione, molē dissipat, si nō diuturna fuerit affectio. Cæteriū ægrē curantur staphylomata quæ ampliorē fundū habent, & quæ uenas sanguine plenas habent. Incurabilia autē sunt eminentia, & colore uaria, & temporū dolores inducētia. His sane nihil aliud adhibedū est, quā ea quæ dolores mitigare possunt, quæ in malignis ulceribus tam antē relata sunt.

*Staphylomatū chirurgiā. Cap. xxxv.*

In staphylomatosis quæ angustū habent, & nō maligna sunt, cōmoda est actio secūdum cōstrictionē appellatā, cuius hic est modus. Duas acas accipere oportet filiū duplex intorquē habentes æquali prorsus longitudine. Deinde hominē ad pedes tuos collocato, capite ipsius reflexo, ita ut occiput ipsius genibus tuis innitatur. Et deinde disparatis palpebris, per medium staphylomatosis fundū, ex superius deorsum acum transmittito. Sit autem non ualde crassa, neq; oblonga. Deinde dum detinetur oculus ab acum transmissa, alterā acum duplex filiū habentē similiter transmittito à paruo angulo ad magnū, per mediū itidē staphylomatosis fundū, quo figura duarū acum trans-

missarum crudiformis fiat, aut literæ græcæ x. similis. Nam quū paulō obliquior facta fuerit transmissio, facilius acus extrahitur. Deinde incisis duplicatorum filorū principijs, superna duo principia, superno acus principio subijcētes, inferna uero inferno, strenuū cōstringimus. Similiter autem & oblique acus principia cōstringimus: optima uero cōstrictio fit rectis principijs ad obliqua ductis, & hoc modo colligatis. Deinde apicem staphylomatosis releuamus, solo fundo ipsius relicto gratia filorū, ut ne elapsis ipsis humoribus oculi effundantur, & oculus cauior fiat. Cur autem staphyloma excidimus: primū quidē compendiarie curationis gratia. Citius enim fila excidunt, & ulceratio curatur. Deinde etiam minori dolore æger affligitur per totū curationis tempus, quū & corpora transpirent, & neq; magna inflammatiō cōsequatur. Post resectionē uero apicis staphylomatosis, acus extrahere oportet, filisuelut dictū est cōstrictis, & tunc lac infundere, aut oui cādidi. Supernē uero oculo imponatur oculi cū rosaceo ac modico uino cōcussum, & molli lana exceptū. Imponatur etiam temporī alius lanæ hapsus ipsidem imbutus. Et facta deligatione, æger in quiete seruetur. Postera die fomentum fiat per spongias probe expressas, & lacte infuso, lana uero imbuta imponatur & deligetur. Atq; hoc faciendū est per plures dies, donec fila excidant. Elapsis autē filis illinantur tenera ad ulcera descripta, ut pura exulceratio fiat. Deinde cicatricem inducentibus utendum est.

*De ulceribus cicatrice indigentibus. Cap. xxxvi.*  
Purgatis oculorum ulceribus, & expletione indigentibus, animaduertere oportet ut ne carne redundent, sed aliquanto cauius ad cicatricem perueniant, præsertim si in pupilla fuerit ulcus. Nam supereminētes cicatrices uisum impediūt, & deformitatem afferunt, & dum ex palpebris punguntur, luxiones inducunt. Quæ uero aliquantulū caue sunt, melius apparent ac splendorem excipiunt, & decore si fuerint partim cōcolores. Tales autē cōsequuntur, si à molibus & meatibus obstruentibus pharmacis, compendiod ad cicatricem inducentia transeamus. Præstat autem si aliquādo clandestinē caro superexcreuit, citō reprimere ac eminentias attenuare, & sic cicatricem inducere. Vianda autē sunt tingentia cicatrices pharmacā, & maxime si iuxta pupillam fuerit ulcus: dū enim denigrantur, impediunt uisum. Sed & deligationes oculorū in ulcerationibus uitadæ sunt, quibus aliqui utuntur uolentes humiliare cicatrices. Deligatus enim exulceratus oculus, & immobilis factus, sæpe palpebris agnascuntur. Porro ulcera ad cicatricē perducta diligenter notare oportet. Quidā enim decipiuntur, & cauiore factas cicatrices, caua ulcera esse putantes, mollia & replentia collyria illinunt. Deinde cōtingit locos quidē non impleri, uerum tunicas ex hoc crassas fieri. Quū itaq; superficiē ulceris darā factam uideris, & albam ac leuē: & album oculi naturalem colorē recepisse, & totū oculum à fluxione liberatum, scito cessasse iam ulcus, & cicatricem inductam esse. Est autem optimum collyrium quo uisus sumus in puris ulceribus & cicatrice indigentibus, quod Cleonit inscribitur.

*De cicatricibus & albuginibus. Cap. xxxvii.*  
Omnes cicatrices in nigro oculi albæ apparent. Denata enim corniformi tunica subiectus ipsi cæruleus color non translucet. Maximē tamen supereminētes

res albescit. Aequales autē minus sunt albz. Caulo-  
res uero quodāmodo cōcolores sunt nigro. Quē ue-  
ro adstringentibus pharmacis usq; ad inducā dica-  
tricem curantur, magis obscurantur, eō quod pelli-  
culā per adstriktionem multum densantur. At uero  
callosas ac diuturnas & crassas cicatrices curare non  
oportet. Necesse est enim in talibus, collyrijs ualde  
acribus uti, & ad uehementi mordacitate alia oculi  
partes ulcerabuntur. Si uero etiā suffusio aut glauce  
do affuerit, uanū est cicatrices extergere. Oportet au-  
tem eum qui cicatricem exterere uelit, per uictū cor-  
pus accommodare, quo moderata materia & boni  
succi, in toto corpore addit. Itaq; ab omnibus acri-  
bus abstinere oportet, falsisq; ac crassi succi cibis. Et  
a multo uino. Et bonae cōcoctionis maximē curam  
gerere, & moderate boni succi edulij uti. A balneo  
uero curationis tempore abstinendum est. Illitio au-  
tem facienda est ante cibū, ubi probe cōcoxit, & ca-  
pite ac toto corpore leuis est, uētris onere prius de-  
posito, & nō statim a lecto ad illitionē transeundū,  
neq; ante coenā. Vitanda sunt excoctantia cicatrices  
pharmaca. Quidā enim illinentes ipsas acribus me-  
dicamentis, & excoctiātes, ac candida ramenta per spō-  
glas detrahentes, ea in coticulis nigris circumferētes  
ostentāt. Deinde illinūt aliquid medicamentū quod  
tingere potest. Verum fluxionibus succedētib; ex-  
pharmacorum acrimonia, itemq; inflāmatiōibus,  
& aliquando resolutis cicatricibus, ulcera magis  
profunda fiunt. Deinde cogantur rursus adstringen-  
tibus ac meatus obstruēdibus collyrijs uti, & cica-  
trices magis crassas faciunt.

*Materia attenuans cicatrices & albugines, Gd-  
leni.*

*Cap. xxxviii.*

Proinde in his quā attenuari possunt, utendū est phar-  
macis moderatē extergentibus. Exterforia autē non  
minima facultate, paritēq; pat. aēs ustum, & squama  
aeris, & flos eiusdē, & chalcitis usta. Si uero lota fue-  
rint talia, exterforia quidē adhuc manent. Tanto ue-  
ro imbecilliora actionibus fiunt, quāto etiā leuiora.  
Securius est autem leuioribus uti. At fortiora his  
sunt, Misy, & ærugo. Quare etiā ad sycofes & cal-  
los cōueniunt, si ammiscentur. Quidam his adiungūt  
etiā gallas, pharmacum uehementer adstringens.  
Sed uehementius est adstriktionem simulq; acrimo-  
nia atramentum sutorium. Multo uero moderatius  
euidit ustum ac lotū. Eiusdē materiae est & squa-  
ma ferri stomomais. Quaecunq; igitur ex adstrin-  
gentibus multum terream compagem habent, aspri-  
tudines sycofesq; ac callos eliquāt, uelut sunt Misy,  
& ærugo, & similia. Quae uero ex succorum gene-  
re sunt, uelut omphaciū & hypodisū, glandumq;  
& acacia, in subliōnibus facile cum lacryma eluū-  
tur. Citra mordacitatem autē extergent, cornu cer-  
ui ustum, & cornua caprarum. At thus darissimae  
particeps est extergēdi facultatis, eximitq; dolorem  
ac cōcoquit. Prædictorū uero animalium cornua,  
exterforia quidem sunt, sed neq; uim eximēdi do-  
lorem, neq; cōcoctōriam habent, quum frigidā ac  
sicca sint temperaturæ. Thuris autē cortex adstrin-  
git quidem & ipse nō instrēuē, sed multum omni-  
bus prædictis inferior est. Thuris uero inter onera  
cōfracti pollen, quod mannā dicunt, differt a thure,  
eō quod modicam adstriktionem assumpsit. Parua  
enim quaedā coricis segmenta ipsi ammixta repe-

riuntur. Habet & armenū appellatū uim extergen-  
di, quo uidelicet utuntur pictores. Item aramentū  
indictū, & propterea uelcribus nō inflāmaudis citra  
molestiam adhibetur. Acaloē mixtæ facultatis est,  
uelut etiā rosa. Habet enim amarū quiddam, quod  
extergit. Habet & adstringēs quiddam, quo cōtra  
hic ulcera & ad cicatricē ducit. Sal uero ammoni-  
cus, & lapis Alsius, & flos ipsius, fortissima sunt  
pharmaca. Quare etiā ad scabras oculorum affectio-  
nes cōueniunt. Cæterum ex aromaticis cōmodo his  
miscentur, calia & malabathrum, ac amomū, discusi-  
foria quidem facultate prædita, uerum etiā adstri-  
ktionē participātia. Nam in communi de omnibus  
exteriorijs medicamentis nosse oportet, quā mode-  
rata sunt, & quā sycofes ac collas consumunt, ea o-  
mnia etiā ad cicatrices crassas conueniunt.

*Auxilia ad cicatrices & albugines. Cap. xxxix.*  
Ad albugines dracunculū semen habentis occultatum  
in terra simile piperi, id ipsum semen accipe, & tritū  
cum melle illine. Aliud, ad cicatrices & hebetudinē  
uifus. Seminis rutæ scrup. ii. armeniāci scrup. viii.  
falis ammoniaci scrup. iiii. ammoniaci thymiamatis  
scrup. iiii. utere sicco. Aliud. Cicatrices recentes ex-  
terit citra omnē molestiam, & lac equinum cum mo-  
dico melle assidue illitum. Aut anechi florem purpu-  
rascensem cū modica aqua terito, & per linteum ex-  
colato, ac succū oculi bis in die instillato. Et postea  
cucumeris hortensis semen cōmande, & expressum  
per linteolum succum in oculum instilla, & hoc as-  
sidue facito. Aliud ad albugines. Sideritidis hera-  
ba fructū leuissimē tritum insuffla. Deinde cōpræ-  
hensum manu oculum, frigida aqua paululum proa-  
lue. Exterget etiā generose Alcyonium milestij cum  
melle. Ammoniacum thymiaa tritū cum uino &  
melle. Quod si puero paruo albugo facta fuerit in  
oculo, mater pueri ammoniacum cōmandet, & in  
pueri oculum sufflet. Facit & Anemones radix bul-  
biformis leuissimē trita illita. Et anagallidis creruleū  
florē habētis succum cum melle. Aliud Capnij Che-  
lidonij appellatū succus cum melle. Nitrū cum oleo  
ueteri, mentæ succus mirifice facit. Columbæ simus  
in core cum aqua dilutus præter opinionē facit. Item  
felis fel illitum. Aliud ad albugines certum. Buty-  
rum liquefactum solum illine, summe prodest, &  
utere. De hoc plura promittere nō oportet, omnem  
enim promissionem uincit. Aliud optimū, Lac mu-  
liebre, melantheriam ex clauis uteris ac aceto para-  
tam, mel bonum, hæc tria æquis portionibus simul  
mixta & excolata adhibe uelut diuinū pharmacū.  
Aliud. Rumicis hortēsis & plantaginis semen in tea-  
sta exurito, & cinerē exactē terito, ac utitor. Aliud.  
Crocum, pipēr, æquali pōdere lenissimē trita, cum  
felis felle in collyria redigito, ac utitor. Aliud. Pul-  
lorum hirundinum capita dextra dextra in olla exurito  
ac terito, & in corneo uase reposito, ac utitor. Est  
enim utilissimū auxilium etiā ad percussos o-  
culos illitum. Aliud. Lapidem sarcophagum appella-  
rum, ex quo loculos defunctorum magnos faciunt,  
tundito, cribrato, & cum sputo ipsius ægri præfer-  
tim ieiuni terito, ac confideret illinito. Aliud. Vi-  
tulæ fel hemina mēsurā ad ignem modice coquito;  
& optimi mellis parē mēsuram adjicito, & myrrhe  
drach. ii. croci drach. ii. simul terito, ac rursus in æ-  
neo uase sufficienter coquito, & in pyxidē æream  
reponito,

reponito, ac utitor. Aliud. Lapidis magnetis ufui, lapidis ophticæ, fistibi, æquas portiones tufas, cribratas, ac rursus probè tritas, nifteridis herbæ succo ac optimo melle addito, illine per specillum ex lapide scaphophago factū. Aliud. Galbanū cū melle liquefactum ac simul tritū adhibito. Aliud collyriū, tollit albugines mirificè ac citò. Squamæ ferri stomomatis drach. ii. aluminis scisti drach. ii. gummi uermiculati drach. iiii. terito ex aqua, & formatis collyrijs utitor. Aliud. Rhani succum, si fieri potest de semine, sin minus, de folijs, sextantem, ammoniac thymiamatis unc. i. testarū sepiæ unc. i. mellis atrici sextantem, Trita excipe ac utere. Quidā solū ammoniacū cum rhamni succo terentes illinūt. Iple uero succus per se illitus cicatrices tingit. Archigenis collyriū ad albugines, quod ex una illitione plurimā albuginis partem tollit. Summe etiam facit ad omnē periculofam ac diuturnā lippitudinē. Cochleari ustarū drach. iiii. aeris usti drach. iiii. squamæ æris drach. vi. squamæ ferri stomomatis drach. x. iij. eruginis drach. vi. lapidis scisti drach. i. aloës drach. i. omphacij scid drach. ii. lycij indic drach. iiii. chalcididis drach. ii. myrrhæ drach. iiii. thuris drach. iiii. corticis thuris drach. ii. croci drach. ii. crocomagmatis drach. ii. spicæ nardi drach. iiii. cyttinorū drach. ii. gummi drach. viiii. terito cū aqua, & formato collyria, ac utere cū aqua. Quod si aridū facere uoles, trito collyrio utere sicco. Facit & harma-tium collyriū, & præscriptū ad mycephala ex uino, & his similia. Probè etiam facit ad cicatrices, inquit Apollonius, collyriū pepiemenon, id est presum appellatū, quæ omnia in tractatu de multi usum collyriorū cōpositione describuntur. At uero theodotij Seueri cū aqua crassum illitū, ad cūam tenuitatē perducit cicatrices, ut sensu cognosci nō possint. Optimū autē in ipsis est siccū collyriū Alexandro regi inscriptū ex croco, spica celtica, & terra amellidē paratū. Habetur autē inter sicca multi usus collyria.

#### Albuginum tincture.

Iam autē dictū est quod adbfstinere oportet à pharmacis cicatrices tingentibus. Verū ut ne ignoretur ea quæ hoc facere possunt, etiā horum mentio faciendā est. Gallam inquit tritā repositam habet, & usus tempore nudeū specilli calefacto, & eo de pharmaco excipito, ac albugini admoueto. Postea uero atramentū futuriū aqua dilutū adhibito. Aliud. Malicorū tritum admoueto, & postea atramentū futuriū cum aqua trium. Aliud. Mali punci dulcis carnē tritam modica aqua adstillata, & leuissimum factū reponito. Et usus tempore, ubi hæc sæpe affricueris, & præadstrinxeris, hyofcyami succum illinito, ad dies x. v. hoc & tingit albugines, & dissipat, muliores illitū. Aliud. Facit & ad glaucos oculos. Misy cū aqua tritum in collyria redigito. Similiter autē aliud collyrium ex galla formato. Vfus autē tempore, ubi per collyrium ex galla præadstrinxeris, collyriū ex misy illinito. Aliud siccum. Gallæ drach. i. acaciæ drach. i. atramēti futuriū drach. ii. Vere. Aliud collyriū. Florum mali punice, atramentū futuriū, acaciæ, gūmī, singulorum drach. iiii. fistibi drach. iiii. gallarum drach. ii. Aqua excipe. Si uero flores punice non affuerint, id quod in ipsis malis inter grana mēbranæ speciem præfert inijce.

Ad glaucos oculos ut nigras habeat pupillas. Ca. x. l. i. Malicorū punci dulcis succum infunde. Deinde inter-

stitio facta hyofcyami cæruleum florem cum uino tritum infilla, aut hyofcyami succum. Oportet autem debito tempore flores colligere ac reponere. Aliud. Acaciæ fructū, & parum gallarum diligenter tere, & anemonis succo excipe, ut mellis crassitu do fiat. Deinde liquorem per lineum diligenter exprime, ac repone, & utere uelut dictum est. Aliud. Cucumeris syluestris succum illine. Hic mulieres glaucoculas oculis nigricatibus facit. Aliud. Hyofcyami cæruleum florem in umbra siccat ac reponito. Vfus autem tempore florem uino austero dilutum præillinito: Et postea ipsum florem leuiter tritum per illinito. Hoc uim suam statim decarat.

#### De puerorum curatione. Seueri.

Cap. x. l. i.

Ingens gramarum copia in oculis puerorū reperitur, & inflantur plerunque horum palpebræ à materie multitudine. Sunt enim pueri natura humidiores ac calidiores. Itaque horum collyria perfrigeraoria sunt, & aliquo modo resiccatoria, participantia etiā non modica astritione, quo foridū copiam influentem repellere possint. Ad tantam enim adstringendā facultatem progressa sunt puerilia collyria, ut etiam aspritudines tollant. Hebeatur enim in pueris collyriorū acrimonia à locali humiditate, & gramarū multitudine. Sed & per allabentium humorum copiam, propter ploratū mentē, collyria eluuntur. Est autē nobis experientia cognitū in ipsis primariū & mirabile collyriū, quod recipit lapidis scisti drach. xx. lapidis hematici drach. xx. eruginis drach. iiii. chalcididis crudæ drach. iiii. aeris usti drach. iiii. opij drach. vi. myrrhæ drach. vi. gummi drach. x. vi. Hæc est collyriū compositio ratione approbata, & experientia utilis cognita. Teritur ex aqua. Sed & aliud collyriū ad ipsos utile experientia cōstat, quod recipit. Lapidis scisti drach. x. iiii. Lapidis hematici drach. xx. iiii. aeris usti drach. vii. ammoniac thymiamatis drach. viii. misyos usti drach. viii. opij drach. iiii. seminis hyofcyami drach. iiii. gummi drach. viii. Excipe aqua. Oportet autem & in his à principio ammiscere lentā collyria, atque sic paulatim ad efficacem auxiliorū facultatem progredi. Mirifice etiā ad ipsos facit theophilium collyrium, & quod Mono inscriptum est, quæ inter multi usus collyria habentur.

#### De aspritudinibus, ac densitatibus, sycosisq; ac callis Seueri.

Cap. x. l. i. i.

Quandoquidem ratio auxiliorū cognationē respicit, & uelut inter se cōpendentes facultates reperit, admonet sanè eadem ut nihil aliud ab ipsis interponamus. Proinde asperitates quæ etiam ab aliquibus densitates uocantur, ex mala curatione sæpe sunt, dum medicī diutius collyria inflant. Quemadmodū enim in externis uulneribus pinguium adhibito, carnū quarūdā inutilium causa est: Sic etiam in præseni fieri cogitare oportet. Sint autem & ex fluxione diuturnā minime modici: Si enim acris esset, citius oculis damnum induceret, quàm palpebris affectionem infeminaret. Fit etiam aliquando non prægressis inflammationibus, neque manifesta causa præseni. Est huiusmodi non similes his quæ ex fluxionibus sunt. In illis enim densiores & asperiores ac cruentiores euerfæ palpebræ apparent: In his uero uelut milij grana, aut erui parua semina uidere est, intra palpebras exurgentia. Estq; hæc species

reliquis

reliquis curatu difficilior. Differunt tamen hæ inter se: Nam densitas in superficie est & cū rubore: Aspritudo uero maior em inæqualitatem ac eminentia habet, cum dolore simul ac grauitate. Ambæ autem oculos humectat. Quæ uero Sycofis dicitur, altioris eminentias habet & uelut incisās, & cui alij rei quæm sicut hiant similes est: Callositas uero aspritudo est diuturna, induratas & callosas inæqualitates habens. Quidam igitur aspritudines radere conantur, partim ferro, partim solij sici. Est autem hic conatus nocuus. Amplius enim ipsas augent, & duras cicatrices inducunt, & assiduam fluxionē auctores fiunt, dum semper oculi ex succedentibus durioribus cicatricibus punguntur. Curare uero oportet aspritudines, nullo ulcere circa oculis existente, collyrijs ad pueros relatis, ita ut euerfis palpebris, si non inflammatæ fuerint, illinantur, & per specilli nucleum diu affricentur. Qui enim cito ab affricione desistunt, densant magis, & oculis fluxionem inducunt. Si uero permanens causa, efficacioribus uti cōuenit. Quale est hoc. Teste sepiæ drach. viii. punice drach. viii. rubricæ sinopice, ammoniac thymiamatis, singulorū drach. x. gummi drach. viii. Excipe aqua. Ex huius usu magnā laudem reperes. Statim enim ab illitione cuticulæ quædam in spongiae admotione excidunt. Oportet autem post collyrij illitionem, aquā frigidam per spongiam adhibere. Est & aliud collyrium ad huiusmodi affectiones, quod recipit cadmiæ drach. iiii. squamæ æris drach. iiii. salis ammoniac drach. iiii. opij drach. ii. gūmi drach. xi. Excipe aqua. Ego uero seueriano siccō collyrio usus profectus, cuius & tu experientiā magistrā habebis. Apollonius autē dicit, ad exasperatas palpebras utendū est pharmacis, quibus etiā crassissimas cicatrices depurgamus. Quale est hoc. Aëris usti drach. viii. myrrhæ drach. i. squamæ æris drach. i. acaciæ drach. i. cadmiæ drach. ii. spicæ nardi drach. i. cinnamomi drach. i. croci drachmā i. piperis grana xvi. hyperici drachmas iiii. ammoniac thymiamatis drachmas tres, æruginis obolos duos, gummi drachmam unā, terito cum uino ueteri austero, & collyria formato, ac utitor. Aliud. Ad fluxiones antiquas & palpebras densas. Cadmiæ drach. xvi. æris usti drachmas iiii. seminis hyoscyami drachmā i. opij drachmas ii. myrrhæ, fructus cricæ, acaciæ, singulorū drach. iiii. gūmi drach. viii. Omnia sicca leuissime terito, & lac mullebre addidit, ac simul trita in collyria efformato. Et ea similiter lacte trita crasse illinito, adhibito prius fomento. Liquida compositio ad aspritudines: Facit & ad oculos suppurationes. Chalcitidis ustæ drachmas iiii. croci drach. viii. mellis drach. ix. Arida cū aqua terito, & ubi probe siccata fuerint, mel ammisce ac utitor. Theophrasti siquida. Ad omnes ficosas emineñtias, & omne carnis extuberantiā. Aëris usti drach. ii. misyos usti drach. i. myrrhæ, croci, omphacij, singulorū drach. i. uini chij aut alterius adstringentis ueteris, odorati, unctæ decim, mellis Attici dextantē. Sunt & alia collyria facientia ad aspritudines. Quale est phoenix, & diorysus, & similia, quæ inter multos usus collyria describuntur. Cæterū in quibus cum palpebrarum aspritudine, etiā tunicæ oculorum inflamatæ dolore uexantur, ammiscere oportet aliquid de exteriorijs, ad propria inflammationi medicamenta: Qualia

sunt collyria ex uino parata. Sedata uero oculorū inflammatione aspritudines exterere oportet. Verum in his qui ulcus habent cum fluxione mordaci, fieri non potest ut huiusmodi medicamentō utamur. Corniformis enim amplius corrodetur, & uisiformis prolapsus maior fiet, & uehemens dolor hominem apprehēdet. Augebitur autem & malignus fluxus. In his igitur collyrium huiusmodi parare oportet. Pumicem leuissimē tritum tragacantho aut gummi madefacto excipimus, & parua collaria formamus. Deinde euerfis leuiter palpebris diutius affricamus. Et postea lac infundimus, & collyrijs ad pustulas ac ulcera destinatis utimur. Cessante uero in temporis progressu fluxione, ad acriora collyria transimus, ac cum ipsis palpebras, uelut dictum est, confricamus. Miscemus etiam ad ea quæ ulceribus conueniunt, collyria ex uino, paulatim augentes ipsorum mixturam, quo neq; palpebræ uexentur tunicas oculorum, & ulcera pura facta impleantur ac cicatricem recipiant.

De oculorum debilitate. Demosthenis. Cap. xliiii. Debiles oculi dicuntur, qui neq; album, neq; splendidum, neq; igneum uidere sustinent, sed ex quauis occasione usum continent & lacrymantur, præsertim inter legendum. Differunt autē hi à fluentibus propter carunculæ naturalis circa magnum angulū decrementum: fluentes enim hoc modo, etiam citra aliquam externam causam lacrymantur, hi uero occasione aliqua oblata. Curadi uero sunt deambulationibus, curribus, exercitijs supernarum partium, cum fritione & spiritus detentione, capitisq; rasura, ac leui oculorum fritione post exercitia, & frigida in caput perfusione. Vendum est & aquæ potu, & uisus ratione media. Conducit & legere cum clamore, utiq; sic scribere. Si uero pharmacs opus fuerit, adstringentibus & perfrigerantibus ac meatus obstruentibus utemur.

#### De myopia.

Cap. xlv.

Myopes dicuntur qui ex natiuitate parua quidē prope uident, magna uero procul uidere non possunt: Et qui scripta admodis oculis legunt. Et alij quidem inæquales, alij æquales oculos habent. Incurabilis est autem talis affectio.

#### De nyctalope.

Cap. xlvj.

Nictalopas uocant qui die quidē uident, occidente uero sole obscurius. Deinde noctu penitus nihil cernunt. Hoc autē magis fieri uidetur propter aliquam capitis debilitatem, & maxime uisui spiritus crassitudinem, itemq; reliquorum oculi humorum ac tunicarum. Quibusdā uero contingit, ut noctu quidē melius uideat, interdū autem deterius. Et si non luna appareat, nihil cernunt. Sed hoc rarum est, illud autem prius plurimis contingit. Curadi porro sunt qui in nocte non uident: Si bono habitu præditi fuerint, uenæ cubiti sectione, itemq; ab angulis oculorum: qui uero uisiosis humoribus redundant, conuenienti pharmaco purgentur. Postea post uniuersalem euacuationem utendum est his quæ pituitam per os ducunt, & quæ per nares purgant, & sternutationes ciendæ. Narisulorium autem pharmacum ipsis commodum hoc fuit. Piperis, staphidis syluestris, singulorum scrup. ii. sinapis scrup. i. tundito ac cribrato, & radicum betæ succum addidit, ut mellis liquidi cōpages fiat, & cōtrita naribus infunde

589

infunde, ac attrahere iube. Atque hoc ad dies v. aut vii. facto. Vtere etiam alijs quæ in nares mittuntur, in Sermone de narij affectionibus præscriptis. Ante cibum uero bibant chylosum, origanum, rutam. Diæta autem attenuatoria sic extoro. Si uero per hæc non successerit, rursus purgatorium dandū est, quale est hoc. Scammonij obol. iiii. castorij obol. ii. salis obol. iiii. In debilibus autem scammonij obol. ii. iij. ce. Talis enim purgatio sæpe cuestigio ab affectione liberauit, aut multo meliorem dispositionem induxit. Post paucos autem dies dādum est purgatorium pituitam & bilem ducens, quale est hoc. Colocynthidis obol. ii. scammonij obol. iiii. salis obol. iiii. Excipe in catapotia sex, & medijs habitibus tria præbe, fortibus autem omnia. Oculi uero illinantur melle cocto, & ad continentium liquorē immisum claudantur. Aut oleo uetustissimo similiter illinantur. Aut aluminis scissi in testa exusti drac. ii. salis ammoniaci aut cappadocii drac. i. teri tot, & cum melle illinito, aut cū lacte muliebri. Aut hyænæ cum melle. Vitandus tamen est frequentior acriorum pharmacorum usus. Assidue uero utēdum est oleo uetustissimo. Putatur ipsis prodesse hepar hirci assatum, cum sale citra oleum, calidissimum comestum. Quidam etiam destillante ex hepate dum assatur sanie ipsos elatum uaporem detinentes, hoc fomento utuntur. Auxiliatur etiam elaterij ex interuallis cum melle illium. Et perdidis fel aut capræ syluestris, aut hirci. Buglosi etiam piscis sel illitum ualde prodest. At uero diæta tota attenuatoria sit. Et ab initio etiam a uino abstinentum est. Et uitanda omnia crassefaciētia. Cæterum in his qui noctu melius uident, interdū autem deterius, nos coniectamus spiritum multū attenuari, ac uisum obscurari. Noctū uero crassefieri colligigi, ac sensum mouere. Et oportet in his robur oculis addere. Herophilus tamē uice uersa in libro de oculis dicit, ad eos qui in die non uident, gummi, crocodili terrestres stercus, misy, hyænæ fel, tria cū melle illinito bis in die, & ieiunis hirci hepar edēdum præbe. Ego uero cōiecto hoc magis facere ad eos qui noctū nō uidēt.

De hebetudine oculorum. Galeni. Cap. xlviii. Hebetudo oculorum est obscuritas uidendi, ob plurimas causas contingens. Aut dum uisus spiritus in crassatur, aut dum tunica densatur ac crassatur. Aut dum humores in oculo crassi ac uiscosi sunt. Contingit etiam his hebetudo, qui diuturno morbo detenti fuerunt, & tristitia ingenti. Ac in senibus uo cum hoc quod crassi facti sunt humores, & tunica, & spiritus uisus, etiam debilitas adest spiritus uisui, & imminutio multa, ac collapsio, & uelut corrugatio nerui uisui ac tunicarum in oculo densatarum ac crassefactarum. Nam dū imminuuntur humores in oculo senibus ipsis, & minus de spiritu ex supernis ad pupillam deferretur, usq; adeo rugosa fit sæpe corniformis tunica, ut senes partim omnino non uideant, partim male & uix adhuc cerant. Corrugationes enim mutuo inter se incidunt, & tunica uelut conduplicatur, ac alia crassitudine aduentitia assumit. Porro auxilia in cōmuni ad hebetudinē, ex eadē materia componuntur, ex qua etiā in incipientibus suffusionibus, & partim in collyriorum formas effinguntur, partim liquida sunt, quæ

etiam induratis inflammationibus tunicarum conueniunt; partim sicca. Horum compositiones in fine huius Sermonis habentur.

De obfuscatione oculorum. Demosthenis & Galeni. Cap. xlviii.

Obfuscatio est perfectū ut plurimū uidendi impedimentum, clara manifestā circa oculū affectionē, pura uisū delicta apparente pupilla. Et quibuscūq; paulatim affectio conflat, alijs cōsertim incidit, ut minitū aut semel in totū nō uideant. Et obfuscationis quidē paulatim cōstatæ plures causæ sunt de hebetudine ita reatæ. Eius uero quæ cōsertim incidit causa est obfuscatione nerui uisui, crassas ac uiscosas humoribus cōsertim ipsis illapsis, aut eiusdē nerui resolutione. Præcedunt affectionē assidue cruditates, & meri potus, insolatio, capitis iniussio ac ardor, aut perfrigeratio. Aut assidue lectio post cibū, aut balnea similiter assidue post cibū. Et uomitus intempestiui, coitus immodicus ac insepissus, spiritus detento uolenta, quæadmodū in rubicindis contingit. Hæc enim & his similia, dū modicē sūt, uisus hebetudinē efficiūt dū uero immodicē, obfuscationē. Fit etiā aliquando obfuscatio ob fortes capitis plagas, aut casus ex alto, resoluro quādoq; neruo uisui, aut rupto, aut quod omnī uisui sumum est, humorū copia per uehementem cōulsionē illata, & uisuum neruū oburante. In resolutionibus igitur nerui, tarde mouetur oculus, aut omnino nō. Quum uero ex uolenta plaga in caput facta, aut ex casu, à cerebri connexu ruptus fuerit neruus, primū quidē oculus prominet sit, deinde cauatur, & alimētum nō sentit. Quum autem ob humorū crassorum aut uiscosorum copiam, neruus cōsertim obstruēdū sustinuerit, absq; alia causa, necesse est capitis grauitatē cōsequi, maximē in profundo iuxta radices oculorū. Eos igitur quibus oculi cōsertim obfuscantur, curare oportet, uena cubiti incisa, si plenitudine grauatū fuerit eger. Validissimū enim auxilium in ipsis est uenæ sectio. Deinde interpositis aliis quot diebus, fasciā collo circundabimus, ac cōstringemus, & postquam frontis uenæ eleuatæ fuerint, rursus exoluemus, & hoc iterū atq; iterū faciemus: quo per spiritus motū, humores obturati uolēter concuuantur. Postea eleuatas angulares uenas, ab utraq; nasi parte secare oportet, & fortem euacuationē facere. Ego enim ad tres heminas ex angularibus uenis aliquādo euacuauī. Post hæc cōsertim cucurbita occipitio affigēda est cū scarificatione. Cōtingit enim plerūq; statim incumbente adhuc cucurbita hominē respicere. Sed nō oportet hoc auxilio cōsentū esse, uerū reparatis uiribus, post teritiā diē purgare. Deinde ad digram deducere. At uero in his quibus paulatim per multū tēpus oculi obfuscantur, præmissa recta uictus ratione, à uenis angularibus euacuationē, uelut dictum est, faciemus. Et in his qui nō multo sanguine abundat, statim ab initio ab angulis asferatur. Deinde cucurbita occipitio affigatur. Et postea purgatio fiat. Per diætā uero maxime aluū facile solubile facto per cibos, bonæ cōcoctio nis præ omnibus ratione habita, per aliquot autem dies dāda est aloē deuorāda, terebinthina excepta in exercitijs infernarū partū, & deambulationibus pluribus in umbrosis locis. Vitandus est uini potus, & aquæ potio, uiriliter tolerāda. Vitādus est etiā omnis cibus crassefaciēs, & assiduus coitus, & capitis insolatio.



latio. Neq; uero balneū cōuenit, neq; somnus diu-  
rnis, neq; uehementior a cibo motus, neq; legere aut  
scribere. Vitandæ sunt iræ, indignationes, & curæ  
periculosæ, & uehementēs perturbationes, ac timores,  
præsertim post cibū, & assidui uomicus. Quotidie  
autē proluēda est facies aqua frigida, præsertim plu-  
uiali, & illinendū corpus per alios. Perseuerante ue-  
ro affectione, etiā per naribus caput purgetur, ita  
ut naribus infundamus quæ ad capitis dolore dicta  
sunt. Utendū est & pituita per os detrahentibus sibi-  
dem relatis. At uero illitio oculorū, diuturna ita exis-  
tente affectione, primū per simplicita fiat, uelut per  
mel nō fumosum, aut oleū uetus; postea etiā cōposi-  
tis utendū est: Nos autē laudem assequuti sumus in  
ipsis ex Diacenti colliryi usu, & liquida Aglaide  
cōpositione ad suffusiones destinata. Cōmune uero  
ad omnē obfuscationē ac hebetudinē hoc est. Vide-  
tur autē & ad mēbranarū crassitudines facere. Cro-  
ci drac. i. myrrhæ dra. i. piperis grana x. v. spicæ nar-  
di obol. ii. succi fœniculi drac. xvi. ammoniaci thy-  
miamatis drac. i. mellis quincuncē. Ad omnia leuissi-  
me trita fœniculi succū affunde, deinde tere ac res-  
sica, & amixto melle ænea pyxide excipe, ac utere.  
Ante illitionē uero, fomentū per spongiam in aqua ca-  
lida marina tinctam oculis adhibendū est. Aliquan-  
do etiā tota facies in marinā tepidam immittēda est.  
Atq; hæc quidē cōmunia in omni obfuscatione. Ce-  
terum his quibus ob coarctationē multorū aut cras-  
sorū humorum ad neruū delatorum, uisus impedi-  
tur, post uenæ sectionē, & cucurbitæ admodonē, &  
purgationem, caput sinapismo integendum est. Et  
postea etiam caustico pharmaco occiput exulceran-  
dum. Et capitis ex aqua calida perfusione utendum.  
Præstat autē saluginosam aut nitrosam esse aquam.

#### De resolutione oculorum.

Cap. XLIX.

Non solū neruus uisus, uelut prædictū est, sed etiam  
totus oculus aliquādo resoluitur, aliquando cū reli-  
qui corporis dextris aut sinistris partibus resolutis.  
Aliquando uero priuatim drca solā palpebram fit  
resolutio. Aliquādo uero etiā totus oculus resolu-  
tur. Et si quidē palpebra fuerit resoluta, oculus sem-  
per cōclusus est, & palpebra nō sentit. Si uero totus  
oculus resolutus fuerit, motus ad dextrā ac sinistrā,  
sursumq; ac deorsum perficere non potest. Et si quis  
acrius pharmacū sublinat, non perdit morsum. Si  
igitur palpebræ solius fuerit resolutio, præpur-  
gato per alioedaria uniuerso corpore, & post aquæ potus  
& frequentioris deambulationis, ac mulcæ inferna-  
rum partū frictionis usum, palpebra assidue lumi-  
ni scisso cū acri aceto illinatur, & colliryis calidioribus,  
aut eo quod ex sandice cōstat. Quod si hinc nō  
restituitur, sursum facere ipsū oportet. Totius autē  
oculi resolutiones ægrè curabiles sunt, maxime in  
ætate prouectis. Si uero ex natiuitate cōtigerit reso-  
lutio, impossibile est hanc corrigere. In quibus igitur  
salutis spes est, talis curatio faciēda est per omni-  
bus in bono habitu præditus fuerit, uenæ cubiti sece-  
tur: Deinde anus per clyster eluatur. Postea purga-  
torio corpus euacuetur. Deinde pituita per os ducē-  
tibz utendū. Deinde per ea quæ naribus induntur  
purgandū. Postea cucurbita occipito affigenda cū  
scarificatione. Et huiusmodi temporibus admodū edn-  
Propinandū etiam castoriū per se, & cum abstin-

shio. Dandū & pulegium, hyssopū, ruta, cum aceto

multo ac sale. Postea caput castorio illinatur, cū ro-  
faceo & aceto. Et ex eodē uingento, mollis lana im-  
buta, oculo clauso imponatur, cauendo ne in oculū  
insillat. Atq; hæc curatio bis in die fiat. Palpebræ ue-  
ro forinsecus & frōs, castorio cū croco ex aceto illi-  
nantur. Mihi uero uidentur liquidæ ex castorio ac  
melle ad affectionē commode, quæ cōpositiones &  
sublinandæ & superlinandæ sunt. A uino uero, &  
carnoso multūq; nutriente ac crassi succi cibo omni  
abstinendū est, & assumēdi quæ excretiones facile fo-  
lubiles faciūt, ac humores attenuāt. In primis tēpori-  
bus uitāda sunt etiā balnea, & uaporatoria, & insola-  
tiones. Vomitiū autē ex interuallis utendū iteinus in  
raphanis, deligato oculo, & citra multa lacinatōnē.

#### De glaucedine.

Cap. L.

Glaucedo duobus modis dicitur. Glaucedo enim pro-  
prie mutatio est cristallini humoris ad glaucū colo-  
rem, siccitasq; ac cōcreto. Altera autem glaucedinis  
species ex prægressā suffusione, fit humore iuxta pu-  
pillam uehementissimè cōgelato ac resiccato. Et hæc  
species incurabilis est. At propriè dictam glaucedi-  
nem incipientē aliquando sanare datur, ex deambu-  
latione pro uiribus, & totius corporis frictione, ac  
lauacris maxime capitis. Aestare uero etiam frigide  
lauacrum conuenit, & confusa capitis ad cutem. O-  
culi uero solo oleo antiquo sublinantur.

#### De suffusione. Ex Demosthene.

Cap. LI.

Suffusio est præterfusio humorū circa pupillam con-  
gelatorū, ut ubi perfecta fuerit, uisum impediāt. In-  
cipientē uero suffusione, talia ægris accidunt. Velut  
culices parui caliginosa quædam oculis sæpe obuer-  
sari uidentur. Et quidam ex ipsis piliformia uident,  
alii uelut sanarum filamenta, aut araneorū texturas.  
Quibusdā drca lucernas circuli apparent. Hæc autē  
ubi apparuerint, aliquādo pura pupilla apparet his  
qui negligentius considerant. Aliquādo uero colo-  
rem maris refert. Augescente deinde affectione, au-  
gescunt etiā accidentia: perfecta uero eadē, homo nō  
uidebit, pupillæq; colorem ad albedinem mutat, &  
omni nō transluet. Plures autē sunt coloris spe-  
cies. Quædam enim suffusiones ærem assimilant,  
aliquæ uitrum referunt, aliæ albicantes sunt, aliæ ad  
cæruleū colorem magis mutantur, aliæ glaucescunt,  
quæ etiam incurabiles sunt. Curandi autem sunt qui  
suffusione tenentur, in principio sanguinis de cubito  
detractione. Et si nihil impedit, etiā clysteribus acro-  
ribz, & purgationibus. Deinde quoque cucurbita  
occipito affigenda est cū scarificatione, & piscuitam  
per os detrahentibus, ac naribus forijs, ex interuallis  
utendū. A uino uero abstinendū est per totam cura-  
tionē, & ab omnibus replētibus caput. Itemq; a bal-  
neo, nisi quis lassitudinis ac tardæ cōcoctionis gratia  
ad lauandum se cogatur. Et tunc omnino nō in ære  
balnei moretur, neq; in solio morā trahat. Sed pau-  
lulū inscēdat, & cito exeat. Dieta uero omnis sit at-  
tenuatoria. Medicamentis autē utendū est, primū sim-  
plicibus, uelut melle, & oleo ueterij, ac fœniculi suc-  
co. Deinde etiā cōpositis liquidis ac siccis colliryis,  
quæ paulō post describentur inter cōmunia auxilia.

#### De mydrasi, hoc est, pupillæ dilatatione. Cap. LII.

Pupillæ dilatatio appellatur, quā pupilla colore qui-  
dem nihil abalienatur, multo uero latior quā pro  
naturali modo euadit, ut aliquando ad iridis circū-  
lum accedat, & quādoq; in totum uisum impediāt.

Aliquando

Aliquando tamen vident, uerum obscure, & quæ uidentur ab ipsis, omnia minora putantur, diffuso uidelicet spiritu uisuo. fit hæc affectio propter humorum allapsum, qui aut acuatim, aut paulatim feruntur, à quibus circa sensum uisiformis tunica distenditur, & pupilla amplius dilatur. Est autem affectio ualde ægre curabilis. Quæ enim membranosa fit tunica uisiformis, ubi semel distenta fuerit induratur, neque facile contrahi potest. Accidit autem affectio hæc magis puris, propter tunicarum debilitatem. Sunt & quæ ex natura nigros oculos habent, magnas etiam pupillas habent. Quapropter facile in hac affectionem delabuntur. Curanda est autem affectio, si nihil impediens, uenæ sectione in cubito, aut purgatione. Si uero hoc fieri non poterit, angulares uenæ soluantur. Deinde cucurbita occipitio affigatur. Venditum est & deambulationibus leuibus ac pluribus, in locis umbratis. Et omni modo conandum, ut materia ad infernas partes detrahatur. Quapropter in principio etiam clysteri utendum est, & infernarum partium frictione per alios. Post deambulationem & inunctionem, facies aqua marina proluatur, hyeme tepida, æstate frigida. Tota etiam facies in aqua mitatur oculis per tempus quoddam apertis. Quod si marina non adsit, parum salis aquæ miscetur, aut posca aquosa assumatur. A uino abstinendum est donec affectio fuerit soluta. Et tota diæta tenuior sit & uentri commoda. Balnei usus rarior sit, & tunc caput non ualde perfundatur. Pharmacis utendum est subadstringentibus, uelut rosa, croco, nardo, thuris cortice, pompholyge, spodio & acacia. Nā ualde acres pharmacorum facultates, humorum copiam attrahentes, distendunt membranas, & latior pupillæ efficiunt. Quapropter & quæ uehementer astringunt, uelut est chalcitis, misy, & quæ amplius frigefaciunt, uelut ciura, membranas indurant. Sed & amplius contra here ac coarctare pupillam incommodum est. Nam hæc res pupillam ad tabem perducit.

## De tabe pupillæ.

Cap. LIII.

Tabes pupillæ dicitur, quum angustior & hebetior facta fuerit. Hoc autem plerisque contingit ex periculosis debilitatibus, aut ingenti capitis dolore. His autem maiora apparent quam pro naturali modo, quæ ab ipsis uidentur, propter pupillæ angustiam. Curationem porro in his contrariam midryasi facere oportet, ita ut exerceamus supernas partes, humeros ac manus, cum spiritu detentione. Et caput ac faciem diligenter confricemus. Deinde oculos summis digitis. Facies etiam aqua calida proluatur. Et caput ungento quodam moderate calefacere potente illinatur, quale est iunium. Et modico facto intersitio, oculi rarefaciente, & acriore, ac humiditate attrahente pharmacum sublinatur. Quale est hoc collyrium. Ammo niaci thymiamatis drach. i. crocomagmatis drach. iiii. croci drach. ii. æruginis drach. iiii. Trita cum aqua efforma & utere. Facit & Erasistratus liquida compositio. Viæus fit optimi succi & forbillis. Vinū suluū & odorū. Somnus excipiat cibum. Sed & balnea conueniunt, & capitis ex aqua calida perfusio.

## De macie oculi.

Cap. LIIII.

Oculus macer esse, & alimentū non sentire dicitur, quū ex uehementi capitis dolore, aut in febribus acutis, paulatim humiliatur & cauatur, & in totum minor fit, & aliquanto obscurior, & usum impedit. Con-

tingit autem hoc sæpe ex caluæ incisione & perforatione, quando sanæ etiam ægre curatur. Differt autem macies à tabe, quod tabes pupilla solam minorem facit: macies autem totū oculum minorē & humiliorē efficit. Curandi porro sunt sic affecti, spongiarū ex calida aqua expressarum circa oculos fomento. Lac quoque tepidū ipsis infundendū, & ab omni collyrij adhibitione abstinendū. Cibi datur ipsis multū nutritiæ & optimi succi. Vinū sit suluū & tenue. Vtendū est balneis, & capitis ex calida aqua perfusione. Exerciitijs itæ partium supernarū & spiritus detentione.

## De expressione oculorum.

Cap. LV.

Exprimuntur oculi aliquando ut prominentes permanent. Et hoc contingit his qui strangulantur, & in athletis certaminibus, & foeminis quæ in paruis doloribus amplius distenduntur. Aut ex fluxionibus plurimis, quæ acuatim à capite defluerunt. Qui igitur ex strangulatione in hoc inciderunt, his uena cubiti secetur. Si uero aliās crassiores humores influentes oculos impetierint, purgentur uerato nigro, aut scammonia. At expressiones oculorū in foeminis ex paruis doloribus sæpe contingentes, purgationes per locos muliebres soluit. Quare has procurare oportet. In uiris autem post uenæ sectionem, aut purgationem, si permanferit affectio, cucurbita occipitio affigatur, & aquæ portus exhibeatur, & cibi contrahantur. Oculo uero imponatur lana melle imbuta cum modico croco, & hapsus lanæ superimponatur, & placida compressione deligatur. Conducit his etiam post principium, aqua marina frigida faciei affusa, & intybi succus ac polygoni, & pssyllij cū opio illitus. Et quæcūque alia cōprimere ac cōtrahere possunt.

## De confusione.

Cap. LVII.

Confusio oculi plerumque ad uehementes plagas consequitur. Sed & ex uisiformis tunicæ inflammatione contingit, ruptis in ipsa uasis. Pupilla uero colore turbida fit, & aut maior, aut minor seipsa euadit. Curandæ igitur sunt confusiones ex plaga, per uenæ in cubito sectionem. Et totus oculus sanguine recens maciati turturis, aut in illius penuria, columbæ conpleatur. Et mollis lana in ouo cū uino & rosaceo conuassato madefacta imponatur ac deligatur. Et postera die idem fiat. Tertia uero sumentū adhibeatur, & lac instilletur. Postea ouorū aslatorum uiscelli imponantur, cum melle & croco trito, linteolo illiti. Quum autem pupilla iam purgata fuerit, collyria ad antiquas affectiones destinata sublinatur, quale est aromatiæ, & chiaci Apollonijs, & similia. Facilius autem curatur esse confusio in his quibus pupilla sola ampliatur, colore uero & figura simili permanet. Difficiliter autem curatur in his quibus pupilla distulsa est.

## De his quæ in albo oculi nascuntur.

Cap. LVIII.

Omnia quæ præter naturam in albo oculi nascuntur, quæ quidem doloris exortia sunt, in quibus pili sæpe exoriuntur, & quæ non ualde à naturali colore euariant, curabis hamo apprehendens ac extēdens, & postea scalpro pterygij destinato resecas. Deinde salem tenue inaspergens, & lanæ hapsum imponens ac deligans, & reliquam curam adhibens uelut in pterygiorum resectione. Quæ uero subrubra, & tumida, ac uariata sunt, dolorificæ, & asperæ, & tempora per consensum afficiunt, ea omnia fugere oportet uelut maligna, & pericula, ac oculorum pro lapsus inducentia in chirurgia.

## De pterygijs.

## Cap. LVIII.

Pterygium, unguis latinis quibusdā uocatus, dicitur quædam album in oculo amplius augescit, aut carne superexerescit, ex scabra quadā lippitudine, aut assiduus fluxionibus. Incipit autem huius augmentum, sæpe quidem ab angulo magno appellato iuxta nasum; Rarius autem a paruo: Et adhuc rarius generatur a superna aut inferna palpebra. Exiēditurq; usq; ad nigrum. Quum uero maius factum fuerit, etiam pupillam cōtingit, & usum impedit. Facilia uero curatu sunt pterygia albicantia, & angustū fundum habentia. His uero contraria, ægre curantur. Nam subrubra post curationem chirurgicā, cariem ac dolores dimidiæ capitis partis inducunt, attamen post symptomatū sublationē oculus liberatur. At pterygia in quibus etiā principia sunt fluxionis, curare nō oportet. His enim sublati, citius suffusio conflatur. Sed neq; crassa pterygia curanda sunt, & uersa, & eminentia, ac indurata, & quæ tēpora per cōsensum afficiūt. Sunt enim maligna & cancerata. Quæ uero usq; ad pupillā peringūt, & propterea usum impediunt, si tollantur, liberat quidē oculum a fluxione, cicatrix autem quæ ex chirurgia iuxta pupillam succedit, nihilominus usum impedit. Cæterum ex pterygijs ea manu curare oportet, quæ aucta ad nigrum se extendunt: Quæ uero parua & in albo sunt, ea cōadū est ut pharmacia cōprimamus.

## Pharmacia ad pterygia.

## Cap. LIX.

Pterygia probe deprimit siccum ad scabiē destinātū, ex chalcitide & cadmiā compositū, quod ad scabros angulos descriptum est. Et theodotium collyrium Seueri tritum ac siccum adhibētum, & omnia exterioria collyria, ad aspritudines & scyfoles descripta, & quæ ad myocephala & staphylomata conueniunt, maxime ex uino parata. Archigenes autē ad pterygia, inquit, atramentū sutorij drach. ii. salis ammoniaci drach. ii. gummi drac. i. terito ex aceto, & collyria formato ac uitior. Aliud, celebre quod celerime ipsa consumit. Chalcitidis usq; ut sulua euadat, drach. iiii. croci drach. i. tritis utere siccis. Aliud, experientia cognitum. Chalcitidis usq; drach. x. x. cadmiæ drach. x. squamæ aris rubri drac. i. piperis drac. i. utere. Aliud, ex fundo tollēs pterygia. Atramenti sutorij torrefacti drac. ii. aris usq; drac. i. siccum adhibe. Et post detractionem, collyrio ex rosas cura, aut ex croco collyrio. Aliud. Magnetē lapidem uiuum diligenter terito, & semel in die utitor. Aliud. Populi nigræ succū cum duplici melle illine. Aliud. Atramentum sutorium cum felle suillo, æquali ponderē trita illine. Aliud. Sepiæ restas usas, cū sale ammoniaco, æquis portionibus tere ac utere. Aliud, facit & ad fugillationes & hebetudines. lapidis magnetis uiui drach. iiii. æruginis drach. i. minij Sinopici drach. iiii. ammoniaci thymiamatis drach. iiii. croci drac. ii. Mellis quincuncem. Hoc etiam ad albugines facit. Aliud. Gladium tūdito, cribrato, & modica aqua terito, & suffident pompholygis cinere addito, collyria formato. Et utere cum aqua bis per diem. Aliud. Aes usum cum pueri incorrupti urina terito ac uitior. Aliud. Squamæ aris rubri, niri rubri, punicis, cismollis, singulorū dra. iiii. Terito ex aceto donec sicceat, & utere. Reponito autē in testaceo uase puro.

## Chirurgia pterygiorum.

## Cap. LX.

Ad pterygij uero sublationē ita chirurgiam aggredi-

mur. Palpebras inter se disparamus, & hamulo circa medium pterygij transfixo, leuiter distendimus, ut ne cuticula coniformis tunica eleuetur. Simul enim sublata maximas inflammationes inducit. Deinde acum accipimus, quæ filū & pilum equinum transmissum habet, & hanc distēto per hamulū pterygio subiicimus. deinde deligatū per subiectū filū pterygium distendimus, filum leuiter sursum trahētes, & filij principij ministro industriē tenendū prebentes. Nos autē utraq; manu pilū tenentes, sursum ac deorsum ipsum cōmouemus, & pterygiū subexcoriamus, initio a nigro facto usq; ad angulū. Deinde cōiuniatē ipsius ad nigrū exoluta per pilum, & distenta per filum, scalpro ad pterygia destinato funditus auferimus pterygij partē iuxta angulum, palpebras & angulū cauētes. Quibus enim palpebræ simul inciduntur, his cōcretionēs sunt. Quibus autem funditus angulus resecatur, his naturalis eius loci carnis decrementum succedit. Si uero fundum pterygij fuerit relictum, regeneratur, si non pharmaco aliquo ex prædictis fuerit consumptum. Congruentis igitur modi cōiecturam facere oportet. Quod si ægri formidolosi oculos aperire non fuerint ausi, hamulo supernæ palpebræ submisso, leniter ipsam extra distendimus, atque sic uelut dictum est operamur. Post detractionem uero, muriam acriorem oculo infundimus, deinde lanam ouo imbutam imponimus, & oculum deligamus. Sequenti deinde die soluius, & moderato fomento adhibito, album ac tenerum Seueri collyrium infundimus. Quarta uero collyrijs ad affectiones commotis utimur, de cætero uitantes tenera & incarnantia collyria. Sunt autem ad affectiones commoda, nardina & theodoria, & omnia ex uino siccitia collyria.

## De carnis in angulo magno incremento. Cap. LXI.

Encanthidem uocant, quum magnus oculi angulus ad nasum auctus carne superexeruit, id quod maxime in canibus contingit. Verum in hominibus redundat, qui in mari uersantur. Proinde si benignum fuerit hoc carnis incrementum, dolore uacat, & tenerum est ac laxum: Si uero malignum, durum erit & inæquale, & dolores punctorios inducet. Oportet autem benignum curare ac paruū pharmaciis siccis, tum eo quod ex cadmiā & chalcitide ad scabros angulos paratur, cum hoc ipso quod opimum est. Aluminis scissi, misyos torrefacti, atramenti sutorij, partes æquales. Hoc egregie consumit omne carnis angularum incrementū. Vtere etiam theodotio Seueri collyrio, sicco trito adhibito, & eo quod ad myocephala ex uino paratur.

## Chirurgia incrementi carnis in angulo. Cap. LXII.

At uero maius & malignū carnis in angulo incrementū, uolSELLA apprehensum resecare oportet. Si uero maior fuerit emīnētia, acū duplex filum habentem transmutare ad fundum oportet, deinde filum cōstringere, & paruo interstitio facto, donec caro liuescat, scalpro auferre, & siccum scabiei destinato adhibere: & hapsū lanæ aut cōduplicatum lineum superimponere. Postera uero die fomentum adhibere. Et post tertiam mellis usu curam absoluerē. Cauendum est autem ne unā cum carne præter naturam aucta, etiam ipsum angulū funditus tollamus, alioqui rheas, hoc est naturalis carnis in angulo decrementum succedet.

De sanguinis ex angulis eruptione. Cap. LXII.  
Fit & sanguinis ab angulis eruptio, maxime pueris, ob asiduos eulatus ac distentiones apertis circa palpebras uasis. Curandi autem sunt postea frigidae aut aquae frigidae perfusio, tum super angulos, tum super caput facta. Infundendū etiam oui candidum per se, & cū aliquo collirio ad tenues fluxiones conueniente. Utendum & infernarum parium deligatura & cibo crassefaciente. In perfectis autem aetibus cucurbita occipiti assigenda est cū scarificatione.

De concretione palpebrarum ac contritione. Cap. LXIII.

Concreunt & agglutinantur palpebrae ad album aut nigrum in oculo, aut inter se, ulceratione praegressa. Quum igitur ad album concretio palpebrarum facta fuerit, & oculi motus impeditur, affectione hanc Ancylosim uocat, hoc est contractionem. Quaecumque igitur concretiones iuxta angulū factae sunt utriusque palpebrae, eas hamulis distentas dissecare oportet, & linamento indito disparare. Et postea uelut communia ulcera curare. Quaecumque uero concretiones factae fuerint extremitatis palpebrarū ad oculi tunicae, eas caeco hamulo distendere oportet, & scalpro pterygii destinato concretione exsoluere, deinde carnis incrementum siccō aliquo deprimere, & aere leuissimē trito palpebras sublinere, & oculum usque ad perfectam curationem indeligaui finire.

De pediculis palpebrarum. Cap. LXV.

Pediculi generantur in palpebris lati, parui, multi, ex ingluuie, & illuue ac mala dietā ortum habentes. Curatio igitur adhibenda est primum, ut pediculi diligenter expurgentur. Deinde aqua marina tepida affundatur. Et postea subscriptū pharmacum loco adhibeatur. Aluminis scissi drachm. ii. staphidis syluestris obol. i. piperis obol. ii. aeris uisti drachm. i. myrrhae obol. duos, lapidis scissi obolos tres, misyos torrefacti drachm. i. terito ac utere siccō. Adhibenda praeterea sunt balnea, & caput discutientibus ac corroborantibus confricandum. Et exercendae infernae partes, & usctu boni fucci utendum. Similis autē curatio lēdibus quoque palpebrarū adhibeatur.

De pilis pungentibus palpebrarum, et de duplici pilorum ordine, itemque multiplici quam phalangosim dicunt. Cap. LXVI.

Pilorum pungentium in palpebris exortum, Trichiasim Graeci uocant, quam sanē sub pilis naturalibus in palpebris alij exorti, & intrō nuētes, tunicas pungrū, & oculorum fluxiones contrōdiciunt. Dicitur etiam trichiasis, quum ipsae palpebrae laxatae sunt, aut ipsarum extremitas intrō nutat, ut pili non facile appareant, nisi quis distendar ac disparare palpebras. Vocant autem medici palpebrae laxationem phalangosim, aut casum. Pilorum uero subconcretionem, duplicem pilorum ordinem, hoc est distichiasim. Fiunt autem hae affectiones, & praesertim duplex ordo, ex multa humiditate. Quomodo enim in terra largitas aquarū plurimas herbas proferre; sic etiam in palpebris, maxime ubi influentes humores minime mordaces fuerint. Si enim id quod influit salisum fuerit, etiam naturales pilos reijcet. Perfecta igitur pilorum pungentium curatio, est consultio palpebrarum sursum uersus. Quādoquidem uero aliqui ob mollitiem nō audent seipos chirurgiae submittere, auxilium ferendum est ipsis quantum eius

fieri potest. Veteres itaque huiusmodi auxilia ad ipsos conscripserunt.

Pharmaca ut euulsi pili nō renascantur. Cap. LXVII.

Pungentes pilos euellito, & euerfa palpebra, sanguinem ranarum recentem illinito, & frigerifici linito. Aut cimicum sanguine similiter utitor. Aut chamaeleonem album urito, & cinerem sanguine ranarum excipito. Et usus tēpore saluā diluito, & praeeuulsis pilis loco illinito. Aliud. Succum Chelidonij herbae quae etiam capnium dicitur, sufficiente gummi excipito, siccatō, ac parua colliria formato, & utitor uelut praedictum est. Aliud. Cochlearum carnes cum uiridum ranarum in harundinibus degentium sanguine, aut herinacei terrestris cruore terito, & atramento scriptorio moderato adiecto sic cari linito. Et utere uelut dictum est, uitata pupilla. Aliud. Hirudines urito ac terito, & utitor asidue pilis praeeuulsis. Aliud. Intestina terrae in testa ad cinerē exusta, ac leuissimē trita, praeeuulsis pilis inspergito. Aliud. Lacertum in olla exurito, & ad cinerem tritum par pondus sandarachae adiecto, ac utitor. Aliud bonum minime molestum. Siliquas siccās non antiquas diffringito, & humorem qui in ipsarum cavitatibus uiscosior, modicus, ac melleus reperitur, specilli nucleō excipietum, praeeuulsis pilis loco illinito. Atque hoc asidue factio. Summe autem facit, inquit Archigenes, herinacei terrestris fel, & sanguis pari mensura, cum modico castorio. Castorium itaque leuissimē tritum sanguine ac felle excipito, & uelut piscium squamas formato. Vtere autem ita ut pilos radictus euellas, deinde squamam unam salua ex ore ieiuni diuina euerfa palpebrae illinas, & ad dimidium horae in loco detineas donec siccetur. Dolore quidem assiduatur aegri, sed pili non amplius enascuntur. Aliud. Psyllium & citrūta semen, ac cedriam, pari portione uespertilionis sanguine excipe, ac utere uelut dictū est, ne oculum contingas. Aliud. Linteam ex nauicetus accipe, & in lucernam pro funiculo lucernario inde, & lucerna ex oleo cyprino impleta, fuliginem in aëro uase collige, ac utere pilos euellēs, & locum asidue illines. Et si renati fuerint, idem repetito. Aliud. Potamogionis succum & artemisiae succum, aequis partibus adhibeto. Aliud. Fel utiuli, & castorium, & gummi, aequis portionibus citra aquam contrito, efformato ac utitor, praeeuulsis pilis illinens ter in die, & compertes successum. Aliud. Porci masculi fel, & adipem eiusdem, in fidele uas nouum den sissimum ac leuissimum mitito, & aceti acerrimi heminae quartam partem, & olei aleni tantundem affundito, & denso linceo obligatum ad dies septem linito, & postea diffusū in mortariū terito, & uelut ungentum excipito. Idem etiam in toto corpore probe facit. A uero alenum oleum, amygdalinum oleum esse dicitur.

Agglutinatoria pilorum. Cap. LXVIII.

Pilos in palpebris praeter naturam introrsum refractos, glutinat mastiche per specillum calidum admodum, & sic pilis ad proprium ordinem refractis. Bitumen eodem modo. Glutinum similiter. Cochleae glutinositas ac excepta. Hieracii succus. Medicamentum agglutinatoriorū appellatorū liquor. Ammoniaci thymia. Compositum autem hoc. Resinae siccæ, picis siccæ, sulphuris uiui, bituminis singulorū

drac. i. ceræ drachmæ dimidium. Liquta reponito: Et usus tempore specillum igne feruefacto, & phar-  
macum contingito, ac eo pilos reglutinato.

De futura palpebrarum sursum uersus. Cap. LXXIX.

Ad futuram palpebrarum sursum uersus faciendam, æger desideat ad sinistram chirurgi partem, humi-  
lior ipso, ad splendidam lucem. Sunt autem ministri  
duo probè periti adstātes, alter retrorsum, alter à la-  
tere. Et chirurgus primū per collyrium, aut superfi-  
ciarias scarificationes, notet sufficientem quantum in  
palpebra redundat, & corrugata cutis resectionem,  
ut neq; plus neq; minus quàm oportet rescindatur.  
Si enim satis resecta fuerit, æger lagophthalmus  
euadit. Si uero angustius, rursus palpebra laxatur,  
& pili similiter pungūt. Notetur etiam circa mediū  
palpebræ iuxta extremitatē locus superficiaria cefu-  
ra. Post factā uero notationē, euersa palpebra, sub-  
sectionem intrinsecus facimus ultra pilos præter na-  
turam exortos, quo ipsi ad naturales foras tendant.  
Aliquando uero in ipsos pilos præter naturales, si  
penitus insitit fuerint, subsecutionē facimus, ut succe-  
dens cicatrix ipsos rursus nasci prohibeat. Nihil  
autem uetat etiā duas subsecutiones facere, unā ultra  
pilos præter naturam exortos, quo extremitatis pal-  
pebræ fiat resiccatio. Alterā super ipsos præternatu-  
rales pilos. Sit autem profundior subsecutio: Adiu-  
uat enim refractionē & palpebræ leuitatem: & ab  
altero extremitatis siue marginis palpebrę termino  
usq; ad alterū procedat. Deinde linteo la parua dupli-  
cata, figura triangulari imponentur, unū iuxta ma-  
gnum angulum, alterum prope paruum. Super hæc  
autē lintea minister qui retro adstat apices magnorū  
digitorum firmet, & uno impetu palpebram disten-  
dat, imprimēs digitum sub supercilio, quo æqualis  
palpebræ tensio fiat. Signū autē sit tibi optimæ ten-  
sionis palpebrę, quū media nota proprium seruare  
locū, hoc est circa medium fuerit reperta. Post disten-  
tionem uero, primū facienda est obliqua & ad ueru  
similitudinem sectio superficiaria infernē, ut ne ex  
superia influēs sanguis chirurgiam impediat. Sitq;  
hæc sectio propinqua palpebræ extremitati. Deinde  
superne luniformis sectio fiat. Initiū autē & ipsa  
sumat ex infernis à magni anguli loco, & delata ad  
notam, rursus deorsum uergat ad paruū angulum.  
Sitq; etiā ipsa superficialior, ut ne musculi laedantur.  
Deinde minister qui à latere fiat, palpebram disten-  
dat. Postea hamulus in circumscriptæ fasciolæ prin-  
cipium transfigatur, in sinistro oculo, ad paruū an-  
gulum, in dextro ad magnum. Distento autē hamu-  
lo per sinistram manum, fasciola scalpro ad hanc rem  
destinato subexcorietur, animaduersione habita ne  
si profundior excoctio fiat, musculi uulnerentur,  
& incurabilem habeat palpebræ laxitatem. Post cus-  
tis autem excisionem, ad futuram sursum uersus ue-  
niendum est. Et prima futura media fiat. Deinde ue-  
trinq; alia duæ, ut in tortū quinq; fiant futuræ. Post  
futuram, distenta palpebra propter uulnere, modera-  
tum spleniū glutinosum suturis sub supercilio im-  
pone. Super ipsas uero sectiones spleniola parua  
glutinatoria & inflammationem arcentem utim ha-  
bentia imponentur. Postea lana ouo imbuta totū ocu-  
lo imponentur, ac deligetur. Quandoquidem uero  
augefcens & acris ac falsa fluxio illota, pilos natura-  
les rejicit, & palpebræ marginem duram efficit: pi-

lis autem præter naturam subenatis etiam augmen-  
tum præbet: difficultq; sit in his palpebræ euerfio;  
conuenit acum robustum filum habentem, per me-  
diam marginem palpebræ trāsmittere, & filum sur-  
sum trahere, atq; sic per specillum palpebrā pro ut  
moris euertere, & sectionē, uelut dictum est, facere.

De futura palpebrarum deorsum uersus. Cap. LXXX.  
Quod si inferna palpebra pilos pungentes produxe-  
rit, futura deorsum uersus probatur. Et prius quoq;  
in his sufficiens laxata superfiliæ cutis resectione no-  
tetur. Nam & hic latiore fasciola excisa, euerfio con-  
tingit angustior uero, inutilis est chirurgia. Post fa-  
ctam notationem, lintea complicata uelut dictū est  
angulis imponentur, & palpebra distendatur. Post-  
ea minister digito malæ impresso, ipsam detrahat.  
Fiat autem prima sectio luniformis inferior. Deinde  
ad ueru similitudinem & obliqua appellata, sub-  
ca palpebræ marginem. Facienda est autem excoctio  
tio, & futura, uelut antea dictum, & reliqua eodem  
modo. Cæterum sola deorsum uersus futura cona-  
tenti sumus in inferna palpebra, uicaria subsecutione,  
ut ne palpebræ euerfio contingat.

De euerfione palpebræ. Demosthenis. Cap. LXXXI.  
Palpebræ amplius eueri solēt, ulceratione prægressa,  
& carne ipsarum superaucta. Aliquando etiam à du-  
rior cicatrice palpebra contrahitur ac eueritur. Cō-  
tingit autē hoc magis circa infernas palpebras. Cura-  
nda uero sunt moderata carnis incrementa, arido  
subiecto. Aeris usui drachm. i. atramenti sutorij, mi-  
syos tostī, chalcididis tostæ, singulorum drachm. i.  
Aliud. Aeris usui drachm. viii. misyos torrefacti  
drachm. ii. chalcididis tostæ drachm. i. atramenti su-  
torij drachm. i. Aliud. Ad inueteratas iam euerfio-  
nes. Aeruginem in testa torrefactam terito, & per se  
adhibeto. Aut plumbi usui parem portionem am-  
misco.

Chirurgia euerfionis palpebrarum. An-  
tyli.

Cap. LXXXII.

Maiores uero carnis incrementa scalpro auferre oportet,  
deinde ære usto trito contingere, aut aloē cum  
manna thuris. Et sequenti die fomento adhibito simi-  
liter curare. Tertia uero die post fomentum melle  
utendum est usque ad perfectam curationem. Si ue-  
ro maior fuerit euerfio, sic chirurgia facienda est. Ex  
inferna palpebra parte duæ sectiones fiant, literæ  
Græcæ Λ, figuram habentes, ita ut angusta literæ Λ,  
pars infernē sit ad malam, lata uero superne ad pal-  
pebræ marginem. Deinde fasciola illa literæ Λ, fi-  
guram referens excindatur, resecta simul etiam sub-  
iecta carne. Non est enim chartilaginosa inferna pal-  
pebra. Cutis tamen indiuisa seruanda est. Deinde  
labia excisionis futura contrahenda. Sufficiet enim  
una futura iuxta partes marginis palpebrarum fa-  
cta. Sic enim incuruata & eleuata palpebra, ad in-  
ternas partes reuertetur. Si uero cicatrix ex aliqua  
causa extra palpebram facta, palpebram euertere,  
tollenda quidem est, uelut dictum est, ex internis  
paribus palpebræ fasciola illa literæ Λ, figuram re-  
ferens, non profunda sectione facta, & labia sectio-  
nis uelut dictum est, per futuram contrahenda. Post-  
ea cicatrice forinsecus per hamum distenta, acum  
duplex filum habentem, sub totius cicatricis car-  
nosam molem transmittimus, à paruō angulo in-  
itum facientes, & ad magnum ipsam acum ducetes.

Deinde

Deinde acu sic posita, filum utriusq; ipsius partibus subijcimus, & per ipsum totam carnosam cicatricis molem distēdimus. Et sic ipsius exsectionē facimus, tollentes simul cum carnosa mole, etiā infixam acū. Post chirurgiam autē, externam sectionē linamentis disparamus, & condupplicato lineo ex frigida aqua imposito, deligatione utimur usq; ad tertiam, frigidā irrorantes, & lineum cōplicatū incumbere sinētes. Tertia vero die solutius, & spōgias ex aqua tepida adhibemus. Fomentum enim in his non conducit. Cauere enim oportet, ne forte glutinatio intrinsecus non succedat. Postquam uero exciderit sustenturæ, corporibus glutinatis, de cætero impaidē fomentum adhibeatur, ad hoc ut etiā cicatrix tenuior fiat, & oculus mitigetur. Deinde repressua collyria palpebræ intrinsecus sublinantur. Externa uero sectio disparata seruetur, per omnem curationē mollioribus pharmacis adhibitis. Contingit enim ex intrinseco cutis incrementum, auxilium quoddam, ut palpebra intrō uertatur. Si uero propter carnis in angulo magno incrementum, facta fuerit palpebræ euerio, exciso eo incremento, palpebra ad naturalem habitum reuertetur. Cæterum illud nosse conuenit, quod supernæ palpebræ euerio curabilis est. Sed illa quæ ob infernæ palpebræ resolutionem contingit, sanari nō potest. Similiter & ea quæ propter resectionē lateris fasciæ in futuris deorsum uersus contingit. Et quæ ob latam cicatricem fit, ulceratione uidelicet progressa, quemadmodum in caribunculis contingit.

*De lagophthalmis. Demosthenis. Cap. lxxiiii.*  
Lagophthalmi appellantur, in quibus superna palpebra reuulsa est, & apertus est oculus inter dormiendū, uelut in leporibus fieri solet. Condingit autē affectio aliquando ex futura sursum uersus, palpebra plus iusto reuulsa, ut oculū contegere nō possit, aliquando ulceratione spontanea prægressa, uelut in caribunculis. Curādī uero sunt hi luniforini sectione in totā cicatricē facta, ut superior sectionis circumferentia sursum tendat, apices autē deorsum ad margines palpebrarū spectent. Postea ramētis linteolorum sectio disparatur, & palpebra deorsum detrahatur, & æqualis naturalī figuræ fiat. At uero in cōuulsis palpebris qua parte contrahitur, istic sectio fiat, & palpebra similiter laxetur. Verū in curatione fugere oportet resiccatā medicamentā, & aquā mulsam. Adhibendū est autē emplastrum tetrapharmacū, & succo foeni greci perfundatur. Et in summa totius curationis ductus laxatorius ac impinguas in his assumatur.

*De lippitudine dura. Demosthenis. Cap. lxxv.*  
Lippitudo dura est, quum palpebræ duriores fuerint, & ipse oculus durior, & ad motū pigrior fuerit, do lensq; ac rubicundus, & præsertim quum post furectionem ex somno, palpebræ difficulter aperiri possunt, & nulla humiditas euacuatur, gramæ uero in angulis consistunt parue, contortæ, subaridæ. Et quum ipsas palpebras euertere uolumus, non facile a nobis uerti possunt, ob duriciam.

*De lippitudine sicca. Cap. lxxv.*  
Lippitudo sicca est, quū subaridus factus fuerit oculus, & pruriginosus, & leniter dolens, citra duritiā palpebrarum.

*De lippitudine scabra. Cap. lxxvi.*  
Lippitudo scabra est, quum anguli ulcerosi sunt, ac ru-

bicundi, & ualde pruriginosi, & palpebræ rubicundæ, & lacrymæ falsæ ac nitrosæ destillant.

*Curatio lippitudinis dura, sicca, scabra. Cap. lxxvii.*  
Prædictarū affectionū diligens cura habenda est. Neglectæ enim suffusionum, glaucedinis, & lippitudinis diuturnæ, ulcerationib; ac staphylomariū causa sunt. Curanda itaq; est lippitudo sicca, cum reliqua corporis cura, etiā per ea quæ humiditatem ad oculos prouocāt, qualia sunt sicca pharmaca postea descriptib; stratiotica appellata, & collyriū diacentiæ, ac similia. Dura uero lippitudo similiter curanda est, per pharmaca humiditatē excernere potētia, sub lita Erasistrati liquida cōpositiōne ac similibus. Ad hæc etiā molliendibus achumestantibus utendū est, uelut calidæ leniter temperatæ prolutione. Et somnium per spōgias asiduc adhibendum. Vitanda uero sunt pharmaca frigiditatis, meatus obstructiua, & agglutinatoria, & aquæ frigidæ affusio. Ex his enim oculus magis induratur. Si uero simul fuerit scabra ac dura lippitudo, (ex humorū enim acrimonia palpebræ indurari solent, ut angulī quidem erodantur & ulcerosi sint, oculus autē & palpebræ ægre moueantur & indurentur) in talibus præmissio spongia somnō, primum per siccam ad scabritiem paratum medicamentū, angulī contingantur. Et moderate tempore interposito, rursus spōgia fomentū adhibeatur, & pharmacum humiditatem detrahere potens sublinatur. Quale est Erasistrati liquidū, & collyrium stratioticum, & diacentetum. Est autem cōpositio sicuti ad scabros angulos medicamentū hæc. Chalcitidis crudæ drac. v. cadmiæ drach. v. Hæc tria in ollam induntur, quæ addito operculo, gypso oblinitur, & in uas acetum diluam habens imponitur, ut olla forinsecus quidem maderiat, non disseuat autem in ipsam humor, & sinitur ad dies vii. Deinde siccatur in sole, ac teritur. Aliud. Philoxeni siccam, Achariston appellatum, (eod quod diagma ipsi gratia resectioni non possit) ad corrosos angulos, & scabras afferri ones, & lippitudines siccas. Cadmiæ drach. ii. chalcitidis crudæ drach. i. talos obol. ii. æruginis obol. ii. piperis grana x. florū rosarum drach. ii. Trius utere. Aliud. Ad scabrā lippitudinē. Cadmiæ drach. i. æris usti drach. i. spicæ nardi drach. i. piperis torrefacti obol. ii. Terito cum aceto in sole, & siccato utere uelut probato. Aliud Menedis, ad corrosos angulos, facit ad delacyrmatōne. Spodij drach. ii. omphacij sicuti drach. ii. spicæ nardi obol. ii. piperis torrefacti grana xv. trius utere. Aliud. Cadmiæ sextantem, salis ammoniaci sextantem, solij malabadi sextantem, piperis unc. i. utere. Aliud. Facit & ad carnis in angulo decrementum. Costi quadrantem, æris sextantem, fuliginis cedræ unc. i. misce ac utere. Aliud. Ad scabras lippitudines, syncoses, putredines, & carnem superexcrecentē. Cadmiæ drach. ii. chalcitidis drach. viii. piperis grana quinquaginta, spicæ nardi drach. i. Cadmiæ & chalcitidem terito cum uino, & ubi siccata fuerint, nardum & piper leuissimē trita adijcitur, & in puluillū redactis utitur. Aliud Capitonis ad lippitudinem siccam, & corrosos angulos, ac oculos humectos, & palpebras scifosas. Cadmiam ad polentā magnitudinē confringimus, deinde melle Attico subactā in fistile uas mittimus, & operculo foramen habente imposito, eod; luto oblitio, uas rectū inter prunæ locamus,



locamus, ac uentilamus. Quum autem albidior factus fuerit uapor exhalans, sublatam ollam aperimus, & cadmiam uiuo utere extinguimus. Deinde eius accipimus drach. viii. æris usti drach. viii. stibij drach. iiii. Et armenij si affuerit, drach. viii. & hæc confusa ac cribrata, cum uiuo uelut collyrium terimus, & resciccatum tollimus ac utimur, per specillum nucleum sublinctes palpebras, mane ac uesper. Nos autem cadmiam, & reliqua omnia simul adipe uiperæ subacta resrefacimus, & postea uiuo exadinctis siccatisq; ac tritis utimur. Aliud. Tomentum purpuræ ueræ drach. viii. cadmiæ drach. xx. æris usti drach. x. lapidis hæmatitæ drach. x. Omnia trita ac melle subacta, uelut prædictum esse torreto, & exadinctis uiuo, ac tritis & arefactis utitor. Aliud. Archigenis, ad omnia prædicta. Amurcam coctam terito cum melle, & utere. Utendum etiam collyrijs & siccis medicamentis, infra inter multi usus pharmaca describendis.

De defluuiis pilorum palpebrarum, quod uitium

Madarosis, & Pilosis, & Milphosis à Græcis dicitur.

Cap. LXXVIII.

Madarosis & pilosis extremitatis siue marginis palpebrarum affectiones sunt. Et Madarosis quidē, ipsum solum pilorum defluuiū est, ex acri fluxione obortū. In pilosis uero & crassescit & callescunt hæ partes, ut composita sit affectio ex madarosis & lippitudine dura. Quare etiam auxilia in hac similia sunt relatis ad illā. Optimum autē est ad ipsos pilos, sicum Philoxeni ad pruriginosos ac corrosos angulos. Facit & ad usus hebetudinis. Cadmiæ drachmas viii. salis ammoniaci drachmas ii. croci drach. ii. spicæ nardi drach. ii. piperis albi drachmā i. utere. Aliud stibium muliebri facit ad corrosos angulos, ac pilos. Stibij usti & lacte muliebri exadincti drachmas xiiii. aloës, myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachm. ii. ordeii usti leuissime triti drachmas iiii. utere sicco. Aliud. Ad pilos & corrosas palpebras. Medullam bubulam ex anteriore dextro pede, cū fuligine terito ac utitor. fuliginem autem sic facto. Papyrū pro funiculo lucernario in lucernā indito, & oleo scāmiano repleunt accende, & supra lucernam leue testaceum aut æneum uasculum pone, eoq; fuliginē excipe, & paulatim per prunam collige, ipsaq; cū melle trita utere. Facit etiam egregie uituli coagulū. Aliud Sossandri, ad milphoses, & inueteratas affectiones. Facit etiam ad carnis in angulo incrementū: Cadmiæ, stibij, chalcididis crudæ, misyos crudi, singulorum drach. viii. Hæc confusa & melle subacta torrete uelut dictū est, deinde uiuo exadinctis ac tritis, adijce spicæ nardi drach. ii. croci torrefacti drach. ii. piperis drach. i. & simul contritis, utere. Cæterū similia ad pilos, & corrosas palpebras facienda hæc sunt: Amurca cocta, lyctū indicum, armenium quo picatores utuntur. Nam cū aqua illitū consumis uitiosos humores, & pilos naturales auget: Rubigo ferri ad multos dies in sole trita, & cum uiuo ac myrrhā in collyria redacta. Spodij ceparū succo exceptum.

De abcessu in palpebris, Demosthenis. Cap. LXXIX.

Abcessus in palpebris internos, apice ipsorum incisio, & humoris expressio, curare oportet. Deinde muria infundatur, & lana ouo imbuta imposita deligetur. Postera die fomentum adhibeatur, & mel subleuiatur, & de cætero collyrium repressum instilletur.

Externos uero post sectionem & humoris euacuationem, impositis linteorum ramentis ex melle, & addita lana deligebimus. Quicquid uero abcessus palpebræ charillaginem corruerint, si quidē extrinsecus fuerint, eos possibile est ouo, ac melle purgatos, capitali sicco medicamēto incarnare. Si uero intrinsecus fuerint, euerfa palpebra, & nudata charillaginē parte derafa, æs leuissime tritum adhibeatur, & supra palpebram ouum cū uiuo & rosaceo conuassatum imponatur. Postera die fomento adhibito, æs leuissime tritū inspergatur, & rursus supra palpebrā ouum ponatur. Tertia uero die mel palpebræ sublinatur. Et postea collyriū repressiui adhibeatur.

De calculo palpebrarum.

Cap. LXXX.

Calculū in palpebris dicunt, quū euerfis palpebris, totis similia circa ipsas extiterint alba ac aspera, uariorū speciem præ se ferenda. Eorū curam facere oportet euerfis palpebris, & cute iuxta apicem tenui scalpello dissecta, ita ut per specilli concauitate tumorem molis collectæ excalpamus. Deinde æs usti tritum adhibeamus. Et ouum cum uiuo & rosaceo in lana exceptum imponamus ac deligemus. Postera uero die, eadem curatio repetatur. Tertia mel sublinatur. At uero in totis forinsecus palpebris innascentibus, post dissectionem & scalpturam, splenium emplastrum tetrapharmaci imposito.

De grandine oculi.

Cap. LXXXI.

Grandine affici dicunt palpebras, quum euerfis ipsis rotundæ quædam eminentiæ pellucidæ gradini similes apparent, quibus dissectis humor euacuatur similis candido oui. Curatio autem faciēda est euerfis palpebris, & incisione per scalprum facta, ita ut humore excreto subiectū aridum pharmacum affricetur. Aeris usti drachmas ii. squamæ æris drachm. i. sandarachæ drachmā i. æruginis, salis ammoniaci, croci, singulorū drachmas iiii. myrrhæ obulos duos, utere tritis. Fiant etiam aliquando extra palpebras grandines subdura, sabis similes. Has si quis uolens contingat, dolores intentos inducit. Et quodcūq; animi exolutionem. Has autem curare oportet cute iuxta apicem incisa, & scalptura per specillum concuum facta. Sanatur facit mellis & ramentorū ex linteis impositione, & fomentis. Si uero pharmacis ad grandines uti uelis, his utaris. Fici syluestris grossos coctos impone. Aut fici folia. Alia illitū optima. Pollinis tritici quadrantem, sulphuris uiui unc. i. terito cum aqua, & formato pastillis, ac utitor. Faciunt & ea quæ ad ordeola descripta sunt.

De ordeolo siue præputio.

Cap. LXXXII.

Ordeolum aut præputiolum uocant, quum in palpebris forinsecus iuxta pilos maxime suppuratum quoddam tuberculum factum fuerit, figura ordeo simile. Facile uero curatur nudei specilli calefacti fomento. Sed & ceræ albæ calidæ fomento id discuties. Aut de musca capite abiecto, reliquo corpore ordeolum confrica. Aut galbanum molitum modico intro addito impone. Aut cum cera emollitum parum misyos crudi commollito, ac imposito. Faciunt & ficus sicæ cum uiuo mullo coctæ, & cum modico galbano tritæ. Aut sagapenum cum aceto tritum illine. Facit etiam ad grandines. Fomentum uero loco adhibeatur per spongiam, & per panem calidum. Post humoris excretionem mel illinatur. Deinde collyria ulceribus commoda.

De gan

De ganglijs, atheromatjs, fteatomatis, & melice-  
vidibus palpebrarum. Cap. LXXXIII.

*Fiant aliquibus extra palpebras etiam hæ affectiões.*

Curantur autem gangliaceras & malagmatis ad ganglia describendis, & aquæ calidæ affusione. Est enim nerui cõtorcio ganglium. Melicerides autem, & parua fteatomata, ac atheromata, curantur aliquâdo ustorio medicamento apici ipsorum imposito, donec incumbens cutis in profundum crustam accipiat. Deinde post crustæ casum, ex salpa tunica humorem continente per specilli concuuitatem. Si uero tunica eximi non possit, per subiectum pharmacum erosiuum cõsumatur. Sandarachæ drach. ii. arsenici drach. i. squamæ æris drachm. i. ueratri nigri drachm. i. elaterij drachm. ii. charæ in cinerem exustæ drachm. ii. utere cum rosaceo. Magna uero chirurgia curantur, quemadmodum in reliquo corpore ex fundo ablata, unâ cum tunica humorem continente. Deinde labia cutis per suturam contracta curentur, uelut in sutura palpebrarum sursum uersus fieri solet. Cauendum autem ne lata fasciola cutis in chirurgia auferatur, ut ne lagophthalmi fiant.

De uaricibus palpebrarum & malignis agnatis emittentij. Cap. LXXXIII.

Varices in palpebris ne cures: Sunt enim maligni: Neq; etiam agnatas eminentias in palpebris tumidas, dolentes & subrubras, & ad digitorum cõpressionē in seipsas se contrahētes. Sunt enim etiam hæ malignæ ac incurabiles.

De ægilope. Seneri. Cap. LXXXV.

Ægilops abscessus est iuxta magnū angulum. Est autem affectio ægre curabilis, propter corpori tenuitatem subiecto esse corrupto. Ob situm autē uicinitatem etiā ipsi oculo damnum infert aliquando, per naturale paruum iuxta angulū foramen. Incipiente itaq; inflammatione, statim in prima die conandum est ut repellatur, ipso solo inflammato loco illito ex collyrio Anonino, aut alio quodā uehementer repellente, ac stupefaciente. Solet enim hæc illitio id quod confluxit dissipare. Si uero perseverarit inflammatio, tentandum est ut similiter uelut aliæ inflammations curentur, per discussoria medicamēta, quæ citra mordacitatē agūt. Coassiditur enim oculus ex acribus, & in ipsa affecta parte inflammatio augetur. Nos autē in inflammationibus nodum transmutatis, ex emplastri Barbari, aut Leænæ, aut Athenæ, aut ex salicibus, aut ex aceto & oleo parati usui, abscessū discussimus ac resicamus. Asclepiades autē ad ægilopas pharmaca talia conscripsit. Succus illecebræ, quā quidam portulacā syluestrem uocant, aut semperuium paruū, succi solani, singulorū lexuncem, thuris drachm. viiij. galbani sexuncem, mastiches quadrante, thus tritum cū succis coquito & ubi dissolutum fuerit, galbanum præmolitum adiicito. Mastichen enim improbamus. Aliud. Thuris drach. viiij. myrrhæ drach. viiij. ladanij drach. i. ceræ drach. viiij. aluminis scissi drac. iij. spumæ niri drac. iij. coaguli leporis drac. iij. Tundito hoc pharmacum, & cum fece ungeri trini emollito. Si uero uitis discussorij medicamentis inflammatio suppurabitur, quā celerimē secare oportet, & humorem euacuare, ac subscripsi uid. Bdellij, myrrhæ, ladanij, spumæ niri, colophonæ, singulorū drac. iij. ceræ drac. x. ungeri trini quantū satis est. Alij pro colophonia, oleo fo-

lia trita habent. Et cum axungia ægilopi imponunt. Et sordes subalares oculum cū axungia eodem modo. Aut ueratri nigri radicem madefactam impone. Aut perdidum herbā pro cataplasmate adhibe. Aut farinam erui cū melle. Aut cinerem signorum uitis aceto subactum impone. Aut staphidem syluestrem & ammoniacum thymiamā cū melle impone. Aut alumen scissum cum terebinthina uelut splenium impone. Si uero ad angulū repperit, ad superficiem autē omnino non processerit, tunc scalpro ad uenę sectionē, aut pterygis destinato, mediū anguli corpus diducere oportet, & bonam carnē ex profundo producere. Deinde ipsam enatā carnem resiccare. Id quod continget, si penitus non pingua loco ahibuerimus. Quare sanē in principio post apertionem lentacula cocta, aut malicorio cum melle utemur. Repurgato uero loco, & nascente iam carne, utrum leuissimē tritum, siccum inspergimus, & in eius usu perseveramus usq; ad absolutam curationem. Est enim admirandum auxiliū, cuius efficacia satis expendi nō potest. Sed & alumē scissum leuissimē tritum, & modica terebinthina exceptū, ad emplastri formam, purgat & incarnat ac cicatricem uero inducit. Oportet autem & in ulceris cauitatem de pharmaco indere, & sorinesces paruum splenij usq; imponere. Profectō nos hoc curationis ductu usi, alio auxilio ad recentes ægilopas non indiguimus. At uero quæ ab antiquis ad hanc affectiōnem descripta sunt auxilia, huiusmodi sunt. Ægilopa curant, si non per profundū corruptum fuerit os, chamæmeli folia commanfa imposita. Aut maluæ folia commanfa cum sale impone. Post apertionem uero ipsa malua trita utere usq; ad cicatricem inductam. Aut solanū maxime halicacabum, aut myrtum cõmanfam impone. Aut cenanthes, aut auriculæ muris folia. Facit & ægilops frumentacei succus cum farina frumenti impositus. Et plantaginis folia manducata ac imposita. Thus item & columbinum sterces cõmiscentur ac imponuntur, & lapidescunt ac inherēnt usq; ad inductā cicatricem. Aliud. Propolis, terebinthina & thus, paribus portionibus splenio illita adhibe. Facit & sicum pharmaci ex eruo cum melle. Aliud. Fel pord fumo resiccatū terito, ac exulcerato ægilopi imposito. Aliud. Thus tritū pice liquida exiipe, & emplastri forma impone. Incipientes enim ægilopas hoc pharmacum dissipat. Iam uero ruptos sanat, ulceri inditum, & superius positū. Aliud ad ægilopas experientia cognitum. Itemq; ad strumas. Radicē lilij recentē ad emplastri formā terito, & imposito. Rumpit enim, & repurgat, & usq; ad perfectā curationē cicatricē inducit.

De uisione Ægilopi. Cap. LXXXVI.

At in quibus affectio diuturna os corruptum, aut ad angulum in situ alibi, cicatrice superficiei inductā, in his triagulari incipientis carnis deratione facta & angusta sectionis parte ad angulū adaptata, & deinde de spōgia oculo imposita, cauteria ignita ipsi sectioni adhibemus, usq; ad os ad squamæ remotionē inuertes, ita ut etiā obliquas in ulceris cauitate partes, & maxime supernas inuamur. Si enim post primi cauterij admotionē spectaueris, apparebit tibi angustissima cauernula, q̄ supernē ex obliquis humorē ulceri trāsmittit, uelut lacrymā. Quare oportet cauteriū cauernulæ foriter apprimere. Et ubi sufficiens facta fuerit

fuerit ustio, lentisculam costam cum melle adhibere. Elapsa uero crusta, & ulcere aliquo modo purgato, alumen fissum tritū terebinthina liquida exceptum modica, ut emplastrum forma fiat, cauitati ulceris indimus, & splentum ex eodē factum, supra ulceris cauitate imponimus. Celerrimē enim repurgat, & incarnat, & cicatricem inducit. Probē etiam incarnat uisum leuissimē tritū inspersum. Vtere, & probabis.

De anchilope.

Cap. LXXXVII.

Circa predictum locū ubi agilosus sit, colligitur etiam lentus humor melleus aut pulsatex, plerumq; in tunica contentus, dolorem nō inducēs, paulatimq; augetens. Curatur autem chirurgica, quemadmodum etiam reliqua circa corpus atheromata, ita ut superficies dissecetur, & subexcorietur, & tunica humorē condens funditus tollatur. Post sublationē autem ipsius, quo secura curatio fiat, & affectio non regeueretur, cauterijs ignitis crustas loco inurimus: Et deinde lentiscula cum melle curamus. Elapsa uero crusta, alumine cum terebinthina, uelut antea dictū est, usque ad cicatricem inducimus.

De carnis in angulo magno decremento. Ca. LXXXVIII.

Carnis in angulo oculi magno imminutio ac decrementum sit, quū exulceratione, aut pręigij, aut incrementi carnis ablatione, totus angulus funditus fuerit sublatus, & allabentem lacrymā continere nō poterit, sed ad malas desluit. Contingit hoc etiam aliquid ex male curatis ægylopiis. Et uocatur hoc uisū Græcis Rheas. Dicuntur autē etiam Rheades, qui ob absidas fluxiones oculo, semper lacrymantur. Curandi uero sunt illi quibus angulus funditus sublatus est, adhibito pharmaco locos densare potente ac consolidare, quale est quod tephru dicitur. Si uero callus fuerit, pręirritare oportet per aliquid quod acris medicamentum. Sed & chirurgica utendum est. Collū enim fascia circumdata cōstringitur, & uas circa nasum notatur. Deinde uas illud scalpro biangulari dissecatur. Deinde spōgia oculo imposita, cauteriū loco apprimitur, non usq; ad os, sed ut cutis & sectio solum flammam sentiat. Sic autem cauterium triangulare. Postea lentiscula cū melle adhibetur. Vbi uero pura facta sunt ulcera, oculus disparatus seruatur, donec angulus carne pura fuerit repletus, ut ne concretio fiat. Probē facit in ipsis etiam alumen cum terebinthina. At uero oculos prę diuturna lippitudine scietes, aut humectos, curare oportet prę omnibus aquæ potu, & parco cibo, exercitijsq; ac deambulationibus, & capitis frictione ac rasura, & frigida perfusione. Est & diætā optimi succi ac in crassante utendū, & oculi sublinendi ex medicamentis meatus obstruentibus, frigescentibusq; ac adstringentibus. Post aggressionē uero frigida aqua & posca oculi proluatur. Optimū autem pharmacū ad hos experimento cōstans hoc est: Plantaginis folia exuccato & excolato, ipsūmq; succum in fistili nouo ad solem exponito, & linteo tenui puro uelato, quod diēct agitato, & resiccatur tritum reponito, & pro collyrio siccio uitior. Stibij ad anguli magni decrementum Alexandri regis ualde bonū. Facit etiam ad pilosum palpebrarum. Terre apellitidis, croci, nardi celicæ, æquales portiones uas melle subigito, & in ollam missa, addito operculo foramen habente, eoq; obliato, prunis imposito, & non uentilato. Quum autem non amplius caliginosus

uapor per foramina exhalarit, ab igne tollito ac frigefieri finito. Deinde tusa, cribrata, ac trita in tenuissimum puluillum pro stibio adhibeto. Aliud. Stibium ad Rheadas. Aeris uisti sesquiunciam, stibij sesquiunciam, croci unciam i. spicæ nardi unciam i. folij malabathri trientē, rosarum uiridium sesquiunciam. Reliqua leuissimē terito. Deinde rosas per se bene leuigatas aridis unito, & simul tritis donec siccetur uitior. Aliud stibium, multa experientia congnitum. Aeris, cadmiæ, stibij, singulorum sextantem, piperis grana xiiii, chareophylli unc. i. spongiarum nouarum quadrantem, mellis quantum satis est. Aes, cadmiæ, stibium, tusa sufficiente melle subigito. Deinde ipsa sponsia excepta in ollam mitito, obliato, urito. Et ad cinerem exactissimē tritū piper & chareophyllū adijce, & tuis, cribratis rursus exactissimē tritis utere.

De his qui tempora inurunt.

Cap. LXXXIX.

Quidam barbaris legibus seruitutes, in diuturnis oculorū fluxionibus, tempora inurūt, aut per pharmacum, aut per medullā lignorū nucis iuglādīs, quod hyfca appellant. Quidā etiā ferrum candefaciūt, & uestionē perscūtunt. Ego itaq; eiusmodi affectionem ex temporū uestione cōstatam uidi. Hi enim immo destē pharmaco uisū, & uestione usq; ad profundum facta, unā cū alienis humoribus, etiā naturales consumplerunt, & ad extremā siccitatem oculum deduxerūt, & nō intelligebant se morbū incurabile præparare. Quid enim aliud contingere poterat, quā quod hic contigit? Primum dolor molestus, & immodicus ardor. Quū igitur tentassemus per collyria obtundere dolores, amplius ægrū grauauimus. Liquidum enim collyriū oculo illitum, uelut arenulas quasdam producit, ac immodica caliditate torrefactum. Et quū rursus per ouū mitigare uellemus, rursus per caliditatē etiam ipsum crassefactū est, & uelut ad membranas quasdam redactū, quæ ægre ab oculis secedebat. Sed & lacte uisū sumus, & ipsum similiter inspissabatur, & in summa, uelut ab igne humores coacti inspissabantur. Proinde multo labore insumpso, quū scenigræci succū instillassemus, moderatē dolorem mitigauimus. Nam & hic a morbo superabatur. Postea uero rationē ducē sequūt, ad rosaceū usum deuenimus, tepefaciētes hoc ac infundētes, ut etiam æger nobis absentiūbus, ipsius solius usū ab accedentibus alleuaretur. Quin & ad alia multa utilē nobis uisum est rosaceum ad oculos. Si enim ex natura siccitas affuerit, ut egre mobilis & penitus lacrymarum exors sit oculus, etiam his commodum est pro collyrio sublitum.

De arteriarum sectione. Seueri.

Cap. xc.

In chirurgica circa caput & frontem, unus generalissimus nobis scopus est, ut ægrū ad fluxionis affectionē liberemus. Verū priuatas & uelut particulares aggressionēs facimus, propter uires, propter accidentia, propter locos, propter materiæ fluxionum qualitatē. Quum igitur arteriarum genus unum sit, loci uero diuersi, nūc de posterioribus expendemus. Hæ enim uelut principia quædam earū sunt, quæ circa superficiem capitis existunt. Cōuenit igitur in magnis doloribus, cario, staphylomatis & prolapsibus, arterias in posterioribus capitis partib; secare. Statim enim utilitatem inde percipiunt ægri. Præradendi autē sunt loci, & sic pulsus exacte per tactū notandus

notandus, & spatium dimetiendum ab auribus triū digitorum, ad caluam posteriore appellatā. Conuenit autem secare non oblique, sed trāuersim, usq; ad os, & membranā caluā ambientem exactissimè radere, & sanguinis excretionem usque ad anti mē deliquim expectare, in quibus uidelicet vires robustæ sunt, & dolor uehementis. Sic enim sopies ac cidentis symptoma. Deinde cuneolum sectioni parē inidimus, & lināmēta consula plurimo cuneo lo imponimus, & lanæ hapso posca imbuto pro linamentorū custode utimur. Deinde ligamento utimur sufficienter adstringentes, & ad frontem ambo principia ducentes ac deligantes. Postera die uino & oleo ligamentū rigamus, & non soluimus. Tertia die soluimus, & uibices moderate proluimus, & os deradimus. Et postea quocq; ossis rasura utimur, & hoc facimus, usq; ad quatuor, aut quinque dies, donec os sanguinē emisserit. Hoc enim signū est sufficientis rasuræ. Cæterum medicamentis, quæ lināmētis illinuntur, utendū est in his, ex pumice et cera ac oleo paratis. Et postea cephalico sicco appellato, ex eruo utendū est. Sed & id quod à nobis preparatur, unicè ad hos facit. Statim enim post osis rasurā impositā, carnē producit. Accipit autē faringē triticeæ tenuissimæ par. ii. colophonis liquidissimæ partē i. Hoc ubi siccū inspersum est lināmētis & splento, custos lināmētū adhibedus est ex aliquo pharmaco & cerussa parato. Nā & ad cicatricē inducendā confert.

## De caluarie circumsione.

Cap. xci.

Sed & caluarie circumsionem, periscyphismo Græcis dictū, assumimus, in quibus diuturna & tenuis oculorū fluctio existit, & multa uasa fluctionem de leganda. Oportet igitur rasos locos notare, ut ne in coronalem futurā, aut rēporū musculorū, sectio fiat. Facienda autē est sectio paululum supra frōtem trāsuerfa insito à tempore ad tēpus facta, ita ut mēbrana caluā ambiens simul dissecetur, & diligenter radatur. Deinde cuneolis sectioni inditis lināmēta adhibemus, & reliqua consequenter facimus, uelut prædictū est in arteriarū sectione, assumpta ex uino, & oleo irrigatione. A tertio die curatio suppuratoria fiat. Deinde ea quæ ressecationem promittit. Si quidē igitur à solo sincipite oculi fluxione infestatur, prædicta sectione contenti sumus. Si uero unā cum supernis uasis, etiā ex temporibus fluxio feratur, post factam relatum supernam sectionem, alias duas luniformes assumimus, unam ab utraq; parte. Habeat autē principium, tum ea quæ à dextris fit, tum quæ à sinistris, à principijs trāsuerse sectionis super ne factæ, ita ut ex supernis ad tempora deferantur, usq; ad mediū frontis. Procedant autē luniformiter ad supercilia cōuerse, ut ne temporū musculorū iniuria afficiant. Sit autē figura triū huius sectionum si milis literæ Græcæ  $\pi$ , ita tamen ut apices ad internas partes incuruatos habeat (hoc modo) ( ). Oportebit autem & hic cuneolos sectionis indere, & cōsequenter facere, uelut antea dictū est. Porro dicunt Aethiopas à natuitate frontem circindere, ut ne oculorum fluxione infestentur.

## De frontis per submissum scalpellum exco= riatione.

Cap. xcii.

Frontis per submissum scapellū exco riationem, hy= pospatismum Græcis appellatū, assumūt qui deformatem cicatricis maximæ per circulum sentis in

frontis circumsione, deulant. Verum hæc curatio imperfectior illa est. Vnde magis frontis circūdsione periscyphismo appellato utendū est, ita ut rei magis necessariæ curam habeamus.

## De uasorum sectione.

Cap. xciii.

Vasorum sectionē assumimus uno oculo affecto, & in oculorū perpetuis lacrymis, & in hemisrania. Assu mimus autē in his, quibus manifesta & eleuata sunt in fronte uasa. Vas uero aramēto notamus, & sum mis utriusq; manus digitis, frontis cutem ab utraq; notæ parte eleuamus, & superficariam sectionem in ipsam notam, ex directo uassū facimus. Et rursus paulatim subiacentes cuti membranas dissecamus, donec nudum uas apparuerit. Atq; si hamulus duo bus trāsfixis labla sectionis eleuamus, & paulatim per scalprum subradentes, uas à circumfictis mēbranis liberamus. Et cæco hamulo subiecto, uas ex profundo attollimus, & ita eleuato acum duplex filum habentem submittimus, & mox ablata acu filiū dimittimus. Idē etiā in altero uasis termino facimus. Et postea uas perpingimus, & euacuationē fieri sinimus. Sufficienti uero sanguine euacuato, utrosq; terminos uasis, per subiecta iā fila deligamus, & medium ipsius ressecamus; atq; ita lināmētis inditis, & hapso lanæ ex aqua frigida imposito, deligati uemur. Postera die uino & oleo irrigamus. Tertia uero exoluitur, & moderata pusiōe facta lināmēta ex aqua mulla indim⁹, donec exciderint fila. Et usq; ad perfectam incarnationē eadem utimur. Est enim bonum auxilium. At uero cicatricis inductionem per emplastrum melinum facimus, aut per id quod ex cadmia paratur. Leonides porro, soleo, inquit, ubi mixta est fluxio, & à fronte, & à muscularis temporibus, iuxta paruos oculorum angulos rēporibus uidens, supra fines superciliorum, crustas inurere per cautes nudeoformes, id uehementer cauens, ut ne temporum musculorū contingam. At in fluxionibus à sincipite, confringo collum, & uasa in fronte magis eleuata noto, & hæc ipsa præralis pilis inuero. Illiō ualde celebris ad diuturnas fluxiones. Viperarum capita in olla probe exurito, & cinerē cum lupinorum amarorum decocto tritum temporibus illinito. Et miraberis de medicamētū efficacia.

## De musculorum temporum cataplasmatibus, agglu= tinatorijs, ac illitionibus. Seueri.

Cap. xciiii.

Quandoquidem fluxiones ad oculos ex superincumbentibus locis suppeditantur: Nam hemisranæ, & caries, & fluxiones capitis, dolores oculorū augēt: operæpretum esse puto etiam ad hos pauca auxilia referre. Vtendum igitur est agglutinatorijs & illitionibus, uelut dictū est, in his quibus oculi fluxione infestantur, in quibus uasa circa frontem ac tempora eleuata distenduntur. Nā si inflexio non ex uasis circa frontem, & tēpora, ac palpebras contingit, sed ex profundius sitis aggludnationes & illitiones magis lædunt. Insuper autē si circa inflāmationē fluxiones oculorū sunt, agglutinatoria ipsas cohibent. Si uero inflammatio affuerit, humores ex circumfictis locis ad inflammatos impulsos, per com prestonem magis discedunt. Itaq; agglutinatoria ex simlagine & ouis ac thure composita uitāda sunt. Ressecata enim distendūt uasa, & fluxiones augent. Quæ uero mollia permanent, aut distensionē non efficiunt, & tum frigidityte, tum adstrictione

uafa deprimunt, his utendū est. Si igitur calida fuerit intemperies quę lædit, Crocum, opium, myrrhā, thus, ex aqua trita, & ad strigimentidam spissitudinem redacta illinitur, & statim inducto somno, dolorem depellimus. Idē præstant & fluuiales stridoræ cum aloë contriti. Sed & polygonum cū mastiche tritum ac illitum, dolorem mitigat. Et mādra goræ cortex cū thure mirificē facit. Et mastiche cū succo brasiacę illoræ trita mirificē reficcat. Item fabrorum fuligo, quam uulcaniam appellant, leniter cum ouo fusa. Et calx uiua cum ouo in frigidis intemperiebus. Et hirundinum sterces cum mastiche & oui candido.

*Totius capitis illitiones Seueri. Cap. xcv.*

Torum caput intemperie calida affectum, acada cum uino trita illinendum est. Nā acetum in huiusmodi capitis illitioibus uitare oportet. Facit & samia terra cum plantaginis aut solani succo trita. Si uero frigidior fuerit causa, ut æger clarē frigiditatem in capite sentiat, & lacrymas frigidas deferat, contraria calidæ affectioni auxilia adhibenda sunt. Nasurto enim cum ouo tritio multum profecimus. Et per erucę semen cum aceto tritum idem effecimus. Sed & thapsia cum sinapi aceto trita, magnopere prodest. Et cochleæ Africanæ cum thure ex aceto tritæ, multa fluxionis illationem relidunt ac excindunt. Et hirundinū nidus cum stercore in ipso reperto, aceto subactus graues dimidij capitis dolores sanat. Et euphorbium cum aceto tritū. Vtere etiā smegmatis & puluillis inspersilibus, suprà ad diurnum capitis dolorem descriptis.

*Cataplasmata oculorum lippientium, Dioscoridis. Cap. xcvi.*

Cataplasmatibus uice imposita mitigant oculorum inflammationes, folia rubi aut auriculæ muris, aut tribuli uiridis, aut portulacę, aut semperuiui, aut polygoni, aut fencybi, aut coriadrī, aut cupressi. Aut hyoscyami folia trita. Aut cucurbitę ramēta. Aut peponis caro, aut calicum papaueris decoctum affusum. Aut ipsi calices cocti triti impositi. Cōmodus est etiam panis aqua madidus tritus cū modico rosaceo impositus. Et ouum cū rosaceo ac uino conuassatum, & hapso lanę exceptū ac impositū. Aut ouo rū assatorū uel coctorū uitellos, cū modico croco, & opio phaseoli magnitudine, ex sapa tere ac impone. Aliud Asclepiadę, ad maximos humorum influxus ac dolores. Rosarum siccarum drach. i. opij drach. i. croci drach. i. efforma in pastillos cū passolo, in quo melilorum coctū est. Et usus tempore ex ipsis terito cum passolo, & ammixto pane imponito.

Aliud ad maximos dolores ac uigilias. Psyllij semē in seruicē aquā coctū, paululum siccato. Et ubi dissolutū fuerit, conuassato, ut emplastri formā accipiat, & ex eo oculū integro. Suauē enim somnū inducit. Aliud Demosthenis, ad dolores & prolapsum oculorum, egregiē facit. Calices papaueris in aqua mulla coquito, & ipsos quidē expressos abjecto, aquā mullam autē tritico, aut ordeaceo polli ne ammixto imponito, modico etiam rosaceo adiecto. Aut polenę florē p pollinē, aut panē purā accipito. Cæterum cataplasmata omnino tēpora comprehendant, & supercilia cū frigore. Solam autē supernam palpebrā cataplasmate integimus, infernā non comprimentes, quo aperiri oculus possit, & lacry-

mam illatam excernere. Assidue uero permuteetur, & maxime æstate, ut ne seruē facta exacerbent. Ad contactum autem summe tepida apponantur, hysceme uero leniter calida.

*Illitiones oculorum.*

*Cap. xcvi.*

In uehementibus doloribus palpebras forinsecus illinire oportet, maxime quidem collyrio Nili ex rosis, aut aliquo dolore eximēte ex croco parato, aut croco trito cum modico papaueris succo, affuso lacte aut hyoscyami succo. Alia illitio Asclepiadę, ad dolores uexationes. Aloës, lycij Indici, rosarū uiridū, croci, opij, myrrhę singulorum æquales portiones terito cum uino, & formato pastillos, ac siccato in umbra. Vsu uero expetente, passio dilue, & oculi los atempora illine. Alia illitio repulsoria optima. Foliorum mali siccorum uisum ac cribratorū lib. i. myrrhę sextantē, glaucij sextantē, gūmi sex uncę, Excipe aqua. Illitio Asclepiadę mordax, eue stigdio fluxionem cōpescēs. Facit & ad lippitudines scabras. Aeris uisi drach. iiii. croci drach. iiii. pipēris drach. ii. opij drach. ii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Hęc forinsecus illita maximos humorū illapsum relidit. Verum uitare oportet ne quid de phar maco in oculum præterlabatur. Aliud phloginū in scriptū linimentū. Aeris uisi ac loci drach. x. i. croci drach. v. i. piperis drach. i. i. i. myrrhę drach. i. i. opij drach. i. i. gūmi drach. x. ii. Terito cum uino ueteris odorato adstringente. Alia illitio ex sandyce, ad perfrigerationes & resolutiones palpebrarum, quales cōtingunt & in his qui canino more conuelluntur. Facit etiā ad acuendum uisum ante balneum illita. Sandicis drachm. x. iiii. crocomagmaticis drach. v. i. piperis drachm. iiii. gummi drach. vi. Excipe aqua. Aliqui adijciunt etiam opobalsami drach. iiii. & illinunt ad hebetudinem uisus.

*De aridis collyrijs, Galeni. Cap. xcvi.*

Ex aridis pharmacs quedā affectionē in oculis cōgrogari prohibent, humorū uidelicet influxiones impedientia, ex quibus oculi affligi solent. Præstantissimum autem ex his apparuit, & experientia iudicatum est, quod ego composui, inquit Galenus: & ob id apud multos in usu est, ac ferē per omnes gentes, quibus Romani imperant. Ac primū sanē ipsius cōpositionē scribā, quum præstatiū esse putem, nullis omnino affectionibus corripit, quā eas quoque iam præoccupant sanare. Utilissimū autē est sanis oculis pharmacū. Vritur lapis phrygius in sabaceas magnitudines contractus. Eum uero in ollam nouam missum, deinde forinsecus luto oblita olla, addito operculo foramen habente, eoq; oblitio, ollam prunis imponimus. Quū autē lapis ignitus factus fuerit, tunc iā ollam in altius uas purum euacuare oportet, & recentū butyro extinguere. Facta autem extinctione, rursus in eandem ollam missum, prunis adhibemus, ac tentilamus. Ignito uero lapide, ubi purum uaporem effert uiderimus, rursus euacuatum extinguimus uino ueteri fuluo odorato. Deinde rursus missum in ollam lapidem, tercio urimus, & rursus extinguimus melle Attico non multo. Postremum autem melle extinguatur, ut mellis qualitas in lapide permaneat. Cæterum diebus trita ac præleuigata in promptu habere oportet, ita ut in reuissimū puluerē redacta sint subscripta. Aeris uisi unc. i. piperis albi unc. i. solij malabathri unc. i. fil

bij drach. x. ii. His ammisce lapidis usti, tufi, cribrati ac triti lib. i. Et postquam omnia simul probe fuerint unita, & reponere medicamentum uoles, adijce opobalsami primarij drach. x. ii. Sit autem opobalsamum tenue, & pellucidum compage, non crassum. Impedit enim crassitudo, ne sicum pharmaci euadat. Vitendum autem est ipso ad palpebras solas, inducitur specillo circa tunicarum oculi contactum. Iubedusque est homo cui hoc subinfatur, palpebras aper tas habere. Hoc itaque a me compositum est, non per mittens hominem qui ipso recte utatur, oculorum lippitudine apprehendi. Stibium ornandis palpebris præsueruatiuum, pueris maxime commodum. Stibij drach. x. vi. plumbi usti ac loti drach. v. iiii. squamæ aeris drach. i. croci drach. i. florum rosarum, myrrhæ, spicæ nardi, thuris, piperis, singulorū drach. i. palmulari ossa decē. Omnia in fistile uas cōiecta diligenter torrefacto, deinde tufis ac tritis opobalsami primarij cōpage tenuioris cochlearia duo adijcitor: Et tritis ac siccatis uitior. Aliud Seueri, facie ad oculorū & palpebrarum pulchritudinē. Stibij quadrante, purpuræ ueræ ustæ sextantem, spicæ nardi unc. i. Vere. Stibium ornans palpebras. Stibij usti & loti drach. viii. osium palmulari ustorū drach. v. iiii. atramenti sutorij drach. ii. nardi celticę drach. ii. Vere, cōstat experimēto. Aliud, facies ad decorē, angulos rarefactos ac humectos moderatē resiccās. Cornu ceruini usti, purpuræ ustæ, singulorū drach. iiii. folij scylmatūs unc. i. Vere. Stibii optimū ad tenuē fluxū, & corrosos angulos. Nutrit hoc etiā oculos debilitatos, in multis affectionibus cōprobatū, & mirifice omnibus se opponens. Facit etiā ad ornātū. Inductū enim multo tēpore in angulis permanet. Habet autē hoc modo. Carnis purpuræ torrefactæ drach. iiii. succi anemones drach. vi. stibij usti & uino extincti drach. iiii. succi baccarū fam buci drach. iiii. spicæ ægyptiæ drach. iiii. ordē usti drach. ii. gallarum nigrarum drach. ii. acaciæ drach. ii. mororū rubi aridorū tuforum drach. iiii. costū tū si drach. iiii. folij tū si drach. iiii. Singula seorsim terito, & simul in uase plumbeo reposito, ac uitior. Aridū Danaī, quod uelut res sacra in regia urbe uēdictū est numismatis c. x. & cū multo labore ab eo impetratum. Præsuerat ab omni lippitudine, palpebris inducitur. Aeris usti unc. i. ungues siue onychas aromaticos uastos magnos tres, piperis grana x. i. ordē usti grana x. i. palmulari ossa usta ix. areas muscas x. i. folij scrup. ix. sanguinis dracōij scrup. iiii. Aes accipe quod ab æris uasis dederatur, & in fistile uas missum, ac prunis impositū, ad tridū uerū, ut aqua cotidie ter ipsum urina pueri incorrupti extinguas, & postremū aqua dulci. Aeras autē muscas accipe ex locis ubi boues degunt, aut si ibi nō reperias, ex mortuis animalibus. Aliud palpebras ornans, pharmacū quod prosperē accōmodatur. Facit & ad diurnas lippitudines. Stibij usti & uino extincti drach. iiii. plumbi usti ac loti drach. viii. fuliginis thuris, spicæ nardi, myrrhæ tostæ, croci tosti, squamæ aeris, singulorum drach. i. Tritis utere. Aridum ad angulos calidiores & rubicūdos ac exasperatos: Seueri croci drach. iiii. cadmiæ lotæ drach. ii. cerusæ drach. i. Aliud Seueriani, cerusæ bessē, cadmiæ tridentem, salis ammoniac sextantem, piperis sextantem, folij tridentem. Aliud palpebras or

nās, facit & ad lippitudinem sicā. Sanat etiā omnē lippitudinē, post mitigatos dolores illitū. Aeris usti leuissimē trid unc. i. cedriæ puræ tridentē. Aes cū cedria ad strigētiā spissitudinē terito, & in arūdinē mixto, & hanc obturatā forinfecus torā loco oblini to, & in dibano prunis obruito, & per diē ac noctē finito: & exemptam terito, & collyrij Pelarij drach. x. iiii. adijcitor, & croci drach. ii. & folij scrupul. ii. & uitior. Aliud sicū collyriū celebre, resiccans multas fluxiones, & uisum acūs. Optime quoque at tenuat dicatrices. Aeruginis unc. i. cadmiæ unc. i. chalcidis unc. i. stibij unc. i. mellis mensurā congruam. Omnia leuissimē trita, & melle subacta, in ollā mitito, & addito operculo foramē habētē, oblinito, ac urito donec tenuis uapor progrediatur. Deinde exēptio ac trito utere. Quod si ipsum paululū mordax facere uolueris, post uestionem adijce piperis grana x. v. Aliud aridū ualde bonū: Cadmiæ sextantē, mellis sextantē, aeris usti drach. iiii. salis ammoniaci drach. ii. piperis drach. iiii. spicæ nardi drach. ii. Cadmiā leuissimē tritam melle subige, ure, & uino austro extingue, & cum reliquis tere ac utere. Est delacrymatiuū. Facit & ad asperas palpebras. Aliud sicū ad lacrymantem oculos, & eos qui a lōga lippitudine nō probe sanati sunt. Est etiā præoccupatiuū. Cadmię drac. v. iiii. aeris usti drach. v. iiii. stibij drach. iiii. Cadmiam cū ære in frusta frasiōra contusam, & melle subactā in olla exurito, uelut antea dictum est, & uino ueteri odorato extinguito, ac siccato. Et deinde stibium per se utrum in olla ammisce, & tufis cribratis ac tenuissimē tritis uitior. Quidam estam armeniaci drach. duas ammiscent. Hoc sicum pharmacū sepe cū uino uelut collyrium cōtrui, & siccato usum sum, inducēs ipsum palpebris mane & uesperī. Aliquādo autē etiā stibij drach. octo intēci.

Aliud sicū croci, pro caulepticō, id est, præsueratiuū. Aloēs, croci, gluci, sarcocollę, singulorū uncia una leuissimē tritis utere. Aliud, quod uor, & affectiones illino. Siftit fluxionē in una die, si dēse ac sepe illinatur. Facit etiā ad egilopas, & palpebras cor rosas, & pilos pungentes in palpebris, post euulsos pilos, pilorum locis illitū. Sarcocollę, croci, gluci, flauī, aloēs, chelidonis, singul. unc. i. myrrhæ troglodytice drach. quatuor. Chelidonia tufam cribratā reliquis adijce, & cōtruis utere. Ego cū aqua uelut collyriū cōtero, & sicco uitor. Aliud sicū collyriū celebre, uisum acūs, inoffensos cōseruās oculos. Stibij scrup. iiii. fuliginis purpuræ ueræ, rosarū, sicarū, singulorū scrup. ii. croci scrup. iiii. folij scrup. iiii. spicæ nardi scrup. iiii. Tritis utere. Fuliginē autē sic facito. Lanā purpuræ cedria tinctā incēde, & pelui leuissimō, aut greo uase cōtege, & cōstā fuliginē pen na collige, ac utere. Aridū albū, uisum acūs. Facit ad pruritus, & uestiones ex sole, & lippitudines incipietes ex frigidityte, ante & post cibum. Cadmiæ drach. ii. salis ammoniaci drach. i. piperis drach. ii. aluminis scissi drach. ii. folij drach. ii. cerusæ oboli dimidium. Terito cum uino albo, & siccato uitor.

Aliud sicū acre. Cadmię drach. x. iiii. salis ammoniaci drach. ii. spicę nardi drach. i. piperis albi drach. i. tritis utere. Aliud optimum. Cadmiæ drach. v. iiii. croci drach. ii. salis ammoniaci drach. ii. spicę nardi drach. ii. piperis albi drach. vi. Tritis utere. Aridū Seueriani. Cadmię ustæ & lotæ drach. viii.



salis ammoniaci drach. ii. piperis albi drach. ii. folij drac. i. cōmuls, cribratis, ac probe tritis utere. Aliud aridū acre. Cadmiæ drach. viii. testarū sepia sextan tē, salis ammoniaci unc. i. piperis unc. i. folij unc. i. utere. constat experientia. Aliud aridum uisum acuens, Oribasij. Radicis chelidonie sextantem, aloës sextantem, folij unc. i. piperis decorificati drac. iiii. ueratri albi drac. i. Vere. Aridum Apollonij ad uisus hebetudinē. Cadmiæ drach. viii. fecis uini ue teris siccae usæ drach. v. piperis albi drach. v. salis ammoniaci drach. x. fandarachæ drach. ii. folij drac. ii. nitri usi drach. iiii. Aliud aridū ad suffusiones & hebetudines. Viperam masculam totam uiuā in ollam mitto, & succi fœniculi cyathum unum adj cito, & thuris non secti granum magnum addito. Deinde totam ollam forisfuculo luto oblitam, urito donec in cinerem redigatur indita, teritoq; ac uitior hoc arido medicamento uelut celebri. Faciunt & ui peræ capita usita, trita, & induta. Aliud. Incompara bile. Veratri albi & piperis æquas portiones tu sas ac tritas adhibe per triduum, purgatione prius per uentrem facta, & per os ac nares. Aridum ad incipientes suffusiones, glaucedines, & pellicularum crassitiem. Cadmiæ drach. x. iiii. salis ammoniaci drach. x. fandarachæ drach. iiii. ueratri albi drac. ii. folij drach. ii. utere. Ego si aliquando opus habeo arido collyrio ad præsentantes affusiones commodo, hoc trito & in leuissimum puluissimum redacto utor. Aliud siccum acuens uisum, experientia cognitum. Cadmiæ drach. viii. i. folij drach. viii. i. spicæ nardi, drach. ii. piperis, croci, auripigmenti, salis ammoniæ ci, chelidonie, singulorum drach. ii. artemisiæ, folij malabathri, singulorum drach. i. utere.

De liquidis collyrijs. Galeni.

Cap. x cix.

Liquida ocularia medicamēta cōponuntur ex suc cis, & liquoribus, felleq; ac melle, & ammoniaco thymiamate, ita ut ammiscatur ipsis etiam modera tiora quædā, uerum utribus nō repugnātia, myrrha in quā, & thus, & crocus, & galbanū, & quæcunq; alia huiuscemodi, quæ tunicas rarefacere, & crassitu dinē humorū ac spiritus attenuare possunt, & humi ditatē præternaturalē discutere, & tunicis oculorum per fimum temperamentū, robur præbere. Liquidū acuens uisum. Succū ex malis punicis expressum, in uas fictile Atticū leuissimum ac densissimum mittā to, & tenui linteo obligatum ad solē exponito, do nec mellis crassitudinem acquirat, & parem mesurā mellis ad succū adjicito, & fictili uase exceptū repo nito. Inueteratum enim melius euadit. Quum autē dormire uolueris, ex hoc leuiter oculos sublinito. Hoc pictoribus, & scriptoribus, & aurisuforibus ac senibus cōuenit. Aliud. Ampullam uitreā oleo ex plecto, & insectis fœniculi folijs teneris in solē expo nito ad dies quadragina. Ex expresso fœniculo, oleo uitior. Aliud uisum acuens. Adipē uiperæ in ui tream ampullā mitto, & ubi liquatus fuerit, specil lū in eo tingito, ac illinito. Hoc ualde cōmodū est. Aliud uisum acuens. Colocyntidis semen tufum, cribratū, ac leuissime tritum cū melle adhibeto. Ex perimento cōstat. Aliud ad uisum acueudū, & ad suffusioes ac clarrices oculorū. Chamæleontis nigri radicem usitā, ac leuissimē tritā illinito. Aliud. Inte stina terræ in testa ad cinerem exure, & cinere trito cum melle utere. Ego hoc arido usus sum ad albugi

nes. Aliud ad inchoantes suffusiones. Mel, & oleum uetus, & fœniculi succū, æquis portionibus misce ac utere. Aliud. Sagapeni drac. ii. spumæ nitri drac. v. mellis lib. ii. Aliud Demosthenis. Ego uero sub scripto utor: Caulicidis succū, coronopodis succū, chamædryos succum, æquis portionibus excolaro, sicato, collyria formato, ac uitor. Si uero liquido uti uoles, cum melle tritis utere. Aglaide liquidū ad principium suffusionis. Floris aeris obol. v. pipe ris obol. v. croci drach. ii. castorij drach. ii. sellis galli drach. i. omphacij drach. iiii. & dimidiā, spicæ nar di obol. i. lapidis hæmatitæ obol. ii. spumæ nitri obol. ii. floris salis drach. x x x ii. opobalsami drach. x x x ii. mellis quincuncem. Omnia trita in argenteo uase reposito. Erasistrati pandrestos liquida cō posito. Ad inflationes pruriginosas, & lippitudi nem scabram, aures purulentas, ulceras ægre recipiē tia cicatricem, cynāchen siue anginā, & ad nomas in ore ac pudēdis. Aeris usi drach. ii. myrrhæ drach. iiii. misyos tostī drach. iiii. piperis drac. i. croci sesqui drachmam, uini austeri uiperis cochlearia. iiii. palse cretici cochlearia ii. trita rursus terito cum uino, & ubi id combiberint, passum adjicito, & unita in greo uase ad mollem ignem coquito, usq; ad mellis spisi tudinē, & in ænea pyxide reposito. Alia liquida ex succo uerbenacæ. Facit ad hebetudinem uisus, pu pillæ debilitatem & obfuscationē, facit & ad corro sios angulos, ad tenuem fluxum, & inchoantes suffu siones: Fellis capræ drac. viii. mellis Attici sexuncē, lycij indicī drach. iiii. piperis drach. iiii. succi uerbe nacæ rectæ deuncem, & succi succi drach. viii. piper tufum ac angustissimo cribro excretum, postea diu in mortario terito, & sicco succo adiecto, simul teri to. Deinde etiā liquidum succū, & mox lycij addi to. Et ubi leuigata fuerint, mel adjicito, & mox fel ipsum & unita ex dpe, ac utere. Quidā ipsam herbā, uerbenacā dico, tūdunt ac cribrāt, & drac. viii. adjic iunt. Si uero siccius medicamentum euadat, colly rium efformato ac uitor. Siccum cassij, ad uisum acueudū & ad glaucedines, antequas lippitudines, uis us hebetudines, ac obscuraciones. Fel taurinum totū in ænea pyxidem euacuatum, ad dies x. finito; dein de trita adjicito, croci, myrrhæ, opobalsami, singul. drach. i. piperis grana x. mellis Attici duplum fel lis. Et omnia simul trita in uas æneum inijecto, & ad mollē cinerē ad mellis spissitudinem coquito, & in ænea pyxide reposito, ac uitor uelut bono. Si mul enim ut illitum est, efficaciam suam declarabit. Alia liquida Bolæ inscripta, ad suffusiones. Fellis fe lis partem unam, mellis Attici duplum, succi hiteræ cij partem mellis mensuram, misce & utere. Alia ad suffusiones celebres. Fellis coruorum recens tum trientem, sagapeni perlici drac. i. succi cyrenai ci unc. i. opobalsami unc. i. mellis dodranē. Alia ualde celebres, ex cuius usu succellum habui. Fellis capræ drach. iiii. opobalsami drach. ii. croci drach. ii. spicæ nardi, cassæ, lacrymæ oleæ æthiopice, alu minis scissi, medulæ struthocamelis, myrrhæ, singul. drach. i. mellis unc. x viii. præparato diligenter, & reposito in pyxide aeris cyprij, ac utere. Alia. Theriaces Andromachi drachm. iiii. succi cyrenia ci drachm. vi. opobalsami drach. ii. mellis non fu mosi drach. v. Theriacam primum uino ueteri dule ci dissolue, & opobalsamum ac mel adijce, & utere.

Alia

Alia liquida Apollonii, ualida cōpositio ad suffu-  
siones. Sagapēti drach. i. succi cyrenaid obol. ii. ue-  
rari albi drach. i. x. rutæ syluestris drach. i. spumæ  
nitri obol. iiii. mellis quadratē. Alia. Ompha-  
cij drach. i. myrrhæ drach. i. salis ammoniaci drach.  
i. opobalsami, lachrymæ oleæ Aethiopiciæ, ammo-  
niaci thymiamatis, singulorū drach. i. fellis hyenæ  
drachm. ii. Excipe melle & utere. Alia. Fellis hye-  
næ, adipis uiperæ singulorum sesquidrachm. 3, croci  
drach. i. omphacij drach. i. opobalsami drach. i. myr-  
rhæ drach. i. ii. & dimidiā. Mellis quantum satis  
est. Alia, ad suffusiones, etiam si fuerint diuturnæ.  
Lapidem Scyticum cum felle aspidis tritum illine.  
Breui liberat. Sit autem Aspis quæ Acōtis appella-  
tur. Fel eius reperitur ad dorsum hepatis annexum.  
Alia, ad omnem usum hebetudinem ac suffusiones,  
facit etiam ad palpebras pungentes pilos producen-  
tes. Mellis sextantem, opobalsami drach. ii. myrrhæ  
drach. ii. succi cyrenaid drach. i. opobanadis drac. i.  
utere. Alia, ad suffusiones, ut æger intra quinq;  
dies usum recipiat, adeo magnū ac admirandū auxi-  
lium est. Facit etiam ad asperitates palpebrarum. Et  
raro quis tale habere potest. Adipis uiperæ, fellis  
galli albi, floris æris, succi rutæ syluestris, lactis cani-  
ni, opobalsami, æquis portonibus tritis utere. Alia  
quando uero pro æris flore, atramentum futorium  
coniūdo. Alia liquida nigra. Ad hebetudines, &  
fluxiones, ac affectiones. Clauorum caligariū uete-  
rū prætorū ac probe ficatorū librā i. in sextar. i.  
acetū acerrimi mittito, & per dies quinq; sinito. De-  
inde in olla fictili aut ferrea, lento igne donec ter ebul-  
liat coquito & excolato, & mellis despumati & co-  
lati lib. i. adjicito, & ad mollem ignem usq; ad strig-  
mentū spissitudinē coquito, ramulis fortibus ab-  
sintij tribus simul colligatis agitando, Deinde ubi  
coactū fuerit medicamentum, atramenti futorii le-  
uissimē triti unc. i. inspergeto, & ac uisitor per spicilli  
nudeū angulos inde cōtingens. Alia repellens flu-  
xiones, & detergens oculorū tunicas. Attenuat etiā  
deatrices, & forinsecus supernæ palpebræ illita re-  
pellit fluxiones, si statim ab initio illita fuerit. Melā  
terre, uelut sū diximus de claus, præparatæ, & mela-  
lis parē mensuram, & succi foenigræci tantundem, si  
mul mixta & excolata, ad leuē ignem coquito, asī  
due agitando donec mellis cōpagem acceperint, &  
repositis utere. Cæterum foenigræci succum præpa-  
ra uelut dictum est in ulcerū oculorū tractant. Sed  
& dū excolas foenigræci succū, ne exprimas ipsum,  
sed ipote desuente inije. Si uero ubi paratū fuerit  
pharmacum & frigidatū, grumi in ipso fuerint,  
totum paulatim in mortarium transfundito, & dis-  
solutis grumīs reposito ac uisitor. Alia liquida,  
ad scolas eminentias, & omnem carnis exuberan-  
tiam, & ad carnis in angulis incrementum, & ad in-  
cipientes lippitudines. Misfys tosti drach. viii.  
myrrhæ drach. ii. mellis quod satis est. Alia. Mis-  
fys tosti drach. vi. atramenti futorii drach. iiii. myr-  
rhæ drach. iiii. mellis quod satis est. Orisbali li-  
quida ad suppuratos ex ulceratione. Atramenti fu-  
torij drach. viii. croci drach. viii. myrrhæ drach. iiii.  
mellis lib. i. Alia liquida ejusdem. Mellis sextan-  
tem, opobalsami drach. ii. succi cyrenaid sesquidra-  
chmam, opoponacis sesquidrachmam. Ee eodem  
liquida Balsi, ad suppuratos oculos. Croci, aloës,

myrrhæ, singulorum sesquidraciam, uini quadran-  
tem, mellis sexuncem; Crocus teritur cum modico  
uino: Deinde aloë & myrrhæ, & ubi ad compagem  
redacta fuerint, inspisata melli adijciuntur, & unita  
reponuntur in uitreo uase. Vtere hoc bis illinens in  
die, aut si res urgeat, etiam ter, & oculum deliga. Re-  
purgat, incarnat, deatricem inducit, usque ad finem  
illita. In plerisq; uero post repurgationem, ad colly-  
ria transitum, & maximè id quod inscriptum est  
scutulare, capræ faciem præferens. Alia liquida  
experimēto cōstans. Succū uerbernæ rectē, lycij in  
dic, equales partes, hoc est, sing. unc. i. mellis tantū-  
dē. Alia liquida ex adipe uiperæ. Mirificē facit ad  
incipientes suffusiones, & hebetudines oculorum fa-  
nat. Succū rutæ, opobalsami, succi fœniculi, succi  
cheloniz circa sepes nascentis, adipis uiperæ in du-  
plid uase eliquat, mellis non fumosi, singulorum  
æquas portiones simul mixtas per purum linteum  
excolato, & utere cōfidenter, ita ut aliquādo mellis  
sesquidraciam, & reliquorum unc. i. coniicias.

Collyria ex croco, & ex succis diuersa. Cap. c.  
Collyrium ex croco ad initū lippitudinū. Glaucij  
drach. xiiii. sarcocollæ drach. xvi. croci drach.  
viii. gummi drach. viii. tragacanthæ drach. iiii.  
Arida omnia trita ac leuissimā facta, tragacantha  
madefacta excipe. Aut sic præpara. Sarcocollam  
aqua terito, deinde glaudū cribratū adjicito, ac rur-  
sus terito. Deinde crocū siccum leuissimē tritum, &  
tragacanthā siccam in tenuissimū pulullū redactā,  
& gūmi similiter insperge, quo eadē die aut postea-  
ra in collyria redigatur. Nam collyria diu in morta-  
rio manentia nigrescūt, & uires immutat. Vere autē  
ipso, aquosum insundēs per ouū, lippitudine incipit  
te. Incipiente uero declinatione crassum instilla. Con-  
stāt autē declinatione fierē, cū aqua illine. Aliud  
ex myrrhæ. Glaucij drach. xlviii. sarcocollæ drach.  
xlviii. croci drach. xiiii. opij drach. vi. myrrhæ  
drach. vi. tragacanthæ drach. xlviii. lapidis hæmatitæ  
drach. vi. gūmi drach. xvi. Excipe aqua. Visus est per  
ouū. Aliud Phosphorus appellatur, ad dolorē, &  
omnē inflammationē, & intēos humorū influxus.  
Glaucij drach. xiiii. sarcocollæ drach. viii. croci dra-  
chi. opij drach. viii. myrrhæ drach. viii. misfys  
usti drach. viii. gummi drach. xii. Excipe aqua.

Aliud Eucherā colore bono dictū. Facit ad eā  
quæ Phosphorus. Cōmodat & asperis palpebris.  
Est & pueris cōmodū. Glaucij drach. xiiii. sarcocollæ  
drach. xii. croci drach. xiiii. opij drach. vi. myrrhæ  
drach. vi. hæmatitæ drach. vi. tragacanthæ  
drach. xvi. gūmi drach. xvi. Excipe aqua, & instilla  
in principio per ouū. Aliud dolorē extēis ex suc-  
cis ad omnē doloris uexationē. Somnū inducit cōse-  
stim. Glaucij drach. xlviii. sarcocollæ drach. xvi.  
croci drachm. viii. opij drachm. iiii. Lycij indic  
drachm. iiii. succi rosarum drachm. iiii. succi man-  
dragoræ drach. iiii. succi hyoscyami drach. iiii. succi  
cicutæ drachm. iiii. tragacanthæ drach. xvi. gummi  
drach. xlviii. Excipe decocto melliloti. Componi-  
tur autem hoc modo. Acæpe melliloti lib. i. aque  
pluuialis sextar. i. Coquito ad tertias, & excolati-  
quorem ad pharmaci præparationem. Collyrium  
ex succo polygoni. Succū polygoni sexuncem, lyc-  
cij indic drach. vi. aloës drach. iiii. myrrhæ drach.  
iiii. thuris drachm. iiii. opij drachm. iiii. acaciæ ni

græ primariæ drach. x. ii. Vini ueteris odorati quā  
rum satis est. Facit ad omnes in oculis affectiones, re  
primi fluxiones, & sedat dolores. Amar autem bal  
neū. Quare ubi illi uisiti, lauari iubet. Facit & ad ulce  
ra. Collyrium ex succo Rhamij, ad chemofes &  
dolores, de quo quidam magnopere gloriantur. Aë  
ris sextantem, cadmiæ sextantem, opij sextantem,  
aloës scrupu. x. ii. croci scrup. x. ii. acaciæ bessem, gū  
mi bessem, succi fructus rhamni lib. i. Aque quantū  
satis est. Si uero abundas, succum fructus totum inij  
ce, & gummi aqua macera. Collyrium est succo  
uerbenacæ, quod maximas humorum influxiones  
intra secundam illidionem exolit. Croci drach. i. ii.  
meliloti drach. vi. glaucij drach. x. ii. opij scrup. i. ii.  
amylī drach. i. ii. gummi drach. i. tercio, & succum  
uerbenacæ rectæ affundito, efformatoq; ac utitor.  
Est & alia efficax compositio, ut uix credi possit, fa  
cit ad lippitudinem, tumores laxos, & inflaiones,  
omnemq; humorum influxionem, & desperat in  
oculis affectiones intra tridū remouet. Croci drac.  
x. i. ii. amylī drach. x. ii. glauci drach. x. vi. albuminis  
oui drachm. i. ii. tragacanthi drachm. i. ii. tere, & suc  
cum uerbenacæ rectæ affunde, efforma q; ac utere.  
Collyrium ex succo fœniculi. Cadmiæ dodran  
tem, sitibij bessem, misfyois crudi sexuncem, ompha  
ciss sequiunciam, chalcitidis unc. i. croci sesquidra  
chemam, solij unc. i. succi fœniculi bessem. Et rursum  
aliud fœniculum cum aqua pluuiali decoquiro, &  
cum eo decocto prædicta terito ac efformato. Hoc  
multū præparatum habent.

Collyria unus dici, monohemera appellata, Cap. ci.  
Collyria unus diet cum candido oui illita, plerūq;  
statim ab initio lippitudines ab his illitis humorum multi-  
tudo factas curant. Reuera enim non parum saepe  
hæc magnas inflammationes mitigauerūt, ut in ues-  
peram quidem homo balneo usui sit, postera uero  
die collyrio nardino illitus fuerit ad instauratōē  
ac corroboratōnem. Ammisceatur autem ad nardi-  
num in prima illitione, parum quiddam de acribus  
ac sistētibus appellatis collyrijs. In secunda uero illi-  
tione, paulo amplius quiddam de isidem. Sufficiunt  
enim duæ pharmaci adhibitiōes, & deambulatō  
cula aliqua non multa ante balneum, ad perfectam  
restitutiōem. Collyria igitur unus diet, quæ pri-  
uatim seculenta nominantur, multam habent acaci-  
dam. Quædam uero aut omnino modicam, aut  
omnino non habent. Complectuntur autem in se,  
alia æris squamam, alia æstus uisum modicum, cum  
multis alijs quæ moderatè adstringunt, & conco-  
quunt ac discutiunt. Talia autem sunt, crocus, myr-  
rhalydium indicum. Sed & castorium ac thus citra  
adstrictionē concoquunt, simulq; discutiunt. In qui-  
bus igitur adstringentia prædominantur, plurimum  
qui liquorem, & parum de pharmaco esse oportet,  
& præsertim si quid ex metallicis pharmaco in se  
complectatur. In quibus uero crocus, & myrrha, ca-  
storiumq; ac thus, & lydium prævalent, paulo cras-  
sior pharmaco utendum est. Fomentum præterea  
omnino adhibendum est ipsis per spongiam, si qui-  
dem medicis sit dolor, semel aut bis in die: Si ue-  
ro uehementer dolor urgeat, præstat ter aut qua-  
ter, & sæpius uisui in longis præsertim estuius diebus.  
Fiat autem fomentum per meliloti ac scenigræci de-

De collyrijs sistentibus. Seueri.

Collyria quoq; que fistenda appellantur, repulso-  
ria sunt. Siftunt enim inordinatum fluxionis impe-  
tus. Et quaedam ex ipsis Hermolai uocantur, quae-  
dam uero Hexacontarchia, ex eo uelut puto, quod  
intueris ipsorum apparatus sit sexaginta drachma-  
rum. Quaedam autem Hecatontarchia. Multae uero  
sunt etiam horum materiae, ob quorum copiam medi-

cus indignatus, uelut in pelago uertigine affectus, à scopio aberrat. Oportet igitur omnium facultates discernere, & ad unum finem horum efficacias adaptare. Nolle enim oportet quodd omnia sistentia collyria frigidificat & adstringit, alia magis, alia minus. Sed & resiccat aliquo modo. Proinde ad calidiores lippi tudines talia comodant, non tamen statim à principio, priusquam concoctio apparuerit. Optimum uero & admirandum nobis uisum est: Album Seueri collyriū, quod ex foenigræci succo præparatur, & cadmia, & cerusa, & tragacantha. Et quod post ipsum scriptū habetur. At ubi ad concoctionem perducta est affectio, rursus ex multis sistentibus commodum reperimus Hecatontarchiū, & adhuc magis ipso, id quod post ipsum scriptum habetur. Recipit autem Hecatontarchiū: Aeris drach. x. ii. cadmiæ drach. x. v. myrrhæ drach. iiii. acaciæ drach. x. x. ii. opij drach. iiii. gummi drach. x. x. ii. Quidam etiā croci drach. i. Excipe aqua. Hoc collyriū aquosum ad illitionē assumptū, ad complicatas affectiones commodum comperit est, in quibus est inflammatio, & distensio, & fluoris influxio. Attenuat enim palpebras, & ipsarum densitates ac aspritudines exaequat, cum aqua illitū. Sed & uisus hebetudines sistit, adstringens ac uelut exprimens incubentes oculo humores. In his tamen qui subitili oculorū sensu præditi sunt, cū oī candido collyriū diluere oportet. Si uero oī candidum desit, panem purū non aridū, neq; muli salis partem, aqua maceramus, & aquā excolatā ad illitionem accipimus. Sin minus, farinā purā madefacimus excolamusq; ac cremore utimur. Conuenit autem ut ne acueratim auxiliorū mutationes faciamus, neq; aliud illinamus, & aliud superillinamus. Oculis enim à peregrina innouatione magis perturbatus infuria afficitur. Itaq; hecatontarchio, uelut dictum est, utendū est ad complicatas affectiones, ita ut aquosum ipsum faciamus in usu. Hic enim est admirandus ipsius ductus. Est & aliud collyriū sistens, ex eadē materia constans, sed dissolutius solum in apponderatione habens. Excedit autē præcedens in sua actione. Vidimus enim operum ipsius euentum. Sed & hoc à uulgo medicorum ignoratur. Accipit autē, Aeris usi quadrantē, cadmiæ quadrantē, opij, myrrhæ, singulorū drach. iiii. acaciæ, gummi, singulorum septuncem & undā dimidium. Excipe aqua. Hoc collyrium inenarrabilem quandam uim habet, & tempestiue adhibitum, desperatas affectiones sanat, & graues dolores mitigat ac sedat. Tempestus autem adhibitionis eius est, lippitudinis uigor, quando concoctio facta fuerit, & gramæ in oculo conspectæ, & uelut subueritum quiddam in oculo apparuerit. Siue enim chemosis fuerit id quod affligit, siue palpebrarum inflammatiō, cōgruum est ipsis hoc auxilium. Tantam enim quietem ex eius usu ægri consequuntur, ut quum antea diu uigilias tolerarint, statim ab illitione somnū allequantur. Con siderent igitur ad pharmacum accurre, considerans nunc tenuis lacryma post collyrii illitionem defluit. Habebis enim & in hoc successus signum, si omnino non post illitionem lacryma defluit. In quibus enim ex prima illitione lacryma sistitur, sed in adstricti permanent, & uelut somnus succedit, in his statim sanitas expectanda est, ut non opus sit secunda illitione. Si uero adstrictio fiat in prima illi-

tionē, insundendum est ipsis oī candidum per se moderate calefactum. Verum in secunda illitione aut tertia, ab eo symptomatic accedente liberabuntur. Primum enim oculus uelut peregrina offensus, mordetur: Deinde uelut aduersus, magis deflectitur. Pruritus enim modicus ipsis oboritur cū quadam uoluptate. Atque hoc est signum successus. Nā corpora in profundo liberata, causas ad superficiem propellunt. Præcipiendum est autem, ut quibus illitum est pharmacum, oculos ne aperiant ante collyrii concoctionem. Commoti enim meatus rarefiunt, & collyrium ad profundum cōdescendens, mordacitatem inducit. Post concoctionem autem collyrii spōgias adhibere oportet, nō magno facto somito, & ipsū collyriū aquosius illinere. Distenditur enim palpebra in crassioribus illitionibus, ut ægre ferat æger, & palpebræ grauentur. In principio igitur cū oīo illinatur aquosius dilutum. (At uero coactio eius fiat in feruida core, calefactum enim crassius se ipso euadit). Nam si adhibitiū in dolore admiradū collyrium comperit est. Etenim ex hoc ductu etiam paruā in ipso apparētē adstrictionē penitus excludimus. In uigore uero itidem cū aqua adhibetur. In dedinatione autē cum aqua, & sub palpebrā illinatur. Etiam si enim densitas relicta fuerit, & hanc itidem sanat. Magnopere quoq; pueris confert. Curat enim etiā horum ardores. Possemus porro plura auxilia recensendo, maiorē legentibus difficultatem parere, uerum quā paruo labore susceperimus, imō potius experientia inuenerimus præscripta collyria, efficacias ipsorum simul cū præparationis modo candide exposuimus. Collyriū sistens ex oleo. Orisali. Cadmiæ usitæ & lotæ drach. x. i. aeris usi & loti drach. viii. opij, myrrhæ, singulorū drach. x. acaciæ drach. centum, gummi drach. centum uiginti. Terito ex aqua, & ad expendendum adijce olei omphacini quadrantē, & drach. iiii. Adhibetur in principio aquosum cum oīo. Aliud ex oleo, uelut expertus sum, facit ad principia lippitudinis, & fluxiones, & ueteres affectiones, & ad corrosas palpebras. Cadmiæ drachm. x. x. iiii. aeris drachm. x. x. iiii. myrrhæ drachm. vi. opij drach. i. acaciæ, gummi, singulorū drachm. x. lvi. olei omphacini sextantem. Terito cum aqua. Collyrium Scutulare appellatum, cū præ faciem præferens, & sistendū uim habēs, in principio quidem cum oīo crassum, & ad dedinationes similiter. Ad uigores autem aquosum. Facit mirifice ad suppuratos oculos, & fordida ulcera paulatim repurgat, & dolorem euestigio eximit. Cadmiæ sesquiunciam, aeris sesquiunciam, croci drachmas iiii. aloës besselē, lycij indicī sextantem, acaciæ sexuncem, opij sesquiunciam, myrrhæ drachm. iiii. tragacanthæ unc. i. gummi sexuncem. Hermolae paruos. Cadmiæ unc. i. croci drachm. iiii. myrrhæ drachm. iiii. aloës drachm. viii. acaciæ drachm. viii. gummi drachm. x. Excipe aqua. Vere hoc ammixto alijs collyrijs lenibus, & insunde in principio cum oīo. Hermolae magnus. Facit ad prædicta multo melius. Cadmiæ besselē, spicæ nardi sesquiunciam, aeris sesquiunciam, croci trientem, aloës besselē, lycij indicī sextantem, acaciæ sexuncem, opij trientem, myrrhæ trientem, tragacanthæ unc. i. gummi sexuncem. Excipe aqua. Collyrium Olympionid. Facit ad maximas doloris

uexationes, & chemosēs, & in summa est ex collyrijs prosperi successus, statim enim liberat. Cadmiæ lotæ drachm. vii. stibij loti drach. viii. aloës drac. viii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. iiii. opij drac. iiii. gummi drach. viii. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura uero crassior sit. Ego pompholygis drachm. iiii. & thuris drachm. iiii. adijcio. Collyrium Ericerum Achariston appellatum, ab erica, & dignæ gratiæ desperatione. Facit ad maximas humorum influxiones. Ex huius usus in Aegypto successum sentunt, præsertim in aghostoribus corporibus. Cadmiæ drachm. xvi. æris uisti ac loti drachm. viii. opij drach. iiii. seminis ericæ drach. iiii. acaciæ drach. viii. myrrhæ drach. iiii. gummi drach. xvi. Terito cum aqua & excipe. Vfus est cum lacte muliebris. Temperatura sit media. Vbi uero circulos affectio est, à collyrio abstinere oportet. Ego porro hoc usus sum. Cadmiæ drachm. xvi. æris uisti loti drachmas iiii. seminis ericæ drach. ii. opij drac. i. myrrhæ drachmā i. acaciæ drach. i. gummi drac. viii. Excipe aqua. Vfus in principijs sit aquosus, & lauato. In declinationibus autē crassum cum ouo ille. Aliud Ericerum, quod cum magno labore accipi, uelut magnū donum. Facit ad prædicta mulrō melius. Et ad asperas palpebras, & ad ipsorum debilitatem. Si non prius mercedem acceperis, ne illinas. Cadmiæ drach. vii. æris uisti drach. iiii. chalcididis crudæ drach. viii. aloës drach. vi. opij drach. iiii. croci drac. iiii. seminis ericæ drac. iiii. acaciæ drachm. x. gūmī drach. xii. Excipe aqua. Aliud Ericerum celebre, quod appellatur sissum Achariston, eò quod digna gratia ipsi rependi non potest. Facit ad fluxiones antiquas, & dolores maximos qui sunt circa ulcerationē, ab initio usque ad finem cum aqua cohibet diuturnos fluxus in ulcerationibus aquosum cum ouo. Aspritudines autē attenuat cum aqua, & albugines dedit, & diuturnas uisus turbationes sanat. Et post sublata pterygia commodū est. Attenuat enim pelliculas, & cicatrices planas efficit. Valde uile est in suffusis post perfuctionē. Per leuem enim adstrictionē, robur oculi addit. Est etiam pueris commodū. Cadmiæ drach. xvi. æris drach. iiii. seminis ericæ, opij, myrrhæ, singulorum drach. viii. acaciæ drach. iiii. gummi drach. viii. Huius equidem periculum ego non feci. Quæ uero de ipso dicta sunt, præstat id quod ipsum præcedit.

De lenibus collyrijs. Galeni.

Cap. ciiii.

Ex collyrijs lenibus appellatis quaedam terræ essentiam habent citra frigiditatem aut caliditatem manifestā, in medio quodāmodo horum consistentia. Et ex his ipsis aliqua, modica frigiditate aut caliditate participat. Aliqua uero omnino nullā talē uim præferunt. Totū itaque genus ipsorum obstruendi uim habet, contrariam his quæ ab obstrukione liberant. Qualis est Samius Aster appellatus, qui tenuiorum partium est quam terra simpliciter samia nominata. Et pompholyx lota, & cinis ipsius lotus. Et cadmiā uista ac lota. Huic autē parum quiddam facultatis extensoriæ adest, siue post uisionem, siue sine hac laetetur. Pompholyx autem & spodium modicam adstringendi uim habent, quemadmodū etiam uistū ac lotum plumbum. Est enim mordacitatis exors, habet autem & adstrictionis quippiam. Est & amyrum lene, & cerullā lota, uicina est facultati plumbi

uisti ac loti. Lene est item scenigræci decoctum. Et quod in ouis est album ac tenue. Et lac boni succi in horum genere esse putandum est, itemque gummi ac tragacantham. Ac stibium non lotum quidem, fortē adstringendi uim ostendit. Lotum autem exola uitur, ut propē mordacitatis exors euadat. Alerum porro genus est eorum quæ paruum habent mordacitatem, ex eo quod ammixta sunt ipsis quædam ex modicē adstringentibus; qualia sunt rosæ & thus, quum modicam quidem adstrictionem habeant rosæ, & parū de exterioria facultate ipsū thus. Quis autem moderatē calidum sit thus, ob id quandam concoquendi ac dolores eximēdi uim habet. Ex eodem uero genere cum ipso, in concoquendo ac moderatē discutendo, putandus est crocus, & myrrha, quæ inter se differunt, eò quod crocus moderatē adstringit, myrrha uero citra adstrictionē discutit, & humiditates non insensū resiccat. Adhibentur igitur à medicis lenissima ad affectiones ægrius curabiles, in quibus ulcus est aut solum, aut cum tunica corniformis corrosione, & uisiformis prolapsu, sanie mordacissima effluente. In his enim nullum aliud pharmacum conuenire uidetur. Quum adstringentia quidem effluentem saniem dedineant, & propter hoc ex mordacitate dolorem augent. Acris uero affectionem intendunt. Laxatoriorum autem ac discussoriorum pharmacorum facultas, euacuare quidem potest quod generatur; neque autem ulceratum renutrire, aut cicatricem inducere, neque quod prolapsum est reprimere ac concludere. Quemadmodū neque concoctoriorum facultas, etiam si concoquere affectiones non parum possit. Quid uero dicere amplius opus est de pharmacis acidis aut amaras uires habentibus, quod huiusmodi affectiones mordent ac exacerbant? Ad maiorem autem malignitatem procedunt, quæ nitrosam ac salisam uim habent. Ad has igitur affectiones conuenire uidetur relatorum lenium pharmacorum genus, quod citra mordacitatem curare potest ulcera citi fluxione, per multum tempus uisarios humores in affecta parte consumens ac resiccās, qui sanē uisarij humores bonum sanguinem locis influentem corrumpunt. Vocantur autem talia collyria à Medicis Libyana & Cygni, adhibentur ipsa oculis trita cum lacte mulieris boni succi, eò quod uitare cupiunt obstruētiā uim ouorum. Quum enim serosa quædam exterioria pars in lacte continetur, usus ipsius congruus sit ad propositam curationem. Vlcera enim quæ impletionē indigent, extensorijs citra mordacitatem opus habent. Si uero non affuerit tale lac, per scenigræci decoctum talia collyria terere præstat, quum etiam ipsū aliquam extensoriā uim habeat. Proinde quæ spodiaca ac tephrica collyria, à cinere & spodio appellantur, communem habent uim leniendi ac frige faciendi, & moderatē mordacitatis exortem.

De lenibus ac albis collyrijs.

Cap. ciiii.

Aliud porro est album collyrium, quod multos later, ob præparationis utilitatem, putaturque esse à pleuriscis hoc nihil posse. Magnā uero ex hoc utilitatem percepi ad propositam affectionem. Egregiē itaque facta ad omnem calidam lippitudinem. Efficax est etiam ad pruriginosas ac corrosas palpebras. Nos enim sepe multis perpetratis in tali interperie, nullū successum habuimus, sero autē aliquando huius copiam adepti

adepti, magnam uim cōperimus in ipso, in aegrē curabili ac ferē incurabili affectione. In tantū enim mitigatus est eger, ut ex deo esse collyrium diceret. Sed & ad suppuratos oculos eximīe facit. Resecat enim humorē ipsorum dira mordacitatem in breuī tempore, & oculum imperturbatum conseruat. Curat etiam compēdiō rubores sub paruis angulis in albo oculi sientes. Adest autem ipsis iuxta medium, uelut pustula quaedam, quā etiam totus rubor cōtingit. In prędictis igitur affectionibus, inter quas etiā ulcerationē posuimus, eximīe facit, ut neq; foenogræco opus habeamus. Nam & hoc in collyrij compositionem recipitur. Vtimur autē ipso aliās aliter, in doloris uexatione, cum oīi dolo: si enim ipsum statim mitigat. In quibus autē dolor non pręualet, palpebræ uero crassę factę sunt, etiam cum aqua infundimus. Aliquando etiā illinimus. Et in summa ad omne lippeudinis principiū, reliquam collyriorū materiam superflua ducimus. Excedit enim uī sua omnia eiusdē generis. Est enim lenius ac doloris magis mitigatiuū quā alia etiā enim opium recipiētia & amyli, & quandoq; etiā myrrham, adstrictiōnem aliquā inducunt. Hoc autem collyriū ab his liberum est, nam croceū excedit in efficacia, & ad feruores ac ardores palpebrarū facit. Et ad solis æstus. Sed & tennes ac acres fluxiones obtridit cum aqua illitum, aliquando & cū rosarum decocto. Et glauicos oculos habentes, & eos qui prominentē habent crystallini humoris sitū, bene illustrat aquosum infusum. Et in quibus oculorum natura nō fecit adstrictionē, his omnibus opimū est auxilium. Compositio autē collyrij hæc est. Cerusę lib. i. cadmię semissimē, tragacathę quadrantē. Preparatur hoc modo: Cadmiā racemosa prunis ignitis obruimus, & flām uentilando excutimus. Et ubi ignita fuerit cadmia, ablata lacte asinino extinguiamus. Deinde rursus prunis ipsam obruimus, & ignitam rursus lacte extinguiamus. Et tertio idē facimus. Deinde rūdīmus & angusto cribro excernimus, & in profundū quoddā mortariū cōiectā, aqua fontana pura affusa terimus. Et postea desiderē sientes, per aquę fusoriū instrumentū, aquā unā cū superflua concretione extrahimus, & rursus aliam puram aquam infundimus, & ubi satis cōtriuimus, & rursus desiderē stuiamus, rursus aquā per idē instrumentum extrahimus. Et hoc sæpe facimus, donec non amplius concretio aquę superstat. Postea uero cadmiā exactē siccamus, & semissimē siue sexuncem apponderamus, in plumbū in mortarium collyriacum cōiectā, aqua pluuiā purissimā affusa, exactissimē terimus, ut nulla asperitas linguę occurrat. Atq; sicad cerussam prædicto modo ablutam, cadmiā adiungimus, & ipsa ad dies x. v. cū aqua pluuiā cōterimus. Et tunc tragacatham alba ac lucidissimam accipimus, eamq; lotam, & reiecto quod in ipsa est arenoso, in fornigēci decocto maceramus, & per diem ac noctē solum macerari sinimus. Plurimum autem iniicere oportet de fornigēci succo, preparato uelut dictum est in principio huius Sermonis capite decimo quinto. Nam à tragacatha, uelut à spongia, absorbetur. Postera igitur diē in mortario puro paulatim tragacatham leuigamus, & alia prius trita in mortariū adiungimus, & probe per mixta patinis utrius excutimus, & tenui lineo cōiecta, in locum humiditatis exortē, ubi uentus spirat, reponimus. Dehiscit

enim collyrium, & efformationem moratur, si in humido depositum fuerit loco. Non enim tantum temporis postulat ad contritionem, quantū ad efformationem. Est itaq; hæc collyrij præparatio. Et poteris ex hac methodo, ad eiusdē generis materias trāsire. Talia autē sunt libyana, & tephra ac spodiaca appellata, itemq; cygnaria, & alba quę ex rosīs, & quę ex coriandri succo præparantur. Quibus omnibus præferendum comperit est propositū collyrium. Optimum uero experientia iudicatū est & hoc, Cadmię usq; ac lotę uel dictū est trientē, cerusę similiter lotę unc. x. vi. amyli recentis unc. x. vi. opij drach. iiii. tragacanthę trientē; reliqua cum aqua terito. Tragacantham autem fornigēci succo diligētē uelut dictū est præparatā, macerato. Amylum uero neq; additū sit, neq; graueolēs. Aliud, Nisilamnon appellatū, tenerum, dolorē eximens, stupefactiuū, ex genere cygnariolorum. Facit & ad ulcerationes, post primū uigorē dolore præsentē crassum illitum. Cerusę lotę sexuncem, cadmię usq; & lotę trientē, pompholygis per linteum lotę sextantē, opij sextantē, tragacanthę sextantem, gummi sextantem, Excipe aqua. Aliud collyriū Asclepiadę dolorē eximens, facit ad fluxionē omnis generis, ulcera, doloris uexationes, pustulas, prolapsus, chemosēs, affectiones omnis generis. Cerusę lotę dr. viii. terrę samię drachm. viii. cineris pompholygis lotę drach. ii. tragacanthę drach. ii. opij drach. ii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Aliud Athanasia appellatū. Cadmię usq; & lacte asinino extinctā, ac lotę lib. i. opij quadrantē, cerusę lib. i. succi mandragorę lib. i. amyli ordeacei lib. i. Tere cum aqua, & ad efformationē adicere ouorū recentū albumina, quantū satis est. Collyriū, Cignus reginę, ad maximos dolores ac affectiones: Cadmię lotę drach. x. vi. cerusę lotę drach. viii. acacię flag drach. ii. opij flauī drach. ii. tragacathę drach. ii. gummi albi drach. ii. amyli drach. ii. Terito cū aqua. Et amyllum postremū insperge. Nā si morā traxerit in mortario, acēsit, & collyriū acre facit. Ad excipiendum uero adicere ouorū recentū quatuor candidū. Collyriū Bolę mitigat & cōcoquit omnē inflammationē. Cerusę tostę drach. xx. ii. croci drach. iiii. opij drach. mas quatuor, amyli recentis drach. viii. gummi drach. xx. ii. Excipe aqua. Aliud collyrium ex spuma argenti quod Augustū uocant. Spumę argēti usq; ac lotę sextantē, pompholygis lotę unc. i. cadmię usq; ac lotę sextantem, amyli sextantē, gummi sextantem, tragacanthę unc. i. Excipe aqua. Hoc maximum & dolores eximit, & fluxiones intercipit, & oculum imperturbatum seruat.

Collyria libyana, & tephra, ac spodiaca. Cap. cv. Collyriū libyanum Asclepiadę. Ad pustulas, epicaumata, ruptiones, ceclomata, oculos suppuratos, chemosēs, staphylomata, doloris uexationes, & affectiones. Deterit etiā cicatrices. Cadmię usq; ac lotę drach. x. vi. cerusę usq; ac lotę drach. x. vi. stibij usq; ac lotę drach. x. ii. amyli drach. x. ii. cineris pompholygis drach. viii. plumbi usq; ac lotę drach. viii. tragacanthę drach. viii. opij drach. ii. gummi drach. vi. Et ad excipiendū ouorū cadida viii. Oribasij inexuperabile, collyriū inquit, Philumētē tēnerū libyanū, ad suppuratos oculos, in uigore, ulcera, dolores, chemosēs, Cadmię, cerusę, pompholygis singulorum drach. x. vi. stibij drach. duodecim, amyli drach. x. ii. plumbi usq;



terre Samiæ, tragacanthæ, singulorū drachm. viii. gummi drach. vi. myrrhæ drach. ii. opij drach. ii. Excipe aqua. Vfus est cū lacte muliebri, aut cum ouo. Aliud Ilybanū Oribasij. Ad principia, & ulcerationes, Cadmiæ usq; & lotæ drach. xii. amyli dra. xii. plūbi usq; & loti dra. viii. cerusæ lotæ dra. viii. tra-gacanthæ drach. xvi. gūmi drach. xiiii. stibij usq; ac loti drach. xii. terre Samiæ, pompholygis lotæ, singulorū drach. viii. myrrhæ drach. ii. opij drachm. ii. Excipe aqua. Aliud collyrium, After Magni, quod preparari solet, Cadmiæ lotæ drach. xxxv. plumbi usq; ac loti drach. xxxvi. cerusæ lotæ drach. xxxii. stibij usq; ac loti drach. xiiii. pompholygis lotæ drach. xxxii. thuris drach. viii. terre quæ After apellatur drach. viii. myrrhæ, opij, singulorū drach. iiii. tragacanthæ, gummi, singulorū drach. xvi. amyli drach. xxxvi. Excipe aqua. Aclepiadæ, aser in exuperabilis, dolorem eximens. Facit ad doloris uexationes, pustulas, staphylomata, ulcera sordida & serpētia, facit ad inueteratas affectiones. Et cicatrices exterit. Cadmiæ usq; ac lotæ drachm. xvi. stibij usq; ac loti drach. xii. cineris pompholygis lotæ drach. viii. myrrhæ drach. ii. opij drach. ii. tragacanthæ drach. viii. gummi drach. vi. Excipe aqua. Aliud collyrium Vranium, uelut Oribasius habet, ad ulcera, pustulas, ruptiones, inuisiones, prolapsus, staphylomata, oculos suppuratos, corrosiones, nomas, carbunculos, & ad omnes magnas affectiones. Maxime conuenit ad ruborē ac glaucedine oculorū. In principijs aquosius infunditur. Quum autem tenuis fuerit & mordax & seruida fluxio, utere cū lacte. Vbi uero crassam fluxionē dissoluere uolueris, cū aqua. Cadmiæ usq; ac lotæ sextantē, squamæ æris lotæ trientē, terre Samiæ usq; ac lotæ sextantē, cineris pompholygis lotę unc. i. opij drach. vi. gummi trientē, stibij loti sextantē. Excipe aqua, & utere cōsidenter. Collyriū Spodiacū Demosthenis. Facit ad inflammationes & fluxiones, cadmiæ drach. xiiii. stibij loti drach. vii. cerusæ lotæ drachm. xiiii. terre Asteris drach. vi. thuris drach. iiii. opij drach. vi. gūmi drach. v. Terito cū succo soliorū oleæ. Succum autē sic facito. Tenera oleæ folia lauato, deinde in pila tundito moderata aqua affusa, ut sufficientem succū remittant, deinde exprimito, & per linteū purū excolato, ac utitor. Aliud Spodiaciū admirandū, tenerum, faciens ad fluxiones & epiphoras humorū impetuosas, ulcera, inuisiones, pustulas. Cadmiæ usq; ac lotæ drach. viii. stibij usq; ac loti drachm. ii. terre Asteris drach. iiii. opij dra. ii. gūmi dra. ii. Excipe aqua. Collyriū Tephron, inspicillat ac adglutinat tenues fluxiones uelut præcedēs. Optimū uero est hoc ad calidas fluxiones. Cadmiæ usq; ac lotę dra. x v. stibij loti dra. viii. terre Samiæ dra. vi. cerusę dra. vi. opij dra. v. gūmi dra. viii. ouorū recentū albumina sex. Excipe aqua. Collyriū Philagrii penitus lene. Obfuscat enim fluxionū mordacitatē. Quapropter confidēter ipso utendū est in acribus ac tenuissimis fluxionibus. Obundit enim has & reficac. Hoc Syricum aut Sandycē appellat. Pompholygis lotæ dra. x v. cerusę usq; ac lotę dra. x v. terre Asteris, plūbi usq; ac loti, singul. dra. x v. gūmi albi dra. x. laque pluuialis purissimæ nō olentis quod faris est. Singula seorsim usq; lota, siccata, ponderata, adijcito ac terito. Et in sine gūmi addito, deinde amyli. Aliud

eiusdē, ad ulcerū repletionē, præsertim malignorū. Cadmiæ usq; ac lotæ drachm. x v. pompholygis lotæ drach. x v. tragacanthæ dra. x. Excipe aqua. *Collyria ex thure.* Cap. c. vi. Collyriū ex thure ad fluxiones, & chemoses, & caua ulcera. Cadmiæ drach. viii. thuris drach. viii. cerusæ dra. x. l. opij dra. v. terre Asteris dra. vi. gūmi dra. vi. Excipe aqua. Vfus est cū ouo. Aliud Deliacū inscriptum. Ad inuisiones, pustulas, chemoses, præsertim in his qui nullā omnino mordacitatē ferre possunt. Cadmiæ lotæ dra. viii. cerusæ lotæ dra. x lviij. thuris drach. viii. opij drach. vi. amyli dra. viii. gūmi dra. xvi. Excipe aqua. Vfus est cū ouo. *Collyrium Cleonis.* Cap. c. vii. Collyriū Cleonis, uelut Demosthenes habet, ad ulcerā pura & iam cicatrice indigentia, ex cuius usu nos ualde laudati sumus. Nam profundissima ulcera & pura celerimē replet, & compediō ad cicatricē perducit, tenuibus & obscuris cicatricibus relictis, & ulcera absq; inflamatione conseruat. Habet hoc modū. Spodij loti drach. iiii. plūbi usq; ac loti dra. iiii. squamę ferri stomomatis lotæ dra. i. gūmi dra. ii. Excipe aqua. Et utere cum lacte aut ouo. Viuius autem ipso, inquit Apollonius, in profundiore ulceraratione, cū cremore tragacanthæ aquoso. Quidā croci sesquidrachmā inijciunt, & pro spodio pompholygis, cadmiā ter usq; accipiūt. Est autem lene quidem & mordacitatis exors, uerū graue. Quare nunquam crasso ipso utendum est, sed aquoso. *Collyria ex rosis uiridia, ac alba.* Cap. c. viii. Collyrium Nili ex rosis, ad dolores, fluxionē tenuem ac multam, pustulas, prolapsus, & ulcera sordida, & palpebras asperas. Rosarū uiridiū resectis unguibus dra. xiiii. croci corycij dra. xii. opij drach. i. spicē nardi dra. i. gūmi drach. vi. Excipe aqua. Vfus est cum ouo. Temperatura sit liquidissima. Quādam etiam ad confusiones & pupillæ dilationem ipso utuntur. Collyrium ex rosis Diagoræ, quod Magnū appellatur, aut uiride ex septuaginta duabus rosarum drachmis. Ad chemoses, & doloris uexationes, pustulas, epicaumata, siue inuisiones, staphylomata, prolapsus, oculos suppuratos, fluxiones antiquas, lippitudines inueteratas, & affectiones ægræ curabiles. Rosarum uiridiū exunguiū dra. lxxii. cadmiæ lotæ dra. xiiii. croci dra. vi. stibij dra. vi. æruginis drach. ii. spicē nardi dra. ii. opij dra. iiii. myrrhæ dra. iiii. gūmi drach. xiiii. squamæ æris drach. ii. Excipe aqua. Collyrium quo usus est Florus in Drusi matre, quæ parū absuit ut ab alijs Medicis excæcata fuisset. Acaciæ drach. x lviij. rosarum siccarum drach. x lviij. meliloti dra. x lviij. spodij pōpholygis dra. xiiii. croci dra. xiiii. malorum mandragorę drach. xii. feminis hyoscyami drach. vi. opij drachm. vi. myrrhæ drachm. iiii. æris usq; drachm. iiii. gummi drachm. x. Vini fæleri heminas iii. aquæ pluuiæ heminas iii. Aequam & uinum misceto. Et in hæc rosas, melilotum, hyoscyami semen, & mandragoræ mala, aut si hæc non adsint, corticem inijcito, & ad triduum macerari sinito. Deinde expresso liquore ad phar-maci compositionem uitior. Vtere hoc uelut probatissimo. Aliud Philagrii ex rosis, ad inflammationes congruum, si supra relato leni Philagrii collyrio fuerit ammixtū. Rosarum uiridum exungulum

exunguium drachm. lxxv. aeris usti drach. xxxii. Tere cum uino odorato ueteri asfringente, & utere. Collyrium album ex rosis nostrum inquit Oribasius, ad uigores & ulcera, & oculos suppuratos, inustiones crustas, & ulceris sordes. Cadmiæ uste ac lotæ, stibij usti ac loti, rosarum recentium exunguii, singulorum drach. xvi. cerusæ lotæ drach. vii. croci drach. vii. opij drach. iiii. gummi drach. xvi. Excipe aqua. Vfus est cum ouo aut lacte. In declinatione cum aqua. Aliud eiusdem. Facit ad uigores. Cadmiæ uste ac lotæ, drachm. xvi. rosarum recentium exunguium drachm. viii. opij drachm. iiii. lactis drach. iiii. gummi drach. iiii. tragacanthæ drach. iiii. amyli drachm. iiii. Aliquij etiam sanij Asteris drachm. ii. Collyrium ex rosis album, quod cum hyoscyami succo præparatur. Cerusæ undas xxv. croci quincuncem, opij libræ i. myrrhæ quincuncem, rosarum uiridum exunguium lib. i. cadmiæ uste ac lotæ bellem, gummi libræ i. Cadmiæ, crocum, rosas cum aqua terito. Deinde cerusam adijcitur. Succos autem & gummi, in hyoscyami succo macerato, & efformato. Vere ad tenuissimas ac acres fluxiones, & in his quæ sunt cum ulceratione genrose repellit. Collyrium uiride ex Galbano. Ad doloris uexationes & affectiones ueteres. Cadmiæ lotæ drach. viii. spodiij loti drach. viii. aeris usti ac loti drach. viii. opij drach. viii. galbani drach. viii. myrrhæ drach. viii. gummi drach. viii. Excipe aqua. Quidam spodium non adijciunt.

Collyria diasmyrna, & chiaca appellata ex uino. Cap cix.

Collyrium diasmyrnum odoratum Synerotis, pharum cum accommodatū ad inueteratas affectiones. Facit & ad rheudas, hoc est, angulos antrorfos, siue carnis in angulo magno decrementum, & ad æglosas. Cadmiæ lotæ drach. xxviii. lapidis hæmatitæ loti drach. xxviii. spodiij pompholygis drach. xiiii. myrrhæ drachm. xlviii. croci drachm. xiiii. opij drachm. viii. piperis grana xxx. gummi drachm. vi. Terito cum uino ueteri asfringente. Vfus est cū ouo in recentibus affectionibus. Temperatura sit aquosa. Aliud Asclepiadeū Pacci. Ad doloris uexationes, fluxū tenuem & multū, inustiones, pustulas, pellicularum eminētias, aspritudines, diuturnas affectiones, & eos qui ad multis illirionibus læsi sunt, cōstitutum opitulatur. Cadmiæ lotæ drach. xii. Aeris usti drach. xii. croci drach. xii. squamæ aeris lotæ drach. xii. myrrhæ drach. iiii. lapidis hæmatitæ drach. iiii. spicæ nardi drach. iiii. piperis grana xiiii. rosarū siccarum drachm. iiii. opij drach. iiii. gummi drach. xii. Terito cum uino ueteri odorato asfringente. Vfus est cum ouo. Temperatura uero aquosa. Collyrium Iosophoton, hoc est, uiro par, ab aliquibus autem Isotheon, hoc est, deo par appellatum. Facit ad oculos suppuratos, & ulcera impura, ac caua, & fluxionum principia, præsertim in corporibus repletis, in quibus grammarum copia crassissimarum in oculis reperitur. Est & pueris commodum, & ad aspritudines bonum. Cadmiæ drach. viii. aeris usti drach. iiii. rosarum siccarum drach. iiii. croci drach. i. folij drach. i. lapidis scissi drach. i. myrrhæ drach. i. gummi drach. vi. Tere cum uino ueteri odorato asfringente, & utere in omnibus prædictis cū ouo aquosius per se infundens. Post perfectam uero resi

tutionem cum ouo dilutum illine per subiectionē, & lauto. Si uero asfringantur post illationem, cādidum oculi infunde. Verum ad attenuandas cicatrices, cū ouo aquosius illine. Quidā etiam piperis grana nouem scripturæ adijciunt. Nos autem in his pie per reijdimus. Collyriū Dionysius. Facit ad myoscephala, aspritudines, fluxiones, hebetudines. Maxime autē facit ad fluxiones inueteratas. Cadmiæ drach. xiiii. aeris drach. v. lapidis scissi drachm. iiii. lapidis hæmatitæ drach. iiii. calicæ drach. i. aloës drach. ii. croci drach. ii. spicæ nardi drach. iiii. folij drachm. ii. lycij drach. i. piperis grana xxi. opij drach. i. myrrhæ drach. iiii. acaciæ drach. ii. gummi drach. vi. Tere cum uino Chio, aut alio austero ueteri, & utere uelut efficacissimo, etiam ad oculos purulentos, & aspritudines, in principiis cū ouo, deinde cum aqua. Efficacia eius superat omnem pollicitationē, Collyriū Chiacum. Ex Demosthene, inquit Apollonius, & ad pura ulcera & proserpentia, & eminentias, & ueteres affectiones, a speras palpebras, sycofes, euerfiones, clauos, staphylosmata, omnes doloris uexationes, lippitudines scabras. Facit etiam cicatrices obscuras, & recentes ac crassas cicatrices attenuat. Oportet autem modō crassum, modō medium, modō aquosissimū sublinere. Et quandoq; ex interuallis, quandoq; assiduē. Facit ad carbunculos & suppuraciones: pus enim percolat. Et in summa ad omnia oculorū uitia optimū est. Spodiij drach. iiii. aeris usti drach. ii. croci drach. i. myrrhæ obol. iiii. opij tantundē, piperis grana xii. gummi drach. i. Terito cū uino Chio, aut alio austero ueteri. Aliud Chiacū Oribasij. Ad staphylosmata & oculos purulentos, ulcera pura & sordida, & ad antiquas affectiones. Cadmiæ, rubricæ sinopiceæ, gallæ omphactidis, croci, rosarū recentium exunguium, gummi, singulorū quadrantē, opij unc. i. Tere cū uino chio, aut alio austero ueteri maris exorte. In principiis ad cygnariū aut pelariū quoddā miscetur. Cicatricē quoq; optime inducit cū aliquo horū, & per se. Fulsit nostrum inquit Oribasius. Ad oculos purulētos, & magnas affectiones, & omnē ulcerationē, præsertim diuturnā: Rosarū exunguium sextatē, cadmiæ teneræ drach. xiiii. cerusæ drach. xvi. opij drach. xiiii. æruginis drach. xii. aeris drach. i. seminis cricæ drach. xii. stibij drach. viii. myrrhæ drach. vi. spicæ nardi drach. iiii. croci drach. iiii. acaciæ drach. iiii. nitri drach. iiii. lycij drach. iiii. aluminis scissi drach. iiii. chalcitidis uste drach. iiii. castorij drach. iiii. omphacij drach. i. gummi drach. x x xiiii. Terito cū uino austero ueteri odorato, & utere aquoso, per scenigræci succū, aut ouū diluto. In progressu uero crassius adhibe. Collyriū Aromaticū, ex Demosthene. Ad inflammationes ex humorū crassiorū multitudine obortas. Attenuat breui ac diffundit, & discuit humores. Facit & ad impura ulcera. Pompholygis drach. i. aeris usti drach. ii. myrrhæ drach. iiii. lapidis hæmatitæ drach. iiii. opij drachm. iiii. piperis grana xviii. croci drach. ii. gummi drach. iiii. Tere cum uino chio, aut alio austero. Collyrium Scyladium inscriptū, ex semine hyoscyami. Facit ad chemoses, & affectiones fluidas diuturnas omnigenas. Facit etiā ad staphylosmata, & repellit fluxiones. Primū cum ouo aquosum, deinde etiā solidum illitū cum ouo. Cadmiæ, aeris usti, lapidis hæmatitæ, chalcitidis uste, singulorū quadrantē, misyos sesquiuicā, ammoniac thymiamatis

raatis ſequiunciam, myrrhæ ſequiunciam, opij ſequiunciam, hyoſcyami ſemina undā unam, aloës ſexuncem, gummi ſexuncem. Tere cū uino auſtero. Aliud collyriū mirificæ faciès ad myocephala. Conſumit etiā pterygia, & carnis in angulo magno inflammētū deterit, itēq; cicatrices. Eſt & ad aſpitudines cōmodum. Cadmiæ unc. i. æris uſti unc. i. chalcididis crudæ unc. i. ærginis rafe drac. iiii. myrrhæ ſequidrachmā, croci drac. ii. ſalis ammoniaci drac. i. gummi drach. iiii. Terito cū uino auſtero. Collyrium Philagrii, de quo ita ſcribit: Tertium ab his eſt meum collyriū, quod appellamus Præſeruatīū, repellens in principio fluxiones, & roborare porēs debiles & læſioni obnoxios oculos. Quare non ſolum in principijs lippitudinis, ſed etiā ſanis, præſeruationis gratia ipſum adhibere oportet. Cythnorū, hoc eſt, floriū mali punice, qui floribus anemones ſimiles ſunt, drac. xx. v. acaciæ flauæ drac. x. x. v. glauci drac. x. vi. aloës drach. v. myrrhæ troglitidis drac. iiii. aramētū Indici drac. vii. ſoliū malabathri drach. i. omphacii ſicci drac. iiii. gūmi drac. v. opobalsami ad excipiendū drac. v. Terito cū uino uetere auſtero. Collyriū ex Bdellio & Styrace concoſtorium. Philagrii. Cuſus multā experientiā habeo, non ſolū probè concoquētis, ſed etiā læſiones ex frigore obortas citra inflammationem ſanantis. Bdellij drac. vi. thuris maſculi drachmas x. myrrhæ drach. x. farcoellæ drach. v. caſtorij drac. ii. galbani drachmas v. ſtyracis drac. v. croci drac. v. lycij drac. ii. ammoniaci thymiamatis drac. ii. gūmi drac. ii. Excipe aqua.

Collyria ad aſpitudines, & exteſoria. Cap. cxx. Collyrium ad aſpitudines Phœnicē appellatur. Facit & ad milphos, & diuturnas affectiōnes, & ad eos qui palpebras & angulos exacerbatos habent. Lapidis hæmatitæ uſti ac loti drac. xxxii. æris uſti ac loti drac. xvi. lapidis ſciſi uſti ac loti drac. xvi. ærginis drachmas ſedecim. Cadmiæ racemofæ drachm. iiii. opij drachmas ſex, chalcididis toſtæ drachmas quatuor, gummi drachmas xvi. Excipe aqua. Collyrium ad aſpitudines Mono inſcriptū. Lapidis hæmatitæ ſexuncē, lapidis ſciſi ſexuncē, æris uſti quadrantem. Cadmiæ lib. i. ærginis rafe quadrantem, chalcididis toſtæ undā unam, opij ſextantem, gummi ſextantem. Excipe aqua. Eſt & pueris cōmodiſſimum. Collyrium Theophilū, ad pueros mirificum, & aſpitudinibus cōmodum. Cadmiæ lib. i. æris unc. x. ærginis quadrantē, opij lib. i. gummi lib. i. Excipe aqua. Vſus eſt cū ouo in principio aquoſi. In declinatione uero cum ouo craſſius illuſit. Aliud collyriū, Xyſter à deradendō appellatum. Facit ad albugines. Cicatrices attenuat, & oculi imperturbatū conſeruat. Ammoniaci thymiamatis, miniſi ſinopidis, ſingulorū quadrantē, ceruſſæ, gummi, ſingulorū ſextantem, pumicis toſti unciam unā, excipe aqua. Collyriū aliud ad aſpitudines. Facit ad milphoſes, ulcera, foſſulas, ualde uetuſta uulnera, ſtaphylomata, myocephala. Lapidis hæmatitæ trientē, lapidis ſciſi trientē, æris uſti trientē, cadmiæ ſextantē, ærginis ſextantē, chalcididis uſtæ unc. i. opij trientem. Roſas uirides ſi aſuerint, ſin minus, ſiccās, per diē ad noctē aqua macerato, & cū expreſſo ac excolato cremore terito. Aliud collyrium Xyſter appellatum, celebre ad aſpitudines. Pumicis uſti, oſtreorū uſtorum, miſyos uſti, gummi a qua-

les portiones aqua excipe. Collyrium ad aſpitudines Eutonum, ab efficaciæ pertinaciā uocatum. Ex Oribasio. Aëris uſti drachm. x. x. iiii. cadmiæ drach. x. x. iiii. ærginis drac. ii. croci drach. iiii. opij drac. iiii. myrrhæ drac. iiii. gummi drachmas nouem. Excipe aqua. Egregiè facit ad aſperas palpebras ac calloſas, lippitudines ſcabras, euerſiones, fluxus diuturnos, citra ulcerationē, ammiro cygnario, aut collyrio ex croco, facit ad ulgores. Sit autem quod ammiſcetur decima ipſius pars. In ſumma palpebras euertere nō eſt opus, ſed ſimpliciter illinere. Hoc alij Harmation, id eſt, currum. Alij opithobares, à grauitate. Nos autem Eutonū uocamus. Aliud euſdem, collyriū exteſtorium, inquit, Gryali, ad aſpitudines ex duobus lapidibus. Hæmatitæ lapidis drac. xviii. ſciſi lapidis drach. xviii. æris uſti drach. ix. cadmiæ drac. ix. ærginis drach. ix. Chalcididis uſtæ drac. iiii. opij drac. vi. gūmi drac. ix. Tere cum aqua & illine donec tolerarit æger, nō conſtriciens palpebras, neq; ſubijciēs ſpecillū, ſed per ſpecilli nucleum explens oculum. Aliud euſdem, ad multas affectiōnes. Chalcididis drac. x. x. vii. cadmiæ drac. x. x. i. æris uſti drac. xvi. lapidis hæmatitæ drac. x. x. i. croci drac. xvi. miſyos drac. xvi. myrrhæ drachmas ſedecim, opij drac. x. x. iiii. gūmi drac. ix. Tere cū uino uetere. Collyrium ex oleæ ſolijs. Facit ad diuturnas fluxiones. Deprimit etiā aſpitudines, & oculū cor roborat. Syrici ſexuncē, æris quadrantē, opij trientem, gummi drac. viii. Foliorū oleæ teneroſi à ſtibus depuratorū drac. viii. Cum uino ſpathite teruntur folia exactè fibris exemptis, ita ut per ſe in mortario biduū probè teras, uinum paulatim ſerrans. Quum autē leuiſſima facta fuerint, es adijcitur, & ſimul diu terito, & ſeuiniſ affundito. Si enim ab initio inſuſum fuerit uinū, folia innatāta incontrita permanent. Contrito autē ære, ſyricū adijce, deinde opium, poſtea gūmi, & efforma, ac utere ab initio inſundens. In declinatione uero etiā illinens. Ego uero, uelut Demotheſtes iubet, folia in mortario mitto, ac cōtundo, uino ſufficiente paulatim inſtillato, ex primo cō ac excolo, & cum uino excolato reliqua tero, remittito foliorū reiecto. Collyriū Harmation, id eſt, Currus inſcriptum: quo uſus eſt Ptolemæus rex, Exterit cicatrices. Acuit uſum, & ad aſpitudines cōmodum eſt. Aëris uſti ac loti drachm. viii. ammoniaci thymiamatis drachm. viii. corſicis thuris drachm. viii. gummi drachm. viii. Excipe aqua. Vſus eſt cum aqua. Quædam deſcriptiōnes habent etiam ærginis drachm. ii. Aliud, ex lapide Hæmatitæ, ad uſu acendū, cicatrices & callos exteſit. Ammoniaci thymiamatis drac. x. x. iiii. æris uſti ac loti drac. x. x. iiii. lapidis hæmatitæ drac. x. x. iiii. ærginis drach. viii. gummi drach. x. x. iiii. Excipe aqua. Exteſtorium Oribasij. Facit in principijs, & ad chemofes, aquoſum cū ouo inſuſum. Cadmiæ drac. viii. æris drachmas duodecim, croci drac. iiii. myrrhæ drac. iiii. opij drac. vi. lapidis hæmatitæ drac. x. viii. lapidis ſciſi drac. x. viii. chalcididis toſtæ drac. vi. ærginis drac. x. ii. gummi drac. ix. Terito cum uino, & utere cum ouo. Collyrium exteſtorium Philagrii per ſe adhibitum, & cum collyrio ſupraſcripto Philagrii ex roſis. Aërginis drac. vi. pumicis drachm. x. vi. teſtarum ſeptæ drachm. x. vi. gūmi drachm. x. x. x. i. His ego inquit adijcitur, ſquam

433  
 squamæ æris drach. xvi. ubi fortius ipsum efficere  
 uoluero. Collyrium Rinema, hoc est lima inferis-  
 sum. Facit ad callosas affectiones, & cicatrices ex-  
 terit. Facit etiam ad suffusiones. Cadmiæ drachm.  
 xlviii. ammoniaci thymiamatis drachm. xlviii.  
 opij drach. xvi. aloës drach. xvi. opoponacis drac-  
 bani drach. xvi. aloës drach. xvi. opoponacis drac-  
 bani drach. xvi. aloës drach. xvi. salis ammoniaci drac-  
 xlviii. fellis taurini drach. viii. salis ammoniaci drac-  
 xlviii. æruginis drach. xvi. myrrhæ drachmas xvi.  
 gummi drachm. xl. Excipe aqua. Temperatura sit  
 aquosa. Collyrium exterforij albuginum, per u-  
 nam illitionem multæ efficaciam ostendens. Facit ad  
 pterygia, & carnis in angulo magno incrementum.  
 Est autem collyriū lene & mordacitatis exors. Con-  
 thylj purpuræ carnis ustæ drachmas decem, æris  
 usti drachmam unam, squamæ æris drachm. ii. æ-  
 ruginis drachm. vi. atramenti futorigi drachm. iiii.  
 aluminis scissi obolum unum, lapidis scissi drachm.  
 i. lapidis hæmatitæ drachmam unam, stercoris cro-  
 codili drachmam unam, lycij drachm. i. succi om-  
 phacij scici drachm. v. chalcididis obolos duos, myr-  
 rhæ drach. iiii. thuris masculi obolos duos, cortidis  
 thuris drachmam unam, florum mali punice drach.  
 i. Excipe aqua. Collyrium Heliadæ, albugines  
 tollens ualde citò, ut mireris. Lapidis armenij quo  
 pictores utuntur, gypsi, atramenti futorigi, floris æ-  
 ris, æruginis, testarum sepiæ ustarum, ammoniaci  
 thymiamatis, lapidis magnetis trahentis, lithosperi-  
 mi, gummi æqualibus portionibus utere, & excipe  
 aqua. Aliud quod præparat Petrus Archiathros,  
 & ipsi bonum testimonium præbet. Salis ammo-  
 niaci scrupulos sex, lapidis armeniaci scrupulos  
 duodecim, seminis raphani scrupulum unum, se-  
 minis uiolæ albæ scrup. vi. ammoniaci thymiamatis  
 scrupulos nouem, gummi scrup. xii. Excipe succo  
 rutæ. Facit & ad suffusiones incipientes. Colly-  
 rium Pressum. De quo Apollonius dicit, optimum  
 esse pharmacum ad cicatrices, & supercrefcentem  
 carnem. Et ad asperas palpebras, & sycofes, & euer-  
 siones palpebrarum: calculos item ac grandines, &  
 induratas affectiones, & pterygia, & carnis in an-  
 gulo magno incrementa, & lippitudines scabras, & pel-  
 licularum crassitudines, & multæ ac crassæ fluxio-  
 nis depurgationem. Sed & aquosum ac multum flu-  
 xum cohibet. Consumit autem & depurgat securè,  
 attenuatq; ac exterit sufficienter mordens. Verum  
 oculum imperturbatum seruat, iucundissimumq; ac  
 leuissimum est, & quod uolere facit. Est autem hoc,  
 Aeris usti ac loti obol. v. croci drachm. ii. myrrhæ  
 trogloditidis obol. iiii. spicæ nardi obol. ii. casie obo-  
 los tres, cinnamomi obol. ii. opij obol. ii. piperis  
 grana xv. gummi drac. i. uini Chij aut alterius austeri  
 odorati quod satis est. Quod si ad hanc descriptio-  
 nem spodi drach. iiii. addere uolueris, ad omnem  
 fluxionem ac lippitudinem optimum euadet. Col-  
 lyrium Isidori Memphitæ ad acuendum uisum. In-  
 ungebam, inquit, non uidentes, & incipiebant uide-  
 re. Appellatur Rhinariū, id est, limula. Ego hoc præ-  
 paraui. Ammoniaci thymiamatis drachm. xvi. æru-  
 ginis uermiculatæ drach. xii. testarum sepiæ quod  
 molle est, drach. viii. sagapeni drach. viii. opopana-  
 cis drachmas duas, succi cyrenaci drachm. i. gummi  
 drac. i. Omnibus aqua prætritis, succi fœniculi dra-  
 xii. adijce, & mellis Attici drac. xii. Et efforma col-

lyrium ac utere. At uero quidam amicus ipsum nūc  
 sic præparat. Ammoniaci thymiamatis unc. xv. æ-  
 ruginis rasæ deuncem, & drac. ii. testarū sepiæ tri-  
 tem, & uncia dimidium, sagapeni quadrantem &  
 drachmas sex, opoponacis sextantē, succi cyrenaci  
 sextantem. Excipe aqua. Gummi autem non recipit.  
 Aliud, ad usum hebetudinē, albugines, suffusiones,  
 Harmatium, id est, Currus appellatū. Fellis hyænæ  
 drach. iiii. spumæ nitri drac. iiii. gummi drac. ii. æru-  
 ginis drac. iiii. sagapeni drac. iiii. galbani drac. ii. am-  
 moniaci thymiamatis drac. ii. baccharū lauri decoritā  
 catarum drac. lxx. aristolochiæ rotundæ dra. i. Ex-  
 cipe aqua. Collyrium ad incipientes suffusiones, ut  
 aqua etiā ex auribus fluat, uocatur Aureū. Sagapeni  
 persici puri drac. viii. æruginis drachmas sex, am-  
 moniaci thymiamatis drac. ii. gummi drac. ii. Excipe  
 aqua. Tere & utere aquosum illinēs, & intra quinque  
 dies efficaciam suā tibi comprobabit. Splendida enim  
 reddet pupillā ac clarā. Collyrium Martiani, quo  
 inquit, in meipso usus sum ad imminētē mihi suffu-  
 sionem. Chelidonium capnitiidis circa sepes nascentis,  
 rutæ, fœniculi, coriāndri, herbas singulas per se exue-  
 rato & excolato, & de succo uniuscuiusq; quadrans  
 tem cōijcto, & opobalsami drac. iiii. mellis Attici  
 drac. iiii. adijcto, ac terito, donec frigiditatis ha-  
 buerint ipsitudinē, & tunc succi conyzæ tenuia so-  
 lia habēdis uncia unam addito, ac terito. Et ubi pro-  
 bē habuerint ad excipiendū, gummi puri tui ac cri-  
 brati quantū satis est pro tua uel Medici cōiectura  
 adde quo collyriū fiat, efforma ac utere, ad incipiē-  
 tes suffusiones cum uino. Ad hebetudines uisus cum  
 aqua, illitū autem ad solē locato. Collyriū Proteus.  
 Cui nullū simile est ad initia suffusionis, & ad omnē  
 uisus hebetudinē. Cicatrices etiā ac callos exterit.  
 Cadmiæ drac. x. cerusæ drac. x. piperis albi drac.  
 i. succi cyrenaci drachmas octo, croci drachmas sex,  
 opij drachmas decē, sagapeni drac. xii. lacrymæ oleæ  
 Aethiopiciæ drachmas duodecim, auripigmētū drac.  
 viii. myrrhæ drach. xii. ammoniaci thymiamatis  
 drac. viii. gummi drac. viii. opoponacis drac. xvi. o-  
 pobalsami drac. xii. Excipe aqua pluuiālī. Vfus est  
 cū aqua. Collyrium Hermophili Thalassærum, hoc  
 est, marinum, ad omnē hebetudinē accommodatum,  
 & ad omnem incipientē suffusionem. Estq; odora-  
 tissimum. Cadmiæ drach. xvi. æruginis drach. iiii.  
 atramētū Indici drachmas sedecim, piperis albi drac.  
 viii. succi Medici drac. iiii. opobalsami drach. iiii.  
 gummi drac. xii. Excipe aqua, & utere cū aqua. Tem-  
 peratura diuersa est iuxta affectiones. Collyriū In-  
 dicum Regij inscriptū. Facit ad principia suffusio-  
 num, & omnē uisus hebetudinē. Et cicatrices exterit.  
 Cadmiæ ustæ & lotæ lib. i. & trientē, atramētū Indī  
 ci sexuncē, cerussæ trientē, piperis albi sexuncem, fel-  
 hyenæ integrum quantū est, fel scarorū piscium de-  
 cem, fel perdicū iiii. opij uncia unā, opobalsami sex-  
 tantē, opoponacis sextantē, sagapeni sextantem, gū-  
 mi lib. i. Excipe succo fœniculi. Collyriū suluū Pan-  
 chreston, ab omnimoda utilitate inscriptum, accom-  
 modatū ad scabros ac corrosos angulos, & intentos  
 pruritus, & palpebras ficosas, cadmiæ drac. lxx. x.  
 chalcididis ustæ drac. xl. piperis albi drac. xl. gum-  
 mi drachm. xl. Excipe aqua. Quidam adijciunt  
 his etiam croci drachmas duodecim, myrrhæ drac.  
 xii. Collyrium plicoric Ptolemæi, accommo-

datum ad scabros ac corrofos angulos, & intentos pruritus, milphoses, hebetudines: Pforici drach. x. l. sandarachæ drac. xxx. chalcitidis usfæ dra. x. x. viii. croci drac. xx. iiii. myrrhæ drac. xii. opij drach. ix. casia drach. xii. piperis albi drach. x. l. piperis nigri drach. x. vii. omphacij drac. x. vi. misyos usfi drach. iiii. folij drach. i. gūmi drac. x. x. vi. Excipe aqua. Collyriū Hygieni aureū, ad corrofos angulos, & scabras affectiones, sandarachæ drac. xx. iiii. piperis albi grana xii. myrrhæ drach. vi. croci drach. vi. gūmi drach. xii. Excipe aqua, & utere cū aqua. Collyrium Diacæton ex Demosthene, Aeruginis obol. iiii. misyos tantundē, succi papaveris tantundē, gummi drach. iiii. Excipe aqua. Facit ad prædictas affectiones, & ad usfus hebetudinem, & incipientes fufufiones. Attenuat etiam cicatrices. Sit autem calidum. Collyriū Siratoriæ compositio hæc est. Cadmiæ drach. viii. cerusæ drach. x. vi. piperis albi drac. ii. aeruginis, opij, omphacij, singulorū drach. ii. gūmi drach. iiii. Facit etiam ad asperas palpebras. Collyrium exterforiū. Aeris usfi, croci, ammoniaci thymiamatis, singulorum sextantem, gummi unc. i. Excipe aqua. Facit ad oculos purulentos, argema, nubeculas, caligines. Ad aspritudines uero cum melle. Collyrium celebre, priuatim ad cicatrices in oculis faciens. Facit etiam ad usfus hebetudines, aspritudines & pterygia. Testarum sepia, pumidis, quame aeris, ammoniaci thymiamatis, aeruginis, cornu ceruini usfi, singulorū lib. i. myrrhæ sextantem, thuris sextantem, opij quadrantem, gummi bessm, osium palmularū ustorum dextantē, mellis sextantem. Excipe aqua. Hoc præparabat Afer, & ualde ipsi confidebat. Nominabat autem ipsum Phoenicem nigrū, eo quod osium ustorum palmularum, (quæ phoenices appellantur) dextantem recipit.

*Collyria enflacta, hoc est, instillatitia appellata.*

Cap. cxi.

Collyrium instillatitiū Paccianum appellatū, cadmiæ drac. l. x. iiii. misyos dra. x. x. ii. stibij dra. x. x. ii. atramentū furorij dra. x. x. ii. piperis albi drac. x. x. ii. aeruginis dra. x. vi. opij drac. x. vi. opobalsami drac. x. vi. gūmi drac. l. x. iiii. Excipe aqua pluuiali. Facit ad acuendū uisum, & callos exterit. Collyriū Aromaticū inscriptum. Aeris usfi drach. x. vi. aeruginis dra. iiii. myrrhæ dra. iiii. spicæ nardi drac. ii. piperis albi drac. iiii. opij drac. iiii. croci drac. iiii. opobalsami drac. iiii. gummi drach. iiii. Excipe aqua. Aliud instillatitium nō perturbans, Oribasij. Cadmiæ drach. x. vi. cerusæ drach. viii. opij drach. iiii. opobalsami drach. iiii. aeruginis drac. ii. omphacij drac. ii. piperis albi drach. i. gūmi dra. vi. Aliud instillatitiū, uisum acuens, cadmiæ usfæ, & urina pueri extinctæ drach. x. stibij dra. vi. atramentū furorij sesquidrach. aeruginis sesquidrachmā, piperis drac. ii. misyos drach. ii. opij drach. i. opobalsami drach. i. gummi drac. vi. Excipe aqua. Aliud nigrū, uisum acuens. Facit & ad corrofos angulos. Stibij usfi ac loti drac. x. l. acaciæ drac. x. l. gummi drac. x. l. cadmiæ drach. x. vi. nardi celidæ drach. viii. myrrhæ drach. viii. croci drach. viii. omphacij drach. vi. opij drach. vi. Excipe aqua.

*Collyria ex cornu ceruino.*

Cap. cxii.

Collyriū Asclepiadæ ex cornu ceruino. Ad ulcera, & pustulas, & cicatrices exterit. Cornu ceruini usfi ac

loti drach. iiii. plūbi usfi ac loti drach. iiii. squamæ aeris lotæ drac. ii. thuris dra. iiii. opij drachmā unā, gummi drach. iiii. Excipe aqua. Aliud, ad calidiores affectiones, & acerrimas fluxiones cum ulceratione. Cornu ceruini usfi ac loti drachm. x. vi. spodij pompholygis lotæ drac. viii. squamæ aeris drac. ii. croci drach. ii. acaciæ drach. viii. thuris drac. viii. opij drac. ii. myrrhæ drach. i. gūmi drac. viii. tragacanthæ dra. i. amyli drac. iiii. terito cum hyoscyami cremore. Collyriū ex cornu ceruino, uelut Oribasius habet, maxime quidē ad ulcerationes in uisugere, clausosq; ac staphylomata, & huiusmodi omnia, ut non simul sint palpebræ densatæ. Et ad ulcera ægrè recedentia cicatriscē, & resolutas cicatrices. Cadmiæ drachmas sex, acaciæ drach. x. l. stibij drachm. x. x. ii. plumbi usfi ac loti drac. viii. cornu ceruini usfi ac loti drach. viii. gummi drach. viii. aeris dra. x. vi. opij drachm. x. vi. myrrhæ drachm. iiii. thuris drach. iiii. Excipe aqua. Vtere uerō ad caua ulcera cum lacte ad fordida, cum succo fenigræci. Aliud collyrium ē cornu cerui, efficacissimē exterit cicatrices in oculis, cū aqua illitum. Vtere etiā ad exulceratos oculos, cum ouo instillans. Aeris usfi ac loti desicem, & scrupul. vi. cornu ceruini usfi ac loti tantundem, stibij loti sextantem, & uncæ dimidiū, testarum sepia trientem, & uncæ dimidiū, aeruginis sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantem, & uncæ dimidiū, myrrhæ sextantē & uncæ dimidiū, thuris sextantem & uncæ dimidiū. Opij sextantem & uncæ dimidiū, acaciæ quincuncem, & scrupul. x. v. gummi deuncem. Excipe aqua.

*Collyria Nardina ex Theodotia.* Cap. cxiii.

Collyrium nardinū Zosij, ad ueteres lippitudines, & myocephala, & ulcera uetera ac staphylomata. Cadmiæ dra. viii. aeris usfi dra. viii. stibij drac. viii. cerusæ dra. iiii. castorij dra. iiii. spicæ nardi sesquidrachmā, aloës sesquidrachmā, folij, croci, chalcitidis totæ, atramentū furorij, lycij Indici, opij, singulorum drac. i. myrrhæ drac. ii. acaciæ drac. x. x. gūmi drac. x. x. Excipe aqua. Collyrium nardinum Candidi leuissimum ac ualidissimē resiccans. Facit ad myocephala & staphylomata mirifice, & maxime glauclis oculis conuenit. Vtere etiam in his qui nullam omnino collyriū mordacitatē sustinere possunt. Cadmiæ usfæ & lotæ lib. i. cerusæ septuncem, stibij loti sextantem, croci trientē, myrrhæ troglodyticæ trientem, aloës unc. i. acaciæ unc. i. opij sextantem, spicæ nardi unc. i. gummi bessm. Excipe aqua. Theodotium nardinū. Cuius multā experientiam habemus in myocephalis, & diuturnis ueribus oculorum, & confusioibus. Maximum exterforium est & uehementer corroborat debiles oculos. Cadmiæ lotæ, stibij loti, acaciæ, gummi, singulorum drach. x. v. rosarum siccarum depurgatarū drach. xii. aeris usfi loti drach. viii. myrrhæ troglodyticæ drach. viii. castorij, lycij Indici, croci, folij, spicæ nardi, chalcitidis totæ, cerusæ, glaucij, seminis ericæ, opij, gallarum omphacinarum, singulorū drach. ii. Excipe aqua. Vtere in principijs cum ouo instillans. In declinationibus cum aqua. Collyrium Nicarum Zosij, ex lacte nardinum. Ad affectiones & fluxiones diuturnas, ulcera, fossulas, myocephala, staphylomata, ueteres lippitudines. Tingit etiam cicatrices, & ipsas incōspicuas facit. Cadmiæ ter usfæ & muliebri lacte

ſte extinſtæ ac lotæ drach. c. viii. ſtibij uſti ac muſliebri laſte extinſti ac loti drach. x. æris uſti ac extinſti ac loti drach. x. x. vi. ceruſæ lotæ drach. x. x. iiii. myrrhæ drach. x. ii. opij drach. x. ii. ſpicæ nardi drach. iii. aloës drach. iii. acaciæ drach. c. viii. gūmi drach. c. viii. Excipe aqua. Collirium Hygidium, quod quidā Ammonij dixerunt. Facit ad incipientes ſuſſuſiones, & inuſiones. Et ad omne ulcus, & oculos purulentos, conſuſiones, chemofes, prolapſus, & ad diuturnamyocephala, ſtaphylomata, ungues ulceris genus. Repurgat, replet, & ad cicatricem perducit. Eos uero qui ob aliquā cauſam, aut propter capitis aut oculi dolorē, dormire nō poſſunt, præclarè ad ſomnū perducit, uelut ſomniſerū medicamentum. Viere cū ouo, aut lacte, aut aqua, & peratura ſit mea dia aut craſior, proſenſus ægrorum ſubtilitate. Habet autem hoc modo: Cadmiæ lotæ drach. x. vi. ceruſæ lotæ drach. x. vi. caſtorij drach. vi. nardi Indici drach. iiii. ſtibij loti drach. x. l. æris uſti loti drach. x. v. roſarum drach. x. x. ſquamæ æris uſtæ drach. v. Aloës drach. vi. caſiæ drach. iiii. myrrhæ dra. vi. lycij Indici drach. iii. lapidis ſciſi loti drach. iiii. & dimidiā, croci drach. vi. plumbi uſti ac loti drach. viii. & dimidiā, opij drach. iii. acaciæ drach. x. l. gummi drach. x. l. Excipe aqua. Eſt ex ualde celebribus. Collyrium Indiarum: Piperis drach. ii. cadmiæ drach. iiii. coſti drach. i. ſtibij. drach. viii. gallarum drach. iiii. ſpicæ nardi drach. iiii. nardi drach. iiii. acaciæ drach. iiii. gūmi drach. iiii. opobalfami drach. ii. Excipe aqua. Facit ad uſus hebetudinem. Exterit etiā cicatrices. Collyriū Theodotij Pacianū. Facit ad maximos humorum illapſus, et doloris moleſtias. Liberat citra uenæ ſectiōē. Cadmiæ uſtæ ac lotæ drach. viii. æris uſti ac loti drach. viii. ſtibij loti drach. x. vi. croci drach. iii. caſtorij drach. iiii. gruginis drach. i. aloës drach. iiii. myrrhæ troglodyticæ drach. iii. lycij Indici drach. ii. opij. drach. ii. acaciæ drach. x. x. iiii. gummi drach. x. x. iiii. Excipe aqua. Vſus eſt cum ouo. Temperatura ſit craſior. Collyrium, quod tumorē laxum palpebris inducit, appellatur Teſtamentū Auriſabri. reliquit hoc moriēs templo Ephēſio dicatū, quod hi qui à Medicis reſiſti eſſent, in tēplo ſanitatē conſequerentur. Inuentum eſt autē ab Adriano Cæſare. Facit ad humorum illapſus, & aſpitudines, & ad omnes deſperatas affectiones, puſtulas ſanctas, caua ulcera explanat, cicatrices incoſpi cuas facit, oculum impeturbatum coſeruat. Inſtillatur cū ouo aut lacte, prout neceſſitas expetit. Sit autem in omnibus dilutū aquoſum. Optimū eſt inſuſper ad acutū uſum. Habet hoc modo: Cadmiæ lotæ drach. viii. ſtibij loti drach. x. vi. ſpicæ nardi drach. iiii. myrrhæ troglodyticæ drach. ii. croci drach. i. caſtorij drach. ii. ſquamæ ferri ſtomomatis drach. iiii. æris uſti ac loti drach. x. ii. gruginis drach. ii. ceruſæ drach. ii. piperis lycij, Indici, opij, thuris, opobalfami, caſiæ ſing. dr. ii. lapidis ſciſi drach. iiii. æruginis uermiculatæ drach. iiii. aramenti ſutorij drach. ii. ſucci foeniculi drach. iiii. fellis capræ drach. iiii. gummi drach. viii. Terito cū uino Aminæo aut Falerno, aut alio auſtero ueteri odorato. Collyriū Teſtamentū, uelut habetur apud Aſterij. Cadmiæ drach. l. x. x. ſtibij drach. l. iiii. myrrhæ drach. v. & dimidiā, ſpicæ nardi drach. x. croci dr. x. caſtorij drach. vii. ſquamæ ferri ſtomomatis drach. x. iiii. ſolij drach. x. iiii. æris uſti drach.

v. & dimidiā, piperis drach. vii. ceruſæ drach. x. iiii. lycij, thuris, caſiæ, opobalfami, ſingulorum drach. x. iiii. opij drach. vii. lapidis ſciſi drach. x. iiii. æruginis uermiculatæ drach. viii. aramenti ſutorij drach. x. iiii. gummi drach. l. x. ſucci foeniculi drach. x. iiii. fellis caprini drach. x. iiii. Terito cum uino aminæo.

Collyrium Theodotij Magnum. Cadmiæ lotæ beſſem, æris loti beſſem, ſtibij loti uncias x. v. roſarū ſiccārū, ceruſæ, chalcitidis, gallarū, æruginis, lycij Indici, croci, aloës, ſpicæ nardi, myrrhæ troglodyticæ, ramentorū ebeni, caſtorij atramenti Indici, thuris, opij, ſarcocollæ, pōpholygis, ſingu. unc. i. cornu ceruini uſti ac loti unc. i. acaciæ unc. x. v. gūmi un. x. x. v. Excipe aqua. Quidam uerō etiā ſolij uncā unam adiſcunt, & amoni unc. i. roſarū uerō quādrantem, gummi uerō & acaciæ, ſingulorum unc. x. x. iiii. Reliqua autem eodem modo. Facit ad incipientes lippitudines, & exulcerationes omnes, & fluxum recentem, ac ueterem, inflammationes, carbunculos, oculos purulentos, nomas, puncturas, prolapſus, myocephala, ſtaphylomata, palpebras aſperas, & ad deſperatas affectiones. Et ad ardores ſolis, aut calcis, aut pulueris, aut ſimilis rei. Tollit etiā pterygia inflammata cū butyro. Ad ulcera uero cū ouo adhibetur. Ad maligna autem cum lacte muliebri. Theodotium Seueri. Aliud quoddā collyrium etiā apud nos reperitur, inquit Seuerus, à ueteri quoddā deſcriptum. Et hoc quidem cōpoſitā materiā habet, uerum efficiā diuerſam. Nam omnibus ſimul reſectis collyrijs cōmodius cōpertum eſt. Quare etiam ipſius præparationē referre neceſſarium puto, quā neq̃ oibus hoc ſit notū. Recipit autē cadmiæ drach. x. x. iiii. æris uſti drach. x. ii. ſtibij drach. x. l. ceruſæ drach. viii. chalcitidis toſtæ drach. iiii. miſyos toſti drach. iiii. ramentorū ebeni drach. ii. nardi Celticæ drach. iiii. ſolij drach. iiii. ſpicæ nardi drach. iii. croci drach. iii. caſtorij drach. vi. aloës drach. viii. lycij Indici drach. ii. roſarum ſiccarum drach. iiii. gallarum drach. ii. opij drachmas ii. myrrhæ drach. viii. acaciæ drach. x. l. gummi uermiculatū drach. x. l. Cadmiā prunis obruimus, & uenilamus, & ubi ignita facta fuerit, ablatam lacte aſinino extinguimus. Stibium uero in ſicile uas coniectū, addito operculo, foramen habente urimus, & ſimiliter lacte extinguimus. Viſta uero ſingula per ſe uſa ac cribrata lauamus, & diligenter ſiccamus, & deinde pōderata ad præparationem adiſcimus. Ceterū gummi nō coſumum inſpergimus ſiccū, ſed maſſefacimus: ſic enim neq̃ lignoſum quiddam, neq̃ arenoloſum, cū ipſo penetrabit dum excolatur, & optima coactio collyrij fiet. Quiddam ad relatā præparationē adiſcunt etiā coſti drach. viii. Et magis ita cicatrices exterit, inquit, & pterygia ac carnis in angulo incrementū conſumit. Verū ad inflammationes & ulcera incommodus eſt coſtus. Huius igitur auxilij actiones ac efficiam dicere non eſt facile. Audiētes enim uix crediderint. Nā deſperatas affectiones ad naturalem ſtatum reuocat. Et ut in ſumma dicā, omnia quæ Theodotij appellat nardinis, & hiſ quæ ex cornu ceruino parantur adſunt, multo plus in hoc comperuntur in recentibus enim affectionibus eo illito, & ſpongia oculo impoſita, ægrum ab affectione liberauiſſum. In diuturnis autem ac deſperatis, parum inſtillantes, paratim illinentes, ſcopum attingimus. Nam in ſacili ſon-



lubilibus oculi affectionibus ipsum illinimus. In ca-  
uis autem & sordidis ulceribus, diluto ipso utimur  
cum ovo aut foenigraci succo. Quandoque etiam cum  
aqua mulla. In mycephalis autem, crassius cum aqua  
sublinimus per subiectionem. Sed & cicatrices simi-  
liter attenuamus. Ad tantam autem tenuitatem perdu-  
cit cicatrices, ut penitus non cognoscatur per sensum.  
Et in summa, inenarrabilem quidam uim possidet.  
Euenim in staphylomatis, brassicae succo diluto col-  
lyrium, & crassa copia oculis a thibitum, una cum ipso  
grae deligatione, molem inconspiciam facit. Quin  
& carnis in angulo magno incrementum consume-  
re potest hoc collyrium tenuiter tritum, & in sicco  
pulsillum redactum, itemque pterigia attenuare. Sed  
& ad alia mirificum compertum est collyrium. Et

nos quoque permitimus posteris per experientiam  
deductis, ut auxilio testimonium praebant. Etiam ea-  
nim quidam ad diuturna ulcera ac fistulas sedis ipso  
us, scopum atigerunt. Vnde non absurdum fuerit  
etiam ad polypos ac ozanas narium ipsum adhibe-  
re. Collyrium ex succo foeniculi. Cadmia dodra-  
tem, stibij bellum, misyos crudi sexuncem, aëruginis  
sexuncem, piperis quincuncem, atramenti sutorij  
sexquiciunciam, chalcidis unciam, croci sexquiciunciam, fo-  
enij unciam, romphacij sesquiciunciam, spicae nardi trien-  
tem & undae dimidium, opij quincuncem, & undae  
dimidium, opobalsami trientem, gummi sextantiem,  
succe foeniculi bellum. Et rursus aliud foeniculum in  
aqua pluuiali decoquito, & cum decocto illa terito  
ac efformato. Hoc à multis praeparatur.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

OCTAVO SERMONE AETII

HABENTVR.

AD superciliorum ornatum. cap. i.  
De hypopijs, hoc est, ijs quae sub  
oculis sunt sугillationibus. cap. ii.  
Vngenta praeseruantia faciem ne à so-  
le aut vento exsurgatur. cap. iii.  
Vt ne rugosa fiat facies. cap. iiii.  
Ad faciem nigredines. cap. v.  
Smegmata & medicamenta faciem niti-  
dam reddentia. cap. vi.  
Cataplasmata aestiua, odorum corpus  
reddentia. cap. vii.  
Potiones ad eos qui tetrum habent cor-  
poris odorem. cap. viii.  
Ad mentis fabricem. cap. ix.  
Ad faciei lentigines remedia, quibus e-  
tiam ad maculas à sole prouocatas,  
& ad uaros uti licet. cap. x.  
De maculis à sole prouocatis, quas Graeci  
epithimas appellant. cap. xi.  
De stigmatibus siue notis ex plaga illatis.  
cap. xii.  
De uarijs faciei, qui tum Ionthis, tum Ae-  
nae Graecis uocantur. cap. xiii.  
De scissis faciei tumoribus. cap. xiiii.  
Ad manantes menti papularum eruptio-  
nes, ex Critone. cap. xv.  
De impetiginosis tum menti, tum reli-  
qui corporis tumoribus. cap. xvi.  
Ad molestum oris odorem. cap. xvii.  
Ad labiorum fissuras. cap. xviii.  
De dentium affectionibus. cap. xix.  
Ad inflammationes gingiuarum. cap. xx.  
Ad cruentas gingiuarum. cap. xxi.  
Ad excrecentes gingiuarum putrescen-  
tesque ac tumentes. cap. xxii.  
Ad corrosas & ab ulcere serpente in-  
fistatas gingiuarum. cap. xxiii.  
Ad parulis, hoc est, gingiuarum infla-  
mationes. cap. xxiiii.

De epulide, hoc est, excrecenti gingi-  
uarum carne. cap. xxv.  
De gingiuarum fistulis. cap. xxvi.  
Cura dentium à calido morbo doloroso  
affectorum, ex Adamanto sophista.  
cap. xxvii.  
Cura eorum quibus ex frigidityte den-  
tes dolore afficiuntur. cap. xxviii.  
Cura dentium ab humiditate dolore affe-  
ctorum, & laxatorum. cap. xxix.  
De dentibus lima atterendis. cap. xxx.  
Cura dentium à siccitate dolore affecto-  
rum. cap. xxxi.  
Cura dentium ob caliditatem & humi-  
ditatem dolore affectorum. cap. xxxii.  
Curatio eroriorum dentium. cap. xxxiii.  
Vt dens citra dolorem, & absque ferro  
tollatur. cap. xxxiiii.  
Smegmata uaria ad denigratos liuen-  
tesque ac rarefactos dentes. cap.  
xxxv.  
De ancyloglossis, & qui uix loqui pos-  
sunt. cap. xxxvi.  
Ad uanuculum sub lingua. cap. xxxvii.  
Ad linguam inflammatam, desquamam ac  
tumore inflatam. cap. xxxviii.  
Ad aphthas, hoc est, oris ulcera. cap.  
xxxix.  
De gurgulionis affectionibus. cap. xl.  
De ablatione columnellae. cap. xli.  
De oris inflammationibus. cap. xlii.  
Illitiones ori commode. cap. xliii.  
Summaria doctrina de usu omnium illa-  
tionum ad os apparatus. cap. xliiii.  
De scissarum inflammationibus. cap. xlv.  
De crustosis & pestilentibus tonsillae-  
rum ulceribus. cap. xlvi.  
De agina, et eius speciebibus. cap. xlvii.  
De glandulis. cap. xlviii.

De suffocatorum reuocatione. cap.  
xlix.  
De deuoratis in rōssillas spinis atque his  
quae in asperam arteriam delabun-  
tur. cap. l.  
De arteriarum pharmacis. cap. li.  
Ad inueteratas affectiones uariae arte  
ridae. cap. lii.  
De distillatione siue catarrho, & na-  
rium muco. cap. liii.  
De tussi. cap. liiii.  
De pharmacis dolorem leuantibus &  
consentibus tussi. cap. lv.  
De suffitionibus. cap. lvi.  
De orthopnoeis, anhelosis, & aegre  
spiritum ducentibus. cap. lvii.  
De cordis tremoribus. cap. lviii.  
De sanguinis reiectione. cap. lix.  
Curatio eorum qui ob distillationem  
sanguinem expuunt. cap. lx.  
De his qui ob frigiditatem organorum  
respirationis sanguinem expuunt.  
caput lxi.  
Curatio eorum qui iuxta alium quem-  
cumque tandem modum sanguinem ex  
pulmone reieciunt. cap. lxii.  
Communes methodi exhibendorum au-  
xiliorum in singulis reiectionibus san-  
guinis speciebus post sanguinis in-  
hibitionem. cap. lxiii.  
De aspera arteria ulceribus. cap.  
lxiiii.  
De pectore suppuratis. cap. lxv.  
De peripneumonicijs. cap. lxvi.  
De phthisicis seu tibijs. cap. lxvii.  
De pleuritide seu laterum morbo. cap.  
lxviii.  
De ea quae pleuritidis esse putatur, quae  
tamen non sit. cap. lxix.

AETII

# AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI-

CINAE TETRABIBLI SECVNDAB

SERMO QVARTVS, ET EX  
ORDINE OCTAVVS.

\*

*De faciei, oris, & tonsillarum affectionibus: Cui annexum est, De destillatione, & tussi,  
aspera arteriae, pulmonis, ac thoracis affectionibus.*

AD SVPERCILIORVM ORNA-  
TVM. Cap. 1.



**Q**UANQVAM quod ad hanc rem attinet, iam antè à nobis dictū sit, ubi de defluuio capillorum capitīs, Sermonē sexto mentionē fecimus, dicemus tamen & hic nō importunè, sed ut habet, paucis. Illud augēs superciliorū capillos, atq; etiam aliarū corporis partium, eadē etiā eisdem nigros reddit. Nucū ponti carū interiora in vase figulino rostrofacta contere, & pinguedine capraē syluestris excipe, atq; cū hoc ipso partes inſigī præcipe. Aliud. Adſiat unc. i. ladanī sextantē, paſi cretid heminā unā, cōtunc ac ſubſige cū paſſo: deinde torre, ut dictū eſt, ac rursus cum pingui capraē syluestris, aut urſi cōtere, & utere. Potes & huc accommodare ea, quorū meminimus Sermonē vi. Itē ex armeniacō lapide, de quo Sermonē ii. cap. xii. diximus, ſiccō trito ſupercilia inſpice.

*De hipopijis, hoc eſt, his quæ ſub oculis ſiunt ſugillationibus.* Cap. ii.

Quod hipopia ſub oculis ſiant, ipſum nomen indicat: ſiquidem hypopium Græcis hypophthalmiū ſignificat, quod Latinis, ſub oculis ſonar. Sunt autē hypopia ex genere ſuſſuſionū ſanguinis in locum contuſi: ſuntq; ex plaga, quum tenuibus ſub cute uenulis contuſis, ſanguis per ſiſſuras ſub ipſam cutē, aſſaſta itē effunditur, neque id uno loco. In grumos enim coit ſtatim, & licet locus, progreſſuq; tēporis nigreſcit. Quare medela occurrendum eſt, antequā nigreſcat, cura poſſiſſimum ad hoc adhibita, ut concretuſ ſanguis diſcutiatur. Quod ſi tunacula quoq; rſatur uenularū, ex quibus effunditur ſanguis, miſcendū eſt his quæ diſcutiendi uim obdient, parum quiddā ex cōſtringentibus. Nā ſi in principio ſola diſcutientia exhibeantur, nō cantū id quod effuſum eſt diſcutient, ſed per ipſas uenarū contuſarū ſiſſuras amplius quiddā elident ex ſanguine in ipſis uenis contento. Quum uero in naturam ſuā redierint uenulae, etiā citra admixtionē cōſtringentiū, ad diſcuſſoria traſeundū. Atq; ego ſanē in principio utor Niſi ex roſis collyrio, ex eo in aqua diſſoluto, locū ſugillatū illino. Vtor autē pro ſomēto, decocto meſſiloti & ſoenigrædi. Deinde collyrium quoq; in eodem decocto diſſoluo, aut etiam in ſolo ſoenigrædi decocto. Quod ſi reliquæ quedā reſiterint ipſius affectionis, diſſolutis ex myrrha collyrijs in ſoenigrædi decocto, illino bis in die, prius tamen cum ſpōgia in decocto madefacta loco ſoto. Idē præſtat in principio, nō præſente ex roſis collyrio glauciū illitum, & ſex olei coquēdo cōdenſata. Inueteratū autē iam

malū ex ſandice collyria tollit, & quæcūq; præclare omnino diſcutiunt, qualia Dioſco. inter facile parabilia enumerauit. Ea enim quæ ſub oculis ſiūt ſugillata, inquit, & liuores ſā inueteratos tollit, raphani cortex cū melle illitus, bryoniæ radix uino aut cerato excēpta, bulbus cū uitello aut impoſitus, aqua marina calida pro ſomēto, aut muria uel falſugo, caſeus antiquus cū decocto hyſſopi impoſitus. ſtatim autē tollit ſepiæ teſta cū aceto illita, ſinapi cerato excēptū, cucumeris ſylueſtris radix cōtrita cū melle, ſini ſemen cōtritum cū lacte. Critonis compoſito. Ad liuores altē infixos, & ea quæ ſub oculis ſiūt ſugillata, ſeminis uitidis albi drach. iiii. radicis herbarianariæ ſine radiculae drach. tres, nitri rubri, cordicis raphani, hyſſopi, ſarinæ fabarū, uniſcutiuſq; drach. tres, mirobalani drachm. x. cineris pulmonis agni exuſti drach. x. l. bulborū rubrorū drach. x. l. radicis rapſiæ aut ſucci drach. x. l. corticis thuris drac. unam; excēpt cerato ex oleo roſaceo apparato, ac linteolo inſarū impone. Oportet autē aſſidue amouere, cum cautione, ne locus exulceretur. Ego autem expertuſ ſum, nucem pingui, uetuftate rancidam, certifiſimū ad liuores remediū. Porro reclinata ac ſupino reamēdia adhibere conuenit, ut adhæreant ſpatio horatrum quā optime contrita.

*Circumſcriptiones præſeruantes faciē, ne à ſole aut uento exuratur.* Cap. iiii.

Circumſcriptio faciē, quæ aurea appellatur: Lupinorum ſecorum ſextarios iiii. aquæ pluuialis ſextar. xiiii. iniſce in uas aerē ſtāno obductū, ſinaſq; madefieri per triduū: quarta autē die decoque ad prunas uſq;: quod diſſoluantur lupini: deinde per colū exprime liquorē, ac cū ſeorſim decoque, atq; ubi condenſatuſ fuerit, in uas uitreū repone. Vbi uero uti uelis, quātum ſatis uidebitur accēpt, & cū eo in modica aqua diſſoluo locū illine. Alia ualde laudata. Similaginē lotā & per pānū percolatā ſinas deſidere, aquaq; abijce, ſecem autem cum albumine oui permiſce, donec mellis craſſitie accipiat, & cum hoc faciē obline uerſaturuſ in ſole quum uero à ſole reſceſſeris, frigida multa ablue. Alia. Boni coloris faciē hæc reddit, atq; itē uniuerſum corpus. Maſtiche cū oleo omphacino diſſoluta circūline: aliquādo autē & olei loco medullam ceruinā, aut uitulinam accipimus: aliquādo ceratū liquidum. Alia. Cupreſi ac ſilicis ſcobem in oleo decoctā oblini. Alia. Solani ſuccum cum oleo illine. Alia. Nuceſ pineas cum modico aceto cōtere, adiecto melle ſufficienti, ac oui crudi uitelluſ, atq; hoc ipſo faciē oblini: neq; reſert etiā ſi citra aceto uo utaris. Alia. Hęc in æſtate conuenit, faciē præſeruāſ: tragacanthi, ammoniaci thymilamatis, coſti contuſi, cuiuſq; ſextantem, aluminis liquidū dra-

chmas *℥* iiii. thuris sextantem, amyli sexuncem, oua cruda recencia *℥* iiii. mellis libras tres, mulsi sextarios tres. Tragacanthū, ammoniacū, & thus in mulso maderi per no<sup>te</sup> unam, in uase uitreo finito: oua autē integra in acētū uetus & acre proiecta, per triduum macerata lumē uero optimē lauato: dein de omnia simul in morariū fācile cōiecta & diligenter cōmixta, melle cocto excipito, atq; utere, faciem ex eis oblinendo. Ante ingressum uero balinei medicamentum hoc tollatur, atq; id particulatim auellere conuenit leni tractu ex facie induratum: dein de aqua tepida abluere, & spongia abstergere: quod ubi factum est, manna thuris in albumine oui dissoluta, faciem illinito.

*Vt ne rugosa fiat facies.*

Cap. IIII.

Faciem corrugatam extendit medicamentum hoc: cornu cerui non antiquū in aqua decoque, donec succulentum quid remittat, percola deinde ipsam aquam, & cū ea farina fabaceā subige, ac pastillos informa, eosq; in umbra exicca. Vbi autem uis postulauerit, quantum opus fuerit in aqua dulci dissolue, ut ce rati liquidi crassitiem accipiat, & cum eo facie oblinere iube, atq; cum adglutinatū fuerit, facie aqua tepida abluere præcipe.

*Ad faciei nigredines.*

Cap. v.

Ad faciei nigredines his utendum est, iridis contrita, farinae prissanae, farinae fabaceae, cuiusq; sextarium unū & dimidiū, salis ammoniaci, cornu cerui nusi ammoniaci, thymiamatis, cuiusq; sextantem, in aqua dissolue, & pastillos informa, quos in umbra exicatos adserua, atq; uis tempore, in aqua resolutos ante balineū faciei illini. Aliud. Farinae prissanae, thuris, iridis, farinae fabarū, farinae erui, spumae nitri, costi, cuiusq; choenidis partē quartam, amygdalas amaras *℥* x. informa cum cādido ouorū & lacte asinino, exicca in umbra, ac utere ut dictum est.

*Smegma & medicamenta faciem nitidam reddentia.*

Cap. VI.

Quandoquidē post unguentorum ablationem pleriq; faciem extergere conantur, utendū ad hāc rem cōpō sitionibus infra scriptis. Smegma illustriorē reddens facie. Amygdalas decorticas *℥* l. thuris, spumae nitri, gummi cuiusq; drachmam unam, farinae fabaceae drachmas *℥* ii. excipe oui candido, & in pastillos digere, quibus cum aqua solutis, passim tum in balneo, tum cūtra balineū utaris. Aliud. Smegma faciei celebre & admirandum, quod & faciem illustriorem reddit, & rugas expolit, asperitates pel lit, incipietem elephantiasin arce, si quidem cū alijs remedijs adhibeatur: usus eius etiam reliquo corpori cōueniēs est. Mastiches, thuris, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusq; uncā unam, tragacanthi sesquiciam, succi uuae acerbae immaturae dodrantem, seminis peponis unā cum confulo in ipso humore dextātem, cādidiū ouorum *℥* x i. similaginis sextarios quinque: contunde omnia, ac cum candido ouorū, & humore peponis, succoq; uuae acerbae commisce, & in pastillos redige, ac exicca, post uero contusos ac attritos, in uase uitreo ad usum adserua. Smegma faciei, quod simul & ipsam rubicundam reddit. Farinae erui, fabarū, lupini, prissanae, ceris, bulborum narcissi, cuiusq; sextarij Italici dimidiū, similaginis sextarium unum, contunde ac cribro tenuissimo excute: deinde oui candido commixta, in pastillos

digere, & in umbra desicca. Vsu uero expecte, quārum libet accipe, & in aqua dissolue, atq; a balneo utere. Aliud faciem illustrans, & uniuersum corpus: dissipa autem & rugas, & cutem depurgat. Vitis albæ radicem delibra, ac in sole aestiuo exicca, deinde contusae ac cribratae Italici choenidis dimidiū accipe, iridis contusae tantundem, myrobalanicae decorticatae tantundem, farinae fabaceae choenice unū: hāc in uino ueteri odorato subacta, in pastillos digere, quos in umbra exicatos adserua: & usu expectente, contusis & cribatis cum aqua utere.

Aliud Cleopatrae reginae odoratum & preciosum. Costi, myrrhae troglodyticae, iridis, spicae nardi, amomi, solij malabathri, calsiae, floris iunci odorati, cuiusq; unci i. Myrobalani lib. iiii. spumae nitri lib. i. cōtundito, cribrato, uitior, cōfert uniuerso corpori.

Aliud efficax & odoriferū. Floris iunci odorati, iridis cuiusq; drach. ii. mastiches drach. i. contempe, & cum succo prissanae crassissimo pastillos forma, & in umbra desicca. Vbi uero usus expetierit, in aqua dissolutos illinito, & post horē spatium frigidā abluito. Aliud, splendidam & erugatam reddens faciem, ac totum corpus: Farinae fabaceae Italici modium unum, similaginis Italici sextarios quatuor, trifolij cōtusi sextarios quatuor, myrobalani tantundem, iridis contusae tantundem, ammoniaci thymiamatis libram unā, costi tantundem, cādidiū ouorum recentium crudorum sexaginta, seminis peponis unā cum humore choenice unam, succi uuae acerbae tantundem, subige & informa pastillos, quos sufficenter in umbra exicatos a balneo illine. Preclarē facit, & ad eas quae in collo sunt & reliquo item corpore nigredines. Aliud ad faciei nigredines, multo usu exploratum. Thuris sesquiciam, cerusae probē lotae, spumae argenti in decocto cicerum alborum, ad solem frequenter abluta, amyli recentis, scobis marmoris albisissimi, mastiches purae, spumae nitri albedinis, testarum septae, singulorum unci. unā, saponis Gallici unci. duodecim, cādidiū ouorum decem, appara, & utere, ut dictū est. Aliud mirabile faciem depurgans & illustrans. Farinae scenigræci trientē, terrae Samiae quae Aster appellatur, quadrantē, amyli trientē, mastiches sexticē, medullae ceruinæ recentis sex uncem, tragacanthi trientē. Tragacanthū in lacte muliebri, aut asinino magerato, ac cum eo dissoluto, reliqua tenuissimē trita in pastillos digerito, quibus in umbra desiccatis, ut predictum est uitior. Aliud smegma. Ricini seminis interioris dra. viii. bulborū narcissi siccorū ac decorticatorum drac. viii. similaginis drac. iiii. thuris drach. ii. candidum ouorum viii. appara ut dictū est, & utere. Sapo quoq; ufa est Pelagii patricia, ad faciem illustrandam. Saponis Gallici sexuncem, cerusae sextantem, mastiches unciae dimidiū, medullae cerui unci i. spumae nitri albæ trientem, ceræ albæ quadrantem. Præmacera saponem in aqua in uitreo uase ad dies v. aqua pluuiali quotidie permutata, & saponem excolato. Postea in ollam nouam immitte saponem, & sexta die rursus affusa pluuiāli aqua, ad lentas prunas decoque, donec sapo dissoluatur. Deinde ceram & medullam adde, & ad dissoluta mastichē & spumā nitri inperge, olla amota, et assidue per spatium commora. deinde etiam cerusam modica aqua trita adde, & medicamentū in testā

missum

missum contentē manu subige, & reposito in uitreo uase utere uelut dictum est. Smegma ex Rusti libris, ad totius corporis erugationē. Ficus pinguisimas, utitis albę radicem sicā delibratā, sepię testā ustam, farinā erui: unumquodque seorsim contunde: deinde etiam simul, & modico adstillato melle, utere. Aliud smegma, quod uniuersum corpus odore imbuat. Terrę cimollę bellem, iridis tenuissimę tritę drac. x. xiiij. nardi Celticę drac. x. xiiij. cyperti, cardamomi, styracis flauī & pinguis, cuiusq; drac. x. iij. styracē in uino ueteri odorato dissolue, & in prōpriu habet: terrā uero cimollā in fistile uas cōfectā car bonibus impone, atq; ubi satis cāduerit ab igne, eā ad dissolutum styracē iniice, deinde reliqua sicca tenuissimę trita insperge, ac simul sufficicter unita in pastillis digere, quibus in umbra exliccatīs, post uero tritis & cribratis utere.

Cataplasmata æstiuā, odorum corpus redditia.

Ex Critone.

Cap. vii.

Quū sudores corpus uexāt, magna oboritur ex eis molestia, præsertim in æstate. Nā & fordes multas inuehunt, & tetrum odore de se præbent. Quare sub scriptis remedijs uti conuenit, non ad mulieres tantum, sed ad ipsos etiam uiros. Non importunum enim esse puo & in hoc smegmatur tractatu harū rerū mentionē facere. Cataplasma, hoc est, inspersio totius corporis odore bonum efficiēs, æstiuum. Rosarum siccarum quadrante, casie quadrante, amomi, costi, spicę nardi, cuiusq; drach. ii. aluminis liquidi sextante, dissolue in uino ueteri odorato, & in pastillis digere, quos in umbra exliccatos usu experientē conuindito, ac cribrato, atq; in balneo inspergens exhibeto, ita ut diligenter perficerent, & cū frigida aqua abluant. Aliud. Spumę argenti in decocto cicerū ad solē inalbatę, amomi, casie, folij mabathri, costi, spicę nardi, aluminis liquidi, iridis, omniū par pondus, appara, & utere ut dictū est. Potes autē præscriptis cataplasmatīs uti quocunq; tempore uelis. Aliud odorum & lene. Rosarum uiridū & tamē siccarū dra. x. i. myrrhę troglodyticę drachmas octo, iridis Illyricę, spicę nardi, casie, cuiusq; drach. viiij. uino odorato subige, & pastillis informa: quibus ubi uti uelis, cōritis & cribratis corpus insperge, maxime ad balneo. Aliud. Amomi, casie, spicę nardi, costi, folij, myrrhę, singulorū æquales portiones. Vini quod satis est, para ac utere uelut dictū est. Aliud. Casie, iridis, myrrhę, aluminis optimi, pares portiones uino subige, & pastillis forma ac utere. Aliud. Iridis, spicę nardi, floris sūd odorati, cuiusq; drac. iij. amomi drach. ii. myrrhę dra. ii. meliloti drachmas quinque, appara & utere similiter. Archigenes autē inquit: Ad omnes corporis tetros odores, atq; eos qui grassantur à Græcis appellatur, ante omnia cōducit exercitiā, inunctiones, siccationes, alui frequēs subductio. Sunt etiā cibi ad destruendū hoc malū cōmodi, itēq; illationes. Cōueniunt itaq; oleū rosacitū, melinū, myrteum, iris sicca per se in puluerē redacta & intrita. Aut, alumē liquidū in aqua uel uino dilue, & myrrham tenuissimę tritā admisce, ac ad mellis crassitudinē redige, & ex eo collū, locos sub alis, inguina, & reliquos exudantes locos inunge. Aliud. Aluminis liquidi drach. iij. myrrhę drach. iij. spumę argenti lotę drach. ii. casie drach. i. contere, & cum eis sub alis locos,

intermedia coxarum & inguina cōfrica: tollit enim euestigio eorum fetorē. Aliud. Casie drac. iij. aluminis scissilis drachm. ii. utere cum uino per se.

Aliud. Mastiches quadratę, aluminis scissilis unc. i. utere cum uino. Aliud. Myrrhę troglodyticę, iridis Illyricę, florum rosarum siccarū, æquales partes cōtunde, & cribra, ac forma pastillos cum uino, eosq; in umbra sicca, ubi uentus non spirat. Deinde cōtulos ac cribratos in pyxide reponē cooperitos, ut ne transpirent, & utere à balneo inspergens ac desiccans locos leniter, atq; ita imbibī sine, & postea frigidā ablue, & manet odor, de quo merito mireris. Probē facit & alumen cum uino, & crocomagma cū myrrha. Et cupressi ramenta ac alumen cū uino.

Potiones ad eos, qui tetrum habent corporis

odorem.

Cap. viii.

His uero qui fetorē habent corporis odore, eiusmodi potiones exhibere conuenit. Cardui radicē in uitro albo decoctā propina, & eijsctū urinā crassā & fetorēt. Aliud. Resinā terebinthinā oliuę magnitudinē cū pari melle decoque, & quotidie deglutiedā exhibe, & uinum insuper absorbendū. Aliud. Myrrhā & serpyllum partibus partibus terito, & in pilulis formato, quarum duas deuorandas dato, & uini insuper absorbendum. Hęc etiam ad oris graueolentiam faciunt.

Ad menti scabricem, ex Galeno.

Cap. ix.

Fiunt & in mento aspredines ut plurimum serolo humore à capite destillante, & præcedentibus fursuracets in collo ac uicinis partibus squamis, aliquando autē usque ad auditorios pertingit ac perreptat meatus. Estq; omnino hęc affectio dolorosa, pruritus inferens, ac distendēs corpus: quare subscriptis remedijs est subueniendum. Critonis. Amurcam ex oliua prius quā exprimatū destillatē, decoque quousque cogatur, eaq; assidue locos inunge.

Aliud. Myrrhę uncā unā, ouorum crudorū utellos quinque, myrrhā cum lacte dilue, deinde adijce ei oua, eaq; simul passo excipe, ac assidue illini, & miraberis effectū. Aliud pharmacū efficax, quo multos hac affectione detentos liberauimus. Glacię dra. xvi. gūmi drachmas quatuor, lacrymę oleatā tundē, dissolue, & ad strigmentitā crassitudinem cū passo redige, atq; assidue illine. Exulcerata autē cute & circumdolente, sequentibus utendum. Pinguis compositio ad faciei manantes & squamosas affectiones, ac asperitates, utilis etiam existit sedi, conuenitq; ambustis ab igne. Spumę argenti uncā unā, cerę tyrrhenicę trientē, ouorum aliaiorum utellos tres, adipis anserini bene subacti trientem: spumam argenti in farinā redige, ac adijce ei oua, deinde his si mul unitis infunde quantum sufficit lactis, ut ad strigmentitā crassitū redigatur, postea cerā liquefactam unā cū pingui, refrigeratāq; ac crassā, cōmisce, ac si mul cōmisce, atq; in pyxide reconde. Vsu uero exigente, de eo quātum satis esse uidebitur accipe, ac tū rosaceo dilutum impone. Potes autē & sedis remedijs, & quę ad ambustos ab igne descripta sunt, cōsimiliter in hac affectione uti.

Ad faciei lentigines remedia, quibus etiam ad maculas à sole prouocatas, & ad uaros uulicet.

Cap. x.

Vitis albę itemq; nigrę radices cum oleo decoque, donec succulentę reddantur. Tollit etiam tum

lentiginēs, cum uaros, oleum amygdalarum cum cera, radix lilij cum melle. Maxime omnium autem lentiginēs delet gummi & nitrum æquali pondere, melle permixta. Aliud. Brasicæ semen aqua contritum illini, absterfo tamen & conftrato prius loco. Vbi uero exaruerit atq; cutis atollatur, prolue aqua multa frigida, & illinito pingui anserino, aut medulla cerui, aut etiã cerato ex aliquo huiusmodi apparato. Cauedũ autẽ est, ne quis post excoriationẽ incidat in ea quę facẽ offendere possunt, qualis est ær frigidus, aut uentus, aut prolixi faciei. Aliud. Sandarachã attere cũ melle ad strigmẽu densitatẽ, & per dies sex illinito, arefacta autẽ cute atq; eleuata, utere galbano cũ modico nitro & aceto dissoluto. Aliud, ad uibices ac lentiginēs: Columbæ stercus cũ acri aceto tere ac utere, & miraberis. Ad diuturnas autẽ lēdiginēs his utere. Radicis cucumeris syluestris sextiã, cõmolæ unc. i. in puluerẽ redige ac reponẽ. Vñ uero expetẽtẽ, quãtũ suffecerit in aqua dilutũ illini. Aliud. Bulborũ depuratorũ unc. i. thuris unc. i. cõtẽre, adiecto cochlearũ terrestriũ magnarum cruore. Oportet autẽ ipsas adhuc uiuas stylo pũgere, atq; id quod effluit mucosum, pharmaco inijcere: quod ubi uis tẽpore dissolueris, melle exceptũ insũge. Eũ dem effũtũ pręstat ari radix, sica cũ melle, & umbilici, ueneris radix, cerato liquido excepta ac illita.

Smegmata ad lentiginēs in calli modum obduras. Quandoquidẽ contingit aliquando sublatas lentiginibus callosam reddi cutem, ac uix curabilẽ fieri affectionem, ut dũ est post lentiginũ excoriationem huiusmodi smegmata. Farina erui chœnicis Italici dimidium, farinæ hordacę tantũdem, scillę assatę sextantem, omnia in puluerem redacta, candi do oui excipe, & in pastillos redige, quos in umbra desiccatos adueruatu uero expetente cum aqua dissolutos illinito, & post modicã temporis intercapedine frigida abluere iubeto: aut cremore in quo fursur maceratus est, maxime si adeat inflammatio.

Aliud. Spumę nitri drachmas octo, alcyonię dr. viii. galbani drachmas octo, amygdalarum amararum delibatarum drachmas tres, melle excipe, ac illitum sinas arefieri. Deinde iube faba dentibus contrita extergi, ac ablui aqua moderatẽ frigida: cautosq; esse præcipe, ne aut a uento, aut a sole lædantur.

De maculis a sole prouocatis, quas Græci ὀφθαλμῖδες uocant, ex Critone.

Cap. xi.

Fiunt etiã in facie maculę, quas Græci ὀφθαλμῖδες uocant, eod quod a sole prouocentur, maxime circa maculas & nasum: & apparent sanẽ non in alto fixę, sed instar flosculorum productę, quare leniter eas contritas atollere oportet, ac sinere arefieri, cõmone req; ut uno aliquo ex smegmatum genere extergantur. Discutitur enim ab illis, aut certẽ ita abscedũt, ut digitis auelli queant. Verum non uiolenter id facere conuenit, sed leniter & paulatim. Quod si adhuc inharẽant, nihilo leuiores reddig, subscriptis utẽ dum est. Brasica contrita, & illita, ad maculas a sole productas, & lentiginēs, atque omnia alia quę mediocri extersione ac repurgatione indigẽt, utilis est. Similiter autẽ & sepię testę usatę, aut testę purpurarum, ac buccinorum cum melle illitę. Oportet autẽ has testas in crudam ollam coniectas in fornacem immittere ac assare. Oribasij ad maculas a sole prouocatas, uarosq; & utiliginēs, Farinę erui li-

bras duas, seminis erucę libram unam, amygdalarũ amararũ, cucumeris syluestris radicis, cuiusq; librã unam, in uino mulso dissoluta & contrita illini, ac post horę spatium spongia absterge. Aliud ualde admirabile. Cera tyrhenicę drachm. x. ulei rosacę drachmas septẽ & dimidiã, pinguis anserini unciam unam, spumę argenti lotæ & dealbatę unciam unam, cerussę unc. i. gummi drachmas quatuor, mellis Attici unc. i. dissolutis illini faciem: & post spatium horarum sex spongia deterge, ac laua cum sapone. Aliud Oribasij. Lupinos in lixiuo per triduum maceratos contẽre, & cum eis lentiginēs illini, donec auelli possint. Aliud. Saponem Gallicum aqua tritum modico adiecto melle inungere, & per horas tres inharere sine, aut sterus columbinũ linteo exceptũ ac in puluerem exustũ, cum oleo contẽre, ac illine cõfidenter. Idem probẽ efficit myrobalanos contrita illita: itemq; bulbus crudus per se uel cũ oui luteo & aceto aut melle. Exusti autẽm bulbi unã cũ alcyonio illiti depurgant lentiginēs: quod facit elateriũ quoq; illitũ, & casia cum melle, brasicæ semen cũ aceto, hederæ folia uino decocta, radix umbilici ueneris cũ cerato liquido illita: aut cucumeris syluestris radix: aut sici uirgulta in aceto decoque, ac cõsuis utere: quod idẽ & utiliginēs sanat. Aut rubiã oleo cõtritã, aut costũ aqua cõsum, aut nitri spumã cerato liquidiore exceptã, aut lupinos crudos cũ lixiuo coactiliariorũ decoctos & cõsuis, cũ melle illini. Aliud. Radicis narcissi delibratas in aceto decoque, ac tere, iniecta farina erui sufficite, & pastillos informa: quos in umbra excicatos, in usum adserua. Qui ubi postulatuerit contritos cũ melle, ad uesperam illine: mane autẽ rursum ab lui præcipe. Aliud. Lilij bulbos quinq; cõtẽre, & conijce spumę nitri lib. i. deinde melle quãtũ suffecerit cõmisitũ illini, usquequo integrẽ curentur, ut iã antea dictũ est. Aliud. Amygdalarũ amararũ partes ii. melanthij torrefacti partẽ i. unumquodq; seorsim contẽre, & cũ melle cõmiscere: illinito autẽ ad uesperã, maneq; abluito cũ aqua dulci. Vtere autẽ uno aliquo ex smegmatibus superius ad faciei nigredines præscriptis: itemq; his quę sunt illis uicinia, ac similia. Vtile autẽ est & hoc, præsertim si fuerint diuturnę, buccinã exure, ac cũ melle contẽre, & ad uesperã illine: mane autẽm ablui cum aqua dulci præcipe.

Aliud ad solares maculas, ualde pulchrũ. Oua integra in aceto macerata, donec testa quãtũ terrentia fiat, deinde superius perforata, ac extrahẽ ab eis candidi: post uero iridis Illyricę tufæ ac cribratę, & melanthij in tenuissimum puluerẽ redactę, & thuris equas partes cũ eis cõtẽrito, adiectoq; melle sufficite, ut dictũ est, utitor. Quod si adhuc perseuerauerit affectio, huiusmodi excoriorijs utendũ erit. Excoriorijs macularũ a sole prouocatarum & lentiginũ. Melanthij quadrantem, seminis ocymĩ quadrãtem, radicis ari quadrantem, aqua subigito & impo nitro, ac finito adglutinari: post aliquantũ uero interstitiũ detrahitũ, atq; aqua calida quã plurima proluito. Aliud. Quod ad callosam facie cõducit, siue per ætatem, siue per continuũ pharmacorũ acriorũ excoriationẽ calli sint cõtracti, seminis erucę sexuncem, ammij, cardamomi, radicis ari, costi, cuiusq; quadrantem, contundito, cribrato, ac reposito. Vbi uero necessitas exigit, quãtũ satis uidetur accipito, acetoq;

449  
acetosq; subactum imposito satis cōdensatū: quū ue-  
ro adglutinatum fuerit, acetum utraq; per spō-  
giam instillato. Facta autem excoarctatione, multam  
aqua calida adfundito: a prolutione uero subje tam  
mixturā panniculo laneo exceptā imposito. Ceruf  
se drac. vii. spumę argēti lotę drac. iiii. adipis anse-  
rini sexucę, medullę ceruini sexuncę, cęlypi medica-  
mētī quadranti, adipis suilli recētis quadrantē, olei  
scsamini quantum sufficit. Oportet aut fomentū ad  
hibere his in die eleuata autē cute, sequens ceratū est  
imponendū. Adipis caprini a fibris depurati & loti  
lib. ii. olei susini sexuncem, olei rosacei, & amygda-  
lini, cerę, mastiches, cornu ceruini usi, salis ammo-  
niaci, cusuq; unc. i. terrę cimoliz trientē. Ea quę eli-  
quari possunt liquefacto & percolato, deinde rur-  
sus ad carbonēs lentē decoquito, & ad ea quę sicca  
sunt in mortariū adfundito, ac probē unitis uitior.  
De exulcerata mēti scabritie. Vtendum est ad eā his,  
quę paulō pōst in capite uidelicet decimoquinto de  
scripta sunt, ad manātes menti popularū eruptiones:  
De stigmati siue notis a uerbere illatis. Cap. xii.

Stigmata appellant, quę in facie, aut alia quapiā cor-  
poris parte insiguntur, notas, quales uidemus in  
manibus eorum qui militiam exercent. Atramento  
autem utuntur illi calidiorum spīę Aegyptię &  
maximē corticis libram unā, xeris usi sextanti, gale-  
larum sextanti, atramenti sutorij undam unā, cōm-  
dito ac cribrato, primumq; usū a se cum aceto teri-  
to, deinde & reliqua cōtrita coniuncto, affusisq; aque  
quidē partibus duabus, succi uero porri parte una,  
& probē unitis uitior. Oportet autem loci prius cū  
acubus punctis sanguinem extrahere, & primū por-  
ri succo illinire, postea uero ipsum adhibere pharma-  
cum. Porrō quibus eiusmodi stigmata extirpare pe-  
nitus uolumus, illis subscriptas mixturas adhibebit-  
mus. Calcis partē i. niri assati partē i. cum lixiuio  
coarctatiorū terito, & nitro asperso locū prius pre-  
parato & extergito: deinde illinito continenter. Idē  
quoque ad verrucas myrmecias dictas, efficax exi-  
stit. Aliud, quod stigmata tollit. Piperis drach. ii.  
rutę dra. iiii. auripigmētī drac. iiii. cōtere, & adie-  
cto melle, in pyxide sigillata reponē. Vbi uero usus  
expedit, supra stigmata prius nitro cōfricta, resinā  
terebinthinā impone, uinculo adhibito in dies v. po-  
stera autē die sexta solue, atq; acu stigmata penetra-  
& cū spōgia sanguinē exterge, salēm q; tenuissimū  
in ipsas puncturas insperge: quę tamdiu inherere si-  
nas, donec stadia decem quis cursu cōfecerit: deinde  
prædictū pharmacū lineo exceptū impone, neq; sol-  
uas per dies quinq; sequenti uero sexta solue, & stig-  
mata scalpēdo expoli, atq; ubi quod nigrū fuerit de-  
traxeris, rursus pharmacū ipsum illinito cum pēna.  
Eruit enim in uiginti diebus cetera magnā exulcera-  
tionē, non relicto etiam uestigio cicatricis. Idem effi-  
ciunt mordendo erodentia medicamina in uulnerū  
tractatu descripta.

De uariis faciei, qui tum tonthi, tum Aena. Græcis  
uocantur. Cap. xiiii.

Solet circa faciei cuticulam tuberculum oboriri, pa-  
uum quidem, sed durum, quod uari nomine appel-  
latur. Id sanē a crasso humore producit. Quare cu-  
ra eius per ea quę duriciem emolliunt, & tumorem  
disscunt, medicamina perficitur: quorum sylum  
eiusmodi tibi parabis. Lilię radicem tritam cum mel-

le illinito, aut cyclamini radicem cum melle, aut nar-  
cissi radicem cum melle, aut caliam cum myrrha &  
melle, aut plumbaginem cum aceto, aut pulegium  
tenuissimē tritum, ac cerato exceptum impone.

Aliud. Mellis & aceti acerrimi, cuiusque æqua-  
les partes simul permixtas illini, ac digito circumte-  
re. Aliud. Sepiæ testæ usæ sextantem, costū sextan-  
tem, myrobalani undam unam, contere cum aqua  
& illini, arefactum uero rursus humecta. Aliud.  
Costum contunde, & cribratum in tenuissimum  
puluisculum redige, deinde cum felle caprino com-  
mixtum in cerati modum effinge, & cum eo uaros  
ad uesperam illini: mane uero a somno, lacte, quale  
cuncq; adfuerit, faciem abluerē iube. Aliud. Alu-  
men scissile quā tenuissimē contere, & resina tere-  
binthina exceptū impone. Quū autē diu persisterint  
uari, his utendū erit, Saponis Gallici drach. iiii., am-  
moniac thymiamatis drach. i. thuris drach. i. dissol-  
uito in aqua, & ad cerati densitatē reducto, sicq; illi-  
nito, ac post horę spatium abluī cū calida præcipito.

Aliud. Rhois culinarij, hyssopti, pulegij, salis fossi-  
lis, seminis ocymi, cuiusque æquales partes, cerato  
rosaceo exipe, ac utere. Aliud, quod ad eminenti-  
ores faciei affectiones, itemq; pruritus efficax est,  
necnō ad principū elephantiasis. Gummi albi & ni-  
tri equas portiones, acri aceto dilue & illini. Vbi ue-  
ro exaruerint, subscripta mixtura depurga. Saponis  
Gallici lib. i. ammoniaci, spumę niri, thuris, masti-  
ches, cuiusq; quadrantē, saponem, & ammoniacū in  
uase fictili cū aque chœnicę una decoquito. Vbi ue-  
ro dissoluta fuerint, sicca cōtrita ac angustissimo cri-  
bro excussa, inijcito: deinde transfer in pilā, probetq;  
cōsum uitreo uase recōdito. Necessitate uero expe-  
tente faciem illinito, & post paruū interstitiū multa  
aqua abluito: prius leniter facie cōfricta. Hoc pha-  
maco semper ad uaros utere. Aliud ad uaros, cele-  
bre. Niri rubri sextantē, cimoliz undā unā, thuris  
drach. iiii., farinæ erui undam unā. Vtere autē hoc  
modo: Accipe halcyonū, ac per se optimē cōtere, de-  
inde iniecto oleo simul tere, & ex eo faciem ad ues-  
pera illini. Mane uero a somno præscripta composi-  
tione exterge. Aliud smegma, quo per omnē curā  
uaroꝝ uti conuenit. Farinæ fabarū, farinæ scsamini,  
medullę peponis sicę, cuiusq; drach. iiii. contere,  
& cum his exterge. Aliud. Nitrum cū myrrha  
tritum aqua permixtum exhibe, eoq; extergatur.

De sciosis faciei tumoribus. Ex Galeno. Cap. xiiii.  
Est & hæc una aliqua ex menti affectionibus, in hoc  
differens a uariis, quod non solum crassus exstitit hu-  
mor a quo producit, sed ferosa etiam tenuitate par-  
tid pat, ob quam & citius exulceratur, si quidem nō  
uti conuenit cures, & sciciorib; etiamnum indiget re-  
medijs, quā ea sunt quę uariis adhibentur. Oriba-  
sius ad Eustathium. Ficos appellant germina ulero-  
sa, rotunda, subdura, rubicunda, quę consequitur  
etiam dolor. Nascuntur autem ut plurimum in capi-  
te, atque etiam reliquo corpore, de quibus Crito sic  
scripsit. Ad sciosas menti eminentias, Critonis.  
Spumę argenti drach. iiii., thuris drach. ii. salis fos-  
silis drach. ii. sandarachę drach. i. contrita simul im-  
pone. Aliud ualde præclarum. Elaterij drach. ii.  
salis fossilis tantundem, chalcantbi drac. ii. sandara-  
chę drachmam unam, misce: & cum specilli instrua  
mēti, quod melā Græci appellant, extremo adnota  
impo-



imponere, præhumectato prius loco quo pharmas melius infideat: post impositionem uero cataplasmate seminis lini aqua dissoluti superne contenge. Aliud, Archigenis, ad capitis & medi ficos. Chalcanthi assati, aluminis scissilis, glutinis, cuiusque equalis partes, squamæ aris duplum: glutinum in aceto maceratum dilue, & cum eo reliqua trita committite. Vbi uero uti uelis, in aceto rursus dilue, ac ex eo ficosas eminentias inunge, & rasura tenuis linteoli contenge. Inheret autem pertinaciter, atque citra cicatricem ficos depurgat. Vtior autem & hoc ipso pharmino ad callos fistularum leniendos in collyria informato. Quod si humidus sint tumores, nimirum aqua effluente ex eis, uelut a fonte, pura, subscriptis remedijs utendū erit. Pastillus ad ficosas medi eminentias. Reprimit autem omnes tumores qui accedunt illis, qui male cicatricem obdixerunt: quemadmodum uideamus in his, quibus palpebræ aut labia sunt confurta: Squamæ aris sextantem, misyos assati sextantem, auripigmenti sextantem, diphrygis drachmas tres, chalcididis uisæ drachmas quatuor, aris uisæ drachmas quatuor, glutinis fabrilis drachmas quatuor: cōponere & utere ut dictum est in priore. Nam & ob eius usum, magnum nomen adeptus sum.

Ad manantes menti papularum eruptiones, ex Critone. Cap. xv.

Conferunt quidem & his plurima eorum quæ antea ad capitis ulcera manantia præscripta sunt. Proprie autem profunt hæc: Spumæ argenti, chalcanthi, mali corij, baccharum myrti, singulorum equales partes cum uino & oleo myrteo tritas illinito. Aliud. Præclarum & hoc est: Verbenacæ supinæ drachmas octo, acaciæ drachmas octo, myrrhæ drachmas duas: cum uino tritas utere. Aliud. Myrrhæ uncia unā, thuris sextantem, acaciæ tridentem, utere cum uino. Aliud. Spumæ argenti, ladani, baccharum myrti nigrarum, seminis hyoscyami, mali corij, æqualibus partibus cum uino & oleo myrteo aut rosaceo permixtis utere. Aliud, quod & ad ea quæ instar faul melle manant ulcera, melicerides Græcæ appellata, cōducitur: siue ea in mēto, seu in capite existat: quæ à Syris appellatur Sanalia. Spumæ argenti & baccharum lauri, equales partes cum aceto ac oleo myrteo illinito. Experimentū enim bonū de se præbuit saepe.

De impetiginosis tum menti, tum reliqui corporis tumoribus ex Galeno. Cap. xvi.

Præterea & hæc affectio ex mixto quopiam generatur humore, nimirum serosis & tenuibus acribusque humoribus unā cum crassioribus permixtis: quapropter etiam facile in pforā & lepram transit. Indi gerit itaque hæc affectio pharmacis fortiter desiccantibus. Quod si uero in pforā aut leprā trāsierit, ad hoc quod desiccantia remedia adhibenda sunt, necesse erit & repurgantibus uti. Itaque Crito ita scripsit, ad eas quæ in mēto prodeunt impetigines, lichenas appellatas: Affectio, inquit, est insuauissima, & pruritus inferens, & drcumtensionem, & periculum nō minus. Proserpit enim aliquando per uniuersam faciem, & oculos ipsos cōtingit. Quare diligentiori cura utendum erit, ubi ea quæ iam longo tempore perseuerant, ab his quæ recēs prodierūt discere uerimus. Ad recētēs igitur impetigines cōueniūt hæc: Perdicij herbaræ folia cōtinenter in loco cōfrica, aut thus, aut amomiacū cum aceto terito, aut etiā cū perdicij succo,

ac illinito. Aliud. Liquorem qui ex humidis oleis lignis cōbūrantur effluit, illini. Idē factū quod ex brasica caule dū aduritur, destillat, illitū. Aliud. Maluæ agrestis semē depuratum collige, conteneat expressum inde succū reponere, eumque assidue illine.

Aliud. Portulacæ succum continenter illinito.

Aliud. Lacrymam syluestris oleæ cū aqua diluitor, & adiecto modico syraxe, unito ac imposito. Vbi uero iā diu durauerint impetigines, uiticis folia cum aceto trita illini, aut hastulæ regię radicem in aceto decoctā & trita adfrica. Aliud ad diuturnas impetigines. Chamæleonis nigri radicē in aceto decoque, cōtere, & illine. Verū quā diuturnas impetigines multa & uaria excogitata sint remedia, particularim de singulis dicēs, initū fumēs à pastillis. Pastilli. Pastillus ad impetigines in quacunque corporis parte cōsistat: Alcyonij uisæ drach. ii. sulphuris uiui, thuris, pyretri, spumæ niri, cuiusque drach. ii. chamæleonis nigri radicis dra. iiii. hastulæ regię radicis dra. iiii. glutinis drachmas quatuor. Glutinū in aceto dilue, & cū eo reliqua excipe, desicca, & utere cū aceto. Pastillus ualde celebris. Foliorū ficū siccōrū dra. x. i. chalcididis crudæ dra. x. calcis uiuæ drachmas octo, misyos crudī drachmas quatuor, thuris drachmas quatuor, sulphuris uiui drachmas octo, aceto subige, & cum aceto utere. Pastillus ad impetigines. Qui & callos extirpat, & cicatrices supra opinionem: Thuris, testarum buccinorum uisiorū, simi columbini, alcyonij, gummi, singulorum æquales partes contere cum lacte, & informa pastillos, ac utere cum aceto. Pastillus alius. Lacrymæ oleæ syluestris drachmas quatuor, thuris drachmas quatuor, sulphuris uiui, alcyonij, spumæ niri, halicæ cōtusæ & cribro excussæ, cuiusque drachmas octo. halicam in aceto multū atque acerrimū cōnectatā diu decoque, donec uiscosa reddatur: reliqua uero eum ea ipsa cōmissa in pastillos informa, ac cū aceto utere. Circūlaciones ad impetiginē. Ad impetiginēs maxime feras: Niri, chalcididis assatæ, ammoniaci thymiamatis, succi serapiadis tres testiculos habētis, equales partes cōtunde, & cū aceto illini: efficax est & ad humentes impetigines, atque ego sanē uscosum, & ex animi sententiā successit. Aliud. Stercoris dorcadis uncia unā, thuris uncia unā, contusis utere cū aceto, ita ut cum niri spuma impetiginē prius cōfrices, & miraberis. Aliud, quod & ad impetiginēs & uidilgines ac lepras ualde cōmodū existit. Stercoris muris, chalcanthi, sulphuris uiui, cuiusque bessem, farinæ fabarum uncias xiiii. aceti sextarios quatuor. Mulcerdā contunde, & cum aceto decoque: atque ubi bis aut ter efferbuerit, sulphur insperge & chalcantem, animaduersione habita, nec effueant & effundantur: deinde ubi parum saltem concocta fuerint, etiam farinam fabacā iniice, & simul ad stringitū crassitiē decocta redige, & ablatis ac reconditis utere. Ad lepras quidē linteolo exceptū impone, ac post quintum tandē diem abstrahere. Ad impetigines uero aceto dissolutum continenter inunge. Illitio cōcta, ad diuturnas impetigines, quæ citra exulcerationem eas summouet. Halicæ molle trita ac cribro quam arctissimo excussæ uncias quatuordecim, chalcididis, cimoliæ, sulphuris uiui, misyos, cuiusque sextantem, spumæ niri, aluminis scissilis, alcyonij, radicis hastulæ regię, thuris

ris, lacrymæ oleæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, cuiusque uncia unâ, acetî choenicas tres. Alcyonium, hastulam regiam cum aceto decoquito: atque ubi ad medietatem redactû fuerit, percolato. In colamento uero ammoniacum, thus, & reliqua sicca dissoluito: hâlicam uero in aceto quod superest decoquito: deinde reliquis adijcitur, ac simul commisis uitor. Aliud ualde præclarum. Aceti acerrimi sextarios octo, farinæ hordeacæ undas uiginti quatuor, mannæ thuris uncias quatuordecim, radicis ruminicis syluestris drachmas octo, radicis albud drach. viii, ueratri albi drach. x. alcyonij dra. x. cardamomi drachmam unâ, terræ cimolice drachmas octodecim, glutinis drachmas xvi. spumæ nitrî drachmas xvi. uirgultorû hâlicacabi uiridum fasciculû quantum manu comprehendere potes, appara & utere ut dictum est. Quod si hæc affectio diutius producatur extendaturq; & in callos transeat, nihilominus his quæ dicta iam sunt utendum est: maxime uero congruum est quod sequitur. Misys, myrrhæ, thuris, aluminis scissilis, cuiusque drachmas octo, aloës, sulphuris uiui, cuiusque drachmas quatuor: hæc cû passo ad strigmenti crassitudinem redige, & bis ac ter in die loco prius confrecto, illine: foris autem conseruandi pharmacii gratia pelliculam uesicæ, aut ex ouo superpone. Oribasij lichenicum pharmacum, factum idem etiam ad pruritus. Chalcanthi, sulphuris uiui, nitrî, thuris, æqualibus portionibus utere: ad impetigines quidem, cum aceto: ad pruritus uero, cum uino. Aliud, quod impetigines in paucis accet diebus, ualde commodum, quare præexigendam suadeo mercedem. Sulphuris drachmas octo, calcis drachmas octo, chalcididis crudæ drachmas octo, thuris drachmas quatuor, misys drachmas quatuor, foliorum capparis uiridum depuratorû drachmas duodecim, cum aceto tere, ac informa pastillos, & utere. Emplastrum liquidum, multi ad impetigines experimenti, cuius rei nuper adeo periculum feci. Picis siccæ, ceræ, resinæ colophonice, ueratri triti, olei, æquales partes. Per experimentum commedatum hoc tibi habere, propterea & mercedem præexige. Quâdoquidem uero plurimi sunt, qui illitio-num usum auersantur, maluitq; adhibere emplastrum, utpote quæ neque per sudores obortos desiliant, neque arefacta etiam cutem circumstant, annexam & horum aliquot apparatus. Emplastrum ad impetigines, quod citra exulcerationem eas submouet. Ceræ, picis liquidæ, thuris, resinæ terebinthinæ, sulphuris uiui, cuiusque sexuncem. Quæ liquefieri possunt, liquefacto, siccaq; eis committito. Aliud quod similiter citra exulcerationem opiculatur. Picis liquidæ libram unam, mannæ, sulphuris uiui, farinæ lupinorum, cuiusque unciam unam, galbani sextantem, Picem calefacto, & galbanum præmolitum adijcitur: liquefactis uero, ac ab igne ablatis reliqua inspergito ac uncto. Ut ere autem hoc ut uehementer commodo. Aliud, quod citra exulcerationem auxiliatur. Chrysocolle siccæ quæ aurifabri utuntur, chalcididis assatæ, misys assati, squamæ æris, diphrygis, salis ammoniaci, terræ cimolice, cuiusq; drachmas quatuor, æruginis drachmas duodecim, chalcanthi drachmas vi. lapidis asij, æris usti, utriusque drachmas sex, foreos drachmas quinque, aluminis liquidî drachmas quatuor, contunde om-

nia diligenter, & adiecto aceto sedulo in sole subferuentis caniculæ aestu contere, donec ipsum phar-macum æruginem contrahat. Apparetur autem in alio quopiam mortario, thuris sextas, myrrhæ sextans, aloës uncia una, ladani uncia una, opoponacis uncia una: hæc in aceto diluta & ad strigmentitiam crassitudinem redacta, illis quæ antea in æruginem commutata sunt inijce, ac rursus contere, atque his omnibus aristolochiæ contusæ & cribratæ undam unam adijce, & rursus tere. Quum uero omnia in formam emplastri redacta fuerint, liquefiscibilia liquefacto, ac affundito. Sunt autem liquefiscibilia hæc, ceræ drachmas centum, terebinthinæ drachmas cc. galbani drachmas nouem, olei libram unam, emollita in usum adseruato simul omnia. Hoc ipsum pharmacum duplici aspectu se uidentibus offert. Aliud, quod similiter ad dictas impetigines efficac est, ut etiam quæ intus relinquuntur reprimere possit. Picis, bituminis, resinæ pinus, ceræ, sulphuris uiui, mannæ, æquas portiones, olei cyprini quantum sat fuerit: Liquefiscibilia liquefacto, & inspergito sicca: in tenui autem pellicula excepta imponito. Emplastri aliud ad impetigines. Picis siccæ quadrantæ, picis liquidæ undam unam, salis unciam unam, resinæ colophonice, ceræ, sulphuris uiui, cuiusque unciam unam, nitrî sulul unciam unam, chalcididis unciam unam, olei sextantem: utere. Excoriatoria impetiginum. Verum ubi iam affectio stabilis facta fuerit, & pharmacorum adhibitioni & molimini resistit, utendû erit excoriatorijs. Ea enim ex facili superficiem auellunt. Excoriatorium impetiginû, quo Pamphilus usus est Romæ: & plurimum sanè profecit, quum in urbe mentagra grassaretur, quæ impetigo uera existit. Squamæ gris drachmas octo, auripigmenti drachmas quatuor, fandarachæ drachmas quatuor, æris usti, ueratri albi, cantharidum, reiectis alis & pedibus, singulorum drachmam unam & dimidiam: unumquodque per se contere: deinde simul contusa cedria excipe, ac in densitatem strigmentitiæ redacta, in pyxidem æris Cyprij reponere. Vbi uero necessitas exigat, nitro ac modico aceto impetigine confrecta, pharmacum hoc cum specillo lato, spatho melam Græci uocant, illine: atque ubi iam adfricueris, modicûmq; temporis spatium interceserit, cû specillo derade, ac rursus aliud illine: bisq; ac ter eodem repetito, locos illicitos cum pellicula uesicæ hœuillæ, aut alterius cuiusdam animantis contegi: post pelliculæ uero impositionem fasciola leuiter colligato, ac finito pernoctetere, si quidem tamdiu sustineris uero non, ad horas aliquot, donec bullas exuisciet sanie crassæ & glutinosa repletas: quibus productis lauari iubebimus, atque remorari aliquâdiu in balineo: etenim hoc ipsum curâ adiuuare solet. Sit autê calidius ipsum balineû. Quod si prohibeat quid balineo uti, fomentum utendum est calida aqua multa: quæ ubi ita ad molestiâ usque affusa fuerit, extergere cõuenit, ac panê cû aqua mullâ subactû imponere. At ubi fordidus ulcera scauerint, emplastrum uiride spleniolo exceptû adhibeto, modico itidê de excoriatorio præscripto admixto. Exclusa autê sanie, & nullo amplius rectorio ulcri incumbente, exemplastro albo linteolum paruum illitum imponimus: eoq; utimur donec omnino ad cicatricem perducatur, quotidie fomento adhibito.

acno po splenolo ex emplastro albo illito. Porro admodone excorioriorum, uicinas impetigini partes munire oportet pharmaco quopiam ex his quæ ab inflammatione locos uentur, arque ita excorioriorum ad impetiginem folam adhibere. Excorioriorum ad mentagram, ut citra cicatricis uestigium ad sanitatem perducantur. Efficax est & ad alopecias ad solem uel ad ignem illitum. Vbi uero bulla producta fuerit, ea ac penetrare oportet, excludo autem humore, ceratis curare: cicatrice enim indurata, enascuntur pili. Atque ita uidem ad alopecias adhibetur. Ad impetigines uero utendum est eo modo qui prædictus est in excorioriorum primo. Pharmacum uero ipsum huiusmodi est: Sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, ueratri nigri, cuiusque drachmas duas, elaterij drachmas quatuor, uenturium citharidum drachmam unam, excape cedria, usus autem iam antea ostensus est. Emplastra uiridia post excorioria adhibenda. Post ipsum excorioriorum usum, subsistat uiridia emplastra adhibenda sunt: nimirum ad ulcerum ipsum repurgatorem. Viride emplastrum, quo Pamphilus usus est ad mentagram, post eruptionem scilicet bullarum. Cerae libram unam, resinæ pinus siccae libras duas, aeruginis quadrante, olei ueteris besselæ, aceti acerrimi quantum suffecerit. Aeruginem ad solem cum aceto conterito, liquefibilis liquefacto, & frige facta, ac in mortarium coniecta simul unio. Aliud. Aeruginis drachmas 11, mannæ drachmas 1111, galbanij drachmas 111, adipis utulini drachm. xii. ceræ drachmas octo, resinæ pinus drachmas octo, aceti quantum satis uidebitur, committe. Aliud, quod euechron, hoc est, boni coloris, appellatur. Aeris usui quadrantem, aluminis rotundi, aeruginis, salis ammoniaci, mannæ cuiusque sextantem, ceræ libras duas, resinæ pinus siccae libras duas, olei dextantem, aceti quantum ad sicca conterenda suffecerit. Emplastra alba ad cicatricem perducunt. Verum ubi iam per præscripta emplastra uiridia, ulcera ipsa repurgata uideris, utendum erit emplastris albis, quo absque cicatricis uestigio ad sanitatem perducantur, quare neutiquam hæc reliquenda censeo, ut quæ ea multa ad tactum lenitate committunt. Emplastrum album, quod aquosum appellatur. Hoc emplastro Magnus medicus usus est, post impetiginem excoriorionem. Cerussæ, spumæ argenti, ceræ thyrrenicæ, aquæ puræ, singulorum libram unam, olei omphacini libras duas. Spumam argenti, cerussam, & aquam simul contere, atque ubi tenuissima facta fuerint, oleum guttatim infusillatum simul contere, donec sufficenter fuerint cōnita: deinde in fistili uase ad ignem adhibe, ac continenter agita: quum uero aqua cōsumpta fuerit, iniice ceram: Atque hoc modo in mortarium insula emollito, ac utere. Aliud, Cerussæ libras duas, misyos crudi sextantem, terebinthinæ undam unam, ceræ sextūcem, olei libras tres, aquæ choenicas duas, compone ut prædictum est, ac utere. Licebit etiam uti ceratis sedis, & quæ ad ambustos descripta sunt tenerioribus.

Ad molestem oris odorem.

Cap. xviii.

Ad grauem oris odorem, qui citra excupationem accidit: Irin in uino ueteri odorato macerata, ad colluendum continuè exhibe, arque etiam in ore retinendam aliquandiu: aut myrrham in uino meraco

dilutam colluendam præbet: aut acre acetum colluat quotidie, uespere dormitum iturus: mane uero spicæ nardi decoctum ore colluat, aut ipsam sub dentibus conterat: aut potamogetonis folia quotidie dentibus contrita expuat: aut rosarum floribus continuè confricato: aut fici syluestris radicem urito, & cinerem eius cum melle illinito: aut parum cyperi, aut floris iund odorati conuindit, & gingiuas continuè confricato: aut cimoliam cum sale terito & affricato. Aut hordeum cum sale, melle subactum & linetolo illigatum urito, & contritis utere: aut similaginem melle subactam ac exustam adhibe. Aliud. Salis albi, pumicis, origani, cuiusque undam unam, iridis sextantem, floris iundi odorati sextantem: his simul contritis dentes fricato & uniuersum corpus. Bonum enim odorem facit, & dentes dealbat.

Aliud, ad fetorem oris. Chalcitidis crudæ drachmas xii. ueratri albi drachmas octo, trita illine.

Aliud. Chalcitidis drachmas xii. cadmiæ drachmas octo, in aceto tere, & per aliquot dies ad solem æstiuum expone, desiccatoque utere. Vtile est & ad sanguinolentas gingiuas, itemque putrescentes. Bibat autem & ipsi ea quæ præscripta sunt illis, a quibus per totum corpus teter odor transpirat, in hoc ipso Sermonem, capite octauo. Aliud, ad crassitied labiorum. Prominet in plerisque superius labrum, aliquando etiam inferius, ex defluxu uehemēti a capite delato, ut prædesiat labrum intumescit, & ad sermonis prolationem præpediatur: ultra hoc, quod alias indecentia quadam faciem dehonestet. Quare curabis hos aut incisa uena, aut purgatos per consuetas excretiones. Post hæc aut adhibebis illitiones ac pophlegmatismos, quibus defluxus pituitæ a capite tollitur ac sedatur. Deinde illitionibus ad eos descriptis illines palatum: quibus præmissis, porri succum cum oleo uetustissimo ad interna labiorum illini, aut soliorum brassicæ succum unam cum oleo ad affectum labrum continue admove: aut glauciū cum uino, aut cimoliā, aut Musæ pastillum, aut pastillum æc halicacabis cum uino.

Ad labiorum fissuræ.

Cap. xviii.

Oui internam pelliculam fissuris labiorum adglutina, aut quod pellicula similitudine, circa palmarum ossicula adheret, aut araneorum atque trabibus dependentium texturam maxime albā. Eas uero quæ in altum magis se extendunt fissuras, cum adipe anserino, aut caprino curabis, aut citi medulla bouilla, aut ceruina, ita ut cum semper uiuo atque terebinthina unita, illinas. Aut gallæ omphacinen trita, terebinthina aut cæsoypo liquido, aut melle excape, & impone.

Aliud. Gallæ & mastichen quàm tenuissimè trita, cæsoypo, id est, lanæ succidæ sordibus, in forma cerati redactis, excape, ac utere. Aliud. Gallarum unciam unam, cadmiæ undam unam, cerussæ quadrantem, cōtere cum rosaceo, & illine. Aliud. Cyperi sextantem, gallarum undam unam, aluminis scissilis drachmā unam, contere, ac sicci inperge. Aliud. Mastichen cum uino trita & dilutam illine. Aliud. Fecet aceti usitam, myrteo aut rosaceo cerato exceptam, impone. Idem etiam ad magnas in extremis ac summis corporis partibus inflammationes conducit. Aliud. Testarum ouorum usitatum, gallæ, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum æquales partes lanæ succidæ sordibus exceptas impone. Ad omnia labiorum ulcera, & ad ea quoque quæ cacoethe appellat.

Ostrea

Ostrea uisita tenuissimè trita insperge. Ego autè & non uisita contriui, eisq; usus sum, neq; male celsit. Aliud, ad fissuras labiorum, Musc. pastillum cum sapa aut uino dilutū, satis crassum illinito. Optime prodest & id quod ex amurca, ad ulcera oris quæ aphbas appellant, apparat. Idèq; similia remedia efficiū, quæ ad fissuras sunt descripta, atq; etiā pastillus ex halicacabis cū uino. Ad tubercula in labris,

Vtèdū est & ad hæc prescriptis ceratorū formis, atq; etiā hoc ipso quod subiecti: Radicis rumicis ustæ, niri usi, terebinthinæ ustæ, singulorū æquas portiones, cōtritas cerato excipe, & illine. Aliud. Adipem asnerinum, melle ac solani succo mixto adhibe. Confrictis autem prius ulceribus, cum penna sæpe illini. Repurgat enim tubercula in internis labris oborta. Colluat autem ea & ante illinitionē & post eam, cum lacte.

#### De dentium affectionibus.

Cap. XIX.

Pars quædam ex tertia coniugatione neruorum à cerebro utrinque delatorum, distribuitur quidem in pelliculam quæ ipsum os, & linguam, ac gingiuas complectitur ac ambit, sensum eis suppedians. Ingenerat autem seipsam tum superiori, tū inferiori maxillæ inuoluens, ac omnibus dentibus ad eorū radicis substrata, ut ob hanc causam inter ossa soli dētes dolore afficiantur. Illi ipsi sanè nerui delatum ad se nutrimentū suscipientes: quod in ipso liquidius existit, sibi lucrifaciunt: quod autem siccius quàm cōueniat existit, tanquam alienum à se abijciunt. Ea ipsa uero à neruis redundans superfluitas in concuitatibus locellorū, in quibus ipsi dētes sunt infixi, aggregatur, paulatimq; tenacior ac densior seipsa facta, obdiuturnam isthæ conuersationem, in osium formā transmutatur. Atque hoc modo nutrimentū dentibus accedit. Itaque dētes hac nutrificatione suscepti, usq; in senectutem augetur. Vnde sanè in senibus ob defectum connutrientis materiæ attenuantur dētes, mobilesq; fiunt, ac excidunt. Cæterum quantū augetur ipsi dentes, tantum ex attritione ciborum cōsumuntur. Impossibile est autem citra nutrificationem augeri. In uniuerso itaque duabus affectionibus dentes sunt obnoxij, & his quidem cōtrariis: Indigentia uidelicet, & abundantia eius quod defertur ad eos alimentū. Indigentia ergo sicciores & alimentum non sentientes, atque ob id tenuiores eos efficit. Abundantia uero cōsimilem in eis dispositionem facit, ei quæ contingit in carnosis partibus inflammationi. Huius igitur adfectionis cura iuxta eundē scopum fiet, quem propositum habent hi, qui inflammationibus medētur. Nimirum ut abundantia partim discutiendo, partim repellendo euacuetur. Eius uero quæ indigentia alimentū contingit, tenuitatis dentium nullum remedium existit. Necessarium est enim laxari ac commoueri dentes, ubi compages eorū flaccidiores reddantur, quom non solum ipsi dentes, sed & loculi eos continentes gracies fiant. Hæc igitur adfectio necessario accidit senibus, quibuscūq; citius, alijs ferius. Auxilio autē eis erunt pharmaca adstringentia, quæ gingiuas cōfirmant, & ad arctius complectendum dentes adiuvant. Qui uero facile extinguntur dentes, eos, si quidem id ex mollicie eorū cōtingat, duriores reddere conuenit, & affectionibus minus obnoxios, per austera uidelicet & acerbata adhibita remedia.

#### Ad inflammationē gingiuarū,

Cap. XX.

Gingiuas autem ob inflammationem dolore affectis, optimum remedium existit oleum lentiscinum cōduplicato uasculo calefactum, ac in ore retentum. Sit autem recens oleum. Nocuum enim existit inueteratum. Repellit autem oleum lentiscinum dura asperitatem, & diffinit absq; mordacitate quibus maxime indigent inflammata. Atqui asiniū lac in ore retentum, ubi maxime infestauerint dolores, eos mitigat, ac ex tempore sedat. Et hoc quod ex uino ad tertiam usque mensuræ partē decoctū, apparat, quod sapam didimus itemq; heptema, & palmarum stillamenum similiter ore retentum calidum uehementer lenit. Oportet autem aquam calidam ad palmarum stillamentum adfundere, quo crassities eius diluatur. Valet etiā semperuiui minoris decoctū per se, aut cum rosaceo melle, aut cum sapa, aut palmarū stillamēto in ore retentum. Conuenit etiam inflammationis gingiuas hyoscyami succus, aut decoctum per se calidum, aut cum sapa ore retentum. Supra opinionem autem lenit succus portulacæ. In sensissimū uero inflammationis gingiuas est acetum, omniaq; acerbata, & acris, & salia.

#### Ad cruentas gingiuas.

Cap. XXI.

Cruentis uero ob bilis acredinem gingiuas, præter opinionem utilis est foliorum hyoscyami succus, aut decoctum cum sapa, aut cum palmarum stillamento calidum ore retentum. Folijs autem ad manum non existentibus radicem eius decoque cum passo, & retinendum exhibe decoctum. Vtile est & alumen scissile cum myrto, si quàm tenuissimè trita adhibeantur. Vbi uero adstrictas iam cognoueris gingiuas, colluendū sapam calidam exhibeto. Aliud. A cleptiadæ, ad cruentas gingiuas. Balaustiorum, florum rosarum, ramorum myrti, singulorū equalēs partes, cum posca dilutione decoquito, & liquorē inde percolato, ac eum in ore retinendum exhibeto. Aliud. Ramorum lentisci, balaustiorū, radicis mali cotoneæ, singulorū equale pōdus in posca decoctū exhibeto. Epithema ad sanguinē ex gingiuis erumpentem. Potente partem unam, uinaceorum uuæ tantundē, succi sanguinariæ quantū satis est, cōtere, & ad ceratū crassitudo redacta, impone ad sanguinolentū locū, aut simul cū succo tādū tere donec acrior, atq; hoc modo trita insperge. Aliud. Spongiam nouā siccam in sanguine taurino madescentē in uase fictili exure, contere ac reponere. Vbi uero uti uelis, cineris ipsius drachmas quatuor accipe, thuris drachmas duas, chalcididis crudæ drachmas duas, & simul trita insperge. Aliud. Terebinthinæ aceto torrefactæ drach. 111, æris drach. 11, tritis utere. Caldas uero in inflammationes & gingiuas corrolas, in quibus falsæ cuiusdam aut mordacis humiditatis sensus percipiunt, maxino pere iuuant dulcium aqua ruuacuant, sanguinis uero acredinem obtundūt. Quare si nihil prohibuerit, bis ac ter lauans, nō lades. Illi nendum est autem caput oleo rosaceo cum aceto.

#### Ad excrecentes gingiuas, putrescentesq; ac tumentes.

Cap. XXII.

Ad gingiuarum tumores, easdemq; excrecentes & putrescentes, conueniunt tum colluta, tum ore retenta, oleū ex immaturis oliuis expressum, oliuarū cōlymbadum muria, cedria cū aceto, gallarū decoctū,

pruni folia ex aceto decocta, cyrinorum decoctum, corticis mori aut etia foliorum eius decoctum. Arida uero & trita, gingiuis ad moueri cōmodē possunt hec: radix aristolochiæ, plantaginis semē tritū, bitumē tritū, feniculi radix usta, pulegiū ustritū, diphyrges, rubigo ferri, chalcandrum assatū, gallæ, cytini, malicorū, balaustia. Optime autē prodest gingiuis ad fluxū ore affectū: aceti & mellis, cuiusq; librā .i. aluminis sextantē. Decoque ad consumptionē aceti, & utere.

Aliud. Aluminis scissilis, myrrhæ & thuris, æquales partes cū melle filine, ac postea uino collue. Medetur autē exesis gingiuis & humore pregnantibus, lac asininū calidū collutū: foliorū oliuæ decoctū, aspalathi decoctū. Platani folia in aceto aut uino decocta. Sicca autē adhiberi possunt, rubigo ferri, balaustia, & cytini. Aliud siccū: Quod ad putredines oris gingiuasq; depastas ac cruentatas efficax est: ad cōsillas etiā, ac glādulas & columellā siccū admoue tur ad quassatos uero dentes, aceto dilutū destinetur in ore. Gallari quæ omphactides appellatur, aluminis scissilis, æquales partes accipe, ac ut ualde efficaci utere. Siccū floridū, quod Græci antherō appellat. Cyperi dra. viii. crocomagmaris, myrrhæ, aluminis scissilis, iridis, cuiusq; dra. ii. croci dra. i. sandarachæ dra. iiii. permixtis utere. Alius siccus puluis, floridus Orisalijs. Cyperi, croci, utriusq; dra. ii. aluminis scissi, sandarachæ, iridis, gallæ, cytinorū, singulorū dra. iiii. floris rosarum, dra. vi. misce ac utere. Ad putredines in ore. Foliorū oleū ustorū, radicis laetueæ, malicorij, singulorū dra. i. cōstiti parū, utere.

Ad corrosas & ab ulcere serpente insissatas gingiuas.

Cap. xxiiii.

His qui corrosas gingiuas habent cū tumore atq; etiā dolore, atque etiā quibus a serpente ulcere depascuntur, summe auxiliari fomentum hoc. Specillo auriculario lanam innecte, ac in feruē oleum intinge, eamq; donec exæquentur gingiuis adhibe, & quousq; undiquaq; appareant albæ. Ita enim ulcus serpens sinitur, atq; ex sana carne id quod corrosum est conuinitur. Post hæc autem utere adrisicorij ad gingiuas descriptis. Proprie autem cōuenit galla tenuissimē trita, acetabuli mensura, cum myrrhā māgnitudine fabæ, quibus tritis utere siccis. Præter opinionem autē ad corrosas, & quæ serpente ulcere insistantur gingiuas prodest id quod ex chalcidide & cadmia constat siccū. Sint autem chalcididis crudæ drachmæ duæ, cadmiæ uncia una. Cadmia in aceto ad solē estliuū aliquot diebus sufficenter conteratur: deinde adiungatur quoq; chalcidis, & similiter cū ea cōteratur, ad usū saepe aceto: post uero ambo bus exsicatis, tritis & tribraitis: utere siccis, sed cum cautio ne, ne quid ex pharmaco hoc deglutatur. Præclare facit etiam in serpēte gingiuarū ulcere, id quod Heliocæs, hoc est, sole uisum appellatur siccum, constans ex calcis parribus duabus, auripigmenti una & dimidia. Verū cōterere oportet & hoc ipsū in aqua, sub exorietis caniculae ardoribus, ita ut ter aqua diffundatur, & postea pharmacū desicetur. Cauēdum etiam, ne ex hoc quicquam deglutatur. Admirandā etiā opem corrosis gingiuis affert, id quod ex chara usta constat siccum, siue per se solum, siue cū melle adhibeatur. Aliud, ad ulcera serpēda gingiuarum. Aluminis scissilis, floris rosarum, cuiusq; drach. ii. salis fossilis drach. iiii. croci drach. i. utere

siccū, aut cum melle coctū. Floridum ad gingiuarū abscessus, ac ulcera oris profunda ac crustosa. Aluminis scissilis, cyperi, cuiusq; drachm. iiii. myrrhæ drach. viiii. sandarachæ drach. iiii. iridis drach. iiii. croci drach. unam. Aliud: Cyperi drach. iiii. sandarachæ dra. iiii. myrrhæ, croci, aluminis scissilis, iridis, cuiusq; dra. ii. utere sicco, & cū melle. Denudatas autē gingiuas carne implet pharmacū hoc. Seminis rosarū nō antiqui partes duas, calami odorati In dici partem unā, siccū tritū adhibe. Aliud: Florū rosarū dra. iiii. calami dra. ii. malicorij drach. ii. aluminis scissi drach. i. Optime autē carnem gignit & hoc quod ex erio constat, siccum capitale. Relatum est autem in his quæ uulneribus adhibentur remedijs.

Ad parulidas, hoc est, gingiuarum inflammationes.

Cap. xxv.

Parulis est inflammatio parū alicuius gingiuarum cum tumore, quæ ubi non dissolutur, suppuratur. Quare in principio adiuuare oportet quo submitatur, per dissoluentes uidelicet collutiones, quales sunt succus pisanæ, decoctum seminis lini, aqua mulsa calida, aut mullum. Deinde siccis deprimita est inuentia carnis. Conuenit autem eis hoc: Sulphuris uti, pipēris, aluminis scissilis, partes æquales. Deprimat autem parulidas alumen omne uisum, aut etiā sorij, trita adhibeat. Quod si suppuretur, ferro uenæ incisio distractam & excisam linamento imposito disparato, aut cum lincolli rasura. Amat autē magis excisionem gingiuarū abscessus. Simpliciter enim incisū, in fistulam proficiunt. Post excisionem medicandum est ipsum hulus per collutiones: & cauum quidem eius, eo quod ex eruo constat sicco capitali impleto: ubi uero ad æqualitatem peruenierit, eo quod floridum appellatur utitor.

De epulide, id est, excrecente gingiuarum carne.

Cap. xxvi.

Epulis est excrecentia carnis ab inflammatione consequita, iuxta anteriorem dentem molarem, aliquando cum febre & uehementi dolore internarum mandibularum, ut neque os ægro aperire liceat, contingens. Primum itaque inflammationē soluere oportet per collutiones eam submittentēs, qualis est aqua mulsa, succus pisanæ, decoctum seminis lini. Proderit autem & totam maxillam cataplasmate ex semine lini & aqua mulsa integere. Vbi uero inflammata fuerit, & hiare iam poterit infirmus, medicari oportet epulidem sicco deprimente: maxime eo quod iam in parulide dictū est, atque etiā eo quod ad serpentia gingiuarū ulcera descriptum est, ex chalcidide & cadmia. Imponenda est etiam rasura lincolli. Vbi autē serius caro cōsumetur, siccū quod carnē excedit apponatur: uelut est ærugo per se, aut cum æqualis ponderis galla, aut siccum quod appellatur flauum: deinde rursus rasuram lintei impone. Quod si adhuc morā traxerit epulis, forcipe arrepta, excindatur cum tenui scalpello, aut si mauis enscutulo paruo. Sequētibz uero diebus cūretur hulus per collutionē aquæ mulsæ, & per capitale siccū, rasura lincolli adimposita. Postremū florido sicco tota cura cōpleatur. Deprimat autē epulidas, galla per se, chalcidis cruda & usta, sorij uisum, alumen omne uisum, balaustia, squama æris in aceto ad solem aliquot diebus exposita, contrita, & rursus exiccata.

Probe

461 Probe facit & hoc: aluminis scissilis drachmas 11. gallarum drachmas quatuor, salis torrefacti drachmam unam. Vtere sicco.

De gingivarum fistulis.

Cap. xxvi.

Gingivarum fistulas diffecare ac explanare conuenit, atque post inflammationem curare huiusmodi ex modo quod paulo ante diximus. Vbi uero usque ad radices propeque dentis fistula ipsa extenderetur, conandum est, ut quantum possibile sit, per fistularia collyria explatur, & per sicum, quod flauum appellatur, melle exceptum curetur, & consimili modo id quod constat ex eruo postea adhibeatur. Quod si confusio & perturbatio ægri non comitetur aut potius libenter hoc ferat, priuabis eum dente affecto. Hocque modo eruetur & fistula, & confidet gingiua: atque omnino facilis erit, ea quæ deinceps requiritur, cura.

Cura dentium à calido morbo doloroso affectorum, ex Adamanto sopifista.

Cap. xxvii.

Gingiuus dolore affectis propter inflammationem aut corrosionem, conuenientia ad hanc rem remedia locis affectis nudis adhibenda sunt, quæ sanè ad omnem mordacitatis expertia sint, aut mediocriter acerbæ, & terrei temperamenti. Vbi uero dentes soli patiuntur, aut cum eis simul coræci nerui & pelliculæ: tum ipsis curatus pharmacis, ea quæ tenuium partium in sua substantia existunt adiungimus, quo uis ipsorum in profundum perferatur. Et si quidem frigidus sit morbus, calida tenuium partium adnectimus. Si uero calidus, ea quæ refrigerare possunt, & simul tenuium partium existentia, commiscemus. Calida itaque existente affectione, & uigente ætate, & temperamento calido, & regione & æris statu consimili, ad collationem oris preparabimus, in aceto albo decoctam radicem halicacabi, semperuiui minus, portulacæ, perdicium, & glycyrrhizam. Quod si intolerabilis existat calor sensus, ut dicitur est hyosciami folijs, aut semine papaueris hortensis, & semine lactucæ, decoctis in aceto albo. Si uero unà cum dentibus gingiue ipsæ doluerint & inflammatae fuerint, acetum ut acutum & hostile gladium deuitaluo enim acore gingiuas corrodit: maxime itaque consolatorium eis existit, lac asininum. Ego autem aliquando cuidam huiusmodi temperamenti existenti, & in hanc affectionem delapso, oleum rosaceum & myrtum in ore detinendum exhibui, & sanè uiri sibi uidebatur hic homo, tanquam à face accenderetur. Nunc itaque cum melle rosaceo miscui, & moderate tepefecit, quo frigoris uehementia frangeretur, & ore detinenda exhibui, & à dolore liberaui. Maximè etiam auxilium affert, ea quæ ex papaueris capitibus apparatur antidotus soporifera, si tepida ore retineatur. Similiter & lac asininum assidue collutum: & sapa quoque ore retenta. Optimum etià remedium eis existit, pastillus qui ex seminibus constat soporiferis, & consimiles, sapa subacti, & affecto loco obducti. Oportet autem & caput maderare ex rosaceo cum modico aceto diluto: idemque auribus instillare cum aceto, Aut terrenos uermes oleo decoctos in propinquam aut infusilla. Aut millepedes sub aquario uase stabulantes, quæ & aselli à Græcis appellantur, eodem modo. Similiter & araneos, & blatæ interanea oleo decocta in aure infundenda. Nutriantur autem ex pitana, halica, ouis, lactucis, & cucurbita, & quæcunque tandè his potestate sunt propinqua. A uiuo autè abstinèat. Ad comanducandū

uero exhibe sub dolentem maxime dentem, herbæ perdicij radicē, aut hyoscyamum: præsertim in balneo, ita ut continet in ore succum ex eo donec inde egrediat. Suffire etià conuenit egro hyoscyami semine, aut canis mortui dente. Inde enim fistulam dolor sedatur. Eodem modo etià terrenos uermes suffuso.

Cura eorum quibus ex frigidityte dentes dolore afficiuntur.

Cap. xxviii.

Frigidus dentium morbus cognoscitur ex figura tum capitis, tum reliqui corporis, & ex ea quæ præcessit diæta, itemque exercitio, ac reliquis quæ ad hunc ordinem referuntur. Medebis autem diæta omni ad caliditatem ordinata. Sint itaque cibi, pitana cum pulgore decocta aut cum ruta, aut cum post cocturâ additum est piper. Similiter & halica, olera, petroselinum, & similia. In potu exhibendum est uinum, modicum tamen, & mulsum, atque etiam quod appellant Conditum. Sero uero ubi dormire uoluerit, confectione ex calamintha cito penetrantem, aut potum, aut linctum deuorandum exhibe. Ad oris collationem, in aceto decocto origanum, calamintham, hyssopum, pulegium, dictamnium, satureia, tithymalli radicem, chamæleonis nigri radicem, uerberacæ rectæ radicem, eryngij radicem, uerbasci radicem, uerari nigri & capparis radicem. Vnumquodque enim eorum aceto decoctum ac ore collutum dolores dentium sedat, qui à frigidityte sunt oborti. Ad eos uero quorum sensus citius afficitur, hæc cum posca decoquantur. Porro ex uino si decoquas prædicta ac colluas ter aut quater in mense, preueniunt ac conseruant eos qui frigidiore temperatura sunt, ne dolore dentium afficiantur. Obseruatum est & pingulum lignorum, ueluti tedarum ac picearum, decoctum ipsis prodesse: cotunduntur autem hæc ac cum caricis decoquuntur ad usum: collutum enim hoc infusum dentium dolores mitigat. At uero & ipsas tedas contusas in oleo decoque re licebit, oleumque calidum in ore continere. Quinetiam ipsas tedas conuassatas solas ore detinere commodum existit, circa affectum maxime dentium. Succus etiam balsami in ore retentus, non paruam se præbet commoditatem. Itemque castoreum cum nardo auribus infusum. Quod si omnes ex aquo doleant dentes, in ingressu balnei cedri in os coniecta usquequo egrediat contineat, & dolore liber erit. Commodum etiam erit manducandas & loco dolenti ad mouendas exhibere, radicem pyretri, radicem tithymalli, & ricini. Similiter autem & theriacem, aut Eledræ antidotum, sapa dilutum ore detinendum exhibe. Præclare facit & Philonis antidotus illita, & quæ appellatur Sotira. Suffuso autem canis mortui dente, ita ut fumus inde progressus ore excipiat. Post uero ipsum dentem usum, & modico aceto tritum, calidum ore retinendum præbe, & dolore liber erit. Poteris & alyonium suffire. Capitis uero cura in primis habenda est. Ad id ergo huiusmodi in peritione utaris: helenij quædrantem, iridis sextantem, aristolochiæ longæ, fomentum adhibe ex milio, aut eruo, aut tritico torrefacto cum bacis lauri, modico adiecto sale. Vt ne putrefacti molares immobilesque conferuentur. Succe racemorum uitis albæ libram unam & dimidiam, corticis radiceis mori sexuncem, decoque ad dimidium, calidumque ore retinendum per septem continuos dies exhibe. Qui enim hoc uitur nunquam dentis dolore afficietur.



tur. Collutio, proprie ad dentes ualēs. Corticis radicis hyoscyami drach. viii. pyretri drach. iiii. spicæ nardi drach. i. mellis dodrantem, aced libras tres: decoque cum aceto in fittili nouo, & percola: deinde adiecto melle utere.

*Cura dentium ab humiditate dolore affectorum, & laxatorum.* Cap. xxx.

Assumamus autem mox alium egrotum, qui uniuersam corporis mixturam, in primis uero capitis habeat humidiorē, uisatq; delicatius, & domū habeat in humiliori loco sitam: insitet aut tēpestas humida, & hora uerna, quā addicetur. Quisnā sanā mentē habens, his uisus, non dixerit, si superabundante humore in hoc morbum esse productum? Etenim quomodo neri qui se ad dentes inferunt, permadescunt, laxioresq; sunt unā cum circumadherentibus corporibus, necessarii dentes mobiles sunt: uerum multis hoc circa doloris sensum accidit. Sæpe enim iam diximus, humiditatē per se non solere dolores inferre. Et dictū quoq; antea est, ob ætatē senilē quibusdam dentes laxari, & quod pharmacis adstringentibus gingiuas, ac denstantibus easdem, senes quærit iuuari. Porro percussis etiam dentes laxantur, his maximo pere prodest alumen scissile, cū myrrha troglodytica tritū, ac inspersum ad dolentē dente, atq; id ubertim & continuē facere oportet. Nā ipsum cōfirmat. Eos uero quibus ab humiditate uacillant, curare conuenit per digē ad siccitatē ordinatā, & cū diuturno abstinētia ciborū. Cibi itaq; eis cōuenientes sunt forbiles, halica, panis ex iure madidus, aut oryza, aut polenta cū aqua mulsā. Neq; male cōuenit eis miliū & lenticula, pisces muria cōditi, uolucres montanæ & sicciores. Ex oleribus, brasiica, & similia. In potu aqua exhibēda est, sed nō multa. Quod si concoctio nō non officere, aqua mulsā danda esset: itaq; si hanc ferre nequeunt, ad aquā modicū uini addatur. Tēpo re autē ad siccitatis, fouere cōuenit locū cū milio & sale. Collutiones exhibendæ adstringentes, & desiccantes, aut falsæ, nisi gingiue simul sint affectæ. Quare gallas, quas omphacitidas appellant, ex acri aceto decoctas, & alumen aceto permixtū exhibebimus: itemq; spīgē Aegyptiæ semen, malicorū, myrti baccas, cythnos, balaustia, oliuē folia, platani folia, cupressi pilulas, rumicis syluestris radice, lappæ radicē, folia rubi, & quæcūq; alia acerbā in se qualitatē complectūtur: ita ut his cū aceto puro, aut etiā aqua mixto, aut uino decoctis, os colluere præcipiamus, & in eo detinere adhibitu liquorem, sensui uidelicet ægri maxime gratū & conuenientē. Iudicata etiam & perpefa eorū quæ offerimus potentia, nimirum plūsne animus exhibere oporteat, iuxta exuperantis humoris multitudine. Ego autē optimā ad collutionē oris expertus sum, oliuārū muria conditarum aquā, in quā uidelicet cōduntur. Etenim omnē oris humiditātē muria ipsa extergit: corporū uero hiatū & laxitatē, oliuārū spissamētū cōcrens corroborat & firmat. Aliquando etiam oliuārū albarū contusa rū & expressarū acceptimus succū, eoq; cū rutæ succo & melle permixto, confricauimus dentes: postea uero insperimus indicam nardum cum pari pondere aluminis rotundi, & salis duplo adiecto. Optime quoq; faciunt ad hanc rem illitiones acerbæ: uelut est confectio de moris ori ualde conduens, maxime si alumen scissile habeat adiectum, & ea quæ ex

nutum succo apparatur eodem modo. Aut alumen scissile, & misy pari pondere cedria excepta, in cerati liquidi densitate redige, & cum eis dentes illine, ac pituitam defluere permittet: deinde lacte asinino calido mordacitatē eleuant, aut uino dulci. Aut alumen, & myrrham troglodyticen inspergito, aut cū aceto, aut melle illinito. Sicæ autē insperfusiones semper eis sunt cōuenientes. Vltra hoc enim quod dentes commotos firmant, etiam ex humiditate hiantes gingiuas cōmittūt. Itaq; spodiū cypriū lotū, & exiccatū inspergēs, os collui præcipe ex aqua myrti aut rubi, aut alicuius consimilis decocti. Postea rursus spodio inspergo, quiescere iube. Aut etiam rubiginē ferri siccam tritā admoue, aut fori ustum. Aliud, ad laxatos dentes & gingiuas humectas. Aluminis scissilis in fittili usti drach. vii. myrrhæ dra. iiii. gal larum, florum rosarum, iridis, singulorum drach. ii. croci dra. i. utere. Aliud. Cornu cerui usti drach. viii. rhois culinarij dra. iiii. omphacij fici drach. mas ii. balaustiorum drach. iiii. corticis pinus, myrrhæ, croci, singulorum drach. i. Aliud. Alumē rotundum cum duplo salis pondere tritum, dentibus ob humiditatem labādbus inspergito. Aliud. Myrrhæ, aluminis scissilis, amyli, pompholygis, æquales portiones, sicce, tritæ, inspergē, labātes dētes firmant. Aliud remediū, quod laxatis ac dolētibz dentibus præsentem fert opem. Aluminis scissilis sextantem, radicis struthij sicce tritæ uncia unā. contritis simul affectum dentem adsperge, teneatq; donec salua os impleatur: & tūc sanē ipsam expuat, & effundat, moxq; dolore liberabitur. Aliud, quod & dentes dealbat. Aluminis scissilis trientē, mastiches unc. i. thuris drach. iiii. solij drachm. iiii. Aliud, quod & firmat, & corroborat dētes. Aeruginis, aluminis scissilis, aut magis quod appellatur phorimō, minij, singulorum æquales partes: ut re sicco, aut cū passio. Aliud. Florū rosarum, balaustiorum, myrrhæ, mastiches, cuiuscq; unc. i. chalcididis assæ, thuris masculi, corticis pinus, cuiuscq; dra. iiii. salis ammoniac unc. i. Vtere sicco. Aliud, quod & ad exulcerationes oris cōmodū est usurpare. Rubiginē ferri, aut ipsum ferrum multa rubigine oppletū, igni candefacto, & in aceto puro, aut cum aqua diluto, aut uino, in his quibus sensus facile læditur, extinguito, ac liquorem ipsum in quo extinctio facta est, ore cōtinendū exhibeto. Dentes enim firmat, & ulcera curat, prædarē etiam facit siccum, quod floridum appellatur. Aliud, Galeni. Quo ego utor, inquit Galenus, polytrichi palearū ustarū sextarius unū: continet autem sextarius harū unc. xx viii. aluminis scissilis quadratē, aluminis rotundi quadrantē, spicæ nardi sextantē, solij unc. i. piperis unc. i. pyrethri drachmas. v. contusa & cribrata gingiuis usque ad dentium radices adhibeto. Vile etiam existit his, thus cum pipere manducatum: itemq; rubus commanducata ac ricini radix. Prodest etiam Eldræ antidotus sapa diluta ac ore retenta, eodemq; modo theriacē Andromachi. Quinetiam in uesperam potu accepta theriacē magisficē auxiliarij. Scribit Archigenes, ut uerum & naturali modo ad labantes dentes accommodatum, Dentem, inquit, canis mortuū in nomine eius, qui agrē habet acceptum, super prunas pone, uaporemq; inde procedentem æger aperto ore admittat, & fir-

& firmabuntur ei dentes. Similiter autem & exustū canis dentem cum aceto calido tritum, ore retinendum exhibe. In his uero qui facile ab aceti sensu offenduntur præbe cum uino.

De dentibus lima atterendis. Cap. xxx.

Solent ferè dentes mori ac labantes reliquis esse prominentiores, maxime quum ex uerbere hanc affectionem incurrerint. Quare uisum est mihi eos lima atterendos esse, in quantum scilicet præ alijs prominent, ne in loquendo uel etiam manducando, eos qui obijciuntur, offendant. Adtestatur autem & experientia ipsum, quantum sanè ego eius rei periculum feci. Ferream namque limulā ad hanc rem apparatus, quo citius ac efficacius res procederet. Nam multæ aggressiones cōcutiunt dētem, quiete opus habet, si modo aliqua spes est, mori dētis firmandi. Sit autem caput ipsius limæ obustum, forma nucleī, & quàm leuissimum. Itaq; aliquando quidem inæquales quædam dentū eminentiæ apparent, in quibus partes tātum aliquas lima atterere opus est. Aliquādo autem æquali planicie extremitates prominent, quare equali etiam ac plana per limam attritione indigent. Oportet autem molle quoddam linteolum gingiuis ipsis usq; ad dentium radicē adhibere. Deinde leniter sinistræ manus digitis apprehēdere, cautēq; ac citra offensionem limam adfricāre: ne dum limam tolerat, dens ipse cōcutatur. Quod si omnino dolore percipiāt eger, dum lima adhibetur, aut ob id quod uehementius digitis dentes apprehēdantur, quiescere statim conuenit, inrerimq; collutiones, doctorem mitigantes, offerre: deinde rursus, ut dictū est, rem aggredi, & paulatim lima deterere. Atque hoc non prima saltem die bis aut ter conari, uerum & secunda repetere: ita ut ægro impetres, ut neq; sermone nimium utatur, neq; ullum aliquem duriores cibū adsumat. Utatur autē cibus forbilibus, aut pane madesfacto. Quod si citra laxitatem, quibusdam dentes præter morem augeant, eos similiter lima atterere oportet, ac collutiones eos cohibentes ac densantes offerre.

Cura dentium à siccitate dolore affectorum, ex Adā manto Sophista. Cap. xxxi.

Quartus iam ex ordine subiiciendus est ægrotus, qui uidelicet à siccā intemperie afficitur. Eam autem efficiūt, autumnalis tempestatis cōstitutio in primis, & uita erūnosa, tenui accedente diætā. Præterea regio siccā, & ambiens nos aëris status cōsimilis. Ad hæc accedit id quod nunc adest corporis ipsius temperamētū siccū, & maxime si caput eiusmodi siccā intemperie est affectum. Sitis autē insidet semper, nisi adsit frigiditas unā cū siccitate. Minimū etiā spūi eijciunt frigiditas. Et ob siccitatē dolor intolerabilis ferè eos concomitatur: austerorum & acerborum usus maxime contrarius eis existit. Quare confectio ex moris sepe his uehementē dolore induxit, itaq; collutiones minimū adstringentes, & mediocriter humectantes apparare oportet: aquam calidā per se, aut sursum decoctum, aut radicis dulcis, aut prisanę succi, aut amyli cū sapa aqua calida diluta: ac per se, maxime asininū, malū decoctū, & alia quęcūq; his sunt similia. Cibus autem his conueniens est succus pistanę, micæ madesfactæ, cucurbitę, malū, oua forbilia, & quęcūq; his profunt qui humectatione indigent. Atq; hætenus quidem simplicium intempe-

rierum curam ostēdimus. Manifesta uero & hinc sit ea, quæ cōpositæ requirunt: Nimirum ex dictorū mixtura cognobiles, & ex tēperatura ostensorū auxiliorū curā accipientes. Verū propter eos qui se nuper ad hanc disciplinā contulerunt & inexpertos ad huc, age paucis unius tantum cōpositæ intemperiei mentionem faciamus, quæ ut manifestum exemplum ad reliquas cognoscendas statuetur.

Cura dentium ob caliditatem & humiditatem doctorem affectorum. Cap. xxxii.

Sit sanè regio calidā & humidā, tempus autē anni uerū, & aëris quoq; status calidus & humidus, qualis est austrinus. Cōtingat itaq; eger, qui caput habeat, quod facile eiusmodi humiditate impleatur, cuiusq; coma plurima sit & subrusa, & totius corporis temperamētū calidum & humidū, & cōsimili quoq; utatur diætā. Quis autē, qui saltē probatus medicus haberi uelit, in hoc calidū & humidum esse morbum nō imaginetur? Medeberis igitur ita affecto bisariā: Si enim excessus naturę cōtingit iuxta qualitates itū, scopus curationis dirigendus est ad alterationem solam: Si uerò unā cum qualitātū excessu, & humorum multitudi adfuerit, palam est primum oportere corpus euacuare, deinde ad temperiem reducere: cuius rei in omni corporis intemperie memorem esse conducit. Eū uero qui tā calidū & humidū morbo affectus est, de quo nūc dicere instituiamus, per uenæ incisionē euacuare cōueniēs est, utpote à sanguinis multitudine exagitatū. Calidus enim & humidus sanguis ipse existit. Incidere autē oportet uenam cubiti superiorē, quæ Græcis humeralis appellatur: quæ si non contingat, eam quę media existit. Quod si quid prohibeat uenæ incisionem facere, modico & tenui uisui superfluum & non necessarium dextra hito humorem. Atq; hoc modo etiam circa reliquas cōpositas intemperies operaberis: ita ut eas quę iuxta qualitatem tantum cōsiterint, alteres, & contrarijs qualitatibus permutes. Eas uero quæ cum substantia quadam cōsistunt, humore per conuenientes purgatiōes detractō euacues: nisi quid & in his purgationem fieri præpedit. Reliqua autem quę adferre oportet auxilia, uelut sunt collutiones, & uisus constitutio, facile ex prædictis inuenire licet. Qui enim formam tractandi simplices morbos cognouerit, in promptu habebit & circa mixtos conuenientia remedia inuenire. Cognoscitur autē affligens humor, quum ex reliquis circa corpus signis, tum ex consequenti dolore. Flauæ namq; bili dolor pungitius comes existit. Pituitam uero sequitur unā cū frigidiatē distensio locorum: & fere quidē sanguinis siue atra bile affligente, sensus adest, uelut corpus cula quædam in profundo consringantur: ubi uero æqualiter omnes augeantur, multitudi eorum in corpore coaceruata, grauitas concomitatur. Verum enim uero & sapor ipse influentis humoris ægro specimen sui ostendit. Aut enim amaritudinem, aut salcedinem, aut acedinem sensu perceptat.

Curatio eroforum dentium ex Galeno. Cap. xxxiii.

Erosiones & cauernæ dentium ex influxu acrimie & erodentis maxime naturæ humorum generantur: quemadmodum etiam ulcera in cute, citra aliquam externam causam. Manifestum igitur hinc erit, quo modo sanandi sint erosi dentes: nimirum per excitationem influentis uidiosi humoris, qui si paucus

fuerit, localia remedia ex deficcandis phar-  
matis suffecerint, uero multus fuerit influens hu-  
mor, totius capitis respectu habere conuenit: contin-  
git autē aliquādo caput affici, ob reliquum corpus  
affectum, quare in his uniuersis corporis curā nos ge-  
rere oportet. Archigenes itaq; ad hos hanc remedia  
descripsit: Sori resina, terebinthina exceptū, dēti cir-  
cumlinito, atq; in cauernā indito. Præclare facit  
& hoc: Sulphur uiuū lyco exceptum cauerna impo-  
ne, & prius depurgatum dentē per orbem ex eo inte-  
get: aut gallam tritā lyco aut resina terebinthina ex-  
ceptam ad cauum intrude, similiterq; depurgato dē-  
ti appone. In maximis uero dētium doloribus sum-  
me prodest hoc: Senectam angulum uisum ac tritū  
cum oleo in mellis crassitudine redige, eodemq;  
modo, ut dictum est, utere. Aut senectam ipsam nō  
tritā dentibus adfricat: inde enim exidē, aut me-  
lanchiū torrefactum ac tritum cum oleo similiter  
adhibeto: aut melanchiū torrefactum & acri ace-  
to aduso tritū cauo denti indito ac circumlinito. Si  
stetur enim erosio, neque quicquam addet ultrā.

Aliud. Melanchiū partem unā, allij dimidiā,  
& salis parum quiddam, simul contrita circumponi-  
to, à dolore enim liberat. Proderit autem & ad ero-  
siones dentium uti ea quæ suprà ad motos dētē des-  
cripta est colluctio, ex succo uidelicet bryoniæ &  
cortice mori. Aliud. Veratrum nigrum tritū &  
melle cocto exceptum in cauernam impone, & præ-  
mundatū similiter ex eo integro dentem. Aliud.  
Thuris partem unā, atramentū futuriū partes duas,  
contere cum passo, donec cerati crassitudo fiat: utere  
ut dictum est, & cito sedabis dolorē. Aliud. Gal-  
bani partes duas, thuris partem unā, contere cum  
passo ad cerati crassitudinē: utere ut dixi, & eo ipso  
die sedabitur dolor. Aliud. Alumen fissile in ca-  
ua intrude, & à dolore liberabit. Aliud. Fel ursi  
indito, & ab erosione liberabis. Aliud. Rhodo-  
daphnes uirgultū exustum & tritum, insperge cauer-  
nis, & medeberis. Andromachī compositio, ad  
dentes molares, quæ eadem hora dolores sedat. Pi-  
peris, pyretri, succi tithymalli, galbani, singulorum  
æuales partes, galbano exceptas, cauernis impone.

Aliud Aselepiadæ. Eo, inquit, usus adseruauī ca-  
ua dentium citra dolorem, Gingiber in aceto mulso  
decoctum, & probē tritum, in caua imposito, simi-  
literq; extrinsecus ad dentē admooueto. Præclare etiā  
facit ex duobus piperis generibus cōposita antido-  
tus, causis inditā: atq; etiā oleo amygdalino aut nar-  
dino aut rosaceo diluta, & in uicinam affecto denti  
auriculā instillata. Aliud. Ego autem ad caua dē-  
tium cum dolore affecta, Elidæ Antidoto utor, quā  
sapa dilutā, & calefactā ore retinendā exhibeo. Mi-  
rum enim quā dolores ea mitiget, uerum si ad ma-  
num non addit, theriaca Andromachī eodem utor  
modo. Fomentum etiā affecto denti adhibere con-  
uenit huiusmodi. Origani sicci ramulos feruente o-  
leo imbutos egro dēti apprime. Aut ricinī uirgulto  
similiter utere: aut staphida syluestrem scalpello pro-  
bē adaptatam, ac affixā, itemq; pyretrum adhabe si-  
militer: aut cerā super affectum dentem pone, eamq;  
cum specilli extremo ignito apprime. Id enim conti-  
nuē facere non ab re est. Est autem & hæc quædam  
fomenti species: primum optemē præmundato den-  
te, hyofcyamī semen suffito, exurgentemq; hinc fu-

num eger admittat in fundibulo adhibito, ad affec-  
tum dentem: mirum in modum etiā erosiones dē-  
tium mitigat, canis mortui dens, quemadmodū &  
antē dixi, eodem modo suffitus & exustus in aceto  
tritūs oreq; retentus, probē etiā auxiliantur uer-  
mes terreni suffiti. oleum quoq; in quo uermes ter-  
reni decocti sunt, in uicinam affecto dēti aurem tepi-  
dum infusum, dolorem uehementer lenit. Idem præ-  
stat blattæ domesticæ capite detracto adeps, cum ro-  
saceo liquefactus ac auri instillatus. Eodē modo &  
hederæ albæ adnos quinq; cum rosaceo tritos &  
in punice cortice calfactos in aurem assidue instilla.  
Auxiliatur etiā radidis hastulæ regię succus, itēq;  
nasturtij similiter instillatus. Prodest quoque in uici-  
nam affecto denti nareum insundere anagallidis ceru-  
leæ succum, aut radicis betæ succum aut aramentū  
futorium cum lacte. Apolloniij. Cumini quan-  
tum tribus digitis apprehendere potes, myrrhæ, ma-  
gniūdinem sabbæ, interioris cucumeris syluestris, du-  
plum cum lacte mullebrī in collyria redige, eaq; in  
utramq; narem immittit: atq; ubi tamdiu hæserint,  
donec quinq; stadia quis cursu cōficere possit, extra-  
here iube, fortiterq; ipsum pharmacū emungere. Idē  
etiā ad auriū dolores eodē modo sumptū prodest.

Ut dens citra dolorem, & absq; ferro extra-  
hatur.

Cap. xxxiiii.

Quod si dētē tollere animus sit citra dolorem, hoc  
ce pharmaco auferendus erit uehementer ad hanc rē  
congruente. Pyretrum acerrimo aceto in dies qua-  
draginta conditum, deinde tritum, in usum adserua:  
qui ubi postulauerit, reliquos dentes cera præmun-  
tos custodito: ipsum uero qui dolet circumcirca pur-  
gatum hoc pharmaco integro, & post horæ intersti-  
tū digitis extrahito, aut scapello exigito. Aliud.  
Sori acerrimo aceto; ad dies decem, in sole æstiuo  
contritum ac excicatum, præmundato denti impo-  
nito, & excidet. Aliud. Sandaracham eodē mo-  
do apparatus, imposito. Aliud. Sori & tithy-  
malli succum galbano excepta depurgato prius den-  
ti apponito. Aut cucumeris syluestris radicē, ut py-  
retrum apparatus, eodem adhibe modo. Aliud.  
Grana cnidii trita ac galbano excepta, circumponi-  
to, & excidet. Aliud. Præclare facit lappæ her-  
bæ radix feruente cinere calfacta, & denti assidue ap-  
posita: pauca enim mora dētes tollit. Aliud. Cuc-  
cubitat syluestris radicem cauo impone, & dentem  
eruet. Aut ipsam cucurbitam usam & cribratā per  
aliquot dies in aceto macerato, donec ad mellis spis-  
situdinē redigatur: deinde in eo ipso pharmaco scal-  
pere parumper iubeto: deinde dentem digitis appre-  
hensum trahet, & sequetur. Aliud. Vermes terre-  
nos in testa exustos, in cineremq; redactos contere,  
& circumcirca prius denti ubertim adsperge, & per  
diem ac noctem excidet sua sponte. Itaq; eo confide-  
ter utere: ut mysterium enim celebratum est iam sæ-  
pe. Poteris autem & citra scalpelli rationem insper-  
gere, idemq; opus patrabit. Aliud. Coricem ra-  
dicis mori teniorē tritum, ad dentem quem eru-  
tum cupis, solū impone, & excidet. Aliud. So-  
ri, gallam, staphida syluestrem, alumen scissum, sul-  
phur uiuū, piper longum in puluerem redige, &  
adiecta cedrī subige: deinde ceram modicā lique-  
factā adfunde, simulq; cōmitte. Vbi uero uis uelis,



ulcera describemus, maxime tamē his quæ sunt ex eis sordida. Proprie autē eis profunt etiā hæc æruginis rase, chalcididis, gallæ, æquales partes insperge. Cū passo potes etiā pro collutiōe usurpare. Aliud: Farinam erui cū melle præfrictis locis, illine. Aut etiam gallā tritā cum melle, aut rosārū semen eodē modo. In corporibus autē molliori sensu præditis, rhōem rubrū cū melle: aut rhois drac. viii. florū rosarum drac. iiii. croci drac. ii. costi drach. iii. misyos, gruginis, æquales partes, cōmisce, & cū his locos sub lingua confrica. Decoctum uero foliorum oleæ coluant assiduē. Aliud. Nuces iuglandes ueteres integras, unā cū cortice exustas contere, deinde piperis grana xii. adijce, thuris grana mediocria iiii. hæc cū melle sufficēti mixta illinito, & miraberis. Aliud In inueteratis uero & perfectæ ætatis, eas quæ sub lingua sunt uenas dissecato. Extrinsecus uerō mento adhibendū ex ouis pharmacū. Magis autē conuenit id quod Græci uocant Sphæron. Aliud. Artemi siam maxime uiridem cum sale tritam ad locos sub lingua adfricato.

Ad linguam inflammatam, desquamatam, ac tumens, et ad palatum ac gingiuas. Cap. xxxviii. Glaudum in cote cum aqua dilue, eoq; locos illine, & eodem die sedabitur. Aliud, ualens etiā ad lingue exulcerationē. Paliuri folia manducet & expuat. Vbi uero lingua infletur, doloreq; afficiantur eius partes uicinæ, similiter & mandibula ita ut loquela præpediatur, folia oleæ tenera trita, & oleo persusa, illinito, egregie enim auxiliantur. Aut organum passo decoctum colluendum exhibero: aut pruni folijs cum melle tritis utere. Ad linguam uero cui superfides instar squamarum aut corticis deccedit, optime facit, amurca æreo uase, donec coagatur, decocta, & illita. Ad linguam putrescentem, & fere demortuā. Succum foliorum uitis albae cū misy permixtum illinito: depurgat enim, et carne replet. Quidā etiam hic mel adijciunt. Vt uero ad cicatricē perducat, radicē uitis albae, contrita et cribra tam insperge. Melius autē erit eam melle permiscere, ne dissipetur. Ad linguæ abscessus. Quod si ab scellus in lingua fiat, fursus in aqua decoctos donec liquor lubricus fiat, percolato, & huius succo mel adijcitur. Simulq; calidū ore detinendum exhibeto. Hoc autē sæpe facere oportet. Aut enim abscellum discutit, aut rumpit. A ruptura uero florido sicco utendum est.

Ad aphthas, hoc est, oris ulcera, ex Gal. Cap. xxxix. Quæ in superficie oris sunt ulcerationes, Græci aphthas appellant, habentes in se quiddā igneæ caliditatis: sunt autem ut plurimum infantibus, quam uisiosum existit lac nutricis, aut aliā puer non probē concoquit: facile autem medellam recipiunt, utpote quæ ex his quæ mediocriter adstringunt, ut plurimum contingit. Aliquandō tamē diuturniores existunt, ob temporis uidelicet tractum, indissolubili quodam marcore emergente, aut etiā ea quæ appellatur Nome, malo nimirum semper ulterius serpente. Funt etiam aliquando in his, qui ad perfectā ætatem peruenerunt, tum propter uisiosorum humorū ad os defluxum, tum propter ægredinē eorum quæ bibuntur acomeduntur. Cognitiono omnium facilis est, utpote uisui acta tui subiecta. Ad tactum quidem, calidiores quam conuenit loci sūt, tumoresq;

excitantur. Visu uero cognoscuntur ob colorem. Quæ enim rubicundiores existunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amarulentæ: albidiores, pituitæ. Luentes uero & nigre factæ, bilis atræ. Erenim qui ista probē discereuerit, singulorumq; simplicium uirtutem cognouerit, facile constituet modum utendi tum simplicibus, tum compositis pharmacis: consideratione simul super corporū naturis habita, numhæ molles sint, & humectæ, an duræ, & siccæ. Si quidem sordidioribus corporibus, fortiora etiam remedia sunt adhibenda: imbecillioribus autem molliora: infantibus itaque conueniendū sunt, ea quæ in cibis eis offerunt mulieres, uelut est lens cum modico pane, & medulla ceruina, aut utulina. Oportet autem miscere cibis aliquid ex malis acerbis, pirisq; ac mespilis: aliquando etiam lactucæ quiddam & intubi, ac portulacæ cibo admiscendum est, inflammata uidelicet ulceratione existente. Quod si infans ipse cibū capere non possit, nutritiē eius huiusmodi uisū cuius rare oportet: necnon ora infantium pharmacis conuenientibus illinire. Si quidem enim subrubræ infantium ulcerationes fuerint, à principio cū his quæ mediocriter adstringunt & refrigerant: consequenter uero his, quæ citra mordacitatem discutunt. Si uero subflauæ ulcerationes fuerint, ipsæ similiter est utendum, uerū magis frigidis. Si uero subalbæ & pituitosiores fuerint, extergētibz utendū est. Si aut nigra, his quæ generose discutunt. Ad maiores uero pueros, pharmacis eiusdem generis facultate præditis utaris, uiribus tantū ipsorum auctis ac extensis. Ad eos autē qui iam perfectæ ætatis existūt, durioraq; corpora habēt, efficacioribus remedijs utimur. Moderata itaq; remedia ad oris ulcerationes recētes hæc sunt Omphaciū in uino dissolutum aut mulso, rhus culinariū eodē modo. Pro infantibus in principio sufficit flos rosarū, ipsaq; rosæ sicca cū mulso, aut melle rosaceo. Inueterato autem iam malo, in minoribus quidem pueris admirandam opem contulit hoc, inquit Asclepiades. Remedium Asclepiadæ. Gallas confusas aqua decoque, & cum decocto percolato parem mensuram mellis permisce, rursusq; decoque, donec ad mellis crassioris spissitudinē redigatur: eoq; ut maximo remedio utere, ita ut locis illitū satis diu digitis adfrices, aut tomento lanæ purpureæ digito circumuoluto locis apprimas. In his uero qui perfectiores ætatis sunt, durioraq; corpora habēt, in uniuersum satis mihi fuit credo misy uti, cū uino adstringētē: quod sanē cū intendit, ut remittit uires suas, iuxta uini uim aut magis, aut minus adstringētis, atq; etiā secundū quod densior aut liquidior uini & misyos mixtura apparatur. Si uero sordidū apparuerit ulcus, misy cū uino mulso tero. Alijs autē & qui adhuc fortioribus indigent remedijs, ærugo & cū uino & cum mulso utilis existit. Neq; uero malū pharmacum his chalcididis existit cruda cum oleo trita. Illinuntur autē ex his pharmacis, solæ particulæ oris affectæ. Quod si collutiones obulerimus, siue mediocriter, siue intense adstringētes, ea cautione utemur, ut fortioribus corporibz, fortiores, mollioribus imbecilliores exhibeamus. Porro si in putredinē aphtha ueruerat, nō cōuenit amplius aphthā, eā affectionē appellare. Neq; enim ea quæ aphthas sanāt pharmaca, his adhibemus, sed

sed fortiora, qualia quædam in capite De crustis oris paulo post dicentur. Atqui si putrescere incipiunt, maxime in infantibus, præclare facit præscripta ex decocto gallarum & melle illito, & anthera stomatica cum melle illita, et id quod ex rosarum floribus conficitur: rhoë, croco, et costo, quod ad colūnellas inflamas describetur, sic cum phar maci: oportet autem id illiri in cum melle. Nec minus egregie facit centaureæ minoris exustæ cinis illinitus cum melle, & sphæritis, hoc est, cupressus pilulas ferens, exusta eodem modo. Proprie autem, inquit Archigenes, facit cornu ceruinumustum, tritum, & adhibet. Ad aphthas autem quæ proserpunt summè efficax est, sceniculi radix usta, per se, & cum melle illita. Item quæ amurca in aereo vase, donec in mellis crassitudine cogatur decocta, ac illita. Aliud, quod & ad aphthas & ad reliqua oris ulcera conducti, Aluminis scissilis sextatē, gallarum unc. i. cōterito, ac oleo subigito, aut digito in oleo madesacto siccu excipito, eo quæ exulceratos locos quamplurimum extergito. Detrahit enim cutē, asperitates tollit, ulcera quæ ad cicatricem perducit.

De gurgulionis affectionibus, ex Galeno. Cap. x l. Gurgulionem quidam etiā columnellā appellant, uero uero nomine accipienda est quædam in eo affectio, quum scilicet uia adno simile summum gurgulionis apparer. Lorum uero uocat aliam quandam eius affectionem, quum ex suffitu nimium ignitus gracilescit, & loro similis propēdet. Verum hæc affectiones raro circa gurgulionem accidunt: inflammationem autem frequentissime. Euenit etiam aliquando, ut circa inflammationem nimium humectus laxior fiat: uelut in destillationibus continuis contingit: itaque inflammatione incipiente repellentibus pharmacis opus erit, quæ adstringētis facultatis esse oportet. Et si quidē moderatus fuerit humorū influxus, ea quæ moderate adstringunt tum adsumenda, ubi uero fortius inualuerit, acerbæ etiā sunt ad iungenda. Collusiones igitur moderate sunt ex palmis decoctis, aliquando in sola aqua, aliquando etiam adiecto modico melle. Similiter autem & ex rosis, radice dulei, pampinis uitis, rubis, iunco rotundo odorato, terebintho, rhamno, cypero, & siliquis. Itaque ex radice mori, hypocistideis & malis coroneis, ac piris austeris. His autē fortiores existunt, myrri, & baccarū eius decoctum, & utrugulorū molliū ilicis, & uniuersi quercini generis, similiter quæ glandiū: item quæ decoctum mespilorū & cornorum. Præclare autem omnium facti decoctum gallarum, rhois culinarij, eius quæ coriorum infectores utitur, spinæ Aegyptiæ, myricæ, aut ericæ seminis siue fructus, utriusque mali punici floris & putaminis. Horum unumquodque & singulatim & cum alijs decoctum in aqua, gargarisandum exhibere oportet. Mirum uero quantum eorum mixtura, simpliciter & immixtorum usum excedunt. Vtilis est etiā affritus cochlearij frigidissima aqua repleti, & postea frigida in balneo colluta. Conuenit quoque arida trita gurgulionis ad mouere, ita ut submisit & paulatim ad superiorem & extrinsecā regionē adferantur, & per cochleare aut specilli cōcauum supra linguā imitantur. Itaque ex aridis moderata sunt, rosæ siccae, & flos earum, & prædictarum platarum germina exiccata, hypodistis, rheon ponticum, lapis coriario rum quo calceamenta ut resplendant expolunt, à

Græcis ageratos, uelut non senescens, appellatur, & is quoque qui famius aster appellatur, & omphaciū siccum. His imbecilliora sunt minoris quæ acrimoniae, gummi, tragacanthus, sarcocolla, & amyli, quibus utrumque erit, ubi gurgulio à nimium adstringentibus remedijs fuerit compressus, aut à mordentibus ac discussorij irritatus. Fortiora prædictis sunt, lapidis hæmatis, necnon phrygius ustus, minimum sinopicum, & terra lemnia, quæ appellatur sphragis, diphyrges, fructus Aegypti spinæ, rhubarbi culinarij. Adstringentem enim hæc euidenter, citra tamen exasperationem. Acerba autem sunt, balaustia, & cydini, & malicorium, ac galla. Adstringunt etiam sufficenter omnia aluminis genera. Atque hæc quidē similia sunt huic loco conuenientia. Ex quibus & cōposita fieri possunt, quum uehementi molle & lene quoddam adiungimus, aut discussorio quiddā adstringens admiscemus, iuxta temperaturam corporis cui medemur. Diuturnæ autē adfectioni impossibile est per repellenda perfectū auxilium adferre, maxime ubi agroti corpus plurimo humore repletum, aut affecta particula natura debilior exiterit. Itaque sæpe in principio statim, aut paulo post omnino aliquid ex discudentibus ad adstringenda adijcere cogimur. Si uero uehemens adfuerit dolor, etiam ea quæ eum mitigant adnectimus, atque quum multa omnino sint quæ discussoria uim obtinēt, à mollioribus est incipiendū. Ab acerbis enim inflamata exacerbantur. Ob eā igitur cōposita in usum uenerūt, tum ad reliquorū membrorū inflammationes, tum ad eas quæ sunt in gurgulione, uelut quæ alumen miscemus cum iride Illyrica, aut thure, aut myrrha. Tu uero perspecta calor in ipsa inflammatione magnitudine, considera quæ influxus ad eam multitudine, atque amplius in toto corpore humorū quantitate ac copia perpena, uel eorum quæ adstringunt, uel quæ discunt, augebis mixturam. Optimum autē phar macum ad inflamos gurguliones, tum in principio, tum in uigore adhibitur ex fructu hoc: rhois culinarij drac. octo, florū rosarū drac. iiii. croci drac. ii. costi drac. i. contusa & cribrata in uitro reponere. Vbi uero expetere dimidium cochleare in duobus aquæ mulsæ aquosioris cyathis dissolutum ad gargarisandum adsumatur. Vtilis est etiā eis pastillus ex croco, qui iris à quibusdam appellatur. Cōplectitur autem myrrhæ dra. viii. aluminis liquidi drac. ii. croci drachm. viii. dissoluitur in uino. Quidam etiam aloē adijciunt, quam nos reprobamus. Hic itaque pastillus fluidioribus, & magis humectis inflammationibus summe conuenit, dilutus in uino ac illitus. Miscetur etiā gargarisim. In corporibus durioribus prodest quoque pastillus Musæ. Prodest etiam efficacissime pastillus Andronis: facit & id quod Asclepiades descripsit, lapidis agerati drach. iiii. floris lapidis asij drach. iiii. terræ samiae drach. iiii. aluminis scissi drach. ii. croci torrefacti drach. ii. gallarum drac. ii. cōtritis utere. Hoc etiam nos usi sumus, inquit Galenus, optimumque sæpe sumus experti, præter quàm quod statim à principio, & quum rubicundus & calidus existit inflammatorius tumor, minime adhibendū uidetur. Vbi uero diutius adest malum, & corpus prius est euacuatum, semel tantum in usum assumptum, magnam statim ostendit utilitatem. Ad laxatam columellam, Gallarum



Gallarum drach. x. xxi. diphrygis drach. xii. illini cum melle. Aliud philosophi. Apparatur temporis necessitate instante. Inuenteratum enim uires amittit. Noces uirides accipe & exciccat, & palmarum ossa, atq; de ipsi ubi uelis sufficiter exurito, & amborū aequales partes misceto, ac siccis tris uitor. Sufficiter enim discoloria existunt. At uero quum in alijs adiectis iōibus, tum ad columellas citra inflā mationē laxatas, gallē omphacinē, salis ammoniac, amborū aequales partes, per cochleare admotæ, præter opinionē auxiliantur. Prædare facit & in his, cyrenais succus tritus adhibitus: qui si non adsit, ipsū lafer. Aliud, ad columellas laxatas. Mellis librā i. florū rosarū sexuncem, aluminis liquidū bestem, succi hypocythidos quadrantem. Alumen, & mel simul decoquito, deinde reliqua trita adiecto, ac rursus paululum decoquito, eoq; utere aliquādo aqua calida dissoluto, aliquādo aqua mullā ad gargarisandum, aliquādo quoq; eius illitu ipsam columellam reprimas ac eleuabis. Bonū hoc remedium esse adstruit Galenus, eoq; uti iubet. Aliud, quod & colūnellas iam excidēdas sanat: facit idē & ad ulcera gingiuas depascētia, omnēq; oris ulcus serpens. Fructus spinæ Aegyptiæ, gallarū, fructus myricæ, balastiorū, foliorū malabari, aluminis scissi, casisæ, singulorū aequales partes. Vtere sicco. Aliud, Aesclepiadæ. Rosarum siccatum non madesctarū sextarium Italicū unum, nardi celticæ cum radicibus ac circumscita ipsis terra, fasciculum manipulare unū: simi columbini agrestis sicci ex ipsis nudis detracti drach. iii. myrrhæ drac. viii. gallarum omphacitidū numero xlv. confusa & cribrata per arundinem insufflato, & per specilli cauum adhibeato. Aliud, siccū ad ualde laxatas colūnellas, itēq; tumentes. Piperis drac. i. myrrhæ drach. i. aluminis scissi drach. ii. gallarum drach. ii. contritis utere: euestigio enim eas firmant, ac resiccant. Aliud parabile, quod & ad laxatā & suffocantem columellam ualeat. Nitrum tritum digito excipe, & adfrica, destillabit enim inde plurima pituita, eaq; cruenta, & sanabitur. Aliud naturale, Phlumeni. Picem li quidam accipe, eaq; extremum pollicis tui infice, alteraq; manu simpipitis capillos distende, ac picē illitane. Recurret enim statim uua. Quod si quis omnino ab adfectione uuæ & tonsillarū securus esse uelit, quotidie per morborum interualla quum lauat, & a calido lauacro egreditur, modicā frigidā aquam forbendo deglutiat. Quod ipsum & ad tussim, & lateris dolorem, humidisq; stomachi uitijis multis utile fuit. Per ea itaq; quæ dicta sunt in naturam suam reducere gurgulionem oportet, omni conatu & molimine adhibito, neq; festinandum ad eius excisionem.

De ablatione columellæ ex Galeno. Cap. xli. Quod si cōnuē adligat colūnellā, periculumq; sit ne suffocatio aut tabes inde inferatur: aut quum graticilis & loro similis sit, propterea quod alimētum nō sentit, quod sanē aliquādo accidere solet: aut quū resolutionem patitur; sit enim & hoc in aliquibus: tūc sanē refert utrū excidatur, an non. Optima eius auferendæ oportunitas existit, quum suffocatio urget, ut tum imminente periculo, ægroto auxilium feramus: itaq; quo manum commodius adferas, eger in splendenti & claro loco collocetur: & tunc quidem

os eius diducatur: mox uero immisso forcipe prouducatur, ita ut uolsellam huic rei idoneā, iuxta mediū ipsius colūnellæ, aut magis adhuc inferius adhibeamus: atq; ita pducta obtorqueatur. Oborta enim uelut stupida efficitur, & uelut illaqueata curuat ac liuescit, citra magnā sanguinis eruptionē. Quapropter immorari oportet aliquādiu, ac eā detinere quousq; æger tolerare possit: tuncq; auferre non super forcipe infiditōe factā, sed ad eius fundū. Quum enim pelliculis referta sit ipsa colūnella, & ob pductionē cedat, plixa sanē inspicitibus apparet. Vnde multi in experti medicis, siue per errorem, seu per ignorantia alius incidētes, eam funditus auferūt, maximiq; in cōmodi auctores ægro existunt. Quare relinquere oportet fundū eius circa palatum, Ab excisione autē ægro offerenda est postea diluta, quā leniter os coluat. uehemens enim ipsius allabentis plaga, sanguinis eruptionē excitat. Quum autē hinc morsum percepta, aquā frigidā colluat, atq; hæc uidisim fiant, donec sanguis sistatur. Sequētib; deinde diebus ex radicis dulcis & palmarū decocto gargarisimus exhibeatur. Similiter & illitiones ad tonsillarum inflā mationes descriptæ. Porro Galenus ait, ab excisione semper diphryge uitor, donec cicatrix obducatur. Cicatricem enim tum huius membri, tum reliquorum omnium exulceratorum probē constringit ac committit.

De oris inflammationibus.

Cap. xlii.

Quum uniuersum corpus multitudinem humorū redudat, aut uisum tantum alicuius noxi humoris multitudo in corpore augetur, conuenienter utimur incisione uenæ, aut purgatione, aut clysteri, & abstinentia ciborū. Quod si neutrum horū adfuerit, ad localū auxillorum opem statim confugimus. In principio quidē reprimendo per ea quæ adstringunt & frigefaciūt: Ex adstringentiū sylua est atramentum futuriū, & similia. Verum adeo fortibus, & quæ simul uim uenenosam complectuntur ac nocuam, minime conuenit uti ad oris adfectiones sanandas, nisi magna cogente necessitate. Plurimum enim nocuum mentum infert, si quid ex his ad stomachum ac uentriculum fuerit delapsū, aut ad asperæ arteriæ extremum & pulmonē. Inest autem huiusmodi remedijs & circa gustum insauitatis quedā, quæ quidem usus tempore molestiam infert, & permanet etiam totam diem. De foeminis quid attinet dicere: maximē opulentes, quæ ob delicias in totum pharmacorū ad os descriptorum adstrictum egere serunt. Iam & uiros quosdā uideas, qui non ob delicias solum, sed ex natura fastidientē stomachū habent, atq; huiusmodi pharmaca non ferunt. Itaque ea quæ ex stomatidis appellatis pharmacis, hoc est, quæ ori conueniunt, mitiora existūt, et cōmplectuntur, & myrrhæ, & alumen. Cæterum cōfectio ex moris & malis punicis, & similes quedā, cū solo melle medetur, habetq; gustū amplius suauē. Quin & cōfectio ex succo nucū cū solo melle apprata suauem exhibet saporem. At uero succus mororum pro debiliore habendus est pharmaco. Fortius uero, & quod nulli inferius existit, est succus corticis nucū. Inter hæc medium tener, quod ad uim adstrictoriam attinet, succus mororum nascentium in rubo. His singulis admiscere potes, si quidem uehementius efficere uelis pharmacum; succum uuæ acerbæ nondum

nondum maturæ, pari pondere: aut si id non uideatur, eius dimidium. Andromachus cōijcit, croci, myrrhæ, succi uuæ acerbæ immaturæ, aluminis scilicet, singulorum drachmam unam.

*Illitiones stomacæ ori commode. Cap. XLIII.*  
*Confectio ex moris.*

Confectio ex moris sic adparatur, quæadmodum docet Eras: succi mororum heminas v. uini austeri heminam i. mellis heminam unā. Succum unā cum uino decoquito, donec ad strigmentitiam crassitudinem redigatur, deinde adiecto melle rursus decoque, donec probe cogatur: deinde in pila eis admisce croci sesquidrachmam, myrrhæ sesquidrachmam, ompha scilicet succi sesquidrachmam. Optimum autem est omnibus oris illitionibus simul incoquere, radicis dulcis drachm. viii. ad eiusmodi sanè mensuram, qualem præscripsi. Est enim radix dulcis natura mitis, & ob id asperitatem ex astringentibus illatam lenire potens. Facit, inquit, Eras, hæc cōfectio tum ad tōssillas, tum ad inflamationes oris, illita, & gargarismi modo collata. Poteris autem succū mororū cum solo melle adparatum, in usum recondere, ob dulcedinē ori cōmendādam. Confectio ex malis punice Galeni. Accipe mala punica in uigore perfectæ, maturæ, & recēta, ita ut ex triplici eorū differētia, dulciū, acidorum, & austerorum, æquales partes unā cū corticibus in mortario cōfectas, contundas, & ab eis succum exprimas: deinde cōfectionem adpares hoc modo. Conijce succi heminas quinque, mellis heminam i. radicis dulcis drach. viii. Primū uero succum cū radice dulci decoquito, ac percolato, deinde adiecto melle simul coagmentato, & uitior. Hæc cōfectio commodius exhibetur his qui oris inflamationem patiuntur, habentēq; simul stomachi fractū, & qui cibū auerſatur. Vtilis est etiā bibita ad alui adfectiones. Expediit autē ei, ueluti reliquis oris remedijs adijcere, in principio quidem ea quæ adstringunt circa uigorē, ea quæ concoquunt, iuxta inclinationē, ea quæ discutunt. Facit etiam ad oris ulcera, & quæ adpellantur Aphthæ. Cōfectio ex malis punicis, Asclepiadæ. Pharmacū ad os prosperē accommodatū, quod etiam ad ulcera serpentia cōducit: Succī mali punici Italici sextarios vi, mellis lib. i. croci drac. iiii. myrrhæ drac. iiii. Succū per se satis diu decoquito: deinde adiecto melle rursus donec probe coagmētur decoquito: postea in mortario crocum & myrrham simul cōmitutio, atq; hoc ut maximo remedio, uitior. Remediū oris ex musſo, Andromachi: quo inquit, ut pulcherrimo uitor. Galla numero xxx. rhois quo coria inficiuntur choenice i. musſi optimi ex uua amineæ alba sextarios sex: gallas contusas unā cū rhoē per diē & noctē in fustō macerato: deinde ad quartas decoquito, & p. linteolū percolato: rursusq; succū donec mellis specie accipiat, decoquito, & adiecta croci drach. i. aluminis scilicet drach. i. myrrhæ drac. i. probe misceſto, & in usum recōdito. Facit enim & ad aurīū & sedis quoq; exulcerationes. Cōfectio ex succo uuæ acerbæ, ex serula medicamentario libro. Sorani. Illitio ad os adparata ex succo uuæ acerbæ, incipitibus in flammationibus accommodata. Valet etiā ad humore prægnates gingiuas, & ulcera pura tōssillarum. Succū uuæ acerbæ ad coagmentandū decocti sextariū i. florum rosarū drac. xii. croci drac. iiii. mellis

heminā i. adpara ut prædictū est. Eodē modo etiam adparatur cōfectio ex succo malorū coroneorum & pironū, pirastrorūq; & mespilorum, ac mororū rubi, similiterq; ex aliorū pomorū succo, atq; item cornorum: nisi quod plus mellis iniicitur ad ea quæ magis adstringūt. Succus enim pironū & reliquorū pomorū ac fructū aliquādo æquale portionē mellis admittit. Eorū uero quæ plurimū adstringunt, uelut est succus corni, aliquādo duplū mellis suscipit. Cōfectio ex nudibus, Galeni. Fit etiā ex succo uiri diū nuctū pharmacū ori cōmodo, hoc modo. Exrinsecum corticē nucis uiridē, quod inſectores utitur, in pila cōiectū contunde, succumq; ex pressum per linteolū excola: eiusq; heminas v. mellis heminā i. & radicis dulcis drac. viii. hoc modo cōmitue. Succū unā cū radice dulci usquequo cogatur decoque, & percola: deinde adiecto melle simul decoque rursus, ac utere iuxta eā quā describemus methodū. Est itaque pharmacum ex nudibus omnium efficacissimū. Verum stomacho utilissimum existit id quod ex malis punicis est cōfectum.

*Summaria doctrinæ de usu omnium illitionum ad os adparatarum. Cap. XLIIII.*

In principio inflamationū, oibus oris remedijs uult ter quiddā ammiscetur ex his quæ restrictoriē facultatis existūt ac repellūt. Quapropter cōmodū est solum succū cū melle adparare, ac reponere: Sūt autem restringētia parabilia quæ in principio miscere conueniunt: rosæ, flos earū, bacca myrti, myrtus ipsa, lentiscus, robus, omphaciū. Post hæc cytini et balauſtia, mali punici cortices, gallæ, fructus spinæ ægyptiæ, omnia aluminis genera, rhus cū culinariis, quæ quo coria inficiuntur: horū unūquodq; aqua decoquitur donec probe cogatur, atq; ita percolatū decoctū illitionibus cōmiscetur. Optimus est etiā mali punici succus in principio ammiscitur. Frāgēda autē sunt ipsa mala ac cōtūdēda in mortario unā cū corticibus suis. Deinde exprimēda ac percolāda decoquēda: donec in totū cogatur, atq; sic in præsentēs illitiōes ex eis ammiscendū est. Quod si sumptuosius adparare uelis pharmacū, nepe diuitibus utendū, adijces corticem calisæ, indicā nardū aut celeicā, aut solū malabathri. Post principii autē ubi constitit influxus, sufficit cōfectio ex moris, croco modico ac myrrha adiecto, ad inflamationis cōfectionē. Quom uero ad uigorē peruenērint inflamationes, parum utendū est illitionibus oris. Verū collutionibus & gargarismis mitioribus inflamationem concoquere oportet, uelut est ea quæ ex surfuribus fit, & radice dulci. Aliquādo etiam remedium oris ipsū decoctū ex caricis constans gargarissandum exhibere conuenit aqua mulla permixtū, aut sapa calefacta, aut cū sola aqua calida, non præsentē melle aut sapa. Optimum cōſetur circa inflamationum uigorē oleum lentiscinum cōduplicato uasulo calefactum, & ore retentum: uerum caudum ne sit inueteratum. Vbi uero iam concocta fuerit inflammatio, & dolorum uehementia quiesuerit: tum sanè & disculſoria ad oris remedia admiscimus, cuius generis sunt, hyſſopum, pulegium, thymus, calamintha, thymbra, menta, in sapa, aut aqua mulla decocta & percolata, ita ut ex decocto cuiuscunq; tandē istorū oris remedium permisceatur. Ex parabilibus disculſorijs est decoctū caricarū ad mellis spissitudinē redactū. Nā singula

ſingula prædicta efficaciora ſunt, ſi diutius coquantur. Fortius autē prædictis exiſtit ſpuma niri, & niſtrum ipſum maxime Bernicariū uſtū, atq; nitro adhuc potius eſt ſulphur uſtū. Porro ad diuturnas et obdurateſ inſtillationes adhibēda ſunt ea quæ præclariuſ diſcutere poſſunt: coſtufa uideſſet ac cribrata, de quorū numero hæc ſunt. Si diuites exiſtāt egri, coſtus & amomū, & quod appellatur macer, per quā calidū & adſtringēs, & ſuccus ſanē cyrenaicus ad diſcuſionē obduratarū inſtillationū aptiſſimus, aut aliquis eorū qui ei ſuccedeſſerūt, uelut ei ſaſer. Pauperibus autē pro ſumptuoſis illis pharmacijs adſicere cōuenit dictamnuſ, aut acorū, aut meon, aut pyretrū, aut parū cardamomi, aut ſinapis. Sit aut pondus ſingulorū quæ adſciuntur, iuxta eā quā in principio diximus apponderationē. Niſtrum ut ad libras quinq; ſucci, una mellis adſciatur, & annexorū ſint drachmæ quatuor uel quinque.

De tonſillarum inſtillationibus ex libris

Philymeni.

Cap. xlv.

Tonſillæ frequentiſſime inſtillationē incurrunt: calidi enim & humidī ſunt earū loci. Verū hac adſectione magis arripſuntur hi qui plurimo ſanguine abundāt: & pueri, uſque mixtura habentes tenerā & multo cibo ſe explētēs; & infantes adhuc lactētes ex hauſtu lactis id malū cōtrahētes. Inferiur autē hæc adſectio plerūq; à nimia meri potōe, & à multa ac auſtiore deuoratione ciborū, maxime acriū & aſperorū: acceditq; ita adſectis difficultas traſglutiedī, & dolor alī quādo etiā febris. Incipite itaq; inſtillationē, cū ſubtrahere oportet, & aquæ poſſe exhibere, præſertim febre ſimul frūſte. Exhibēdi etiā gargarismi adſtringētes & repellētes, uelut eſt lēdculē decoctū cū roſis, myxis, & palmis: reliqua q; que in principio inſtillationi gurgulionis adſumuntur. Cauendū autem nemel in principio ad gargarismos cōſciamus, ne per acrimoniam malū iritemus. Verū quum uehemētius adſectio ipſa inualeſcit, & periculum ſuffocationis ſuſpectū eſt, uena cubiti incidēda eſt: repetita ſanguinis detractione; maxime ſi iuuenis ſit æger, & multo ſanguine abundet, cū autē offerendī ſunt forbiles & uentri cōmodi: quod ſi ueter nō probē egerat, inſiſtendus eſt dyſter: inſtantium uero uſque glaci immiſſa, & ſedis inſtillationibus irritare oportet. Poſt euacuatiōnē gargariffent decoctiōnē ſurfurum calidam aut piſſanæ ſuccum, in quo decocti ſunt uſq; paſſe, aut ſapā tepēfactā, aut decoctū radicis dulcis, aut paſſum cum decocto ſicum & hyſſopi. Hæc omnia tepida exhibenda ſunt, frigus enim nō tolerāt inſtillationē, ſicut nec plurimū calorē. Multū autē proderit oleū amygdalinū auribus inſuſum. Extrinſecus leniter fouere cōuenit ſpōgijs expreſſis, & cataplaſmata quoq; imponēda ſunt ex farina ordeī aut ſemine liani, aut ſoenigraci, aut hiſ ſimul mixtis. Remittēte autē ſi inſtillatione & decreſcēte, mel in gargarismos admiſcere cōuenit: quod in principio & in augmento minime facere oportebat: quo tēpore etiā calidiores gargarismi proſunt. Extrinſecus autē lana mollis oleo ſincta collo circūponēda. Quod ſi ex uſu acriorum colluſionū aut inſtillationum inſtillatio exaſpētur, & mordacitas inde accedat, leniores gargarismi colluendi ſunt, quales ſunt, ſuccus piſanæ, aut halicæ, & micarum ſiliginearū cremores, qui tepidiſſimū offerantur: lac etiā tepidū gargarifandū. Remittē

te autē inſtillationē et dolore prædicta oris remedia ſunt inſinēda, immiſſo digito medio, ita ut cum leni adhibita inſtillatione partes tonſillarū, quę intumuerūt, cōprimātur, quo contentā in ſe materiā excludant. Veritatem nō uolenter cōprimere oportet, quædam modum quidā faciunt, qui autores ob id ſunt, quo inſtillatio amplius augeatur. Si tamē obigerit aliquis ab eſuſmodi curatione læſus, cōſecti erimus exhibitione gargariffimū leniendum, nihil inſinētes. Permanēte uero ac immorante diutius inſtillationē, atq; ubi tonſillæ ipſæ ſubrūbri coloris fuerint, neq; melius à prædictorū remediōrum admotiōne habuerint, permutatiōne in pus expectare oportet: cito enim tonſillæ abſcedunt. Abſceſſu autē factō, inſtillationis ſignā auget ſunt, & exacerbationes ad uēſperā ſunt fortiores, cū horrore & inæqualitate, alī quādo etiā cum febre. Quare ubi ſuppurationē ſuram ſperamus, coadiuuare oportet ut quāmi citiſſimē fiat. Sint autē gargarismi eis exhibēdi calidiores uelut aqua muſſa calida, & decoctū caricarū ac hyſſopi. Verū ad molliendos & maturandos tonſillarū abſceſſus, maximopere auxiliatur unguētum quod appellatur Aegyptiācū, quod ex reſina therebinthina, & melle & oleo dulciſſimo adparatur: & extrinſecus cataplaſma impoſitū ex ordēacea farina & ſoenograco cū decocto caricarum & althææ ac melle. Quū autē pus perfectū fuerit, dolores minuūtur, et inſtillationis tumor mollior redditus digito cedit: tunc ſanē acriores colluſiones exhibēda ſunt, atque prædictæ quoq; oris inſillationes. In cibo accipiat fruſta panis aqua macerata quāmi maxima, & reliqua ſimiliter que eis p cibo offerūtur acruuam ingerāt. Vehementiore enim ex his circa tonſillas obuolūtione facta cōſimili modo tumores adſciuntur, ueluti ſectionē ſuſtinerēt. A ruptura autē aqua muſſa gargariffanda p ſe, poſtea etiā admixta lēticula & roſis, atq; hiſ ſane inſinomādū eſt, donec penitus ad cicatricē perducatur. Nec uetat ſepe adſicere quiddā ex prædictis oris remedijs. Quod ſi ruptura eis ſerius contingat, ob ſoliditatē uidelicet corporuſculorū incūbenſiū, inſerātq; inſtillationē ipſa dolore, diducere abſceſſum cōuenit ad prollicēdā puris excretionē. Leonidæ. Itaq; ſi perfectæ ætatis ſit æger, cū deſiderē ſacito, poſtea diducto ore lingua cū ſpecillo lato, aut inſtrumēto lingue deprimmēda apro, deprimito, ipſumq; abſceſſum cū ſcalpello aut acicula penetratedi ducto. Si uero puer ſit æger, caput eius intra genua eius qui manū admolitur cōtineatur. Deinde facta abſceſſus diſſectione caput eius inclinetur ad humoſis cōmodorē excludiōnē. Ab opere autē patrato aqua laſei teporis frequēter colluāt. Poſt multā autē intercapedinē ab opere patrato, & in ſequētib; deinde diebus aquam muſſam gargariffent: adhibeatq; eis unguētū ad exulceratas tonſillas cōueniēs; quale eſt quod ægyptiū croceū appellatur, & quę ei ſimilia exiſtūt. Eſt autē Aegyptiū hoc. Vnguentum ægyptiū croceū. Croci dra. iiii. mellis ſeſquilibram, olei roſaci ſextante, ſucci ſoenigraci & ſeminis lini decocti quadrante. Crocum in ſucco diſſolue; deinde oleo adiecto, ea ſimul commiſce, et mel prius deſpumatum cōmijce, & permixtis utere.

De cruſtoſis & peſilentibus tonſillarum ulceribus.

Cap. xlvii. Cruſtoſa & peſilentia tonſillarū ulcera ut plurimum nullo

nullo præcedente tonsillarum fluxu incipiunt, al-  
quando autē ad confusis fieri inflammationibus, maxi-  
me effertur perficiuntur. Fuit autē frequentissime pue-  
ris, atq; etiā ætate iam perfectis, maxime his qui vi-  
tiosis humoribus abundant, in his quæ vere contin-  
gere solent pestilentibus constitutionibus. In pueris  
uero oris ulcere, quod aphtham uocant, præceden-  
te omnino perficiuntur. Sūt aut partim alba, maculis  
similia, partim cinereo colore, aut similia crustis, q̄  
ferro inuruntur, accidit autē ægris siccas in trāsfluitē  
do, & suffocatio coaceruatim incidit, maxime quū  
rubor subeat mentū, aut ubi hæc acrimonia præterie-  
rit. Nome quæ depascitur, locus excipit, succeditq;  
uā putrefactio. Archigenis. Fesināter itaq; auxiliū  
adferre oportet his qui sunt ætatis perfectæ, atq; cō-  
fidēter uenā brachij incidere, si quidē nihil sit, quod  
id fieri phibeat. Multæ enim ulgines circa uigoris  
ætate mētiū purgationē appetētes, hæc affectio ap-  
prehenditur, quæ præcipue uenæ incisioe opus ha-  
bēt. Incidēdē aut sunt in eis tali uenę, & unica sangui-  
nis detractioe facta euacuandæ, nō autē ad usq; ani-  
mī detractionē facta euacuandæ, Deinde glandulis & sedis illitionib.  
ac dysteribus utendū erit: itemq; cucurbitulis iuxta  
lumbos, ac colligationibus extrematū, atq; omni-  
bus modis conandum est, ut diuersio ab affectis par-  
tibus fiat. Postea etiā gargarismis uti cōuenit, uelut  
est lentisculę decoctū, & myxarū ac palmarū cū mel-  
le & pūsan succo, deinde furfurū decoctum in deco-  
quēdo uiscosum factū, adiecto melle. Potest etiā rea-  
mediū oris ex moris, & maxime id quod ex malis  
punicis cōstat colluendū exhiberi, hydromelite per-  
mixtū. Philumeni. Infardtur aut hydromelitis &  
costus & iris, ac aristolochia, & similia post princi-  
piū. Probē autē facit id quod ad collumellas præscri-  
ptū est. Siccū pharmacū ex rhoē, flore rosarū crocoq;  
& costo. Foliōrū etiā glaucij siccorū decoctū opti-  
me facit, quāquam gustus uehementē amari existat.  
Ego autē & glaucij succo cuius ad collyria usus exi-  
stet, in aqua mellis meracore diluto, p̄ gargarisma-  
te utor, aut etiam cū iris decocto. At uero fruticis  
ipsius sicci, glaucij in quā, cōtusi & cribrati optimus  
usus existit si insuffletur. Conpādū autē est in uniuersum  
ne digitū quidē locis admoveamus, aut leni sal-  
tē tactu manū admoliamur. Etenī inscij ad quos ma-  
xime in rebus dubijs homines cōsugūt, uehemen-  
tius illinūt, simulq; inflammationē locū comprimit, si-  
mulq; crustā detrahūt, qđ minime facere conuenit  
prius quā eleuatā, & uix inntentē crustā cōspiciā-  
mus. Quōd si enim adherentē adhuc crustā auellere  
aggrediamur, ulcerationes magis in profundū pce-  
dunt, & inflammationes cōsequuntur, augenturq; dolo-  
res, & in ulcera serpētia proficiunt. Itaq; sicca quidē  
remedia insufflare cōuenit: liquida uero cū pinnula  
illinire, ita ut quantū liquerit quā penitissime pin-  
nula immittamus. Vtēdū est etiā cōpositione ex se-  
mine rutæ syluestris ad anginā descripta, & ea quæ  
ex uitis hirūdiniibus cōstat, ita ut cū melle liquefa-  
ctas illinamus, & cū hydromelite permixtas colluē-  
das exhibeamus. Profit uti aliquibus aristolochia  
& iris, & chalcitis adhibita cū melle. Aliquādo etiā  
Andronis & Musæ pastilli. Mirabiliter autē crustas  
auferre caninū recrementū melle illitū, & ustarū hīrū-  
dinū cinis, & cētaurę minoris ufas cinis cū melle,  
& cochlearū terrestriū maxime nudarū ustarū cinis

cum melle. His uero de quibus medici desperarunt,  
sel crocodili exiccatū & tritū ad crustā insperge, aut  
illine cū melle. Oportet autē post iritationes ad phar-  
macis eiusmodi factas, lenire cū radicis dulcis deco-  
cto, et qui ex uino scybelite, mastiche chia, myrrha,  
& croco cōstat gargarismo, deinde cū amylo & tra-  
gacantho. Cohibitō autē itā ulcere pascēte, lac garga-  
rissandū, samia terra permixtū: et febriū quoq; curā  
habere cōuenit: uehementēs em incidere solēt: atq; in-  
repurgadis explanandisq; ulceribus maxime sollicitū  
est: cōuulsionē enim infantes plurimi passi sunt  
in ulcerū repurgatione: aliqui uero uisa transglutien-  
di exiccata, sunt strāgulati. Sunt etiā quibus corro-  
duntur gurguliones, atq; ubi diutius perstiterint ul-  
cerationes, & in p̄fundū propterperint, cicatrice iam  
inducta, adstrictiorē uocē edunt, reflectiturq; ipsis  
potus in ipsas nares. Nam et ego puelle noui, quæ  
post quadagesimū tandē diē consumpta est, quum  
se iam a morbo recolligeret. Verū ad septimū usq;  
diem plurimī periclitantur. Vbi uero inflammatio-  
nes & ulcera serpētia semper amplius extendantur,  
forinsecus fomētū adhibere oportet, & cataplasma-  
tis cōmunibus uti, cū cautione ne refrigeremus. Feli-  
citer enim res procederet, si intrinsecus detentā mate-  
riam extrā queant transferre. Contegatur itaq; sem-  
per post cataplasmata, partes circa meatū, cū nardi-  
no & cyprino cerato, cū circumpositione lanarum  
molliū. Vbi autē crustæ solutæ fuerint, & ulcera ipsa  
mundata, antheris, hoc est, floridis remedijs utendū  
est. Sanant enim in torū ulcerationes ipsas, tum sicce  
adhibita, tum illitæ cū melle. Sunt autē crustarum  
tum oris, tum tonsillarū, cōposita pharmaca huius-  
cemodi. Asclepiadæ illitio ad exulceratas inflama-  
tiones. Florū rosarū drach. viii. croci drac. iiii. ba-  
laustiorū drac. i. myrrhæ drac. i. nucū pinearū repur-  
gararū drac. iiii. Subactis melle ad illitionem utere.  
Asclepiadæ, ad oris putredines. Rhōis culinarij dra-  
c. iiii. acaciæ drac. i. omphacij drac. i. medullæ cerui-  
næ aut uisulinæ drac. iiii. in uino dulci diluta, melle  
despumato excipe, & ad illitionem utere. Andro-  
machi remediū oris odoratū ac tenerū, ad inflama-  
tiones ac crustas optimū. Nucū pinearū depuratarū  
drac. iiii. amyli dra. ii. aluminis scissillius dra. i. florū  
rosarū drac. i. croci drac. i. mellis quantū suffecerit.

Aliud ad omnes tum oris, tum tōsillarū adfectio-  
nes. Rhōis culinarij dra. iiii. florū rosarū drac. i. cro-  
ci drac. i. costi drac. i. illine cū melle, aut cū aqua mel-  
lis gargarissandū exhibe. Crionis ad crustas. Misy-  
allatum aut crudum illine cum melle: statim em eas  
collit. Sint autē misyos drac. iiii. & libra una mellis,  
quo modo etiā uti poteris chalcidē. Archigenes  
autē inquit: Ad crustas optime conuenit stercus ca-  
ninū cū melle: quod tum optimū erit, quū osibus  
canes fuerint nutriti. Magnopere enim auxiliatur,  
neq; odium sui inducit in cibo oblatū. Licebit etiā  
ut plurimis eorū quæ ad anginā descripta sunt auxi-  
liorū. Aliud Archigenis, ad crustas in ore. Hirūdi-  
nū ustarū & stercoris humani æquale pōdus cū mel-  
le illine. Accipiendū est stercus nō quoddāq; obige-  
rit, uerū puerū biduo prænutrire oportet pane &  
lupinis, ac uino modico, atq; deinde tertia die ster-  
cus eius accipere & excicare, atq; repositū seruare.  
Vfu uero expetēt cōrito uti. Efficax enim & ad an-  
ginas existit. Experit etiā sumus, inquit Galenus,

pharmaca à Sorano descripta prædare facere, quæ sanè ille iuxta dictionū seriè descripsit Remediū ad crustas oris cōferēs & ad gingiuas humore pregnātes & graueolētes. Misys usq̃ drac. v. iiris illyrice drac. iiii. croci drac. i. in puluerē redige, ac pyxide lignea reponē. Vtere autē p̃ se uel cū melle. Florida cōpositio, ad prædicta similiter effiac. Iridis illyricæ drac. iiii. sandarachē dra. iiii. cyperi dra. iiii. aluminis scissi dra. ii. myrrhæ dra. ii. crocomagmatis dra. ii. in puluerē redige ac utere. Quidā etiā florēs rosarū, & gallas addiūt, singulorū dra. iiii. Vtere autē ad putrefactā, et ad abscēssus gingiuarū siccō: ad crustas uero cum melle. Philagry, ad oris erosiones. Seminis lentis nōdum denigrati dra. iiii. gallarū dra. iiii. costi dra. i. folij dra. i. utere. Theodorū, ad tonsillarū ulcera, gingiuarūq̃ & pudendorū, ad putrefactā & carbunculosa. Aluminis scissilis, sandarachē, myrrhæ troglodyticæ, singulorū æquale pondus accipe, ac utere siccō. Hermi, ad omnes oris adfectiones, ab ulcere quod aphtha adpellatur usq̃ ad crustas & carcinomata. Ericæ semē tritū, succo hyoscyami excipe, & utere cum melle. Aliud, ad ulcera quæ serpūt in ore, gingiuas, ac lingua. Misys cū succo foliorū uitis albae, quā bryonia adpellant, dilue, et cōiecto simul melle tere, ac ad illitōnē utere. Diuinitus extergit ac repurgat. Vbi uero repurgata fuerint & carne expleta, bryoniæ radicē cōtusam & in puluerē redactā adhibe. Ea enim ad cicatricē perducit. Aliud eiusdē, ad oris putrefactiōes, ulcerationes, & ulcera quæ serpūt. Foliorū uitis albe quadrantē, aluminis scissilis tritē, misys crudi dra. iiii. auramētū sutorij dra. ii. cōtere quousq̃ ardeat, siant, & in puluerem redactū utere siccis. Repurgat, explet, reprimit illatū fluxū. Ego uero præcedēs expertus sum. Collutione autē utendū est ad oīa oris ulcera, & ea q̃ serpūt, putrefactionēs, & gingiuas denigratas. Verbenacæ rectē decocto ex uino, quod calidū ore retinēdū exhibe. Aliud diuinū remediū. Oleæ uiridis folia aqua decocta colluenda exhibe.

De angina, et eius speciebus, ex Galeno. Cap. xlvii. Anginæ quatuor differtētiæ existūt. Vna, quā fauces fuerint inflāmatæ: fauces autē pharinga Græcis appellatā, uoco intra os locū, ubi iñ stomachū, tum asperæ arteriæ extrema cōueniūt. Altera quā neq̃ circa oris regionē, neq̃ iuxta fauces, imō nec forinsecus, quicquā adparet inflāmatū: & tamē suffocationis sensus infestat agrū iuxta asperæ arteriæ extremū. Tertia, quā exterior gutturis regio unā cum interna fuerit inflāmata iuxta mētum. Ad hæc autē & circa ceruicē quqdā adfectio oboriri solet, ex luxatione & discessu cuiusdā in collo uerūculi in anteriorē regionem: unde cauus apparet locus, & quā extrā attingitur, dolore additur: qd̃ cōtingit ob distracta intrō uerūcula, & cōstititē circa musculōs faucium, aut extremitatis arteriæ inflāmatōnē. Hęc autē species pprie cynthæ à ueteribus est adpellata. Lingua enim à luxato uerūculo iuxta radicē suā impulsā, ex proprijs locis excedit, & difficultas magis circa respiratōnē infestat, unde cognūtur apertio ore semp̃ hiare, atq̃ arē adtrahere. Oēs autē prædictæ adfectiones cōmunē habēt difficultatē trāsludēdi: ita tamē ut in alia plus, in alia minus hoc malū augeat. Accidit etiā eis potū adsumptum ad nares reflecti. Atq̃ hæc sanè sunt adfectiones: curatio autē earū in paucis uariat,

Aræteus autē inquit, Anginæ causæ multæ existunt, maxime autē frigiditas magis quā ardorēs, & plagæ, & ossa ex piscibus ad tonsillas impacta, et potus frigida, ebrietas, nimia satietas, & quæ spiratione attrahūt mala. Archigenes autē ait: Occultæ anginæ causam esse in quibusdā, neruus qui ad stomachū deferuntur, dum male adficiuntur, et pōt inferioribus mēbris, pulmoni inq̃uā & cordi, respiciendū principiū inflāmant. Arterijs uero quæ carotides adpellantur, itemq̃ alijs adiacentibus inde inflāmatōnē trāsmittūt. At uero quod hī qui sic adficiuntur nō siant autoniti, inde est quod huius adfectionis causa interperies sola existit, nō etiā coarctatio locorū. Cōueniunt igitur, inquit Archigenes, eis ea quæ uomitoriā uim obinēt, uelut est elaterium, & squama eris illita cū melle. Ego autē, inquit, ab occulta angina phrēsis ex sinapi gargarismo releuo, moxq̃ in balneū induco, atq̃ ita multos à periculo liberaui, quibus adfecta particula, obliuioni tradita fuit, p̃ distributionem uidelicet in uniuersum corpus sanatos. Aræteus autē inquit: Cucurbita accipiatur, priusq̃ infra umbilicū adhibeatur, mox ad latera desorsumq̃ & scapulas, ita ut assidue à loco uno ad alterū trāseratur, & in admotione ex supernis locis deorsum trahatur. Quod si uehemētē urgeat suffocatio, sinapi aqua tritū & uisū panniculo exceptū pectori impone. Ad delingendum uero cōueniunt eis: sinapi, nitru, hyssopus, scylla assa, sulphur uiuū, omnia paribus portionibus cū mellis cochleari permixta delingenda exhibe. Archigenes. In principio igitur compendiarium & p̃ceptis auxilium omnis angina requirit, quandoquidem autē ferē iuuuenibus accidit, euestigio cubiti uenam eis incidere oportet, nisi quiddam maioris periculi impediatur: aut ferre aut sanguinem parce, non usquequo animi defectio sequatur: citius enim hī animo linguntur, & aliās sanè ex refrigerationibus & animi defectione perfacile materia à faucibus ad pulmōnē deferunt, et ineuitabile periculū inferit. Curandū etiā ut modica fiat diductio uenæ. Nā quum in alijs, tū in magnis uenę diductiōibus acuatim animi defectus irruat: neq̃ tamē angustiores facere uenæ incisionem cōuenit, ne sanguis uelut percoleatur, & crasior eius pars intus remaneat, quæ causā huius adfectionis existit. Ut illis est autē eis repetita detractio in sequēti die, nisi prepediat egri timor, aut animi deliquiū. Quod si quid uenę incisionē fieri prohibeat, per clysterem infundendū est centaureæ, abinthij, calaminthæ, & aristolochiæ decoctū, admixto melle & plurimo nitro: postea etiā purgatiua danda, quæ magis pituitam ducunt: cōuenientissimum autē aliquādo in angina esse uidetur, elaterium: uerum non oportet nisi cum sero lactis & cinco in sero cocto ipsum propinare. Conuenient etiam eis ex aloë & colocythide catapota, si modo queant ea deglutire. Si uero confidentior contingat medicus, bonum est et hlerē Archigenis ex colocynthide dra. iiii. cum aliqua ex prædictis decoctione per clysterem infundere, ubi prius aliquo stercorū eductiuo euacuauerit. Post uniuersales autē euacuationes, cucurbitas adponere oportet, et si quidē tumor circa maxillas, aut sub mēto persistat, in ipsum tumorem, & cū scarificatione plurimum sanguinem extrahere, saleq̃ respergere fissuras, & cōsticare. quod si nullus ex-

trinfecus tumor adpareat, ueluti fieri solet in ea quę occultā adpellatur cynanche, retro sub collī neruo insigenda erit cucurbita iuxta primū uerticū, et cōstanti adtractione utendū, & frequentius cucurbita auellenda. Ea enim instantiā factis uertebatū discēssibus, ac luxationibus probe se opponit. Deinde ubi paulisper a reliquorū remediōrū adhibitione quiesueris, cataplasmatīs utendum, tum eadem die, tū etiā in sequendū. Maiorē uero spem in sequentibus dieb. in illitionibus & gargarisimīs reponere conuenit. Itaq; ubi initium sit cū multa inflāmatione, ea quę leniter adstringunt offerēda sunt primū: uelut est rosarum, lentium, palmarumq; decoctum, flos rosarū ex hydromelite, rhus cum hydromelite decoctus, et decoctum myxarum. Quōd si excoctiorū contingat corpusculorum, panis cremor exhibendus est calidus, aut fursurum decoctum colluant, aut etiā lac solum. Ego autem, inquit Archigenes, sicūt pharma cū in promptu habeo. Ex rhoīs culinarij drachmas vii. florū rosarum drachmas xii. costi autem & croci, cuiusq; drachmas ii. Ex quo sanē in aquā mulsam inspergo, & in gargarisimā utor, atq; inflāmationes & ulcerationes cōsillarum facillimē sano; etiam si contingant quibus illæ ad summū progressum minentur. Quin & illitiones manifestiores inflāmatis cōmodæ sunt, uelut est ea quę ex moris cōstat, & rhoīs culinarij cremor in hydromelitis coctus donec cogatur. Oportet autem pręmacerare sufficenter rhoēm ipsū, donec abūdē aqua mulsā ex eo colorem accipiat, & in sapore uim eius repręsentet. Probe etiam facit malū punid integrū unā cum corticibus fractū ac conuulsū succus melle permixtus: ita ut ad succi partes tres una mellis cōiiciatur, & donec cogatur decoquatur, ac illinatur. Quōd si adictorū remediōrum malum cūdat, sed semper multatudo humorum augetur, uenæ sub lingua incidēdæ sunt, aut quę sunt in fronte, aut etiā circa magnos angulos oculorū: forinfecus autē assidue lanæ cir cum collum ponatur oleo calido madefactæ, aut ceratū ex oleo cyprino adparatum adhibeatur, aut si malis ex gleucino siue musteo. Quōd si diutius moram traxerit, abscessum expectare oportet, & tū sanē conuenientius erit sicuum decoctum ad colluēdum: multoq; magis si hyssopū ei cōiiciatur. Neq; uero in cōmodus fuerit in his quī aliquo modo sunt exulcerati, crocus cū aqua mulsā: & decoctū radicis ludis. In uigore autē omnīū utilissimus existit succus pūsang aut halicæ ore collutus: nā et a multis mīnis liberat, et abscessus merum eximit cōsestīm. Qui si nō adsit, fursures probe cocti ei succedere possunt. Atq; hæc quidē his cōueniunt. At in angina siue inflāmatione ac ulcere, ubi sola multitudine ægri obturati periclitantur, in his quę acriora sunt periculū est faciedū. Sunt enim tunc etiā in principio cōuenientiora: post uniuersales tamē euacuationes: itaq; hydromeli meracius puerit, si cū eo hyssopū aut origanū decoquatur. Si uero in superioribus partibus, aut iuxta fauces malū persistet, sinapī tritū cū aqua mulsā et percolatū gargarisandū exhibebimus. Cōuenit etiā calsiæ decoctū, & iridis, & radicis panacis, gentianæ, cētauræ, aristolochiæ, agari, & radicis cucumeris agrestis: unūquodq; autē cū hydromelite factū dīu decoquatur, donec succulentum reddatur. Vfus sum etiā in oculita angina ex sinapī garga-

risimo, & sæpē ad periculo ægros liberaui. Illiū autē his ualde cōueniens, his inquā, quī citra exulcerationem anginā paduntur, est ea quę ex femine rutæ syluestris adparatur: & quę ex uitis hirundinis constat: quarum apparatū paulō post unā cum alijs remedijs describā. Luanatur etiā foku uaporis intra os accepto hoc modo. Origanum, hyssopū, saturiæ, feniculi semē, cum aceto plurimo & nitro feruēfacto in olla diligeret opera, operculo foramē habētē in medio, deinde arundine ori ægri & foraminī adadaptata, sinas foueri. Si uero ex feruore arundinis os aduratur, ouum uacū parū uirgū perforatū ore contineant, & per ipsū arundo immittatur. Mollius autē somētum fuerit, si pro aceto poscā affuderis, aut aquā. Cæterū magis lancinantis offerre illis oportet, quo rursus infurgat caro, & transmutare queat eam quā in profundo pertulit coarctationem. In dubium enim sæpe uenit & ferē desperationem præferit morbus, ut & odiosa exhibere quibusdam necessarium fuerit: quidem humano stercore quosdā ufos esse constat pro illitione, & magnū sanē cōmodum repererunt. Alij autē recentī ufi sunt, alij uero exicato et trito, ita ut cum nardo uel myrrha id permiscētēs scetorem celaret. Ab acrioribus autē & his quę dilanantē uim obtinent, ad medicria est trāseundum: uelut est Andronis pastillum, et similia. Vtilia etiā his sunt, ea quę uomitorā uim obtinēt, maxime illis quibus grauitatis sensus circa uentrē hæret. Archigenis remediū, quo utor, inquit, ad occultas anginas, mirabiliter etiam cōducit: anhelosis. Elaterij oboli dimidiū, spumæ nitrī obolos tres, sinapīs drac. i. contere cum aqua et informā. Mouet autē uomitum elaterium cum oleo aut melle tritum & penitissimē illitum. Multō autē efficacius id præstat, si squama æris ei cōmiscatur, aut ipsū æs ustum, oleo cyprino tritū & illitum. Probe etiā facit sel tritū illitū, & nitrum cum aceto multo potatum, & cētauræ succus cum melle, & ac illi sub aquario stabulantes uase cū melle deſtrēt. Quidā nasciturj semē tritū bibedum exhibuerunt quātum cōchleari accipi potest cum aqua mulsā. Nec ita lōge post pīuitā uomuerunt illi crassissimā & tenacem, statimq; a plurimis molestijs sunt liberati. Aliud, Stercoris gallinacii albi, & colore cerulam referētis bonā copiā exiccata & repositā adserua. Vbi uero usus posular, quātū cochleari accipi possit, in aqua aut aqua mulsā dilutū ppina. Etenim desperatos etiā sanat: quod si bibere nequeat, tritum cū melle q̄ penitissimē illitū. Aliud, ad idē. Cētauræ drach. viii. nitrī dra. viii. salis cōmunis dra. viii. cōtere et reponē sicū. Vbi uero exigētē melle imbuet, cum pinnula illine, aut quomodo uidēbitur uere cōfīdēt. Nā periculū eius factū est. Aliud. Absinthij cōsūm & cribratum, adiecto nitro trito, illine cū melle. Aliud. Elaterium cum felle taurino & melle cōstitum illine. Cōpositū ex femine rutæ syluestris ori cōmoda, Andromachi. Ad anginas & desperatos, inquit, hac utor. Sime etiā prodest stomachicis, & ad tormina intestinorum, fabę magnitudinis exhibita ex frigida: Seminis anisi, seminis apij, floris lunct odorati, ammi, aluminis scissi, iridis illyricæ, seminis rutæ syluestris, quod quidā harmala, alij besalia adpellā, cinnamomī, myrrhę troglodyricæ, aristolochiæ lōge, singulorum unc. i. calsiæ, cro-



comagmatis, rosarū siccatū culuscq; unc. i. costi qua drac. cineris hīrūdīnū rectū usarū quadratū, croci sesq; unc. spicē nardi dra. iiii. amomi dra. iiii. gallas omphacitidas numero octo, cōtere & melle excipe ac utere. In principio quidē pharmacū hoc cū decoctione aliqua mediocriter adstringēte, quales sēpe diximus, dilue. Iuxta uigorē uero cū pilulā succo. Iuxta remissionē autē & declinationē melle aut hydroromelīte, aut uino mulso. In ueterata autē & uelut indurata inflammatione aceto mulso. Philagrius autē inquit, Aliquādo post prādictas uniuersū corporis euacuationes, & adhibitiones cucurbitularū, & incisionē uenarum sub lingua, miscemus etiā alia qdam ad prāscriptū pharmacū, quae partim quidē irrūcēt fluxū restringunt, partim autē oīa quae iā incidēt diſcutiunt. Cōſiſtunt autē ex rutae cōpositione dra. viii. gallae omphacitidis dra. viii. & stercoris caninū albi, ac humani stercoris sicci, culuscq; dra. viii. Verū quēadmodū & anrē dīctū est, stercus canū accipe, re oportet eorū, q̄ antea p̄ biduū olisibus lupinū nutriti, humanū uero ex puero biduū pane & lupinis nutrito. Vomitoriū Martiani, qd̄ ad operas & manifestas anginas prodest: prāexige, inquit, mercedē. Aeris uſti dra. xii. atrametū sutorij dra. xii. myrrhæ dra. i. elaterij dra. i. spumae natrij dra. i. sellis taurini dra. iiii. excipe melle & cū pinnula quā penitissimē illine. Archigenes autē inquit, Stercus humanū quale prādximus accipe & exicca, ac in uili pāniculo ligarū exure, atq; cū aqua mulsa dilutum propina. Est em̄ remediū eorū quī iā suffocati. Antontus uero Mula inquit: Stercus caninū quale prādximus accipe & exicca, cōtusoq; & cribrato utere ad anginas cum melle, quā penitissimē illinēs, ut trāsgludre possint. Eo em̄ nullū potēdū pharmacū noui, inquit Gale. neq; ex angina laborantibus, neq; ad magnas tonsillarum inflammationes, neq; ad glandularū tuberculorumq; gutturis suffocationes iā periculū minantes, pb̄e facit etiā aceto mulso & pice liquida illitū caninū stercus. Summe etiā auxilia: tur ad anginas, cōſectio ex uſtis hīrūdīnibus, cuius cōpositio hęc est. Cōpositio ex hīrūdīnibus uſtis. Cineris hīrūdīnū syluestrium usarū dra. viii. croci dra. ii. spicē nardi dra. i. excipe melle, & permisce: hoc modo ubi iā incubuerint adfectiones. Oportet autē exurare hīrūdīnes hoc modo: Pullos hīrūdīnū uiuos nō deplumes, addito cōgruentis modī sale in fistile uas cōſiſcimus, idq; obruturum super prunas ponimus, donec puluis & cinis fiat, quo cōrito utimur. Aliud, ex hīrūdīnibus, itidē ualēs ad anginas. Hīrūdīnū usarum numero xi. succū myrti uiridis cyathos xii. myrrhæ obolos ii. mellis cyathos ii. hīrūdīnū pullos exure et contere, deinde omnibus simul mixtis utere. Aliud cuius experimentū constat. Folij, costi, gareophylli, piperis, cuiuscq; unc. i. sandarachæ trientem, excipe melle despumato, & illine. Aliud. Cochleas nudas citra testam in hortis repertas in ollula exure ac cōtere, cinereq; melle exa-cepto utere. Est em̄ cuiusmodi remediū, quod presentem opem affert. Simili modo etiā cancrorū uſtorū cinere utendum est cū melle: & decoctū quoq; cancrorū ore collutū uſile existit. Ego autē cancrum in aquā hemina tritū percolo, ipsanq; aquā calefactā gargarisandā exhibeo: crallā em̄ eductā mulsa, & re-levatur cōſectum æger. Aliud. Centauream mino-

rem siccatam exure, cineremq; illine cum melle. Aliud. Maxillæ porcelli uſtæ unc. i. stercoris canini albi dra. iiii. malicorij unc. i. gallarū unc. i. costi dra. iiii. piperis torrefacti scrupulos vi. misce cum melle ac utere. Valde autē magna sollicitudine ac cōtentione opus est etiam tum quum malum remittere uidetur: etenim ea quæ iam ex profundo corporis citra fauces adtracta sunt, ex improviso in pulmonem transferuntur, si negligantur, atq; ita repentina mors ægro infertur.

## De glandulis.

## Cap. xlviii.

Omnibus hominibus carunculae quædā exiguae naturales iuxta utraque tonsillas extant, antiades Græcis, Latinis glandulae appellatae, quæ quū naturalē modū seruant, nihil molesti inferunt. Verū ubi iuxta affectionis proprietatē auſcant, & modi maioris q̄ secundū naturā suam ſiant, tunc sanē & transglutinationis & spirationis diffidilis causæ existunt. Cōſiſtunt autē serē in totum citra inflammationē, & paulatim etiā auſcunt. Aliquando autē & inflammationē patiuntur. Diducto itaq; ore manifeste apparent glandularum tumores maiores, citra quidē inflammationē tonsillarum corpusculis cōcolores. Inflammatae uero rubicundæ & inferentes dolorē. Quare quum inflammationē affuerit, gargarismis & illitionibus ad tonsillas inflammationes descriptis est utendū. Quū uero citra inflammationē cōſiſtunt, conari oportet ut per cōmoda pharmaca paulatim deprimentur, & per admodū digitū cōpressionē. Remedia autē ad glandulas absq; inflammatione auſtas talia cōueniunt. Gallæ omphacitidis, salis ammoniaci, aluminis scissi, culuscq; unc. i. adhibe siccum. Aliud. Myrrhæ sextatē, gallarum dra. viii. misyos dra. ii. salis torrefacti dra. ii. uterē siccō. Aliud. Gallarum, misyos, myrrhæ, aluminis liquidi æquales partes accipe, & siccis utere, uel cum melle. Aliud. Asclepiadē. Remedium ad glādulas accommodatum: gallarum omphacinarum dra. iiii. diphrygis dra. i. myrrhæ dra. iii. croci dra. ii. mellis quantum suffecerit. Hoc pharmacū citra ulcerationē glandulas reprimat. Aliud. Apolloniadē. Diphrygis dra. ii. chalcitidis assatæ dra. ii. gallarum dra. i. croci dra. i. myrrhæ dra. i. excipe melle & utere. Chirurgia. Verum si pharmaca uincantur, excindere glādulas oportet. Quod ut cōmodius fiat, æger in claro & splēdidō loco collocetur, & diducto ore unaquæq; glandula undino producat & excindatur: excinditur autē ex ea id quod supereminet, iuxta medium eius, quod præter naturā excreuit, quī em̄ dum omnē quæ præter naturā accreuit carnē excindunt, etiā naturalē carnē ex fundo autē ferūt, periculose sanguinis eruptionis autores ſiunt. Post excisionē autē posita frigida collucta detur, ad sanguinis uidelicet inhibitionē, & post ea frigidissima aqua. Postquā autē sanguinis eruptio constituerit, salis lōga intercapedine teporis facta aqua mulsa tepida exhibebitur. Sequētibz uero datus etiā cū ea illitiones adferatur, quales sunt ad ulceratas tonsillas descriptæ. Raro autem, quando uidelicet ulceræ eminentiora adparent, florido siccō ipsas tonsillas attingimus. Per hoc enim eminentiæ deprimuntur, & deatrics inductio perficitur.

## De suffocatorum reuocatione.

## Cap. xlix.

Reuocantur aliquando suffocati ac strangulati, aceto ori insulo cum pipere, & semine urticae: uerum diffi-

cultur

culter tractari possunt ut admittant: cogere itaq; oportet ac ori infundere, ad uomitionemq; irritare. Rubore autem circa collum dissoluto, statim respiciunt ac relaxantur: quare oleo multo calido & lana, aut cerato, collum assidue circū circa est amplectendum. Similiter etiam naufragos reuocare oportet, si quidem respiratio adhuc in eis seruetur, prius autē in caput ipsos suspendere conuenit, ac cogere quo abforptā aquam euomant, siue pinnularum, seu digitorū irritatione, forinsecus uero manuum impositione iuuare oportet uentris firmitatem.

*De deuoratis ac fixis in tōssillas spinis, atq; his quæ in asperam arteriam delabuntur.* Cap. I.

Si in asperæ arteriæ extremū, atq; ipsam adeo asperā arteriam, aliquid eorum quæ deglutiuntur præter lapsum fuerit, tulsis prouocanda est, per acetosam aliquam qualitatem: & sternutatorum quoq; naribus admoventū. Ex uehementi enim agitatione, & instantia, & spiritu simul cum uolentia quadam expulsiōe adiuuante, eiusmodi consueuerunt excerni. Si uero iuxta tōssillas, aut iuxta principium scōmachi seu gulæ spinæ aut ossa fuerint infixā, ita ut oculis subiaceant, atq; plurima sui parte extra tōssillas promineant, uossilla apprehensa extrahere oportet. Quum uero in inferiorem gulæ locis quid adhæserit, hoc modo educatur, Spongiam paruum resina retribinchina madefactam, aut carūculam crudam recentem incisam, unā cū filo ualido ipsi alligato, deglutire coge, & mox cōpræhensam per alligatum filum rursus extrahe, hoc enim modo sæpe etiā id quod infixum fuit, simul extrahi consuevit. Conuenit etiam panis recentis interioris buccellas deglutientes exhibere citra commanducationem: aut caricam aliquantisper circummanducatam, non tamen penitus dissolutam, Quum autem ad fundum usq; ipsorum corporū penetrarit, neq; extrahi potuerit, aqua mullā gargarisanda exhibeatur, & cibi forbiles, uelut prīsana cū melle, aut halica similiter mihi ea aqua mullā calida macerata offerantur, forinsecus uero ceruicē atq; uniuerso collo lanam oleo calido imbutam imponere oportet: similiterq; cataplasmate calido laxante ac deprimente collum contegere conuenit: uelut est id quod ex semine lini cū aqua mullā adparatur. Hoc enim ductu tū locus ipse suppuratur, tum spina commota, simul cum his quæ deglutiuntur, deducitur. Aliud, ad educationē eorū quæ in tōssillas deuorata sunt. Statim te ad ægrū desidentem conuertere, ipsumq; tibi attēdere iubeat dic, Egredere os, si tamē os, aut festuca, aut quicquid tantum existit: Quæadmodum Iesus Christus ex sepulchro Lazarum eduxit, & quæadmodum Ionam ex ceto. Atq; adprehensio egri gutture dic: Blasius martyr & seruus Christi dicit, Aut ascēde aut descēde.

*De arteriarum pharmacis.* Cap. II.

Asperæ arteriæ extremum & subiacentem ipsi asperam arteriam, cum suis proprijs musculis, pellicula quædā fortiter cōplectitur & ambit. Quādo igitur adfectio aliqua siue iuxta eā ipsam pelliculam, aut circa extremi ipsius arteriæ musculos contingit: remedia quæ uim medendi eam obinent, arteriæ cōmuniter adpellantur. Afficitur autem pellicula hæc aut ob nimiam humectationem, aut asperitatem, aut ulcerationem. Vocis enim nomenclatura, uidelicet eius interceptio, hoc est non posse loqui, & rauditas in lo-

quendo, ad plures causas consequuntur: aliquando quidem propter diuturnos ex capite defluxus, aliquando uero propter suppuracionem thoracis & talem. Ex uociferatione etiam magna & plurima raucedo uocis oboritur, & ob frigidi & insueti flatus inspirationem, & ob plurimam ac insuetam potus nem uini mercedorem. Verum hæc affectiones magnitudine inuicem distant. Etenim uehementius humectis uocis instrumentis, uocis interceptio cōtingit: mediocrius autē rigatis, uox raucosa perficitur. Itaq; qui ex uehementi clamore, amplius uoce uexantur, cōsimile quiddam patiuntur his, qui reliquis corporis particulis fatigatis & ex labore afflictis afficiuntur. Nam & pellicula quæ arteriæ extremum atq; ipsam asperam arteriam ambit, per magnas uociferaciones extrā prolatō spiritu percussā, inflāmatur. Et iuxta arteriæ extremum, ultra hanc plagam, musculorū ipsum mouentium actio offensa, maiorem affectionem operatur. Musculi enim illi uocem operantes, ob magnas uociferaciones, non solū ab erumpente spiritu percussī læduntur, uerum etiam superextensi uehementer, maximam sustinent lassitudinē. Curatio autem horum coincidit cum his, qui alias particulas corporis habent fatigatas. Balneum enim dulcium & bene temperatarum aquarum magnopere iuuat omnes phosaficos Græcis appellatos, qui uocis exercitio magno uiuunt: citharēdos inquam & præcones, & tragædos, quum contendendo oblaeserint uocem. Quæadmodum autem oleum forinsecus illitum omne corpus ad fatigatione refocillat: sic & cibi mordacitate carentes & deprimentes, ac laxantes, tum affectam arteriæ pelliculā, tum ipsos musculos, et pharmaca arteriaca uim obstruēdi meatibus habentia iuuant. Quum igitur afflictiones ac lassitudines uelut distendentes circa extremi ipsius arteriæ musculos, & ipsam pelliculam generantur: in principio quidem lenissima edulia conueniunt: pharmaca uero obstruētoriam meatuum uim habentia. Sedata autem inflammatione aliquod ex modice repugnantibus est adhibendum: deinde rursus aliud, sed priore præstantius, ut paulatim ad medium repurgantium perueniatur: deinde ab hoc adhuc fortius diffusorium adhibeatur, ut hoc modo semper ad uehementem progressus fiat, quādo uidelicet diutius uelut indurata adfectio in uocalibus organis persistit. Primi itaq; ordinis erit tragacanthus, & gummi, & aster famius, amyllumq; & ex halica atrago probe decoctis forbitio: lac etiam conueniens est, & dulcitarī panes, oua forbitia, & nuces pīnce madefactæ, sesama, & sapa quæ fireon quoq; & hepsēma adpellatur. Hæc itaq; inflammatis affectionibus circa arteriam arteriæq; extremum conueniunt: quibus utendum donec moderator inflāmatio fiat. A uini autē potu abstineant hoc tempore in totum. Postquā autē inflāmatio moderator reddita est, passum theriacum exhibendum est, & sapa: butyrum quoq; conueniens est, & amygdalæ unā cum forbitionibus decoctæ, lac item ac mel diutius cocta, amylo ipsi inflecto, quod si non adsit, panis siliginis siccus contusus & cribro excussus, lacti dum coquitur infarciendus est. Manifestum itaq; est quod per huiusmodi uictum, tum pelliculam, tum musculorum circa arteriæ extremum atq; ipsam arteriam, inflammatio sedatur. Relinquitur autem humiditas

multa, propter quam impossibile est uocem esse claram, nisi rursus edulijs utatur & pharmacis mordacitate carentibus & repurgantibus, uelut est faba elixata, & pilana, & semen lini torrefactum. Hæc enim medium obtinent, inter ea quæ mediocri ui prædiata sunt, & ea quæ meatus obstruunt pharmaca. His autem amplius repurgat resina cerebintina, & thus cum despumato melle, amygdalæ amaræ, brasicaq; & probe decocti porri. His uero adhuc fortiora sunt, farina erui, hormini semen, iridis radix & panacis. Omnibus autem prædictis maxime mollibus, passum creticum, deinde theriacum & scybelites conuenienter miscentur: sapia quoque quæ sireon & hepslema uocatur, ex musto ad tertiam partem mensuræ decocto adparata omnium maxime meatus obstruit, citra etiam mordacitate meatus lenit. Quod uero ex caricis adparatur decoctum ad mellis spissitudinem, magis discutit ac repurgat. Omnium itaque simplicium pharmacorum uires nosse oportet, cum quod aliquod compositum est factum. Qui enim eas nouerit, etiam eis quæ ab alijs composita sunt recte utetur, maxime quum indefinite fuerint descripta. His igitur præexplicatis, arteriæ ac cõpõsitiones à ueteribus descriptas subnectemus. Arteriæ ad uocis asperitates, in principijs exhibitæ lenissimæ: gummi drac. ii. tragacanthi drach. i. sapæ sextarium i. Gummi & tragacanthum confusa et cribrata, cum sapâ contere donec dissoluantur, deinde super prunas sumum non emittentes decoque, donec non inquinent testæ insillata. Exhibe autem ex ea sub lingua tenendum. Alia arteriæ. Gummi quincuncem, palsi sextarium unum, mellis lib. i. Gummi modica aqua dilue, & ad reliqua cõiectum super prunas ut fumantes decoque, ut prædictum est. Ante somnum uero delingendum exhibe. Antonij Musæ, ad uocis interceptiones. Brasicæ uiridis cauliculos depurgatos manducandos exhibe, & quod instar pælearum excucum est expuere iubet: succum autem ipsum deglutire. Aliud. Succu eryngij aqua decocti heminam i. succi sicui aqua decoctarum tantundem, gummi leuissimè triti drac. vii. decoque simul diligenter, donec ad arteriæ crassitudinem redigatur, & delingendum exhibe ex eo ante somnum usque ad cyathum mensuram. Alia arteriæ, ad asperitates, rauicatas, tussescq; & sputum sanguinolentum. Amygdalarum amararum decorticatarum numero xxv. seminis lini torrefacti drach. iiii. tragacanthi drach. ii. oui in fermento assati utissimum, tragacanthum in modica aqua maceratam, unâ cum reliquis omnibus passio excipe. Si uero sonus uocis sit fractus, mel per passio ammisce, maxime si ex pectore aliquid educi oportet. Aliud. Brasicæ succum cum melle decoctum delingendum præbe, & confestim auxiliabitur.

Ad inueteratas affectiones uariæ arteriæ. Cap. iiii.

Oribasij ad asperitates et suppressam uocem.

Crod drac. vii. radidis dulcis, spicæ nardi, cufusc; drachmas iiii. myrrhæ drac. iii. thuris drach. iiii. seminis hyoscyami drac. i. mellis despumati unc. vi. piperis albi grana l. exhibe sub lingua tenendam magnitudine fabæ. Alia arteriæ sub lingua tenenda, ad suppressam uocem, rauicosos & cruenta reiectantes. Tragacanthi drac. vi. gummi dra. vi. myrrhæ drac. xi. obolos ii. thuris sesquidrachmam, piperis albi grana xx. croci drach. i. succi radidis dulcis drach. vi. carnis phœnicobalanorum numero iiii. palsi Cre-

tici quantum satis est. Gummi & tragacanthus confusa & cribrata passio macerantur cum radidis dulcis succo: quod si non adsit succus, radicem tulsam, & donec cogatur decoctum cõiectum quadruplici potest dare. Alia arteriæ, quæ etiam ad tulsim prodest. Seminis lini confusi & cribrati, uuarum passerum pingulum sine uinaceis nucum pinearum tostatum, nucum auellandarum mundatarum, æquales partes in farinam redactas melle cocto sufficiens excipe, et cochleare exhibe ante somnum. Edagma quo utimur. Vini scybelitæ sextarium i. gummi sexuncem, mellis dodrantem. Gummi pauca aqua præmacera, deinde omnia simul contrita in diplomate decoque acutere. Aliud, Charixeni. Succu radidis dulcis drac. vi. tragacanthi drach. vi. croci drac. ii. myrrhæ, thuris, cufusc; dra. i. spicæ nardi drac. i. palsi proptero phœnicis iiii. decoque donec in mellis modum cogantur, siccis probe cõmixtis, acutere. Eadè enim potestate ualeat quæ & sequens. Aliud, sub lingua tenendum ad suppressam uocem, ac reliquas circa arteriæ affectiones. Tragacanthi drac. xii. gummi drachm. xii. myrrhæ drac. iiii. thuris drach. iiii. carnis phœnicobalanorum numero vi. radidis dulcis drac. vi. palsi propterea uteræ quantum excipiendis his satis est. Sit autem passum ipsum præcoctum ad mellis crassitudinem. Exhibe fabæ Aegyptiæ magnitudine sub lingua tenendum, & dissolutum deglutendum.

Alia arteriæ faciens ad uocem fractâ, rauicosam & suppressam, inflammationes tonsillarum: utilis est phonascis & ante & post certam exhibita: uiuat refrigeratos: prodest ueteri & recenti tussi, spuentibus sanguinè, & sursum reiectantibus, & coeliacis: cõducit etiam ad anhelitus foetorem. Croci dra. iiii. myrrhæ drac. i. succi radidis dulcis dra. i. palsi Cretici sextarios iiii. passum ad tertias decoque, & cum eo prædicta excipe ac utere. Aliud, ad ulceratâ arteriam, Charixeni: conuenit etiam phonascis, hoc est, qui uocis exercitio utitur ante certamen, & post exhibita: facit & ad circûdolentes oculos, extrâ imposita lana ex eo madefacta, & ad interaneorum adfectus delineta. Gummi drac. xii. tragacanthi dra. xii. thuris drac. iiii. myrrhæ drac. iiii. croci dra. ii. succi hypocistidis drac. ii. palsi scybelitæ sextarium unum. Gummi & tragacanthum contundit & cribrato unumquodque seorsim, et cum modico passio diluito, reliqua uero fracta & præmacerata similiter cum modico passio conterito. Crocum uero in raro laneo panno ligatum, in ollam appendito, in qua reliqua coniecta, ac assidue agitata decoquantur: deinde extracto croco, et probe contrito, reliqua omnia in pilam coniungantur, & ut cocta sunt cum croco insanant, & utitor. Alia arteriæ, ex cuius usu sæpe magnam laudem adsequutus sum. Nuce pineas sexaginta, amygdalas amaras desibratas quadraginta, carnem phœnicobalanorum vi. succu radidis dulcis scrup. xii. croci scrup. i. myrrhæ scrup. i. tragacanthi scrup. vi. palsi Cretici quantum sufficit. Quibus uero educatione ex pectore opus fuerit, mel & sapâ adde. Alia, Andromachi. Pinguedinis gallinæ recentis quadrantem, mellis heminam i. decoque simul, & cum rutæ ramulis agita donec cogatur. Exhibe eam ieiunis. & post cibum, & ad noctem. Sorbitio ad suppressum sonum maxime ab humore: conuenit etiam phonascis. Porros in aqua ad tertias decoque, atque ipsos quidem abijce

abijce, aque uero halice succum ammisce, & mel, & ouorum lutea .iij. quæ ubi commiscueris ad tertias decoque, & excola; deinde adfula sapæ optimæ sex tario uno, rursus donec cogantur decoque, ac ramulis anethi circumagita. Da ex ea mane & uesperis cochlære unum. Arteriacæ necessaria, phoracis com moda; expertus sum etiā eius ualorem ad raucescentes ob humiditatem plurimam. Costi, folij, spicæ nardi, amomi, piperis, calstæ, mastiches, cuiuscq; drachmas quinque, opij drachmas duas, mellis & succi mororum æqualiter mixtorum quantum satis fuerit. Excipe pharmacū cum eis, quo uiscosa coactio reddatur, & utere. Exhibe sub lingua tenendum magnitudine nucis auellaneæ: caueto ne nimis solidum facias, ut facilius sub lingua liqueat. Alia arteriacæ, ad affectiones asperæ arteriæ, & pulmonis ad reiectiones sanguinem, & omnia uitia manifesta: maxime uero prodest crebrum & rectū anhelitum ducentibus. Sillæ depurgatæ coctæ drac. vi. seminis lini drac. ii. seminis urticæ drachmas duas, succi uerbenacæ exsiccati drachmas duas, thymi drachmā unā, farinæ erui drach. ii. pulgij, iridis, betonicæ, anisi, nasturtij, apij, seminis foeniculi, seminis anethi, piperis, fœnij græci, cuiuscq; drac. i. excipe melle Attico, exhibe mane & uesperis quātum cochleari accipi potest. Alia, ad arteriæ adfectiones, & pulmonis ulceræ, reiectiones puris et sanguinis, destillationes ad pectus, & ad educationem eorum quæ in pulmōe coaceruata sunt ualde efficax. Resinæ terebinthinæ, croci, thuris, myrrhæ trogloditicæ, terræ quæ Aster appellatur, cinnamomi, nucum pinearum purgarum, radicis dulcis, singu. dra. .iij. amomi, tragacanthi, carnis palmarū pinguiū cuiuscq; drac. .iij. spicæ nardi drachmas duas, calstæ drachmas duas, costi drac. unam, galbani depurati obolos quatuor, mellis Attici libras sex. Mel & terebinthinam in diplomate decoque, atq; ubi cōdensari cœperint, galbanū præmolitum ammisce, ac donec non inquinant amplius decoque, deinde agitando frigesacito, & cum reliquis cōiustis in pila permiscito. Vius eius est sub lingua detentæ. Alia, quæ similiter ad omnia prædicta efficax est. Spicæ nardi drach. .iij. croci drach. i. piperis grana triginta, radicis dulcis drach. i. nucū pinearum depurgatarum numero centum, styracis drach. .ii. balaustiorum drach. .iij. tragacanthi drac. i. cinnamomi drac. i. amomi drach. i. thuris drach. i. mellis sesquilibram, aut passū Cretici heminas viij. passum in duplici uasculo siue diplomate coquitur ad mellis spissitudinem, & ad reliqua arida in pila trita affunditur. Tragacanthus autem tunditur, cribratur, & diluitur unā cum styrace in uino modico dulci, atq; ita ammisceatur, exhibe ex eo cochleariū unum. Expertus enim sum ambo hæc adscripta magna celebritate probari. Composito ex capitibus papaueris uaria. Capita papaueris centum & uiginti in aquæ sextarios tres cōiecta ad dies quinque macerato, deinde ad tertias decoquito, & abiectionibus capitibus ad aquam mellis sextarium unum ammisce to, quibus simul ad spissitudinem mellis decoctis, ita ut non disfluant, croci, myrrhæ, acaciæ, succi hypocistidis lingu. drach. i. infardito, & ante somnum delingendum exhibito. Prodest reiectionibus sanguinem, coeliaci ad difterencis: Ego autem ad huiusmodi ex capitibus papaueris compositionem, quæ

do scilicet ad libram unam aquæ, decem papaueris, capita iniijuntur, prædicta commisco, & pro phar maco fluxiones sistente ac repressiuo utor. Alia, ex libris Asclepiadæ, panacæ Mithridatis. His qui uocis exercitio utuntur ante et post certamen utilis, facit ad glandularum inflammationes, columnellæ laxatam, & ad gingiuas humore turgentes, & ulcera serpentia oris, ad motos dentes, & destillationem, tulsim ueterem & recentem sanguinem spuentem ac sursum reiectantes. Vitor ea aliquādo citra admixtionem, aliquando autem passo aut scybelite uino, aut aqua calida diluta. Etenim ad tonsillarū inflammationes atque consimiles adfectiones utendū est pharmaco hoc diluto: ad eas uero quæ in profundo hærent, immixto & puro. Verum compositio ipsa hoc modo habet. Radicis filicis quam crassissimæ diligenter lauantur, donec terrenæ sordes in totum discedant, deinde refrigerantur, in frusta digitali magnitudine dissectæ: ex quibus lib. .iij. accipimus, & capita papaueris agrestis mediocriæ centū & quinquaginta, radicis symphyti depuratæ, corticis radicis mandragoræ, rhei pontici, rosarum siccarum, iridis illyricæ, radicis dulcis, balaustiorum, singulorum quadrantem, calstæ trientem, nardi cesticæ sesquidam, aquæ pluuialis sextarios quindecim. Omnia prædicta crasso modo contunduntur, & per triduum madesunt, deinde sequenti die in diplomate ad tertias decoquuntur, exprimuntur, & percolantur: in huius autem decocti parte, subscripta per diem & noctem maceramus. Sunt autem gummi puri libr. i. tragacanthi pellicidi libr. i. myrrhæ trogloditicæ sextans, succi radicis dulcis sextans, croci sextans, succi hypocistidis sextans, mastiches uncia una. Sequenti deinde die diligenter, & paulatim hæc trita diluimus, & quod superest ex ipso decocto ac expresso liquore, paulatim adijcimus. Et postea uinum scybelites, aut herbarum, aut aliud dulcissimum, sextariorum x x .iij. mensura in uas fictile diffusum decoquimus, donec ad mellis crassitudinem redigatur: deinde adiectis etiam tritis omnibus rursus ad coactionem decoquimus, & ablati utimur. Datur ex hac quātum cochleari excipi potest.

Composito ex capitibus papaueris, ad tussis humidas, dolore adfectam arteriam, & fauces, & ad destillationes à capite ad pectus: utilis est etiā ad uigilias: Capita papaueris Thebaici mediocriæ unā cum ipso semine decem, aquæ pluuialis sextarium unum, radicis dulcis parum quiddam, per diem unum præmacerato, deinde donec flaccida tactu fiant capita, decoquito, exprimito, & percolato, ac ad decoctum dimidium eius mellis adijcto, & rursus super prunas ad mellis crassitudinem decoquito, ac utitor. Accuratio huius antidoti adparaus, atq; etiam partim usus prædictus est Sermone quinto de proprijs ægrorum potionibus, loco. Quod si magis adstringens alui profluuiorum facere uelis, & sanguinem spuentibus commodum, succi rhois rubri drachmas duas adijce, & acaciæ drachmas duas; hæc autem in passo diluta, tum decimum quum ab igne ablaturus es pharmacum, in olam conijce, & parumper seruiferi sine, ac utere, cochlearium exhibens ante somnum.

De destillatione siue catarrho, & narium muco, ex Galeno.

Destillationis & muci causa est cerebrum, quod quidem a frigore ad frigidā intemperiem deducitur, ab æstu uero calefit & repletur. Vinū quoque ultra modum potatū caput replet, & balnea calidiora, & largior persufio capitis ex aqua calida, maxime si aliās calidius caput existat: & cibis sanē qui in uentre incoctus perseverat, neque infra excernitur, in caput impletū facit. Repletū itaque caput rursus ad subiecta mēbra humores demittit: & si quidem ad nares hoc ipsum excrementū defluat, Coryzan siue mucū appellare consueuerit, & Latini amplius grauedinē: si uero ad gurgulionē, morbum Vūā appellatū generat. Est autē affectio circa gurgulionē consistens, aut aliās ipsūm gurgulionē tumidū facit. Promptissima itaque est ad nares & ad os defluxus delatio, quāuis aliquibus etiā ad oculos, aliquando & ad aures deferatur. Atque delationem ad os etiā stomachus siue gula excipit, & aspera arteria, atque ipsum adeo arteriæ extremū. Quod sanē extremū, ob ipsum ad se delatū a capite defluxū superhumectatū, in principio raucoſam uocem producit, & progressu temporis etiā paruā. Quod si amplius augetur malum, uox ipsa in totum perditur. Nam ipsa aspera arteria unā cū suo extremo permalescit. At si acrior fluxus ipse existat, non tantū uocis damni prædictæ particulæ patiuntur, sed grauiſſima etiā erosio accedit, talis narturæ, quales circa cutē accidere sēpe uidemus circa ulcra externā causā, eoq̃ modo etiā pulmo ipsis exulceratur, uocaturq̃ hæc affectio tabes. Quod si ad gurgulionē in uentriculum fluxus deferatur, si quidē frigidus existat, in frigidā intemperie corpora perducit, calidus uero in intēperie calidā: exulcerat etiā ea temporis progressu, in principio uero appetitioni nocet & concoctioni. Si itaque frigidus fuerit defluxus, tardas cōcoctiones & cruditates, ac ructus acidos efficit. Si uero calidus fuerit, in corruptionē adiget cibos, unde nidorosus, aut foetentes, aut acide eruptiones pducuntur, aut etiā aliterius cuiusdā quæ nominari nō potest, aut etiā nō habentis qualitatē. Vbi uero aliter penetrat nō cumentum, etiā intestinum ieiunum adficit, & ad colū usq̃ pertingit, atq̃ ad mesenterij uenarum uasā, per quæ ad hepatis distributionem atq̃ digestio alimentū contingit, aliquibus itaque defectio appetitus accedit, aliquibus uero appetitiones præter naturā, quas adpellat caninas, aut etiā uitiosorum ciborū cōcupiscentia, qualis mulieribus prægnantibus pica morbo infestatis contingere consuevit. Manifestum autem est & gurgulionem & conſillas adfici. Quin & parulides & glandulæ, & denſiū erosiones, ulcerationesq̃ & putredines oris, ad seroſas ex capite in ipsum os destillationes sequuntur. Cæterum uulgus Medicorum aut gurgulionē refecat, aut pharmaca exhibet quæ per asperam arteriā spūi eiectione in pulmonē dilapsa educant. Alij uero uentris curam gerunt, quemadmodum alij dētiū, & oris, aut etiā affectionum in naribus, aut oculis, aut auribus curam moluntur. Principium inuentioſis Galeni. Melius autem erat, mea quidem opinione, uelut fontem malorū excindere, sanāto uidelicet capite, quod si impossibile sit facere, ob uehementiam naturalis intemperie, omnino tamen eius salutē consulere oportet, indicatione ex signis ipsius accepta quomodo ei subueniri possit: non enim mox, uelut aliqui Medici omnibus capi-

tibus semper ex thapsia & sinapi cataplasmata adhibent, sic et te facere uolo. Etenim si a calida intēperie caput uexatur, omnia calida pharmaca nociua existunt. Oportet itaque ipsos balneis multis calidis potabissimum & dulcimum aquarum consolari, simulq̃ generatim in capite uapores calidos discutere, & temperaturam omnem in melius mutare. Nocuius autē est eis usus aquarum natura sua calidarum. Quæcūq̃ enim sulphurentæ sunt, & bitumē olent ob caliditatem suam, contrariæ sunt capitis natura calidis. Quæ uero aluminosæ, coarctatione sua caput offendunt: uerū calidas dulces non adpellamus sua natura calidas: neq̃ enim inuenire est quæ suapte natura calidæ existant, ac non aliqua medicamentaria qualitate participant. Qui uero caput uehementer calidum & perustū habent, & ob id assidue a destillationibus uexantur, his melius est hora estiuā ex rosaceo ungi, ex solis rosæ et omphacino oleo citra spissamētorū adiectionē adparato. Quædā autē capita propter calidiorē arteriarum tēperaturā, tū uertigine, tum dolore apprehenduntur: in quibus etiā arteriarū in cisione utimur. Quare cōsiderare oportet præcedentē destillationis causam, & præhabita diætā, atq̃ ita remedia cōtraria afferre: in uersum autē pauco cibo & quiete utendum est, uitato etiā frigore & calore: si uero ubi incoctū amplius in uentre innatent, ad uomitū æger est inhortandus. Philumeni. Valde utile est his qui destillationē patiuntur, si eorū plantæ pedis cū pice in oleo plurimo dissoluta cōstanter fricentur, ex eadēq̃ inguina & sedes perungantur, nares uero ex thure & myrrha cū uino & oleo cōtritis, ac ad mellis crassitudinē redactis illinantur, & unguentum trinum simul naribus infillatur. Melanthium etiam torrefactū linteolo illigatum odorem, aut hedychroō manibus teneant & assidue odorēt, aut cyphi eodē modo. Cōuenit etiā inflammationē arcere emplastra frōdi imponere, uelut est Icelis, & emplastrū oxerū adpellatū, itemq̃ barbarū cruentis uulneribus, destinatū, & athena. Gargarissem autē assidue passum scybelites, aut sapā calidā: forbitionibus uero utantur decocto hyssopū, sicū & nucū pinearū, atq̃ iridis, itē halica ex passio decocta. Si uero ab his nihil leniatur destillatio, neque tamē amplius augetur, sed eodem modo ad plures dies persistat, præsentissimū auxiliū capitis irroratio existit, maxime in ætate, & capitis temperatura calidiorē. Oportet autem in balneis ex alto frigida aqua delabente caput subdere, ut uolentium inde sustineat insultū: eue stigio enim densitatem dissoluit. Animaduersionē tamen habere oportet, an thorax inde facile offēdā possit: consuevit enim promptē a capite frigiditatem transsumere ac fortissimas uexationes perferre. Porro diuturnas destillationes fortis clyster sanat, aut uomitus a raphanis ieiunis factus, aut purgato exuberantis humoris, & frigatio capitis ex unguento irino, aut optimo nardino. His uero qui cōtinua & in ueterata iam destillatione addiuntur, caput radere oportet, & factis scarificationibus bituminosa emplastra imponere: pharmacis autē deglutitijs utendū huiusmodi. Eclegma ad destillationē. Mellis sextantem, butyri recentis unciam unam, decoque, & in duas partes diuisum delingendum exhibe, his qui educatione opus habent. Manducatio ad eandem. Semen homini, semen papaueris nigri, semen lini

torrefactum æquis portionibus cōrunde, & cribro excute, melleq; cocto excepta commanducandam mane exhibe. Probè etiam ad destillationes facit antidorus ex capitibus papaueris soporifera, ante somnū exhibita: etenim somnū dulcè infert, & reprimit influxū. Eius adparatus paulo ante inter arteriacas compositiones dictus est, & in quinto similiter Ser mone de proprijs ægorū portionibus loco. Cata portū ualde celebre ac dolorē leuās. Syracis dra. vi. myrrhæ dra. i. & dimidiā, terebinthinae drac. ii. opo panacis dra. ii. iridis dra. ii. piperis albi, spicis nardi, nistri, feminis hyoscyami, opij, cuiusq; dra. i. arida cō tundito ac cribrato, reliqua uero in pila citra liquoris admixtionē confusa simul committito, & grana in erui magnitudinē informata ante somnum deglu tiēda exhibeto, neq; quicquam ultra forbitiones ad mittito. Dantur ad summū grana iiii. medium iii. minimum ii. Aliud, quod etiam dolorem leuās, tum tussim, tum destillationi opitatur. Syracis, drach. iiii. myrrhæ drachmam unam, opij drach. i. galbani dra. i. contunde in pila, & sapa assula subige, & catapotia erui magnitudine informa, quorū similiter ad summū iiii. exhibe, medium iii. mini mū ii. aborbeant etiā insuper palsi calidi diluti cya thos duos. Asclepiadē remedium. Pyrethri, costi, utriusq; drach. ii. piperis albi drach. i. contusa & cri brata reponē. Vñ uero expetite apprehēsis naribus phar macū adtrahere præcipe. Aliud. Piperis dra. ii. feminis urticę drach. ii. croci, myrrhæ, costi, cuius que drachm. i. Vtere ut dictum est. Cæseus autem te ner & recens comestus utilis est, & cauliculi brasicae crudi à se iunctis comesti, similiter & brasica deli catio cocta & comesta. Qui uero calidiori præditi sunt tēperatura, la tucæ cauliculos parumper ferue factos comedant, in posca uero ipsos intingant.

De tussi.

Cap. LIII.

Tussis causæ uarię sunt. Nam & humor à capite ad as peram arteriā destillans tussim efficit, & asperitas so la pelliculæ asperā arteriā intrinsecus ambiētis tusa sim iritat: qui præterlabūtur etiā cibi ac potus tuf sim mouet, & lumbrici stomachū infestantes, tussi culas paruas excitant: & acris humor stomachū per turbans, ac iritatuam aliquam qualitatem ad fau ces demittens, imaginariā tussim producit, quemad modum etiā in his qui stomachi morsum sentiūt, & saluæ ad eū influxu uexantur, euenire solet, quū nihil molesti iuxta asperam arteriam obuersetur. In temperies quoq; frigida respiratōnis instrumento rum, tussis causa existit: uerum hi moderatè ac mini mē uiolenter tussunt, adeo ut non solū per spiritus compressiōē, retinere queant & impedire tussim, sed sanare etiā sæpissimē, per respiratōnis inhibitiōē frigefactas particulas calefaciēdo. Signum au tē ob solam intemperiem frigidā tussientium est, si per crebras inspiratōnes iritentur, frigidiūte uide licet exinde intensiore facta & aucta. Quādo igitur hi leniter inspirant ac aērē adtrahunt, & in calida do mo uersantur, parū uel omnino nihil tussunt. Quæ uero cum distillatione paritum, ab utraq; palati par te contingunt tusses, palam ostendunt defluxum à capite ad asperam arteriam deferri, itemq; ad pul monem. quod si nihil expuant sic adiecti, tenuē esse defluxum indicat, qui expulsione spiritus dissectus, præ tenuitate sua rursus fluxum reflectit, id uero ex

humore per sputū reiecto manifestè apparet: crassio rē enim priore habet compagem, etiā si sit à spiritus impulsione reiectum. Manifestum autē est, quod hu mor in pulmone & thorace detentus, in morbo late rali, inflammatione pulmonis, & tabe, maxima tussis causa existit. Medemur autē tussi à tenui defluxu fa ctæ, per antidotum ex papaueris capitibus inspissan tes, aut per alterius cuiusdā pharmaci dolorem leuā tis usum, & per cibos boni succi. Si uero crassus aut uiscosus fuerit affligens humor, per ea quæ extenuāt & discindunt medebimur. Instrumentorū autem re spirandi frigiditatem per calefactentia emendamus. Quæ uero ab asperitate fit, per lenientia & mordaci tatē arcientia sanatur, qualia sunt ex arteriis cōposi tionibus simpliciora. His itaq; præ explicatis, ea quæ à ueteribus descripta sunt ad tussim remedia subne stemus. Nos uero ad præscriptā methodum animū conuertentes, atq; uniuscuiusq; simplicium pharma corum uitres docti, faciliè ad quamcuq; affectionem cōueniētia remedia afferemus, etiā si à primis indeh nite sint descripta. Remedia autē hæc sunt. Syrax, nucis auellanae magnitudine deuoratus, tusses sedat ac destillationes. Vtilis est etiā ad raucedinem.

Aliud, Ficus siccas pingues in uino dulci meraco madefactas, unā cū uino deuorādas exhibe, hoc tusse mitigat. Terebinthina & mel coctum delingēda præbe, & uinū dulce dilutū insuper absorbēdū: hoc enim attenuat, & educit. Aliud. Filicē cōtusam & cribratā passo instar poltæ insperge, & aborbeā dā exhibe. Prodest etiā sanguinem reiectantibus.

Aliud, quod ad tusses noctu molestiā exhibentes cōducit. Mētæ ramulos tres tritos, affuso aceti cō chleari, ante somnū absorbēdos præbe. Adiuuat cō coctionē, stomacho utile est, & crassitū discindit.

Aliud. Nucū pinearum torrefactarum, amyli, radicis dulcis, feminis urticæ, feminis lini, cuiusque sextantem, iridis, piperis, hyssopi, feminis nasturtij, amygdalarū amararum, singulorū unciam unā. Ex cipe melle probè despumato, & præbe ex eo cochlea rium mediocre. Compositio ex marrubio ad tusa sim. Marrubij sextantem, hyssopi uncia i. iridis dra. iiii. pulegij dra. iiii. calaminthæ montanæ drach. iiii. bulborum scillæ scrup. vi. nucem unam pineæ bonam & integrā, caricas pingues v. aquæ sextariū unum & dimidiū, mellis hemina unā, uterē. Ede gma tussientibus aptum. Nucum pinearū repurga tarū dra. xii. palmarū pinguium dra. x viii. iridis dra. xii. feminis lini torrefacti dra. viii. tragaca thi dra. xii. amygdalarum dulcium delibratarum dra. xvi. mellis despumati quantum sufficit. Traga canthum in uino dulci modico maceratam & dilu tam, primum cum despumato melle decoquito, atq; ubi semel ebullierit, reliquis in mortario probè con tritis affundito, & utitor, cochleariū exhibens mane & uespere de digito delingendum. Mellis enim tan tum adijcere oportet, ut delingibile pharmacū fiat.

Aliud elegma ad tusses recentes. Vini dulcis ueteris sextariū unum, mellis Attici libram unam, decoque, cum rutæ ramulis assiduè agitando, exhibe ex eo mystri i. mensura. Est etiā uile stomachio. Alia remedia ad tussim cōducētia. Copia rium, hoc est, placentula, tussi accommodata. Semi nis lini cōtūsi & cribrati, uux passæ pinguis & exa cinatæ, cuiusque sextarium Italicum unum, nucum pinea



pinearum torrefactarum, nucum auellandarum repurgatarum, singulorum sextarium dimidium, piperis sextantem, myrrhæ unciam unam, croci unciam unam, mellis sextarios quatuor. Semen lini contusum cum melle decoquito, atque ubi coactum fuerit & inspissatum, reliqua optimè conrita ammisceto, & simul unito. Exhibe ex eo magnitudine nucis auellanae. Ad tussim inueteratam remedium optimum. Cumini, piperis, seminis urticae, cuiusq; unc. i. mellis despumati sextarium i. contrita cum melle subigito, ac parumper seruefacto, reposito, ac utroque ex eo præbens cochleariū delingendū. Aliud admirabile. Piperis, pulegij, hyssopi, calaminthæ, cuiusque sextantem, petroselinū unc. i. mellis despumati sextarium i. da cochlearium. Aliud simplicius bonum. Mellis quadrantem, butyri recentis quadrantem, cumini quā tenuissimè triti drach. iiii. Melli prius despumato butyrum ammisceto, & simul calefactis cuminum insperge, & paulatim delingendū cochlearium unum exhibe. Aliud, ad tusses pituitæ repurgans. Hyssopi unc. i. pulegij sextantem, iridis, sinapis, seminis nasturtij, anisi, piperis, singulorum un. i. tusa ac cribrata, melle despumato sufficere ei excipe, & cochlearium exhibe. Hyemis autem tempore, & febre non instante accepturum, piperis sextantem adijce, & pro aniso, fœniculum aut cuminum, & pro nasturtio sinapi, ut sit sinapis sextans siue uncia duæ. Aliud, ad diurnas tusses. Comæ hyssopi, pulegij, de superiore anno, ammi, piperis, erui rufi decocti, iridis cuiusque sextuncem, spicæ nardi drac. iiii. terebinthinæ trientem, butyri recentis sextantem, mellis despumati sextarios ii. Butyrum & terebinthinā cū melle liquefacto, ac reliquis unito: utere exhibitio cochleari paruo. Aliud, thoracis affectionibus cōmodum. Lomentū fabaci fricti ac tenuissimè triti septuncem, seminis lini septuncem, tridis contritæ quadrantem, nucū pinearū torrefactarū dra. ii. pulegij triti dra. ii. seminis urticae dra. i. piperis dra. iiii. mellis despumati choeniceum i. Melli despumato lomentū insperge, ac pariper decoquede inde reliquis in mortario ammixtis utere. Aliud, Aholij. Hyssopi, pulegij, ammi, piperis, erui rufi, iridis, cuiusq; dra. vi. terebinthinæ drach. iiii. spicæ nardi dra. iiii. butyri recentis sextantem, mellis despumati sesquialtera, utere. Aliud, ad tussim ex sty race. Amomi sextiæ, cassiæ sextantem, styracis sesquialtera, spicæ nardi sesquialtera, croci unc. i. piperis unc. i. mellis despumati sextarium i. exhibe cochleariū.

Ad tussim sicā. Sicam tussim sanant etiā paulo antè præscripta pharmaca. Aliquādo autē & aquæ seruefactæ forbitio. Qui enim ob pituitæ crassitudinē nihil educere possunt, ab humectantibus plus emolumentū sentiunt; maxime eo quod quodammodo simul extenuatoria participant facultate.

De pharmacis dolorem leuantibus & simul conseruentibus tussi.

Cap. LV.

Hocce pharmacorum dolorem leuantū genus, hi qui ante ætatem nostrā fuerunt, cōposuerunt, tussicibus & sanguinē reiectantibus præcipue conducens, atq; etiā his, qui ultra has affectiones tabescunt; itemq; ad alios dolores & affectiones quæcūq; circa pulmōnē & pectus, ac asperā arteriam, reliquaq; interiora mēbra cōsistunt, præter quæque propriè colicæ appellantur. Differunt enim hæc a colicis similiter anody-

nis, hoc est, dolorem leuantibus appellatis, tū aromātū & odoratorū seminū, tū eorū quæ urinā cient admixtione. Colicæ autē facultates ac cōpositiones his uehementiores sunt, excellentē uim stupefactoriam complexæ, ob multitudinem uidelicet eorum quæ refrigerantis naturæ existunt, uelut est hyoscyami semen, & dactæ, papaueris succus, & mādāgoræ cortex; quibus sanè ad colicos necessariō ob doloris magnitudinē utimur. Atqui in thoracis affectionibus aliqui styracem & crocum ammiscuerunt; aliqui autem calefacientia; alij etiam aromatica, & cum pauca ui adstrictoria exicantia; quidam etiam nobis familiaria, uelut anisum, apium, fœniculum, daucū, & seseli, quæ uehementiū pharmacorum uires & infunditatem obtundunt, ampliusq; urinā expellunt; quidā etiam ea quæ asperitates leniunt addidere, uelut est tragacanthæ & radix dulcis, ac uinum dulce. Quæcūq; autē ex eis de pharmacis stuporem inducentibus, minus participant; ea etiam tabidis exhibemus. Sunt autem ad ueteribus cōposita doloris leuamenta huiusmodi. Catapotium. Pharmacum ad tussim accomodatū, inueterata maxime existēte affectione. Efficax est ad diurnam destillationem, dolorē capitis difficulter spirantes, & inflammationes pulmonis, ad uescicæ quoq; ac uulugæ affectus. Inscritbitur Panacæ, ab alijs etiā Stichus. Myrrhæ, opij, piperis, styracis, castorei, galbani, æquales partes cū sapa dulci subige, & in catapotij figuram redige, ac ciceris magnitudine exhibe; absorbeat autem a sumptione aquæ mulsæ cyathos duos. Harmonia. Aliud pharmacū uehementèr efficax quod harmoniæ adpellatione inscribitur; ualet ad destillationes, & in exuperabilem defluxū. Styracis, castorei, piperis, cardamomi, cuiusq; dra. iiii. opij, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, cuiusq; dra. iiii. passio probè cocto excipe, & catapotia ciceris magnitudine informa, & ante somnū præbe deuoranda. Alia confectio, ad tusses diurnas egregiè & cōtinē ualēs; itemq; ad humētes & ob humoris crassitudinem diu durantes, quæ Symphonos adpellatur, & febrē optimè sedat. Ea omnes ueteres celebres usi sunt. Piperis, opij, cardamomi, cuiusq; dra. i. croci, sulphuris uiui, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, cuiusq; dra. iiii. mellis cocti cochlearia iiii. Hoc enim modo nos apparamus: uerū sunt qui gentianæ, & dauci, cuiusq; dra. ii. ammiscēt. Alia, ad tussim & tabē Isthathmos appellata. Folij, petroselinij, hyssopi, rofarū siccarū, anisi, opij, croci, cocti, seminis hyoscyami, myrrhæ troglodyticæ, spicæ nardi, iridis, æquales partes cū melle sufficienti subige, datur fabæ magnitudine ad noctem.

Alia, iohannis adpellata, ad tussim, tabem, omnes morbos internos, & certo drcuitu affligētes affectiones, spicæ nardi dra. ii. myrrhæ dra. i. croci, cocti, piperis albi, cuiusq; dra. i. galbani dra. i. fecis opobalsami, cinnamomi, mandragoræ succi sicci, castorei, cuiusq; dra. i. seminis dauci sesquidra, cassiæ sesquidra, mellis despumati quātū facis erit. Facit ad dolorē stomachi, iecoris, pulmonis, oculorū, sanguinis reiectionē, abscellus dyntericos, uoluoili, renū ac coxendicū affectiones, difficulter spirantes, dolores laterū, unice tamē illorū ac præcordiorū, profluuiū muliebre, & muliebris suffocationes. Prodest cōtra letalia uenena ante & post cibū sumpta, & ad omnē sanguinis eruptionē cū frigida, ad uipere & phalagij mor-

fus in

sus in uini cyathis 111. quantanarius ante febris accessus datur ex ea oboli 11. cū uini cyathis 11. sed prælo to tamen antea ægro. Sanat ægrè spirantes, & qui nisi erecti spiritum ducere nō possunt, & anhelosos, etiam si iam ad multos annos affectio durauit. Sanat quoque antiquas à capite ad pectus defluxiones.

De suffitionibus.

Cap. lvi.

Quantum antea suffidentissimè de suffitionibus dictum sit, in Sermonè De clysteribus & euacuantibus, ac alijs quæ ægris offeruntur, qui sanè tertius huius operis fuit, dicitur tamè nūc quoque, sed paucis. Pastillus suffumigabilis tulsentibus & orthopnoicis commodus. Abrotoni, sandarachæ, sinapis, cardamomi, æquales partes cōtundito & cribrato, & cū aqua in pastillos redigito ac suffito, ita ut æger ore fumum suscipiat. Alius pastillus. Sandarachæ sextantè, terebinthinæ sextantem, costi serupulos sex, folij scrupulos vi. mastiches scrup. vi. laferis scrupulos 111. piperis grana x. redige in pastillos ac utere eodè modo. Alius. Castorei, sandarachæ, galbani, sulphuris uiui, colophonij, propolis, terebinthine, mastiches, roci, chamaeleus aquales portiones, cū aqua in collyria redige, & ipsa per infundibulum suffito. Si uero non adit chamaeleus, his conyzam paruam aut capparisi corticem adijce. Aliud bonum suffumigium, per experientiā nobis inuentum, quatuor speciebus constans. Sty racis, terebinthinæ, sandarachæ, mastiches, & æquales partes excipe, ac similiter utere. Creditur anhelosos & purulentos sanare: itemque tulsim & laterum adfectiones, quemadmodum etiam ea quæ paulo ante hic sunt præscripta, atque ea quoque quæ tradidimus in tertio Sermonè. Epithema ad tulsim optimū, ex seruula campana. Sāpuci, seruulæ campanæ, prasijs, iridis, cuiusque sextantem, myrrhæ unc. i. thuris quadrantem, resinæ pinus lib. i. olei irini lib. i. utere.

De orthopnoicis, anhelosis, ac ægrè spiritū ducentibus, Ex Galeno.

Cap. lvii.

Qui frequenter respirant citra febrem, quemadmodū solent à uehementi cursu fatigati, eos asthmaicos, hoc est, anhelosos, Medici uocare consueuerunt, ab accidente uidelicet, hoc est, anhelando: eosdem etiam ab altero accidente orthopnoicos appellat: desident enim ac pectus erectum habere uidetur, ob timorē, ne suffocentur, & stratum quoque iuxta superiores partes, ad quas pectus ipsum reclinatur, erectis sibi adparant, ne dormientes strangulerent. Inspiratio enim minor ipsis contingit, quam respiratiois frequentia exposulat, quamuis pectus plurimū ipsis diducatur. Ex quo manifestū sit, coarctationē locorū præter naturā intrinsecus adesse, cuius etiā manifestè ægri sensum percipiunt. Fit autē coarctatio loco rū inspirationis, quum aut crassiorum & tenaciorum multitudine pulmonis bronchia obstruxit, aut tumor quipsi abscessui similis in ipso consistat. Similiter autem difficulter spirant, quia aspera arteriā à multa destillatione habet repleta, aut quadam defluxione ex uicinis locis acruatim in ipsas arterias de labete. Distinguntur autē inter se hæc affectiones: nepe quod destillatio etiā sanis ex manifesta causa repente accidit, in totum ferè citra febrem contomitantibus etiam proprijs destillationis signis. Si uero tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessariò febris consequitur, neque ita diu possit, inflammatione

in pus transfmutata, pus reijctur cum tulsim. Si autem crudum tuberculum gignatur, uelut Antipatro Medico contigit, iuxta leues pulmonis arterias, hi neque grauitatē magnam sentiunt, neque ab orthopnoia in tantum infestantur. Qui uero propriè orthopnoicid & difficulter spirantes adpellantur, in totum febrem non habent: grauitatis autē sensus eis contingit, neque quipsi purulentū per spiritū relectant. Porro curatio prædictarū affectionum quiddā cōmune habet, quiddā etiam cuique proprium. Cōmune quidem ut superflua substantia humoris hæc affectiones generatis consumatur, & expēdatur. Proprium uero, ut si à crasis & tenacibus humoribus fiant, per extenuantia & incisiva pharmaca cōsumptio fiat: si uero à tumoribus abscessui similibus affectiones fiant, per extenuantia & desiccantia consumantur: quæ curatio omnibus in profundo corporis abscessibus cōmunis existit. Vini autem potio ambabus conuenit, tenuis saltē temperaturæ, in uniuersum autē paucus potus conuenit, quibus abscessus alicubi adest, multus uero, quibus brōchia tenacibus & crasis humoribus sunt obstructa. Etenim repurgantia hos humores pharmaca necessariò tussis conueniunt, uerum non facile per spiritum reijctur ob crassitudinē id quod repurgatum est humectatione igitur multa indiget, quo facilius efferatur: & ob id sanè largior potus anhelosis est exhibendus. Pharmaca uero eis conueniunt incidentia citra uehementem calefactionem. Crasi enim & tenaces humores à uehementi calore uiscosiores redduntur, glutinosi, & ut difficulter auelli possint: quapropter maximè prodest eis acetum scilicet linum, & ipsa quoque scilla asila cum melle trita & de linctā, & acetum mulsum ex ea adparatum. Maximum autem remedium inquit Archigenes, purgatio frequentior existit per pharmaca fortiora: & uosmitus à radicibus, per interualla suscepti. Cataplasmata uero ex sicibus & ordeacea farina: magis uero ex loliacea habente resinā & mel ac cerā ammixta, insarciri potest etiam ei iris & manna. Malagma ta autem conueniunt, quæcunque exulcerāt cutem & attrahunt saniem, quale est Cissophontis, & quod constat ex bacis lauri, & quod ex semine rosmarini constat, & emplastrum ex herbis, & quod icesiū adpellatur, itemque quod uocatur Thraçæ. Quod uero cyzicēnū emplastrum dicitur, si irini ceratū equalem sibi portionem assumat, & uniuerso pectori imponatur, humiditates cōsumit, & habitum corroborationem. Omnium autē conuenientissimum huic affectio ni hocce est, inquit Archigenes. Emplastrum nigrum Archigenis. Ceræ lib. i. resinæ pinus sicce lib. i. iridis sesquialibram, bituminis lib. i. picis lib. i. æruginis unc. i. myrrhæ sexuncæ, thuris sexuncæ, radicis cucumeris syluestris, centaureæ, lapidis asyriaci, cuiusque sextantem, misys crudis sesquiunciam, chalcidis crudæ sesquialibram, salis ammoniaci unc. i. galbani, terræ cimoliz, terræ ampeliridis, cuiusque unc. i. olei lib. ii. aceti lib. i. aut ut ego soleo lib. ii. styracem cū modico oleo liquefactū in mortario pbc cōtere, & tallica uero cū aceto dissolue, herbas autē cōtere, & cribro excute, liquefactis uero quæ eliquari possunt, & percolatis, ac ab igne ablatis, cōtrita adijce, atque herbas insperge, omnibus autē simul unitis & emolliis utere. Hoc sanè multos occultos abscessus discutit, & in uaporē resoluit, alios autē aperit: quicunque autem

autē sū rupti sunt, & fluidi tamen adhuc permanēt, eos mirabiliter exiccat: eiusmodi enī pharmacis uix aliud praeſtantiū reperiri poſſit. Cōueniens eſt etiā praeſcriptis affectibus Amethaonis epithēma, atq; eo adhuc magis Polyarchion, maxime tempore coarctationis locorū. Pectus uero cū urticis cōfricetur ac cēdatur, ac ſcilla decoctata fricetur, dein de lauacro ac oleo calido loci rubefacti cūrētur: ſi dūc autē lenioribus ſoluiſis aluum emollire oportet, quale eſt, enī acetabula duo optimē conſuſa, & cum ſero laetis decocta, ita ut percolatum ſerum, & modico melle permixtum bibatur. utendum eſt etiā ex thymo, ſalere, & pipere ſalis conſectiōnibus, quibus addita eſt ſcammonia, aut etiā his quae ſunt ex roſmarino. Ego uero etiā herbae ſabine optimū uſum expertus ſum, ſi per ſciſpam drach. pondere tria ſumatur, & ſequenti die duarum drachmarū pondere, tertia triū. In aliquibus autē & quarta die uſq; ad quārā drachmā pondus auxi. Quod ſi bene procedat purgatio, ſimulq; cruetā educat, non eſt quem nō melius ſpirātem in poſterū reddat. Porro interiectis duobus aut tribus diebus, abſinthium potandū exhibui, maxime ſi ſtomacho aeger langueat, quod ſi non contingat ſtomachum languere, ſi ſim bibēdā dedi, aut abrotonū, aut caſtorium ex aceto muſſo. Mirum in modum autem effiac eſt, quod ex elaterio cōſtat, & oſtobolon applicatur. Elaterij aereo ſos ii. ſpumae niri obolos iii. ſinapis drach. i. haec in aqua diſuſa in octo cataportia infirmo: manetq; duo, tantundemq; uſperij exhibeo. Purgat enim clatra moleſtia ſupernē, aliquandū quidem permanēt & ſoluens. His uero qui robuſtiores ſunt, poſt triū dierū ſpatū rurlus exhibeo. Atqui quae ex colocynthide cōſtat hiera noſtra, hoc eſt, Archigenis, aſciduē praebita miſcorem ſpirandī difficultatē correxit ſapientē, atq; id breui & perfectē. Verū ſi magis in profundo haerit, auxiliatur cum aceto muſſo ſcillitico potata. Aliud ad difficulter ſpirantes, qui etiā aſthmatici appellantur. Ariſtolochiā dematitidis, abrotoni, ſulphuris uiui, ſeminis rutae agreſtis, cacuminū thymi, ammoniaci thymiamatis, & aequales partes cum aceto tritas in paſtillos redige, & ex eis obolos iii. exhibe cum aceto muſſo ad tridū. Alia re media aſthmaticis commoda, ex Aſclepiade & Dioſcoride. Ariſtolochia rotūda cū aqua bibita, antheoliſis auxiliatur: itē centaureae maioris radice, & minoris ſuccus: & ſtechas trita ac cum aqua potata, & ſphōdyli ſemen, & calaminthae montanae coma, & hyſſopū, & iris, ac melanthiū, & radícula & uitis albae, & aſellos, qui & millepedae appellatur, ſub aqua rio uafe ſtabulātes, ſextarij menſura in ſcille uas cōſectos, ad carbonē ignitis torrefacto, atq; ubi inalbuerint, terito, ac melle exceptos cocto, ante & poſt cibum duorum cochleariorū menſura delingendos exhibero. Aliud. Scillae crudae ſuccū exprime, & cum eiſdem meſurae melle permixtū ad prunas decoque, eiſq; cochlearia duo delingenda praebente & poſt cibum. Summē autem hoc prodeſt, etiā dēſq; eius rei periculum ſeci, inquit Archigenes.

Aliud, Archigenis. Radicis centaureae maioris drachmas vi. petroſelinī drach. vi. ammoniaci thymiamatis drach. iii. ſulphuris uiui, bituminis. cardamomi, radicis panacis, ſeminis urticae, iris illyricae, cuiuſque drachm. ii. thuris, myrrhae, caſtoſei, ni-

tri, lagapeni, abrotoni, poli, chamæpityos, ſaluae, cuiuſq; drachm. i. pipēris albi drac. iii. Haec omnia trita cum melle miſcuntur deſumpato, dantur ex hoc oboli iii. Etenim aſciduē potatum hoc, quibuſdam perfectē medetur, citra moleſtiā autē effiac exiſſit, dato hoc cum hydromelitis calidi cyathis iii.

Aliud, quo etiā ego utor, ad multos uſus cōmōdū. Scillam ſuſulam manū magnitudine ſua impletam, fermento obductam, in furnum conſicco, ut quā optime aſſcut, deinde ubi molliſſima facta fuerit, ſuperficie eiſus exuſta reſecta, reliquū optimē contero, atq; ei quantum trimembri ſeſtione facta, duae aſſatae ſcillae partes ponderant, tantum ſaringerui albi adijcio, & ammoniaci thymiamatis drach. iii. radicis panacis drac. iii. iris, & abrotoni, & acori, cuiuſq; drach. ii. pipēris grana xx. haec omnia ſi mul trita & unita in orbiculos digero pondere ſeſequiobolares: ex eis autem drach. i. aut etiā obolos tres, aut duos, cum tribus cyathis lactis aſinini recēs muſſi, aut aquae muſſae exhibeo. Pueris uero tantū unum orbiculum praebeo. Aluum hęc menſura mouet: quod ſi hac amplius quiddam exhibeas, & urinā cies, & cōpacta ac inſtante mali irritationē diſſolues: etenim & comitiales ſanae, & uulua ſtrāgularia, & lumborū languidos dolores, & febres debiles ac per circuitum repetentes. Cū aceto menſes ducit per craſiſtudinē ſuppreſſos, ad quos cōſequantur uertigines, interceptiones uocis, contraſtiones, dolores articuloſū, plēgretias, & ſpiradi difficultas. Eueſtigio enim ſanguinem euellit, & ab omnibus moleſtijs liberat: quare tenuitatem huius pharmacī ne contemnas, ſed abundantem uiriū eiſus ſupelle ſtilem, qua ſi per manus à maioribus traditam aſſumas. Alia potio ad ſuſpirioſos. Poli, abrotoni, caſtoſei, chamæpityos, ammoniaci thymiamatis, & aequales partes melle excipe, & ſabae magnitudine exhibe. Quidam ſpumae niri albi cochleare, in aquae muſſae cyathis tribus exhibuerūt. Auth hoc modo. Spumae niri drach. ix. pipēris drach. i. laſeris drachmā unā, ad cochleare cum aqua calida. Alia. Caſtoſei drac. vii. ammoniaci thymiamatis drac. vii. pipēris grana x. excipe paſſo, & ſabae magnitudine praebente in aqua muſſa. Alia. Abrotoni drach. ii. radicis bryoniae drach. vii. rutae hortēſis drac. vii. caſtoſei drachmas quatuor, artemiſiae drachmas iii. epithymi drach. iii. datur ex ea ſcrupulus unus & dimidiū cū aceti muſſi cyatho i. Alia. Iris drach. vii. ammoniaci thymiamatis drachmas iii. datur drach. i. cū hydromelitis cyathis tribus. Alia. Herbae ſabinae, his qui integra aetate conſiſtunt, ſcrup. vi. alijs uero ſcrup. iii. butyri ſcrupulos xii. mellis ſextatē. Praebe delingendam ad dies iii. & intermiſſione per triduum facta rurlus praeb. Paſtillos doloris leuamenti orthopnoicis & aegre ſpirantibus praebens. Opij drach. i. ſulphuris uiui, plāginiſis, ſeminis hyoſcyami, ſucci radicis dulcis, ſtyracis, myrrhae, thuris, terebinthinae, cuiuſq; drach. ii. croci drachm. i. cum uino maris experte contere, ac in paſtillos triū ſcrupulorum digere, quos bibendos exhibe. Porro ſi radicis dulcis ſuccus non addit, ipſam radicem fraſtam actuaſam ſatis diu decoquito, atq; hoc totū cum decocto eiſus committito. Alius, Andromachi, ad idem. Scillae aſſatae, ſulphuris uiui, bituminis, & aequales partes, melanthij drachmas ii. caſtoſei drach.

drach.ii.anisi obol.iiii.cum aqua pastillos informatrium aut quatuor scrupulorum: exhibe ante somnum, cū aquæ calidæ cyathis duobus. Catapodium, suspensiois dolorem leuans, Rutæ uiridis sextantem, styracis sextantem, terebinthinæ sextantem, opij drach.iiii. ex his catapodia siliquæ pondere singula informa, triaſq; ante somnum exhibe deuoranda, à sumptione autem ebibant aquæ calidæ cyathos duos. Remedium pulchrum Philagrij, ad anhelos. Radicum symphyti in petris nascentis, radicis centaureæ maioris, iridis illyrice, singulorum sextantem, aquæ sextariū i. radices fractas per bidentum in aqua macerato, deinde ad tertias decoquito, & percolato, & tantundem mellis decocto adiecto, rursumq; donec cogatur decoquito: deinde rhei pontici contusi ac cribrati unc.i. inspergito ac unito. Exhibe circa primam horam diei cochlearia duo. Quod si non adsit rheon, centaureæ maioris radicem contusam & cribratam uncæ pondere iniice, aut eodē modo radicem symphyti. Hocce pharmacum pulmonī & thoraci firmitatē & robur præbet, simulq; humores ad eū delatos repurgat, desiccāt, & expellit. Aliud, ad orthopnoicos. Boli armenicæ drach. i. cum uino diluto bibendum præbe. Ad tussis autē inde sequentes antidotum, Iosethū appellatam, paulo antē inter tussis remedia descriptam, exhibe. ante somnum nucis auellane magnitudine cū aqua mulsa. Alsidiuus enim huius antidoti usus in totum ab hac affectione liberat, etiam si fuerit inueterata: confidenter itaq; ea utaris. Quod si non adsit, pæoniæ antidotum præbeque ipsa quoq; si haberi non possit, eam quæ zopyrios appellatur, quarū descriptiones in Sermone De colicis habētur. Suffusiones etiā eis sunt cōmodissimæ: de his in tertio Sermone plenissimū dictum est, & paulo antē inter remedia tussis. In earum autem usu undiquaq; stragulis contegantur, atq; ore sedulo hiantes fumū foriter admittant: mucus enim & lacrymæ multæ spiritūq; uberatim ducuntur, & per uehementem tussim pūisita uiscosa ex profundo effertur. Verum quod latere te nolim, antequam ad eiusmodi rerum ac lacinatio num adhibitionem perueniat, uentrē subducere oportet, uel per clysterem, uel pharmacū solutiuū. Profunt etiā suspensiois fricationes pectoris, ex pumice cum nitro, fece uini usta, cum flore funi odorati. Cuius generis & hoc est, Auripigmenti, pumicis, spumæ nitrī, cuiusq; unc.i. alcyonij sextantē. hæc contusa & cribrata cum unguento aliquo calorifico commisceto, pectusq; & dorsum donec ignescat cōfricato, ex frequenti enim huiusmodi perscritionis adhibitione spirandi difficultatē & tussim, omnēq; purulentam pectoris affectionem propulsabis. Cæterū inueterato malo, & medicina omni frustra adhibita, ad uisionem confugiendū erit itaq; iuxta medium commissuræ clauicularum, utrinq; una crusta inuratur, cum cautione tamen ad motis manibus & disticta cure, ne aspera arteria oblādatur. Deinde aliæ duæ paruæ iuxta carotidas colli arterias infligendæ paululum sub mento utrinq; una, incumbentis cutis tantum perustione facta. Infligendæ autem adhuc aliæ duæ sub mammillas, inter tertiam ac quartam costam: rursumq; aliæ duæ retrorsum uersus inter quintam ac sextam costas. In medio etiam pectore unam inurere oportet: & iuxta principium osis pe

ctoris (quod à capitis gladij similitudine xiphoides Græcis appellatur) supra os ipsius uentris, unam similimodo. Et adhuc alias duas inter octauā & nonam costam utrinq; unam. Tres etiam retro inuren dæ sunt crustæ, una iuxta medium dorſi, reliquæ duæ ab utraq; uertebra rum parte, paululū infra mediam crustam. Omnes autem infra collum inustas, mediocriter latas esse cōuenit, neq; ualde in superſicie consistentes, neq; rursus nimium profundas. Vlcera autem crustarum factis multo tempore fluida permittere oportet.

De cordis tremoribus, Ex Galeno. Cap. LVIII. Cordis tremor siue palpitatio, multis tum adulescentibus, tū senibus inculpate sanis accidisse uisus est. Doleat aut caput ita affectū, citra aliquam alterā externā causam: atque omnes hi ex uenæ indictione opeserunt: aliqui etiam ex eis in totum ab hac affectione sunt liberati per extenuatiorā dietā & phar maca consimilia, post uenæ indictionem adhibita. Noui autem & ego quēdam, qui singulis annis, uentris tempore, tremoris accessione afflictebatur. Hunc ubi expertus essem per triennium ex uenæ sectione fuisse in quarto per uenę sectionē euasit, antequam hoc malo apprehenderetur: atque hoc modo pluribus deinceps si agebat annis, cōstanteā simul utēs diætā: ueruntamen & is quoque ante senectutem saluto functus est, quem admodum alij omnes. Aliqui quidem in febribus acutis comprehensim animo destituti, similiter mortui sunt: aliqui uero etiā citra animi deliquium, stuporis attoniti modo affecti, repente uitam cum morte commutarunt. Plures autē hac affectione laborantes ad ætatem peruenerunt, minorem quidem annis quinquaginta, quadragesimum tamen ætatis annum excellerunt.

De sanguinis reiectionibus, ex Galeno. Cap. LIX. Sanguis qui ex pectore & pulmone, aut aspera arteria educitur, omnino cum tussi reijctur. Si uero ex locis circa fauces, aut gurgulionem sanguis seratur, per ex creationes excernitur. Si uero ex aliquo loco oris aut ginguiarum, simpliciter expuitur. Aliquando autem à capite aut partibus gurguliois delatus sanguis, ad asperæ arteriæ extremum incidit, & tussim commouet, imaginationemq; facit uelut ex pectore educatur. Itaq; si quis pluribus ex ordine diebus sanguinē excreat & emungat, neq; capitis dolore, aut grauitate aliqua quæ etiānum adsit, accessus, neq; plaga istic illata: cōsiderare oportet diligenter omnē narum meatū, atq; etiam oris locū illum ubi nares ad palatum sunt perforatæ. Contingit enim aliquādo hæc accessio, hiru dine ad locum hunc affixa. Cæterū aliqui per uomitū citra tussim sanguinem ex uentre reieciunt, aut ex uenis adiacentibus in ipsum delatum, aut hiru dine deuorata. Verū sanguis uenarū ex hepate aut splene in uentrē delatus grumofus est, nigerq; uomitur: qui uero ex hiru dinis præsentia procedit, tenuis est, & sanofus siue ex uentrē, siue ex naribus, siue ex stomacho pferatur. Atqui & localis dolor qui cōcomitatur, affectam particulā ostēdet. Si em ex stomacho educitū fuerit, non magna sanguinis erupcio contingit: gradules enim sunt stomachi uenæ. Sed & cum nausea ac uomitu sanguis effertur, et in deglutendo mordacitas percipitur, maxime si adstringētia, aut acrida deglutiantur: si uero ex uentre educatur, nausea pluri

mæ comitantur & uomitus, & si à cibo sumpto educitio cōdngat, sanguis cibus permixtus efferetur. aliquando etiā pituita ac bilis simul uometur. Si uero ex hepate & splene sanguis in uentrē deferatur, aderit tumor. Si uero ex pectore & pulmone, aut aspera arteria sanguis expuatur, impossibile est cum citra tussim per sputum rejici. Fit autem sanguinis educitio ex pectore, aut ob uenæ rupturam, aut oris uenarum apertione, aut ob corrosione. Venarū itaq; pulmonis rupturæ cognoscuntur ex eo, quod post aliquam præcedentē causam manifestā, statim sanguinis educitio consequitur. Præcedentem autem causam dico, delapsionē ex alto, aut si grauius aliquod corpus pectori inciderit. Aliquibus autē ob clamorem magnum, quomodo cūq; editū uasis uenarum ruptura accidit; & citra manifestam externā causam copia sanguinis cum crudo ac statuo spiritu, distendens pulmonis uasa, rupturam efficit. Cæterum ob sanguinis multitudinem factæ rupturæ cognitio exhibet sanguinis effusio repente & coæruatim facta. Magna enim pulmonis uasa existūt, ac arteriarum speciem habentia; sanguis autē in eis tenuis & calidus est, perq; saltum spiritus ui ac impetu excernitur. De uenarum apertione. Venarū autem ora aperiantur, si quidem dispositiones præcellerint calidæ: ueluti si calidis balneis plurimis usus sit homo, habetq; in calida regione, consimili existente maximē anni tēpore, cibus quoq; et portio nibus calidis utatur. Etenim multitudine sanguinis calida existens, uenarum pulmoni incumbentiū ora aperit & dilatat, atq; hoc modo coæruata effusio contingit. De uenarum corrosione. Quibus uero ex corrosione uenarū pulmonis sanguinis euacuatio contingit, his per interualla modica sigillatim cum tussi expuitur. Ipsa autem uasorum corrosio ex acris bus contingit humoribus, siue à capite in pulmone delabentibus, seu in ipso pulmone generatis. Possibile est etiam propter corrosione, coæruatā sanguinis educationem cum tussi fieri. Quum enim præcedenti tempore per modica interualla sigillatim, ut dictum est, & cum tussi sanguinē expuerit quispā: & post sequentibus dieb. neq; casus, neq; alia quædā externa uolenta causa acciderit, & tamē sanguinis eruptio multa prodierit, magnā corrosione factam esse ostendit. Multi autem hoc modo affecti particulas pulmonis simul cum sanguine extulerūt, aut tectoria ulceribus obducta. Impossibile itaque est latere educationē propter corrosione uenarum factam. Quare diligenter animaduersionē habere conuenit, nūmne spumofus sit sanguis: nam & hoc firmissimum signum educationis ex pulmone existit: deinde nūmne bronchi particula quædam, aut tunica arteriæ seu uenæ simul efferatur. Horū em̄ nihil apparet in his, qui ex succingente thoracē membrana sanguinem spuēdo educūt. Maximum etiam signū elationis ex pulmone est, si omnino citra dolorem efferatur. De educatione sanguinis ex alijs pectoris partibus. Sanguis autem qui ex alijs pectoris partibus educitur, nigrior est, & iam in grumos coactus, cum tussi etiam & dolore rejicitur particula affectæ, ac foetidum odorē de se præbet: aliquid & pure ammixto efferitur. Verū hoc signum cōmune est. Si uero iuxta asperā arteriā ulceratio fiat, paucissimus sanguis expuitur, paucissimo omnino

pure permixtus, doloris autem sensum iuxta exulceratam arteriæ partem æger perceptat. De sanguinis à capite educatione. Si uero à capite sanguis deferatur, si quidē plurimus sit, plurima adest capitis grauitas aut dolor: si paucus, pauca, aurium sonitus iuxta proportionem affectionis, rubor faciei: uenæ frontis emicant, & uertiginis accedunt. causa autem ista præcedens manifesta est, nimirum plaga, aut frigiditas, aut calor, aut ebrietas. Vini enim potatio larga cumulatim caput replet, & cumulatim etiam ex rupto uenæ uase effundit. In parua autē ebrietate modicum adest sanguinis sputum, & consueta fieri per nares sanguinis excreatio cohibetur: aliquando etiam ad palatum conuersa, imaginationem exhibet, ueluti ex pectore sanguis ipse educatur. Si itaq; à capite sanguis deferatur, titillatio palati accidit, & frequēs excreatio, atq; hoc modo expuunt: irrlantur enim ad tussim, & tamē non ualde tussunt. Si autē à palato ad asperā arteriā destillat, tum tussunt, & quid delapsum est educunt: & ob id quidā decepti, ex pectore educationē fieri autumāt. Defluit autē aliquando à capite per gulam seu stomachum in uentrem, uomitusq; rejicitur, atq; ob id putatur à stomacho prodire. Habet autem & suam figuram sanguis à capite delapsus. Est em̄ nō adeo crassus, colore nigro, leuis, æqualis, immixtus, altero uidelicet aliquo pure uel pituita, & cū excreatione statim se in linguā infert rotundus, faciliq; rejicitur per sputum. Si uero palatum consideraeris, densius atq; uelut exulceratum ipsum inuenies, & ut plurimū sanguinolentū, ppter destillantē ad ipsum à capite sanguinē. Curatio autē his qui sanguinē à capite educunt, sufficit simplicior & exigua. Adstringentia enim per collutiones palato adhibita frigida sufficiunt: nā à calidis & rarefactibus collutionibus plus sanguinis eripit, quare signum id est adeo à capite proceduntis educationis. Si itaq; à capite feratur, multūq; sit quod defertur, euacuatione opus erit. Quare citius per nares, aut per uenā alicuius in sectionē euacuare oportet, ne per negligentiam consuetudo fiat sanguini in hos locos delabendi.

*Curatio eorum qui ob destillationem sanguinem expuunt.*

Cap. lxx.

Qui ob destillationē sanguinē expuunt, his uenā incidere oportet statim in principio, ac si simul clystere adhibito & euacuata alio: deinde confrictis quā plurimū manibus, brachijsq; ac cruribus per phararmacū calefactorium ac exrenuatorium, extremorum partes colliguntur, postea uero capiti raso phararmacum ex stercore syluestrium columbarū imponē, & post horarum trium interitium in balneo lauato: post uero capite mediocri pileo cōrecto forabitione multa ex solis austeris pomis connutrito: deinde dormire uolenti, theriacen Andromachi ex uisperis recens adparatam exhibito. Sequēt autē die omnibus corporis partibus, capite tātum excepto, confrictis in quiete adseruato, rursusq; in uesperā theriacen exhibito. Quod si ex his destillatio sistatur, tertia die mane mel parum coctū præbeto, quiescereq; finito, ac totū corpus defricato. In cibo exhibe pilanæ succū, modicūq; panē madefactum. Quarta autē die mane post acceptum ex uisperis phararmacū, rursus plurimū mellis præbeto, capiti simul phararmacum

maco ex stercore columbino imposito. Deinde lōdis & mediocriter nutritis, quinta die ea quæ humores qui in pulmonem defluerunt, uehementer resurgare queant exhibeto. Post uero per interualla ad caput curato ex thapsia apparato uariis. Vniuersam autem curationem renutriendo ac refocillando corpori destinatam impendito.

De his qui ob frigiditatem aëtorum respirationis sanguinem expuunt, ex Galeno. Caput LXI. Qui uero ob frigiditatem membrorum respirationis ruptis pulmonis uenis, sanguinem expuunt, his eue stigio uenâ secare cōuenit, secundaria facta detractio ne eadem die, & postridie similiter, uidelicet ut paulatim euacuationem faciamus, & ut ad contrarium diuersio fiat, quam antispasmi Græci appellāt. Eius enim gratia uenâ sectio adhibetur. Deinde fricatione extremarum parū, & ut dictum est, ligatione factâ, in uesperam ex seminibus pastillum exhibeto. Sequenti uero die post repetitâ sanguinis detractionem, uniuerso pectori ceratū ex thapsia imposito, quod in uesperam rursus ne ulterius quàm cōuenit calefaciat, detractio, atq; iterum pastillos ex seminibus dato. Tertia autem die ex thapsia ceratū ad horas circiter tres rursus imposito, hominemq; lauato. Cibū autem præbe primis diebus sobrietatem, tertia autē ad succum pilanæ, pisces qui facili cōcoquantur probeq; conditi sunt additante somnū etiā rursus pastillum ex seminibus exhibe. Nam & forum conciliat, & dolores leuat, & exccitat. Inflammatione autem ruptarum uenarum sedata, & partibus ad bonam temperiem redactis, ea quæ thoracē repurgant præbe, adhibito simul uisū theriacis ex uiperis apparatus. Deinde etiam lactis potu, alijsq; cibis utaris. Hoc modo sanē eos qui se mox eodem die medicandis exhibent, poteris curare, non tamē similiter qui post duos aut tres obueniunt dies. Alii quī enim eorū immedicabile ulcus habēt, maximē qui per uisiosos humores erosionē sunt passi. Quorum aliquibus sputum ipsū sanguinis aut muriaæ saporem exhibere referunt.

Curatio eorum qui iuxta alium quemcūq; tandem modum sanguinem ex pulmone reiectant. Cap. LXII. Difficilliorē autem curam ulcera in pulmone consistētia habent: conari itaq; oportet quædammodum nos fecimus, ita ut ægro præcipiamus, ne respiret ualde, & ut sileat semper. Incidere aut statim uenam oportet in cubito internam, ac sanguinis detractionē reitērare, bis, aut etiam ter, paulatim, gratia diuertēdi. Non enim euacuatione indigent tales, nimirum ab affectione ipsa euacuatī. Quapropter etiam fricationibus utantur, aut etiam totius corporis membrorum cum latis lintecolis constrictione. Posteaquā uero hæc exacta fuerint, primum quidē poscam dilutam & tepidam bibendam exhibere conuenit: ut si quis sanguinis grumus in uiscere hæreat, inde dissolutus eijs datur, neq; quicquam obstat, bis & ter in tribus horis hanc positionem iterare. Post hæc autē pharmaca inductoria & obstruendi meatus uisū habentia, simulq; adstringentia exhibeantur, aut ex posca diluta in prima sanē die, aut ex decocto malorū, aut baccarum myrti, aut alterius cuiusdam adstringentis. In uesperam uero rursus exhibendū est phar macum: abstineatq; eger ab omni cibo, si uisum uel bur addit minus, satis erit sobrietatem præbere.

Optimum autē est & secunda die rursus parum sanguinis detraxere ex eadem quæ prius incisa est cubiti uena, si modo uires ad id tolerandū sufficiant. Cuius etiam & pharmacis similiter utendū usque ad diem quartū, pectore in orbē madefacto, æstate quidem ex uino, oleoq; melino & rosaceo, hyeme uero ex unguento nardino. Si uero emplastris uti uelis, optimum pharmacum nostrum Barbarum appella tum habebis. Conducunt etiam reliqua ex bituminē, aceto & pice apparatus, & maxime quod ex salicibus, & quod ex lolijs cōstat. Maximū em hoc est, cui diligenter attendere animum oportet, ac mox facta uasorum ruptura inderemedium offerre incipere, quo cruentū adhuc uulnus cōcreseat, prius quā inflammationē apprehēdat: etenim si inflammatio præuenerit, partī spēs est ad huiusmodi uulneris cōglutinationem, quippe quæ se in multum tempus extēdit. Eluere enim oportet, tum pus, tum serosum sanguinem ipsius ulceris posteaquā inflammatio fuerit soluta: reliquam autē curam, quemadmodum ad tabidos fieri solet, ordinare. Ex Archigene. Porro si à stomacho aut uentre sanguinis reiectiones cum uomitu procedant, uena incidēda est in cubito superior, humeralis appellata, etiā si ex hepate in ipsū uentrem deferatur. Si uero à splene sanguis seratur, quod ex tumore circa splenem consistere cognoscēs, incisa uena quæ inter paruum & anularem digitum in sinistra manu est, probē ac propriē auxiliaberis. Cæterum & cibos & potus magis adstringētes dare conuenit his, qui ex uentre per uomitum, citra tussim sanguinem reiectant, non tamen uehementer & actu frigidos: Ex uehementi enim frigiditye plagæ inferuntur: Quare suffecerit, si nō calidi existāt, neq; nimiam humectationē inferāt: fontana igitur aqua, nō ualde frigida, neq; multa, in poru exhibeatur: Et cibi pauci similiter mediocriter frigidi, ac naturæ quoq; adstringentis.

Communes methodi exhibendorū auxiliorū in sanguinis reiectionis sanguinis speciebus post sanguinis inhibitionem. Cap. LXIII.

Ex Galeno. Primum periculū in reiectione sanguinis est, ne ultra modū eiuseuacuato fiat. Curatio autem post eius cohibitionem eiusmodi existit. Reiectionis quidem sanguinis quæ ob apertionem fit uenarum, per obturationē occlusionemq; dilatati oris ipsius uenæ curatur: quæ uero ob uenæ rupturam fit, per conglutinationem sanatur: quæ ob corrosiōnem, per renutritionem, & ea quæ carne implentur corrosa. Obturatur quidem dilatatum & apertū os uenæ ad adstringentibus. Conglutinatur aut rupta uena ab iisdem, & quæ cūq; in compositione eius amixta citra mordacitatem desiccant: ac glutinosum quiddā in se completū, uelut est lemnia terra, & quæ sanius aut appellatur, & his similia. Renutritur autem corrosum à cibis boni succi, & pharmacis carne explentibus, siue sarcoctis à Græcis appellatis. Conueniunt igitur adstringentia eis qui non tussunt, qui corpus boni succi habent, & qui ob apertionem oris uenarum, aut rupturam sanguinem reiectāt. Adstringit autem optime acetum, & portulaca comesta: succus autē eius bibitus efficacior existit: plantaginis succus cyathis tribus, aut sanguinarie succus eodem modo: Succus uuæ acerbæ in sole probē desiccatus drac. una, rhois aut gallæ decoctū



cyathi mensura, cortex glandis maxime castaneæ drachma i. radicis rubi decoctum mensura cyathorum trium, mora rubi, & flos balustiorum drachma i. acacia & hypocisthis eodẽ modo. Vinacea cochlearij mensura, similiter lapathi acuti semen. Efficacius autem operatur radicis althææ decoctum, radicis symphyti decoctum, atq; ipsa quoq; sicca trita posuit inspersa, centaureæ radicis drachmæ duæ, quas febricitantibus cum aqua, febre carentibus cum uino exhibebis. Lapidis hæmaritæ drachma una cū mali punicis succo, aut corallij lapidis eodem modo, radix equiseti. Mora ualde cruda & immatura. Forinsecus autem pectoris irrigatio adhibenda ex uino adstringente cū oleo rosaceo aut myrteo. Si uero multa sanguinis eruptio fiat, maxime in æstate, & citra tulsim eius reiectiones contingant, neq; debilis sit æger, sed robustus & carnosus: Acetū pro uino adhibendum est, non in sordidissimis amplius latis, sed spongijs exceptū, fasciâq; lata æger conuinciendus. Aliquando aut acaciā, aloē, aut omphacium acetō permiscere conuenit, & eutem ex oleo myrteo prillinare, ne mordacitas ex irrigatiōe succedat, aut etiam emplastrum Barbarum, aut ex salicibus, aut aliud simile impone. Quod si æger ferre nequeat ex irrigatiōe prouenientem iniucunditatem & molestiam, neq; toleret item emplastrorum incommoditatem, uisuiusmodi cataplasma est admodum: ex palmis uidelicet & acacia, alumine, malicorio in puluerem redactō, symphyto, polenta aut lendum farina apparatus. Si uero neq; cataplasmatum grauitate ferre queat, neq; calseri sustineat, illitionibus utēdū. Lori itaq; aut mespili corticem, & rhoēm culinarium, paucaq; rharni, aut sanguinariæ folia in acetō decoquito deinde in eo decocto aloēs succum, aut acaciæ, aut omphaci, paucumq; gummi diluito, & pectus ac dorsum ex eo illinito, atq; ubi exiccatū fuerit, rursus inungito, quo crassitudine accipiat illitio seu unguētum, & ne denudati frigore circueuantur. Illa uero hora qua arescit illitum, ab ægro multus aer est arcendus. Quod si inflammati succedentes febres inferant, solent enim uehemēter acutæ irruere & periculosæ, aliquādo etiam lenes & obtusæ, quum uidelicet in tabe sunt transiunt: tum omnīs ueluti in febribus est ordināda diæta: nō tamē acuatim, sed quiete & paulatim, ut ne rursus rumpanitur cōglutinata, abstinendum a uino & sorbitio nibus, ammissenda quæ leniter adstringunt, uelut sunt palmæ, & similia. Cataplasmate utendū pane calido, deinde semine lini. Vbi uero perseveret malum, omnia ut ad tabidos facienda. Exiccatoriā porō citra mordacitatē uim obtinet succus ocymin: qui si acetō cōmiscetur, cōuenientior fiet, & est quoq; nobis in usu familiaris, citraq; formidinē eū porrexeris. Adstringit autē & desiccāt simul rheon ponticum. Assumere autē oportet hanc ipsam pōticā radicē ad recētes ac inueteratas sanguinis reiectiones & ad pectoris fluxiones, in principio quidē ex posca decoctam. Si uero per circuitus redierit reiectionio, omnino parū quiddā bibēdū præbe cum aqua. Quum uero asperitas & tulsis molestia intulerint, passio cretio decoctā, deinde contritam præbe. Magis autē desiccāt arefacta in potum inspersa. Exiccat etiā citra mordacitatem famius aster, & minimum sinopicum, & terra lemnia bis in diē data drachmæ

pondere ex aqua. Citra mordacitatem etiam & præclare omnino desiccāt bolus armeniacus, ut nihil eo hac parte præstet: eius itaq; drach. i. exhibere potes cum aqua cōfidēt. Exiccat etiam coagulum hœdi, cerui uero magis inspisat. Quod si stomachus æger sit, semel exhibe quod adstringit, & semel quod desiccāt. Aliquando autem mane adstrictorij damus, circa sextam autem horā desiccatorium, in uespera uero qđ inspisat. Quando uero inspisantibus opus fuerit, amyllum deur, & gummi, ac tragacanthus, quodlibet per se, atq; etiam inuicē permixta. Simplicia ad sanguinem reijcentes pharmaca. Huius generis inspisantium uidelicet, est & gluten pisciū, & symphytum manducatum ac deuoratum. Cibos etiam eisdem cū prædictis pharmacis facultatis exhibere oportet, tum his qui propter apertionem uenarum, tum qui ex stomacho sanguinem reijciunt: nimirum adstringentes, uelut est halica ex posca, aut micæ panis eodem modo, aut oriza, oua mollia, rhoēm culinarium tenuissimè tritum infarctum habentia, plantago cocta, intubū, lens cū prædictis condita, aut lapidum acutum: in quibus uero inspisante materia magis opus est, lac coctū refrigeratur, datūq; tum ob corrosione, tum à stomacho sanguinē educitibus. Hi enim adstringente materia et carnis expletione opus habent: aliquid autē lacti cocto amyllum infarctum, ac modicum omnino coaguli. Cauere enim oportet immodicū eius usum, neq; statim post eius admixtionem lac ipsum exhibere, sed post aliquantulam dilationē: ualde enim in uentre concretum morrē inferre consuevit. Conducit etiam palmas cum halica decoquere, aut cum similiagine. Inspisant autē simulq; adstringūt oua crassiora rhoē infarcta, maxime si sint affata, lens cum pitana decocta, miliū coctum. Fugienda autē in omnibus uehemēter adstringentia, & excellenter inspisantia. Eligenda uero simpliciora & minus molestia ex uniuerso genere eorum quæ sunt prædicta. De cōpositis ad sanguinem reijcentes pharmacis, Gale ni. Iuxta primam quidē rationem ex adstringentibus & desiccantibus ac inspisantibus pharmaca cōponuntur ad curationem reiectionis sanguinis conuenientia. Quum uero adstrictorij, & tenacia ac desiccantia, uias præcludant, & difficulter per corpora digerantur, uī quadā opus habet præparante acaperiete eis uias ipsas, & ob hoc ipsam calida & tenuis partium eiusmodi pharmacis miscetur, quæ iuxta omnē ipsorum cōsiderationem cōtraria sunt sanguinis sistendæ reiectioni. Miscetur etiam eis fuporē inducentia, quo profundiorē somnum inducant: quæ sanē cōmodissima sunt his qui à tulle lancinantur omnibus, maxime tamē qui simul sanguinē reieciunt. Hi igitur scopi cōpositiōnis pharmacorū ad sanguinis reiectionē conuenientij: quæ uero per experientiam cognita sunt à prisclis medicis composita pharmaca, deinceps dicētur. Potio hæmoptoicis cōmoda. Lapidis corallij, terre famiæ quæ aster appellatur, succini, mastiches, cuiusq; drach. vi. amyli, thuris, gumis, cuiusq; drach. iiii. Exhibe cochlearium unum siccum cum posca, aut cum aliqua prædictarum decoctionum. Alia potio. Terræ famiæ asteris, lapidis agerati, terræ lemnia, æquales omnium partes accipe, & ex eis cochlearium unū præbe cum cyathis duobus decoctionis plataginis.

Alia. Terræ lemnix drachm. xvi. terræ asteris drach. viii. sarcocollæ drach. iiii. gummi drac. ii. præbe cochlearium cum decocti palmarum cyathis duobus. Sit autem decoctum ipsum crassum. Alia Andromachæ. Coralli torrefacti drac. i. thuris obol. iiii. acadæ drac. i. balauftiorum obolos v. gummis obol. ii. candidum ouorum daorū. Huius quartam partem cum aquæ cyatho uno & dimidio exhibe. Alia, Asclepiadæ. Radicis sanguinarix manipulum, radicis symphyti tantundem, rhois rubri acetabulum, aquæ sextarios iii. decoque ad tertias, & expressi, ac percolati liquoris cyathum unum præbe, & ad singulas exhibitiones gummis trid drach. i. conijce. Alia ualde præstans, cui testimonij præbeo. Thuris, terræ asteris, cuiusq; drac. viii. croci drach. i. amyli drac. i. succi plantaginis sicci drach. i. confusorum & cribratorum cochleare unū dato cū posca. Alia, per experientiam. Coralli drach. viii. thuris drach. viii. dato cochlearium cum uino myrtis diluto. Eadem etiam ad fluxum muliebrē efficac est. Pastillus ex electo. Prædare facit ad hæmopticos undecunq; sanguis efflatur, ad tussim ueterem & recentem, tabidos, cruenta reiectæres, supurationē pectoris, tormina intestinorum, uescicæ fluxiones, & ad inflatos: est etiam aurij affectionibus cōmodus. Psylli drachmas quadragintaquinq; ramentorum electri, iridis, mastiches, croci, cuiusq; drac. quatuor, opij drachmas quindecim. Psyllium in aquæ calidæ sextarios tres cōiectum, parumper macerato: atq; ubi uiscosum ac lubricum factum fuerit, liquorem inde exprimito, eoq; præscripta dilui terito, ac pastillos informato. Ex his obolos tres cubitum ituris exhibeto. Pastillus Dosithe, ualde celebrer. Virgultorum rubi sextantem, radicis symphyti, fructus spinæ ægyptiæ, succi hypocistidis, lycij, opij, thuris, rhei pontici, terræ asteris, singulorū sextantem, rhois culinarij quadrantem, rosarum siccarum drachmas quatuor, baccarum myrti quinque, croci, terræ lemnix, corticis qui macer appellatur, cuiusq; drachmas duas. Exiipe succo plantaginis, aut uino scybelite, & informa pastillos. Eos cum decocto symphyti aut sanguinarix exhibeto.

Alius pastillus, ex cuius usu magnam nominis famam sum adeptus. Terræ asteris quadrantem, amyli recentis quinquuncem, tragacanthi, sesquiciā, gummis quadrantem, glutinis piscium unc. i. acetiq; quantum suffecerit. Gluten more eorū qui arcus faciunt dissoluito, per triduum in sufficienti aceto maceratum, quarta deinde die exemptis ex eo pelliculis repurgatum paulatim tolle, & in mortario cum pistillo contunde, & quam diligentissime dissolue, aut super calidum cinerē pone. Difficiliter enim solubile existit. Vbi uerò solutum fuerit, rursus in aere aut ferro, aut, ut dictum est, cinere calido cum aceto decoque, & sufficienti tēpore assiduè agita, ut quàm crassissimum fiat, deinde in mortarium coniectum satis dū utere. Atque unumquodque prædictorū per se confusum ac cribratum in promptu habens, maxime tamen tragacanthum, in mortarium ad dissolutum gluten inferge, omniaq; diligenter unita uitreis lancibus solidis excipe, & exicca, pastillosq; informa mediocres. Durant autem aliquandiu donec formentur. Eos cum posca exhibe, & utere ualde confidenter. Pastillus ex Corallio, qui nunc

celebris & in usu apud omnes empiricos existit. Terræ asteris, balauftiorum, coralli, succi hypocistidis, acadæ, myrrhæ, rhei pontici, daudi, omphacij, tragacanthi cuiusq; undam unam, thuris sextantem, opij drachmas quatuor, amyli scrupu. sex. aluminis falsi scrupulos duodecim, terræ lemnix scrupu. vi. rhois rubri quadrantem, radicis dulcis sexuncem, symphyti radicis trientem, gummis scrup. xvi. croci scrupulos sex, fructus spinæ ægyptiæ drach. quatuor. Digere in pastillos cum succo plantaginis, aut uino austero uetere, & exhibe ante somnina in testinorum. Pastillus ex ægyptia spina, quo plurimum utor. Pharmacum Clidion appellatum, quod proptere omnibus sanguinem reiectibus conducit: itemque coeliacis, intestinorum torminibus, & stomachi fluxionibus. Cytinorum, fructus spinæ ægyptiæ, balauftiorum, acadæ, succi hypocistidis, singulorum drachmas sex, lycij, rhei pontici, opij, cuiusque drac. quatuor, myrrhæ drach. iiii.

Confusa & cribrata diligenter baccarum myrti, aut rosarum decocto excipito: aut uino myrtis, & in pastillos redigito, & iuxta cuiusque uires cum rosarum, aut baccarum myrti, aut pampinorum uitis, aut palmarum decocto exhibeto, aut cum frigida aqua. Quod si lycio non abundes, hoc modo apparere potes. Rhus, quæ coriorum tinctorum utuntur in quadrupla aquæ portione ad triduum maceratur, uirga frequenter agitata: quarta autem die decoquitur usque quod aqua ipsa rhois comam exæquet. Et tunc quidem rhus expressa abijctur: aqua uero percolata, donec in mellis spissitudinem cogatur decoquitur, atq; ita pharmacum additur. Quum uero bibendum præbes hoc prædictum pharmacum, spongiæ posca madaestas stomacho aut pectori imponere: atque ubi restiterit sanguis, pectus aut locos fluxione laborantes ex omphacio in aceto diluto & aliquid tantulum repaecto inunge. Conuenit etiam sanguinem reiectibus pastillus Philippi, qui in tractatu De intestinorum torminibus describitur. Potio ad sanguinem reiectantes. Succu saluix cyathos duos, mellis undam unam, exhibe sejunis in potu, & euestigio sanguinem sistes. Quæ grumos sanguinis concretos dissoluant. Sanguinem in grumos concretum lixiuium ex cinere fici, & uitis, & quercinum dissoluit, similiter etiam thymus & saturia, cum aceto. Coagulum leporis aut hœdi, ciceris magnitudine ex aceto: itaq; mox ubi quis ex alto ceciderit, ac sanguinem reiecerit, lixiuium per se bibendum exhibeto, aut cum modico aceto,

De aspera arterie ulceribus. Cap. LXIII. Quæcunque in aspera arteria ulcera sunt, iuxta pelliculam eam intus ambietem, & maxime prope eius extremum, aut in ipsa adeo arterie extremitate, fanabilla omnino existunt: Et nos non paucos hoc modo affectos curauimus. Reijciunt autem hi perspiru purulentia pauca ac cruenta, aliquando etiam tectoria quædam ulcri obducta, sensusq; doloris ab eis manifeste percipiunt iuxta ex ulceratum locum. Hos itaq; in quiete adseruare oportet supinos reclinatos, atq; ips quæ capiti subijciuntur sublimius intratis. Admonere etiam ut quantum possibile sit renitentur, & ne tussiant: Deinde forinsecus loco affecto desiccantia imponere. Veluti sunt Emplastra Barba

rum. Ex salicibus, & ex lolijis adpellata, ac eis similia. Pharmaca aut eis exhibenda sunt, quae supra ad ulcera inter arteriaca, & ad pectore suppuratos sunt descripta: Quae etiam sub lingua detinere conuenit, ut paulatim liquefacta in aspera arteria delabantur: tum uero maxime obniti, & non rursus. In potu autem exhibendum est lac quoddam recens multum ab adstante adhuc animali, adijcendum etiam mellis quidam his qui lac difficulter concoquunt, & quibus in calidi modum in uentre concreuit.

De pectore suppuratis, ex Archigene. Cap. LXV. Empyrici, hoc est, pectore suppurati uocantur, quibus abscessus in succingente costas intrinsecus membrana, aut in aliqua alia pectoris pellicula factus, aceruatim ruptus est, & in uacuum pectoris locum effusus inter pulmonem & membranam costas succingentem. Qui si non quam diuissime per spiritum reiectur, tabidi sunt, febricitant aut pectore suppurati indefinenter haecitent, hoc est, habitualement febre. Rumpuntur autem suppurationes, aliquae quidem sursum uersus, & liquae uero deorsum. Quae deorsum rumpuntur, in aluum & intestina, ac uescicam transfunduntur, per uasa quaedam transmissione ad ea membra facta. Quae cumque uero sursum rumpuntur, in uacuum uidelicet thoracis locum, periculosos flores existunt. Cognoscere autem suppuratos hoc modo. Quum lateris dolor praecesserit, deinde uehementes febres geuerint, & ex magna parte quoque dolor, grauitatis aut sensus remanserit intus in lateribus in profundo thoracis, simulque transfluere aliquid appareat, iuxta multiplices reclinacionis permutaciones, & maxime quum ab uno latere in alterum decumbunt, tunc sanè multitudine puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus saepe sensibilibiter in reclinacionibus ipsorum auditur. Cognoscitur itaque suppuratio facta tum ex praedictis, tum quod nihil relatu dignum per spiritum reiecturum in eo qui praecessit uehementi lateris dolore. Nouissimum autem quosdam circa febrem suppuratos, ex seroso aut pituitoso humore ex reliquo corpore in uacuum thoracis delapso, istiusque putrescente. Itaque quibus ex gymnasiarum exercitijs, aut ex casu aliquo saepe sensibilibiter conuulsio facta est, quae dolorem circa profundum thoracis inuolit. Nitrum, acetum, & oleum cyprinum consijciantur, his addatur rosamari nisi semen, Canchry appellatum, tunc probeque coctum, aut pyrethrum eius loco, seu staphis lyuestris: haec simul calefacta, deinde excolata ipsis locis ex lana succida repleti irrorentur, aut cum lana imponantur. Vtilis enim haec irrigatio existit, saepeque sola malum omnino discussit. In quibus aut inflammatio praecessit, ultra uenâ cubiti incidere oportet, si nihil phibeat, & mediocriter euacuare, ut alieuatio itaui aliqua contingat. Nutrire uero ex praeferantia succo & aqua mulsa, excretioni consulendo, & in quiete diligenter custodendo. Ad primum quidem ex oleo pingui irrigaciones lana coeoluta exceptae ac impositae conducunt. Quod si febris absit, passum etiam moderatum cum multo oleo commisceatur, lanaque succida excipiat. Haec enim irrigatio in his qui febre caret, usque ad tertiam sufficit diei. Si uero febris simul adsint, & ruptura consequatur ipsius puris, rutaceo, aut anetino oleo, scoriculorum flos cypri madescat. Aut quod magis ad haec re coeuenit, ipsi oleo incoquantur cum radice maluae. Conuenientius est autem oleum cyprinum, cum pissamētis apparatus.

Haec autem calefacta & lana molli excepta imponantur. Post haec autem cataplasmata adhibere conuenit ad febres quidem sedandas, ex pane in aqua multa decocto, uiridi apio, aut sceniculo, simul decoctis iniectione, aut apij aut sceniculi semine inperfo. Comodius autem ad haec butyrum pro oleo adijcitur. Deinde cataplasma quocumque ex semine lini adhibeatur: quod si maius ualuerit, etiam scenogracum addatur. Quod si frigiditas suppurationis causam praebuit, irionis etiam semen cataplasmatibus indatur. Tardatibus autem suppurationibus, ordeacea farinae carlicae costas addere oportet, & althaeae radicem, terebinthinamque resinae ac sterus columbinum. Fit etiam ad tardantes rupturas utile cataplasma ex solo stercore caprino, quod & collectione maturat et discutit. Optimum etiam discussorium est ex lolijis cataplasma, si bitumine permisceatur. Ablatis autem cataplasmatibus, ceatis affectae partes contegantur ex butyro apparatus, & habentibus quoque admixtam irin, parum de bacis lauri, & rutam. Etenim ad hoc quod a frigore tantum, adiuuant etiam reiectionem. Tempore reiectionis congruit emplastrum ex succis constans, & mnaeae, & simpliciora melina, postea uero icschij & quod ex lolijis apparatur. Si uero fluxus timor immineat, id quod Thraeae appellatur, erit aptum. Ego uero assidue eo quod ex syluestri cucumere constat utor, omnium enim efficacissimum existit. Praescriptum autem hoc est in anhelosorum tractatu. Aditu uero igitur oportet puris excretionem quocumque reperi cognoscatur. Quod si ad aluum proruperit, magis emollitientia sint ea quae offeruntur: si uero ad uescicam serpat, ea quae urinam magis cient adhibenda. Si uero per rursus puris repurgatio fiat, nihil conuenientius aut familiarius exhiberi potest quam praeferantia primo melle permixta. Caetera ea quae urinam cient, cibis comode ammiscantur, unde cum tandem puris excretio contingat. Comoda est etiam faba cocta in omni suppuratorio differentia exhibita, si ei parum ex feminibus erui maceratis, & duplici ex aqua decoctione dulcoratis adijciatur. Alij comestio quoque uilis ad repurgacionem existit. Inter potionum genera simplicissima est aqua multa cum iride & plurima radice dulci decocta, utilis est & radicis dulcis succus commanducatus, & cum ammixto scilicet peratus. Conuenit etiam hyssopum aqua multa decoctum. Edegrum autem prodest hoc, Nucum pinearum, tum quae pitydes, tum quae strobili appellatur, amygdalarum amararum, seminis lini, amyli recentis, aequales partes, mellis quantum suffecerit. Optimum autem est & piperis parum ac seminis irionis addere. Quod si tussis infestet, butyrum recens tepidum cum melle tepescitum delingendum praebet. Aliud edegrum, internos abscessus repurgans, ut etiam pelliculas maximas educat. Cardamomi drach. viii. sagapeni drach. iiii. myrrhae drach. iiii. opij drach. ii. castorei drach. ii. piperis drach. i. cum aqua in pastillos duorum obolorum podere redige, & cum aqua calida pastillum unum pro una uice exhibe. Thespiana ad internos abscessus. Seminis apij drach. iiii. opij drach. iiii. melanthij drach. iiii. castorei drach. ii. seminis dauid, iridis, sinapis, cuiusque drach. vii. ex parte melle cocto, & praebue nucis uellanae magnitudine ex aqua.

Edegrum ex eruo, suppuratis commodum. Erui madesfacti & inde torrefacti, decorticati, & in fari nam

nam redacti, drach. viii. nucum pinearum drachm. viii. amyli drach. vi. piperis drachmas v. succi rutæ drach. i. mellis cocti quantum suffecerit. Elegma magnum ex marrubio. Spicæ nardi, piperis, succi marrubij, cuiusq; unc. i. mellis libr. iii. uini ueteris dulcis libras ii. Succum cum uino & melle decoque, atq; ubi ea coacta fuerint, sicca cōfusa & tribrata insperge, ac simul unitis utere. Aliud. Amo mi sextantem, calicæ quadrantem, styracis calamitæ sesquiunciam, spicæ nardi sesquiunciam, croci unc. i. piperis unc. i. nasturtij drach. iiii. thuris drach. iiii. mellis libras iii. utere ut optimo. Antidotus Pan chrestus ab omnimoda utilitate appellata. Conducit, tursi antiquæ, suppuratis, orihopnoicis, tabidis, præcordiorum distensionibus, & omni inflatio ni. Mouet menses feminarum, & quæ ex abortu aut partu relinquuntur, secundas etiam ac partus educit, & uescicæ abolet affectiones. Terebinthina drachm. viii. styracis drach. vi. myrrhæ drach. v. croci, irisidis, galbani, cuiusq; drach. iiii. feminis hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti, opoponacis, cuiusque drach. i. piperis drach. i. spumæ niri drach. i. cū passo coque in passillos, ex quibus obolos ii. cum aquæ mullæ cyathis iii. præbe. Alia antidotus Aristarchi, Paulina appellata. Vim habet admirandā. Prodest rufiscentibus, reiectibus sanguinē, tabidis, suppuratis, pulmonis abscessibus, conuulsionibus, & rupturis ad stomachi subuersiones, bilis per uosmum ac fecellum eruptionem, coeliacos, dysentericos, uescicæ affectiones, ueteri strangulationes, et ad febres per circuitum repentes, una hora ante exacerbationē exhibita. Facit & ad malū habitum corporis, & ad eos qui alimentū nō sentiunt, ad extirpata pharmaca, & uenenatorū morsus. Habet autē hoc modo: Cinnamomi, costi, galbani, castorei, opij, piperis nigri & longi, styracis, singulorū unc. i. mellis sextarium i. Sicca contundito ac cribrato: galbanum aut cum modico melle decoquito ac excolato: deinde omnia simul unita in uase utreo reponito, ac subæ Aegyptij magnitudine exhibito cum aquæ mullæ cyathis duobus irrorato de pollice modico aceto. Vere etiam his quæ ad tabidos describemus. Exhibe quoq; confiderenter antidotum Isotheum appellatam, ad tussientes supra præscriptam. Licet hæc præonia appellata antidoto uti, quæ in Sermonē tertio & decimo cum alijs multi usus antidotis describeretur. Farinas quoq; apparare conuenit ex eruis albis madefactis primum, deinde rescicatis ac decortatis & mola tritis. Hæc enim farina & laici dū decoquitur adiicitur, ammixto etiā melle, et uehementer cōmoda redditur. Admiscetur etiam alijs sorbitionibus: & elegmata ad difficulter purulenta reijcipientes apparatus, ex hac conflunt. Commodum est autem & amygdalas amaras delibratas forbitionibus infarcire. Facilem autem puris reiectionem facit porrum capitatum cum forbitionibus decoctis, atq; etiam per se aquæ incoctum, & in cibo acceptum. In potu aqua offeratur probe cocta: si uero uino opus habeat, theræum detur, aut aliud dulce paucum. Ab aceto autem & omni alio uinoso genere, et ab aqua quoque frigida abstineant. Tempore uero quo cicatrix obducitur, uinum scyllinum utile est præpotatum, aut absinthites, & cenanthinum in uomentibus & purgatis per uescicam: hyssopites uero & scyllinū

his qui per tussim: pulegiatum, qui per aluū purgatur: maximè si nigricanda subeant una cum purulentis, aut grumosis quædam coactiones. Quoniam autem per interualla colligi solent & rūpi quoque suppurations, curam adhibere cōuenit ne post factam earum curationem recurrant: id fieri potest per laetis potationem, & hieræ ex colocynthide constantis purgaionem, post etiam dropaces locis adhibetur, & inlegmata seu exterioria acriora cutem rubefacere potest, & epithemata eiusdem usus, uelut est id quod ex euphorbio fit: item quod ex baccis lauri. Assumenda etiam arenæ ingestiones: & acrium ciborum comestio utilis eis existit per interstitia adhibita, maximè uero alliorum coctorum. Multos autem suppuratos post cicatricis obductionem illæ sos conseruauimus per salamentorum comestione. Alsidue etiam acetum mullum præbendum est, sit autem ex scylla apparatus, pectus quoque alsidue ex abrotini decocto repurgandum: item ex centaureæ & hyssopi alijsq; consimilibus decoctionibus frequenter potatis. Quod si sæpe puris collectio cōtingat, securus est crustas per cauteria pectori in orbem inurere: quemadmodum in anhelosis est prædictum.

## De peripneumoniciis.

Cap. lxxvi.

Peripneumonia inflammatio est pulmonis, cum febre acuta. Cōsequitur autem affectos thoracis grauitas absq; dolore. Quod si pellicule ipsius, quæ cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexæ, sint inflammatae, etiam dolorem percipiunt, & spirandi difficultas simul irruit, & surrecti sedere uolunt. Pulmo enim cordi incumbens suffocationem infert. Rubicunda eis est facies, & maximè malæ, nasus in summo fit limus, uenæ temporum eleuantur, prostratus est appetitus, respiratio calida, linguae sic citas, aquæ frigida, magis autem aeris frigidi cōcupiscentia, tussis sicca. Si uero quid effugerat, spumofum est ac biliosum, & aliquando eruentum & floridum uehementer, quod etiam pelsimæ significationis existit. & si quidem mortale malum fuerit, ulgillæ amplius aderunt, aut somni breues stuporem ac delirium inducentes: & imaginatione mentem uicissim perturbante non sentiunt ualde præsentia mala: extremitates frigida, ungues liuidi incuruati, quartana aut summū septima die hi moriuntur. Verū si ad salutem permittetur morbus, sanguinis eruptio ex naribus absideret sequitur, aut alui exturbatio multis ex euntibus biliosis & spumosis humoribus. Aliquando autē inflammatione in pus commutata, per uentrem aut urinam pus excernitur, statimq; ab omni molestia liberatur. Quod si in pulmonē irruerit acerratum, aut suffocatum, aut cū grauibas accessionibus in tabē permutat. Itaq; si nihil obstitit, statim uena secanda est in cubito, & si sustinuerint uires, ex utroq; brachio sanguis extrahendus. Primum quidē modicus & non usq; ad animi defectionē, ut uidelicet adseruetur ad repetendā detractionē. Si uero quid prohibeat fieri uenæ incisionem, acridi dyster subluere oportet ex decocto hyssopi, et colocynthide, & ruta melleq; ac oleo plurimo, iniecto etiā nitro ac sale. Eorū uero qb. uena incisa est, sedē illi in re oportet his q̄ status educit, & fecellum irritant: uelut est mel cū cymino & ruta, ac modico nitro. Post uniuersales aut euacuatiōes peripneumoniciis aqua

mulsa in potu exhibenda est, in qua decoctum sit hyssopum, aut iris sicca trita, mensura duorum cochlearium aquae mulsa inspergenda. Quod si suffocatio urgeat, etiam nitrum inspergere conuenit ad decoctionem hyssopi. Cibus sit extenuariotus, pitana cum origano aut hyssopo decocta, aut modico pipere trito ad eus succum insperso. Aliquando autem sal pro nitro conueniens est, prout expeditur, & sustinuerint vires. Porrum etiam capitatum bis coctum praebeatur, & halica cocta ex aqua mulsa: quae omnia inflationis sint expertia. Porus exiguus sit quantitate: humiditas enim noxia pulmonis existit. Sub lingua autem detinetur praebemel in pastillos redactum, cui in decoctione inspersa sint hyssopum & calamintha quam tenuissimè trita. Vt quoque conuenient eleganterque in pleuritidis describuntur: atque uniuersa dicta eorum quae ad peripneumonia conualescentiam, eadem sit quae pleuriticoe & suppuratorum. Pectus uero lanis cooperiatur cum oleo & nitro. Conuenient etiam cera roe coctere cum pectus, tum latera, ex oleo rutaceo, aut cyprino apparato, quod habeat simul iridem siccam tritam inspersam, aut epithemate ex cera, & terebinthina, medulla ceruina, oesypo liquido, butyro, & iride tenuissimè trita imponatur. Sint autem horum partes aequales.

De phthisicis seu tabidis, ex Galeno. Cap. LXVII.

Phthisis proprie est exulceratio pulmonis, ad sanguinis spuitiones consequens, quum uidelicet sanguinis eruptione suppressa, ulcus non fuerit coagulatum, neque cicatrix inducta consequitur etiam phthisis in suppuratis & peripneumonicis, aliquando etiam in adfectionibus pleuritidis, difficillimè autem curatur ulcera pulmonis, propterea quod citra ulsionem non resurguntur: tussientibus autem mutuo ulcus diripiuntur, ipsi quoque quasi per circulum reuolutum mala. In citatis namque a tussi inflammationis, altera rursus maturatione inflammatio opus habet, rursusque periculose per tussim pus repurgare necesse est: quare ex omnibus difficilis curatio ipsis subornatur, quod neque pharmacoerum vires ulcus pungere ualeat, prius quam in uentre permiscetur: & quod iuxta respirationes pulmo semper mouetur, & tussidè lacinat. Progressu uero temporis cartilagine quoque asperè in pulmone arteriae aduruntur: quod admodum in externis ulceribus ossa, quae scalpturam ad squammularum discessum ac deractionem non admittunt. Diuturna autem pulmonis ulcera etiam si aliquando curentur, callosas tamen & fistulosas reliquias posse in ipso pulmone relinquere, quae temporis progressu ex leui occasione facile refricantur: unde contingit aliquando & rectorii ulcers obduci, & modicas sanguinis guttas una cum alijs quae inde per sputum reiciuntur, effertur alio plane principio opus sit ad ulceris curationem. Notae autem quae ex sputo sumuntur, in tractatu de febris sunt praescriptae, nimirum quinto huius operis sermone: unde superfluum existimo hic de eis uerba facere. Medicari itaque pulmonis ulceribus oportet, quo apparatu quo facile sursum efferatur humores, cura simul adhibita ne alij congregentur. Itaque cataplasmata in principio assumentia sunt, ex semine lini & tenuissimo polline, cum decoctione scoenigregi & althaeae, oleo quoque & melle ammisceri possunt, etiam ipsis althaeae folia trita. Adhibeantur autem haec omnia statim post exacerbationum remissionem. Post

temporis deinde intercapedine, ad cerata transiendum ex butyro & oleo laurino ac cera apparatus. Repurgationis autem tempore, epithemate utendum est, ex terebinthina, & oleo cyprino, & butyro, & ex medulla ceruina, ac adipis taurino, iridis quoque farina, & oesypo, hoc est, lanæ succo de foridibus, aequalibus omnium partibus commixtis. Post etiam emplastro Mnaeae, aut aliquo ex simplicioribus mellinis utendum. Locis autem fluxione laborantibus, id quod ex salicibus constat adhibendum, quod etiam exiccationis tempore conueniens existit. Sicut & hoc quod ex syluestri cucumere apparatus supra ad anhelosos descriptum, & quod ex lolijs sit eodem modo. Ne autem cutis ipsa distendatur, primum locum ipsum inungito, atque ita glutinosa pharmaca imposito: sic enim facilius auellitur. Optimum autem ad eos malagma tempore quo cicatrix obducitur, hoc est, Cerae libr. i. picis lib. i. uisceris quercini unc. i. ammoniaci thymiamatis tritici, galli hyemalis, aluminis scissilis, acaciae, malicorij, seminis apij, rhois culinarij, cuiuscunque uncia i. olei myrtini aut rosacei trientem. In hyeme autem paulo plus. Sicque cum succis in aceto contere, liquefactis quoque eliquari possunt, & ab igne ablatis uiscum inijce: ad quod deinde liquefactum in cacabo etiam reliqua trita conijce, ac simul uncta in pilam transfunde, & emollitis utere. Inter pharmaca uero portabilia simplicissimum est aqua mulsa per se, & cum amylo, aut iride & radice dulci in ea decoctis. Omnium autem conuenientissimum phthisicis est lac asinum potatum: quod si non adsit, bubuli aut caprini, & ceteri crudi triti cum lacte potati, aut cocti in cibo sumpti, assidue iure eorum insuper absorpti. Conuenit etiam eis adeps ceruinus recens in sorbitionibus eliquatus. Quod si molesta tussis incubuerit, thymus tritus & hyssopum melle cocto excipiuntur, & sub lingua tenenda exhibentur. Congruit etiam butyrum recens cum mellis & terebinthinae aequalibus partibus decoctis. In his uero quae tolerare possunt, plus butyri accipiantur, si tamen recens existat: optime enim repurgat. De hac itaque mixtura cochlearium unum ieiunis detur. Bonum est etiam amygdalas amaras maxime cum pitana decoquere, & porrum capitatum cum pitana, aut altera sorbitione decoctum, aut etiam per se bis coctum accipere. Vinum autem thereum & scybelites praebeatur, mediocri tamen ualde mensura. Eclegma uero phthisicis congruum tale est. Mellis optimi libram unam, uuarum passarum pingulum exactarum sextariorum, croci, iridis, seminis hyoscyami, tragacanthi, cuiusque drach. iiii. styracis flauae unc. i. nucum pinearum drach. vi. amyli unc. i. Exhibe ex eo cochlearium ieiunis. Tragacanthus in uino dulci modo coquitur: styrax uero in pila dissoluitur reliquis coniectis ac permixtis. Aliud. Foeniculi succum cum pari melle decoquito, & ad sextarii mensuram croci drach. i. rhei pontici drach. ii. aliquando etiam hypodistidis drach. i. adijcto. Quod si iuxta asperam arteriam extremum asperitas adsit, conijce & radicis dulcis trita drach. ii. detur cochlearis mensura a cibo. Aliud. Scillam optime assato, eiusque medium siue medullam terito, & ad unam scellæ sex mellis partes conijcto, & ieiunis inde cochlearis exhibeto. Aliud eclegma celebre. Marrubij, hyssopi, iridis, radicis dulcis, pulegij, dictani, saluiae, caricariae, palmularum passiarum, ling. unc. i. crassius cotundito, ac in aquae sextarij tribus

tribus ad triduum madefacito: deinde ad tertias decoquito ac percolato, mellisq; libra 1. adiecta, rursus donec cogatur decoquito, & post farinæ orobi scrupulos x. terebinthinae unc. 1. amyli drac. 111. masti ches tritæ drac. 111. tragacanthi unc. 1. adijcto. Tragacanthi primū in modico decoctū madefactū conserito: deinde adiectis ei reliquis fectis, etiā ea quæ decocta sunt affundito, simulq; coactis uitior, exhibitio ieiunis cochleari. Licebit & anse fornū exhibere, experimento eius utilitas cognita est. Aliud, ad phthificos fluxioneq; thoracis laborantes. Seminis cucumeris facui desquamati drach. viii. amygdalarum delibratarū dra. 1111. seminis lini drach. 11. seminis papaueris albi drac. 11. Cōfusa & cribrata cū tragacanthi cremore cogito, & in pastillos digerito. Iuxta usum autē tolerantiam alijs drachmā 1. alijs obolos 11. præbeto: eis qui febre carent, cū uino dulci & myrti cremore: febrientibus uero, cū cremore solo. Aliud, quod & ad phthificos & suppuratos præclare facit. Farinā erui albi succo sillæ subactā exiccato: aut sillā assatam ac tritā, farinæq; erui subactā eodem modo exarescere finito. Vsu autem experiente, pastillos ipsos exiccatos contundito ac cribrato, mellisq; permixtos cochlearis mēsurā ieiunis dato. Optime em̄ repurgat. Aliud, multo usu cognitum, citra molestiam repurgās. Farinæ erui unc. 1. hyssopi quadrantē, seminis urticę quadrantē, iridis unc. 1. mellis quantum suffecerit. exhibe ieiunis cochleare, ac confideret utere. Aliud, experimento cognitū, quod ad phthificos & suppuratos facit: magis tamē frigidis tēperaturis cōducit, Iridis illyricę sextantē, farinæ erui albi sextantē, hyssopi, pulegij fumo nō siccati, seminis urticę, cuiusq; dra. viii. pi peris gran. x. 11. Excipe melle, ac præbe cochlearia 11. mane uino, alterū ad uesperā. Potes et catapota inde formare, atq; alternis dieb. exhibere. Aliud, phthificis, & tussis ueteri aptum. Cardamomi torrefacti drac. x. vi. thuris, galbani, iridis, piperis, cuiusq; dra. 1111. calisæ, croci, myrrhæ, cuiusq; dra. 111. opij drachmā 1. cōfundito ac cribrato: & cum aqua cyathis tribus, ac passu duobus, cochleare 1. aliquando etiam duo præbeto. Licebit etiā pastillos inde formare cū passo. Aliud copiarium, siue placenta, ad phthisin, ex edegmatum materia apparata. Ex amygdalis uidelicet amaris decoraticis, nucibus pineis recentibus, propter oleaginosum in eis saporē aqua præmacerasis: semine lini, amylo rectū hoc modo. Nucum pinearum quæ pityides appellantur sextantiū 1. seminis lini sextantiū quartā partē, amyli quintuncē, piperis drac. 1. mellis boni cocti & despumati quantum satis erit. In his qui caput quod facile obleditur habent, pityidas uitare oportet, proq; eis semē urticę cōijcere. Edegma ex orobis apparatū Dioscorij prætorij. Erui albi torrefacti & desquamati, ac triti unc. 1. costi trientem, croci sextantē, iridis unciā 1. nucum pinearū unc. 1. piperis grana 1. seminis lini, uuarum passerarum à uinacis depuratarum, terebinthinae, sing. unc. 1. butyri drachm. 1111. mellis quantum his cogendis satis erit. Summe hoc phthificis auxiliatur. Antidorus ex orobo, ualde celebris, ad phthificos suppuratos, & inueteratū tussim: optime repurgat, & cicatricem obducit. Amygdalarum amararum delibratarum sextantē, farinę erui trientē, hyssopi trientem, iridis trientem, amyli sex-

tantem, piperis, panacis radicis, & croci, cuiusq; scrupulos vi. succi omphacij exiccati drac. 1111. nucū pinearum torrefactarum sextantem, mellis despumati libr. 1. aceti undam 1. Farina erui in aceto per diem unum maceretur, postea simul coactis omnibus, ex eis cochleare unum ieiunis præbeatur. Alia antidotus ad phthificos, quæ etiā ad omnem tussim inueteratam conducit. Amygdalarum amararum decoraticarū sextantiem, seminis urticę torrefacti dra. 1111. succi radicis dulcis sicci, radicis symphyti, cuiusque sextantem, terræ asteris, nucum pinearū torrefactarum, seminis lini torrefacti, sesamii, uuarum passerarū à uinacis depuratarū, singu. sesquinciā, farinę erui albi sextantem, iridis unc. 1. terræ lemnis unc. 1. sapæ & mellis quantum suffecerit ad eorū coactionē. Exhibe ieiunis cochlearis mēsurā: aliquando etiā ante somnum, Vere & uaria ex capitibus papaueris cōpositiōne, supra ad destillatiōnes descripta, exhibēs ex ea ante somnum. Vere & his quæ ad suppuratos sunt descripta, itē arteriacis remedijs supra præscriptis conuenientissima etiam eis est cōfectio isothocis appellata, ad tussim descripta: & antidorus pæonia, quæ in Sermone x. 111. cum alijs multis utilitatis antidotis, est relata: ea confideret utaris. Prodest & Mithridatis cōfectio, & quæ Eisdæ inferibitur, miro modo itē ex uiperis theriace Andromachi, per interualla exhibita: quę omnes in tertio & decimo Sermone sunt descriptæ. Vltra opinionē autem efficacē est, bolus armenicus drachmæ pondere ex uino tenui albo. Catapocion phthificis ualde commodum & bonum, cui nullū cōparari potest: faciens ad omnē tussim inueteratam, & purulentas reiectiōnes: quod in tribus diebus utilitatē suam demonstrat. Styrcis flauī, piperis albi, myrrhæ troglodyticę, castorei, galbani puri, opij Achaici, aut Asiati, omnium æquales partes, cū galbano & styrace subigę, ac catapotia informā erui magnitudine, quorū tria aut v. ante somnū exhibe deuorāda: calida aqua insuper ad sorbendū data, & admirandam uim uidēbis. Porro diutius perseuerare malo, ac itā inueterato, cauteria ad mouere oportet, pectore in orbem insuto, quædam modum in suspirioforum prædiximus curatione.

De pleuritide siue laterum morbo. Cap. LXVIII. Pleuritidis exquisita & propria, inflāmatio est membrana interiuscūsc latera succingentis, dolorem punctiuum uehementer inferens cum acutissima febre. Cōsequitur hac affectus spirādī diffi cultas, & tussis aliquando quidem sicca, aliquando uero cū reiectiōne, ac primū quidē cruentorū: inflammatione uero matura facta, purulentorum, pusillus adeo durus, & secantis quippiam modo habens. Si itaq; dolor circa mammas innititur ac usq; ad clauiculam se extendit, citra dilationē cōfideret uena scādā est. Si uero deorsum ad præcordia uergat dolor, corpus purgādū. Quod si mediocris infestet dolor, & nō punctiuus: neq; adit tussis, neq; febris acuta, non opus est magna remedia adhibere. Clyster em̄ efficacior eis primū infunditur, deinde euacuatiōne aliquod ope ræprectū faciēte, adhibetur etiā irrigatiō ac somnatio lateris affecti: itē sacculi ex fursurib. et pulegio ac mēta impleti: et dicta ex tenuatoriū uim habēs. Archigēn. In his uero q; acuto morbo, ut diximus, infestatur, si qdē circa mamas ac clauiculā hæreat dolor, ue  
nam



nam incidere oportet, ut dictū est, in brachio, nō eo quod rectā ab inflammato latere procedit, sed opposito. Sanguinis autē multitudo extrahatur, nō uicq; ad animi deliquium, periculū enim ne in peripneumonia morbus permuratur: si quidē refrigerato ualde corpore, pulmo rarus & calidus existens lateriq; uicinis prōptē & facillime morbū susceperat. Itaque modicum extrahere oportet, & post sufficientē temporis intercapedinem, rursus repetita incisione modicum auferre. Quod si animi defectionem timeamus, uicq; in sequentē diem eius repetita ablatio deferenda erit. Deinde dyster aluo adhibeatur, si non ut cōueniē, feratur. Clysteri autem cōfidenter uti oportet ex oleo rutaceo, eliquatis in eo terebinthina & butyro: deinde forinsecus laus ex oleo calido fo uere, in quo ruta, anethū, flos cyperi decocta sunt. La nam item sulphuratam, aut ipsū sulphur inspersum habentem, adhibe calido oleo imbutā, ita ut insperso modico thymo trito imponatur, leniterq; ac pro uide colligetur, atq; hac sanē irrigatione utendū est ad tertiam usq; diem: quarta deinde cataplasma adhibeatur ex polline ac lini semine, melleq; ac oleo rutaceo: sitq; uehemētē leue ipsū cataplasma. Quod si liquidior relectio existat, farina etiam loli, & seminis trionis ammiscenda, aut focumgracū ac nitrum inspergendum. Si uero repurgamēto liquido prodeunte adhuc perseueret dolor, suppuratū fieri hominē spes est. Quare sinapi etiam in cataplasmatā commiscendum, & nasturtij semen, ac rosamarinij semen canchry appellatum, itemq; pyretrum: aut farinam loli, ceræ, & bituminū, cū oleo eliquatis permixtam impone. Cura etiam adhibenda est ut calida permaneant cataplasmata: quod hoc modo fieri potest. Oleo calido uescam bubulam semiplenā redde, eamq; frequētē cataplasmatā admoue. Post septimum autem diem, si eodem modo dolor persistat: cucurbita lateri affigenda est, & cutis scarificāda. Manifestissima em̄ in pleuriticis utilitas ex cucurbitulæ appositione apparet: uulnūscula autē scarificata lo cū sale aut nitro inspergēda, si quidē sustinere quēat: in alijs uero lintheolum oleo madefactū ac sale conspersum imponatur. Sequenti deinde à scarificatione die optimū est rursus cucurbitā affigere, quo sanguinis saniofus ex impactu uulnūsulis extrahatur. Hæc enim detractio priore cōmodior existit: non enim sanguis, sed sanies in secūda detractiōe auferitur. Tertia uero die post sanguinis detractiōē, ceratum cyprinum aut rutaceū tum pertuse cuti, tū uni uerso lateri imponendum: neq; unquam affectus loci nudus relinquendus: quod si permutati in pus humoris signa appareant, & non per exhalationem discutiantur, coadiuuare permutationem oportet, althæa & caridis in complexum cataplasmatum cōiectis. Post uero etiam epithematis utendum: relectio nis maxime tempore, huiusmodi mixtura apparet. Butyri, terebinthina, cœsypī, id est ex lanæ succidæ fordibus pharmaci, ceræ, medullæ ceruinæ, irisdis, omniū æquales partes consice, modico oleo cyprino aut rutaceo ammisce. Optimū est etiā sulphur tenuissimē tritū cerato liquefacto inspergere. Admirabiliter quoq; eis auxiliatur brasica: radix sicca, unā cum cauliculis exusta, cinere eius axungia ueteri sūilla sufficiente excepto, ita ut ne perfluat in corpus, ipsūq; inquinaet. Præclare enim discutit, & mi

tigat dolores. Probē etiā auxiliantur brasica, itēq; cupressi folia tenera trita, & cū axungia imposita, aut marrubij eodē modo, aut cinis sarmetorū, aut ficus pingues cū pari axungia cōmixta. Eundē usum præstat stercus caprinū cū axungia impositū. Aliud epithema, pleuriticis ualde cōmodum, Opopanax naci unc. i. foliorum rutæ sextantē, olei cyprini lib. i. ceræ sex uncē, terebinthina sexuncē, galbani sesquici unciam. Opopanax in oleo cyprino dissoluitur: galbanū autem cū rutæ solijs conteritur: quæ uero eliquari possunt, liquefunt, & refrigerata tritis ammiscuntur. Aliud, experimēto cognitū. Rutæ sextantē, sulphuris uiui unc. i. nitri sesquici uncia, adipsi sulfi tridentem, ceræ sexuncē, olei cyprini sexuncē, butyri, cœsypī liquidi utriusq; sextantē, terebinthina unc. unā. Aliud epithema ad pleuriticos, in quibus dolor diu perseuerat. Ceræ, resinae pini, picis, baccarū lauri decorticarū, singulorū lib. i. ammoniaci thymiamatis sexuncem, galbani tridentem, pyretri sextantē, æruginis unc. i. nitri sextantē, euphorbij unc. unā, alij tantum dimidiā accipiūt, olei laurini aut communis antiqui tridentē. Appara & utere. Rubescit cutem, & grauitatem leuiorem facit. Epithema scetidū, pleuriticis cōmodum. Resinae pini lib. unā, ceræ sexuncē, rutæ uiridis tridentem, olei cyprini sexuncem, sulphuris uiui, opopanax, sagapeni, galbani, cuiusq; drachm. iiii. De portionibus pleuriticorum. Portionibus suauiter pleuriticū in principio quidem aquæ mulsæ, in qua ruta est decocta, post etiam hyssopum, aut calamintina, aut organū, aut iris, aut radix aristolochiæ. Alia, euestigio auxilium. Radicis phu fasciculū in tribus aquæ sextarijs decoquito: & expresso liquore ad sextarium unum, mellis tridentem cōmisce, rursusq; decoquito, ac cyathos tres ante cibum exhibeto. Alia. Chamepityos manipulum in tribus aquæ sextarijs appara, & utere, ut dictum est. Alia. Stoechadis tenuissimē trita drac. i. exhibe ex aqua mulsā, aut si mili modo chamedryn, aut chamæpityos modo apparatam præbe in potu. Prodest & dracūculi radix cocta in cibo sumpta, aut ari radix eodē modo. Sub lingua uero tessillas ex melle cocto eliquantes deuorent. Eclegma autē eis conueniens hoc est. Eclegma ad pleuriticos. Seminis urticæ, seminis lini, nucum pinearum, amyli, singul. cyathum unum, amygdala amara decorticata x. v. piperis grana quinquaginta. Nuces pineas ac lini semen parūper torreto, dein de alia trita ac cribrata simul cum his melle depumato sufficienti ex cipito, et ieiunij cochleare unum exhibeto. Aliud. Butyrum recēs cum pari mellis mēsurā decoquito, ac inde cochleare præbeto. In pleuride uero diuturna exhibe seminis balsami drac. i. ex aqua mulsā, aut etiā gētanæ dra. i. radicis cētauræ maioris dr. ii. ex uino, aut radicis symphyti ex aqua mulsā. Quod si liquida & cruda reiecter, cōue nit hoc myrrhæ troglodytice dr. ii. croci dra. i. pipis gra. x. v. mellis depumati lib. i. cogito simul, ac inde cochleare dimidiū præbeto. Orisbasi antidotus ad pleuriticos & oēs pectoris fluxiones. Seminis rosamarinij, opopanax, sagapeni, castorij, anisi, seselis, cuiusque drac. vii. myrrhæ, opij, cuiusq; drac. iiii. bituminis dra. i. ii. & dimidiā, piperis drac. ii. thuris sesquidrach. Vere, araci magnitudine exhibēs cum hydromelitis cyathis iiii. Antidotus alia pleuriticis ualde

ualde commoda. Baccarū lauri dra, vii. seminis rutæ sylvestris drac. octo. aristolochiæ longæ dra. vi. myrrhæ drac. iiii. gentianæ drac. iiii. mellis despumati lib. i. Datur nucis pōicæ magnitudine, aut fabæ, aut arad. Prodest suppuratis, cōuulsis, itēq; ruptis. Cæterū & antidotus quæ ex quatuor rebus appellatur, præclare facit. habet autē hoc modo: Gentianæ, myrrhæ, aristolochiæ, baccarū lauri, æquales partes melis cōto excipe, & fabæ magnitudine præbe: his qui febre carēt ex uini cyathis iiii. febricitantibus uero cū aqua mulla. Efficax est ad conuulsiones, rupturas, orthopnoeā, tormina interaneorū, et morbū regiū, & eos qui uenenū hauserunt: resistit etiā serpētū uenenis potata: præstat idē & ad morsus locum imposita. Quidā eā mysteriū appellāt. Alia antidotus ad pleuriticos pharmacū accommodatum. Extrahit menses & partus, & quæ a partu relinquūt se cundas. Dīcānt, sagapeni, opoponacis, trifaginīs, cuiusq; drac. iiii. myrrhæ, seminis rutæ sylvestris, herbæ sabinae, comæ cetauræ minoris, piperis, cuiusq; dra. octo, radis gentianæ drac. vi. baccarū lauri dr. x. vi. aristolochiæ rotundæ drac. i. mellis despumati quātum cogendis his satis est. Datur nucis auellanae magnitudine cū hydromellis cyatho i. cibi porō pleuritici exhibendi sunt forbiles qui in principio uerē subducūt: uelut est pistana succus cū melle, citra salē aut alterius rei admistionē. Post hæc etiā nō colata integra pistana exhibēda: deinde micē quoq; ex aqua mulla. quōd si a melle abhorret æger, oleum optimum in principio pistanae affundens, decoquesq; simul capitātū porrum, deinde modico sale condies, et exhibebis. Remittente uero ac declinante iam malo in perosis aquis degentes pisces exhibendi, & colūbæ, omnisq; diæta tenuis cōstituēda. Alius autē assidue subducatur, in maximis præsertim doloribus: sed tamē cauendū ne fortiora solutua exhibeātur. Mastichen itaq; tenuissimē cōterito, et usq; scrupulis ix. cū cum aqua tepida, aut lacte teporis aqua præbeto. Soluitur em̄ a calida aluus. Vbi uero hanc potione obtuleris, amygdalæ amaræ decorticas x. in promptu habet: easq; tritas cum pauco melle delingendas præbe, aquā etiā calidam modicam insuper bibendam. Profectu autē ex his consequente, etiā cum subscripta Asclepiadæ hiera purgabis, quo omnes morbi reliquæ extergantur: quæ enim relinquuntur a morbis, reciduius facere cōsueuerūt: & non pura corpora quo plus nutries, eo amplius lædes. Hiera Asclepiadæ, quæ omnes abscessus in profunda corporis parte cōsistentes unā cum tuniculis ipsorum educit, phibitidis ac pleuritidis cōmoda: facit & ad eos qui assidue reuomunt cibū. Colocynthidis medullæ drac. x. x. i. marrubij, stoechasdis, trifaginīs, cuiusq; drac. x. iiii. myrrhæ, spicē nardij, piperis longij, florisunci odorati, cassiæ, cinnaomomi, cuiusq; drac. iiii. croci drac. iiii. radis cetauræ maioris drac. iiii. galbani drac. iiii. Excipe melis cōto, & pleuritidis duarum nucum ponticarum magnitudine exhibe ex aque mulla cyatho i. phibitidis uero & suppuratis unus tantum nucis magnitudine itidem ex aqua mulla.

De ea quæ pleuritis esse putatur, quum tamen non sit.

Cap. lxxviii.

Ex cruditatibus plurimis, & cibus humoris crassi ac pituitosis, ueluti sunt bulbi, ac fungi, & consimiles:

crudi humores uiscosiq; & tenaces in corpore generantur: qui aliquando repente se in uacuum thoracis locum ingerunt, aut in ipsum etiā pulmonem. Multitudine itaq; sua succingentem latera intrinsecus pelliculam distendentes inferunt dolores: ut imaginatio factæ inflammationis in expertis exhibeatur: quin etiā uas spiritus interceptantes uehementer spiradī difficultatē inducunt. Vnde quidā medicī errore seducti, uena cubiti incisā, multoq; sanguine euacuato, moris causam ægris præbuerunt. Quare interrogare oportet, num eo cuius mēdonē feci, uis sint cibo, diligenterque perdiscere formam ipsius respirationis, contingere etiā pulsus, & tactu explorare caloris qualitatem. Etenim in his non ob dolorem respiratio ueplurimum intercepti, sed quod uas spiritus sunt obturate, & respirationis forma uelut laqueo collo circumdato contingit. Superius autem serē in totum decumbunt semper, præ impotentiā etiam, neque probē loqui ualentes. Vt plurimum uero non febricitant: ita quando & frigidus solitot corpus eorum inuenitur. Quōd si febre afficiatur aliquando, debilissima ipsis febricula existit, minimēq; sunt siticulosi: & quod adhuc maximum signum est, pulsus difficulter mouetur, minimus & tardissimus præter solitum morem existens. Horū itaq; curatione suscepta, calefactiā, incisū, & repurgatiā intrinsecus & extrinsecus offeremus: & primum quidem a simplicioribus incipiemus. Clysteri ergo cōsuetō aluum a stercorebus repurgabimus: deinde etiam efficatori utemur ex decoctione calamintæ, aliquando centaureæ, mellēque plurimo, ac nitro et oleo. Colocynthin autem in his quod ualde a stomacho aduerter deuitanda. Post aliū euacuationem rutam & anethum in oleo decoquemus, & ex eis quā plurimum fouebimus affectos locos: lanas etiā oleo madefactas imponemus. In potu dabimus aquam mullam, in qua hyssopum, aut pulegium, iris, caricæ plurimæ sine decocta. Succum etiā pistanae tenuissimum exhibebimus cum melle, quo inde uenter leniter subducatur. Edema autem ipsis commodum huiusmodi est. Seminis urticæ, hyssopi, iridis, nucum pinearum, amygdalarū amararum, singulorū æquales partes, modico pipere adiecto, optimo melle despumato excipe, ac inde ad summum cochlearium unū ieiunis præbe: deinde interstitio facto, exhibe aquā mullam, ut dictū est, ac post horas duas succum pistanae: tertia deinde die ex farina ordeī, ac semine lini, multoq; foenogracocataplasmā imponatur: adiciamus etiā sinapi tritum, & lauri baccas, ac parum nitri, & ex liquidis oleum rutaceum, quo cyprinū, aut anethinū. Apparandum autē est eo modo, ut thoracem & costas cōprehendat. Ablato autem cataplasmate, thoracera to ex butyro & terebinthina, cōsyposq; liquido, et cera, taurino adipe, ac iride, æqualibus portioibus acceptis contegatur. Aliquando etiam ex medulla, ceruina & oleo cyprini. Sulphur quoque uiuum cera to liquefacto infarciendum. Stomacho uero lanam conuolutam, unguetō nardino ac modico uino madefactam imponemus, eiq; incumbere semper sine mora. In his uero quibus suffocatonis periculum imminet, uomitorijs ad anginam descriptis confideter utemur, & maxime eo quod ex elaterio, sinapi ac nitro constat, primum quidem ipsum cū oleo &

pauco melle quàm penitissimè illinendo: deinde etiam bibendum, quemadmodum illic diximus exhibebimus. Absidue etiam aquam mulsam absorbere præbebimus, in qua hyssopum est decoctum. Porro humoribus dissolutis reiectare eos incipiet, & tussis in eis augetur: quare antidotum isorheum appellatum, tunc eis ante somnum exhibebimus, nuda auellane magnitudine ex aqua mulla. Sontum enim dulcem infert, & humores quo facile sursum efferantur præparat, ac tussim sedat, doloresque dissipat. Est autem supra ad tussim descripta. Quando uero etiam uenter eis non bene excernit, mastiche tenuissimè trita scrupulorum nouè pondere cum aqua repida, aut lactei teporis bibenda offeratur, deinde amygdalæ amaræ decoratæ tritæ ex melle præbeantur delingendæ, & aqua calida post eorum summationem absorbenda. Feliciter autem procedente curatione, & columbarum pullos in cibo offeremus,

cum porro capitato cocto, anetho, & oleo, modico sale & pipere adiecto. Vinum bibant fuluum, uetus, mediocri mensura. Atqui eclegma prædictum ex semine uidelicet urticæ quotidie ieiunis præbebitur. Ante somnum uero isorheum antidotum alterius aut singulis diebus, donec ab omnibus molestiis ægri liberentur. Ceratum autem quod pectori adhibetur, singulis diebus renouetur. Et si quidem uenter adstrictus sit, mastiche cum amygdalis & melle præbeat. Eclegma Galeni, ad diuturnum pectoris dolorem citra febrem. Fœnumgræcum aqua macerato, deinde decoquito, & prima aqua diffusa, & palmarum pinguium carne adiecta rursus coquito, ac exprimito succum: quem deinde melle largius permixtum rursus ad prunas decoquito, donec ad medicorem spissitudinem redigatur: & ex hoc multo ante reliquum cibum tempore delingendum exhibeto.

## OCTAVI SERMONIS AETII

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

NONO SERMONE AETII

HABENTVR.

- D**E cardiacis. Cap. I. bimodo conuelluntur. cap. XVIII.  
De his quibus atra bile stomachus Viridis iaspidis usus. cap. XIX.  
infectatur. cap. II. De appetitus perditione. cap. XX.  
Ad eos qui flaua bile euomunt. cap. III. De appetitu canino. cap. XXI.  
Ad eos qui stomacho exuruntur, & sititulosi sunt. cap. II. De appetitu canino, qui ex immodica transpiratione, ac cutis exolutione contingit. cap. XXII.  
De singultu. cap. V. De uitioso appetitu. cap. XXIII.  
De bulimo, hoc est, ingenti fame. ca. VI. De cruditate, Galeni. cap. XXIII.  
De animi deliquio, ex Philumeno. cap. VII. De crapula, Philumeni. cap. XXV.  
De his, qui in balneo animo linguuntur. cap. VIII. Quæ cura alio adstrictæ exhibeda, ex Galeno. cap. XXVI.  
De stomachi imbecillitate, & supinitate, ac subuersione, ex Gale. cap. IX. De inflatione, Galeni. cap. XXVII.  
De nausea, ex Galeno. cap. X. De uolulo, Archigenis. cap. XXVIII.  
Cataplasma ex epithematis ad nauseas & uomitus. cap. XI. De his qui ab acri humore coli dolore infestantur, Galeni. cap. XXIX.  
De cholera seu bilis effusione. cap. XII. De his qui à frigidis & pituitosis humoribus, coli dolore infestantur. cap. XXX.  
De stomachi adstrictione. cap. XIII. Pharmaca ad colicos. cap. XXXI.  
De humoribus à capite in uentrem de stillantibus. cap. XIII. De antidotis dolorem leuantibus, insusisq; colicis accomodatis. ca. XXXII.  
Dieta conueniens his qui stomachum habent dissolutum, alium autem adstrictum. cap. XIV. Quæ colicis infundatur, & per anum subdantur. cap. XXXIII.  
De stomachi inflammatione. cap. XV. Cataplasma colicum, ex libris Seueri. cap. XXXIII.  
De stomacho exulcerato. cap. XVI. Quomodo alium fluxione laborantem curare oporteat, ex libris Philumeni. cap. XXXV.  
Cura eorum qui ex debilitate, alui fluxione laborant, ex Gal. ca. XXXVI.  
De celiaca affectione, Archigenis. cap. XXXVII.  
De colliuatione. cap. XXXVIII.  
De lubricis, ex Herodoto. ca. XXXIX.  
De lato lumbrico. cap. XL.  
De ascaridibus. cap. XLI.  
De abscessu in intestinis. cap. XLII.  
De dysenteria, hoc est, torminibus in testinorum. cap. XLIII.  
De tenasmi cura. cap. XLIII.  
Cura dysentericorum. cap. XLV.  
Cura eorum qui aurum aut es, aut tale quippiam deglutiuerunt. cap. XLVI.  
Communia remedia dysentericorum, quæ supernè exhibentur. caput XLVII.  
Composita pharmaca, quæ supernè exhibentur. cap. XLVIII.  
Quæ infernè dysentericis infundantur. cap. XLIX.  
Epithemata dysenterica. cap. L.  
De lenteria. cap. LI.

# AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE MEDI- CINAE TETRABIBLI TERTIAE

SERMO PRIMVS, ET EX  
ORDINE NONVS.

\*

*De stomachi, alui, ac interaneorum affectionibus.*

*De cardiis.*

Cap. 1.



**Q**VOMODO eos, qui cardiaci appellantur, curare oportet, aut eos etiā qui aliter ob stomachi afflictionem animo inquietur, iam absolutissimè prædictū est in quinto huius tractationis sermone, ubi ad febrium curā hæc annexuimus. Nunc uero quum affectionē stomachi ac alui remedia opportunè ex ordine describemus, necessariū uisum est & hic paucis eorū mentionem facere. Cognoscemus igitur eos qui cardiaci dicuntur, quum acuta febri & maxime æstuosa affliguntur hoc modo. Pulsus si inueniorem densum & obscurum, & extremarū partium frigiditatē, sudores circa faciē & ad pectus usq; glutinosos, & odorem corporis terrestrem nares percellentem, & pulsus circa ipsum cor uehemētes & magnos, & ad hæc accedant desperatio, angor animi, & corporis iactatio. Hoc modo affectum, cardiacū esse dico. Os uero uetris primū est quod in ipsis afficitur, per consensum uehementer obledet cor ipsum, propter uicinitatē. Porro ueteres os uentris cordis appellatione Cardian uocant, ab accessionibus nimirum quæ ex eo accidunt & inferuntur. Aeris itaq; frigidi admisionē & uentilatione eis auxiliari oportet. Spōgia igitur ex posca frigida imbuta, facies permalescat, & aqua lactei teporis paulatim absorbēda præbeat. Odoramenta autē uaria offerantur, malum cotoneū, pulegium, cucumer, & similia. Stragula eis incubentia tollantur: operimenta uero quibus cōteguntur, mollia sint, & usu priore detrita: pauimentū irroretur, ac folijs confternatur myrti, platani, ac quercus, maximè uero uitis atq; ipsis etiā rosīs. Solē autē domus in qua decumbit nō admittat, sitq; minimè alta, sed depressior, et nō ualde lucida. Exundantibus uero paribus myrtus siccā trita inspergatur, aut cīsmolia, aut cenanthe, aut ordei: imprimis uero collos & thoracē, & locis sub alis ac inguinibus ea sunt adhibenda. Eodē modo auxiliariū malicorum cū manna inspersum: aut galla per se, & cū sulphure uiuo, aut famia terra admixtum habēs gummi. Illinūtur etiā ad cōterendos sudores, oleū myrteum, cōnathinū, rosacē, melinum, & lentissimum. Circūlita autem sudores cohibēt, manna & amyllum cādido ouī excepta, aut bulbis albus, & piper, ac urtica semē, et gūmi, modico cerato myrteo excepta, aut ouī candido subacta, quæ sanè crassius inungere conuenit: ad glutinantur em & exarescunt, & possīma in eis spes cōsistit naturalis caloris reexuscitandi. Neq; uero pinguescat: cui huiusmodi inunctiones sunt adhibendæ: uerū lineolo probè prius extersæ inūgātur. neq; mox ubi calor apparere incipit, auferātur, sed postq; sufficīet extremæ corporis partes fuerint cōcalescēt, quod ubi cōiugerit statim tollātur, et tho-

rax cooperiatur, atq; scibituarosum quippī aut ucerosum ex inunctionis adustioē circa thoracē appareat, blādē tractetur, ac aliquo ex his q̄ ad ambustos ab igne descripta sunt, pharmaco locus curetur, maxime uero cōueniet id q̄ ex ordeo cōstat. Extremæ uero corporis partes, siue ad genua usq; & cubitos, siue usq; ad locū sub alis & inguina sint refrigeratæ, fece usita & sulphure uiuo cōspērgendæ, aut pyretro, aut piperidē, aut bulbis tritiscū piperē illinēdē à brachijs usq; ad digitos, & à femore usq; ad extremos pedes, gracilibus lintheolis simul circūpositis. Idē præstat sinapi & pyretri, ac adare. Porro mollibus corporib; sufficit aliquando oleū sicyoniū aut gleucinū illitū, cū multa fricatione ac cōcalescētiōe partū extremarū: quanq̄ nihil ueter piperis ac ceræ modicū his ammiscere, quo spissiora fiat, & melius adhærescant. Fasciculus quoq; ex lana pura in oleo calido madesactus incutiat semp̄ circa uescicæ regionē. Capitis somētia frigida sint, qualia ad phreniticos sunt descripta: frōs spōgia ne madescat, sed ex acacia, galla, terra samia, ac syluestris puncti flore illinatur. Optime facit etiā omphaciū, & gūmi, uerū unūquodque eorū ex rosarū decocto aut succo, aut aliquo cōsimili diluatur prius, & deinde illinatur. Quod si quis sanitaris tēpore nimis repleus existat, & stercora antiqua recto intestino infidēat, tūc sanè clysteri simpliciore euacuare oportet: ex succo pitifanē, et modico melle, paucissimoq; sale, & oleo quoq; modico ad iectō. Illinenda est etiā singulis dieb; sedes ipsa ex cumino, ruta cīnro, cū modico melle cōmixtis, ob inflationū uidelicet educationē. Si uero nulla stercora in intestino recto subidēat: neq; aliās etiā extremētori multitudine inflit intestinis: ægrī autē cibū nō sentiat & tabescat, pitifanē succū aut halicē p̄ clysteri in fundere oportet tepesactū, cōqualiato cū eo ouo crudo. Ultra hoc em̄ quod ex q̄ stomachi inferne molestia afficitur, euocat et educit, etiā alimētū optime corpori sufficit ex lāguore ob nō acceptū cibū misere asfecto. Auxiliariū itē cardiacis cataplasmatīs modo, stomacho, ac sinistræ māmæ imposita, solia rubi cū pane, aut myrti folia, ipsaq; myrti bacce, aut pāpni uitis, aut platago cū pane, aut mala coronæ & palmæ, aut intubuscato exceptus. Imbecillioribus ponēnam cum palmis imponere sufficet, aut palmas uiuo madesactas uncia unius mēsurā contere, deinde cōfictis aloēs drachmis quatuor, mastichēs drac. iiii, simul tere, & affuso eliquatæ ceræ sextate, & olei, si quidem hyems sit, neq; multus calorīs sensus ægrum cōtingat, nardinū in æstate uero rosacē, aut melini triente simul misce, ac utere eodem modo. Quod si ex uisceribus quoddā inflammatum sit, panē cū modico uiuo et melle decoctū impone, admixtis in his qui imbecilliores sunt malis repurgatis, aut cōnathē. Reprimūt autem sudores stomachumq; & cor ipsum firmitatis autorem placat ac cohibet ca-

z

taplasma

cataplasma ex palmis, & oenanthe, & acacia, rosas, alu-  
mine, hypocisthidae & rhoë rubro: ita imposiū ut si  
nistra māmā atq; ipsū ventrē cōplectatur: sit e-  
tiā tactu molle & leue, ac assidue permuteetur. Reuo-  
cato autē ex accessione ægro, si lod quidā circa præ-  
cordia sint inflāmāti, puiderē oportet ut per cōmu-  
nia cataplasmata ab inflāmātiōe liberentur. Cibi of-  
ferēdi, panis ex aqua frigida, aut ex uino albo & te-  
nui frigidō: ac diluto: pedes suilli, talīq; & rostra:  
ex uolueribus macrā, & nō fetidā, in putanē deco-  
ctione eliquatā, aut etiā per se. Frigida autē hæc ex-  
hibeantur, si caloris sensus circa stomachū sit, et eger  
inflāmationē nō uexetur. Alijs calida exhibendā, si-  
militer autē & potus calidus dādus, uinū tenue, al-  
bum, dilutū: immodicā autem uini exhibitū mul-  
titudinem pulsus ægroti offendet. Eo usque enim  
exhibendum est uinum, donec pulsus subremulus  
esse desinat, & robustior fiat.

De his quibus atra bile stomachus infestatur. Cap. II.

Ex Herodoto. Quibus stomachus ab atra bile in febrī  
bus uexatur, similes accessiones cardias patiūtur.  
Accedūt autē ad hæc, fortis stomachi morsus, cū eius  
exolutione, & capitis uerigine, ac frigido sudore,  
paruusq; & obscurus adest pulsus. pgressu uero tē-  
poris augetur morsus, atq; hinc in dolorē q̄ difficul-  
ter leniri potest, trāsit. Ceterū manifeste apparet si  
uæ bilis uomitus has accessiōes leuiore reddit, atq;  
aut bilis soluit. Vomūt autē ferē in totū hoc modo  
affectū pituitā addā in ventre coaceruatā ex assidua  
cruditate, propter utrūq; ipsius debilitatē. Qui uero  
circa febrē ab atra bile stomacho infestatur, his acce-  
dit tēpore quo humor ipse generatur et producitur,  
tristitia, & somnus cū accessione imaginatiōnū alie-  
narū, contractioq; & dolor poplitū ac furarum. A-  
cutius quā antē consueuerunt, cernūt, & deiectum  
habent appetitum: ructus autē & excreatiōes forti-  
das & pisces olētes. Coaceruata uero bile cū multa  
desperatione intolerabili ter ignescunt, ut omnia eis  
membra ardere uideantur: in primis autē stomachus ue-  
lur à palis igne candefactis pūgatur, afficitur. Sudor  
sens animi deliquiū inducens per omne corpus de-  
stillat, & ferē semper sputi influētis reiectione uexā-  
tur, quum morsum fenciūt, multamq; habēt uomen-  
di cupiditatē. Et aliquādo quidem frustra lācīnātur,  
quādoq; aut pauca quædā biliosa aut acidā pituitā,  
quæ in utrē defluxerūt euomūt, modicoq; tēpore  
à malo leuati, rursus idē patiūtur, atq; in uniuersum  
his qui ueraturū sumpterūt similes existūt. Pulsus au-  
tē aliquādo densiores, aliquādo etiā rariores & mi-  
nores sunt, plurimum uigiles permanēt, & si qui-  
dē dormierint cū perturbatione æstuosiores exur-  
gūt, ebulliente ut uerisimile est delato in utrē hu-  
more. Saepē etiā acceptū cibū unā cū atræ bilis hu-  
more euomūt: ferē in totū eū post duas ab accepto  
cibo horas accessione apprahēdiūt, maxime quā  
acrē aliquē aut salsum cibū aut potū ingesserūt. Ex-  
cremēta alui retinētur, aut preter naturā incocta ex-  
cernuntur. Effertur autē aliquādo & bilis inferne per  
alium, atq; adiuuat affectionis declinatōē. Aliq;  
autē ob rectā bilē, etiam atræ bilis affectionibus, &  
delyrijs mētē alienantibus sunt apprehēsi. Quod si  
contingat, siue febris adsit, siue nō, si quidē iuuenes  
sint, sanguineq; abundet, & reliqui numeri ad uenę  
insectionē requisiti adsint, uena secanda est, repetita

sanguinis detractiōe, & hoc tamē per infusum dly-  
steris, corpore prius euacuato. Atqui ad animi usq;  
deliquiū id facere nō oportet, ppter stomachi im-  
becillitatē. Colligādā autē adstrictæ ac tremæ corpo-  
ris partes, & ad paucum cibū ægri cogendi, stoma-  
chus uero lanis luccidis fouendus est ex aceto pluri-  
mo, modicoq; rosaceo, aut melino, aut lentiscino.  
Quod si amplius permaneat stomachi imbecillitas,  
ex rosarū succo foueantur, siue intubi aut portulacę  
cum rosaceo: adstringētia etiā & lenitiua cataplasma-  
ta imponantur. Qui uero unā cū morfu circa utrē  
ac intestina inflantur, ijs cōueniētissimū est acre ace-  
tū, in quo pulegiū est decoctū, & cuminiū calidum  
forinsecus uentri per spongiam imposiūt. Dolo-  
re uero perseuerante, aluē liquidū cum atramētō suto-  
rio trito, & aloë melle excepta imposito, & alumi-  
ne in aceto coniecto & calefacto, stomachū per spō-  
gas foueto, aut aluminis ac aloës æquales partes ce-  
rato myreos ex ceptas ad os utrūq; apponito, aut he-  
dere folijs in uino decoctis uentrē integro, aut plan-  
tagine cū sale trita, aut marrubio cū pane & rosaceo  
subacto, aut bulbis rufis cum pari pōdere aluminis  
cooperito. Optimū em hoc est, in ueterato malo re-  
medium: quin & bulbi ipsi cum nitro triti & impo-  
siti celerē curatiōē præstant. Optimē etiā conducit  
eis gregarij bouis sterus aridum uino decoctum &  
imposiūt. Epithema quoq; ex seminibus adhibēdū:  
itē bulbi cū sterore bouis ac nitro pmixti. Ex Dio-  
scoride, Conueniētissimū omnium his quā atrā bilē  
generāt, inflatisq; & morsum sentientibus, pulegiū  
decoctum existit potatū, aut aqua in qua ferrum est  
extinctum: itē intubi succus potatus: bibant autem  
aquā, eamq; calidā. Si uero plurimī calorīs sensum  
percipiant, frigida danda, sed modica, & maxime tē-  
pore exacerbationum. Aestuantibus enim & in an-  
xietate existētib; omniq; miseria afflictis, frigida  
ad absorbendū cōcedēda, per interualla tamē, & nō  
ultra cyathi mensurā. Nō enim humectatione opus  
habent, sed refrigerationis tantū gratia, frigida per-  
mittitur, et ut melior intrinsecus tēperatura fiat. Vit-  
lis est ipsi & mentæ succus cū succo mali punici dul-  
cis. Quod si aquam bibere non possint, parum uini  
aquis cōcedendū est inter cibos, calida aqua probe  
dilutā. Cibus maxima ex parte sit frumētaceus, et op-  
timī succi in omnibus: simplicior autē & qui facili-  
tius concoqui ac cōmutari possit in febricitantibus.  
His uero qui febrē carēt, adijci possunt ex oleribus,  
lactuę cauliculi ac maluæ, pisces petrosi aquis de-  
gentes, & ex uoluerū genere, nō graue olētes, macrę  
& mōranæ: ex ostrēis quę testa integūtur, herinacę  
recētēs. A' salis uero & acribus in totum abstineat.  
Molestas autē mordacitates & nauas, hausta pluri-  
ma tepida aqua per uomitū soluat. Si uero id nō be-  
ne tolerent, quiescere iubeto, & extēse manus palma  
stomachū foueto, quo delatū ad ipsū biliolum in-  
ferne per alui exernatur. Quod si uenæ insectionē  
non faciamus, secunda ac tertia die per dlysterem eua-  
cuandū est, & modico cibo æger cōnutriendus, de-  
inde in potu exhibendū pulegiū decoctum icūnis,  
reliq; suprà dicta. Fomētum etiā ex aceto adhi-  
bendū, & cataplasma ex sterore bubulo ammi-  
tis bulbis & nitro. Porro postquam febris cessauerit, aut  
ubi etiam in totū nō febricitauerint: & tamē diuini  
malū molestia afflixerit, & iritationes per longa in-  
terualla

terualla repetuerint, purgandum est corpus ex hiera Archigenis, aut Ruffi. Qui uero spuit multitudine stomacho uexantur, his conyza arida maximè tenuis māducanda, aut pulegium, & masticechia ex aqua potanda. Exhibendū est etiā lac in potu iisdem quemadmodū in proprio capite de ipsis ex professo est ostensum. His uero qui stomachū ualde ex olu tū habent, seruū lactis per acetū multum fisci exhibetur, ita ut ad primū seri haustu epithymi tenuissimè triti serup. i. x. & scammoniae obolum i. aut ii. iuxta uisum tolerantia inspergamus. Deinde serū ipsum per interualla paulatim bibat, sicut eius potatū mēsurā ad minimū quinque cyathorum. Bonū est & cucurbitulā ad dorsum affigere, aliquando etiā ad stomachi regionē, & scarificatione facta, sufficiens sanguinem ex fissuris extrahere. Quo uero penitus affecto hæc destruat, quotidie horā unam ante ciborū sumptionē exerceantur, ac frigida lauētur, maximè in mari, & arena sub caniculæ ardoribus obruantur. Abstineat autē ab omnibus arā bilem generantibus, maximè carnibus bubulis, uino nigro, brassicæ, & lēte. Diligētissimè autē de ipsorum diæta in sexto Sermone, ubi de atra bile affectis egimus, est prædictū. Quod si inflato eis augefact, rutā & cuminū in oleo decoquimus, indeq̃ uentrē quā pluri- mū irrigabimus, ex eodēq̃ oleo quincuncē per clysterē infundemus, si tamē clysteri stercoreū educituo prius ipsos euacuauerimus, in quo decocta sint ruta & cuminū. Deinde splenitum magnum aluo ac uisceribus imponendum ex epithemate quod ex seminibus cōstat. In cibo uero fucus pitaneæ detur, qui ex aceto, melle, cumino, & aniso fit conditus. post etiā gallina iisdem cōdimentis apparata exhibeatur, potus uero sit uinum rufum medicorū mensura.

Ad eos qui flauam bilem euomunt. Cap. III. Ex libris Philumeni. Qui flauam bilem euomunt, siue in febribus, siue extra febres id contingat, eis cōueniunt ea quæ ad nauisæ, ac nimia stomachi humectationē describētur. Quare omnibus ad illos descriptis odoramentis, manducatorijsq̃ & fomentis utatur. Decubitus autē eorum, à cibo præsertim & potu supinus adornetur, & spōgia ex posca imbuta ad os uentris imponatur, maximè si non uilis & contempnibilis sit dolor. Fricatio etiā & constrictio suntur arū manuum, ubi pulsus exploramus, adhibetur, & reliquarū similiter extremarū corporis partium. Cataplasmata autem ex palmis, malicorio, & si milibus accipiātur, quæ ex uino quidē aut posca sint decocta, cū pane autem & acacia, & hypocistide permixta ac contrita: quin & rhus & syluestris punici mali flores cōmodè cataplasmati admiscantur. Atq̃ uniuersi corporis curato ex oleo fiat, modico nitro ammixto, quo sudorē ex cute eliciamus, & fluores transferamus; & ob id etiā alui per inferna excretio plus quā oportet facta uomitus desiccat, quare ex ablinthio & aloē potionē cōueniēter exhibebis. At uero affectione diutius perseverante, si agri uires non repugnēt, etiā hieræ catapota ex colocynthide ab Archigene descripta apparabimus, decq̃ eis minimū dracm. summum ii. dabimus. Et si nihil obstat cataplasmate ex sinapi præcordia rubefacimus. Præclare enim sensum ipsum ad cutē transferi. Verū hæc diuturnæ affectioni remedia cōueniunt. Tēpore autē ex acerbationis & circa accessions acutē, cucur-

bitula plurimū auxiliatur cū multa flāma ori uētris affixa, fortiterq̃ abstracta, rursusq̃ secūdo ac tertio adglutinata. Cibus quales uomētibus solemus exhibebimus, sepe & paulatim sumēdos, & quotiescūq̃ reuomuerint acceptos, toties alios post modicum in teruallū offeremus. Ante cibum aquā tepidam dabitur, & uomere cogemus: bilioso enim humore cū cū circa adhærente unā cū aqua reiecto, stomachus elotus ac leuior redditus statim redinet oblatum sibi cibū. Mitigat autē dolores & stomachi morbus portulacæ succus tū per se, tum cū uinguetō nardino aut melino mixtus. Qui uero stomachū habet uehementer exultū, eis utile est lapathi acuti semen, tritū obolorū pondere ex aqua; aut mastiches tenuissimè trita cochleare bibendū præbe ieiunis ex aqua. Maximè omnium autē morbus sedat lac asininū: aut si hoc non adsit, bubulū recens multum potatū, absq̃ dilatione enim auxiliatur: si uero neq̃ hoc adsit, calidū, quartā eius partē aquæ addere oportet, & serue factū bibendū præbere. In balneū quoq̃ & ad uini potationē celerius ducēdi sunt qui bilē uomūt, quouidelicet ad cutē materiā transferamus. Cæterū & uinū subadstringēs firmitatē corporibus addit, ac cibos redinare cogit. Ventūdū est etiā aliquando cerasis ex lentifino aut cenanthino oleo, admixtis ablinthio, aut aloē, aut galla, aut cenanthe.

Ad eos qui stomacho exuruntur, ex siticulosi sunt.

Cap. IIII.

Sitis fit aut ob penuriā humiditatis, aut abundantiam caliditatis: siccitatis remediū est somnus, caliditatis uigilia. Verū his qui ob multū uini potum sitiunt, frigida aqua potata auxiliatur. Quibus autē longo iam tēpore stomachus est uar, eis auxilium, simulq̃ sitim sedat, radices dulcis fucus potatus, atq̃ ipsa etiā radix ex aqua, pampinorū uitis cremor, & portulacæ succus. Ab imbecillitate autē uires recolligitur sitim sedat, fucus sicca cibo acceptæ, & symphytum in petris nascens cōmanducatum. In cataplasma sitis uero ad stomachi ardores conducunt, linguinaria, intubum, sonchus, aptum hortense, pampini uitis, portulacæ, unumquodq̃ cum polenta aut pane. Qui in superficiei uruntur, his ramentorū cucurbitæ succus opitulatur cum rosaceo, aut omphaci succo. Sitim autē quæ in febribus oboritur, lenire solet capitis irrigatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, ex alto nimirū sincipite irrorato. Sitim etiā admittit stomacho exultis cucumeris semen cōmanducatum, de corticatū uero & tritū ex aqua potatū ualde iisdem auxiliatur. Eodē modo profect lactuæ semen ducatū & potatum: item semen portulacæ. Aliud adipsam, sitim optimè tollens. Cucumeris satui seminis decorticati dra. viii. traga canthi dra. iiii. tragacanthi contunditō & cribrato, semen uero cōterito, eisq̃ ouorum crudorū recentium cādida adijcto, & simul omnibus contritis catapota informata, ac in umbra excicata. Ex his deinde unum sub lingua detinendū præbeo, ut paulatim dissolutū deglutatur. Aliud adipsam, ad stomachi nimia humectationē commodū, in his præsertim quibus humida & calida dispositio adest. Rosarum uisridum unguibus earum resectis drachm. vi. radices dulcis drachm. iiii. spicæ nardi drachm. iiii. excipe uino dulci, & redige in catapotium formam, indeq̃ ciceris magnitudine sub lingua detinendum præbe, refrige-



rat, & firmitatem addit. Aliud. Seminis cucumeris, seminis portulacæ uiridis, tragacanthi, cuiusq; drach. iiii. radices dulcis drach. ii. Ex dipe portulacæ succo, & in cataplasia redige magnitudine fabæ, & utere uno pro uice sub linguam exhibitio. Absorbent etiam malorum cotoneorum cremorem, aut pīrorum, aut omphacii succum cum aqua. Aliud ad īpson. Seminis portulacæ uiridis, seminis pepōnis, succi radices dulcis, tragacanthi, singulorum equales partes, aqua subigito, & ad fabæ magnitudinem reducto, ac uisor.

De singultu.

Cap. v.

Singultus accessio stomacho accidere solet ob repletione, aut euacuatione, aut frigiditate: aliquando etiā ob humorū acrimiam & medicata qualitate prædicatorū mordacitate, quos ubi uomitus reiecerint, statim a plurimo singultu liberantur. Quin & hi qui phar maci ex tribus piperis generib. biberunt, aut ipsum adeo piper, si statim uinū a sumptione eorū ingesserint, omnino singultum. Cibis quoq; in mordacitate corruptis aliquos singultus facit, & oris uentris frigiditas singultum inducit, maxime uero omnī pueris frequētes singultus accidunt ob stomachi frigiditatem, & alimenti corruptionem. Fit etiā in febribus singultus, stomacho præsertim aut aliquo alio uiscere inflammato. Frigiditate itaq; singultū præcedere, oleū lana exceptū stomacho imponendū, in quo ruta, cuminū, & absinthium sint decocta. In potu etiā ruta cū uino exhibēda, aut apii in aqua mulsa decoctū, aut cuminū tritū, aut calamithee, aut asariū, aut pulegiū, aut dictamnū, aut celtica nardus, quodlibet eorū per se aut simul mixta. Utile est & acetum scyllinum foris illud acceptum. Castorium autē eis qui integræ sunt ætatis, tum ob frigiditatem singultibus, tum ob humorum multitudinē similiter affectis, drachmæ pōdere ex posca dādum: quin & stomacho foris insectus impositum utrisq; cōmodū existit cum oleo sicyonio aut antiquo. Quando uero ex repletione singultus oboritur, quomodo in totū frequētissimē cōsistit, uiolento motu opus habet. Vomitus itaq; remedio fuerit, & extremarum partū adstrictio, cōpressio spiritus, uociferatio concinna, cū plurimo clamore, deambulatio longa & cōcitata, gestatio atq; adhuc magis equitatio, cucurbitulæ cum plurima flāma pectori, stomacho, & dorso affixæ: sternutatio etiā cōuenienter prouocatur, eis qui ob humorū multitudinē singultunt. Singultui autē ex euacuatione oborto maxime contraria sternutatio existit: sanantur autē hi per alimentū conuenientis assumptionē, & per ea quæ defectum explēt. Singultus in altiore sopore, aut animi deliquio, aut tetanis oboritur, moriē nō longē abesse præsignat. Cæterum & his aquā mulsam assidue bibendū exhibere cōuenit, aut aquā purā medio criter seruata. Conducit & castoriū ex aqua mulsā potatū pondere trīū obolorū. In his uero q; a malo uisū sunt, præclara remedia reculanda sunt. Porro mordacitate singultū prouocante, primum sufficiens remediū uomitū ipsum reperietur: deinde etiā sensus stupefactionē, & morsum inferentium alterationē ad disculsiōnem. Stupefacti itaq; sensus per refrigeratā. Aliter aut mordacitas per obtundētia. Eiusmodi mixtæ facultatis subiectū phar macū existit, & quæ ei assimilari possunt. Habet autem hoc modo. Asclepiadæ phar-

macum, ad eos qui stomacho exuruntur, & ad uehementes singultus, uolulofascy stomachi affectio nes. Costi, spicæ nardi, chrysobalani, croci, rosarum uiridium, mastiches, cuiusq; drachmas iiii. asari, aloës, cuiusq; drach. ii. opii drach. i. subige cum psyllij cremore, & digere in pastillos, quorum tres pro uice dato. Ego uero chrysobalano reprobata, pastillo qui alter appellatur ad hos uitor, qui paulo mox ad stomachi subuersiones describuntur. Obundit autem mordacitatem, & ex ea obortum singultum sedat, intubi succus potatus, cucumeris semen decoratū tritūq; bibitum: laetice semen eodem modo, item portulacæ succus potatus, ipsaq; portulacæ in cibo sumpta: myxarum decoctum in potu acceptum: maxime omnium tamen præstat lac recens multum potatum.

De bulimo, id est, ingenti fame.

Cap. vi.

Bulimus ex stomachi frigiditate oboritur, indigestiō, ac uirium imbecillitate, & ab externo frigore ferē in totum initium capit. Vox ipsa Græca est, & a Latinis magna fames interpretatur. Fames em in principio multa adest, quæ tamen non usquequaq; perdurat. Nam postea repente animo linquuntur, cum extremarum partium refrigeratione, & spiritus defectio. Et sanē quidā in locis desertis, aut in balneo in malum istud collapsi, ex instanti perierint, auxilij facultate destituti. Peregrinationes autē & iunera lōga, maxime per niuem facta, affectionem hanc inducunt. Eos itaq; qui in itinere, aut aliis fame magna citra febrem infestantur, refouebimus ac reuocabimus aceto aut pulegio ad odoratum exhibitio, aut terra quęcunq; tandem obtigerit aceto conspersa: item pomis ac alijs qui inueniri possunt fructibus. Auxiliatur & panis recens naribus admotus, & calens boni odoris, caro suilla assata aut cocta: & in uniuersum omne quod ualde nutrit, maxime uero quod nidorosum ac probe conditū habet odore: his enim ut plurimum multū resodallatur. Cæterū & extremæ eorū partes fascijs cōstringendæ sunt, manuumq; ac pedū summitates calide aque seruetori imponendæ, & ipsi quoq; stimulatī eorū maxillis, crinibusq; ac auribus uellicatis excutāti. Reuocatis autē ab exolutione panē ex uino diluto offeremus, aut aliud quiddā eorum quæ acuatim uires reparare possunt, uelut sunt, oua forbilla, halica cū uino. Compēdiōsissimū enim auxilij ex cibo sperare possunt, quem etiā si oblati acceptare nō possint, ori indere oportet uiolētē, cogereq; ut ipsum trāsglutiant. Euestigio enim & a fame & ab animi deliquio liberātur, & celeriter excitantur. Accedit etiā in febribus, raro tamen, neq; cito, uerum circa uigorē ad declinationē. Si itaq; remissionis exacerbatōnū febrilium tēpus, eius accessio irruat, aut circa exacerbationis declinationē, in trepidē eis cibi sunt offerendi. Si uero in principio accessio nis febrilis, aut in uigore apparuerit, per prædicta odoramēta conabimur eos primū reuocare, maxime per ea quæ frumētacei generis existunt: uelut est, polēta aqua madefacta, aut posca, aut panis calidus uaporē adhuc emittēs. Frictio etiā extremarū partū adhibeatur, & cataplasmata ex palmis, aut malis cotoneis, aut polenta, in uino diluto decoctis, atq; hæc usq; ad remissionē facere oportet, ut oportune cibum offeramus. Quod si ex his nihil melius habeant, audendum est per ciborum ingestionem auxilium

auxilium adferre. farinæ itaq; crassioris cochleare unum ex aqua mulla, quæ laetis speciem ac teporē in tactu de se præbet exhibeto. Buccellam item unam atq; alterā uino madefactas. His enim refocillati ac respiciētes, ex improviso deinceps usq; ad remissionis tēpus perueniunt, in quo tū corporis curationē, tū sufficientē ordinabimus cibū. Vitabimus autem omnino in his qui hac affectione sunt apprehēsi, longiorē cibi dilationē ac inedia, & ne alternis tantū diebus cibū offeramus. Verū solerti rationatione facta, singulis horis simplicissimum modicumq; cibum dabimus. Assidui enim bulimi & exoluiti & in animi deliquia incidunt, quibus ægrē auxilium reperitur.

De animi deliquio, ex Philumeno. Cap. VII.  
Animi deliquium siue in febribus, siue citra febres cōtingat ex præmanifesta causa, uel est, plurima sanguinis aut uētris excretio, aut assidua surrectio, aut motus, aut dolor, aut timor: auxilium fert ex causarū ablatione, de quibus absolutissimē in febriū tractatu à nobis est prædictū, quinto uidelicet Sermone. Dicitur autem summam, & paucis etiam hoc loco de iisdem. Frequentes igitur surrectiones eis prohibendæ sunt, & acuatim facta euacuatio cohibenda, doloresq; mitigandi: causæ etiam quæ timorem inducunt soluendæ, siue forinsecus accedant, siue ex humoribus in corpore obortiantur. Extremæ corporis partes animi deliquis irruentibus constringantur: cucurbitæ etiam aliquando tum posterioribus, tum anterioribus stomachi partibus affigantur, & in latūs etiam apponantur. Caput autem agitatū leuī manus impositione cum coarctatione etiam cōprimatur. Odoramenta quoq; offerantur, & aperto ori digitus aut penna immitatur, facies uero ac stomachus uehementissimē fricetur. Hoc enim modo præoccupati refocillatur, uiresq; recolligunt, neq; in periculum animi deliquij incurrunt. Reuocatis autē, si quidē febre careant, cyathū III. aut IIII. frigidæ aque in potu exhibendi, quam tamen paulatim & per interualla absorbent, aut cremorem palmarum, uuaū rampassarum, malorum cotoneorum, rosarū, aut pampinorum, aut alicuius consimilis, aut uix acerbæ nondū maturæ succum cum frigida aqua. Aut mentæ ramulos tres tritos cum mali punici dulcis siue acidi succo præbeto absorbendos: aut potentam cum punici succo. Forinsecus autem stomacho ea imponenda sunt quæ suprā ad cardiacos & bilē uomentes sunt descripta.

De his, qui in balneo animo linquntur. Cap. VIII.  
Qui in balneo animo linquntur, aut magis animo linqui incipiunt, eos celeriter educere oportet, neq; multa aqua infusione humectare. Qui autem iam inciderunt, celerrimē exportandi sunt: & reliquum quidem corpus leui quoptam uelamine cooperiendum: facies uero spongia frigida imbuta madefacta, aut frigida aspergatur. fricanda etiam facies, stomachusq; & pedes: eos quoq; aperiendum pennarū aut digitorū immisione, omnib; modo conandū quo humor ipsius animi deliquij autor euomatur, aqua tepida ori infusillata. Etsi enim nihil inde euomant, stomachus tamen irritatione firmatur, quæ animi deliquium soluit: auxiliatur etiam ad oris apertionem auditoriorum meatuum cōpressio, similiterq; osium quæ à petre duritia, lithoidea, hoc est, petro

sa appellantur. Qui uero uisioris sunt conditionis etiam alapis sunt cædendi, capillorum quoque facta euulsio. Et uociferatio quidem unius, utilis est: multorum autem & simul edita, nocet. Cæterum à uehementi animi deliquio cōualecentibus, tū in calidam, tum in frigidam aquam demissiones, uelut mortis causæ timendæ. Aut enim laxatis corporibus, calore discusso & resolutio pereunt: aut à frigidi tate adstrictis, extinguuntur.

De stomachi imbecillitate, & supinitate, ac subuersione, ex Galeno. Cap. IX.

Quæ supinitas stomachi appellatur, ex intemperie quacūq; tandem oboritur, nullis humoribus uitatis. Oboritur etiā ex multitudine humorum, nulla tamen maligna qualitate accedente: stomachus enim à largo humore fortiter madefactus, ad similitudinē amplitudinis totius uētris laxatur, adeo ut cibis ob uolui, eosq; contegere non possit, & propterea circa ipsum humores supernant, quos ubi uentriculus abrumperet omni impetu annuitur, anxietatis accessum perfert, ac prius quàm cibis præbeatur, extremæ imbecillitatis. Facilius autem hæc affectio curatur, inter reliquas stomachi affectiones longo tempore perseverantes. Opus uero habet pharmacis humorem deficcare ualecibus, cohibereq; ac adstringere laxatum corpus. Itaq; fit in profundum usq; humiditas extendatur, & crassa tenaxq; existat, pharvacum miscere oportet extenuatorium & uelut consumptiuum, quale est acetum & acetū mullum. Si uero eiusmodi humiditas non existat, neq; in profundum usq; corpus extendatur, adstringentia sola ad curationem sufficiunt. Magnum autem si gnium ad cognoscendum, frigidāne sit an calidā hæc affectio, sensus ægri præbet: siquidem aut nullam, aut aliquam sitim perceperit. Supinitates igitur stomachi ex uitatis humoribus obortę, pica curatur, quemadmodum paulo post dicitur, ut potē quæ ce lerissimē uitatum humorem repurgat. Subuersiones uero & nausæ ex imbecillitate stomachi factæ, per intemperie correctionem sanantur, & per incumbētis humiditatis desiccationem. Si quidem autem calidā affectio existat, catapota adipsa & sitim tollentia exhibeantur, quæ ad eos qui stomacho exuruntur sunt descripta, & maxime quod ex rosīs, spica nardi, & radice dulci constat. Ad frigidiores uero & humectiores affectiones conueniunt subscripta. Asclepiadæ, ad stomachi subuersiones. Succū adnorum mali punici acidi sextariū III. succū mentæ sextariū I. conijce in uas fictile, & decoque assidue agitando, & ubi coacti fuerint ablutos recōdito, & ante cibum mysticum unum aut duo exhibeto. Aliud. Vnam acerbā immaturam arefactā, contusamq; & cribatā in promptu habe, & cochlearij mensura ex aquæ frigide cyathis duobus præbe. Aliud, quod calidioribus dispositionibus magis commodū est, si cut etiam præcedens: Mala punica matura & in uigore perfectā quinque aut sex numero, integrā unā cum putaminibus contunde, & infusis aquæ pluuiæ līs sextarijs tribus usque quo ad tertias omnis liquor redactus fuerit decoque, exprime, ac percolā, liquoremq; expressum rursus per se decoque, donec ad mellis spissitudinem redigatur: ac inde cochleare unum aut duo exhibebis qui febre carent, cum uisno: febricitantibus uero, ex aqua. Aliud ualde bo-

num. Succo mali punica acidi, ac intubi, æqualibus portionibus permixtis, mentæ siccæ tenuissimè trita, parum quiddā insperge, & cyathi mensura bibendum præbe. Idem facit oxylapathi semen tritum ex aqua potatum: similiter & semen portulacæ. Vt re etiam confiderat ad stomachi subuersiones, amaronum pastillo, & eo qui aster appellatur, quorum compositionem paulo post in nauſæ tractatū describo. Vt re quoque cataplasmatīs & epithematīs, quæ mōx post sermonem De nauſæ describentur.

De nauſæ, ex Galeno.

Cap. x.

Nauſæ ex uitioſo humore tum calido, tum frigido gi-  
gnuntur. Qui in uentre continetur, aut in concaui-  
tate ipsius innatæ, aut in tuniculis eius infartus instar  
uiſci adhæret, atque ægrè auiſci poteſt: aut ſeroſior &  
mediocriter exiſtens in ipsis uentriculi tuniculis, ue-  
lut aqua in ſpongia, imbibitur. Atqui eiſmodi hu-  
mores ex uentris intemperie tum calida tum frigida  
aliquando generantur. Aliquando autē ex alijs par-  
tibus prius affectis in ipsum uentrem, uelut excre-  
ta illarum coſſunt, uelut ex hepate, aut ſplene, aut  
capite, aut ex uniuerso corpore. Quando igitur aliæ  
partes prius afficiuntur, omni modo uiniſculuſque  
propriæ acceſſiones cōcomitantur: & ipſe æger pri-  
mum affectū membri læſionem ſentiſcit: enim calo-  
ris ſenſus iuxta affectum membrū ipſi cōiungit, aut  
frigoris, aut grauitatis, aut etiam tactu noſtro durū  
ſuccūbit. Si uero uniuersum corpus uitioſis humori-  
bus replectū eſt, idipſum ex colore, & eruptionibus  
papularū circa eūrem cognoscitur, atque ex ipſa adeo  
urina. Quod ſi nihil horum adſit, certum eſt uentrē  
ipſum aliquo modo egrotare. Si itaque cū in uentre  
nidoroſi ſiunt, nullo huiusmodi cibo alſumpſero, ue-  
lut ſunt piſces, aut oua in ſartagine friſta, aut alijs cō-  
ſimiles, nec eſſe ut ratiocinari cauſam calidam eſſe,  
quæ hoc in uentre operatur. Si uero acceſſunt in uen-  
tre cibi, nullo huiusmodi cibo ſumpſero, uelut ſunt pi-  
ſces, aut oua in ſartagine friſta, aut alijs cōſimiles, ne-  
ceſſe eſt cōſiderare frigidam cauſam eſſe, aut atræ bi-  
lis humorē uentrem inſeſtantem. Maniſſta autem  
erit cognitio & ſcientia cauſæ, quā habes ſuſpectā: fri-  
gidis enim pharmacis cibisque ac potibus ſtatim adſu-  
tum hominem uidebis, ſi quidem calida diſpoſitio  
exiterit. Si uero frigida, calidis cibis & pharmacis  
iuuabitur, at frigidis uero lædetur: cæterum & ſitis  
ad calidam affectionem cōcomitatur: ſitis autem fe-  
rè in totum carent, qui frigidam intemperie habent,  
niſi ſalla ſit picuita. Atqui ex diligenti uomitus in-  
ſpectioe eiſmodi quoque cognoscuntur affectiones.  
Si enim intemperie quadam uenter afficitur, alſum-  
ptos cibos ad intemperie naturam permutat, ut ap-  
pareant uomitu redditi cibi, citra aliquid humoris  
complexū, in nidore aut acorem permutationem ſu-  
ſcepſiſſe. Si uero humor quiſpiam uitioſus amplitudi-  
ni uentris innatet, & cibi corumpat, ipſi cibi mani-  
feſte eiſmodi humore madefacti apparent, & in il-  
lius naturam permutati. Quum uero cibi amplitudi-  
ni uentris innatent, humorē ipſum affigentem produ-  
cunt, qui ubi infartus, aut imbibitur, ut dictum eſt, in  
uentris tuniculis fuerit, ſi quidem calidus ſit, ſiticulo-  
ſos facit, & ciborum inappetentiam inducit: ſi uero  
frigidiſſus ſit, ciborum appetentiam excitat, & ſitim  
extinguit. Nauſæ autē utriſque accedūt, & inanes uo-  
mendi irritationes, quæ lancinant tantum, & nullū

humorem educunt. Prædictum autem & antea eſt,  
quod ſi tenues humores & uenioſi exiſtant, quos  
etiam Græci *ὑγρὰς*, hoc eſt, ſeroſos appellant, per  
profundum ſolidorum uentris corpūculorum pro-  
cedūt, & uelut aqua in ſpongia imbibuntur. Si uero  
tenaces ſint, circa internam uentris ſuperficiem uiſci  
modo adhærent. Seroſi itaque humores, utpote te-  
nuium partium exiſtentes, non ſolum ante cibos, ſed  
& poſt acceptum cibum, uomitu inducunt, perpe-  
tuo nimirum motu uerſati. Qui uero ſuperficiē ui-  
tris inſartū adhærent, ante cibum magis inanes uomit-  
iones mouent. Diligenter itaque cōſiderare oportet,  
num uentris tantum affectio hæc ſit, aut aliquid ali-  
terius membri. Deinde qualis affectio exiſtat, an ca-  
lida, aut frigida, humidæ aut ſicca. Et ſi quidem ex  
alia quadam parte, aut ex uniuerso corpore humo-  
res in uentrē conſuant, priorem curā membri prius  
affecti habere oportet: ita tamē ut neque uentrē ipſum  
negligamus. Qui enim primum affectam particulā  
curat, uelut fontem omnium in uentrem influxuſque  
exciudit. Ventrē autem ſolo affecto, diſpoſitionis in  
ipſo qualitate cognita medebimur. Calidā itaque in-  
temperiem ſemper refrigerare oportet, in quocunque  
tandem membro exiſtat, frigidam autem calefacere:  
eodemque modo humidā delicare, & ſiccā humectare.  
Innatates autē amplitudini uentris humores eua-  
cuare, ſive per uomitum, ſive infernè per aluum cō-  
modius id fiat. Qui uero in tuniculis uentris inſar-  
tus adhæret, aut imbibitur eſt uitioſus humor, per re-  
purgandā ipſumque incidentia ac euacuantia pharma-  
ca eſt curandus. Intemperaturæ enim in humoribus  
conſiſtentes pharmacis humores euacuantibus opus  
habent. Qui uero abſque uitioſo humore, ab intempe-  
rie ſola quacunque tandē, maximè tamē calidæ & ſic-  
cæ inſeſtantur, in tabe omnino perueniūt, pharmaco  
euacuare purgati, etiā ſi exhibitū pharmacū imbedi-  
liuſ exiſtat, quale eſt ex aloë picrū appellatū. Quo  
modo igitur unāquāque intemperie, ſive ſimpli-  
citer, ſive mixtā curare oportet, iam prædictū eſt in quarto hu-  
ius tractationis Sermonē: dicetur tamē oportune &  
hic de eadē re, ſed paucis. De intemperie frigida. Hiſ  
itaque qui ex frigida intemperie afficiuntur, pharmacū  
ex tribus piperis generibus commodum exiſtit, aut  
quod ex calamintā coſtat, aut aliud quoddā cōſimi-  
le, ex uino tenui aut aqua potatū. Forinſecus autē ſto-  
macho maſtiche chiā, unguento nardino dilutā & tri-  
tā, purpureāque excepta lana imponit. Vinum uero  
exhibendū eſt ruſum, ſubadstringens & ueniuſius, &  
conſimiles etiā cibi. De intemperatura calida. Hiſ ue-  
ro qui a calida intemperatura afficiuntur cū mediocri-  
ter adstringentibus & refrigerantibus forinſecus ſto-  
macho ac uentri adhibitis, medeberis, ita ut quāto ma-  
gis calor excellat, eo amplius refrigerantia adau-  
geas. Cibū autē exhibebis haliçæ ex uino albo & te-  
nui, & ſubadstringēte: ex uolucris, macras & nō  
ſœcidas, ac quæ hiſ cōſimiles exiſtūt. Si autē humor  
tenuis biliouſus aut ſeroſus in uentris amplitudine cō-  
tineatur, tenuiſſimo piſſanę ſucco exhibitio uomere  
cogimus, digitis aut pinnis immiſſis. Aut aloë dra-  
c. cum aqua tritam potandam damus: calidorum  
enim in uentre humorum optimum pharmacum eſt  
aloë, & in una ſepe die ſtomachicos ſanctiſi uero pi-  
uitioſi aut uiſcoſi & craſſi humores amplitudini uē-  
tris innatent, aceto mulſo utendum eſt, in quo ex in-  
cidentibus.

cidētibus, ac repurgantibus, mediocriterq; calefaciē-  
tibus quēdam sunt decocta: his uero quibus uisofus  
humor intrinsecus circa superficiē uētris infartus ad  
hēret, ut eggrē aulli possit, ex aloē picra appellata cō-  
posito utilis existit, quā uisofum humore repur-  
gare cōsueuit, crassumq; extenuare, per uires eorum  
quā cū aloē sunt cōmixta: quod si serofa humiditas  
tuniculis uētris sit imbibita, quā ut prēdictum est,  
non solum ante cibum, sed post acceptum etiam uo-  
mitus mouet, primum Amazoniū pastillus cōueniē-  
ter exhibetur, qui picrā est subscriptus. Mediocriter  
enim per hunc uomitibus prohibitis, deinde ex aloē  
picrā appellata utimur. Cuius compositio hęc est:  
Aloēs drach. c. xylobalsami, mastiches, croci, spicæ  
nardi, asari, cīnamomi, cuiusq; drac. vi. cōtere & re-  
pone arida, & exhibe perfecto pondere scrupulorū  
xii. ex aqua frigida aut calida cyathis xii. Andro-  
machū ad prēdicta etiam floribus iunci odorati drac.  
vi. adiicit: & aloēn lotā cōijcere iubet. Verū quod  
cognoscere opere prędictum est, ad uētris subductionē  
illota aloē cōuenientior existit: quæ enim lota est,  
multū à medicamentaria facultate deponit: quā cōsi-  
dentius etiā exhibere quis possit, eis qui nō ualde fe-  
bricitāt, & quibus firmitatē uētri addere uolumus.  
Quare scire oportet ex uisofis humoribus affectio-  
nes circa stomachū & uētrē, per pharmaca ex aloē  
utiliter subdici & euacuari posse: quæ in maximam  
perniciē perueniunt per adstringentē eduliorū, po-  
tionū, ac pharmacorū exhibitionē. Asclepiades autē  
picrā eodem quo Themison modo apparare iubet.  
Habet autem hoc modo: Aloēs dra. c. mastiches, cro-  
ci, spicæ nardi, asari, cīnamomi, cuiusq; un. i. & pro-  
xylobalsamo carpobalsami unc. i. cōtundito ac per-  
angustissimū cribrum excusito, siccumq; ne in aērē  
transpiret adservato, & drac. i. tantū ex frigida præ-  
beo, nisi menses ciere uelis, nam tum præstat præbe-  
re ex uino. Eductis mēstrua fœminarū: facit & ad uul-  
uæ affectiones: propriē autē ad stomachi subuersio-  
nes: conducit hepaticas, affectionibus renum atq; om-  
nino admirandā potentia habet. Ad refrigeratos au-  
tem & qui pituitā crassā & uisofam in uentre ha-  
bent, subiectū pharmacum cōmodum existit. Calefa-  
cit enim & extenuat ac dissecat crassitiem, uisofita-  
temq; repurgat. Habet autē hoc modo: Corticis ra-  
dices fœniculi uiridis sexuncē, aceti sesquisextarii,  
aloēs quadrantem. Cortex cum aceto ad tertias de-  
coquitur: deinde percolato aceto mellis artificii unc.  
x. v. adiungimus, & ad mellis crassitudinē coquēdo re-  
digimus, & cōritæ in mortario aloē paulatim hoc  
ipsū acētū multum cōctū affundimus: postea uero  
simul unīta tollimus, ac utimur. Datur ad summum  
mensura cochleariorū trium. Alia cōpositio quæ  
dulcis appellatur. Aloēs septuncē, iridis sextiantē,  
mastiches sesquiquintam, nardi celicę uncā unā, pipe-  
ris drachmas quatuor, myrrhę dra. iiii. aceti chœni-  
cis septē, cyathos septē, mellis libras tres, sextarium  
unū, corticis radicū fœniculi libras tres. Corticē fœ-  
niculi in aceto præmaceratam ad tertias decoque  
& percola, residuoq; aceto mel adijce, ac rursum deco-  
que usquequo probē cogatur, deinde sicca in morta-  
rio simul ammisce, & cochleariū unū exhibe. Cōdu-  
cit frigidioribus temperaturis, & aluū piuitosiorē  
mediocriter soluit, & caput leuius reddit. Amazo-  
num pastillus. Facit ad uoluulosas stomachi sub-

uersiones. Voluulosas autem fortes stomachi sub-  
uersiones appello, quemadmodū enim in uoluulis  
uomitum cum uehementi cōtentione fiunt, & stercō-  
ra reuomuntia etiam alios uomitus cōcitatos uol-  
uulosos appellare possumus. Consequuntur autem  
huiusmodi uomitus, ubi magna molestia affectis  
membris à serosis medicatisq; ac uenosis humori-  
bus est illata: & si aliquo modo imbecillior fuerit  
uēter, geminatur malū ex mordacitate. Quapropter  
ita instruenda curatio est, ut simul odoras qualitates  
affectis membris offeramus: quales sunt aromatum  
quorundam & seminum in ciborum usum uenien-  
tiū: uelut est anisum, & apīū, & similia. Quemadmo-  
dū enim grauelentia omnia stomachū subuertere  
consueuerunt: sic odora corroborant, maximē quæ  
nobis sunt familiaria, & in cibo accipiuntur. In qui-  
bus itaq; cōiectamus serofos humores in uētris tu-  
niculis imbibitos esse, his hoc pharmacū magis con-  
ueniet. Quibus uero circa superficiem uētris tunicu-  
larum infartū adherent, eis picra utilius exhibetur.  
Quod si exhibita picrā reuomant, coniectare opor-  
tet mixtā esse affectionē, & tū tuniculis imbibitos,  
tum superficiē infartos humores, in uētre abundan-  
te: quare utile fuerit pastillum præbibendum exhi-  
bere, ut mediocriter uomitū prohibeat: deinde autē  
pharmaco picro uti. Est autem pastilli cōpositio hęc:  
Seminis apīi drachmas vi. anisi drachmas vi. cōmæ  
absinthij dra. iiii. myrrhæ dra. ii. piperis dra. ii.  
opiī dra. ii. castoriī dra. ii. cīnamomi dra. vi. in  
pastillos redigito, & ad summum drach. i. exhibito.  
Ego uero, inquit Galenus, præscriptum pharmacū  
circa myrrhæ admixtionē apparare cōsueui, ob me-  
dicamentaria eius uim, piperis pro eo cōiungens dra-  
ii. ita ut in uniuersum piperis drach. iiii. accipiatur.  
Datur stomachicis ex uini diluti cyathis iiii. Chole-  
ricis autē siue bilem effundentibus ex aqua frigida.  
His autem qui cibum reuomit, si quidem siticulosi  
fuerint, & caloris sensus eos circa os uētris infestet,  
& sanitatis tempore frigidam bibere sint aduersi, si-  
militer ex frigida præbe: si uero non ita habeat, ex  
calida. Coeliacis, & ad intestinorum tormina ex deco-  
cto myrti, splenicis cū aceti multi cyathis tribus.

Asclepiades pastillus inexuperabilis, after appella-  
tus. Pharmacū quod prosperē accomodatur, dolorē  
leuans, somnum inducens, multæ omnino utilitatis:  
etenim morbos circa stomachum mirabiliter sanat,  
adidos ruitus & difficilem concoctionē aufert, inte-  
stinorum tormina, & uoluulos, inflationesq; curat.  
Prodest hic pastillus ad capitis dolores potatus, &  
aceto dilutus forinsecus frōti illitus. Ad dolores au-  
rium facti perdicij succo liquefactus: facti & ad den-  
tiū dolorem tritus & galbano exceptus, aut sic suc-  
co, & cauernę inditus. Ad oculorū affectiones & flu-  
xionū impressiōes passo diluitur, & lana ex eo irri-  
gata imponitur. In tonsillarum affectionibus tepesa-  
ctus ac dilutus ex aqua mulla præbetur gargasillam  
dus. Vtilis est ad omnē sanguinis fluxū uino myrti  
te dissolutus. Ad distillationē inueteratasq; & recen-  
tes uisus affectiones, uino scybelite aut thereo eliqua-  
tus. Prodest suppuratis, & phthisicis marrubij deco-  
cto liquefactus, prodest dysentericis, cholericis, &  
sanguinē reiectantibus, sanguinariæ succo dilutus  
prodest ad omnium reptiliū plagas ex rure decocto  
potatus. Soluit per circuitum repentes febriles ac

cessiones, si duabus horis ante aduentantem febrem ex uini diluti cyathis III. exhibeatur. Fœminarum menses cetera Artemisia succo dilutus ac potatus, facit & ad uelicæ affectiones uino mulso solutus, quomodo & ad uulvæ strangulationes prodest potatus, facit ad articulorum dolores & podagram gentianæ decocto dissolutus ac potatus. Compositio autem eius hoc modo habet: Castorei, opij, myrrhæ, cuiuscq; drac. IIII. spicæ nardi, calsiæ, terræ lemnis, corticis mandragoræ, cuiuscq; drac. IIII. croci drach. VI. daud, styracis, anisi, seledos, seminis hyoscyami, cuiuscq; dra. VIII. myrrham, styracem & opium in uino odorato dissolue: reliqua autem contusa & crasbrata insperge, ac simul unita in pastillis redige, ciceris magnitudinem æquantes, quibus in umbra de siccatis utere. Et de pharmacia quidem quæ in potu sumuntur habentur. Decubitus autem sursum uergens in omnibus quomodocumq; nauseantibus & uomētibus adornetur, in conuenienti & affectioni contraria domo. Quæ frigida quidem sit, affectione existet calida. Contrā uero calida, ubi frigida affectio existat. Extremæ corporis partes fricentur, manibusq; calefactis palpentur, quin & uolentius adstringantur, deinde pedes & manus in aquam solito calidiorē demittantur. Odoramenta autem admoveantur naribus olfacienda boni odoris: uelut rosæ, mala cōtonea, pulegium, menta, malabathrum, spica nardi. Caput uero fomento olei dulcis frequentius irrigetur: in calidioribus uero ex rosaceo. Stomachus absinthij cremore irrigetur, rosaceo in calidioribus ammixto; nardino autē in frigidioribus, apio insuper, aut cumino, aut peroselino aduicō. Ex quibus si nullū cōmodum sentiat, ad cataplasmata ex palmis transeundum, quæ paulo post dicentur. Conueniunt etiā ea quæ aloēn, absinthium, & mala cōtonea accipiunt, & aliquādo quoq; alumen. Idem præstant & cerata ex his apparata. Si uero inflammatio circa præcordia existat, communia cataplasmata adhibeantur. His qui stomacho exuruntur, frigida etiā aqua quā plurimum decoctā, deinde rursum refrigerata absorbēda præbeatur, ita ut cyathi unius mēsurā, aut duorū, aut etiam trium, paulatim tamē absorbeat. Colluta etiā & in ore retenta, nausæas tollit, his quibus propter obstaculū aliquid potus eius negatur. Eodem modo assumitur posca diluta. Porculaca etiā cōmanducata, & ossa myxarum, & cucumeris semē cochlearij mensura mirabiliter prodest. Porro affectione diutius permanente, & cibis præ morbo non retentis, cucurbita ad os uentris cū plurima flamma affigatur, donec locus rubefiat, atque ipsa adhuc affixa cibis præbeatur. Ad quotidianas autem nausæas, & ascensum cibum, ac uomitus, coriandri semen tenuissimē tritum, cochlearij mēsurā, ueluti farinā aquæ inspersum bibendum præbe, aut mastiches cochleare ex frigida aqua, aut lactucæ albæ semē cochlearij mensura ex aqua, præbe his qui stomacho exuruntur.

Cataplasmata ex epithemata ad nausæas ex uomitus.

Cap. XI;

Cataplasmata ad eos qui cibum non retinent, quos ueteres propriè stomachicos appellauerunt. Farina fœni greci, & malux semen aridum tritum, mellis commisceatur. Si uero præ duritie contundi non possit, malux semen, ipsum decoctum & tritum mo-

dico oleo adiecto in malagmatis formam reductio, & uitior. Aliud. Lolij & trionis farinam subige cum melle, & pro oleo liquidam picem ammiscere; Ceratum autem conuenit ex olei irini fece, ceraq; ac modico castorio. Aliud ceratum. Cera quadrante, olei irini sexuncē, galbani unc. I. opoponacis dra. IIII. castorij dra. IIII. Opopanax aceto teritur. Manifestū est autē talia in frigidis dispositionibus adhiberi, ceterū epithemata hæc ad prædictas affectiones per experientiam, ut Galenus inquit, conducunt: nō modo eorum qui ea descriperunt, uerum nostro quoq; iudicio comprobata. Asclepiadæ epithema ad stomachi subuerfiones & choleras, siue bilis effusiones. Oenanthes, croci, florum rosarum, ferulæ cāpanæ, mastiches, singulorum drach. VIII. cum palsis palmis subige, modico rosaceo affuso, & uestis detritæ panniculo excipe, stomachoq; ac uentri impone. Aliud. Oenanthes, omphacij, florum rosarum, mastiches, singulorum drach. IIII. aloës, aluminis scissi, uiriuscq; drac. IIII. uini dulcis myrti quod satis est. Trita excipe palmis palsis, & utere. Aliud epithema, ad stomachi imbecillitatē, & dolorem, & ad eos qui cibum redire non possunt. Palmarū passarum sex uncē, oenanthes unc. I. thuris unc. I. mastiches unc. I. cera lib. I. unguētū nardini aromatis inspissatū libr. II. uini quantū sufficit. Palmas in uino ueteri macearatas optimè cōtere: deinde mastichen & thus unum quodq; per se optimè tritum adijce, ac rursus simul tere. Liquefactæ autem cum unguento nardino ceræ oenanthen tenuissimē tritiā insperge, simulq; unita & refrigerata ad reliqua in mortariū conijce, & probè remollitis utere. Aliud epithema, ad stomachi subuerfiones, & circa ipsum uexationes, facit & ad particulares inflammationes. Oenanthes, bellæ, croci, rosarū siccarum, ferulæ campang, mastiches, ramentorū electri, sin. dra. IIII. carnis phœnicobalanorū quadrante, uini myrtidis quantum sufficit. Ari da cōtunde & per angustissimum cribrū excute, & uino myrtito diluta ad cerati crassitudinem redige: deinde palmarum carnem adijce, simulq; contunde, & cerato ex oleo rosaceo apparato excipe. Post uero lintecolo infarium ad os uentris impone. Prodest etiam oculorum inflammationi.

De cholera seu bilis effusione.

Cap. XII.

Cholera appellatur quum ob multas cruditates uomitus biliosus & nidorosus & acidus oboritur, ad plures horas continuè perseuerans, & uenter infernè eadem ex cernit, sequiturq; sitis, & exudatio, & impeditus pulsus, musculorūq; manuum ac pedum, maxime uero surarum contractio & tensio. Si quis igitur mox in principio, aut coaceruatim, ea quæ effuerunt cohibere aggrediar, is maioris mali autor erit: inuicem enim quum sint, euacuatione opus habet, quare conuenit si nō sponte ferantur, oportune irritare, aqua tepida exhibitæ, ac egro uomere iussio: aqua enim multa mordacitatē operatur, torsionesq; auget: aqua uero oleo mixta, auget fluxiones. quare aqua tepida potata uomant, quotiescūq; quidē cibis nimis fuerint expleti, prius quā illi corrumpantur. Adiuuare etiam oportet per sedem exercitiō nē saluti enim uelut uenenū insidens, & uentrem ac intestina rodit, & humores ex uniuerso corpore adtrahit. Per uomitus itaq; oportuna prouocationē, uomitus ipse soluitur & cessat. Quū uero humorū excretio

excretio quleuerit: colligamenti autē & tabefactio nis signa in excrementis ipsis appareant, uelut si sint rasuræ similia, frigimentitiasq; & mucosæ, & gracilitas per ambitum corporis fiat, & maximè si uenter consistat & adstringatur, pulsusq; imminuat ac præter modum condensetur, tunc sanè uentrem cooperire & fouere oportet, membræq; & artus ac musculosos similiter locos, oleo multo calido impinguare, & uinculis adstringere extremas corporis partes. cataplasma quoq; uentri imponendū ex palmis & cenanthe, quibus hypocisthis, & acaciæ, & rhus ruber, & malicoriū sint ammixta. In potu uero frigida aqua cyathi mēsurā præbeatur absorbenda: cauendū tamen ne nimis frigida ex istat. Aceruatim enim exhibita reuomitur: & quæ ualde frigida est, aliquando innatum calorē stupore suo extremè offendit, aut inflammationem stomachi aut uisceris alii cuius efficit. Inspurgantur autem aliquādo aquæ forbendæ pampini uitis, aut mali punici succus modicus infusiletur. Si uero & hoc reuomat, crassa etiā forbitio ipsa faciēda est, per micarū inritationem, & per cochleare exhibenda. Etenim si acruatim deuo retur, aut reuomitur, aut infrā detrahitur. Annitendū est etiā ut priore forbitione uomitu reiecta, rursum altera exhibeatur: dandus itē mali punici succus cum mentæ succo absorbendus, micis minutissimè tritis adiectis. Sit autē acidi mali punici succus, & multa quantitate mentæ succum excedat. Quod si acriora sint ea quæ excernuntur, cucumeris semen mace ratū, desquamātū & tritūm ex aquæ cyathis III. præbeatur: datur etiā uiliter cum amylo. Post uero somnus procurādus, & quies omni modo. At uero ubi intolerabilis effusio existat, & pulsus emolliatur, apprehendatq; frigiditas & exudatio, aliquādo etiā singultus, ad uinum transeundū est mediocriter adstringens, neq; uiribus ualidum, & quod dulce quiddē sit, non autem odorū. Interant autē in ipsum micas, aut haliā inijciant, si fieri possit, calidū, si uero non, frigidū: atq; ita paulatim & per interualla cochleare absorbent. Sirum uero arcei polenta tenuis sine sale uino diluto inperfa & absorpta. Vini multitudinem uitanda est, ac omni arte conandū ut ipsos sopiamus, ex rosas ac myrto domus pauimento cōstrato. Odoramenta quoq; naribus admoueantur, mala coronea, & similia. Reliqua autem omnia eo modo adhibeātur, quo suprā in æstuiatibus febribus est prædictum. Illitiones etiā soporiferæ circa frontē assu mantur. Alio autem adhuc egerente, amyllum cum decoctione capiti papaueris per clysterem infundatur: simul enim & cohibet & refrigerat, & somnū inducit. Ad uomitus uero coercendos cōmandu care cōuenit, succumq; deuorare, mespilorum, malorum coroneorum, pyrorum crustum minorum, & uuarū, maxime quæ uinacels interpositis seruatur, & pensile quoq; unā cū uinacels expedit manducare. Ad cōtractiones autem in musculis factas, uestis detritæ panniculi oleo calido madesacti conueniunt, contra ctis musculis impositi: & cerata humida aliquando castorei accipientia, & ex ficomyon oleo ad frino oleo facta. Quibusdā eorum etiā maxillares musculi dolent: quos quum lana operire non sit facile (est enim infuscundum, & fudor quoque inde elicitur) illitionibus leniter factis molliores reddere oportet. In cibo exhibendi sunt pedes suilli cocti, pulli columbi-

ni & gallinarum, perdoes, palumbi, turdi, & consimiles his existentes. Asclepiades autem cholericis eiusmodi electum planè remedium describit, inuulibus tamē omnibus prius sufficere euacuatis. Baccharū myrti nigrarum exadnatū Italicum sextarium unum, florū rosarum tantundē, carnis palmarū numero uiginti, aquæ potabilis sex tarios sex decoque ad tertias, & expressum ac percolatū liquore rursum per se decoque, donec ad sextarium unū redigatur: cui deinde passū myrtitæ sextarium unum affunde, rursumq; decoque donec ad mellis crassitudinem cogatur, & utere. Datur ante & post cibum cochlearij mensura. Vtere etiā ad hos potationibus & epistematibus ad stomachi subuersiones præscriptis.

De stomachi adstrictione.

Cap. XIII.

Oboritur aliquibus post cibum acceptum, circa cōcoctionis & digestionis tempus, stomachi adstrictio itemq; alui, æstuat autē uniuersum corpus, maxime uero manuum ac pedum extremitates: & facies ipsa rubescit: pulsus autē in densitate permuratur. Hos multi etiam febricitare existimant. Nocumētū autem omne circa digrendi alimentī difficultatem cōtingit: consistit enim ut plurimum in aridis & condensatis habentibus carnem, spiritu circa uias concluso & coarctato: utpote qui per uapores ab alimento procedentes inspissatur, & ob id quod non effletur immodice concalescit. Curantur autem hi in principio quidem constrictione & colligatione extremarum corporis partium, frictioneq; brachiorū, cruriorūq; ac coxarum: sæpe etiā extremitatum cōmpressionem, ita ut præcipiamus ipsis ut desideant, & decubitus quoque formæ erectiorem faciant. Quosdā & lectica gestare expedit, donec alimentū omnino subductum digeratur. Ante augmenti tempus diligentiore totius corporis curatione utendum est, studio adhibito ut carnem mollem & humidam reddamus. Vitis itaque eis tunc ex oleo inunctio existit parum nitri habens admixtum. Inclinate autē morbo & uigore præterito, aquæ infusio ad manus pedesq; lauandos commoda est, quo tempore aliquando & calidæ plurimum potum non improbo: nos enim remittente morbo, & paulo longioribus existentibus interuallis, plurimos ante cibum lauesimus, & uehementer iuuimus. Perfectiore autem declinatione apparente, etiā uinum exhibendum est, quo tota affectio corrigatur. Cibi autem sint facile digestibiles, & quibus cōcoquendis corpus sufficit: quos diuidere etiā conuenit, maxime si bis cibum sumere sint aduersi. Quod si in uisceris inflammatione, adstrictionis stomachi accessio contingat, illam ipsam prius curatione aggredi ac demoliri oportet, per fomentorum & cataplasmatum adhibitionem. Cæterum hæc ipsa adstrictionis stomachi accessio frequentius in eis apparet, qui hepar præter naturā dispositum habent.

De humoribus à capite in uentrem destillantibus, ex Galeno.

Cap. XIII.

Capite ex intemperie affecto ut multa generat superua canea recremēta, omnibus subiectis organis inde nocumētū inferunt, recrementis uidelicet ad ipsa delatis, & promptissima quiddē ad os & ad nares delatio existit: deferuntur autē & ad thoracē, aliquibus etiā ad aures. Delationē autem ad os, stomachum excipit atq; aspera arteria. De aliorū sanè mēbrorum nocu-



mento, iam prædictū est. Quū uero ad stomachū fluxus deferatur, & frigidus existat, ad frigidā intemperiem corpora perducit, calidus cōtrā in calidam: hic exulcerat quoq; tēporis progressu: in principio uero appetitui nocet & cōcoctiōni. Si igitur frigidus fuerit defluxus, tardas cōcoctiōnes & cruditates efficit: si uero corruptus, in corruptionē adiget cibos: unde nidorosa, aut foetida, aut acida eructationes producuntur, aut etiā alterius cuiusdam quæ nomināri non potest, aut etiā nomē habentis qualitates. Vbi uero altius decesserit nocumentū, etiā intestinum ieiunū afficit, & ad cōlum usq; pertingit, atq; ad uenarū mesenterij uasa, per quæ ad hepar ipsū alimēti distributiō contingit. Et quibusdam quidem deest appetitiōnis accedat: alijs uero appetitiōnes rerum præter naturā, quas appellat caninas, aut etiā dīborū uitiosorum cōcupiscētiæ. Optimū itaq; est in his uelut fontē malorum excindere: capitis uidelicet sanitati prospiciendo: aut si hoc impossibile sit facere, ob uehementiam naturalis intemperiei: omni no tamē eius salutē cōsulare oportet: indicatiōe ex figura eius accepta, quomodo ei subueniri possit: non enim quēdammodū aliqui medici, qui ad omnes diuturnas capitis affectiōes semper ex thapsia & sinapi cataplasma imponunt, sic & se facere uolo. La-uacris itaq; multis calidis potabiliū & dulciū aquarum cōsolari eos oportet, discussis simul calidis in capite uaporibus, & omni tēperamēto melius permittitur. Nocturnus autem est eis usus aquarum naturalium calidarū: quæ cum eis eis sulphurelentiæ sunt, ac bituminosæ, ob caliditatē suā capitis naturā calidis aduersantur. Quæ uero aluminosæ, coarctatione sua caput offendūt. Solis itaq; dulcibus aquis citra læsionē uti poterint. Quicūq; uero ualde calidum ac perustū habent caput, his melius est ut æstatis tempore uenturū optimo rosaceo, ex solis rosis ac oleo omphacino præparato, Aliquādo uero caput euaporationes calidas ex uentre suscipiens, dolore ac intemperie afficitur. Et propterea utrūq; curā habere oportet, ipsiq; robur indere, ut biliosus humor aut omnino nō colluat in ipsū, aut quādam celerrime euacuetur, atq; hoc per absinthij, & picræ ex aloë cōpositiōnis potiū. At uero quæ forissecus adhibēt utri in his ungēta, moderate sint adstringētia. Tale autē est æstate melinū, hyeme uero nardīnū. Aut mulierū ungēta quæ foliata & spicata appellant. Nam & ipsa calefaciunt ac roborant uentrem. Vere autē idoneum est mastichinū. Quodd si non solū caput calidos serosos humores ad uentris locos demittat, sed etiā ipse uenter propriā intemperiem calidā habeat, refrigeratibus eduljjs ac potibus & illitionibus semper uti conuenit, ita ut plus aut minus permittatur, iuxta anni tēpora temperamēto ipsorū aucto, aut remisso. Cæterū grauis mixtura est, quā aut in uentrē calidū defluerunt ex capite frigidi ac pituitosi humores, aut in frigidū calidi. Intra stabilius est autē ea, in qua in calidū uentrē pituitosi ac frigidi humores deferuntur. Pessima uero ubi cū his etiā uenter supprimitur. Corrumpuntur enim humores in uentre morā trahētes, ut & mordeāt ipsū, & uitiosos

uapores ad caput remittat. Etenim pituita in uentrē deflūsus calefacientibus ac attenuandis opus habet. Os autē uentris ubi natura calidum fuerit, a calefacientibus. Quare conari oportet in his, ut pituita in uentrē deflūctem, per ea quæ nō ualde calefaciunt fecemus. Quale est acetum multum simplex, cuius præparationem inter cōcoctoria referemus. Quū uero pituitosus humor a capite in frigidū natura uentrē deflūxerit, huius affectiōnis medela facilis est, si manes simplex pharmacū ex tribus piperis generibus cōstans sumatur. Sed & solum piper exacte tritum, aquæ ammixtum bibere licet. At uero absinthij potus ita affectus ualde aduersatur. Pituitosum enī humorē ipsorum uentri infarct. Sed neq; aloë sola per se ipsam his prodest. Biliosi enim humoris attractoriam uim habet, non pituitosi. Et propterea bene inuenta est compositio pica appellata, quæ propter aliorū acrimiam ac calidorum ammixtionē crassos ac uiscosos humores secat. Verū fieri nō potest, ut quis hac alsiduē utatur, quēdammodū ea quæ ex tribus piperis generibus constat, & similiter quæ ex calamintha. Etenim si omni hora etiam his utatur, quæ frigida utrūq; intemperie laborat, nullum amplius nocumentum experietur.

*Dieta conueniens his qui stomachum habent distolutum, alium autem adstrictum.* Cap. xv.

Grauis & ægrotabilis cōplexus huiusmodi corporis apparatus ac dispositio existit, in quo dissolutū, & nauasibundū est os uentris, quod stomachi quoq; appellatione uenit: alius uero est adstrictus: quæcūq; enim ipsam ad egerendum impellunt, ea omnia stomachi subuertit, utq; & in eo cibi innatent, & nauasibundus sit efficiunt, ad quæ necessārio consequitur, cibum quoq; non probe concoqui. Si uero rursum ea quæ stomacho grata sunt edulia eis exhibueris, ad tres aut quatuor diēs alius inde adstringitur. His igitur in tempore dicta cōstitutā est, ac in principio quidem exhibenda sunt olera ex oleo & garo condita, & alia quæ uentrem emollire consueuerūt. Postquam uero sufficiens nutrimentum ingesserint, ad extremum aliquid eorum quæ stomachi corroborant, accipiant: uelut sunt poma & pyra, & aliqua masculi punic genera, quæ citra acorem adstringunt. Ipse autem homo affectus, omnibus his partim experimento cognitis, quodcumq; tandem minime nocuum & iucundissimum reperiit, deinde utatur: neq; tamen multum ex singulis horū generibus acceptandum est, sed quantum imbecillitati stomachi, curandæ suffecerit. Facile enim solubilis alius ita adfectus sit, quando, ut dictum est, a cæteris cibis aliquid eorum quæ stomachi adstringunt comederint. His enim os stomachi corroboratum, ea quæ uentri innatant, deorsum propellit.

*De stomachi inflammatione.*

Cap. xvi.

Os uentris quēdammodum & ipsū hepar, eorum quæ adstringūt complexu semper quidem opus habent, multo maxime uero ubi fuerint inflammata. Si enim per laxantē dietam ac ductū, citra eorū quæ corroborant admixtionem curentur, periculum uirtutis incurrit. Medicū namque qui laxantē dietā in eis utitur, uelut est oleum dulce per se, animi deliqui ipsi autores existunt: neque enim ullum noui stomachicum aut hepaticum, qui in eiusmodi medicum incidit, seruatum. Oportet itaq; siue oleū sit, quo

quo inflammationem patientes fouentur, siue capsula ipsi imponatur: semper aliquid ex adstringentibus amiscere: uelut est unguentum nardinum, aut melinum, aut ipsum malum cotoneum in oleo decoquere, mastiche simul ammixta. Ceratum autem quo assidue in stomachi inflammatione utor, hoc est. Ceræ tyrrenicæ unciam unam, ungueti nardini tantum, uel quantum sufficit, aloës dra. i. mastiches dra. i. Quod si maiori adstrictione indigeant, tãta nimirum imbecillitate & dissoluzione existente, ut neq; cibos cõtinere possint, omphaci succi sicci dra. i. aut succi absinthij tantumdem est ammiscendũ: aliquid quando etiã ambos addere oportet, & tertium quod ipsis conuenit, hypocistididis succus existit, & œnanthes, & rhois rubri succus, iuxta eam quæ adest uide licet dispositione. Cerat autem amplitudinem augere oportet iuxta proportionẽ & mensuram reliquorum pharmacorũ: ueluti si quatuor drachmæ aliarũ rerum congregentur, cerati nardini uncias quatuor esse conuenit, duas quidẽ ceræ, duas reliquas ungueti nardini. Quod si durius adhuc pharmacũ ipsum appareat, apponendum est unguenti nardini quantum omnino satis erit. Aliud ceratum. Ceræ trientem, rosacei unci. x. gallarum, aluminis fisisi, aloës, florũ rosarum, mastiches, singulorum drach. i. Vtere in his qui uehementi adstrictione opus habent. Cataplasmata autem inflammatis conuenientia, sunt ex hordeo & semine lini, melleq; & unguento nardino, modicoq; uino, adiecta mastiche & absinthij coma. Ad diuturnas autẽ inflammationes & iam induratas, magis uaria pharmaca adhibere oportet: quæ & emolliendũ generis & discussiorum existunt: ueluti est quod sit ex serula campana, seu meliloto. Compositio autem eius multorum modorum est, propterea quod omnibus iuxta præcordia infirmata cõducatur: magnaq; differentia eius sub alia atq; alia forma apparatũ existat: alius enim apparatus circa stomachũ inflammationibus, alius inflammato hepatis, aut spleni utilis extat. Epithema stomachi, quod Philagrius composuit, & frequenter apparatur. Ceræ quadrantem, œnanthes unc. i. aloës sextantem, mastiches sextantem, ammoniaci thymiamatis, bdellij, cuiusq; unciam i. adipis asnerini trientem, styracis unc. i. œsypii bessem, olei rosacei libras ii. uini quantum sufficit. Stomachicũ contusum, Andree Comitis. Cyphæos, styracis, terebinthinæ, cuiusq; quadrantẽ, bdellij, aloës, mastiches, cardamomi, cuiusq; sextantem, comẽ absinthij unciam i. propolis trisẽtem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, ceræ unc. x. conunde & utere. Ceratum emolliens & relaxans ad induratas inflammationes. Olei testarium i. aque cyathũ i. adipis suilli recentis sexuncẽ, ceræ trientẽ, chamemeli quadrantẽ, cillẽ quadrantẽ, anchuse sesquĩciã. Epithema ex meliloto, Orisafij, meliloti bessem, ammoniaci thymiamatos quadrantẽ, bdellij quadrantem, myrobalanorum sextantem, œnanthes sextantem, cardamomi unc. i. croci, cyperi, iridis, myrrhæ, zingiberis, aloës, amomi, spicẽ celticẽ, casisæ, cuiusq; unc. i. ceræ librã i. terebinthinæ unc. x. vi. melini, aut nardini aut rosacei lib. i. Aliquãdo & succi balsami thymiamatis sextantem, rosacei aut nardini lib. i. modico uino in pila conterito: reliqua uero in uino diluto, & liquefactis quæ liquefcere possunt, affusisq; omnia simul unio ac uitõr. Aliud ex melle

loto, ad omnẽ præcordiorum induratum inflammationẽ, & ad colicos ac dysentericos, quod & in Alexandria apparare cõsueuerunt, quo uti soleo, hoc est: Meliloti, cyperorum, myrrhæ, nardĩ celticẽ, cuiusq; unc. i. croci drach. viii. cardamomi drachm. viii. cyphæos drach. x. vi. ammoniaci thymiamatis drach. x. i. terebinthinæ drach. l. x. x. x. ceræ drachmas c. l. x. olei cyperi drachmas c. x. x. uini quantum sufficit. Epithema ex mastiche. Terebinthinæ dodrantẽ, ceræ unc. x. viii. mastiches dodrantem, adipis taurini dodrantem, mellis lib. ii. rosacei lib. ii. Epithema aliud, ad induratas stomachi inflammationes, & ad omnem duriciã, ac diuturnam in ipso affectionem: in senibus præsertim & qui uergentis sunt ætatis, ex perimento clarum. Colophonis pellucidæ sextantẽ, ceræ puræ unc. i. mastiches puræ unc. i. olei cõmunis coctare unũ tantum. Omnia depurata in ollam coniecta super carbonẽ liquefacto, assidue agitando, donec exploratũ habueris quod in frigida aqua destillata in passilli modum emollire ac cogere possis. Vtere, non cõtempta ipsius utilitate. Epithema stomachicũ ualde celebre, ad stomachi inflammationes & duricias, itemq; debilitatẽ. Micarũ filiginearũ quadratẽ, carnis palmarũ pinguium unc. i. meliloti unc. i. comæ absinthij drachm. iiii. mastiches unc. i. aloës drach. iiii. adipis asnerini recentis sextantem, ceræ quincuncẽ, olei amari præ immaturitate acerbi sexuncẽ, styracis unc. i. pilularũ chamæmeli uncã i. palmas, melilotum, chamæmela, ad uesperã in spumam maceranda conijcito, & sequenti die lento igni decoquito, exprimito & percolato, atq; in decocto micæ maceratas rursus percolato ac conterito: sty racem uero per se cũ pauco oleo liquefacto, atq; ita solum midis tritis ammisceto, & ceratũ affundito: post uero liquefactis quæ liquefieri possunt, aridisdq; inspersis simul omnia in mortariũ diffundito, ac sub actis & simul unitis uitõr. Ante pharmaci impositionẽ stomachicũ ex oleo et modico uino irrigato, in quibus absinthiũ sit decoctũ. Emplastũ ex midis emolliẽs, relaxans, ac diffusẽs: facit ad inflammationes in quocũq; tandẽ loco induratas, emolliẽs, & discutieĩs, ac firmitatẽ addẽs. Radicis althææ lib. ii. phœnicobalanorum lib. ii. fœni græci lib. i. seminis lini lib. i. chamæmelorũ, melilotorũ, singuli sexuncẽ, utini ueteris odorati adstringentis sextarios octo, spumæ argenti, cerusæ, colophonis, cuiusq; lib. ii. ceræ lib. i. terebinthinæ lib. i. olei ueteris lib. ii. aquæ lib. ii. panis filigine aridi cõstũ & cribrati lib. v. Herbæ uero præmaceratæ, deinde decoctæ exuccantur, in succo uero panis contusũ & cribratũ maceratur. Sequenti deinde die spuma argenti & cerusæ in aqua teruntur, & adiecto eis oleo, donec nõ amplius manus inquinent, decoquantur, eisq; liquefacta iniunguntur: atq; ab igne ablatis, fermentata panis farina emollita paulatim ammiscetur, assidue tamẽ omnibus cum spatula agitaris: & post in mortarium cõiectis, ibiq; primum pistillo, post etiam manibus fortiter emollitis uitõr. Epithema Nilei, ad induratas tum stomachi, tum hepatis inflammationes. Ceræ lib. i. croci drachm. quatuor, ammoniaci thymiamatis sextantem, rosacei aut nardini lib. i. Crocum & ammoniacum aceto trita diluito: ceratum autem liquefactum & refrigeratum eis affundito, ac cõiunctis uitõr.

De stomacho exulcerato.

Cap. xvii.

Vlcere in stomacho aut uentre existente, omnium acrimiarum commestione abstinere oportet: succo autem pisinae, aut halicæ uel modico ammixto melle, quo per ipsum ulcera repurgantur & extergantur. In cibis enim exhibere oportet, aliquando quidē ea quæ ulcera repurgant, aliquando autē & quæ dolores mitigant, & mordacitatem obtundunt. Post purgationem uero quæ carne explent, deinde quæ ad cicatricē perducunt: uelut sunt ea quæ adstringunt. Forinsecus autem episthemata his conueniunt ex palmis & malis cotoneis, ac polenta. Ceratum uero imponendum ex melino aut rosaceo, ammoniacō thymiamate, & thure ammixto. Episthemata autem eis conueniunt Nilei. Et tempore inductionis cicatricis emplastrum ex salicibus, & quod Icesum appellatur.

De his qui a stomacho, comitialis morbi modo conuelluntur.

Cap. xviii.

Quidam homines ubi diutius ieiunij permāserint, præsertim cum tristitia interim affecti, aut ira concitati, aut curis anxie torti fuerint, comitialis morbi accessione comprehenduntur, & conuulsioni cōuulsū. Plures autē eorū qui hoc modo afficiuntur, gracilis habitus sunt, & assidue bilis in stomacho ipsis effluerescit. His sanē stomachus subtiliore sensu præditus existens, & cerebrum per consensum affectū, uniuersum corpus conuulsioni modo landnat. Commune autem consilium omnibus hominibus medicinæ quidem ignaris, rationatione autem non inexercitatis subijciam, ne quādamodū plerique uulgo homines rationis expertiū animalium more uiuāt, eorūque modo se habeant: uerū per experientiam iudicet, qui cibis ac potus eis noceant, ite quales ac quāti officiant motus. Similiter autē et circa rei uenerēque usum obseruet, nū innocuus eis existat, an cōtrā nocuus: multos enim noui, qui ex rei ueneræ usui maximū periculū incurrerunt. Oportet itaque hos ipsos bonā & exquisitā cōcoctionē sibi puidere: & tertia aut quarta diei hora panē diligēter apparatus accipere: solū quidē, si non sicculosi existant: si uero uergēte, ex uino diluto modicoriter adstringente & albo. Hæc enim uentrem corroborat, & caput nō percellunt, quædam dū fortia facere cōsueuerunt. Exhibere etiā eis oportet ex aloē pharmacum, bis aut ter in anno. A superfluis enim recrementis totum uentrem repurgat, & ad propria munia obeunda efficaciter corroborat. Vidi autē & alios in ore uentris comitialis morbi modo conuulsos, quum uehementi cruditate laborarent, aut uino multo meraciori se ingurgitassent, aut interpestius re ueneræ fuissent usi. Quosdam etiā in febribus uidi repente conuulsos: qui bilioso uomitu succedente, euestigio ab omnibus afflictionibus sunt liberati. Quidam autem ex ita affectis fusa uomuerunt: quidam uero porri succo consimilia: quidam a multitudine uitiosorum ciborum aggravati, sensus ac motus priuati munere a sopore grauissimo sunt apprehēsi ac detenti, quousque ea quæ os uentris compresserāt, omnia euomuerunt. Multis uero, nō infamnia modō, sed & somni perturbatēs, & deliria, ob uitiosum humorem in ore uentris congregatum, accesserunt. De inflatio autē & præcordiali apellato morbo, nullus est qui non uerba fecerit, quo modo uidelicet tristes, et desperatēs, & moesto adpectu reddat, & (ut uniuersum dicam) nulla re ab his

qui atra bile afficiuntur differētes aut inferiores. Apparet autem & hos uehementius post cruditates prædictas accessioniibus appropinquandi: plerique autem ex ipsis splendetis sunt: quæ res facit ut æstimentes, & quendam ex splene confluere in uentrē uitiosum aserosum humorem. Curatio uero his conuenit eadē quæ ad affectos ab atræ bilis delirijs est prædicta, in eo quo de capitis affectiōibus egimus Sermonē. Itē ea quæ paulo antē est descripta, de his quibus atra bile stomachus infestatur, & qui uentrem habent inflatum.

Viridis iaspidis usus, Galeni.

Cap. xix.

Viridis iaspidis lapis stomacho, qui & os uentris appellatur, utilis existit pro amuleto appensus, cuius re multum experimentum fecimus. Oportet autem si lo innexos ex collo suspendere, eo modo ut lapides os uentris contingant.

De appetitus perditione.

Cap. xx.

Ventrem natura promptuarium creauit, uelut terrā plantis: dedit & indigētiam sensum, cuius impetu animata ad cibum aptum concitata, his se explant: & uocatur quidē eiusmodi expletionis desyderiū, Appetitus. Contingit autem ob indigētiam sensum, quum uenæ ex cibis in uentre ad se attrahunt, uelut emulgentes & exugētes: quam exuctionem quum uenter ferre non possit, sed inde uelut diuellatur, huius angoris remedium cibum exquirat. Itaque exuctionis sensus, ipsa fames existit, & Appetitus appellatur, naturale opus, non animale existens. Huiusmodi autem appetitus euacuatio præcedit: & contingunt sanē quinque accessiones ordine mutuo se ipsas consequentes: Quarum prima, Euacuatio est: secunda, Appetitus naturalis membrorum euacuationum: deinde per uenas ex uentre Exuctio: post, Exuctionis sensus: tertio, Appetitus animalis, qui omnium postremus existit. Itaque appetitus perditio contingit, aut ob sensus exuctionis uenarum perditionem, aut quod exuctio non fiat, aut quod corpus non euacuetur. Contingit autem sæpe etiam ob immoderatam uentris & intestinorum fluxionem, & ob bilioso humoris in uentrem delationem, tenacitatem & acris, ac porri speciem habentis: & ob pharmacipotionē, & ob sanguinis immoderatam detractationem: & in continuis ac uehementibus febribus, stomachicis & uulnæ. Contingit etiam in colica & uoluituosa affectione. Maxima autem quod quis non esuriat, causa caliditas existit, quæ solida corpora laxando exoluit, & ad attractionem imbecilliora reddit: humida autem diffundit, atque amplius extendit. A plurimis etiam alijs causis appetitus perditio contingit. Itaque si iuxta principium morborum accesserit, aut iuxta uigorem, quum uires adhuc sustinere possint, nihil molestiarum inferat: modico enim alimento ægri opus habent. Si uero in declinatione totius morbi appetitus perditio accedat, aut in disuturna imbecillitate, aut uiribus debilitatis, aut ex immodica euacuatione, periculo non uacat. Augeret autē affectio hæc & ab ætate. Incomode enim hoc malo pueri afficiuntur, uixit qui natura uoraces sunt, & assidue fomite opus habent. Quare magnus præternaturam excessus significatur, si pueri appetitus perditione fuerint affecti. St quidem igitur ex uitiorum humorum præsentia, appetitus perditio contingat: antequam

antequam aliam curam adhibeamus, delatos in uentrem humores, uomitu reiiciendos præordinabimus. Quod si ægre uomant, sorbitiones exhibere oportet, quæ eiusmodi humores infernè expellere consueverunt. Deinde per ea quæ ad hanc rem comoda sunt, corpora ad bonum perducemus temperamentum. Si uero ex uisum imbecillitate appetitus perditio accedat, considerare oportet qualis intemperies uires exsoluit, & per contraria eam ipsam corrigere. Si uero ob inflammationem, aut obturationem alicuius alterius membri, appetitus perditio concomitetur, tum & illius habere curam conuenit. Conandum est etiam ut per odoramenta appetitus reuocemus; per potentiam uidelicet posca madefactam, aut uino odore diluto, aut malorum confectionum decocto, aut pyrorum, aut cucumerum uiridum maturorum cremore. Inunctione item leni & non nimium sedula idem conabimur, ac moderata corporis frictione, atque etiam pedum ac manuum palpatatione ac cõrectatione accurare. Inessus etiam lumbos ac pectinè amplectentes adhibendi sunt, & aquæ affusiones, ac gargarisationes: absorbtiones quoque aquæ frigide modicæ & dulcis. Ab istis enim molissimè sæpe ad accipiendos cibos profecerunt, quin & digitorum in os immisione stomachus lancinatus sæpe ad accipiendos cibos est conuersus, quare hoc ipsum tum ante curationem, tum post eam est faciendum: eorumque enim aliquid biliosa aut pituitosa quædam, quæ perditum appetitum in quibusdā sunt causa, atque ita ab hac accessione eos liberabis. Cibi apparentur plures & uarij ac optimo apparatu, & ultra dulcedinē etiā illicientes & appetitum iritantes: frumentacei in primis generis, ac multi alimēti: uelut est halica ex decocto palmarum, aut prunorum damascenorum lota, aut ex aqua mulla diluta præparata, oua forbilia, panis ex calida aqua lotus, aut si ita aduersi fuerint, frigida. Diuitibus autem, gallorum testes exhibendi sunt, & ex uolucris non grauiolentes, & matracæ ac montanæ: pedes suilli in decocto ne plurimum eliquati. Eiusmodi enim cibos si gusta uerint tantum, sufficiens alimentum deinde corpori offerendum est. Omnia autem quæ exhibentur, eiusmodi esse conuenit, ut facile deuorari possint: quæ enim multa commanducatione indigent, inuicunditatem quandam afferunt, & appetitum auerunt. In his uero qui ita prompti sunt, cupiditatem cibum accipendi, cõcedere oportet ne sufficientem mensuram excedamus. Considerare etiam oportet, num ob naturalem infirmitatem, aut consuetorem ciborum cupiditatem simulent appetitus perditionem: quod si ita contingerit, quantum in nobis est, grauius oburgatos ad monebimus, ne uilibus negligant obtemperare. Quod si non obtemperent, sed præ alimentum negligentia contabescant, uicissim contemnere ac negligere eos oportet, ac cibum parum deteriorem exhibere: postquam primos affectionis dies, cataplasma ex palmis, malis, cœnanthe, absinthio, & aloë stomacho imponere: licebit & ceratis uti ex eadem materia apparatus.

De appetitu canino.

Cap. xxj.

Contraria appetitus perditioni affectio est, quæ caninus appetitus appellatur: plures enim cibos appetit, atque quæ appetit cohibere nequeant, in ingerendis nimis cibis modum excedit: deinde multitudine

eorum aggrauati, & assumptos citra nocumētū ferre nō potētes, ad uomitum diuertunt: deinde rursus cibo se explentes, rursus ad uomitū reuertuntur, quæ admodum canes: hoc autem aliquādo & ad uomendi consuetudinem delabuntur. Sæpē etiam alijs affectionibus obnoxij sunt, cœliaciis uidelicet & dysentericis, atque aquæ inter cūtem: propterea quod prius quam priores cibi sint cōcocti, alios ingerant. Quod si huius accessiōnis causa humor quispīam uitiat & acidus existat, qui os uentris mordet & iritet, appetitumque excidet: frigidus enim humor uitiatu exuactioni consimilem mordacitatem infert, ciborumque appetitionem excusitat, & affectionis naturalis, quæ famem appellatur, modo corpora ipsa uacua reddit, tuniculis eorum coactis & adstrictis: quapropter & egestionis multæ ex ipsorum uentribus procedūt, crudis existētibz nimirum cibis, aut semicoctis. Itaque ubi cognouerimus ab humoribus pīuitosis & acidis fieri hanc affectionem, qui in ipsum os uentris impactū, ac uelut aqua in spongiam imbibitū, cogant, & iritent & ad appetitū excuscent, pīcrū appellatum pharmacum conuenienter exhibebimus, quod non tantum calefacere potest, sed dissiccare, ac repurgare, extrahereque ex profundo oris uentris imbibitū humorem, & per aluū inferne euacua: re: quin & robur uentri addit, ut ne facile nocitū humorem susceperet. Exhibeatur autē pōdere drachmæ quatuor ex uino cum aqua calida diluto: si uero puer hac affectione laboret, & ob amaritudinem bibere nequeat, si quidem possibile fuerit, in catapotia drac. duas huius pharmaci digeremus, melleque forinsecus oblinentes deuoranda dabimus cū ouis forbilibus aut pistana succo: quod si neque sic tolerare queat, ea quæ dissiccare & repurgare calefacereque possunt, in cibis annexemus: ueluti sunt allia, porri, thymus, satureia, origanum, pulegium, & quæ his similia existunt. Potum autē præbebis ante cibum multum ac acuatim bibendum, calidum sanè aut certe tepidiorem. Sorbitiones item appetitum destruentes, ueluti sunt pulres cum melle multo & oleo pluribus, aut adipe anserino, gallinaceo aut suillo: ex oleo rībus cōuenit malua, cerebella item & pinguior uolucritū partes, pisciumque eodē modo, & omnino quæ appetitū auertunt, ac satietatem inducūt, & quæ magno cumulo accepta, modicæ alunt. Ammiscere etiā cōuenit panibus dū fermētāur acriora & uiridiora, similiter & uino quod in potu sumunt, uelut est cūminum, anisum, petroselinum, & quæ eius generis existunt: ad uinū etiā piper & mel & spica nardi ultra ea quæ dicta sunt, cōiiciantur. Panis uero nō sit recens, neque ualde bene fermentatus. Vinū uero quod bibunt, colore fuluum, substantia tenuē, odorūque, & nō ualde uetustū. quod tū ieiunis, tū sumpto cibo plurimū præbeatur, quantum uidelicet bibere possint. Ventre enim ex caliditate, & humorum destruitur acor, ut sæpe solum suffecerit cum pinguis & oleosis cibis ad perfectam curationem. Abstinerē autē oportet ab omnibus acidis ac adstringentibus cibis ac potibus, maxime uero à fructibus. Bellaria eorum sint pistada, amygdalæ, nucēs pineæ, colymbades etiā oliuæ exhibendæ ex melle. Conandum est etiā, ut lac ipsi exhibeamus, tum per se, tū passio aut melleista tamen ut obseruemus ac uitemus in eis, quibus in stomacho accrescere consuevit in his

A enim

enim maius nocumentum quam utilitas consequetur. Probe uero concoctum non solum appetitum obducit, sed & aluum obstruat emollit, fluxionesq; eius sistit, apparandæ etiam ex ipsa lacte potiones & placentes, ueluti sunt dulciaria & oryza. Viscera uero cataplasmate hordeaceæ farinae contingere utilissimum existit. Lauare autem per interualla oportet, cuticulamq; ipsorum large pinguefacere.

De canino appetitu, qui ex immoidea transpiratione, ac cutis exolutione contingit. Cap. xxii.

Est & alia canini appetitus species, quum uniuersum corpus rarius existens, & per obscuram respirationem exhaustum, præter modum in assidua alimentum indigentia constituitur. Cōtingit autē id, aut ex facultatis retentiuæ in toto corpore imbecillitate, quæ debis dominari nō potest; aut ob plurimi caloris fortitudinē, qui instar ignis cibos consumit, & curē rarefacit, ac exhalationē efficit. His sanē uētris egestionē lōge pauciores procedunt, quā pro eorū quē ingeritur modo ac proportione. Est stercorea quæ egerūt, existunt sicciora. Itaq; pharmaci ex aloē eis insensil simū existit, item extenuatorij generis & discindentes tum potiones, tū cibi. Cūtem enim magis rarefaciunt, exhalationē mouēt, ac appetitū augent. Quare eorū qui hoc modo affecti sunt, cutē cōdensare ac spissiorē reddere melius est, cū oleo quopiā ex immaturis oliuīs expresso, in quo myrtus, aut rosæ, aut eius generis quippiā ad lentū ignem sint decocta, admixto etiā alumine scisso in aceto acerrimo prius trito, intantū ut ad strigementidam formam unguentū reduci possit. Abstineant autē ad balneis calidis, consimiliq; aëre, ac uini potu, & ab omnibus quæ tum intrinsecus calescere possunt. Ducantur ad lauacra frigida, si quidem nihil id fieri prohibeat, utpote corporis gracilitas, aut membrum aliquod refrigeratum, thorax nimirum, aut aliud quoddam. Cibi eis exhibendi sunt stabiles, & ægre corruptibiles. Eius generis cochleæ existunt, & totum ostreorum quæ testis integuntur genus, si ex duarū aquarū reiterata decoctione appareatur: & polypi eodē modo. Carnes suillæ in uigore existentes: maxime uero uētres & uulue. Bubulæ quoque pinguiorēs, & omnia simpliciter pinguis, & quæ uentri innant, tardeq; concoquantur, ac digeruntur. Ex ouis, ea quæ coquendo sunt indurata, aut sartagine fricta. Et similiter, quo absque melle ex pinguius iusculis apparata, similiter & dulciarij panes, & oryza, & panes nō fermentati. Iuxta proportionem autem quantum accessio imminuitur, tantum ex crassi humoris cibis est detrahendum, & ex adstringentibus forinsecus admotis imminuendum. Aliquando enim sedata uehementis appetitus accessione, in aliud grauius malū transido contingit: nimirum quum corpus ex crudis & crassis humoribus repletur.

De uitioso appetitu, ex Galeno. Cap. xxiii.

Vitiosas ciborum qualitates concupiscunt, qui in uentris uētris superfluum uitiosum recrementū imbibitū habent: id autē maxime mulierculis uitioso humore repletis euenire solet, quum uterum ferunt, & uocatur hæc affectio pica. Concupiscunt autē in ea maxime quidē acida & acerbā, aliquando etiā acrida, quandoq; etiā terram, aut testas, aut extinctos carbonēs, aut alios quosdam absurdos cibos: atq; hoc affectu plures ex ipsis infestantur usque ad secundū aut

tertium mensem completum: in quarto uero quiescere incipit malum, partim quidē uitioso humore per uomitū euacuato, partim uero cōcocto & per tēpus consumptō, utpote quū mulier modico cibo usa sit, propter appetitus ab eduljīs nutritibus auersionē: quin & foetus in utero auctus plurimū alimentum ad se trahit, adducto simul cū sanguine & uitiatō humore. Porro idē affectus uiros quoq; infestat, quū & ipsis uitiatūs humor quipsiā ad os uētris fuerit delapsus. Cōueniēs autē eis remediū, Amazonij passillus potatus existit: post uero etiā ex aloē cōfectio pica appellata. Euacuato autē plurimo uitioso humore, exhibendus est eis mali punici dulcis succus, mēta sicca inspersa, aut aliud quippiam eius generis, quod est ad stomachi subuersiones ac nauseas præscriptū. Cōueniunt etiā muria cōditæ oliuæ albæ, & quæ colymbades appellātur. Itē amygdalæ amaræ & ieiunis acceptæ, & antidoti ad letalia pharmaca aptæ. Quo modo uero ad pica appellato morbo mulieres infestatas curare oporteat, in muliebris remedijs dicitur.

De cruditate, Galeni.

Cap. xxiiii.

Concoctio, est iuxta qualitatem permutatio, quæ nutriti potest. Contingit autem a uentre sibi ipsi cibos assimilante: quapropter manifestum est, quod circa permutacionem, offensæ concoctionis accessio continget. si itaq; cibi in totum non permutantur, cruditas ea accessio appellatur, & est perditio & perfectæ priuatio actionis: si uero permutantur quidem cibi, uerum non ut oportebat, uitiatam significat concoctionem, non autē ut antea eius priuationē: aut enim tardat, & nunquam propriā transmutationem suscipit, & difficilis cōcoctio appellatur: aut cibos omnino non corrumpit, ac transmutat in alienam qualitatem. Atque hæc quidem concoctionis offensiones existunt. Causæ autem ipsarum sunt intemperies uentris, inflammationes, scirrhi, abscessus, & quæcunque eius generis existunt. Aliquando autem uentre nihil male affecto cibi crudipermanens, aut propter immoderatam ciborum ac potuum ingestionē, aut ob uitiosam ipsorum ciborum qualitatem, aut ex intemperstia, aut etiā inordinata sumptione, aut ob recrementum uitiosum, aut ob uigilias. Cæterum ex uitiosis ciborū qualitibus, & recrementis quæ iuxta uentrem consistunt, cum corruptione cruditas oboritur: aliquando & ex inordinata sumptione, si quidē poma, aut mala punica, aut aliquid aliud tale primum comederint, deinde olera assumant ex oleo & garo, aut etiam alia quæ uentrem emollire consueverunt. Intemperstiam autem acceptionem appello, si prius quā prior probe subierit cibis, prædeat, aut etiam præter consueta horam. Corruptions autem sunt, nidorosæ quidem in calidioribus & biliosis moribus: acidæ uero in frigidiori bus natura & magis pituitosis. Eodē modo & de excrementis quæ in uentre præexistunt iudicandum erit: quæcūq; enim ex eis pituitosa & frigida sunt, acidas corruptiones efficiunt: quæ uero calida & amara bile mixta, nidorosæ. Ipse quoq; uentriculus aliquo modo affectus, si quidē frigidus morbus existat, acidas permutaciones facit, calidus uero nidorosus. Tardas autem concoctiones, cibi difficulter corruptibiles faciunt, & si ultra quā uires tolerant sumuntur, itemq; uigilias. Quum uero citra corruptionē perfectæ cruditas oboritur, ut quales accepti sunt cibi, tales permaneant iuxta omnem

xxa omnem

xtra omnem suam qualitatem, ex hoc cognoscere datur uisum esse uentriculum, aut ab immoderata ciborum multitudine, aut per uehementem refrigerationem insiti caloris. Vt nequis igitur in crudelitatem incidat, cautione in omnibus prædictis est utendum, ut neq; in multitudine, neq; in qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neq; in acceptionis oportunitate, neq; in ordine delinquat: & ut quæcunq; concoque re ualeat, ea tantum ingerat, & non quæ appetitus expouulat: mensuræ enim maxime omnium diligenter respectum habere oportet, appetitûq; refrænare, & neq; plus quàm uires tolerant accipere, neq; quæ natura diffuciliter concoquuntur, ueluti sunt carnes natura duræ: natura autem dico, uelut carnes bubulæ, & consimiles: etate uero, si madata animalia seniora existant. Cauendum est etiam à partibus carnis multo nutrimenti existentibus, & pinguiusculisq; cõdimento seruatis, ac uetustis. Ex oleis, quæ igneæ sunt naturæ, ualdeq; frigidarum quæ in statione parit, incõmoda existunt. Ex piscibus, qui duras carnes habent, et repositione arefacti. Abstineat quoq; à cibis corruptis & foetidis ac grauolentibus. Vitent fructus dulces aut flatus generantes & immaturos: bellaria quæ diffuciliter concoquuntur & olea ginosa, & quæ ægre diuidi possunt, uelut est sesamum, quod comanducationem ob paruitatem suam effugit. Non minus autem uitadi cibi peregrini & inconfueti ac medicamentarii uim habentes, quales frequenter placentis ac panibus immiscetur. Iuxta tempus autè accipiendi cibi neq; impetuose, neq; accuratim, neq; solidis partibus aut absque cõmanducatione eos ingerere oportet: neq; etiã potus cibum interpellat: id enim unitionem ciborû impedit, singulosq; uentri innatare facit. Ex condimentis uero oxyporon quoddam, quod cito penetrat, assu mere nõ incommodum neque iniucundum existit: maxime uero huiuscemodi. Caroi drachmas xvi. feniculi drachmas sex, seminis apij drachmas octo, ligni drachmas octo, amij drachmas octo, pipæris drachmas decem: aliqui autè & zingiberis drachmas tres, in frigidioribus temperari uis, omnia melle excipiuntur, & cû carnis ac piscis exhibeantur. Melius autem est cum cibo & pipæra maxime longum exhibere, in his qui magis pituita abundant: uelut si enim flatus crassitudinem dissoluit: & quæ circa præcordia consistunt, inferne ad aluum propellit: cõcoctionem etiam omnium maxime pipæra adiuuat, quod si forte non adsit, albo utendum erit: quod si neque hoc adsit, nigro. Utendum etiam aliis cõcoctionibus suauitibus pharmacis, quæ ad finem huius capitis sunt subiecta. Post acceptum cibum uexationes inæquales ac conturbantes uitandæ. Item æstus & refrigeratio: hæc enim concoctioni ciborum resistunt. Adiuuant autem eandem frictio pedum, calidius cõtuberniũ, & calefactio præcordiorû. Quod si grauitas adsit circa uentrem, & ex ea molestia quædam in uniuersum corpus diffundatur, expansa manu os uentris apprehendendum est, aut puerulus carnosus ad mouendus. Ex his enim sepe alimētum corruptio ni proximum est conseruatum. Cæterum quum ructus iniucundus proueniens manifeste corruptione factam indicat, citra cõtundationem ad uomitû uentis dum est, atq; aqua tepida ingesta, omnia corrupta ad excretionem cogenda. si enim in uentre permanse-

rint, & torfionû, & dolorû, & grauitatis capitis causa existunt: aliquando autem bilis superne ac inferne effusionem, aut profluuium uentris, aut etiam febres inducunt. Quare eos qui diffucili cõcoctione apprehendi solent, longo ante tempore adfufaciemus ut facile uomant: cõmodissimus enim in plurimis periculis uomitus existit. Quod si quis natura diffuciliter uomat, aut ob aliquam aliam incommodatam uomere impediatur, omni modo conandum est ut cibis subeat, & ex præcordiis deducatur. Ad hæc etiam cõtior decubitus appareat, ut ea quæ capiti subiciuntur sublimius infertantur, & reclinatio ipsa in sinistru latius fiat: atq; si quis uigilijs infestetur, citra corporis uexatione permaneat, eademq; decubitus forma obseruet: frequentes enim agitationes cibos perturbant, intestinaq; inflata reddunt, flatus autè cibum sursum uertere facit. Si uero quis ob nullam causam male dispositus sit ad frigidæ potum, non inconueniens erit cyathû unum aquæ frigidæ puræ absorbere: corroboratus enim inde uenter celerime quæ in ipso heget extrudit, & ad subiectas partes demittit. Sequenti deinde die in quiete æger assuetur, frictio neq; pedû utatur, & præcordiorû concalectio ne, donec murmura & flatus circa intestinû rectum eruperint, repositionesq; cum qualitate manuficiori recurrerint: & tunc sanè exurgere cõuenit, primûq; aluus ea quæ corrupta sunt egerat: deinde ad deambulationem moderatam æger procedat, atq; otium agat, propter commotos uapores ex corruptione in caput delatos. Post hæc autè ad quotidianas actiones mens applicada est citra perturbationem ac indignationem: deinde rursus uenter cogendus est ad eorum quæ reliqua sunt excretionem. postea quiete scire iubebimus, atq; aqua calidiore pedes persundere ac fouere: frigida uero pura facie prolata, in lecto quiescere omnibus conatibus somnum illiciendo. post quæ modica deambulatio, deinde balneum suscipiatur, quod calidius solito existat: cæterum resectis prius uiribus lauetur, corporeq; nitro cõsperso exudet, atq; hoc modo in calidius soliu descendat: deinde etiã in frigidû insiliens, largiore oleo uniuersum corpus pinguefaciat. Cõmodissimum est etiã aqua calida in balneo hausta uomere: uelut ablundo ea quæ in stomacho desident biliosa aut pituitosa. absinthij quoq; prælibatio à balneo quod cõuenit facit, & aliena uentri adgrentia extergit. A lauacro cibum capere conuenit moderatû, & cui cõcoquendo corpus sufficit. dabitur itaq; herinaceos marinos recentes, aut cancos fluuiatiles, ita ut ab eorû acceptio ne, maluam aut oua sorbilis, aut pisces in petrosif aquis degentes adsumant, & ex uolucris non graueolentes & macras. A reliquis autè carnibus abstineant, & à leguminibus ac cepis, salisamitisq;, & quæ eius generis existunt. A bellarijs item, & omnis generis placentis, & à fructibus dulcibus ac facile accelescentibus in uentre. his enim omnibus concoquendis egre sufficit uenter, ampliusq; instantis naturæ ea ipsa existunt. Non solum autem qualitates eorum quæ in cibo exhibentur permutatas esse conuenit: sed etiam multitudinis adhibere modum. ea enim quæ facile concoquuntur, his quæ non concoquuntur paria sunt, si præter modum ingerantur. Deinde uero somnus imperturbatus, & æqualis procuretur, illito utre ex unguento nardino. Pharmacum concoctio



nem adiuuans, ex malis cotoneis, Galeni. Pharmacū ex malis cotoneis conueniens est apparando appetui in his qui eum perdiderunt, conuenit & concoctio, in his qui non probè concoquunt cibum, & ut summam dicam, uentrem robustiores reddit, eisq; qui debile habent hepares, uile existit. Manifestum autē esse arbitror, quod si ieiunis exhibere hoc oporteat, mystri mediocris mensura, quanquam nihil offendat, etiā si quis a cibo ipsum acciperet. Recte etiā exhibetur, si pranso atq; inde coenare uolenti prae sumendum deur. Oportune uero duabus ante cibum horis datur. Apparatur autem hoc modo: Ex malis cotoneis maiora iucundioraq; & minus acerbā, quae uidelicet struthia appellantur, eligito, expressitq; eorum succi sextarios Romanos duos accipito, ac mel his quam optimi parē mensurā ammiscerito: aceti uero sesquicenturiū affundito, hisq; simul ad prunas ar dentes moderatē decoctis ac despumatis, zingiberis quadrantem, piperis sextatē adijcito: atq; hoc modō rursum ad arduas prunas, donec ad mellis crassitudinem perueniant, decoquito. Quod si magis adstringens ipsum facere uelis, etiam ex carne malorū cotoneorū appara. His uero qui intemperie uentris calida afficiuntur, & qui quomodocunq; itidem bile sunt repleti, magis cōuenit, zingibere & pipere de tractis, succū malorum cum aceto ac melle solo decoctum praescripta cōmensuratione exhibere. Quando uero mediā temperaturę fuerit uenter, ut neq; biliosa neq; pituitosa in eo aggregentur recrementa, dimidium praedictae cōmensurationis tum piperis, tū zingiberis radicis iniicere expediet, ita ut piperis quidē una l. zingiberis uero sesquiuincia coniiciatur. Si uero frigidiore temperamenti fuerit uenter, zingiberis triēs, piperis quadrās, aut unc. ii. s. ammiscatur. Licetbit etiam iuxta mediā cōmensurationē apparare, atq; ubi opus fuerit usus tempore reliquum adijcere. Pharmacū concoctio nē adiuuans, Diospolidicū appellatum. Conuenientior autē diospolidicū pharmaci usus erit, in his praesertim qui a siti dūcē insistant. Duplex autem compositio eius existit: aliquando quidem aequalibus omnium partibus cōfectis, cumini uidelicet & piperis rutaeq; & nitri: hoc enim modo magis aluū subducit. Aliquādo autem reliqua singula inter se pari pondere miscuntur: nitri uero dimidium aut quarta pars adijcitur. Praestat cuminum cōiectum aethiopicū esse, piper autem longum aut album. Cumini uero in acerrimo aceto maceretur, deinde moderatē torreatur. Sint & rutae folia praeparata. Recentia enim superfluo humore abundant. His autē omnibus tenuissimē tritis, mel despumatum sufficienti mensura ammiscetur. Aliquādo tamen sola haec citra mellis admixtionem trita & exsiccata, repostitāq; adseruantur, ac pisanā succo in sparguntur, aut alijs etiam cibarijs, quibuscunq; tandem maximē conuenire uidentur. Ammiscetur etiā ipsum mel usus tempore, exhibeturq; inde cochlearij mediocris mensura ante cibum. Porro peregrinationis tempore praestat ipsum pharmacum aceto subactum in pastillos redigere, atque usu expetente similiter cum melle exhibere. Crasso autem modo cōtundere oportet ea quae ad huiusmodi pharmacorū compositionem coniunguntur, ea gratia, ut ita uenter melius inde subducatur: tenuissimē enim trita & in puluerē redacta, ad emolliendam aluum inepa red-

duntur. Ceterum urinam nō modicam cient. Crassiora uero iuxta uentrem persistunt, quum angustia uenarū ora penetrare non possint. Pharmacū ex tribus piperis generibus, Galeni. Hoc autem modo dispositis, frigidum uidelicet & pituitosum habitum nactis ac inflatis, ex tribus piperis generibus pharmacum conueniens existit, si quidem nō nimis medicato ac uario modo appareatur, quemadmodū multi id cōficere solent: ut salis operosum sit eis, qui hoc accipiunt, ea quae ad eius compositionem ingrediuntur concoquere, uelut est ammium, & fesele, & ligusticum, & quae eius generis existunt. Talia itaq; ex pharmaco hoc sunt adimenda, ampliusq; & helenium, spicaq; nardi, & calsia. In promptu autem dupplicem eis apparatum habere conuenit, quemadmodum nos sumus consueui. Alterum quidem simplicem, his qui nō concoquunt cōuenientē, & qui recēti circa uentrem frigore, aut pituitoso humore adflicti sunt. Alterum medicamentarium, quo maximē in defluxionibus a capite ad thoracē utimur. Simplex igitur quo etiā ad crudos humores, circa primas & magnas uenas cōsistentes utimur, hoc modo habet. Ad quinquaginta drachmas uniuscuiusque trū piperis specierum, sufficit ammiscere anisi, cacuminū thymi, & zingiberis, singulorum drachmas octo, atque hoc sanē simplicius existit pharmacum: quamquam adhuc simplicius apparari possit, si citra zingiberis admixtionem paretur. Alterum autem ex iisdem cōstat: uerum ad quinquaginta uniuscuiusque trium piperis specierum drachmas, singulorum ex his tribus, aniso uidelicet, cacuminibus, thymi, & zingibere drachmas xvi. coniicimus. Pharmacum ex calaminta oxyporon, hoc est, citō penetrans, quod polyetes, id est, anisum, appellatur. Praedictorum quidem igitur pharmaco rum caliditas circa primas uenas extinguitur, minime per uniuersum corpus se diffundens: quemadmodum id quod ex calaminta constat, solet, & ei similia. Neque enim uolumus ea quae cum cibo cōcoctionis gratia exhibemus, in uniuersum corpus diffundi, sed tantū concoctionē ciborum in uentre adiuuare, itemq; humorum crudorum in primis ac magnis uenis contentorū. Quare quemadmodū in Diospolidico pharmaco dictū est, nō nimis in puluerē redigere oportet ea quae ad concoctionē solam adiuuandā apparantur. Hoc uero pharmacū in uniuersum corpus usq; ad eum ipsam digeritur ac diffunditur: quare ipsi ipsum exhibere cōuenit, quibus partium humorū multitudo in solidis animalis partibus consistit. In talibus enim, omnium quae ego noui optimū, id quod ex calaminta constat, existit. Attenuat enim crassa & uiscosa: adificuitq; ea similiter, urinamq; & menses det. Compositio autem eius talis est. Calamintae montanae, seminis petroselinij, pulegij, feseles, cuiusq; dra. xii. seminis apij, cacuminum thymi, sing. drach. iiii. ligustici dra. xvi. piperis dra. xlviii. mellis despumati quātum sufficit. Aliqui & zingiberis unciam unam adijciunt. Iucundissimū autem est quod plurimum mellis ammixtum habet. His uero qui dulcia auersantur, & a mellis usu abhorrent, parū in compositione ammiscatur. Quidam tamen mellis libras iiii. & dimidiā ammiscēt. Potest & absq; melle siccum adseruari, eodemq; ut reliqua modo salibus cōmisceri, edulijsq; ac liqua

ac liquamentis inspergi. A cibo uero nunquā, neq; hoc, neq; aliud quoddam pharmacum, quod uehementem penetrationem facit, accipiat: distribuitur enim ac digeritur simul cum ipso aliquod crudorū ciborum, & obturationem operatur. Vfus eius conuenit post matutinam frictionē, duabus ante exeretū balneumq; horis. Aceti multī apparatus ac usus, Galeni. Pituitosis in uentre humoribus etiā acetum multum conuenit, quod hoc modo apparatus oportet, Melle optimo ad prunas decocto ac despumato, dimidia eius mensura acetum affunditur, atq; ita rursus ad prunas decoquitur, quo ipsorum qualitates optimē permisceantur, & ne appareat gustantibus aceti acor. Ad eos uero qui aceti multitudine auersantur, hoc modo apparatus. Aceti pars una accipiat, despumati mellis duae, & aquae partes quatuor. Quod si fortius facere uelis, tantum aceti, quantum mellis coniicies, & absque aqua apparatus. Praestat autem iuxta sensum eorum qui accepturi sunt, mixturę congruentē modum iudicare, nō uero secundum quod nostri sensus percipiunt. Quod enim naturę accipientis familiarissimū est, id iucundissimū existit, & ob id etiā utile & accommodatum. Nocentissimū autem cōtrā est, quod minimē iucundū. Ceterū usus tēpore aqua calida mixturę, uelut uinum exhibendum est, prout ægro iucundius uisum fuerit. Pharmacū ex malo citrio, tardē concoquentibus cōmodum. Carnis mali citrij lib. i. hyssopi, rutę, origani, cuiuscq; fasciculū exiguum, aceti heminas iiii. per quinque dies ac noctes aceto macerata ad tertias decoquito, & expressa reijcto: ad acetum uero mellis sextarium i. ammisce, rursusq; ad mellis crassitudinē decoquito, deinde a sari, mei, piperis, cuiuscq; sextariū inspergito. Mane & uespere exhibetur. Pharmacum ex uino scybelite, Archigenis. Vini scybellite sextarios iiii. succi rutę sextariū i. sisonis, piperis, cuiuscq; unc. i. zingiberis sextantem, petroselinū unc. i. mellis sextarium i. Liquida ad compagem crassam decoquito, aridaq; inspergito, ac cochleariū unum aut alterū exhibeto. Efficax est ad tardas concoctiones, ac inflationes, itemq; colicos. Vinum autem scybelites est, quod sua sponte ex papsis uuis distillat, utpote uinum ultro effundentibus uuis. Sales Iamblichii. Salis ammoniac libram unam, salis cappadocid sexuncem, piperis quadrantem, zingiberis quadrantē, seminis nicot scrupulos xviij. seminis erucę scrupulos xvi. amij scrupulos xviij. hyssopi scrupulos xviij. silphij scrupulum i. cacumini thymī, phylli, seminis apij, petroselinī, cuiuscq; scrupulos xviij. origani unc. i. Cōrundito ac cribrato, indeq; dimidium cochlearium, cum ouis forbillibus, aut cum pulana teiuis exhibeto, potes & cum carniū aut piscium liquamento exhibere, aut quomodocumque tandem uelis. Huius medicamenti auxiliarem facultatem nemo pro dignitate laudare potest. Quare ut breuiter dicam, ad frigidiore temperaturas non reperias aliud pharmacū, quod conuenientius crudos humores concoquat: unde & colicis prodest, uentrem citra molestiam medicoriter mouens.

Salēs Poletis, aluum emollientes, pituitam a capite dissoluentes, per palatum transpirantes, reliquasq; distentiones attenuantes. Salis torrefacti splendidissimi drachmas cxxliij. floris chamæmeli aridi & cōtusi trientem, conyzæ tenuis trientem, calaminhæ

montanæ trientem, radices eryngij montani, origani, cuiuscq; trientem, silphij trientem, piperis trientē. Contusis & cribratis utere. Sal dodecatheos, hoc est duodecumanus, seu duodenarius. Hyssopi trientem, pulegij quadrantem, cumini sextantem, amij unc. i. salis torrefacti uncias triginta. Cōrundito & cribrato, proq; quoddiano sale, utiq; placeat, uitior. Qui enim eo assidue utitur, nullis morbis per omne uitæ tempus infestatur. Precipue tamen caput alleuat, & usum acuti, pituitamq; in thorace congregari non sinit: concoctionem bonam operatur, & mela raicas maximē uenas ab obturationē liberat, & renēs repurgat. Quidam & origani sextantem adijciunt. Ego uero semper spicæ nardi unc. i. annecto. In hyeme amplius piperis unciam i. addo. Ad eos quibus alimentum in uentre accedit, utiliter hoc remedium adhibetur. Piperis drach. iiii. seminis anethi drach. i. cumini drac. iiii. contere, ac exhibe cochlearium ante somnū ex uino diluto. Embamma optimum ad intestinus, concoctionem adiuuans. Cumini, piperis, foliorum rutę, mentę uiridis, anethi uiridis, cuiuscq; drach. iiii. pulegij sesquidrachmam, salis unc. i. gari albi cochlearē i. mellis cochlearium i. Vtere, ualde enim cōmodum existit. Posca, cōtioni ualde commoda, Cyrilli Archiepiscopi. Pulegij, seminis fœniculi, seminis apij, cuiuscq; scrupulos sex, caroi sesquiscrupulum, seminis corlandri sesquiscrupulum, baccam lauri unc. x. cyperi, folij malabathri, costi, cuiuscq; scrup. i. salis sexuncem, aceti sextarium i. Sicca contundito & cribrato, acetorq; ammixta ad paucas horas macerato, ac utitor.

De crapula, Philamenti.

Cap. xxv.

Cruditates ex uino multo obortas, crapulas appellamus, easq; consimili methodo tractamus, quali ad difficultatem concoctionis præscripta uti solemus. Itaq; his qui ad frigidæ potum adfueuerunt, aliasq; stomachum habent aestuosum ac exustum: aquæ frigidæ puræ cyathi duo aut tres per interualla ad absorbendum exhibendi sunt post uero per somnum meridianum turbationibus depulsis, confestim eos in balnē inducimus, prolixiorēq; exudatione procurata, ab aquæ tepidæ haustu ipsos uomitū facere cogemus, aut digitorum tantum immisione eundē lacessimus. Deinde prædictos cibos exhibebimus, diluore ac pauidore addito potu, donec caput a grauitate liberetur. Statim uero a principio caput ex oleo opmachini fomento irrigetur. Sequenti autem die bonæ concoctioni consulatur. Optimum autem fuerit, si quis uinum absinthites ad plures dies a balneo præbatur, itemq; post matutinas deambulationes. Prodest & acetum scillinum absorbere i. mystri mensura: deinde in quiete breui sanē tempore degere, atq; ita ad reliqua facienda procedere, quemadmodum in capite De cruditare est prædictum.

Que cura aluo adstrictæ adhibēda, Galeni. Cap. xxvi.

Recrementorum iuxta uentrem retento, aut propter acceptos cibos ac potus coniuncti, aut propter uentrem ac intestina. Et propter cibos quidem, aut ob ciborum ac potuum acceptorum tum qualitatem, tum quantitatem, aut propter ordinem, & utendi modū contingit. Ob qualitatem quidem, si acerbā & austera ac sicca temperatura & commixtio cōstent ea quæ accipiuntur. Ob quantitatem uero, si plura aut pauciora & citra conuenientem exhibeantur men-

A 3 suram,

suram. Circa ordinem autem retentio excrementorum contingit, si arida & acerbior prius, humida uero pinguior & dulcia postea ingerantur. Circa modum uero utendi, si bis cibum accipere conueniat, & semel omnem assumat. Quae uero circa uentrem ac intestina consistit recrementorum retentionis causa, ea & ex natura ipsorum, & ob acquisitam contingit dispositionem. Causae itaque circa naturam ipsorum, sunt uisitatione corporum constitutiones. Ostia autem existunt uentris acquisitionis intemperaturae. Quatuor quidem si implicae, caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas: reliquae quatuor commixtae, caliditas simul cum humiditate, caliditas cum siccitate, frigiditas mixta humiditate, frigiditas mixta siccitate. Oportet autem unamquamque intemperiem in eam magnitudinem excedere, ut euidenter excretui facultatem imbecilliores reddat, aut in uentre solo, aut in gracilibus intestinis, aut etiam crassis, aut simul in omnibus praedictis, quemadmodum in uolulis fieri consuevit. Ad haec amplius & in febribus aliquando alius adstringitur, ob acrimoniam uidelicet resiccantibus & consumentibus humores: aliquando autem materia ad alios locos diuersa, per quos illos ipsos exclusa. Sudoribus enim multis per cutem exclusis aluus coarctatur, & stomacho ex fluxione affecto sterco cohiberi contingit: propter inflammationem item intestino recto uicina, ipsumque deprimentem, uelut est uesicae, aut uulue, & propter ulcerationem aut dolorem circa eas partes oborta, excrementa recurrunt. In his uero qui a morbo vires colligunt, uenter cohibetur, propterea quod plurima digestio ciborum in corpus fiat, & ob id exiguum & aridum, & quod difficile excerni potest, sterco relinquitur. Ad haec etiam uenter adstringitur ob flauae bilis cohibitionem, quae ad intestina delabi consuevit: ea ipsa enim in animalis, quod secundum naturam habet, confluens intestina mordet & iritat, & ad excretionem excitat recrementorum. Quapropter etiam semper cibo uacuum ieiunium intestinum reperitur, in quod procedit meatus, quae bilis succipit uesica bilis ad intestina deducit, atque ob has sane causas uenter adstringitur. Commune autem in omnibus praecceptum est, ut causae noxae inferenti contraria curationem opponamus. Proprium uero ut secundum singulas causas cuique quotidie contraria remedia exhibeamus. Et si quidem ex paucorum ciborum acceptione homo aluum habeat adstrictum, plures simulque humidiores ei offerantur: si uero siccioribus sit usus, humidiores quidem dentur, non autem multum. Si uero austeri & acerbis cibi retentionis fuerint causae, dulces & pingues exhibeantur. Si uero ob permutatum ordinem adstrictio fiat, in eum qui conuenit, reducat. Si uero semel cibum accipendo, quum bis id facere oportuerit, uenter cohibeatur, non solum bis, sed & saepius conuenientes cibi dentur. Eodem etiam modo recentes intemperaturae per contraria curantur: ita ut exsiccata corpora humectemus, humecta uero resicemus, & calefacta quidem refrigeremus, refrigerata uero calefaciamus, atque in coniugatis siue mixtis qualitatibus eadem iuxta proportionem faciamus. Cohibita autem quae ad intestina defluere consuevit bile, aut ob crassitudinem, aut ob biliosorum meatuum obturationem, extenuatiora dieta utendum est. Similiter autem omni conatu instare & reniti oportet, ad reliquas alui adstrictae causas tollendas, atque uiscerum quidem inflammationem solu-

mus, ubi per ipsam cohibitorum contingat, materias uero ad intestina conuersas deducemus, si quidem aliopropterea: quae autem medicinali materia id fieri possit, in simplicium pharmacorum Sermone est praedictum in principio huius tractationis, atque in eo qui hunc sequitur, De purgantibus pharmacis inscripto. Communis autem omnis quomodocunque euenierit, adstrictio alui curatio talis est. Ex decubitus si guris erectior eis conuenit, & ad sinistram latus rectum nato. Et si letum quidem acquies uentrem cohibet, motus autem & deambulatio impellunt. Paucus potus, & non praepotare, neque inter medios cibos potum accipere, uentrem resiccant: praepotatio uero & multa potio stercora humectant. Somnus coquoquit, & recrementa fluida facit: uigiliae uero materias distrahunt, & suspensas tenent. Plurimum autem ciborum qualitates possunt, quare eas quae uentri graue exhibere oportet, quamquam omnino melius fuerit abstinenti succum dare, aut ex aloë catapotia deuoranda. Quibus si nihil proficimus, duris quoque adhuc stercorebus insidentibus, & lumbis aggrauatis, circuncens quoque & inflato uentre superiore, humectantibus immorari cibis absurdum. Saepem enim lapidis modo recrementa indurantur, & in intestino recto coeunt, tanquam accepti cibi stomachi quidem & uentris humectant & effeminant, ad intestinum uero rectum per uentre non possunt: ut inde aliae quaedam molestiae consequantur. Melius igitur in istis fuerit alui pituinae succum per clyster infundere, ammixto oleo & melle, aut maluae aut feni graeci uel fursurum decoctum similiter cum oleo & melle: utendum etiam glaudibus ac illitionibus sedis. Alumen autem liquidum melle critum donec indurescat decoquitur, ex eo quoque sedes illinitur, & facile quidem plurima stercora prolestat, quamquam inde aliquandiu dolore afficiantur. Optime autem facit & cyclaminum fuscum cum melle illitus, & in tomento quoque appositus. Mercurialis etiam uiridis contrita, & ad glandis modum redacta, excrucatur & supponitur, ualde quoque comoda existit. Alia glans, purgatoria uim habens. Comae abstinenti conuulsa ac cribrata drach. iiii. nitri drach. iiii. elaterij drac. i. melle cocto excipit, glandes quoque informato ac subindito: fomento tamen prius ad locum adhibito. De his autem absolutissime in tertio huius tractationis Sermone est praedictum, ubi etiam pharmaca purgantia quae circa umbilicum illiuntur, descripsimus, eorumque etiam quae per os exhibentur ac uentrem emolliunt, tum simplicium, tum mixtorum remedium mentionem fecimus, quare superfluum existimo hic de eis producere sermonem. Absinthii emollientis utilis apparatus. Costi un. i. spicae nardi scrupulos iiii. folij scrupulos iiii. mastiches scrupulos ii. mellis sextarios duos, uini sextarios decem. Absinthii tum bonum, emolliens, & dulce. Sifonos unciam unam, floris funci odorati scrupulos vi. mastiches scrupulos duodecim, folij scrupulos unum, uini sextarios quinque. Absinthiatum amarum pituitosis magis conueniens. Agarici, folij, amomi, spicae nardi, castae, cuiusque scrupulos tres, costi scrupulos ii. rosarum siccarum scrupulos ii. aloës scrupulos vii. mastiches scrupulos duodecim, mellis sextarium i. uini sextarios v. Aliud, atra bile abundantibus, & pituitosis

tuitosis similiter eodemodum. Folij scrupulos vi. spicæ nardi scrupulos sex, agarici scrupulos quatuor, epithymi scrupulos xii. mastiches scrupulos xii. aloës scrupulos quinque, mellis sextarium unum, uini sextarios v. Aliud optimum. Folij, spicæ nardi, casia, amomi, cuiusque scrupulos iiii. costi scrupulos iiii. agarici scrupulos iiii. mastiches scrupulos ix. aloës scrupulos xii. mellis sextarium i. uini sextarios quinque.

De inflammatione, Galeni.

Cap. xxvii.

Inflammationis principium cibis male concoctis existit.

Cōtingit autem flatuū generatio in uētre, ex humorib. in ipso pituitosis, aut ex cibis in uapores per mediocre caliditatem resolutis. Perfecta enim frigiditas nullum omnino uaporem efficit, propterea quod nec omnino attenuat, nec consumit, nec dissoluit eā ipsum cibum: uehemens autē caliditas cibum attenuat, si flatuosa natura existat, & tunc sanē nebulosus flatus generatur, uerum paucus, adeo ut per unū aut alterum ructum euacuetur. Mediocris uero caliditas minoris efficacæ existens, cibos quidē dissoluit, non autem perfectē consumit: unde sanē flatus generatio contingit. Vna autem eademq; ratione quemadmodum extrinsecus frigidissimæ & aquilonares in hyeme constitutiones, & calidissimæ æstatis tempore consistentes, purum aërem reddūt: quæ uero inter has mediæ existunt, nebulas gignūt: sic eodem planē modo, in animalium corporibus, neque in extrema caloris debilitate, neque quum uehementer calor inualescit, sed quum inter hos excessus medio modo habet, flatuosum recrementum generatur, atque hoc ipsum ubi per stomachum excluditur, ructus operatur: per sedem uero aut streperem, aut absque strepitu flatū. Quum uero neque per os, neque per sedem exernitur, inflammationem appellatam producit. Archigenis. Accedit affectus stomachi grauitas & distentio, multosq; fallit tanquā in ipsum solum dolor innaturus: etenim multū ipsum aliquando quidem iuxta totum pectus, aliquando uero retro iuxta collum ac dorsum, atq; ipsa ueribula irruit: sæpe autem & utrinq; occupatos tenet: aliquando autem & tumorem circa os uentris efficit, ructusq; inanes sunt modicē alleuantes, inhibitiq; flatuū qui per aluum ex cerni cōsueuerunt. Succumbit autē & tumor ipse iuxta uentrē, ad manū impositiones sublaxus cedens. Quibusdā eorum & dolores accidunt, & appetitus perditiones, ac capitis dolor: si uero ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cū dolore amplius distenduntur, qui sæpe ad clauiculam usque defertur ipsasq; scapulas ac uniuersam spinā, ultra hoc quod & ructus cohibentur: ut aliqui tam non dissimile quiddā suffocationi se perpeti æstimaunt. Leuantur autem alimento infernē subeunte, & flatibus siue per ructus, siue per intestina exclusis. Eos igitur qui nō ita diu ante cibum sumperūt, primum uomere præcipi: deinde uero fouere oportet cum lana in fasciculum conuoluta & leuiter calido oleo madefacta. Si uero dolor urgeat, fomentū fiat per uescam bubulam aqua & oleo calidis semiple-nam. Glandes quoque confidenter & citra dilationē supponendæ sunt, ex rebus flatus prolestantibus in formatæ, uelut est rutæ semen & cuminum æquali pondere cum melle coctō, ac modico nitro coacta.

Inedia etiam affectioni necessaria existit, per unam quoque atq; alteram horum tempore irritationis, irritationes ex oleo conueniunt. In quo absinthium, ruta, & anethum sint decocta. Lanæ uero conuolutæ cuminum tritum, aut apij semen, aut sisonis magis inspergatur. Deinde & cucurbitæ adsumantur inanes multæ, & cum multa etiam flamma admoda. Perseuerante autem diutius affectione, cataplasmata ex semine lini, ordeacea & lollicea farina imponantur: ex cumino etiam trito, semineq; anethi, aut apij aut fœniculi, aut chamælae, aut tragorigani, aut centaureæ coma, aut eryngij semine, uel radice cetex hydromelite etiam & oleo, in quo ruta, baccae lauri, & melanthum sint decocta. Ammiscendū est & birumen, oleumq; laurinum. Si uero inflammatio unā cum inflatione adeat, pro calefactentibus ea quæ relaxant ammiscere oportet, uelut est anethum oleo incoctū ammixto adipe gallinaceo aut anserino. Cibus uero frumētacei generis sit & paucus: post multum etiā assumpti cibi tempus, potus tandem præbeatur: cibo fricationes extremarū corporis partium adhibeantur. Alius uero tum per cibos, tū per aloē subducatur. Cerata etiā imponantur ex oleo apparatus, in quo cucumeris syluestris radix sit incocta. Ad finem uero malagmatis utendum, quæ ex seminibus aut lauri baccis constant. Marciani irrigatio siue fomentum, ad eos qui ex morbo circa septū transfusum inflationē habent, & murmura circa interiora, aut quibus uiscera inflammata sunt, aut inflantur. Rutæ uiridis trientē, fœni greci sexuncē, meliloti trientem, absinthij trientē, scœnum græcū in pauca aqua diem unū præmacerato: deinde reliquis ei adiectis, atq; olei sextarijs iiii. affulsis, ad non fumantē ignem decoquito, percolatoq; ac in eo sanam conuolutam quā plurimū madefacto. Si uero dolor intendatur, in solum ex oleo apparatus eos imponemus, si tamen nihil id fieri præpediat, althææ itaque radicē, lauri folia, scœnum græcum, pulegium, rutā, in aqua decoquemus, & oleo ad decoctum affuso, eos inscendere faciemus: quod ubi feliciter processerit, cibum accipiant, panē ex aqua, & pisces teneras carnes habentes. Qui uero se iam recolligunt, diæta restituentis uiribus apta utantur: sinapismisq; & cucurbitulis cū multa flamma post exerdia admotis, uomār. Si uero fixa perseuerauerit accessio ipsa, tēpore exacerbationis cataplasma ex sinapi imponendū est, & paulo post aloës drachma una propināda, aut smyrnij semen ex uino. Aristolochia autem longa siue rotunda drachmæ pondere potata flatum dissoluit, & tarde concoquentes inuat: quod & calaminthæ decoctum, aut etiam polium decoctum cum melle modico & paucissimo pipere tenuissimē trito, facit. Ouillus autem talis uestus & potatus torminibus ac inflammationibus medetur. Aut rhamni folia uiridia trita in pastillos redige, eosq; in umbra exicatorum drachmæ pondere exhibe: non febrientibus, cum uino diluto, febrientibus uero cum hydromelite. Facit & ad uoluolosas affectiones, omnesq; inflatuos dolores mira modo: per ructus enim ac flatus infernē prodeuntes discusso & resolutomani sani sunt, inquit Dioscorides. Vile etiam eis castorium ex posca bibitum existit, drachmæ pondere acceptum. Idem quoq; forinsecus cum oleo sicyonio impositum, etiam si cum torminibus

& inflationibus prædictæ affectiones cõtingerint, eas sanat. Aetium uero scillinum tum ante, tum post cibum absorbere, aut ante somnum. Apparatur autẽ simplicissimè hoc modo. Scilla repurgatæ & dissolutæ libras v. aceti sextarii xlviii. sub canaliculæ ardoribus ad dies quadraginta insiluit, ac uitior. Oxyporion etiam quod cito penetrat eis conueniẽs est huiusmodi: fuliorum rutæ drach. xxxii. cumini drach. xiiii. ligustici, caroli, feminis apij, piperis, zingiberis, helenij, nitri, cusi, drachmas viii. exhibe cochlearium quomodo cunq; uelis congruenter. Exhiberi etiam potest ad noctem ex tribus piperis generibus pharmacum, erui magnitudine: robustioribus uero, Aegyptiæ sabæ. Alio autem adstricta citra dilationem clyster infundendus: balneo uero ex intervallo usum est tempore remissionis. Præferent autem istis tum dorsum, tum stomachum, conspergantq; nitro asato: solij etiam calidioribus utatur, & ad balneo cibis detur, minime insilans, & post omnem cibum uinum meracius exhibendum. Cibus autem ipsorum diuidatur, ita ut in prandio tertiam, in coena uero reliquas duas accipiant partes. Fructum uero atq; olerum humidorum eum semper habeant suspectum. Mulum autem potum tanquam infestissimum hostem deuitent.

De uululo, Archigenis.

Cap. xxviii.

Vululus, adfectio est intestinorum, letalem dolorem inferens, causa adfectionis, continua ciborum corruptio existit, præsertim si multi accipiantur, uarij, & ad quos non aduectus, & maximè ex pinguibus carnibus. Oboritur etiam ex plagis quibuscunq; & frigore uehementi, & ex acerrima frigida potione, maximè si ab exudantibus accipitur. Cõtingit & his quibus intestinum in serotum unà cum sterco re delapsum est indeq; uolūtate retrusum, ex eoq; inflammationem existit. Fit etiam ob ueneni potionem, & ob induratum sterces circa tenuia intestina impactum, in uno loco dolore innitente circa tenuia uidelicet intestina, ut admodum manu durities tactui succubat, quam adfectionem chondrasmus ueteres uocauerunt, hoc est, intestinorum emollitionem. Et multi sanè ex dolore statim intereunt. Alijs uero inflammationis suppuraui, rursumq; intestinum ipsum denigratum ac putrefactum excidit, eoq; modo deficiunt. Familiaris autem hæc adfectio ætati puerili est, eadunt tamẽ naturalis beneficio humiditatis. Senibus uero nõ ualde familiaris est: si tamẽ ipsi hæc adfectio nõ incidant, ferè nunquã conualescunt. Accedit egris dolor circunvolutus, stomachi nimia humectatio, exolutio, ructus inanes nihil alleuantes, murmur in testinorũ, cohibito perfecta stercoreis & flatuum. Si uero intendatur affectio, omnia sursum feruntur, ob idq; & uomitus picuitæ ac bilis accedunt, frigiditas totius corporis, dolorq; plurimis etiã spirandi difficultas. Morituris autẽ amplius sudor frigidus, uring difficultas, podex ita adstrictus, ut neq; specilli extremitũ suscipere possit: aliquando & sterces uomitus reijciuntur. Si quidem igitur cibus crudus ueniat insidere uideatur, aqua mulla cum nitro exhibitã uomere cogemus: deinde rursum aquam calidam puram dabimus, ut mordacitas obundatur. Si uero nihil crudorũ ciborum in uentre continetur, omni conatu endũ est, quo tum flatum tum stercorea infra trahatur: idq; per glaciẽ illitionesq; & clysteres, magna

diligentia in singulis adhibita perficiendum. Glan- des itaq; conueniunt ex semine rutæ & nitro, cuminoq; ac melle. Valent etiam quæ ex brasica cauliculis apparantur cū melle coctis: ex profundo enim attrahunt. Cæterum glandulas longiusculas facere oportet, quæ adstrictiorẽ internam ani partẽ sphincterẽ Græcis appellatam, transire queant. quibus appositis, podex per spongas calidas foueatur, quibus sanè cyclamini succus uulissimè ex cipitur, quanquã cum melle etiam ad nitro idem illius efficaciter opitulatur. Idem facit centaurea cum melle & nitro: uenturum in his conandũ ut quàm penitissimè illinatur. Per clysterem autẽ oleum infundatur, in quo cuminum, ruta, althææ radix aut folia, scenum græcum, centaurea, cucumeris syluestris radix, sint decocta: adijciatur autẽ & butyrum, & resina terebinthina, ut inde crassitudo insulo ipsi accedat, per ampliorẽ etiam fistulam largius infundatur, iuxta corporum rationem, aliquando usq; ad duarum heminarũ mensuram. Quin & clysteres ex prædictis apparentur. Probè facit & syluestris cucumeris radix confusa, & in aqua satis diu decocta abstinio adiecto: si quidẽ ad decoctum ipsum mel & nitrum, oleumq; ammisceantur. Si uero sterces durius intestinis insidere cõiectamus, aut inflammationis obstructio adsit, althæam ac scenum græcum cū caricis decoquemus, butyroq; & anethino oleo plurimo ad decoctũ adiecto, per clysterẽ inijciemus, & quamdiu quidem queat, retinere præcipiemus. Optimum autem infusum hocce est. Bituminis drach. iiii. nitri drach. i. aloës unc. i. olei rutæ dodrætem. Commodum est etiam cuminum, rutam aut abstinium cum oleo coquere, deinde per colarum modicum salis inijcere, aut opopanax drach. i. aut galbani drach. iiii. Prosumt & carica ac ruta in oleo decocta. Eiusmodi autem infusa ante cibum infundere oportet, & maximè quod ex asphalto apparatur: urgente uero malo etiã ad cibo. In solij etiam aqua & oleo referendum desiderare eos conuenit: in aqua uero althæa, ruta, & conyza decoquatur. Fometa quoq; adhibenda sunt ex fursibus, & per pyriæria phacora, id est, uaporatoria uasa lenticularia, & per uesticas bubulas ex oleo semiplenas. Cõueniunt etiam fomenta ex lanis oleo madefactis, in quo cuminũ, anethum, ruta, conyza maximè parua, & nasturtium sint decocta. cuminum quoq; per se tritum uentri inspergendum est, deinde lana imponenda. Cõuenit enim ab irrigationibus incipere, ipsisq; etiam inter cataplasmata uti. Cataplasmata uero ex melle sint apparsa, aut hydromelite meraciorẽ: assumant autem semen lini, scenum græcum, pollinem hordeaceum, loliacæ farinam, & farbarum. Infarciendum est etiam ipsis plurimum rutæ & cumini, anethiq; semen aut apij, aut rutæ semen siccũ: inspergantur autem hæc crassa, & post impositionem calefant, posteaq; assidue permuetur. Post hæc cucurbitæ affigantur, primum quidem ad remotos locos, inanes: deinde ad ipsos etiam dolore affectos, scarificationesq; profundiores fiant, salicĩ impacta uulnifera conspergantur, quibus postquam cicatrix fuerit obducta, malagmate ex seminibus utendum, aut eo quod ex lauri baccis constat. Potus eis conueniens est anethi decoctum. Est enim usus tam & accommodum. A potu panem in aquam feruentem conijce, eiusq; frusta calida confestim edenda

edenda præbe. Hoc enim modo seruabitur, etiam si iam infer ei suffocationis periculum. Oribasius autem inquit: Anethū in aqua & oleo decoquatur, atq; ita bibatur, deinde frusta panis ex aqua feruenti præbeat. Mirum in modum enim inde suauatur, inquit, etiam si iam steruus uomat. Ruta etiam ac cumminum trita & potui inspersa commoda existūt, & sinapis arida trita inspersa. Commodu est etiam malux semen, tritum ac potui inspersum. Balsamū quoque non adulteratū, in potu uile existit. Alius porus. Bituminis drachmas quatuor, cum modico nitri contere, & ex aqua bibenda confidenter prebe.

Alius. Radicis panacis drac. ii. nitri dra. i. cumini drachmas ii. exdipe melle, & nucis ponticæ magnitudine ex aqua calida præbe. Alius. Castorij, anisi, pipēris, cuiusque æquales partes cōmiscē, atq; inde seqūi drachmā ex aceto mullō præbe. Aflectipadæ potus, qui & recremēta multa soluit. Elaterij sufficēti terebinthina exceptum, in catapotia q; redactum, deglutitendum præbe, aquamq; insuper bibendam. Aliud ad uoluulū remedium, quod uentrem soluit: confert etiā anelosis, splēdis, aquę inter cutem, ex lapide laborantibus, urinae difficultati, paralytids, tremoribus, comitialibus, uulū æ strāgulationi, mensesq; ducit. Medullæ scillæ crudæ, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusq; drach. l. galbani drac. x. v. opopanax drachmas x. ii. Scillam seorsim cōtere, deinde ammoniacum cum acerrimo aceto tere; postea etiam galbanum & opopanax, si multq; mixta omnia in catapotia redige: ex quibus drachmam unam deuorandum præbe, & utrum dilutum insuper bibendum, aut aquā mulsam, aut acetū mulsū. sit autem liquoris mensura cyathorum quatuor. Concoctionē adiunat, si ante cibum deuoretur, ultra hoc quod alium facillimē soluit. Felicitur usi sumus, inquit Archigenes, ad uoluulos abfque inflāmatione, hiera nostra ex colocynthide ponere drachmarum duarum, aliquando etiam trium in catapotia redactā. Aut enim uomitu reicitur ipsum pharmacum cum multa bile ac pituita, aut in fra ad intestinū progressum omnes causas adfectionem operantes secum subducit. Doloribus uero per seuerantibus, & maximē quibus infusi clysteres nō infra rursus prodeunt, etiam ea quæ dolorem leuāt exhibenda, itemq; cōuenientes antidoti ante somnū. Communisima igitur & optima, ea quæ ex pipēribus constat, & Andromachi ex uiperis theriaca existit, post eam uero quæ Mithridati nomen debet. Pro priē autem in his colicæ antidoti faciunt, qualis est uel in primis quæ Zopyrios, & quæ Paeonia appellatur, quarū descriptiones in xiii. Sermonē cōtinētur. Si uero à uenenofo pharmaco quis in uoluulū incidat, aquam tepidam multam bibēdam dabimus uomereq; cogemus, deinde oleum calidum in potu dandum, aut pingula fuscūla, ut rursus uomant ex moderato eorū potu. deinde ita parumper quiescat, & statim postea theriacen accipiant cū uino dissolutam. Cibi eis exhibeantur boni succi: alius uero lacte scisso euacuanda. In eo autem uoluuli genere, quod chordapsū appellari diximus, in quo in uno loco dolor innisitur, ut admota manu durities & tumor tactui succumbat, circa tenuia uidelicet intestina, subitum periculum instat, ut plurimum tertiam aut quartam horam non excedens: quando ue-

ro ad suppurationem inflāmatio uergit, aut longior remoratio contingit, neq; ea ferē citra periculum existit, quāquam sint qui ex eis sunt seruati. Venae igitur sectio ante localia remedia assumenda est, deinde cucurbita, & reliqua cura quemadmodum in inflāmatione fiat. Danda uero & his assidue ex uiperis theriaca ciceris parui magnitudine ex aqua calida insusum, etiam immittendum ex his quæ inflāmationibus conducunt, uelut est fœni græci & malux decoctum, cum oleo & butyro. In potu exhibetur rosmarini decoctum, florisy iunci odorati, mei, fœniculi, & maximē omnium anethi. Probē etiam ad eos facit, foliorum rhamni uiridum tritorum, & in pastillos redactorū, excitatorumq; drac. i. ex calida aqua exhibita. porrō ex conuulsione aut ruptura abortos uoluulos uenæ sectione curare oportet, locosq; ubi dolor insignitur profundioribus fissuris impactis scarificare & diducere, lanisq; succidis irrigare: antidotos etiam dolorem leuantes bibendos præbere, uerum clysteres omnino deuitare. Si uero uoluulus propter intestini in serotum de lapsione contingit, confestim tentandū est, ut decubitu sursum uersus uergēte adornato, delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atq; post leniter citra uiolentiā ac compressionē, ligamento adhibito contineatur. Si uero iam ex compressionē inflāmatio aborta sit, termina q; ac inflationes accedant, etiam hos ipsos uenę sectione curandos censeo, in inedia q; ad tertium usq; diem seruandos. In principio uero lanis succidis ex uino & oleo madefactis irrigandos: adhbito postea etiam cataplasmate crudæ hordeacæ farinæ. Aliquando autem & inflāmatae partes commodē per ambitum scarificantur, per althæę quoq; ac fœni græci decoctum & oleum utiliter irrorantur ac adsparguntur.

De his qui ab acri humore coli dolore infestantur,

Galen.

Cap. xxxix.

Quibus in colo & intestinis acris & mordax insidet humor, hi a calidis cibis ac pharmacis itemq; insusis læduntur, & a cibis abstinentes magis iritantur. Melius autem habent ex temperantium inducentū & mordacitate carētium usu. Tenuis enim & acres humores uehementissimū inferunt dolorem, aliquādo uero & conuulsiones, maximē ubi circa os uentris fuerint aggregati. Accedunt quandoq; & animi deliquia, & humiditates sudoris frigida. Hoc itaq; modo affecti, calida potata ac uomitu reiecta biliosum humorem excernunt, quicq; etiā aerugini aliquādo in colore similis existit. hic quidē igitur humor ubi in uentre cōsisterit, mordens, & animi deliquia inferens, per uomitū expurgare ipsum oportet. Vbi uero in intestinis aggregetur, per sedem infundere conuenit ea quæ humores eluere atq; citra mordacitatē repurgare possunt, cuiusmodi est psianę succus. Cibi uero boni succi & qui non facile corrumpantur eis exhibendi, attenuantibus & calefacientibus uitatis. Oportet enim infestantem humorem aut euacuare, aut temperare. Exempli uero gratia mentionem faciam quorunda a nobis curatorum. Quidam etenim quadraginta annorum, qui colicus esse putabatur, à perfusione infusis & fomentis, cataplasmatibus & acrioribus insusis non modo nō suauabatur, uerū & magis exacerbabatur, & ubi mel cū pipere accepisset, extremū dolorem incurrit, & ubi fœni græci succum



succū cum melle sumpſiſſet, plurimum ſuit irritatus. Conſeſtationem igitur ſed, mordaces in ipſis inteſti norū tuncis imbibitos eſſe humores: non facile cor- rupſibiles ei exhibui cibos: deinde ubi uidiſſem eū minus à dolore infeſtari, uidati humoris purgaſo- ne ei opus eſſe cognoui: cæterum pharmaco ex aloë amaro hominem aceruatim purgare minime auſus fui: nimirum ob dolorem ac indigentiam, tempo- riſq; diuturnitatem uiribus attenuatis. per interua- la itaq; mediocria paulatim purgatione per picram ex aloë facta, in paucis diebus ipſum perfectè ſana- ui, nullo altero remedio admo- ro. Alter quidam adoleſcens nō paululū antea à colicis doloribus ue- xatus, accepta ſcamonia purgatus eſt: quumq; pro ratione accepti ſacis multū fuiſſet euacuatus, illa ma- xime membra quæ prius habuit emaciſſilla morſu infeſtata ſenſit, ut inde quaſi fluida quandā & dolo- roſam circa inteſtina haberet affectionē. Itaq; & hūc curauī, colica remedia rejicere ſuſſum, & ex halica cū aqua calida decocta nutrirī, granis mali punici ſi mul incoctis. Quumq; totā noctē abſq; dolore dor- miſſet, mane exhibuiſmus ei rhois ſuccū diſulorē bi- bendi: ut ſi qua ulcerosa adfectio circa inteſtinū eſſet oborta, eā adſtringeret, ſiue quippiā ex ſuperioribus partibus ad affectum inſuſeret, idipſum repelleret. In prandio etiā halica ſimiliter cū mali punici acinis & aqua decocta uti ſuſſimus. In ueſperam uero panē ex uino quopiam auſtero ac ueteri madaſcētū dedi- mus. Cōceſſimus etiam ut ex auſteris fructibus pro libitū, modicē tamen, caperet. Tertia autem die quū eodem modo fuiſſet reſectus, in quarta hauſta the- riacæ perfectē ſanus euasi. Alium autem quendā ſimiliter affectum æſtatis tempore quum plurimū ſuſtinet, eodem uicū curauimus, ampliūſque frigidū potum ei indulſimus. Cæterum euacuato humo- re, & remanente adhuc dolore, ad ſtupeſcendum uſum confugere oportet. In huiusmodi enim affe- ctionibus non ſolum quod ſenſum ſtupeſcit, ſed & quæ humores tennes inſpiſſant, caloremq; refrige- rant, maxime opſculantur.

De his qui à frigidis & pituitosis humoribus coli-  
dore infeſtantur.

Cap. xxx.

Quum uero craſſi & leni fuerint humores, qui dolo- ris cauſa exiſtunt, nequaquam ſtupeſcipientia erunt offerenda: etenim alleuantur quidem ex eorum uſu, ob ſenſus uidelicet ſtupeſactionē: uerū rursus petus inde habent, quod ampliūſ per ipſa humores inſpiſ- ſentur, & diſſiciliter omnino excerni poſſint. Atqui nauſeæ unā cum uomitibus magnæq; & frequen- tiores illis oboriuntur. Vomuntur autē pituitola & corrupta, reſinentur excrementa, adeo ut ne ſtatus quidem ex cernatur, neq; ructus etiam procedat. Sæ- pe enim ueluti ſurſum reuoluitur dolor, ac plurimū occupat locum: aliquando uero ex loco ad locum digreſſus uehementius augetur. Maniſta uero co- gnitio coli affecti eſt, quādo aliquando quidē altius dolor infeſtat, quā pro renum ſitu, aliquando au- tem longe inferius: ſi enim iuxta renū ſitum dolor in- nitatur, atq; id in uno loco cum dolore ac grauitate, renū affectionem eam eſſe ſenſendum eſt. Conſide- rande autem ad hæc urinae: aquoſæ enim & puræ in principio à nephriticis minguntur: quæ admodum in ſequenti tempore ſubſidende habentes aſperā, de- inde exquiſitè arenoſam. In colicis uero etiam ſi ege-

rat aliquando uenter, tamen ſtatuoſiora excernit: ſæ- peq; ſtercora aquæ inuehuntur boum ſtercoribus compage non abſimilia. Contingit etiam quando- que humorem aliquem frigidum cum ipſis excerni, quo ſactō conſeſtim melius habent. Per fomenta au- tem & cataplaſmata nephritici quidem doloris mi- nigationem accipiunt, laxatis uidelicet iuxta obſtru- ctum lapidem corporibus. Colicid uero parumper quidem uidētur mitiores redditi: paulo poſt uero ue- hementius intenduntur eis dolores, diſſuſi uidelicet per adhibitarum fomentationum calorem humori- bus, generatiſq; ſtibus, qui plurimam diſtentionē operantur. Quomodo igitur oportet dolores ex fri- gidis in inteſtinis humoribus obortos curare, ita ut neq; uehementius irrationibus, neq; cataplaſma- tis caleſcant? A caleſcipientibus enim diſſunduntur & inſtantur omnes frigidī ac craſſī humores, qui in- teſtina diſtendendo augent dolores. Conuenit itaq; ipſos diſſecare & concoquere citra uehementem ca- lorem, & per minime ſuſtantū uſum. In exacerbati- onibus igitur conſimilis colicorum cura fieri de- bet, quaſi ad uoluuloſos eſt prædicta, irrigationes uidelicet ex oleo rutaceo & ſicyonio & anethino, inediaq; & fomenta ac cataplaſmata, inſuſa item & glandium admotiones, illitionesq; ſedis. Vomitus uero ante coenā, ſi quis facile uomat, præ omnibus auxiliatur. Vbi uero maſſi ipſum produciatur ad plu- res dies, inſeſio in ſolum ex oleo repletum adſumē- da eſt: aut ſi hoc fieri non poteſt, ex aqua & oleo re- pleatur, in quibus althæa, pulegium, ac lauri folia, ſi- miliaq; ſint decocta. Fomentum uero ſiue uaporato- riū adhibeatur ex ſurſuribus & milio, & cataplaſ- mata quoque ad uoluuloſos prædicta. Poſt dies ue- ro ſeptē purgatio ex hiera Archigenis ſuſcipiatur. Licebit tamē & nō purgare, uerum ac acrim ciborum eſu inchoare. Quādo uero aliſum ipſum omniū minime inſtat niſi febris adſit, cōſiderent ipſum aſſe- remus. Siſis autem ſequitur acrim rerum comestio nem. Præalleuetur itaque præcedente uicū eger, ubi ad acrim rerum eſum procedere uolet: aquæq; po- tu utatur. Flatu autem uentoſo inſeſtante, egregium remediū cucurbita ſæpius aſſixa, cum largiore ſlam- ma exiſtit, ut incantationi ſimilem effectum præſtare uideatur, in quacuncq; corporis parte apponatur, conſeſtim à dolore liberare ac perfectè ſanare cogno- ſcatur. Quod ſi humor quoq; unā cū ſtatu aduerſis, euſteſtigi quidem à dolore leuantur, mox uero rur- ſus redeunt dolores, maxime ubi quippiam peccati circa diætā fuerit admiſſum: aut ſi plus quā oportu- it, caleſcierint ipſa membra. Maximum autem ſi- gnū & hoc tibi fuerit ad affectionis cognitionē. Ne caleſcacio itaque maniſeſte, ſed diætā attenuatoria utaris. Oportet autem & ante inſuſorum uſum, cu- curbitam dolētibus locis adhibere: indeq; oleo ruti- ceo, & huiusmodi cūctis inſuſis uti. Multi uero acce- pro dyſtere uehementer dolent, & uitreo humore careto ſtatim liberantur. Febre autem ut plurimum carent, ſitūq; in totum non inſtantur. Naſcuntur & in colo lapides, ſed raro: quare oportet eos urinam- cientibus, & ſtomacho grauiſ uti, ſanitarisq; rēpore etiā uenam ſecare, & catapotiis ex aloë gratia præfer- uandi uti. Quandoquidem autem colum ipſum in quibusdam debilitatum ex leui occasione, & per inuerialia quædam dolores inferre cōſuequit, melius utique

utique fuerit exquisitiorē diēta uti, & curā quoque adfectioni conuenientē subornare. Quā de causā ubi à somno surrexerit aeger, uenit exonerare tener: de inde ad deambulationē procedat. Deambulet autem & hyemis tempore, nisi frigidior sit aēr, aut ipsius de billitas hoc nō permittat idē faciat in loco sub diō, aēri exposito, & patenti: primum quidem lentius, pōst uero cōcitatus. Quiescatq; ubi crura incaluerint fuerintq; delassata. Deinde domum reuersus bibat aliā quod pharmacum adfectioni conueniens, modicēq; quiescat: & ubi quotidianē alicui ac consuetā actiōni uacauerit, per horam equo uehatur, assidue ē in si dēdo: quod si facere non possit, in curru: si autem imbecillior sit, per nauigium. Iacens enim uectari poterit, quom omne corpus unā cum nauigio cōmouetur. Pōst uero ubi molestiam ex uectatione obortam modica deambulatione excluserit, leniter exclamet, aut condigne cum uociferatione procedendē legat: deinde rursus modicē quiescens ad inunctionem ac fricationem exuatur. Exerctatione itaque facta, & cura ad mota cibum accipiat circa sextam horam, ut & ad cenam sufficiens interstitium fiat, partitur autem cibos, maioremq; eorum partem in cena assumat. Vtilissima enim colicis ciborum partitio existit: praeputio igitur absinthie uino, panem in cibano coctum recentem probe apparatus accipiat cum olis colymbadibus muria conditis, aut paucis uuae pensilis acinis, aut fideis uiridibus tribus aut quatuor: deinde à potu, nisi ualde urgeatur, abstinat. Si uero siticulosus sit, modico potu uehementiē sitis medeat: ut otioq; & iucunda animi uoluptate fruatur. Deinde per circuitum affectione repente, declinet: cibosq; probe disposito, ad cenam accedat. In cena si siticulosus sit, modicum praebitur, & post paruum interstitiū cenet: ex varijs quidem pauca, & commo ditatibus abunde referta. Potus mediū cibum nō dirimat, sed post ipsum referuetur, qui sufficit etiam potus exhibetur. multa enim portatio inconueniens affectioni existit. Non longo deinde à cena intervallo facto, ad somnum diuertat: & si quidem noctu sitis urgeat, ei parce medeat, aqua paulatim absorpta. Atque de quotidiana quidem diētae ordinatione haec tenet. Ceterum paucis subnectam etiam commodos adfectioni cibos, potionesq; & pharmaca. In uniuersum igitur omnia quae colicis exhibentur, attenuatoria sint diētae. Panis itaque neq; sit aridus, neque calidus, in cibano coctus, aut si is nō addit, in furno. Olera autem cruda quidem nō sunt danda, cocta uero conueniūt, dchorium, intubū, rarius autem cauliculi lactucae, cucurbita in calido cinere assata, cocta enim stomachum ledit: malua cocta: uerum nihil horum abesse pane & exhibendum. Dande etiam colymbades oliuē cum aceto mulso ac ruta praeparat. Ab alijs uero abstinendum. Legumina omnia per se quidem affectioni incommoda sunt. Verum uarietatis gratia aliquātum addumatur lenicula cum beta colliquata, opimeq; conrita, aut cum pisana: aut faba cum pisana diligenter subacta. Ceterum rarum leguminum usum probō, pisana excepta: commoda enim haec est, lapathio cum ea colliquato. Conuenit etiam salisamentum piscium petrosi locis degentiū: itemq; limaria non inueterata, nec muria condita. Pere autem & ruta cum aceto mulso condita exhibeantur. Ex carnibus conueniunt in primis uoluc-

rium, secundo loco pisciū numerantur, tertium ordinem terrestrium carnes habent. In unoquoq; genere omnia inconsumpta reprobanda. Inter ea uero quae pro consuetudine in cibum nostrum accipimus, uitanda sunt dura, siue natura, siue aetate italia existant: item quae neruosa ac fibris referta habent carnē, graueolētiaq; ac foetida, & quae alijs mali sunt succi, aut grauioris qualitatis, & pinguis, atq; ea etiā quae omnino macra sunt & infirma, & quaecunq; praehurmiditatis multitudine diffiunt. Quapropter ex piscibus, hi qui in fluminibus & stagnis degunt, uitandī sunt. Ex marinis autem, qui in perris degunt, his qui intra pelagi profundum uersantur, sunt praefere di. Qui tamen in profundo maris degunt, litoris praefrant: & litorē rursus, potiores sunt his qui in marinis paludibus nutritur, etiamq; his qui in magnarum urbium stagnis uictum querunt. Eligendi autem sunt maxime lupi & aselli mediocri magnitudine: scari autem & turdi ac gobij terriberrimi quidem sunt, & facillime secedunt: alimentum autē paucum, roburq; corpori addunt. Scaros autem hic non magnos intelligere oportet. Nulli autem & scorpij & passerēs, nutrimenti quidem ac roboris gratia omnū gratissimi existunt, grauiorem autem omnē habitum reddunt, ut ob eam causam frequentiores eorum usum uitare oporteat. Murenas autem & lo ligines, sepiasq; & polypodas, omniaq; simpliciter mollia, ut quae difficulter concoquantur, inflationes pariant, noxios humores generent, censo reprobanda. Ex his uero quae testa integuntur, squilla omnū minimū noxia existit: cancer turbaionem inducit: gammaro autem siue asfaro pro uoluptate fruatur. Ex ostreorum porro genere, purpure, & buccina reliquis praefrenda: deinde pelorides praefrant: postea herinacei recetēs: deinde quae proprie ostrea appellatur: reliqua uero relinqua. Ex uolucrum genere, gallinae omnibus praefrantiores. sint autē feras, & in moranis altae, deinde perdices, & palus, debilis nutrimenti gratia exhibēdi, turturesq; feri ac per agros nutriti & colūbae. Fugieda omnia uolucrum genera, quae in aquis degūt, tanquam graueolentia, & quae superfusa sitis multis abundēt. Ex quadrupedum animantium genere praefrant carnes suillae, tū cōctionis & alimēti roborisq;, quod inde corpori accedit, gratia, tū quod facile secerantur. secundo loco hoedinae habendae: reliquae uero domesticae fugiedae. Ex syluestribus & feris paucae, uarietatis tātum gratia dēnt. Omnes autem carnes quas exhibere uelis, ad duas dies promptas & paratas habere oportet: in hyeme praefrēt, ut friabiles reddantur: ex aqua etiā omnes coquantur, quae enim in saragine fricta sunt, quantum fieri potest uitentur. Cauendum etiam a uisceribus omnibus: sunt enim frigida, & turbationem mouent: difficulter concoquuntur: grauiasq; sunt, & saniosa, ac foetida: nimiasq; humectationes ac nauasas producant: maxime tamen omnium cerebrum. Pulmo sanē hoedini bis affatus, ac in cibo acceptus superabundans alimentum subtrahere uidetur. Qui uero uolū lacte replent, deindeq; coquunt, aut assant, uoluptatis gratia non uilitatis respectu id faciunt: multoq; magis qui eum frustatum concisum in saragine torrent. Sale conditi arietis pulmo maxime ueluti, difficulter & grauitē a uentre exspiratione. Cochleae autem terrestres succulentae in cibo sum-

preobluſtari & ſeſe opponere colicæ affectioni uiſentur. In liquamentis & cõdimentis cõueniunt, cum ſiſinum, menta, ruta, ſiſon, ſcniculum, origanũ, ammiſum, thymum, piper, zingiber, daucus, ſucus ſilphi, acetum, mel, garum, uinum. Pyrethrũ uero & liſticutum, ac helenium, ſimiliaq; magis medicamentaria ui prædita ſunt: & ob id in quotidiano uſu ac diæta uiſanda. In uniuerſum autem, ut ſummatim dicam, uniũs cõſectationem facere oportet, ut ſcilicet accepti cibi optime cõcoquantur. Particulatim uero, ut ne ſiccitas excrementa apprehendat, neq; fatigetur ueter in multis cibis cõficiendis: ne ueter ciborũ quaſitibus obluſctetur, uel ui ſi ægre eas cõficiat, & nimiam humectationem ei inferant, ne noxiũ humores generentur, neq; in uſere, neq; in uniuerſo corpore. Omnia enim in uulſa excrementa ex leui occasione ad affectũ ac infirmum mēbrum detruduntur. Quare uitare cõuenit omnia dulciora & placentas: plurima etiam ex bellariis ac fructibus; luciditatis tamen & gratificandi ſtomacho grada, uua alba dulcis præ ariditate corrugata cũ pane præbeatur: ſicusq; maturæ cuticula auulſa: uua etiã uſnaceis exemptis. Reliqua uero omnino ſunt fugienda. Vinum ſit ſub adſtringēs, album, tenue, pellucidũ, mediocri ætate, rēperatura dilutiore, modiceq; bibatur. Quod ſi ſitis a cibo accedat, aqua calida præbeatur. Inſenſiſima enim ipſis frigida exiſtit. Dulces autem prælibationes ex uino & melle apparatus, propomata Græcis appellata, eod quod ante cibos biberentur, omnes de uſandæ. Atq; hoc ſanẽ modo ea quæ ad colicorũ diętã pertinent, dijudicantur. Colicum remediũ ex ſtoechadæ, nephriticis cõmodum. Hoc omnes ueteres interiorũ membrorũ affectiones curauimus. Datur autem ex ordine diebus xxx. & perfectẽ ab omnibus affectionibus liberat. Stœchadis drach. xviii. radicis panacis drach. v. agarici drach. ii. cina momi, myrrhæ, ſeminis braſicæ ſylueſtris, iridis, mādregoræ, hyoſcyami albi ſeminis, coſti, nardi cretici quod plu appellat, ſpicæ nardi, piperis, opij, cuiuſq; drac. xii. (accipio aut piper longũ) mei drac. xviii. ſeminis dicuæ drac. xxiiii. dauci drac. viii. Cõuſa ex cipe melle deſumpta, ac exhibe robuſtis ſerup. ii. reliquis obol. ſii. febre carentibus, ex uino mulſo: febricitantibus, ex aqua. Inſuſum quoq; nucis ponticæ magnitudine cum oleo in quo ſcœnum gre cum & ruta cõctũ ſunt, colicorum dolores ſedat.

#### Pharmaca ad colicos.

Cap. xxxi.

Conuententiſſimum ad colicos pharmacũ uinum abſinthies exiſtit, ſi prælibatione a balneo aut exercitio opus habent: eſtq; etiam nõ ſiſentibus ualde cõmodum, ſi laxiore ac debiliore apprehendẽte aluo, cyathi temperati menſura ante aridorum ciborum cõmeſtionem accipiat. Apparatur autem uini abſinthies, & pro occasione, uirgis recentis & pleni abſinthij quindẽcim numero, per diem ac noctẽ in ſiſili uale uini tenuis & adſtringēſis mediocriter uetusti maceratis: menſura autem uini ſit ſextariorum trium. Decoctũ etiã herbæ ipſius, ubi ſemel tantum ebullierit, pari modo ad uinum quod alias pro conſuetudine bibant, admixtũ, uſitũ a balneo ac exercitio præbeatur. Melius autem eſt quod ubi oriũ ſit ſic præparatur. Selibra abſinthij in amphoram uini optimi recẽtis, quod muſtũ appellamus, conſicitur, ghlinitur, in eaq; permittitur, donec muſtum ceſſauit

rit ſeruere: deinde abſinthium quidẽ abijctur: uinum uero reponitur ac inueteraſcit. Habet autem omnino amphora ſextariis octo & quadragina. Vinum abſinthies aluum corroborat potenter, & quicquid lubricum inferne in aluo ac inſeſtinis hæret, dura animaduerſione deergicibilis generationem præpedir: ſtatuſq; alios quidẽ depellit, alios uero avertit: quodamq; modo ſpiritus diſpenſationi præſectum deſecat. Aloẽ etiam optima triũ dra chmarũ pondere deuorata apriſſima eſt, ubi nõ proratione ciborum egeſtio excrementorum fiat. Quẽ admodum autem optima aloẽ etiam ſola ſanitati reſtituere poteſt: ita uitioſa medicamentaria ſuperſtitate uentrem replet. Intercedentes uero obiter inflaſiones ſylueſtre cuminum, quod & ethiopicum appellant, cochlearij menſura ex aquæ calidæ cyathis duobus aut tribus potatum diſſoluitur: aut ſiſon ſimili modo: aut rutæ ramuli in aqua ipſa ſeruẽfacti. Caſtorum etiam aſiſide potatum totius affectionis apparatus demolitur, omnibusq; medicamentis præſtare repertum eſt: datur eiũs drachma una in tribus cyathis optimæ aquæ muſſæ. Lupi autẽ ſtercus maxime album ex aqua, aut uino albo & tenui ſumme colicis auxiliatur, inquit Galenus: non ſolum in accenſionibus & iritationibus, ſed tempore etiam interualli. Aut enim perfecte morbuſ ſedat, aut ita præparat, ut ad tempus aliquo mitius adſigat. Melius autem ſtercus cenſetur, quod non in terrã delapſum reperimus, uerum in fruticem aut herbam excretũ. Olla quoq; in ipſo ſtercore inueniuntur, quæ ipſius animalis cõcoctionem effugerunt, quæ ſi trita bibantur, magnopere colicis auxiliantur: quare mundioribus hominibus repurgatoria exhibenda ſunt cum ſale ac modico pipere mixta, aut alio quopiam ad commendationem odoris. Mirum in modum etiã maniſeſte colicos iuuat, inſtar amuleti alligatũ ilijũ ægroti idẽm lupi ſtercus: oportet autem ſilum quo amuletu colligatur ex oue a lupo diſcerpta ſumere, cum ſtercoreq; ipſo in pelle ceruina excepto, ac ſilo colligato, illa præcingere. Si uero non ſuppetet lana ex ouicula a lupo diſcerpta, ligamentũ ex ceruina itidẽ pelle accipere oportet. Corydus itẽ paſſerculiſ, qui & corydalus, hoc eſt galerita, appellatur, ſimilicĩ iure cõctus, aſiſidueq; unã cum iure acceptus, ſummopere colicis prodeſt. Uſitatuẽ enim ex eo expertus ſum, inquit Galenus. Cæterum paſſerculiſ, quos pyrgitas a turribus, & troglitas ab antris & cauernis appellant, ſimilis eſt, qui ſanẽ circa urbium muros uerſantur ac degũt: uerum hiſ maior eſt corydalus ipſe: habetq; in capite ueluti criſtam ſiue galeã ex pennis ſponte naturæ enatam, & circa uſas reperi tur hyemis præſertim tempore. Aliud. Talum ſuillum uſum & tritum, totũ ex aqua biſbendũ præbe. Aliud. Thymi cacumina in aqua ad tertias decoquũt, & ad percolatum decoctum mel deſpumatum adſicco, bibendumq; præbeto. Aliud. Radices uerberacæ rectæ tenuiter cõſaſas in aqua ad tertias decoquũt, ſeu uniũs per quinq; dies bibendum decoctum hoc præbeto: & colicis medeaberis. Vtere, eſt enim experimento cognium. Aliud. Hoc itẽdẽm experimento conſtat, eoq; ipſe liberatus ſum. Mentam uiridẽ aliquandũ decoquũt, decoctũq; bibendum ad dies tres exhibeto, & nunquam dolo re adſicetur. Cauendum autem ne olla in qua men-

ram decoquit, per tres dies terram contingat. Remedium uero hoc eiusmodi est, ut præsentem opem ferat, et multo usu cognitum. Lauri etiam teneriora uirgula arefacta comedenda præbe per tres dies, quibus mentæ decoctum potant. Aliud mirabile. Marrubium in uino mulso decoctum bibendum præbe. Liberabitur æger à dolore, neque unquam postea incidet in affectionem. Aliud. Rhamni folia uiridia trita in passillos informata, & exicca: drachmæ unam inde exhibe febre carentibus, cum uino: febrientibus uero cum hydromelite. Facit & ad uolulosos, omnemque dolorē flatuosum miro modo. Per ructus enim ac flatus exoluti à malo, sani fiunt. Aliud. Rhamni succum poculi mediocris mensura tantundemque passis cretici misceto: dumque in solium in balneo descendit, bibendum præbe; plurimumque tolerare id iubeto. In frigida autem aquæ solium nequaquam consendat. Experimētū cognitum est. Ex apparatus uero pharmacis hocce nobis familiare est, inquit Archigenes. Castorium & ammiū tenuissime trita duorum cochlearium mensura præbe ex aqua mulla. Secundum uero locum hoc habet. Castorei drach. iiii. ammi, seminis apij, foeniculi, cuiusque drac. i. exhibe eo modo quo præcedēs. Aliquando autem pro apio panacis radicem adijciens præbeo, assequorque rite quod uolo. Præstabile est & hoc. Anisi, castorei, æquales partes misceto, indeque dra. i. ex uino mulso exhibeto. Aliud. Gladiolum unā cum radice exiccatam, contusam, & cribratam cum pipēris granis undecim bibendā præbe, diuturno malo hoc medetur. Cæterū duo efficacissima ex multis omnino colī pharmacis usus approbatione præstantia, inquit Archigenes, unicuique cōmunicabo. Sagapēni, pipēris, galbani, pyrethri, croci, spondylii, myrrhæ, cuiusque drach. i. radices panacis drac. viii. excipe melle, & ad cerati consistutudinem redige. Vbi uero usus expetat, manipulū i. chamæleuces aut chamæpityos in uino optimo, leui, annicū heminarum quindecim mensura, usque ad tertias decoque. In hemina deinde decoctū una, ex pharmaco ad fabæ magnitudinem dissolue: idque semel primo mense bibendum præbe: secundo deinde mense bis; & tertio ter: atque hoc modo usque quo quinque exhibueris, secundum menses aut tione facta procedes: nisi alui ramenta inde succedant. ea enim leniter detrahēre hoc pharmacum consueuit.

Alterum uero ad dissoluendās accessiones, ualde efficax existit. Myrrhæ stactæ, opopanax, succi cyrenai, croci, pyrethri, galbani, sagapēni, cuiusque drach. viii. olei picini drach. i. mellis despumati quantum suffecerit, ut ad cerati spissitudinē redigatur. Ex hoc pharmaco drachma una, in tribus cyathis passis cretici dilui calidi liquefacta exhibetur. Neque uereor hæc etiā in accessionibus, nisi ex cruditate laboret æger, præbere, atque etiam in interstitiis per aliquas dies ex his affectionē expugnare, ualdeque mihi ex sententia res procedit. Theriace porro Andromachi ex uiperis cōstans interualli tēpore assidue accepta, prohibuit ne facile ab accessionis irritatione rursum imperirent. Antidotum Zopyrii appellata, præbens auxilium in debilibus doloribus existit: facta ad colicos & alui inflationes, & incipientes aquæ inter cutem suffusiones, maxime eam quæ tympanites appellatur: ualeat etiam ad iocineris affectiones:

prodestque his qui uenenum hauserunt. Myrrhæ troglodytice drac. v. spicæ nardi drac. v. croci drac. iiii. floris iūd odorati drac. iiii. & dimidiā, calsiæ drac. iiii. cinamomi drac. iiii. thuris dra. i. pipēris albi seculidrachmæ, costi dra. i. Excipe melle despumato, ac nucis pōicæ magnitudine præbe ex uini mulsi, aut passis ueteris cyathis duobus, aut ex aqua. Exhibeat etiam in colica diuturna, habita tamen prius corporis cura, paululū ante horā cibi sumēdi, ad dies ex ordine quindecim: deinde ubi ab eius exhibitio ne per quinque dies quieueris, rursus exhibe ad dies decē: iterumque post multorū dierū intercapedinē, parū præbe, donec ea amplius opus non habeat æger. At qui propria sua efficacia corpus se melius repræsentaturū promittit, tū carne, tū colore, tum sensu, tū firmitate. Archigenes porro Zopyriū antidotū sic parare iubet. Spicæ nardi drach. vi. floris iūdi odorati dra. v. myrrhæ dra. v. croci drac. iiii. calsiæ dra. iiii. cinamomi drac. iiii. pipēris dra. vi. costi obolum, thuris obolum. Cæterum præter opinionē colicis conueniens antidotus est, quæ pæonia appellatur. In ipsi enim uehementibus accessionibus irritationibus ante somnū exhibitum percussit dolores, somnumque dulcem simul produxit, ac morbum dissoluit. Quidam etiam ipsam cum oleo insudentes scopum attingerūt. Descripta autem habetur in tertio decimo De theriacis Sermone huius uidelicet tractatus: quare ea ipsa censeo confidenter esse utendum.

Aliud ualde bonū oxyporium, cito penetrans, tū colicis, tum inflatis commodum. Cumini tritentem, pipēris albi, cācaminum thymi, foliorum rutæ, nitri, singulorum unc. i. cōtere tū aceto, ac redige in passillos pondere unius aut duarum drachmarum. Exhibe iuxta cuiusque uires cū aqua calida. Aliud. Sifonis, calsiæ, foliorum lauri in umbra exiccatōrū, singulorum drach. viii. petroselinī drachm. iiii. spumæ nitri albæ drac. v. excipe melle, ac utere. Aut cochleare eius siccū ex aqua mulla, in quaruta decocta est, præbe. Aliud. Cumini syluestris cochlearia iiii. seminis coriandri, foeniculi, anisi, apij, seminis rutæ, cuiusque cochleare i. pipēris grana ix. uini sextarium i. Hæc tenuissime contrita uino permisce, & quotidie cyathum unum bibendum cū aquæ cyathis tribus præbe. A potu autem eger deambulet, & probe concoctionem iuuabit. Poteris & ipsum unum calefactū præbere. Aliud. Asclepiadæ, quod ab omni affectione penitus liberat. Corticis salicis uiridis drac. v. zingiberis drach. iiii. pipēris drach. ii. palmas passas iiii. rutæ uiridis ramulos v. aquæ pluuialis sextarios iiii. Omnia simul ad tertias decoquito, atque ad horas siue dies tres pro qualibet uice cyathos duos exhibeto: & post triginta dierum spatium idem rursus facto: quo per anni spatium unius, triginta & sex portiones contingant. Hoc enim pharmacū potatū hoc modo totam affectionem aufert.

Aliud. Cornu cerui recens enati adhuc capillis oblitū, tennerrimū ac uisū, cochlearia maioris modi iiii. pipēris albi grana ix. myrrhæ parum quid, ad commendandum odorem. Contere omnia, et sic cochlearum terrestrium magnarū unā cum testis suis tritarum, quantum uisum fuerit adijce: omniaque si mul trita, & uino salerno mari mixto tritum cyathorum mensura permixta, & ad mites prunas in uase sicili calēfacta, ac sedulo, ne quid in fundo residat,

agitata, præbe bibenda, ita ut nihil reliquū maneat: atq; id maxime tempore accessions, & ieiuno adhuc ægro fiat. Deinde uero dñū qui facile coñsistit præbeas, atq; hoc ex ordine ad dies tres exhibe. His uero qui cochleas sumere nō possunt, reliqua præbe sicca cū uino. Porio ad colicos, quæ etiā inflat, & difficulter cōcoquantibus, uolulofisq; est accomodata.

Abstinētiā, pulegij, piperis albi, cumini syluestris, baccarū lauri decoratarū, omnīū æquales partes excitas ac tritas, cochlearij mēsurā præbe ex aqua calida. Vtreq; eo confiderit. Aliud colicū remediū per experitiā receptū. Baccas lauri i. x. pipe ris grana vii. opopanaca magnitudinis dceris. consice in aquæ cyathos iiii. totūq; simul seruefactū bibendū præbe, quiescatq; inde æger, & perfectē sanitati restituitur. Oportet autē, inquit Galenus, ad uisus masculi, ad feminas mulieris sexus herinaceli internā mēbranā accipere, excicareq; ac contundere: eiusq; partes tres prædictis ammiscere. Aliud, ad colicos prælarū. Colocynthida maximā nō solū serro perforatā, sed & semine ciecto euacuata, ita tamē ut id quod insit in tomēti in ea est relinquant, uino ueteri dulci quantum ei in capere potest exple, eāq; per noctē integrā reponere: mane uero unum ipsū per panniculum diligenter exprime, ac percola, ut nihil ex medulla eius in ipso potu residuum maneat: unumq; ipsum calefactum bibendum præbe, quo facto æger deambulet & liberabitur.

De antidotis dolorem leuantibus, insusisq; colicis accommodatis, Galeni.

Cap. xxxii.

Pharmacis dolorem leuantibus, medicū ut consueuerunt, ubi magnus adest dolor, aut uigiliæ, aut ne ob uolentā tussim lācinentur ægri, uelut in sanguinis reiectatiōe, & destillationibus à capite cōtingere solet. Verum in illis mediocria exhibere solemus: quales sunt ex seminis cōstantes tussis accomodate facultates, quæ & ipse omnino aliquid ex sapore inducētibus pharmacis admixtum habent: uerū modicū id est inter multa adeo semina, quæ & boni odoris sunt, tenuiumq; partū, & urinā dēnt: cumini dico, daucumq; & anisum, & quæ his similia existūt. Cæterū quæ ad colicos apparantur pharmaca dolorē leuatiā eiusdē quidē generis cū illis sunt, uerū lōge maiori facultate prædita, atq; id ob magnitudinē in eis doloris. Opū igitur fortissimū est stupefactiū: ammiscere autem ei oportet, ea quæ aut dolorosam affectionem cōcoquere possunt, aut humores ab ipso faecos discutere, aut secare & attenuare, aut secundum se ipsos substatiam permutare. Scopos enim nobis in his est, primū quidē ut sensum stupidū reddamus, deinde ut nihil in posterū ex stupefactiū pharmacō relinquant, quod mēbro nocumētum inferre possit. Amplius autem, ut quod maximū est, affectioni opitulemur. Ad hæc itaq; respectu habito, uidetur mihi debito modo & iuxta rationē propositi componere pharmacū: ex hyoscyami quidem & opij permixtione, quicūq; aliorū somnū ac soporē, sensitiuūq; facultatis stuporē inducere uelit: quo uero citius digeratur, omnēq; profunditatē affectorū corporū penetret, calefactiā ammiscere oportet, piper uidelicet ac euphorbium & pyrethrum, quæ notuos humores discutere possunt, & repurgare uiscosos, secareq; crassos, & status uentosos attenuare, concoquereq; & euacuare. Neq; uero parum concocto

riæ facultatis frigidorum præsertim humorum in indica nardo existit: quemadmodum autem ex aromaticis nardum coëdit Philo, sic & hi qui ei successerunt, alij aliud adiecerunt: florem iunci odorati, cassiam, amomum, ac cosum. Quemadmodum autem rursus crocum cōiicit Philo concoctorum pharmacum ad humorē & affectionē crudā: ita alij myrrhāq; & castoriū ammiscuerunt: plurimūq; ex ipsis, neque id male, etiam familiaria nobis semina, apij uidelicet & cumini, anisiq; ac dauci, & petroselinij, & quæcūque eius generis existunt, adiecerunt, quo uidelicet amarorum pharmacorum iniucunditatem lenirent, ad digestionē & urinæ expulsionē totum pharmacum impellerent atque inhortarentur. Si uero uaporum aut humorum transiutudinem attenuare oporteat, & hoc ipsum per ea cōtingit. Prima itaq; ut appareat, ex omnibus uetustioribus prædara Philonis antidotus existit, de qua ipse hæc scribit.

Philonis antidotus. Philonis Tharsensis medici magnum mortalibus inuentum ad mularum affectionum dolores, siue cum quis doleat semel datum, siue iecur, siue etiam urinæ difficultas, aut calculi morbus, aut orthopnea, aut tabes infestet. Sannat & conuulsionem & pleuritidem, ac sanguinis reiectionem, aduersusq; moriē se opponit, omnes uiscerum dolores sedat, tussimq; & suffocationem, singultumq; & destillationem. Hanc etiam Andromachus in suos commentarios retulit, hoc modo de ea scribens: Colica antidotus admirabilis, qua uitor & ad uolulofos, & ad eos qui stercorea per uomitū reijciunt in maximis doloribus: datur magnitudinē fabæ ex cyathis tribus aut quatuor aquæ frigidæ. Composito autem hoc modo habet. Piperis albi drac. x l. opij drac. x x. croci dra. x. seminis hyoscyami albi drac. x l. spicæ nardi drac. ii. costij, piperis albi, cuiusque drach. ii. ex dpe melle cocto, ac utere. Alia antidotus colica, Nicostriati Isotheos appellata, duobus talentis empta, faciens ad stomachicos qui cibū continere non possunt, oculorū affectiones, & magnas uexationes, & dolores uuluae, ex hydromellite in quo ruta fit incocta. Croci selsquidrachmam, myrrhæ drac. ii. spicæ nardi drac. ii. costij, piperis albi, piperis longij, galbani, cuiusque drac. i. cinamomi, succi mandragoræ, castoriij cuiusque drach. ii. seminis dauci selsquidrachmam, alij drach. iii. & dimidiam eius cōiiciunt, opobalsami drachm. iiii. sagapeni drac. iiii. cassiæ drachm. iiii. ex dpe melle despumato, & fabæ magnitudine præbe.

Que colicis insundantur, & per anum subdantur.

Cap. xxxiii.

Huius generis sunt etiam, quæ sedi applicantur, quæq; ad leuandum dolorem per anum, tum subduntur, tum insunduntur. Opium itaq; ex genere eorum est, quæ fortiter sensum stupidum reddunt, ac somnum soporiferum inducunt. Atq; hæc facit tum per se solū, tum cū pari castorio in sapa aut oleo rutaceo imbutum, tomentō quo exceptum, & ano inditum. Misce enim hæc pharmaca oportet quopiam uires ipsius opij mitigante, nocumētumq; quod inde mēbris inferit impediēte, ampliusq; affectionem inuante. Aliud, quod subditur colicis, ad dolorem leuandum. Castori, croci, opij, myrrhæ, styracis, æquales partes in collyria longa redige cum aqua, & utere. Insusum ad colicos mirabile. Cedriæ quadran

quadrantem, picis liquidæ semissim, castorij sexqui-  
unciam, opij sexquiuunciam, piperis grana .x. unito  
cum digito medio, uel eo qui index appellatur, usq;  
ad primam flexuram unctō, & simul cū olei ruta-  
cæ cyatho .i. inquinato, ammixtaq; butyri unc. i. tere-  
binthinæ sexquiuunciam, tepefactum per fistulam am-  
pliolem infundito: subidet enim & dehiscit, ac ab  
unione discedit. Aliud infusum, quod ante somnū  
acceptum, somnum condilat, dolorem lenit, conco-  
ctionemq; probe iuuat: Succī absinthij drachm.  
i. i. i. opij drach. i. i. i. aloës drachm. x. i. i. picis liquidæ  
unc. i. cedriæ unc. i. myrrhæ unciam unam, centau-  
ree drach. i. i. i. castorij drach. x. costi drachm. vi. ma-  
stiches unc. i. foliorum rutæ unciam unam, styracis  
unc. i. mellis & terebinthinæ liquidæ quantum ad  
coactionem sufficit, quo ad mellis crassitudinem re-  
digatur. Vsu uero expetere ex pharmaco hoc drach-  
mas plus minus quatuor, iuxta ægri uires ac ætatē,  
in diplomate cum oleo cyprino, glucino; & anethi-  
no, tellino, in quibus cuminum concludum coctū est  
dissolue, modicumque butyrum ammisce. Et ubi al-  
uum per clysterem stercoreis eductum prius euac-  
uaueris, deindeq; laueris, & cibum exhibueris, ac  
caput ex anethino aut omphacino illeueris, ante  
somnia infunde. Vere, experimento enim con-  
stat. Aliud, quod inferne infunditur, quo ego usus  
magnum nomē assequutus sum. Castorij drac. i. i. i.  
croci sextantem, alij tamen drac. i. i. tantum habent,  
opij trientē, myrrhæ drachm. i. i. i. succi rutæ drach.  
i. i. i. niri rubri drach. i. i. quidam uero pro nitro spicā  
nardi scribunt, excipe melle despumato cocto. Vsu  
uero tempore nudis auellane parue magnitudine,  
aut sabæ tantum accipe, ac in uini mēsurā unā dissol-  
ue, affusaq; olei rutacæ mēsurā una, ut uidelicet duæ  
mēsuræ sint in totum, permisce, ac præloto ægro,  
ante somnum infunde. Cæterum præscriptas ad do-  
lorem leuandū antidotos & infusiones uitare opor-  
tet, ne in nimis asiduū uisum conuertamus: sedant  
enim cōfestim dolores, causas uero intus referunt:  
& aut paulo post animi deliquium inferunt, & mor-  
tem, aut diuturnas & indissolubiles affectiones red-  
dunt. Aliud infusum mirabile. Butyri quincun-  
cem, adipis anserini, adipis gallinacæ, medullæ cerui-  
næ, terebinthinæ, cuiusq; sextantem, adipis urini  
unc. i. cumini, foliorū rutæ, castorij, cuiusq; quadrā-  
tem, euphorbij recētis drach. vi. opobalsami septum  
cē, nardi celticæ trientē, unguētū nardinī lib. i. olei  
rutacæ sextarios i. i. i. Vere hoc ipso in uehementi-  
bus doloribus: euacuatione tamen prius per clyste-  
rem facta, & post horæ spatium mensuram unam  
mediocri poculi tepefactam infunde, quiescereq; iu-  
be, ac aliquandiu pharmacum retinere: atque ita di-  
uina eius uidebis facultatē. Aliud infusum, quod  
etiam causas euacuat, ac dolorem leuat, facit & ad  
diuturnam renū affectionem, & ad calculosos: eosq;  
qui inuoluntariē urinam eijciunt. Alij capita ma-  
gna tria, rutæ uiridis manipulares fasciculos duos,  
olei dulcis lib. i. i. i. Allia decoratō, & cī ruta ac o-  
leo donec torrefiat coquito, atq; id ad prunas fumū  
nō emittentes facto, ac deinde percolato, ad oleūq;  
butyri lib. i. affundito, picis liquidæ sextarij italici  
quartā partem, cedriæ tantundem: unito, ac in uis-  
treo uase recondito. Vsu autem expetente, sextantē  
inde, aut minus iuxta ægri uires accipito, oleoq; &

uino pari mēsurā acceptis, ita ut totū hemina una  
 fiat, cōmisceto, tepefactumq; infundito. Aliud in-  
fusum. Olei cyprini lib. v. castorij sexuncem, anti-  
doti regiæ quæ etiam tetracharmacum appellatur,  
sexuncem, emplastrū ex succis sexuncem, terebinthi-  
næ sexuncem, butyri sexuncem, baccas lauri centum  
& unam, baccas alij magnas quinquaginta unam,  
cumini laui unciam unam, rutæ manipulum unum.  
Baccas lauri & allia mundato: latum uero cuminū  
& rutam in pila tundito, & in hemina una uini uete-  
ris dulcis macerato. Sequenti uero die affuso oleo  
& butyro, in diplomate decoquito, percolato, ac re-  
liqua ammisce, pariterq; castorium cum oleo tri-  
tum. Vitor. Vbi uero usus postulauerit, pharmaci  
huius sextantem accipito, & adipis anserini liquefa-  
cti itidem sextantem ammisce, tepefactumq; inijci-  
to. Infusum colicum admirandum. Fœni græci  
ac lini seminis æquales partes, quantum satis uidebi-  
tur accipito, & in aqua præmacerata decoquito, atq;  
ubi succus inde prodierit, quantum ad usum satis ui-  
debitur percolato, ac in eo ipso quod percolaueris,  
lanas succida eluito, expressisque lanis, ad aquam,  
salem & oleum moderate adijcito, simulque unito,  
ac tepefacta infundito.

Cataplasma colicū, ex libris Seueri. Cap. xxxiiii.  
arinæ cicerum nigrorum, seminis brasicæ, farsing fœ-  
ni græci, singulorum æquales partes decoque cum  
melle, oleoq; cyprino, modico uino affuso. Est &  
alterum admirabile remedium, cuius efficaciam ex-  
primētum ipsum approbavit. Accipiat autem fœ-  
ni græci partes i. i. baccarum lauri confusuram, ma-  
stiches chiæ, & terebinthinæ, singulorum partē unā.  
Coquitur cum uino & melle. Epithema coli-  
cis, inflatis. Silphium plurimum cerato cyprino  
excipe, & impone. Ego uero, inquit Archigenes,  
etiā castorij paululū admisceo, efficaciusq; redditur  
ad stomachi præsertim inflationes. Aliud epithe-  
ma ad colicos, inflatos, cox endicum dolores, pleuri-  
ticos, ac stomachicos, & diuturnū uomitū cibitra-  
hit etiā, ac duritias emollit. Ceræ, picis, resinæ pi-  
nus, adipis taurini, baccarum lauri, singulorū quin-  
cuncem, ammoniac thymiamatis trientem, galbani  
quadrantem, piperis sexquiuunciam. Aliquæ etiam cā-  
thyros quadrantem, ammiq; tantundem coniiciūt.

Aliud. Ceræ libras i. i. celtici nardi, floris iunci  
odorati, cassiæ, cyperi, cuiusq; sextantem, colopho-  
niæ libras i. i. terebinthinæ sexquiliibrā, thuris, py-  
rethri, cuiusq; sexquiuunciam, euphorbij unciam i.  
costi drachm. xxx. unguenti irini quantum suffe-  
cerit. Arida in uino rigata ac exiccata cōiundito &  
cibrato, atq; ita liquefactis inspergito. Ad sinē etiā  
opobalsami sextantē aut quadrantē ammisce. Fa-  
cit quæcūq; etiā polyarchion: maxime tamē inflatis  
conducit. Vtendū quoq; ad colicos paulo mox sub-  
scripto polyarchio appellato, atq; eo quod ex baccis  
lauri constat, quod ad hydropicos describitur, & si  
qua his similia existunt. Proprie autē colicis conue-  
nit, inflamatisq; & inflatis, quod in epistolis Archi-  
genis refertur, ex seminibus constans. Ceræ drach-  
mas centum, terebinthinæ drach. l. ammoniaci thy-  
miamatis dra. l. opopanas, iuridis illiricæ, anisi, me-  
liloti, nitri, adipis taurini, fœni græci, seminis apij,  
cuiusq; drach. xxxv. mellis sexuncem, aceti cyathos  
duos. Arida coniundito & cibrato: ammoniacum  
B 2 autem



autem in aceto multo per noctem unam maceratum reponito, postera die liquefibilis seruefacto, in mortario cum pistillo tusa commisceto. Hoc epithema hoc modo purum citra aliarum rerum admixtionem impostum, cutem exasperat, eisque qui vitio sis humoribus amplius abundat, serpiginosum pruritum excitat, quare in his qui teneriores carnes habent, ex cerato rosaceo quantum tibi satis videbitur pro curandi corporis ratione, ammisceto. Dropax etiam assidue super omnem venris amplitudinem iniiciatur, atque etiam super dorsum. Cōponatur autem is ex pice & resina, modica cera, sulphure, bitumine, manna, nitro, adarce. Intenditur autem usus eius si calidiori & non pinguefactæ cuticulæ admo ueatur, atque etiam inter exercitia incumbere sinatur. Aliquando etiam balneum suscipiatur, ex nitro assa to toto corpore large conserpso. Huiusmodi enim dropacis usus uolentius adfectionē destruit, sicut & sinapismus & thapsiæ usus multis quæ antea exquisita digesta sunt usi, & per aliu, si quidem adstricta fuerit, sunt euacuat, affectionem omnē excidit. Porro dropacum & sinapismorum apparatus in tertio Sermo ne sunt descripti. Aliud, Ardigenis, uile quidem, uerum ob efficaciam ipsius lenitatem in precio habē dum. Picis liquidae libras ii. ceræ sexticem, sulphuris uiui, niri, aluminis scissilis, cuiusque quadrantem. Ad picem liquidam præcoctam usquequo non amplius inquit manus, ceram iniecto, qua liquefacta ab igne tollito, aridaque tenuissime trita inspergito, unito, emollito, ac uitoto. Flatus inferne ducit, cutē uellendo iucte afficit, ac per omnia colicis auxiliatur. Prodest etiam coxendicū doloribus, & articulis refrigeratis, lienique indurato. Epithema ex bacis lauri, ad colicos. Ceræ, colophoniæ, picis sicce, spurmæ niri albi, ammoniaci, cuiusque dextantem, bacarum lauri decordicarum sesquilibram, piperis sextantem & uncia dimidium, ammi, canchrysos, iridis, cuiusque sesquiunciam, galbani sesquiunciam, unguiti irini librā unam. Quod si cāchrysos nō adsit, pyrethri cōijce, & liquefacta cū siccis permisce. Hoc etiam approbat Oribasius. Polyarchion, quod in Alexandria præparatur. Calsiæ, amomi, rosarii, cyperi, cardamomi, spicæ nardi, nardi celicæ, solij, iridis, ænanthes, cōpositionis hedychoi, mastiches, croci, melliloti, succi absinthij, ammoniaci, thymiamatis, aloës, bdellij, myrrhæ, cuiusque unc. i. xyloci namomi, piperis cōmuns, helenij, styracis, cyphæos, thuris, cuiusque sequiunciam. Succos cum aridis com munito, ammiscetoque xylobalsami scrup. xii. floris iunci odorati scrupulos xii. terebinthinæ sexuncē, unguenti nardini bestem, rosarii lib. i. hederæ unc. xvi. opobalsami sextantē. Succuleta uino diluta terito. Polyarchion, quod dialema, id est intermissio, appellatur: quod ipsum & in Alexandria præparatur. Castorij unc. i. piperis longi sexquidantē, myrrhæ, opobalsami, hedychoi, foliorum malabathri, cassiæ, radicis panacis, spicæ nardi, cuiusque quadrantē, costi sextantē, amomi sextantem, cinamomi sesquiunciam, aut pro eo calsiæ quadrantē, floris iunci odora ti trientē, croci sextantē, cyperi, cardamomi, iridis, aristolochiæ lōgæ, aristolochiæ rotundæ cuiusque sextantē, pyrethri trientē, ammoniaci thymiamatis quadrantē, aloës quadrantem, ceræ lib. iiii. terebinthinæ lib. iiii. resinæ trientem, unguenti nardini lib. iiii. quit-

dam etiam styracis sextantem addunt. uini uero quantum omnino sufficit. Polyarchion multo experimento cognitum, quo confidenter ad omnes diuturnos frigidosos, præsertim circa uiscera morbos utaris, ego sanē eius usu semper clarus euasi. Styracis pinguis dextantem, foliorum malabathri sextantem unciamque dimidiam, malorum cotoneorum re purgatorum uncias xv. masuaphij uncias duas & dimidiam, spicæ nardi, croci, cuiusque sextantē, dimidiamque unciam, mīcarū purarū dextantē, cyphæos dextantem, ænanthes quincuncem, carpobalsami sequiunciam, costi absinthij unc. ii. & dimidiam, mastiches unc. ii. & dimidiam, chareophylli unc. i. scrupulos vi. ammoniaci thymiamatis unc. xx. colophoniæ unc. xvi. opobalsami unc. xii. & dimidiam, olei gluci ni deuncem, nardini dextantem, melini unc. xx. pro polis dextantem, rosaci sextantem unciamque dimidiam, mellis cochlearia uiginti, terebinthinæ chisæ unc. xx. ceræ unc. xv. uini spathitæ quantum sufficit ad reliqua cum eo conterenda, & ad rigandas mīcas. Arida quidem omnia contundito & cribrato, mala uero cotonea concisa cum uino spathite coquit, ac per se terito, deinde ammoniacum & mastichē cum uino conterito. Styracem uero cum opobalsamo in altero mortario dissoluit, atque omnia trita ac dissoluta simul unito, liquefactisque quæ liquefieri possunt, & ab igne ablatis arida infarcito, ac donec refrigerentur agitato; deinde quæ ad ea quæ in mortario trita sunt adijcitur, ac unito, adiecto etiam immelle, post uero emollito ac optime subacto, tanquam ualde probato uitoto. Aliud epithema præter opinionem efficax ad omnes præcordiorum uentustissimas etiam affectiones, præsertim in stomacho ac uentre. Quibusdam etiam quibus aqua inter cumentiam suffundi inceptit, profuit. Durities enim in stomacho uicē dissoluit, supra hoc quod uisceribus robur & firmitatem addit. Compositio hoc modo habet. Resing pinus libras x. ceræ libras quinq, terebinthine deunces duas, olei lēscini uncias xvi. glucini uncias xvi. thuris quincuncem, ladani quadrantem, ammoniaci thymiamatis, nardi celicæ, succi absinthij, mastiches, bdellij, cassiæ, cuiusque quincuncem, cardamomi, floris iunci odorati, iridis, balsamitiorum, singulorum trientem, carpobalsami quadrantem, chareophylli quadrantem, herbæ sabine quadrantem, statæ albæ quadrantem, piperis sextantem, suffimentorum subscriptorum libras iiii. ænantharij quantum sufficit. Suffimentorum uero quæ ad huius epithematis compositionem conijciuntur, apparatus hic est. Lillorum alborum depuratorū lib. ii. styracis pinguis libras duas & dimidiam, solij lib. i. careophylli trientem, costi trientem, spicæ nardi trientem, mastiches quincuncem, amomi sexuncem, onychum aromaticorū ustorū & exustorū, opobalsami, singulorum bestem, carpobalsami sexuncem. Apparato ac redigito in pastillos, eisque ad præscriptam compositionem utaris.

Quomodo aluum fluxione laborantē curare oportet: ex libris Philumeni. Cap. xxxv.

Alius tum in febribus, tum citra febres, fluxione laborat, maiori uero difficultate eorum, qui febricitant, cura perficitur, coniecturaque exquisitiore opus habet. In principio enim aliena à natura salubriter euacuare conuenit, ipsa uidelicet natura undiqueque ad flum perfluum

perfluum & incommodum reijciendum cogere, quæ admodum in febrilibus morbis frequenter fieri uidemus. Conuenit itaque rebus sic stantibus, aut usquequo natura omnem curam suam impenderit expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare. Etenim obstruere & excretionishibitionem moliri, maiorem morbum facit: siquidem quæ cohibentur sursum perlata dolores capitis, aut phrenitidas, aut lethargos, aut parotidas inferunt planè perniciosos. Quare in principio ea quæ in corporis commoditatem utiliter excernuntur, minime inhibere oportet. Postquam uero iam diutius perseverauerint fluxiones, non solum superflua euacuantes, uerum habitum ueluti colligantes, uiresq; cõsumentes: tunc sanè resistere eis oportet, tñ per ea quæ per os sumuntur, tñ quæ per anum infunduntur, atq; ea quæ forinsecus imponuntur. Si itaq; biliosa pura recemeta prodierint, in magis salubria permutare ipsa oportet, non tamen perhibitione eos curare. Biliosum enim tñ in uentre, tum in ieiuno intestino aggregatum, atq; post coacervationem retentum maxime lædendū: nam & stomachum subuertit, & uisceribus inflammationes infert, & sidam accedit, & febres instaurat, omnesq; prædictas affectiones in capite efficit, atq; in totum grauiorem affectionem reddit. Lac igitur in tali incommoditate bubulum aut caprinum tepidum, recens multum ac potatum auxiliatur, aut ad ignem decoctum, assidueq; agitatū, donec ad tertias sit reductū: quod ipsum & per fluuiales filices, siccitq; laminas igni cadesfactas ac in lacte extinctas fieri potest. Cæterū in decoquendo superstante concretione siue spumam mystro aut pinna auferre oportet. Hoc enim nullum compendiosius remedium ad fluxiones biliosas reperire possis. Quandoquidem autem febricitantibus lac ipsum in nidore aut etiā acore conuerti consueuit, maiusq; nocuentū quā cõmoditatis inferret: tñ sanè in præsens ipsum exhibere uitabimus: aquæ uero quarta parte ad lac ipsum affusa, decoctione faciemus, donec dimidiū totius cõsumatur, atq; hoc modo exhibebimus. Et hæc quidem ad biliosas fluxiones sufficiant: ad alias uero ubi sufficiens iam euacuatio sit facta, fluxioq; ipsa adhuc per seueret, irrigationes adhibeantur ex oleo omphacino, aut rosaceo, aut melino cum uino: efficacius autē his myrteum est, si uehementiori indigeat adstrictio ne, tertia aut quarta uini parte ei admixta. Quod si robustiora corpora cõtینگant, gallæ, malicoriorū, cupressi pilulæ, in ipsa irrigatione incoquantur. Cum num etiā tritum lanæ cõsoluata infardatur, & apij similiter semen pari pondere: urinam enim iritat, fluxionesq; ad intestina ed diuertit. Cæterum & sedes ipsa ex decocto quopiam prædictorum adstringentium foueatur. Perseuerante autem adhuc fluxione, etiam cataplasmatibus ex palmis & acacia & alumine erit utendum: ceratis itē ex oleo myrteo apparatus. Conueniunt quoque emplastra ex eadem materia apparatus. Parabile uero & efficax hocce est. Mora præ immaturitate adhuc acerbiora, & albicania, septem accipe, probeq; cõtēre: deinde ceratum ex oleo omphacino apparatus, ita ut ceræ in eo uncia sit, olei uero sextans, adijce, uni, & utere. Idem facitum cruda mora exiccata cum ouo trita ac illita. Porro inueterata iam affectiōni epithema ex cenanthe conuenit, & ex micis emplastrum in stomachicis deseri-

ptum, quod spumam argenti & cerulam admixtam habet: item reliqua quæ in sermone de coeliaca affectione describuntur. In potu uero accepta uentris fluxus, post sufficentem inutilium euacuationē, sanant: capilli ueneris decoctum, palisuri folia, uinacei uiræ triti, spica nardi, spinæ albæ radix, quin & coeliacis & stomachicis eadem opitulantur. Mora etiam immatura & adhuc acerba ad solem pluribus diebus desiccata, deinde trita & reposita, usuq; expetente bibita, magnum pharmacum alui restrictum sunt, ut ad diuturnas etiam coeliacas affectiones cõmmodè exhibeantur, aliasq; omnes quæ fluidæ existunt, atq; etiam dysenterias. Contunduntur quoq; & obsonijs ammiscuntur, quemadmodum rhus culinarius consueuit. Magis tamen aluum cohibent rubi mora immatura & acerba eodē modo exiccata, & in potu exhibita. Illitio enim optima ad fluidam aluum eiusmodi utaris. Acaciæ, mastiches, cennathes, cuiusq; æquales partes accipe, ac unumquodq; per se cõtēre, deindeq; permisce, ac sicca adserua. Necesse tate uero exigente ouo subacta aluo illinito, fasciculūq; lanæ purpureæ imposito & obligato. Māto uero adhuc perdurante, etiam dorsum inde illinito.

*Curā eorum qui ex debilitate alui fluxione laborant: ex libris Galeni.* Cap. xxxvi.

Vnumquodq; membrum propria actione persungitur, quum temperamentum suum iuxta naturam adseruat. Seruabitur autem temperamentum, si refrigeremus, ubi ad caliditatem fuerit diuersum: contraq; calefaciamus refrigeratum: humectemus uero exiccatum, & rursus desiccemus humectum. Iuxtaq; eandem proportionem etiam tractemus eos, qui ex harum intemperierum complexu & coniugatione afficiuntur. Oportet enim semper excessui contrarium opponere, usquequo ad moderationē, & in id quod iuxta naturam habet, membrum ipsum reducat. Ratione igitur edoctus sum etiam octo differentias curationis imbecilli uentris esse. Calidæ intemperiei cura. Vidisti namq; & tu ipse aliquos quidem per diem unam, quosdam autem ampliori spatio, frigida potu curatos: quorum aliquibus nō solum recentem frigidam fontanam exhibui, sed etiam coctā & postea niue adobrutam & refrigeratam. Edulsa etiam hoc modo refrigerata eos accipere, uidisti me concedentem: maxime si à plurima caliditate uexarentur. Dedi autem & lactis spumam similiter refrigeratam, & frigida iuxta ipsorum uires poma eodē modo refrigerata: pistinam quoq; citra salis aut alterius rei admixtionem probe coctā, aliasq; eius generis infinita: unicum scopum refrigeradi propositū habens. Prohibui autē ne absinthium aut aliqua adstringentia contingerent. Frigidæ intemperiei cura. Alios autem ex frigida intemperie laborantes, similiter ab adstringentium usu prohibui, omnibus uero modis calefeci: uino ueteri facultatis plurimū calidæ exhibitio: itemq; cibis calefacientibus cum pipere. Humidæ intemperiei curatio. Quibusdam uero humidam uentris intemperiem habentibus, medicationis scopū in exiccando feci, dedi q; eis edulsa ex natura sicca: carnes probe assatas, & paucū potum: omniumq; adstringentium usum his cõuenientissimus existit: in quibus enim humiditas multa ac ueluti maior circa affectum membrum adest, citra tamē humorum uisidationem, ita ut quantitas tantum ex-

cessu adfiliant, ac ueluti persilliantem ipsum uentrē reddant: in his commodissimum existit ciborum ac potuum, itemq; pharmacorum adstringentium usus: exoluto nimirum ac languido tunc facto ægroto membro. Cura uentris ob siccitatē immodice fluidi. Alium autem siccissimum iam factum, ut tabidis simillimam figuram haberet, in cōtrarium omnino habitum deducit curauit. Huic quum in principio exigua intemperie uexaretur, à siccitate uidelicet humectatione indigente, medici qui cum curandum fu seceperant, abstinuit bibedum dederunt: malaq; coctonea, ac similia in cibo, extrinsecusq; similiter adstringentia adhibuerunt, atq; hoc modo totum aridū hominem reddiderunt. Hunc ipsum nos curauimus uniuerso corpore eius omnibus modis humectato. Qualis autem est senectus in sanis, talis est siccitas in ægris: ut etiam incurabilis existat, ubi persiccitē compleatur. Persiccum autem complementū in hoc est, si solida substantia similarum corporum aridior fiat. Est autem & altera quædam siccitas eorum corporum, quæ ex substantia humore compacta constant, uelut est caro & pinguedo. Alia etiā tercia siccitas est, quum humiditas ex qua membra connutriuntur est deperdita. Circumsunditur autem ea ipsa humiditas circa omnes animantis partes, instar roris in ipsis dispersa, quam impossibile est ipsis mēbris apponere citra nutrimentum: quare difficilima omnium huius affectionis cura existit. Alia autem siccitas est, quæ circa paruas arterias ac uenas cuiq; membro proprias consistit: hæc ipsa ob sanguinis penuriam contingit. Omnes uero has siccitatis species extreme offendunt austerorum ciborum ac potuum pharmacorumq; exhibitiones. Consumunt enim etiā si quid in ipsis innat ac insitū humoris relinquantur, parum quidem exhaurentes, parum uero exprimentes per meatus in interiorem latitudinem alui, parum etiā ad alia membra depellentes. Curare igitur has siccitates conuenit, tum conclusos meatus laxando, tum quod ad circumiacentes partes depulsum est attrahendo, per humectantemq; cibum unumquodq; simile membrum propria humiditate replendo: quemadmodum nos arefactū penitus à medicis hominē curauimus. Balneū itaq; temperatissimum his conueniuit: ut æger aliquandiu in tēperata aqua moretur. Præstat autem prope exteriores balnei fores calidē soliti locari: neq; enim aërè omnino ad ipsos indigemus. Oportet etiā gestando ipsum in balneum inducere, atq; inde educere. Deinde ex oleo antequam induatur inungere. A balneo uero statim lac asininum recens multum exhibendum, alina in domum in qua decumbit æger deducta: paucissimo enim tēpore in ambiente aërè lac ipsum morari oportet. Parum etiā mellis optimi tepidi lacti ammiscendum, atq; ita usq; ad secundum balneū quiescendum. Postea uero mediocriter & accurate fricauit, secundum lauabimus diligētī coniectura, tum ex ructibus, tum ex uentris tumore facta, an exhibitus cibus sit rite confectus: modicum uero tempus à primo balneo usque ad secundum intercedat, horarum IIII. aut V. puo, maxime si tertio etiā ipsum lauare uelis: id si non uelis, non refert etiam plurimum. Lauabis autem tertio, si aduersus sit balneis plurimis uis: & hoc sanè minime negligamus, quo à singulis balneis priusquam induatur, oleo cū

inungamus. Cæterum si laetis usu delectetur, etiam à secundo balneo ipsum propinabimus: si uero non, pisanam probe decoctam, aut halicam instar pisanæ dococtam dabimus, indeq; statim rursus quiescere iussim, postea ad tertium balneum ducemus: aut cōtra, ad cenam, si lauare nō uelit. Panis ei preparetur cibari, purus, recēs, probe assatus, fermentum & salem mediocriter admixta habens. Pro obsonio sit piscium quispiā petrosus aquis degentū, aut asellus ex iure aloi. Atqui & alæ & testiculi gallinaceorum lacte nutritorū conueniunt: perdecies item ac auiculæ montanæ ac molles carnes habentes. Verum quæ in palustribus ac fluminibus degunt uitanda: omniaq; duras habentia carnes, & graueolentia, pinguiatq; & fibris referta: & ut summatim dicā, caput cibi sit ut bene nutriat, & facile concoquatur, minimèq; uiscozus sit, neq; superfluitatib; abundet. In potu sumat uinum album colore, tenuèq; substantia, & modice omnino adstringens, purūq; & parum aque ferens, quo nomine accipi uolo, id quod quum temperatur modicā omnino aque admixtionē perferre potest. Scopus autē quæritatis potus in hoc sit propositus, ut nūquam uentriculo innaret, neq; fluctuationis aliq; sensus faciat. In cibus uero spectetur, ut quantum possibile sit, uentrem non grauent, celeriter concoquantur, & inflationem non pariant. Atq; hoc sanè modo maxima corporis siccitas curatur. Quū uero mediocriter siccitas existit, utpote quū uires nō extreme sunt collapsæ, pleniorē dietā sufficere expedit. Proponatur autē siccitas similis quidem prædictæ, cum quatamen frigiditas sit coniugata: in tantum igitur prædictis ex calefactū sylvæ miscbitur, us, quantum membra fuerint refrigerata. Ponatur autem primū mediocriter ipsa esse refrigerata: apponemus itaq; paulo ante dictis, in lactis quidē usu plus mellis: in uini uero usu, idē quidē genere dabimus, minus autē priore aquosum, & plurimum annorū. Cæterum & edulia omnia calidiora exhibenda, non solum ex naturalī tēperatura, sed à recentī etiā qualitate. Ex unguento etiā nardino assidue uentrem inungemus, ut nunquam aridus fiat: uero nardinum non adsit, mastichino erit utendū. Sed & ipsam mastichen cū nardino unguento terere licebit, lanāq; purpureā ex eis imbutā uetri adhibere. Si uero frigiditas multa intemperiei sicq; copuletur, ut coget ferē ad uberius calefactū, primū quidē affectionē grauissimā esse scito, & quæ difficulter corrigi potest, multaq; diligētia opus habet. Vbi uero ipsē usi fuerimus, quæ ad mediocriter frigiditatē sunt descripta, speramus sanè quanquā longiori temporis tractu nos affectionē laetatos: ita tamē ut à uehementē calefactibus abstineamus. Demus autē amplius quiddā ex melle desumpnamo unā cū lacte, atq; etiā ipsum per se ampliori modo: itemq; decoctū ac in pastillos redactum. Vinum uero uetustius eis eligendum. Optimum autē pharmacum in omnibus his quo frequenter piscatores utuntur, existit. Eo itaq; uniuerso uentrē illinire oportet, atq; mox prius quam refrigerat auellere: uerum hoc non sæpe in die, quorundam more, facere oportet. Discutit enim hoc modo, non uero bono sanguine membrum ipsum replet: nos autem non discutendi gratia, sed ob sanguinem bonum ex uicinis partibus attrahendum, eius usum approbamus. Auxiliatur etiā omnibus his puellus carnosus dormientibus

mientibus acclinator, ita ut superiorem ventrem semper contingat. Quod si ex ordine melle siccatati caliditas non ualde multa miscetur: in hac primam uisum ratione seruauimus: ita ut mel prorsum non gustent: uinum uero minime uetus accipiant, quod sit album & tenue, & etate annum non excedat. Edulia etiā tepida exhibebimus quæ lactosa, hoc est lactei repositi appellantur, si hyems adscit in æstate uero, uel ut aquæ fontanæ cōueniunt edulia, quæ non summe frigidæ sunt. Venitrē quoq; omphacino aut melino oleo illinemus. Si uero maior caliditas adsit, etiā diuiniorem uini temperaturā faciemus, frigidumq; dabimus, quemadmodum fontana aqua in medio uere esse solet. Nolle tamen operæ pretium esse febrium similem hanc affectionem esse, atq; si quis contentio sius eos refrigeret, periculo non uacare.

De cœliaca affectione, Archigenis. Cap. xxviii. Non omnis uentris fluxus cœliaca affectio proprie appellatur: neq; enim si cibi crudi & incosti inferne prodeunt, neque si corrupti ac in peregrinum habitum mutati sunt, cœliaca affectio uocatur: uerū tunc solum quum leuia & humecta excrementa egeruntur: uentre præ imbecillitate ea digerere nequeunt. Sequitur autem ipsos assidua egestio, aliquando fortis da cum animi deliquij sensu, aliquando uero etiam sanguis flauus ac tenuis unā cum his quæ egeruntur destillat: & ob eam causam cibū auerfantur, decolorēsq; & uehementer graciles sūt, corrugata insuper eorum uniuersa cute: & uenæ sanæ quæ in uentrem deferuntur, fluescunt: & ad magnam omnino desperationem res deuenit, si morbus diutius duret, ægris ad cōuenientem dietam pigrescētib; Si itaq; morbus autumno incipiens ad hyemem usq; se extendat, difficilis omnino curatur. Causæ autem affectionis sunt, assidua cibi corruptiones, & peregrinorū eduliorum ingestiones: amplius autem si frigiditas aut uehemens ardor insilit, similiter etiam plagæ uentrem lædunt: & in morbis quoq; longis, uenter male affectus adfectioni huic obnoxius fit. A medicinæ quoq; purgantis potione quiddā cœliacæ affectionem inciderunt. Nolle tamen oportet, quod aliquando quidem per circuitus malum hoc adfigit, tēporibus quibusdam aluo restitante, quibusdam uero ordinate per certas horas fluente: aliquando uero incessanter apparet. Quin & hoc nolle oportet, quod sæpe non solum permanet appetitus, uerum etiam amplius augetur: & ob id corruptionibus acruatim perq; uices factis, omnia mala augetur. Recente igitur morbo, diligenter inuestiganda sunt ipsius causæ, ut ab eis maxime nos adseruemus. siue igitur corruptiones præceserint, cauendum ne amplius fiant, simulq; uitiosi humores ex eis generati euacuandi: siue peregrinorum eduliorum ingestio causa existat, ea ipsa auferre oportet: siue labor, aut fatigatio, aut aliud quippiam ex prædictis, ab eis similiter abstinendum est, ægrīq; in quiete adseruandi, atq; si ferre queant, in inedia: aut certe omnino modico cibi usu. Aliquando autem etiam larga portione utendum, ægerq; ad reuocandum cogendus, maxime si humores in uētre collectos perceptemus. Deinde attente exquisita diætā instendum, donec affectio in totum tollatur. Constat autem exquisita diætā in electione qualitatū ciborum. Quod si tamen in principio difficilis appareat morbus, etiam

reliquis prædictis utendum. Primum igitur media inspicienda sunt, atq; si inflammatio, aut similis inflammacioni dispositio circa uentrem reperitur, cataplasmatibus utēdum est, quæ ex profecto inflammacionem soluunt, ac fluxus retrahunt: qua in re, palmæ cōmode semini lini ammiscuntur. Cæterum cataplasmata ipsa minime calida apponere oportet: sed tepida saltem: atq; si intendere eorum uim uelis, acaciæ quippiam & hypodisthidis, aut malorum coroneorum, aut aluminis recte ammiscueris. Magnifice autem profunt lentiscus & rubus simul cocta: acetum quoq; multum appositum in cataplasmatum cocturā assumitur. Summe uero cōmodum utriq; affectio nō nouimus loliaceam farinam simul cum eis incotam. Inflatione autem plurima infestante, cumini acetum multo inspergimus, rutamq; & anethum. Manifestum est autem quod ad cataplasmatum retentio nem, quo contentus inherere, etiam rosaceum adhibebimus, ac parum uini: ampliusq; lentiscum, aut cœnanthinum, aut myrsinum. Oportet autem lana excepta ipsa imponere. Cæterum optimum ad ipsos, tale cataplasma existit: Malis maxime coroneis & palmis, abinthijq; coma in uino decoctis, uinum ipsum percolatur, ac sapæ creticæ tertia pars ei affunditur: deinde simul calefactis polenta tenuis inspergitur, & absq; oleo decoquatur. Oleum uero quo uenter illinitur sit melinum. Post cataplasmata conuenient cerata ex myrsino aut leniscino oleo apponantur: quæ tamen ex adstringentibus quædam habeant admixta, ex acada dico, & quæ eius generis existunt. Apulissimum etiam his ceratum est ex oleo myrsino apparatus, quod mora immatura ac acerba trita, parumq; sanguinariæ habet admixta. Porro ubi diuturnum fuerit malum, etiam ad mala gmata transendum est: summo uero concinnū eis uidetur, quod ex seminibus constat, & ad colicos est præscriptum: itemq; quod ex lauri bacis, quod ad aquam inter cutem describitur. Postea etiā adhibenda ea quæ uehementer rubefaciunt cutem. Quod si adfectio adhuc intendatur, etiam dropacis adhibēdi medicamentaria ui præcellentes, bitumenq; habentes & adarcen: post dropacem uero, morsum balneo secundum caliditatem mordaciore curare oportet: duabusq; post dropacis amotionem horis sinapismi adhibendi ex sinapi & caricis: ita ut modico tempore impositis sinamus, oleoq; indead locū circumfuso, ad balneum ducamus. Atq; id semel facere non sufficit, sed bis ac tertio: enim hoc ipso aliud efficacius remedium in prædicta corporis constitutione apparari potest: & ob hoc non multo tempore inhærere id oportet, ne loco nimium exustio, secunda & tertia huius præsidij admoitio præhibeat. Mirabiliter etiam uomitus efficacea sunt, tum à cena, tum ieiunio facti, nimirum quæ corrupta sunt euacuantes, & quæ ad intestina diaplasmata sunt attrahentes & conuerrentes, ac proprias uentris actiones reuocantes. Si uero liceret ab his ad eos qui à raphanis sunt transire, maiorem compendio affectio ipsa expugnaretur. Quidam etiam uerauri albi purgatione usi sunt: & si subiectæ uires eius auxilij sine capaces, præ omnib; huius usus eligatur. Ego uero ad cœliacos prius quam uires exire desistant, purgatione humori conuenienti utor. Aliquando autem medicati quidam &

acres, aut etiam ferosi humores tunliculis ventris aut magis intestinorum insidari aut imbibiti rodunt & iritant, atq; ex omni corpore humores ad locos circa ventrē & intestina aduocant, diuturnarūq; fluxionū causa fiunt. Ceterum ex egestis recemētis & ex cōsequentibus accessionibus, affligentis humoris specie cōnectare oportet, atq; ita cōuenientē exhibere purgationē. Præstabilius tamen est picræ ex aloē cōpositioni scammoniaē scrupulum i. aut amplius, si vires tolerant, ammiscere, & cum aqua multa præbere. Quod si ex atra bile sit humor infestans, epithymū adijcere oportet, & post affligentis humoris euacuationem, eis uti, quæ affectis mēbris firmitatē adde re possunt; cuius generis sunt ex malo punico eclegmata, ad stomachi subuersiones descripta. Illud etiā notatu dignū, quod aliquib; fluxionibus ex adstringētium usu oboriuntur: uentrē nimis ab ipsīs lesō propter imbecillitatem aut mollitiē sensus. Vtūm autē, inquit Archigenes, ad alui fluxiones hiera mea, drac. ii. ex ea exhibitis, ad eorū quæ in uentre ac intestinis insident deteriorationē, ut nullū enim aliud hæc ipsa quā rectissime emēdat & corrigat, deinde theiaca utor. Vtor etiam, inquit, zopyrio mea ad colicos descripta, ad sabæ magnitudinē ex ea præbens cū duobus cyathis passis uentris, ut acetū multū paulo ante horā cibi sumendū, ad dies ex ordine x v. deinde ubi ab eius exhibitione per v. dies quiesceero, rursus exhibeo ad dies x. atq; hoc itādū facio donec nō amplius opus habeat æger. Præstat etiā exhibere quæ ex duob; piperis generibus constat cōpositio nē. Omnino igitur simplicia pharmaca & facile digestibiles cibos exhibere oportet debili existente aluo. Si uero febricitent etiā, eo magis adstringētium sylua erit uitanda. Quod si tamē prædicta remedia circa affectionis solutionem nihil efficiāt, uisio adsumatur. Perurere autē superiorē uentrē oportet, intervalis duorum digitorū mēsu aut ampliorib; etiā factis, ulcerationēq; seruare ad multum tempus ad fluxionū in uentrē transitū ac deriuatōnē. Licet autē & per pharmactū crustas insillire, si quis ignis admotiōnē formidet. Postremū quidem igitur locū inter prædicta remedia uisio habet, propter nimiam seueritatē: si quis tamen uisili animo præditus sit, prius quā cōdicant vires, post prædiditōrū firmitatem addentū usum, quodam modo uisione uti potest, quæ sola se affectionis difficultati opponere consueuit. Atq; huiusmodi quidē est quæ forinsecus cœliacis adhibetur cura. Oprepredum est autē & per adstringentes posita auxilium ferre, ubi humiditas imbecillitatis causa existat ac fluxionū. Plantaginis itaq; semen siccū tritum ac potatū præclare facit, tum per se, tum alijs etiam admixtis. Quidam etiam gallinarum uentriculis utrūq; exicatis ac tritis potui inspersis. Eandē efficaciam & struthocamelorū uentriculi habere creduntur. Proderit & lapathi semen tritum, maxime uero oxylapathi. Cornu item cerui tenerimū uisū cum modica galla præbe bibendum: aut nucum iuglandium corticem quo tinctorēs utrūq; siccum tritum cochlearij mensura ex aqua præbe: aut quercinam glandē contusam ac cribratā cochlearij mēsurā insat farinē uino austero insperge, ac exhibe: aut cācri marini uel fluuiatilis testam usā cochlearij mēsurā præbe cum aqua: aut thuris granū sabæ magnitudinē in uini nigri cyatho uno dissolutum, sanguina-

riæ succo pari mensura ammixto præbe, aut gūmis albi uermiculati undam unam triciam ex uini nigri cyathis tribus præbe: aut uuarum passerarum uinaecos, siue etiam uuarum torrefactos: exhibe cum polenta aut canis sterucus siccum, cum quodam odorato: aut plantaginē siccam contusam & cribratam dato: aut biuminis quārū satis esse existimas, deglutendum præbeo. Bonum est etiam cortidis quercinæ glandis decoctum: itemq; pelliculæ decoctum, quæ sub cortice quercus reperitur. Castaneæ corticis decoctum, aspalathi decoctum, radidis pæoniæ decoctum, atque ipsa etiam radix sicca, trita, potui inspersa. Corticis loti arboris decoctum. Calicum item papaueris torrefactorum drachma una ante somnum cum uino diluto potata: quin & semen capitum papaueris tritum exhibitum egregie auxiliatur. Mirabiliter autē acerba & immatura mora profunt sicca trita in potu exhibita, quemadmodum de alui fluxione est prædictum, eodem modo & rubi mora immatura & acerba exhibenda. Vtendum & simplicioribus ad dysentericos descriptis medicamētis, maxime his quæ ex pomis sunt adparata. Commoda sunt quoq; ea quæ urinae cient, fluxionem saepe transferentia: uelut est, apium, fœniculum, anisum, adistum, acorus, damasonij foliorum dra. i. & quæ his potestate asimsilantur. Ex cōpositis prodest pastillus Thrasandri, & qui ex seminibus constat, ad dysentericos scripti. Pastillus item ex spina, & ex electro, ad sanguinem per spiritū reiicientis descripti. Omnium uero maxime antidotus theriace ex uiperis cōstans prodest multoq; adhuc magis quæ Eisdre inscribitur, efficaciter enim auxiliatur. Mirifice quoq; cœliacis cōducit antidotus desopsynos appellata: cuius cōpositio hæc est. Spicē nardi, cinamomi, piperis, costi, hyoscyami, croci, seminis papaueris, opij, omnia æquali pondere accipito, cōtundito & cribrato, ac cū melle unito. Datur ex ea duorū scrupulorū pondus ex uino. Orisbasi, ad cœliacos. Baccharū myrti nigrarum cochleare unū & dimidiū, rosarum siccarū, cœnanthes, singulorum cochleariū dimidiū, palmarū carne sufficiens excipe, & pastillos informa, ac exhibe drac. i. cū aqua, aut uino dilutus temperato his qui febribus carēt. Aliud, ad cœliacos. Lauri uirgula iii. piperis grana xxxiiii. cum ni grana quinquaginta unū, contere, ac præbe febre carentibus cum uino, febricitantibus cum aqua: pro una autem uice hæc in potu sumuntur. Ceterum simplicia & antidota oportune ante cibum exhibentur: pastillus autē dolore leuans, ante somnum. Malagmate uero cōcoctorio in alui flore per omnia huiusmodi utaris. Bdellij, ammoniaci thymiamatis, cāchryos, cuscūq; sesquidracmā, opopanax drach. vi. styracis drac. vi. myrrhæ sesquidracmā, piperis grana centum & triginta, galbani drach. vii. terebinthinae drach. vii. ceræ drach. tredecim & dimidiā, ad pis suilli drach. xvi. Siccissima conterito & cribrato: molliora uero in pila tundito, ac sicca inspergito: pila itemq; pistillo ex unguento irino illitis, ut mole ad tactum & glutinosum reddatur. Vermes autem terreni in testa ad cinerem exusti, & ieiunium cum uino exhibiti, uentris fluxiones sistunt: eorum itaq; tres aut quinq; exhibeto. Porrò cognitu dignissimum & hoc est: infinita scilicet remedia hoc nomine prædicata esse, quod aluum sistere possint uerum

uerum seri profectus est omninū meminisse: & cauē  
dum etiam nimum largus fiat eorum usus: quan  
quam plurimi omnino morbi ab aceruata pharma  
corū uicissitudine delentur, qui aliis non facile ho  
minem relinquunt, si diæta solum exquisita uatur.  
Vna autem tutissima & compendiosissima uia ad  
affectiōis extirpationem diæta existit. Diæta coe  
liacori. Coeliaci oportet mox ubi à somno surre  
xerit, facilius proluerit, ad deambulationē prodire, ita  
ut pro uiribus progrediat. Deinde frictionē sim  
pliciorē adhibere, parce uidelicet & minime cōtente  
fricando maxime uentrē, oleo uero quo cōfricatur,  
canchry & pyretrum incoquātur, quo postea deter  
so, corpus ex oleo dulci impinguerit. Balneo autē  
ut plurimum renunciamus, aliquando tamē ad lasi  
tudinis uel alicuius alterius rei medellā ipso utimur.  
In balneo uero smegmate quopiā uatur, quod curē  
lancinare ac pertundere potest, uelut est nistrum alla  
tum, sex uini uista, & quæ eius generis existunt. Ab  
inunctionibus & balneo prandendū est: perspicien  
dum uero, si quicquam aliud ut cibum diuidamus.  
Duas itaq; tertias partes cibi in coenam reseruet, atq;  
ipsum etiā qui in prandio exhibetur panē dimidia  
tum per se fumat: reliquū uero cum obsonio simpli  
ci. Frumentaceum enim alimentum naturæ homini  
maxime cōuenientis existit. Oleribus autē raro ut  
scur: inflationes enim pariunt, minime apri sunt  
etiam omnes arborum fructus, insuauibus humori  
bus uentrem & stomachum replentes. Cæterum à  
prandio deambulationibus indulgendum, & animi  
aliqua laxamenta adhibenda: somni enim diurni no  
censissimi sunt, nisi lassationis sensus addit, aut nox  
uigilata præcessit: uesper autem à coena dormiat. Ex  
frumentaceis igitur conueniunt panis clibanites, ha  
lica, oryza: uerum forbitiones ex milio non probō,  
quoniam concoctæ difficiles & uitiosos humores milii  
producat. Ex leguminibus non inepta est lentacula  
assata, & cum plantagine cocta, utile est & palmas  
forbitionibus incoquere, malaque cotonea, eisq;  
simili uis prædita. Ex oleribus brassica eligatur dua  
bus aquis decocta, cum oleo ac modico garo: pau  
cissimò que aceto: intubus itē coctus & cichorium,  
pastinacæ ualde ex cocta cum simplicii liquamen  
to. Varietatis autem gratia eis etiam carnes exhiben  
dæ, ex gallinis, columbis, aut auiculis montanis,  
ex pedescribus etiam tenerimæ & friabiliore coctæ  
omnes, concoctis simul quibusdam fructibus, aut  
pomis, aut myrri baccis. Bellaria modice præbenda,  
uelut sunt amygdalæ, palmæ, nuces, atq; ea uolupta  
tis gratia tantum ac dulcoris degustanda. Fructus  
sint minime instantes: uua modica pensilis in pomis  
ac piris similibusq; mediocriter seruanda, atq; hi  
ipsi cum pane exhibendi. Vinum conuenit subad  
stringens. Omnis autem liquor qui in potu exhibe  
tur paucus sit, & post omnem cibū præbeatur. Mul  
tus enim potus uictris fluxionibus insensibilisimus ex  
stet. Nolle tamen oportet, quod in his qui cum mor  
daciæ fluxionibus infestantur, optime facit lactis  
potus: ita ut in principio calidum ac recens multum  
deur: postea uero ad medietatem decoctum aut etiā  
ad tertias, quemadmodum in alui profusio est præ  
dictum. Hoc enim modo exhibitum simul sistit ac  
temperat fluxiones. Cæterum in quibus lac ipsum  
in nidorofam aut acidam qualitatem permutatur,

quantam partem aquæ affundito, prædictoq; mo  
do decoquito, ac exhibeto.

#### De colligatione.

Cap. XXXVIII.

Quum uero per uentrem quiddam excernitur, quod  
non ab accepto cibo aut potu prodit, sed ab humori  
bus ex corpore in uentrem defluentibus, assimila  
turq; ei quæ tum per uomitum reijcitur, tum infer  
nè procedit, flaue bili: differt autem ab ea tum gra  
ueolentia, tum quod flauius quodam modo excre  
mentum apparet, firgimentitiamq; crassitudinem  
habet, aliquando uero & oleosum aut adiposum exi  
stet. Colligatio morbus is & synrexis uocatur. Re  
cens enim compacta substantia pinguedinis ac cars  
nis ab ardentī febre resoluitur & colligatur. Diu  
tius uero perfeuerante malo, ex ipsi etia solidis parti  
bus aliquid colligescit. In qua pessima febricula fri  
gidæ purissime frequēs potus remedio existit: eius  
dem etiam qualitatē cataplasmata & episthemata ad  
pectus & præcordia adhibere oportet: cibi quoque  
refrigerantes exhibendi: reliqua; quemadmodum  
in estuantibus, ac in habitū conuersis febribus dictū  
est, faciendæ. Quod si in uiscerum inflammatione hoc  
contingat, ualde periculosa adfectio est, & cum præ  
dictiōe remedijs prædictis uti oportet. Porro si acre  
sit ac mordax quod excernitur, intestina; inde igne  
scant, mordacitatem lenire oportet per insuliones,  
ubi urgeat malum, nullo exa:erbationum respectu  
habito, præter quàm circa initium accessiōis. Insun  
datur autē succus oryzae ad tactum tepidioris, iteq;  
lac tepens. Si uero mordacitas cum tormine contin  
gat, pistanae succus insundendus est cum ouis crudis  
ac conuulsatis, admixto rosaceo, aliquando uero  
bituminis etiam dra. ammiscenda. Quod si dolor  
adhuc perseueret, bis ac ter etiam prædicta insundā  
tur. Conuenit quoq; his lac potatum, ad quod quar  
ta aquæ pars est affusa, quemadmodum dictum est,  
decoctione ad tertias facta.

#### De lumbricis, ex Herodoto.

Cap. XXXIX.

Lumbrici & in febribus, & circa febres nascuntur, tū  
multitudine, tum magnitudine, tum colore, tum tē  
poribus etiam differētes. Circa initia enim morbo  
rum generant, substantiam suam ex subiacente corru  
ptione capiunt: circa uigorem uero ex malitia mor  
bi: circa declinationem autem ex permutatione o  
mnium in melius, qui sanè citius separantur: natura  
enim ipsos, reliquorum recrementorum instar, for  
as propellit. Censentur autem peiores ex ipsis, ma  
ioris minoribus, paucis multis, & albis rubri. Viue  
ntes etiā mortuis deteriores. In infantibus autem &  
pueris, atque his qui ad pubertatem accedunt, maxi  
me abundant. Cæterum hoc malo affectos incredibi  
lis morsus stomachi ac uentris cōcomitatur, tussis  
lacq; tenuissimæ ac frequenter siccantes, quā tamen  
nihil reijciatur. In somno tremūt, & præter rationē  
exurgunt. Quidā uero & linguā foras protrudunt,  
oculosq; claudūt, ac tactum sunt, excitatiq; mole  
ste ferunt, ob imbecillia uigilare nequientes. Qui  
dam autem oculos sanguine suffusos habent, &  
pulsus inæqualem, obitum, deficientem & recur  
rentem. Quibusdam etiam appetitus perditio ac  
cedit. Pueris insuper dum dormiunt manducatio  
lingue, cum exertione, cui accedit conformatio oris  
in modum lactentium aut accipientium cibum:  
uerum hæc paucio tempore & per interualla sunt,

Aliqui



Aliqui uero infantes cum clamore præter rationem exurgunt, citoq; rursus collabuntur. Aliqui etiam dentibus frædent, quod contingere uerisimile est, ani- malculis attrahentibus cibum, mordentibusq; uen- trem ac intestina. Iam uero & ad stomachum quos- dam processisse constat, nausæarumq; & morbum fuisse causas. Sæpe etiam per se sursum reieciuntur: aliquando uero cum pituitoso quopiam humore. Quidam etiã infantes neglecti motu pulsus destituuntur, ac refrigerantur, atq; eorum insit qui animo lin- quuntur, tenuè quendam ac frigidum sudorẽ exadã, & ut plurimũ liuescunt. Contingit autẽ aliquãdo fa- cem fieri rubicundã, maxime circa malas: uerũ co- lor hic rursus in pallorẽ solito maiorem trãsit. Alij autẽ insit delirantiũ peregrina in somnis loquun- tur. Alij decubiũ transmutant cõtinue dormientes, angoreq; uexantur, ex locoq; ad locum sese uicissim proteant. Verũ paucos omnino ex ipsis morbum confiteri constat. Pleriq; enim in mentis inopia ac ta- cturnitate degunt. Porro qui à rotundis lumbricis infestantur, etiã cibũ auersantur, & si quid accepe- rint reuomit, aut nausæabundi uix deglutire pos- sunt: febres in eos cum uehementi extremarum par- tium refrigeratione irruunt. Quibusdã autẽ uetẽ ad tympani modũ insit. Ex Hippocrate. Lũbri- ci circa aluũ his signis deprehenduntur: si somnolen- ti sint non permittente morbo, & extremæ partes frigidæ, & cordis siue oris uentriculi dolor, urinæ conturbatæ, & lingua humectatur. Item qui animal- culis in uentriculo abundant, sputo replentur: & si tenuis quispia proderit lumbriculus, amplius non spuunt. Quicunq; igitur in ore uenuriculi lũbricos habent, ferẽ in totũ ipsos uomitu reieciunt. Quibus uero in intestinis insunt, ipsos infernẽ excernunt. Omnes autẽ nausæabundi sunt, uomuntq; quacũq; acceperunt. His qui punguntur similes sunt: totoq; corpore cõtrahuntur, & repenẽ acuatimq; mouẽ- tur, ac tormina acculant, interaneorũq; dolores. Eua- porationes quoq; ad caput delatæ, uertigines indu- cunt. Quin & diætã quæ præcessit, ostendit tibi lũbri- corum generationẽ: ex crassioribus nimirũ & quæ difficulter cõficiuntur, & largius ingestis, & maxi- me frumetacets, contingentẽ: quos itẽ balneis à cibo ufos fuisse cõperies. Cæterũ cura ipsorũ, alia cõmu- nis est, & cum ea quæ febricitantibus cõuenit coinci- dens. Alia uero eis proprie cõducit. Quũ igitur am- bigua adhuc affectio existit, & rationalis quidem suspicio adest, incerta tamen, neq; planẽ cõperta, mi- noribus sanẽ remedijs uti oportet. Ab acrioribus enim febres magis exacuuntur, si adfectionem falsõ habuerimus suspectam: ubi uero cõstans ac euidentis cognitio contigerit, ad tẽpora morbi animũ intẽde- re oportet. Ad eos enim qui circa primas horas nase- cõtur, acrioribus remedijs est utẽdũ: & magis utiq; si iuxta declinationẽ totius morbi adparuerint: eos uero qui uigẽte morbo apparẽt, mĩdius curabimus: atq; id eo magis, si inflammaciones & tensiones uis- cerum cõcomitentur. His igitur cataplasmata adhi- beantur ex semine lini crassiore lupini farina, pari mensura admixta. In potu pueris ante cibũ myxarũ decoctum amixta menta præbeatur. Eis autem qui ad integram etatem perueniunt, absinthij aut abro- toni cremor. Vtrũq; uero etiam si febricitent, essi tri- mesfres tantum infantes existant: uermes terreni cum

cum sapa confidenter exhibeantur: si uero sapa nõ admittant, cum hydromelite, aut ut libet, præbeo nihil ueritus, neq; uilitate contempta septem nume- ro dato. Quod si nõ nuda sit suspicio, sed certa depre- hensio lumbricorum, cataplasma ex lupinorum sa- rina, in hydromelite decocta imponendum, cui ali- quando etiam bryonia radix adijciatur. Vmbilic- us autem selle taurino expleatur, aut melãchio cum lacte muliebri trito, aut absinthio, aut abrotono, aut bryonia, pinguis scibus admixtis. Spina uero uniuersa ex medulla ceruina inũgatur. In potu etiã his uermes terreni septẽ cõcti ac triti cũ sapa præbe- tur, aut ut libet aliàs tenuissime triti. Efficax est & abrotonum, & fantonicum, & absinthium decoctũ, unumquodq; aut cũ scibus aut palmis exhibitum. Aliquando autẽ hæc contusa & cribrata, & cũ mel- le in cataplasia redacta, deglutienda præbentur. Dari potest etiam chamæmelorum decoctum cum modi- co rosaceo, uehementer enim efficax existit. Egrege quoq; facti cretica sapa cũ rosaceo potata. Aliud. Nuces pineas in aqua calida macerato, teritoq; ac rosaceo cyathum unum affundito, & cum uino opi me temperato tribus horis bibendas præbeo. Inde enim enecat, tum uomitu, tum fecesũ eijciuntur. Commode quoq; in cibo sumitur senetio uiridis, ac barba hircina. Eisdem etiam auriculæ muris succus, & calaminthæ ac mentæ decoctum, citra mole- stiam educt, quod & brasicæ semen ac petroselinũ facere perhibentur. Superior autẽ uenter cerato inte- gatur ex absinthio oleoq; cyprino adparato: alio au- tẽ adstricte glans immittenda, præsertim pueris, quæ si nihil profecerit, clyster adhibendus morbi uigore remittente: ex absinthij, aut abrotoni, aut cõtæure de- cocto, cum melle ac nitro. Cæterum lumbricos, qui circa uigores febriles nascuntur, quosq; malignos appellamus, per simpliciora remedia subducere co- nabimur. In cataplasmata igitur absinthium, abro- tonũ, ac fantonicũ miscibimus, aliquãdo etiã lupinũ. Olei autẽ omphacini propinabimus eis, qui facile id- ferunt, cyathum unum. In sorbitiones uero mellis plurimum coniiciendum: & prisnæ quoque oleũ plurimum omphacinum incoquendum, hancam itẽ in myxarum decocto præbebimus tum per se, tum cum aqua mulla: præbitiones uero ex oleo sem- per augebimus: multæ enim cõmoditates existunt. In uniuersum enim omnia quæ lumbricos educunt aut per acredinem occidendo, aut per amaritẽ sub- ducendo, aut ad excretionem irritando, aut per con- sequentẽ ad ea quæ exhibentur lubricitatem, effica- cia cognoscuntur. Extrahuntur enim simul, ut ueris- simile est, per sorbitiones lubricas uias reddetes, aut etiã per innominatam aliquam efficacem qualitatẽ. Viuentes equidem uicinas intestinorũ partes adpre- hẽdunt: mortuæ uero unã cum stercore euacuuntur. Prodeunt autẽ quẽdã adhuc uiuæ, uerum uertigine affectæ, & si ita dicere libeat, semineatæ. Profunt au- tem & his uermes terreni. Porro per pharmacorum portiones enecatos lumbricos, citra dilationẽ per glã- dulas extrahere oportet: uisofa enim ex ipsis exha- latio procedit, quæ & appetitũ & digestionẽ lædit. Atqui ad nausæas ex lũbricis obortas, lãctionesq; stomachi, salis granũ in ore detineant, deglutiantq; liquefactum. Acredo enim, ut apparet, eos statim in- fra subdũdere cogit. Oboriuntur autem & in alui flu- xione

zione lumbrici: eos fluorem inspissando, & concoctione tum per cibos, tum per cataplasmata, in melius permittendo, curare oportet. In quatum enim fluxiones inualefcunt, tantum etiam lumbricorum generatio augetur: uicissimque fluxu cessante, lubrici interquiescunt: quare diligenter conabimur ut alui distringamus, firmitatemque ei adiciamus. Coniicienda itaque in cataplasmata, alias ad fluxiones sistendas continua, ea que ad lumbricos sunt prædicta, & quæ fluores non exacerbant: uelut est absinthium, abrotonum, santonicum: iamque etiam masticorum, acada, & balauftia, eisque similia, cum cruda hordeacea farina. Cerata quoque imponenda ex his apparata. Vitædum & præpotationibus, inter quas reliquis omnibus plantaginis succus est præferendus. Ad utraque autem affectione, uelut dixi, efficax existit. Licet ibi enim & in hoc casu uermibus terrenis, quemadmodum antea dictum est, uti. Ceratum ad lumbricos. Farinæ lupinorum, absinthij, farinæ hordeaceæ tenuissimæ, cuiuscque drach. vii. sellis taurini unc. i. scobis cornu cerui drach. iiii. ceræ quadrantem uncæque dimidii, olei secundarij sexuncem.

De lato lumbrico.

Cap. xli.

Lumbricus qui latus appellatur, in his qui febre caret abundat, & in longis ac diuturnis nascitur morbis. Est autem latus lumbricus, si ita dicere libeat, permutatio pelliculæ intrinsecus tenuia intestina ambiens, in corpus quoddam uiuum, quod continuos stomachi morsus infert, & ad cibos incorrigibile appetitum: cæterum ea quæ accipiuntur non succenturiata digeruntur, sed cito excernuntur. Consequitur affectus corporis gracilitas, & imbecillitas cum tarditate, assidueque famis sensus. Quod enim uiuificatus est in intestinis, ubi reces exhibitum cibum consumpsit, postea ipsa solida corpora arrodit. Minime uero falsum signum erit, si cito recrementis quædam incurbitæ semini similia excernantur. Porro cura penis cum precedenti concordat præpotationes enim cõueniunt amaræ & acres, alij item comestiones. Aut enim in tegre excernuntur, ut incredibilem magnitudinis de se præbeant aspectum: aut etiã prodeunt in partes condensæ. Et semel sanè exolutæ non amplius secundario congregantur. In potu igitur etiam his uermes terrenos, ut dictum est, exhibebimus. Proprie autem ad ipsas auriculæ muris succus facit, duorum cyathorum mensura, cum uno zythi cyatho potatus: celerrime namque ipsos educit. Aliud, ad laros libricos, quos carias, hoc est infittas, uernacula uoce appellant. Niri, cardamomi seminis, piperis, singulorum æqualiter partes commisceto, & cochlearij mensurâ inde præbeto: confestim enim educit. Aliud. Corticis radicis mali puniceæ addidæ in suprema parte delibrati, piperis, cuiuscque drach. quatuor, cardamomi drach. sex, marrubij drach. duas, mellis despumati quantum sufficit, præbe ex eo cochleariū post alij comestione.

De ascaridibus.

Cap. xlii.

Ascarides cum lumbricorum species sunt, circa extremas intestini recti, ac primam internam adstrictiores aut partem, spintherem Græcis appellatam, consistentes, uehementemque pruritus his locis inferentes. Et pueri quidem assidue ad egerendum iritantur, à contraria uero instantia, & aduersus eas contentione, ac ut plurimum ab excretionē melius habent. Qui uero ad integrâ ætatem peruenerunt, causarum mo-

lestiam inferentium animaduersionem habentes, digitos in anum immittunt, ac procidentes educunt: quin & ignitis lapidibus, aut litoris calculis à sole perustis fouendo, mordaces pruritus leniunt. Cæterum quum quidam præ pusillanimitate nihil horum auxiliorum admittant, minime malum ipsum negligere oportet, sed citra dilationē curare, atque his qui falsi diuersum sentiunt causas indicare, ac curandi uiam demonstrare. Porro causas huius accessorii mali, cibi sunt, & frigiditatis, alimentique corruptiones, quas præstat prius uitare. Huius uero signa potissimum ex recrementorum græueolentia sumuntur. Postea pueri quidem acrimuria infusa sunt euacuandi, aut absinthij decocto oleo ammixto. Calidiorem quoque sublationem esse conuenit, à qua ubi prodierint recrementa, affecti loci illinendi, ex simplicibus quidem acada & hypocistididis succo, rhoisique succo cum alumine liquido. Compositis uero Andronij pastillo, & sphragide polyidæ inscripta, & lanæ succidæ pastillo, ac quæ his similia existunt. Coacta enim ab adstringentibus caro corroboratur, aptitudinemque ad animalculorum generationem amittit, atque ascaridas ipsas excludit. Perfectiores etiam ætate similiter euacuandi acrioribus ac calidioribus infusis, uelut est muria & centaureæ decoctum: deinde cedria eis infundenda: quam rem cornæ fistulam undiqueque perforatam apparare oportet, circa fundum amplam, ac magnitudine locis conuenientem, quam ultra adstrictiorem anî partem inditam cedria explemus, ita ut cedrig immixto pasam tum per amplitudinem, tum per transversa, undiqueque contingat: post uero quiescere iubemus, sæpe eundem curationis modum repetentes. Aliud, quod & pueris & qui perfectæ sunt ætatis conuenientissimum & efficacissimum existit. Carnem ueterem salicam, pinguedine derafa, sublongam & rotundam formabimus, atque ita adaptatam podici atque adstrictiori anî parti intrudemus, ligamentoque adhibito, quam diu sustinere possint, inditam sinemus: deinde soluemus, prædictaque infundemus atque illinemus: idem etiam remedium sæpe repetemus. Cibi uero frumētacei generis, boni succi, ac qui facile concoquuntur, præbeantur.

De abscessu in intestinis.

Cap. xliii.

Oboritur aliquando abscessus in intestinis, ad cuius eruptionem eliquationes aquosi puris consequuntur: quare ignari ac inext per hoc uiso decipiuntur, dysenteriam hanc affectionem esse putantes: & sanè ut uerum fatear, si post eruptionem diuturnâ sit exulceratio & perfeueret, eo modo quo dysenteria curatur, uerum in principio neutiquam consimili curatione subducitur. Vnde etiam quosdam ægros periclitatos esse cõstat, male ab indoctis medicis tractatos, qui statim in principio dysentericas infusiones adhibuerunt. Pro uisibus itaque affectiones hæc inter se distinguantur. Iudicant enim faciles existunt. In abscessu enim semper dolor pulsantis præcedit iuxta affectum locum innitens: neque morsus, neque decursus adfuit, quales in dysentericis præcedere consueuerunt. Deinde mutatione in suppurationem incipiente, rigores inæquales consequuntur, febresque circa uesperam maxime irruentes: postea ubi perfecta humidî mutatio fuerit facta, omnes molestiæ minores fiunt, uehementesque dolores remittunt: deinceps

deinceps eruptionis tempore accedente, rursus dolores intenduntur, aliquando autem perfecta ventris adstrictio adest. Post eruptionem uero humor, qualem praediximus, excernitur, quoniam nihil tale in dysentericis oboriatur. Cataplasma igitur ad eos uti oportet ex semine lini, adstringentibus aliquid simul ammixtis: ueluti sunt palmae, mala cotonea, & similia. Atque ne fluxus augescat in suis utendum erit, ex pituitae succo aut halice cum quodam mediocriter adstringente. Vehementer enim adstrictione in his face re ueremur. A cataplasma uero ac praedictis insus inflammatione mitigamus. Et si quidem eruptionem suspectam habeamus, epithematis utimur quae eam adiuvant, althaeam nimirum ac caricas, simumque columbinum admiscentes: si uero discuti posse ac euascescere inflammationem speramus, ea quae discutere ac digerere praedicantur epithemata adhibemus. Quia in re egregie facti emplastrum anticum, hoc est insuperabile appellatum. Si uero eruptio obuiam ueniat, insus utendum, primum quidem pituitae succo: cui deinde modicum mellis, ad ulcerum repurgationem, est ammiscendum. Quod si sordidiora recrementa appareant, etiam lentiuscula decoctum ac malicorij, ad pituitae succum & mel affundatur. Repurgatis deinde ulceribus a melle absistendum, parum uero quiddam ex pastillo de halicacabo ad insusum coniiciendum, quo ulcera ad cicatricem perducantur. Post haec autem prospiciendum, ut corpora insauratione suscepta, subsidant ac molliora reddantur: saepe enim identidem humoris collectiones fieri consueuerunt. Quod si uero sinus quipsiam relinquatur, rursus ea de qua praedicta sunt adhibeantur: si uero ea quae ex ulceribus promanant serpeo depascant, ad ea quae ad dysentericos in principio conueniunt, traesundum.

De dysenteria, hoc est, torminibus intestinorum,  
ex Archigene.

Cap. XLIII.

Dysenteria proprie, exulceratio est intestinorum serpendo depascens, ab externis causis producta, ueluti frigiditate, ardore, uenenatorum pharmacorum potu, & quae huiusmodi existunt. Iam uero & a cruditatibus, peregrinorumque & acrimia ciborum acceptio ne ab aliqua item acrimia humorum impressione, et consimili quae circa externam cutis superficiem contingit, a qua paupulae quaedam feruida ac exulcerationes perficiuntur. Primum uero egestio malum auspicatur cum rugitibus subpinguibus ac biliosis, pingui nimirum quod intrinsecus intestinis adhaeret paulatim circumliquefacto, & quibusdam quidem cum torminibus, quibusdam absque his excretiones continunt. Quum uero superfices intestinorum perfecte fuerit denudata, exulceratioque superne consistit, seculata ac cruenta biliosaque excernuntur. Vbi autem altius penetrarit ulceratio, etiam sordes pelliculas admixtas habentes expelluntur, & si non celeriter cohibeatur, compendio uicinos locos depascitur: saniosa uero quaedam excernuntur, qualia ab occisorum corporibus desfluere consueuerunt. Atque haec sane est quodammodo acuta dysenteria. Si igitur ab acribus cibis, aut a flaua bile dysenteria oboriatur, ferè in toto ipsam curamus. Si uero ab atra bile initium sumat, si quidem ratione iudicationis febrili morborum atra bilis excernatur, transituque suo intestinum distendat, etiam hanc curare non desperamus. Si uero sua sponte, nullo praecedente febrili morbo,

neque concoctione bona apparente, atra bilis excernatur, immedicabilis dysenteria ex ea oborta existit, nihilque a cancro exulcerato differt: estque omnino letalis. Consueuerunt etiam exulcerationes aliquae diutius persequere, serpendo nequaquam depascentes, uerum cauis ulceribus forissecus consistentibus similes, quibus cicatrix tarde inducitur, labris nimirum ulceris in callum induratis, in huiusmodi etiam insula infeliciter adhibentur. Atqui in plerisque dysentericis tenebris praecedere uidetur. Est autem tenebris egerendi promptitudo quae differri ac deuitari non potest. Nosse tamen oportet, quod aliquando quidem aliqua sui parte intestinum rectum in dysentericis exulceratur: aliquando uero totum, & cum ipso etiam superiora. Si quidem igitur circa colum, hoc est, circa intestina crassa ulceratio contingat, sterora quae egeruntur multa sunt, & coaceruata, & cum flatibus prodeunt, aliquando etiam spumosa. Pingua quoque & cruenta recrementis ammixta apparent, inexplabilisque edendi appetitus oboriuntur. Tenibus autem intestinis exulceratis, dolores circa umbilicum consistunt, biliosaque & porri colorem habentia, atque omnino uariiegata, stercorei commixta plurimum excernuntur, citra tamen ramentorum complexum, cum torminibus & mordacitate, desperationeque ac exolutione, ut non procul ab animi deliquio aegri absint, a sitique infestatur, & febricitat, sterora quoque crudius ab eis prodit. Exulceratur autem, uerum raro, & seium intestinum, quod si contingat, egestionis crudiores apparent, sanguine nigriorem vehementer implicatum habentes, bilemque abunde flauam, sitis multa itemque naucae affligunt: uomunt etiam aliquando, ac cibos auersantur, dolor quoque uehemens supra umbilicum confidet, quandoque & febres malignae oboriuntur. Atque ita adfectus decoloris sunt, & ad animi deliquium usque excedunt: uires etiam ipsorum cito deficiunt, neque procul ab interitum absunt. Anrylus autem scribit. Tunc equidem seium intestinum exulceratum esse putamus, quum sanguis qui cum recrementis egeritur, niger ac uetus apparer: necesse est enim huiusmodi, in omnibus infra seium sitis intestinis decoctum externum. Pituitosa etiam ac subpinguia simul excernuntur: pituita enim, inquit, in seim abundat, ipsumque etiam adiposum existit: biliosa item abundanter in his excernuntur, sitisque infestat, utpote uentriculo ob uicinitatem ex affectione intestini seimi conalescens: quapropter & februnt & dolent. Ceterum tenui intestino exulcerato, egestionis minus quidem biliosa ac pituitosa sunt: neque enim pituita, nec pinguedo in hoc uelut in seimo abundat, suberueta autem magis & rasura similia excernunt. Quae enim defecerunt, pelliculas intestini in superficie radunt, quae obruta sanguis etiam in eis minus niger adparet. Si uero circa colu exulceratio fiat, recrementa multa erunt, & flatu comitante coaceruata, & aliquando spumosa: quod uero cruentum in ipsis prodit, flauum erit: cibum plurimum experet, crudioraque egerent: minus etiam a siti infestantur, & non multum februnt, nisi magnum sit ulcus, aut malignum, & si febricitare eos contingat, difficiliter alijs febrem summovent & excludunt. Magnam autem causam subesse oportet, si febris ex colo accendatur. Quod si rectum intestinum sit exulceratum, concocta erunt recrementa

menta & sanguis floridus, & sordes plurimæ excrementis ammixtæ: tenesmi etiam aderunt uolenti, sepiusq; ad excretionem incitantur, neque iam nihil excernant; neq; ualde esuriunt, neq; sitiunt, neq; februnt, nisi ulcus sit cancerosum. Porro primum periculum ex ulcere serpente ac depalcente dysenterici impendit: secundum uero ex sanguinis eruptione, tertium autem ex fluxu à locis ab imbecillitate affectis cõsequenti. Ceterum ab ulcere serpente ac depalcente pueros magis opprimi adparet, usq; ad ætatis uitæ calidum, namq; & humidum huic ætati corpus est, quare ad putrescentes morbos perferendos magis sunt parati. A sanguinis autem eruptione, magis hi qui in ætatis uigore cõsistunt, infestantur, & qui à natura multo sanguine abundant. A fluxionibus autem seniores amplius læduntur, & qui malo corporis habitu sunt præditi. At uero ubi ulcus proserptum est, dolor concomitatur. Acræ enim & liquida cum torminibus recrementa egeruntur: deinde & odoribus & coloribus uariata una cum mordacitate. Febres uero quoq; prauæ accedunt, inediaq; ac corporis lactationes cõsequuntur: æstus ite cõtinuus ac sistis. Iam uero ulcere serpente ac depalcente in peius procedente, tametia excernuntur: scilicet multa ac nigra effertur, & sordes magnæ intestina ambientium pellicularum, si in crasis intestinis ex ulceratio cõsistat. Quum autem sanguinis eruptio futura est, exolutio totius corporis, animi deliquio similis præcedit, ac grauitas loci. Ea uero que egeruntur, lenta sunt ac multisca, deinde cruenta. Postremum etiam grumi multum excernuntur, primum quidem flauis, ad finem uero nigri & graueolentes. Manifestum autem est, quod uires quoq; eorum subueruntur, sudoresq; effunduntur: aliquando autem & conuulsiones ad plurimam euacuationem consequuntur. Atqui fluxione laborantes, curationis tempore compacta stercora excernunt, deinde non longè post ulceris stercorum splendidum una cum stercore effertur. Modicè namq; ab infusis fluxus sistitur, deinde paulo post ulceratio excortatur. Ceterum si alicubi certe in intestino recto ac colo cõsistens dysenteria facillè curabilis existit: quæ uero in tenuibus intestinis hæret, difficulter curatur, maximè uero in ieiuno. Iam uero & hæc quæ post abscellum eruptiones sunt dysentericæ, graues sunt, propterea quod uires defectæ ita sint per coincidentes inflammationibus febres ac dolores. Graues sunt quoq; quæ cum uehementi inflammatione oboriuntur, quæq; cum febris ac perditione appetitus. Pessimè uero dysentericæ sunt, in quibus quæ excernuntur porri adspectum habent, suntq; nigra, plurima, uaria, & graueolentia, & quæ una cum excernendis sordes pelliculis magnis cõmixtis excernunt. Veruntamen & mulieres, quam uiri, senes & pueri, quam iuuenes & in ætatis uigore cõsistentes, difficiliter curâ accipiunt. His prædestinitis à tenesmi affectione curâ dysentericæ indispemus, quum pleriq; inde dysenteria initium sumat.

De tenesmi cura.

Cap. XLIII.

Quemadmodum iam prædictum est, in plerisque dysentericis tenesmus præcedit. Est autem adfectio hæc ad excernendum promptitudo, quæ differri ac deuitari non potest, nihil tamen præter quam pauca cruentum adpectum habentia propellens, & post ea quædam mucosa. Vbi uero stercus fuerit excrementum, ægri alleuantur. Iam uero & inflammationem cum laxo

tumore, ex cõtinuis distentionibus circa locum obortam esse constat, quæ stercoris insidentis suspensionem præbet, quod exitum querat. Cæterum recrementa in ipsis concocta & compacta ferè in totum excernuntur, pauco sanguine post recrementa destillante, stercori minime admixto. In principio igitur si grauis distentionis sensus circa anum uentrem fiat, & maximè circa dextram partem, cõiecta re oportet stercorum multitudinem in cæco intestino inistam esse, quam sursum ac sœni græci decocto infuso eluere oportet, melle oleoq; ac modico nitro ammixto. Quod si huiusmodi nihil apparuerit, statim in principio ex oleo myrsino aut rosaceo, cum uino & cumino, pestinem, inguinacq; ac interanum & scrotum intercapedinem, perinaeon Græcis appellatū, fouere ac irrigare oportet. Deinde lac caprinum recens multum hemina mensura, & nequaquam minus præbendum: uerum non acueratim, sed sigillatim partitum. Sequenti deinde die lac ipsum ad dimidium decoquatur, ablato eo quod in decoctione concretum superstat, atque ita exhibeatur. Si uero pituita sit quæ ægrum infestet, aut præcellerit frigus, rutam in uino albo decoquito, atq; uinum ipsum calidum meracum bibendum dato, ac assidue bitumen, picem siccam, coriandri semen & cyperum suffuso: undiquaq; autem ægro contextio suffumentum supponatur. Est autem & pastillus fumigabilis ad tenesmos ac intestinorum dolores approbatus, hic. Picis sicce sextatē, bituminis unc. i, sulphuris ului unc. i, bitumē ac picem cum modico acetoliquato, sulphur autem uiuum tenuissimè tritū adiicito, hisq; simul unitis pastillos informato. Vbi uero expetente in calidū cinerem contextio suffuso. Bitumē autem in refrigeratis, etiam cum pisanæ succo infundito. Glande quoq; suppositis in eis huiusce modi utendum est. Oleo raphanino si adsit, aur cum muni, si nō illud haberi queat, alia decoquito ac conformato: deinde ladanum & ceram paulatim adijceto, quibus liquefactis & ab igne ablatis, modicum lycij addito, unito, ac rometo excipito, sediq; quam penidissimè indito. Ad anum uero uerem ac lumbos hoc adhibeto. Ladanum & styracem unguento nardino, oleoq; suffumigabili appellato dissoluito, ac lana exceptum imponito, ac colligato. Efficacissima autem sunt in tenesmi affectione fomenta sedî admota. Gallas igitur in aceto decoctas cum spongia adhibeto, aut glomis texturæ gynæciorum per successionem foueto. Efficax est & mallicorum similiter decoctum, myrticq; bacæ, ac rubus, quæq; his similia existunt. Furfures quoq; in aceto decocti, ac feruenti ligamēto excepti, commode sedî adhibentur. Infectiones etiam ex prædictis utiliter suscipiuntur. Verum cui per nostram experientiam cognitio testimonium merito præbemus, tale est. Latè perquam uetustus & à summo denigratus una cum cõtentis in eo paleis tunditur: deinde feruenti aceto subactis, in teoloq; illigatus sedî subditur. Hæc autem statim ab excretionē admoueantur, & maximè si dolor infestet. Iuuantur etiam per spōgiū dem herbam sedē extensa. Si uero exulcerationis principium oboritur, inflammationioq; adsit, pisanæ fucus infundatur, paucis rosis simul cum eo decoctis. Quod si acria sint quæ effertur, lac tepidum infundatur. Vehementiori autem inflammatione infestante, oleum ro-

C facem

faceum leniter calidum infusum ac pluribus horis detentum, doloris vexationem dissoluit. Si uero laxius intestinum rectum fiat, lentum ac malicorij de coctum infundatur. Similiter autem & si exulcerationis principij addit. Si uero uisgula unâ cum dolore cōsequantur, sedî colliryum soporiferū subdetur, quod ad dysenterias est descriptū. In eis autē quibus ita ulcus serpsit de pascitur, subiecta ad dysentericos cura uretur. Epithema dysentericis. Croci, myrrhæ troglodytice, cyphij, mastiches, succi ablinthij, aloës, palmarū, acaciæ, mafuchæ, ladani, malorū concolorū, cumini torrefacti, cādidî ouorum assati, panis uisti & in uino macerati, olei melini aut rosacei.

*Cura dysentericorum.*

Cap. XLV.

Principium curationis dysentericorū à quiete & modico cibo fiat, undecumq; tandem fluor procedat, & mediæ corporis partes lana oleo modico dulci imbuta cōtegantur. Vehementi autem mordacitate infestante, putaceum sit oleum, & cuminum tritum lanæ conuolutæ inspergatur, maxime ubi inflationes & tormina affligant. Quod si hæc augeant & intendantur, ad cataplasmata confugiendum erit, & hoc maxime si inflammationis sensus percipiatur. Multis enim non dolorum tantum, uerum etiam totius massæ obliatione cataplasmatum cōmoditas induxit. Adparentur autem hæc ex polline in posca usque quo cogatur decoctio; quem deinde linteolo complicato illigatū totis illis impones: fluorē enim ipsum cocogit, quandoq; autem & palmas, malaq; cotoneæ, ac malicorium cum aceto cocta ammiscemus: quod si ardor addit, symphyti radicem tritam, aut solanum, aut perdidum, aut plataginem adijcimus. Stomacho uero imbecilli & exoluto, polentam cū cenâche, aloëq; & omphacido annectemus: inflatione autem simul infestante, anisi, feniculi, apij, ac irionis semen addimus: & si lumbrici simul cum recrementis excernantur, melanthium, aut cornu ceruini ramenta, aut adeps ceruinus, aut coriandri semen non incommode admiscetur: quod si dolor ueruens addit, prædicta cum lini semine commisceantur, & aceto multo decoquantur. Si uero sanguis multus efferatur, acacia, hypodisthis, & alumen cum palmis ac malicorio decoctis & tritis apte condecnantur: si autem liquida & cruda prodeant, quod eis qui uires debilitatas habent euenire solet, mel coctum per se, aut polenta ammixta, pelle exceptū imponitur. Aliquando autem & opij parum, aut hyoscyami semē, hypodisthidemq; & acaciā ac myrrham, apijq; semen satis largū, itemq; feniculi & anisi inspergitur. Quod si frigoris sensus adsit, pellem agnina leuē liquida pice imbuta, calefactamq; aluo imposito. Ego uero, inquit Archigenes, superioribus quidem intestinis adfectis, pastillum aliquem ex eorum genere qui superne per os exhibentur dissoluo ac melle probe cocto, aut palmarū pinguium carne exceptum impono. Neq; enim impetū parendū est in his qui de uita periclitantur. Inferioribus autem intestinis adfectis, ac mucosis multis inferne prodeuntibus, & eiusmodi etiam occupante madore: ex pastillis qui inferne per anum infunduntur, tres aut quatuor palmarum carne exceptos impono, semperq; mihi iuxta uotum res acta succedit. Mirifice etiam emplastra quæ cruentis uulneribus adaptata sunt, cōducunt, postquam quiescerint inflammationes, uen-

tri ac lumbis totis usq; ad dorsum imposita: qualia sunt Barbara appellata, & quæ ad fracturas apparantur, uelut est quod Ihs uocatur. Atq; de his quidem quæ forinsecus imponuntur hæc tenent. Dicendum autem deinceps de his quæ intra corpus assumuntur. In principio igitur post tertiam diem permittentibus febrilibus, lacte recens multo adhuc calido utendum est, melle tepido ei ammixto, atq; in eius usu ad tres dies perseverandum, quantum nutriendo corpori suffecerit exhibendo: sequētib; deinde diebus melle adepto, & modica aqua (quartæ nimirum lactis partis mensura) assuta, paulum decoquimus ac exhibemus. Deinde post alias tres dies ad dimidium decoquimus, & post alias tres, ad tertias, similiter per tres dies, atq; ita eis præbemus. Primum enim lac depurgat, simul ea quæ in corpore sunt cōtemperando; postremū uero aluum sistit. Non scio enim an aliunde grauior molestia dysentericis oboriat, quam ex eorum quæ egeruntur acredine contingit. Oportet autem insuper & panem madefactū à lactis acceptione offerre. Pultes etiam eæ. Lactē aparate, tum pharmacum, tum nutrimentū optimū præbent: uelut est oryza cum lacte, duldarij panes, amyllum, & ova lacti commissa. Quod si adhuc fluxus perseverat, inde ad eorum quæ aluum siliunt sylum trāsundum est. Ex quorum genere, alia quidem influentes humores obducunt & inspissant: alia uero, corpora plus iusto rarefacta & laxata adstringunt, alia autē resiccant. Pultes igitur ex halica apparent: nam hæc & probe nutriunt, & aliquo modo obducunt. Cōstantur autem paucissimo sale, ac modico oleo & anetho, aut pro oleo magis adipe gallinacō, aut asferino recenti. Quæ uero ex oryza eodem planē modo parantur, præcedentibus magis resiccant. His autem adhuc amplius quæ ex millo fiūt. Quæ autem ex rhoë apparantur pultes, magis adstringunt. Ego uero, inquit Archigenes, eas hoc modo adorno. Rhoem culinarium in aqua pluuiâ per noctem macero, deinde diligenter expresse aquæ cōmito. Farris apparatus ex Archigene. Quod uero Latine in regionibus Romæ uicinis far appellat, hoc modo apparatur. Frumentum modico tempore aqua madefactum, indeq; extractum ac in pilam coactum, uelut psanā a cortice repurgato. Vbi uero corticem exuerit, tollito atque in sole siccato: deinde manibus tritum donec penitus a cortice fuerit mundatum, crassissimè molito, ita ut granum unum in quatuor aut quinque partes redigatur, & siccum adseruato. Vfus autem tempore halicæ modo coquitur, & à sanis in cibo sumitur. Pro egrijs uero uariè apparatur, & epithematis quoque ammiscetur. Quidam spicas frumenti adhuc uirides tollunt, ex ipsiq; far condecnant, quo modo & suauius & succidius redditur. Far quod clusinum appellatur. Porro frumentum ipsum rursus madefactum, manibus sedulò confrico, atque ita percolatum ipsius succum coquo, anethi ramulis assidue agitando: coit autem celerrimè uelut glutinum quo ad librorum compactionem utimur; quo facto ipsum sale, ac paucissimo oleo siue adipe coctum, sicq; hoc modo non solum commodum, sed etiam succundum. Apparatur autem puls ex siccis item panibus, quos aliquando quidem posca, aliquando uero palmarum, aut malorum coroneorum, aut pisorum, aut sili-

aut filiquarum, aut rhois, ut dixi, cremore contusos coquo, eisq; aliquādo ex fauo albo ac optimi mellis pleno aliquid admisceo. Ex adstringentib; numero lēcula quoq; proditur, quæ probè assata cū planta gine aut malis punctis cōtusis decoquatur, acetoq; ac modico oleo cōdātur. Vtiliter etiā lenticulæ far du finum ammiscetur. Olera quidem non ualde probo, decentē tamē eorū degustationē nō prohibeo, uelut seridis coctæ, plantaginīs, brasiçæ his coctæ, ad quā post primam atq; item secundam decoctionē aqua diffusā, poscam feruentem affundimus, rursusq; donec liqueat decoquimus. Intubum quoq; ac silarū cum liquamēto simplici exhibemus. Damus & ouo rum assatorum lutea tantum cum modico aceto ac rhois, paucissimo oleo ammixto. Carnes autem dysentericis non ualde commodæ existunt, dandæ tamen eis qui diuturno malo uexantur. Ex his uolueriū eligendæ, deinde syluestrium ferarum: uerū ex his omnibus facillē solubiles & non graueolentes, teneramq; carnē habentes ac adstringentē, reliquis præferendæ, uelut est inter uolucres perdix, palumbes, & similes. Ex pedestrib; uero carnes rodacids, capræ, ac leporis. Ex marinis, asellī, perçæ, Ioliginis ac nulli: singulæ uero in posca ebulliant, myrti baccis cum eis incōctis, deinde assatæ cum familiaribus edulij præbeantur. Fructibus quoq; parce utantur: si nam stomachus langueat, pīrum coctum, aut cotoneum malum concedemus, aut uuam quæ in cado, siue olla, aut etiā interpositis uinacis adseruatur: me spīa item ac punicum malum. In potu à principio quidē aqua pluuiā, quæ nō sit ex domibus plumbo intectis delapsa, utendum est. Talis enim aqua potata etiam sanis dysenteria propinat, quod si pluuia optima non addit, fontana uentur: puteorum aqua semper deuitata, utpote quæ subsalsā est, ac uentrē perturbat. Cum aqua autem fructus adstringentes coque-re oportet, maxime uero acinos. Post uero ubi uires fuerint delectæ, etiam uinum præbendū, quo stomachi sanitas firmetur: sit autem uinum adstringens, & non ualde uetustum. Ante cibum uero corpus inun-ctis, & faciei proluione, similibusq; curetur, quæ in febriū tractatu sunt relata. Atq; hætenus quidē de diætā. Iam uero ad remedia quæ infernē adhibentur transeundum. Magnis igitur intestinis affec-tis etiam infusā adhibeatur: & si quidem tenesmus infestet, pīsanæ succus infundatur, adipe caprino aut hircino admixto. Vbi uero corpora excoarctationem incurrant, halicæ aut oryæ succus magis appositus erit: triçea etiam pīšana ad tenesmos ac excoarctatio-nes accommodata cēsetur. Aliquando in uehemēti tenesmi ad egerendum promptitudine, muriæ usu ægrum ab omni dolore liberauimus, sufficiunt autem ex ea drachmæ sex, heminæ uni calidæ aquæ illiquatæ: ubi uero succo allici eam ammiscueris drac-  
viii. inficito. Præstantius tamen oliuarum albarum muria conditarum liquamē censeatur, tepidum hemi-næ mensura infusum, & sanè per assiduum etus in re-nesmi cura usum optimè succēssit. Si uero ex ueteri chirurgiæ perpelesione, aut aliis subtiliore sensu præ-dicta existant circa sedem egroti loca, anus abside & maxime ante acrium aut adstringendum pharmaco-rum infusionem, adipe anserino aut suillo perunga-tur, & fistula quoq; clysteris crassius illita immittatur. Cæterum post distentionem ex olutionem, aspe-

ritates quæ circa intestinum sunt, quæ quidem me-diocriores, per muriam resicantur: quæ uero relin-quuntur succis magis adstringentibus curantur: ue-lut gallæ in uino decoctæ, aut tritæ & uino insper-sæ, malicorij item ac corticis pīnus, & baccarū myr-ti nigrarum. Quod si ardor consequatur, oua cruda duo cum uino modico, ac largo rosaceo conquassa-ta infunduntur. Qui uero caput, quod facile adsti-ngitur habet, in his feminis lini succū recusamus, utpo-te caput replētem. Portulacæ autem cum pīšana (si possibile est) decoctam, aut cum aqua: si id fieri non queat, succo eius cū rosaceo & ouis crudis permix-to infundimus, in his præsertim q; ardoris adfectio-nē circa intestina habent, aut qui aliās à calidorum in-fusori ardore sunt legi: ex rosaceo uero quarta ipsius succi pars sumatur. Mirificæ etiā feminis lini succus facit, cum candidis ouorum, & lacte asinino sesqui-cochlearij mensura permixtus: pro quo si non addit, bubulum accipere non incōmodum erit. Porro in-flammationibus erysipelatis, ciborum ac potuum in-tra mordacitatem adstringentium usu conueniens existit. Infusa uero eis cōueniunt, plantaginīs succus, malicorij, perdicij, portulacæ, semperuiui: uerum sin-gulis acaciæ aut hypocythidis succum admiscere oportet. Efficacius autem in erysipelatis glauciū in-funditur cū aliquo ex prædictis succis, aut Andro-nis pastillis, aut Musæ inscriptis. Quod si sanguis destillet, sanguinariæ succo utēdū aut plantaginīs cū acaciā, hypocythide, aut balaustio. Si uero sanguinis impetus uehementer urgeat, quemadmodum etiam si maxima inflammatio subest, præsertim in his qui plurimo sanguine abundant, uena incidenda, si uires non resistant, & maxime in quibus consueua sangui-nis excretio cohibetur. Auferre autem oportet neq; multū neq; coaceruatum, ab utroq; enim uenter con-turbatur. Omnium uero maxime cauebimus ne ani-mi deliquiū fiat, quare desident etia dysenterico ue-nā secabimus: hac enim desidentes forma dū secatur uena, minus reliquis animo linquitur. Secare autē oportet in dextro cubito uenam humeralem appel-latam: neq; enim similiter hac uena incisa, uires labe-sctantur, & insensibiliter quodammodo surtimq; sanguis auferetur. Quod si hæc non appareat, necessa-riō mediā secamus. Inferiorē autem incidere ob sub-iacentem arteriā uitandum: ceterum fissurā omnino tenuissimam infligemus: nō enim ob multitudinem sanguinis euacuatā sectionem facimus, sed ut mare-riam quasi per riuos transferamus. Paucus autē san-guis etiā multo tempore emissus, inflammationem mitiga-t. & sanguinis ad intestina delationē reuellit, innatūq; calorē sensim refrigerans, somnum magis quam animi deliquiū inducit. Est autem optimū dy-sentericis remedium somnus. Si uero quid uenę inci-sionē fieri prohibeat, ex eorū quæ sanguinē sistūt am-mixtione infusionē facio. Qua in re lanarū succida-rū cinis optimè facit, aut ex spongia noua uita. Spō-giam autē ipsam liquida pice imbure oportet, aut sanguine taurino, cineremq; eius in olla exustæ in aliquē ex prædictis succis inspergere, atq; hoc modo infundere. Succū aut in his ad infusiones apti humi, ex plātagine, sanguinariā, ac similibus. Quin & linteo-lū alumine liquido imbutum, deinde usū, præclarē sanguinis eruptiones sistit. Sūmē autē conducētē cognouimus asinini stercoreis succū, maxime si à pæ-



stura prodeat animal mōtāna & adstringente: quod si non sufficit ipse succus, stercus plantaginis succo madefacito, exprimito ac infundito. Adhibeatur autē simul & epichemata, & quę per os accepta sanguinem sicut, & qui sanguinem spuentibus commo-di sunt pastilli. Præter opintionem uero eis profunt, maceris cortex, & mali punici flores, æquali pondere confusa & cribrata, si inde serupuli duo cum uino adstringente propinentur. In his etiam frigida, citra offensionem tamen, infusa apparentur. In reliquis uero dysentericis tepidiora, aut leniter calida. Vlceribus enim frigidum infesum est, nisi sanguinis eruptio simul adsit. Si uero exulceratio absque fluxione relinquitur, plura ne infundatur, quā lac bubulum, aut caprinū, cui lyçij drachmæ tres sint ammixtæ: opimè faciunt & terræ samizæ drachmæ III. aut amyli drach. III. cum plumbi usti drachmis II. triticeæ pisanæ ammixtæ ac infusæ. Aut cerusæ drach. II. cū succo injuncto, egergetur sanatur, ubi uero fluxione additur, & nimium humecta sit exulceratio, charta usta, aut lentiscus usta, aut cinis pōpholygis, aut aridum ex charta cōstans pharmacum, similiaq; cum succo plantaginis infusa, aut etiam cum altero consimili succo ægrum, à malo adseruat. Quod si uehemens sit fluxus & humectatio exulcerationis, ea quæ à callis indurata corpora leuigare ac à callis liberare possunt adsumantur: itemq; ea quę humecta ressiccare & exurere, exolutaq; adstringere possunt: uelut est sabinæ herbæ decoctum, item saluæ, polij, ac pilularum cupressi, ex pastillis uero Musæ inscriptus, & qui ex sanis succidis uitis constat, & cōsimiles. In potu uero Thrasij pastillus, & qui croceus appellatur, consimilesq; qui supernè per os sumuntur, præbeantur. Cibi etiā magis ressicantes eis exhibendi. Si uero serpendo depascit ulcera ipsa, si qui dē in intestino ieiuno consistant, paruam omnino salutis spem promittunt. Si uero circa tenuia intestina fiant, minus graue malum est, atamēn periculo non uacat. Si autem in colo fiant, ut plurimum sanabilia existunt. Verum quemadmodū in externis ulceribus depascētibus: ita & in his statim in principio, ubi depastio apparuerit, crustas inducētia & exurere ualentia adhibere oportet: si enim ad magnitudinē peruenierit exulceratio, inutilis horū usus fuerit, ceterū ulcera circa ieiunū ac tenuia intestina, per poriones curantur, ea uero quę crustas inducūt in potu accipi non possunt: quare sorbitiones & eclegmata ex tergere ac repurgare potētia, his sunt exhibēda: estq; pisanæ succus cum melle absorptus, his aptus, atq; ipsum adeo mel per se induratum, & in decoquēdo in pastillū coactum, quod comestū ulcera potēter repurgat. Sorbitiones item ex eruo apparet, cōueniētissimæ sunt eis qui in superioribus partibus ulcus depascens habent. Apparantur autem hoc modo. Erum in aqua calida sepe permutata ad horas octo madescere sinitur, deinde donec testam omnem abiecerit, manibus in aqua confricatur: pōst uero coquitur, & prima itemq; secūda, tertiāq; & quarta aqua diffusa, semper ubi prius decoctum diffunditur, rursus alia aqua seruens affunditur, quæ ubi post quartam tandem decoctionem fuerit diffusa: acetum mulsum ad ipsum sufficienter infundatur, & cum quintæ aquæ affusione ad compagem succi pisanæ decoquendo reducatur, atq; hoc modo absorbeat. Hali

ca etiam cum lacte bubulo decocta non incommoda efficitur. Maximè uero omnium prodest eis lac bubulum recens mulsum ac potarum. Quicquid uero eadem eis datur, ualde modicum sit. Hi enim præ alijs dysentericis paucō cibo indigent, sitiq; uexantur. Pharmaci autem loco exhibeantur quęcūq; aristolochia rōtūda participat, radicēq; panacis, ac iridis, alumine scissili, moris, & mali punici flore. A uino uero abstineat, depastionem enim dilatat. Quod si circa intestina crassa ulcus serpendo depascens consistat, ea quæ per sedem infusa crustas inducunt, adhibeantur: cuius generis funt pastilli Faustini, & consimiles, & maximè qui Nymphodoro est inscriptus, quo etiam nos utimur: itē qui ex thallia, id est, oleæ ramulis constat, quorum omnium compositiones paulo pōst dicemus. Cæterum cum attentione crustam inducentibus uti oportet, excellentem ipsorum facultatem reuerendo. Porro cancerosa & maligna, quę cacothē Græci appellant, intestinorum ulcera ferè in totum incurabilia existunt, neque tamē citra auxilium relinquere oportet, sed uehementes dolores mitigare: optimum autem & his est asinum lac recens mulsum potarum: si quis enim eius usum sustinere possit, nullumq; aliud nutrimentum accipiat, plurimam salutis recuperandæ spem habebit, bonum est & bubulum ac caprinum recens mulsum, si illud non adsit, bonum est & scissile lac cum amylo. Præbeantur autem eis & oua cruda, ac iuscula gallinarum & perdicum. Succu etiam præbeantur omnes qui facultate obtundendi dolores præstant: infusa quoque eiusdem generis sint: pharmaca item his cōueniunt omnia, quæ ad dysentericos à uenenatorum acceptione factos, conducunt. Cæterum irrigationibus & cataplasmatibus neque curantur cæcrosafa & maligna ulcera, neq; mifiora sunt. Vtere autē & ad eos infusis ad cancerosam uuluum describendis, & pharmaco ad caneros mammarum, ex uino adriano & rhoē qua coria tinguntur, apparato. Porro si à uenenatū pharmacū potione, ubi mortis periculum fuerit deuitatur, dysenteria oboritur, his quæ à uenenorum potu conueniunt, erit utendū. Triplis autem modi remedijs in his qui uenenum biberunt utimur, uomitōrij uidelicet, & obtundentibus atq; extinguentibus: in quorum numero etiā acria comprehenduntur. Vomitōria itaq; remedia mox à uenatū potu sunt accepta. Extinguentia uero quæ acria sunt, tanquam uisceribus minime conuenientia, recusamus. Alterum igitur tantum genus extinguentium, hoc est, aromaticum adsumemus: itemq; ea quę obtundendi uim habent. Ex cibis itaq; conueniunt pisanæ succus, aut halicæ succus cum anetho decoctus, aut palmis aut mali punici acinis, licet radices dulcis succus: cum his etiam tum gallinæ, tum perdicis decoqui possunt donec eliquescat: cerebella itē ac pedes eliquata præbeantur, & sorbitiones ex amylo & lacte, quibus anserinus aut gallinaceus adeps est ammixtus. Ex pharmacis autē eis cōducunt quę de uenenis referūt in tercio decimo Sermōe. In potu uinū non inconueniens est tenue & album, nisi febris aut inflamatio adsit. Cæteri cataplasmata & fomenta in eis quibus ex bilis acredine dysenteria oborta est, uitabimus. Quod enim leue & bene succulentū in intestinis est, id distrāhūt ac diripiūt: quod uero nulli usui est, & mordax, in ipsis relinquant.

*Cura eorum qui aurum, aut as, aut tale quippiā deglutierunt.*

Cap. XLVI.

Si quis aurum, aut ære, aut ferro, aut aliquo alio huius generis deglutito, sanguinem per uentrē egerat, malig. aut feminis lini succo multo, in potu exhibitio, lapsum facies deglutit, supra hoc quod & in intestinis obortā lenies asperitatē. Ego uerō, inquit Antyllus, quum quidā per forā anulum aureum deuorasset, & ramentosa ac cruenta infernē egereret, ob sculpturā uidelicet asperitatē: in ipso enim auro capitellum inerat asperē condinatum: non sum immoratus his quæ lubricas uías reddunt, sed cōfidenter animo ad ea quæ fortiter purgant: pharmaca sum progressus: quare contigit una cum recremētis anulum excidere: quo facto, homo ipse ex pissanæ succo, ac forbillibus ouis nutritus, tertiā diē sanus euasit.

*Communia remedia dysentericorum quæ supernē exhibentur.*

Cap. XLVII.

Porro ubi memor fueris remediōrū iam antē in unaquaq; dysenterici specie dictōrum, expedit inueniē, iuxta eundē planē modū, quomodo & cōmunibus remedijs, quæ nunc dicenda supersunt, utaris. Cōmixta enim reperies hic remedia omnia simpliciter scripta quæ dysentericis cōueniunt: nimirū adstringentia, obrundentia & resiccantia. Et simplicia quidē quæ tum dysentericis, tum colicis in potu dantur: alia quidem adstringēt, & firmitatē addēdo, humoresq; inspissando, uētre m cohibēt: alia autem obrundendo, alia etiam urinam ciendo, ac fluxionē transferendo. Quæ itaq; urinā ciēt, omnibus sunt manifesta, & sæpe in hoc opere descripta, quibus etiā hic uti oportet. Quæ uerō adstringunt cōmoda eis hæc sunt: lapathi syluestris maximē semen, aliterius autē lapathi tum semen, tū radix, trita aquæ inspersa ac potata, siliquæ aridæ comestæ, rhus culinarius, gallæ, spinæ Aegyptiæ semē, malicoriū aridum tritū, rubi radix, unumquodq; eorū cum aqua ad tertias decoctum, aut tritum potui inspersum, laudanum cū uīno austero, acaciæ succus, hypocistidis succus, lysimachia, balauitū, sideritidis heracæ folia & radix, salicis folia, symphyti radix & folia & semen, rheon ponticum, altheæ radix, gnaphalium cum uīno austero, hippuridis succus cum passō, loti arboris bacca, & ligni lotini scobs, potui inspersa & potata præclare faciunt, cortex thuris tritus potatus, lemnia terra quæ sphragis appellatur, minimum sinopicum, cœnanthe polentæ modo potata, holoschoeni tunc fructus torrefactus, uerbasci radicis drachm. ii. mora acerbā in sole desiccata, ac trita liquoři potando atq; obfonsis inspersa, mora rubi acerbā similiter exhibitā, adni uuæ, ac uuarum passarum tum aridi tritū, tum in cinere exusti, plantæginis semen aridum tritum, similiter folia & radix, maceris cortex. Ex eorū autem numero quæ aliquo modo adstringunt, uerum magis obrundunt, est asfer famius, & amyllum. Obrundit autem tragacanthus & gummi. Resiccāt coagulum leporis ex aqua, cornu ceruinum usum, herinaceorum testæ ustæ, itemq; ostræorum, & cancorum maximē fluuiatum, atq; etiam marinorum testæ ustæ ac irritæ: egregiē faciē & saluæ decoctum.

*Composita pharmaca quæ supernē exhibentur.*

Cap. XLVIII.

Vinū uetus adstringens ad tertias decoquito, mellisq;

optimi equale pondus adjecto, rursusq; donec in cōpagem cogatur coquito, & ante cibum myrti mensura exhibeto. Aliud Asclepiadæ. Ouum recens in uas quoddam euacuamus, putaminēq; eius mel optimū ac uiuū uetus adstringens, malicoriumq; tenuissimē tritū demetitur, piperisq; granis x. adiectis, hæc simul in sartagine torremus, atq; tertiā inde partē ielunis cū pane præbemus. Simē etiā prodesse quod sequitur scimus, corticis thuris, feminis plantæginis, æquales partes tritas, uīno diluto ad trium cochleariorū mēsurā insperge, ac ante cibū exhibe. Cæninū edā stercus album, tritū, lacti crassili & per silices decocto inspersum, summē dysentericis auxiliatur, si lac ipsum in cibo sumatur. Cæterū canē ipsum per præcedens tridū, nullo alio cibo quā osum comestione nutrire oportet. Aliud ualde approbatū, cuius usu scimus multos a morbo liberatos. Gallarum tenuissimē tritarū, piperis, rhois culinarij, malicoriū tenuissimē triti, singulorum æquales partes misce, ac cū utellis oli subige, & in mali punici uacuam testā cōijce, ex eodemq; sumpto putamine os testæ contege: deinde totā mali testā fermento fortisecus oblini, & ad prunas assa: post uerō ex hac ipsa mali punici testa repurgata cochleariū ante cibū edēdū præbe. Aliud quod & colici prodest. Baccarū myrti nigrarū cochlearia ii. anisi, rosarū siccarum, cœnanthes, acaciæ, singulorū cochleare unū. Palmarū carne subige, ac drachmā unā præbe. Si cœnanthe haberi nō potest, uuas immaturas siccatas cōijce.

Aliud Marciani, ad eos qui neque potum, neq; cibū accipiunt, sed pro desperatis habentur. Baccarum myrti albarū quincuncē, malorū coroneorū medicum ac pulchrorum numero duo, aquæ sextartios ii. scobs corticis arboris loti sextantem & uncē dimidiū. Decoquito simul donec sextarij duo reliqui supersint, ac quantum possint bibendū præbe, idēq; etiam per dysterem infundito. Eiusdem facultatis est loti scobs potatus, atq; amplius adhuc eo præstat eius decoctum. Quod si lotus non adsit, cortice pinis utaris. Aliud Marciani. Aloës ad carbonum formam exustæ unciam i. malicoriū usi unciam i. seminis lini usi unciam i. contere & præbe cochlearia duo, his qui febre carent cum uīno antiquo. Ego uerō, inquit Marcianus, quotiescunque hoc exhibeo, duorum terrestrium herinaceorum membranā in ternam, quæ cibum complectitur, desquamatā adjecto. Quare hanc membranā illoram accipito, siccato, ac adseruato. Per se enim huiusmodi pelliculæ potatæ uentris fluxiones sistunt. Aliud Marciani, cuius utilitatē ne cōtemnas: feminis anethi, apij, fœniculi mōrati, piperis, sing. un. i. in testacā pilā cōijcito, atq; ubi probē cōtrieris, herinaceorum terrestriū internā membranā illoram, ac per se cōtusam & cribratā unc. i. pondere immisceto. Deinde uīnū purum uetus quantū satis uidebitur, in nouū uasculum infundito, & laminā ignitā ex ferro quod stomaoma uocant, nō minorē libra in uīno exstinguito, & adiectis aridorū drachmis duabus bibendum præbeto. Tantiū enim ad summū datur, atq; hoc medicamine multos ille desperatos seruauit. Aliud multa experientiā cognitiū. Cochleariū terrestriū maximē montanarū, usuratum, carnē trium drachmarū pōdere accipito, piperis scrupulos viii. simul cum æreo pistillo in puluerem redigito, & uini ueteris sexuncem,

cem, tantundemq; gari affundito, & ac simul unita omnia in tres partes diuidito, & per tres horas exhibeto, Oribasius autem siccochleari unā cum testis exustarū unc. i. alij trientem habet, galie sextantem, piperis unc. i. in puluillū redige, & obsonijs insperge, aut cum aqua, aut uino albo tenui præbe. Præda reauxiliatur hoc dysentericis, quibus uelocis nōdum est putrefactum. Aliud Marciani, quod Phenus appellatur. Myrrhæ, opij, balaustij, rhois rubri, cuiusque uinciam unā, anisi sesquinciam, spinæ Aegyptiæ quadrantem, lentisij quadrantem. Cum decocto cortidis lotini ligni subigito, & nucis pōticæ magnitudine præbeto, cū lotini cortidis decocto: quod si lotinus non addit, mespilino pro eo utaris. Cataporium dysentericum ualde pulchrum, Aesclepiadæ. Radicis symphyti, seminis ericæ, malicorij, gallarum æquales partes subige, & in catapota digere, ex quibus obolos tres cum uino, aut aqua deuorados præbe. Aliud eiusdem. Gallarum drachmas quatuor, opij assani drachmas duas, petroselinij drachmam unam, aqua subigito, & catapota formato, exq; eis ad ckeris magnitudinem præbeto, aut quātum uires tolerare possunt. Aliud. Thuris, acaciæ, opij, gallæ, æquale pōdus singulatim cum succo intyborum subigendeq; ad ckeris magnitudinē aut pro utrium tolerantia præbe. Aliud. Florum rosarū, opij, acaciæ, gummi, succi hypocistidis, cuiusque trientem, seminis & succi plantaginis, cuiusque sextantē, succi rosarū unc. i. In catapota redigito, ex quibus obolos tres dato. Pastillus ex feminibus, qui in Alexandria præparatur. Anisi unc. i. scentulij unc. i. seminis hyoscyami quadrantem, seminis apij quadrantem, alij tantum drach. i. habent, opij unc. i. dauci unc. i. aqua subigito. Oribasius autem hoc modo: Anisi, ammi, scentuli seminis, apij seminis cuiusque drachmas tres, petroselinij drach. ii. opij drachmas duas. Vale coeliaci, dysentericis, choericis, & tussientibus. Pastillus trigonus, hoc est, triangularis appellatur. Seminis apij sextantem, seminis hyoscyami unc. i. opij unc. i. unā, anisi unc. i. aqua subigito. Aliud Andromachi, ad coeliacos & dysentericos. Rhois culinarij drach. iiii. piperris drach. iiii. myrrhæ, croci, acaciæ, scobis cortidis lotij, ammi, cuiusque drach. ii. spinæ nardi, lycij, gallarum, succi hypocistidis, opij, aloës, anisi, cuiusque drach. i. cum rubi succo subigito, & ante somnū iiii. obolorū pondus ex aqua præbeto, non febrientibus ex uino frigido. Pastillus Philippi, ad diuturnas dysentericorum affectiones leuās dolorem, & bibitur & infunditur, & forinsecus quoq; imponitur, melle cocto aut palmis pasis subactus. Acaciæ, balaustiorum, hypocistidis, rhois rubri, opij, thuris, myrrhæ, croci, gallarū, lycij, aloës, rhei pōticæ, baccarū myrti nigrarū, malicorij, singulorum drach. iiii. uino ueteri adstringente subacta in pastillos digere, & nō febrientibus obolos iiii. ex uino præbe, febricitantibus uerō ex hydromelite. Ego autem hoc pastillo uor, & feliciter mihi succedit, omnibus quidem prædictis ad eius compositionem adiectis, præter thuris & rhoem. Ad hæc autem omphacij, floris mali punici, casie, castorij, aluminis scissilis, rosarum re purgatarum & siccarum, singulorum æquale pondus addo. Cataportum bonum. Abrotini sextantem, sarcocollæ unc. i. gummi parum, ut ex eo cogi-

ac formari possint. Catapota ciceris magnitudine formato, & ieiunis unum deuoradum præbeto, si militier unum ante somnum. Aliud Oribasij, ad dysentericos & hæmopticos, fluxumq; muliebrē. Succu hypocistidis, terræ samie, galie omphacij, acaciæ russæ, cuiusque drach. vii. cum aqua pluuiæ li subige, & pastillos forma, ac utere. Ad dysentericos quidem in potu exhibitis, ac per dysenterem cum succo oryzae, aut lentis, aut aliquo cōsimili, infusus. Ad hæmopticos uerō, cum aquæ frigida se sequi cyathos eius drach. i. Ad fluxum autem muliebrem, cum succo solani, aut sanguinarie, aut plantaginis la-na exceptos subde. Aliud parabile. Alumē liqui-dum tritum cum ouo absorbendum præbe, & rursus aqua calida dilutum bibendum exhibe, & ad miraberis. Sedat diuturnas dysenterias, & in quibus cruenta excernuntur. Aliud. Pumicem in tenuissimam puluerem redactum, cum ouis forbilibus, cochlearij mensura præbe, & miraberis. Aliud ex aquisum. Fici folia arida contusa cochlearij mensura cum uino austero dato. Aliud. Macer, mali punici florem, æquali pondere conunde, & ex eis scrupulos duos cum uino adstringente præbe. Valde commodum hoc est in his qui cruenta egerunt.

Pastillus ad dysentericos & coeliacos. Anisi, seminis apij, ammi, balaustiorum, succi hypocistidis, seminis hyoscyami albi, singulorum drach. vii. opij drach. iiii. Exhibe his qui integræ sunt ætatis drachm. i. cum aquæ calidæ cyathis tribus. Polyidæ Sphragis, coeliaci, dysentericis, quartanarijs, & oculorum fluxionibus conducens: dolorem enim adimit & reficit. Hyoscyami albi seminis drach. iiii. seminis apij drach. quatuor, anisi drach. ii. opij drach. i. contere cum aqua, & informa pastillos obolares: ex quibus unum cum aqua frigida præbeto.

Que infernè dysentericis infundantur. Cap. x. lxx. Pastillus Nymphodoti, ad dysentericos, & ulcera de-pascendo serpentina omnibus præstantior, quemadmodum experti sumus, inquit Archigenes: composi-tus quidem ut Faustinus, distonans autem in auris pigmētī appōderatione: opere uerō longè efficacior eo cognitus. Cuius compositio hæc est. Chartæ usiæ drach. x. x. auripigmētī drach. vii. calcis usiæ drachmas x. sandarachæ drachmas v. uini austeri sextarios iiii. Vinum ipsum per se coquitur, donec tertia pars reliqua fiat, cum qua arida in mortario teruntur, donec in compagem tertia redigantur, ex quibus deinde pastilli drach. iiii. aut trium siue duarum etiam formantur, quorum usus iuxta ægri uires adhibetur: cum uino autem & aqua infunduntur, ita ut cum aqua lenticula, rosæ siccæ, ac cortex loti decoquantur cum uino uerō baccæ myrti, ut ex utriusque hemina mensura superfic. In uniuersum autem, non solum in huius pastilli, uerum omnium qui crustas inducunt usu, stomachum hora una ante eorum exhibitionem, ex oleo myrteo ac uino ueteri irrigare oportet, itemq; caput ex oleo largo. Quæ enim crustas inducunt, si infundantur, & stomachum & caput offendere consueuerunt. Ante infusionem autem frusta panis duo aut tria ægro exhibenda, ex aqua frigida aut lacte teporis, si uehementis adsit febris: aut uino diluto, si parua fuerit febris & nullus pēti. pane madefacto. Quod si ab infusione stomachus exuratur aut subuertatur, aquæ frigide cyathis tres

hi tres confiderent in potu præbeantur: exhibendus & laetæca caulis cum pane & aceto: oliuæ item albæ ex aceto. Cæterū his qui statim ubi infunditur pharmacū, rursus reſciunt, imò penitus infusum retinere nequeunt: muriam præinfundere oportet: aliquando etiam salis ammoniaci cochleare i. aut amplius tritum, pharmaco est ammiscendum, nullo habito mordacitatis respectu. Vilitas enim omnem dolorem exuperans inde procedet. Vitumur autem frequenter oliuarum albarum muria cōditarum liquamine, hemina nimirū una ex eo infusa, semihoræq; interſtitio facta, aut paulo diutior, pastillū ipsum consequenter infundentes, quo modo facillè ipsum continent. Et pharmacum sanè magis efficaç sit, ubi nuda ulcera contigerit. Si uerò nec sic continuerit, iterū atq; iterum infundito: munitum est enim pharmacum ne crustas inurat. Porro ubi efficacis fuerit pharmacū, & uicerit affectionem, multa cū ipso mucoſa ramenta prodibunt, & à multis molestiis, egerendiq; promptitudine, disſentionibusq; liberabit. Infusum autem ipsum non ultra duas horas retinendum est, neq; infra unius horæ spatium. Atq; hic casus non uniuersalis tibi in omni crastus inducente infuso proponatur, unā cum hoc quoddā & stomachus & caput sit præmunitum. Ante infusionem etiam anus ex oleo dulci ſillinaur, maxime uerò adipe quopſa ipsa ſitula crastius perlinatur. Post infusionem cum spongijs aut glomis decocto quopſam adstringenti imbutis, ſedes foueatur: adiunat enim hoc ipsum infusi retentionem. Mirabiliter etiam prodest Andronis pastillus duarū aut unius drachmæ pondere infusus. Pastillus ad dysentericos, cuius multam expectoriam habemus, admirabilis enim in ulceribus serpendo depaſcentibus exiſtit, nō solum dysentericis, sed oris etiam gingiuarum, & ad omnem nomen serpenstem. Calcis, auripigmenti, chartæ uſtæ, squamæ æris, æquales omnium partes ramulorum olææ decocto seu succo subſigito, ac uitior cum oryzæ succo. Exuccatur autem olea hoc modo. Ramulos olææ conuulſito, eiſq; congruentis mēſuræ aquam affundito, atque donec quater efferuerit decoquit, expreſſoq; succo uitior Faustini inſignes paſtilli: quorum alter conſtat ex chartæ uſtæ drachmis x x x, calcis drach. x v, auripigmenti dra. x ii, ſandarachæ dra. vi. Infunditur duarum drachmarum pondere cum rhois & baccharum myrti decocto. Si uerò diuturna ſit aſſectio, ſalis etiam drach. ii. adſciuntur. Alter uerò conſtat ex calcis drachmis decem, ſandarachæ drach. vi, auripigmenti drachmis octo, chartæ uſtæ drachmis triginta, hæc in paſtillos redigito, ac uitior, quemadmodum in Nymphodoti paſtillō eſt prædictum. Alter adhuc paſtillus Fauſtinus, qui in Alexandria præparatur. Auripigmenti trientem, ſandarachæ trientē, calcis uncias duodecim, acaciæ uncias x ii, ſubſige cū uino. Paſtillus Philadelphus, ad dysenterias, & ſanguinis eruptiones, & omnes nomas. Sandarachæ, auripigmenti, cuiuſque quadrantem, calcis ſexuncem, acaciæ ſexuncem. Excipe plāta gnis ſucco, aut uino auſtero, & paſtillos drachmarum quatuor, aut trium, aut duarum informa, atq; pro ægri uiribus inſunde cum uino myrtite. Eras autē hoc modo ipſum præparat. Auripigmentū beſſem, acacię trientem, calcis trientem. Paſtillus alius, dysentericis commodus, qui euſſigio aluum

ſiſtit, quod multo experimento conſtat. Bituminis, auripigmenti, ſandarachæ, aluminis ſciſilis, ſquamæ æris, cuiuſque drachmas quatuor, chartæ uſtæ drach. x, calcis drach. viii, ſucci hypociſthidis drach. iiii, balauſtiorum drachm. iiii, opij drachm. ii. Cum uino myrtite ſubſige, ac utere uelut in Nymphodoti paſtillō prædicti. Paſtillus ex ſubere appellatus, quo uelut præter opinionē admirando uitor. Gallæ uſtæ, chartæ uſtæ, ſuberis ex uale uini ueteri accepti ac uſti, panis aridi uſti, ſingulorum drachm. x v, auripigmenti drachm. x x, ſandarachæ drach. x, calcis uiuæ drachm. x, acaciæ drach. v, ceruſæ drach. v, ſpumæ argenti drachm. iiii, omphacię drachm. iiii, ſciſis uini uſtæ drachm. v. Cum uino adſtringente ſubſige, & informa paſtillos drachmarum iiii. & iiii. & ii. In principio autem hos cum plantaginis aut ſanguinarie, aut perdicij ſucco inſundito: aut cum aqua tepida, ſi hæc non adſiſti: uerò morbus forſis ſit, & in uigore conſiſtat, cum ſcenti græci aut lini ſeminis decocto inſundito: in declinatione autem cum myrti & rubi decocto ex uino. Et in pueris quiddē cyathorum duorum menſura: in ſceminis, tritum: in uiris uerò qui ad perfectam ætatem acceſſerunt, quatuor inſundatur. Paſtillus Aſclepiadæ, dolorem ſummuens, ſomnumq; inducens. Diuturnis dysentericis adſectio nibus euſſigio auxiliatur, ſi abſteſbris. Chartæ uſtæ drachm. iiii, auripigmenti, ſandarachæ, ſquamæ æris, aluminis ſciſis, omphacię, lyſcię, acaciæ, ſucci hypociſthidis, calcis uiuæ, cuiuſque drachm. v, opij drachm. ii, croci drachm. ii. Vino myrtite excipe, & in paſtillos redige, quatuor & tritum & duarum etiam drachmarum. Iuxta ægri uires cum paſſi cretici cyathis vi. his qui integræ ſunt ætatis inſundito. Paſtillus alius dysentericis, Auripigmenti ſextantem, ſandarachæ quadrantem, ſquamæ æris unciam i, calcis trientem, aluminis ſciſilis ſextantem, chartæ uſtæ quincuncem, omphacię ſextantem, acaciæ ſextantem, ſucci hypociſthidis ſextantem, thuris unciam i, opij quadrantem. Vino myrtite aut aliquo alio auſtero excepta ſubſigito. Quoddā ſi quis inſufum non continet, ſed ſtatim ipſum reiecit, omnino morti propinquum iudicato, quemadmodum ſæpe ſam ſum expetius. Inſundito autem ex eo uelut ex præcedente drach. i, tantū. Paſtillus, thronus Marcellius appellatus. Auripigmenti quadrantem, ſandarachæ trientem, lentidū trientem, balauſtiorum quadrantem, alię dextatē, habent, opij ſextantem, calcis beſſem, omphacię ſextantem, ſucci hypociſthidis quadrantem. Vino auſtero ſubſige, & utere ut paſtillō Nymphodoti. Paſtillus Lycos appellatus, ad dysenterias eos. Sandarachæ drachmas ſex, auripigmenti drach. x ii, calcis uiuæ drach. x, æris uſti dra. x x, acaciæ drach. vi, cadmiæ drach. x ii, chalcitidis crudæ drach. x ii, rhois culinarij aut quo coriarij utuntur, drach. iiii, ſucci hypociſthidis drach. iiii, baccharum myrti nigra rum recentium drach. vi, ſcoros drach. i, miſſos crudos drach. i, gallæ drachmas viii, omphacię drach. i, lyſcię drach. viii. Vino myrtite ſubſigito, aſuſo etiam plātaginis ſucco, & paſtillos drachmarū iiii. & iiii. & ii, formato: cum uino uerò adſtringenti inſundito, ægri habita cura, uelut in Nymphodoti paſtillō eſt prædictum. Paſtillus magnus, dysentericis præclarē & ſelictē iuuās, etiā ſi ex treme ſint aſſecti

ac deſperat, ut pote in quibus carnoſæ & ſeculentæ  
 produunt egeſtiones. Inſunditur autem cum ſucco  
 oryzæ, ſic ut adeps hircinus & myrrus cū ipſo deco  
 quatur. Cæterū in his quæ retinere non poſſunt, mu  
 ria oliuarū albarum præmittenda, & poſt horæ in  
 terſtitium paſtillus inſundendus, ſtomacho & capite  
 præmunis, uel ſut in Nymphodoti paſtillio eſt prædi  
 ctum, anus itē ab inſuſione fomenti integratur. Pro  
 deſt etiā ad caua ac profunda cruſtoſaꝝ ulcera, itēqꝫ  
 nomas pudendorū. Verum in dyſentericis præſtat,  
 ut cū reliquis prædictis remedijs, manus ægri laijs  
 & longioribus ſalcijs conſtringantur, ſupernē ex hu  
 meris exordio facta, & in ſummo uſqꝫ digitoſa liga  
 mento protenſo: nō parū enim hoc ipſum ad fluxus  
 reſpreſionē facit. Porro ipſius paſtilli coſpoſitio hoc  
 modo habet. Balauſtiorum recentium, malicorij,  
 rhois quo coria tinguntur, phylloſorum, ſingulorum  
 drach. iiii. ſilicis diſtorij drach. iiii. alijs dr. vi. ha  
 bent, ſpinæ Aegyptiæ drachmas iiii. ſeminis hyo  
 ſeyami drach. iiii. ſarinæ lentium drach. viii. ſuberis  
 ex uafe uini ueteri accepti ac uſti drachm. iiii. gallæ  
 omphacinae à teredinibus nō corroſe drach. iiii. ro  
 ſarum ſicarū drach. vi. ſloris recentis roſarū drach  
 mas ſex. croci drach. iiii. myrrhæ drachm. vi. lycij  
 drach. viii. bituminis drachmas ſex, piſcis ſiccæ drach  
 mas ſex, acaciæ drachmas octo, hypocithidis drach  
 mas octo, gummi drac. xxi. thuris maſculi drac.  
 viii. omphacij ſucci ſicci drach. iiii. opij drachm. ii.  
 amyli drach. ii. ſolearum ueterum uſtarū drachmas  
 quatuor, cornu cerui uſti drach. iiii. oſſiculorū oli  
 uarum uſtorum, oſſiculorum palmarum uſtorū, ſe  
 cis uini uſtæ, ſpongiarum nouarū liquida pice & ce  
 dria imbutarum ac uſtarū, oſtreorum uſtorum, æris  
 uſti, ſquamæ æris, ſing. drach. iiii. lapidis gagatæ, coral  
 li, rubiginis ferri, aut ſcoriæ, cuiuſqꝫ dr. iiii. alumini  
 ſis ſciſilis in teſta exuſti drach. ii. aluminiſ quo in  
 ſtiores coriorum utuntur drac. ii. auripigmenti drac.  
 iiii. chalcididis crudæ drac. iiii. ſandarachæ drac. iiii.  
 gypſi loti drach. iiii. caldis uiuæ drach. iiii. minijs ſino  
 pic ſeqꝫidrachmā, atramenti communis drach. ii.  
 diphrygis dr. ii. & dimidiā, ſpumæ argenti drach.  
 ii. & dimidiā, ochræ drach. ii. & dimidiā, atra  
 menti Indici drac. ii. & dimidiā, plumbi drac. iiii. ce  
 ruſæ ſeqꝫidrachmā, terræ ſamiæ drach. iiii. terræ ci  
 moliaæ drac. ii. pompholygis drachmas duas, ſucci  
 mandragoræ & plāginis quantum ad hæc ſuffice  
 rit. Coſpoſito quidē igitur paſtilli hæc eſt, in qua  
 torus ille ſimplicium pharmacorū cumulus, ex quin  
 quaginta quinque rebus conſtat, præter herbarij ex  
 aqua decoctionem, quæ ad huius paſtilli ſubſtatio  
 nem accommodatur. Cæterum apparandi modus  
 huiusmodi eſt. In pilam thebaicam primum æs, &  
 æris ſquamam, & ſpumam argenti, calcem, lapidem  
 gagaten, corallium, rubiginem ferri coniecto: oſtrea  
 etiam conuſa & cribrata probē & continēt teratur,  
 donec in puluillū redigantur: deinde adiecta chalcidi  
 de, ſandaracha, auripigmento, cornu ceruino, oliua  
 rumqꝫ ac palmarum oſſiculis, ſpongiæqꝫ & alumini  
 ſis, rurius terito, aſſuſis etiam ſpiſſamentis, quæ ſtym  
 mata Greci appellant. Alumē autem hoc modo urſa  
 tur. Alumen in ollulam nouam coniectū ſuper pru  
 nas ponito, & ubi diffunditur ac liqueſcit tollito, &  
 frigeſieri ſinito, & hoc modo tritum adiecto. His  
 deinde tritis, minium, diphryges, atramentum indis

cum & cōmune, ochran, plumbum, terram ſamiā, ci  
 moliam, ceruſam, pompholygem, reliquaꝫ omnia  
 metallica addito, & contentiſſimē ſub caniculæ æſtu  
 conterito, donec ex ſpiſſamentis quātam aut quin  
 tam addideris partem. Poſtquam uerō quodam mo  
 do ad collyrij formam fuerit redactum, arida conti  
 ſa & arctiſſimo cribro excuſſa adiecto, ueteribus ſo  
 leis ſimul cum aridis conſuſis: deinde additis ſpiſſa  
 mentis rurius ſimiliter ut priora terito, ſæpe inſtilla  
 tis ſpiſſamētis. Vbi autem trita inauerint, in altero  
 mortario primum erocum cum duobus ſuccis, man  
 dragorē uidelicet & plantaginis, terito: quod ubi tri  
 tum fuerit, reliqua adiecto, myrrhā ſcilicet & thus,  
 omphaciam, acaciam, hypocithidem, gummi, ly  
 cium, opium, piceam, bitumen, & lentum ſarinam,  
 quodlibet eorum prius per ſe aridum in tenuiſſimū  
 puluerem redactum. Cæterum ubi optimē in mor  
 tario fuerint trita, duobus ſuccis largē aſſuſis, quo  
 etiam ad aliorum exceptionem ſufficient: de cætero  
 ſiam antē trita metallica ſic arida terito ac admixcto:  
 omnibusqꝫ probē permixtis ac ſubactis, paſtillos  
 ad duarum magnarum ſabarum magnitudinem for  
 mato, & uitior aliquando quidem cum oryzæ ſuc  
 co, aliquando uerō cum uino, aut aliquo conuenien  
 te liquore. Ego uerō ob mandragoræ uiridis ſucci  
 inopiam, aridi ſucci drachmas quatuor addo. Porro  
 ſpiſſamenta cum quibus paſtillum conteris, hoc mo  
 do apparato. Rubi, myrrū, ſlorum mali punici, radi  
 cis ſymphyti, radicis capparidis, ſoliorum ſalcicis, co  
 mæ cupreſis, omnium æquales partes cum aqua co  
 quito, & uitior. In his ipſis uerō ſpiſſamentis, aut  
 etiam alijs, ſpongiam aut glomos rigato, cumqꝫ eis  
 ſedem foueto, aſſidue quidem, maxime uerō à pa  
 ſtilli inſuſione. Siccum dyſentericum. Terræ lem  
 niæ quæ ſphragis appellatur, terræ aſteris, amyli,  
 gummi, thuris, æquales partes omnium in puluillū  
 redactas, cochlearij meſura inſundito, ſpiſſamentis  
 etiam quibuſdam adiectis. Indus autem Medicus  
 hoc uitior. Terræ lemnis quæ ſphragis, buccinorum  
 uſtorum, thuris, ſingulorum æquales partes commi  
 ſce, indeqꝫ cochlearia duo cum lotini corticis deco  
 cto, aut pinus, aut meſpili, inſundito. Quæ dyſen  
 tericis ſubdantur. Glans quæ dyſentericis ſubditur,  
 Theoſebij. Opij drachmas xi. myrrhæ, caſtorij,  
 croci, thuris, hypocithidis, cuiuſqꝫ drachmas ſex,  
 ſtyracis drachmas tres, uino excipito. Alia glans,  
 ſive collyrium. Opij, croci, myrrhæ, aluminiſ ſciſi  
 ſilis, ſingulorum æquale pondus cū uino ueteri ſube  
 ige, & collyria drachmæ unius pondere informa,  
 quorum uſu & ſubſtitione diuinam efficaciam ad  
 miraberis. Optimē facit & ad dyſentericos opoba  
 ſamum tomento exceptum & ſubditum. Spiſſa  
 menta, quæ dyſentericis cataplaſmatis uice imponū  
 tur. Florum mali punici, gallarum, malicorij, myr  
 ti ſiccæ, leiſci, mannae, acaciæ ſiccæ, æquales omniū  
 partes in puluerem redigito: quem ſiccum adſeruato  
 ac uitior, ſic ut uſu expetente cū uino decoctum im  
 ponas: magis uerō mitigatorium fiet, ſi ſapa pro ui  
 no accipiat. Illitio, ad coeliacos & dyſentericos.  
 Acaciæ quadrantem, gallæ, cenanthes, malicorij,  
 balauſtiorum, aloës, ſucci hypocithidis, maſtiches,  
 aluminiſ rotundi, omphacij, ſingulorum unciam  
 unam, cum uino ſubigito, ac formato paſtillos: qui  
 bus cum uino aut ſucco aliquo conuenienti utaris.

*Epithemata dysenterica.*

Cap. I.

Epithema dysentericis commodum, Marciani. Ma-  
la cotonea repurgata decem, in uino decoquito, dissil-  
gentes terito, ac tritis aloës unciā unā, manne  
sextantē, myrrhæ siccæ trite quadrantē infarcto, de  
inde ceræ sexuncē, unguētū nardini librā unā addito.  
Ceratū ipsū liquefacto, & refrigerato, tritisq;  
adijcto, ac uitō. Epithema ex cenāthe, Philume-  
ni, stomachidis, & coeliacis dysentericisq; in princi-  
pijs commodū. Onāthæ siccæ drachmas x. viii. gal-  
læ, acaciæ, rosarū siccarū, omphaciū, singulorū uncā  
unā, aluminis rotundi sextantē, aloës sextantē, rhois sy-  
riaci trimentē, olei myrtē librā unā, ceræ librā i. picis  
li. i. Quidā uero singulorū libras duas accipiūt. Ari-  
da uino ueteri adstringētē rigato, deinde liquefibi-  
lia adijcto, ac simul emollita excipito. Efficaciter au-  
xiliatur ad interaneorū fluxiones, & stomachi fasti-  
dia ac exolutiones, & ardores. Aliud, per multā ex-  
perientia. Rosarū, cenāthes, acaciæ, gallæ, aluminis  
scissilij librā unā, ceræ, picis, olei myrtē, cuiusque li-  
brā unā, uini quantū sufficit. Epithema ex lixiuio.

Ammoniaci thymiamatis, nardi celdici, croci, car-  
damomi, bdelij, cyperorū, singulorū uncā i. lixiuū  
ex cinere lignorū uitis selquisiūciā, ceræ quadrantē,  
unguētū nardini sexuncē, uini quātū sufficerit. Appa-  
ratur autē & hoc modo. Croci uncā i. aloës quadra-  
tem, styracis quadrantē, ceræ sextantē, lixiuū ex ci-  
nere lignorū uitis, unguētū nardini, cuiusque uncias  
x. i. uini quod satis est. Illud superius appaui, &  
præ cenāthes inopia, fossia uitis conseci, in estate qui-  
dē uisidia, in hyeme uero eiusdem uirgulta, reliquis  
siccis, cōtūsis & cribratis. Epithema, Clidiō appel-  
latū. Cyllisi. Acaciæ, gallarū, thuris, aluminis scissi-  
lis, aloës, rhois culinarij, hypocisthidis, myrrhæ, ba-  
laustiorū, cenāthes, rosarū siccarū, singulorū uncā  
unā, ceræ dodrantem, picis, olei myrtē, cuiusq; do-  
drantē, uini spathicæ quantū satis est. Ex libris Phi-  
lumeni, epithema Mnaseq; clidiō appellatū, ad coelia-  
cos & dysentericos. Gallæ omphaciū, succi hypo-  
cisthidis, aluminis rotundi, acaciæ, rhois rubri, mali-  
corij aridi, seminis apij, singulorū uncā i. uisci quer-  
cini drachmas quatuor, ammoniaci thymiamatis  
drach. iiii. picis siccæ drachmas xx. ceræ drachmas  
viii. olei myrtē aut lenisicini drac. xx. gallas & ma-  
licorū cōtusa ac cribrata in uini cyathis nouē deco-  
quito, assidue agitando, donec tertia pars relinqua-  
tur; deinde in mortariū cōiecta terito, ac reliqua si-  
militer in puluē redacta inspergito: ammoniacū uero  
aceto diluito, & uiscum cū modico oleo emol-  
lito, picē uero ac cerā liquefactis cū residuo oleo, &  
ab igne ablatis, uiscū adijcto, ac unito, & simul tri-  
tis affundito, fortiterq; contundito, ac uitō. An-  
dromachi epithema, ad dysentericos & coeliacos.

Seminis hyoscyami albi, seminis apij, cuiusque  
drach. iiii. anisi, floris rosarum, succi hypocisthidis,  
balaustiorū, rhois rubri, cuiusq; drach. ii. opij drachmā  
unā, croci drachmam i. contere, ac uino myrtē ex-  
cipe, informaq; pastillos, quos in umbra siccabis:  
usus uero epōre, ex eis quantū suffecerit contundes  
ac cribrabis, & subiges, linteoloq; infarū uentri im-  
pones. Dropaces. Dropax ex tertio libro plac-  
torum Sorani. Resinē librā i. picis siccæ lib. i. nitri,  
bituminis, sulphuris uiui, cuiusq; libras ii. pyretri li-

bras ii. uetrāi sextantē, olei heminā unā. Si ue-  
ro efficacius reddere uelis, adijce & piperis tricentē,  
adacæ sextantē, staphidis syluestris sextantē.

Alius dropax. Pids sexuncē, resinæ pinus tor-  
resaciæ sexuncē, myrrhæ, sulphuris uiui, nitri, cu-  
iusque uncā unā, pyretri quadrantē, adacæ  
uncā unā, euphorbij sextantē, aliq; drachmas  
duas tantum habent, adipis taurini sexuncē. Vten-  
dum autem & ad hæc rubefacientib; cutem, phoe-  
nigmis à Græcis appellatis, itemq; sinapisinis, in  
tertio Sermone descriptis, in declinatione præse-  
rim dysentericæ, quo totum malum penitus de-  
struatur.

De lienteria, seu intestinorum leuore. Cap. ii.

Lienteria, quemadmodū ipsū nomen indicat, leuor  
quispiam intestinorum est, qualis etiam forinsecus  
in corporis cuticula, & ex cicatrice contingere so-  
let. Oboritur autem frequenter, dysenteria magna  
præcedente, & ex profunda ulceratione, cicatrice  
densa & leui succedente, quæ deinde ob densitatem  
quidam suam, ciborū per corpus digestionem fieri  
non permittit, quum factæ uenarum ora sint ueluti  
obtura: uenarum inquam, quæ alimentum ex in-  
testinis ad fe aeuallunt. Ob leuorem uero, cibū statim  
prius quā permutationem & perfectam cōcoctio-  
nem admittat, dilabi sinit. Cæterū lienteria ipsa pro-  
prie ex permutatis cibos ac digerentis facultatis de-  
bilitate contingit, cuius signum est, quod cibi crudi  
& nihil immutati excernuntur, quæ ratio & ex hoc  
amplius corroboratur, quod non solum à dysente-  
ria hæc affectio oboritur, sed & post frequentia uol-  
uolosa tormina, & post longum profluuium uen-  
tristaliquando etiam aqua inter cūrem per uentrem  
euacuatā, lienteria consequi solet. Ex quactiq; igitur  
causa lienteria orta sit, ægri cibum nō sentiūt, & ma-  
lum corporis habitū acquirunt, quod urunque ma-  
lum incorrigibile existit. Succedit enim ægris asidu-  
a excrementa cruda, colore subalbida, inæqualis, &  
aquosissima, citra sanguinis ac bilis complexum.  
Adest autem simul & ardor per tota præcordia se-  
dilatans, quem cibi fastidium concomitant. Vide-  
tur autem bonum & amicum signum in eis rictus  
addus esse. Indicat enim tucundū quippiam factum  
esse, & uentrem ac intestina nō uelut inanitia cibum,  
sinere pertransire. Itaq; quum eiusmodi sit affectio,  
facile est intelligere, quod uim retentiuam, ac con-  
coctoriā facultatem tum uentris, tum intestinorū,  
omni modo refocillare oportet, quod sanē  
per ciborum conuenientium exhibitionem fieri po-  
test, perq; diætā restituentis ac refocillandis uti-  
ribus aptam, & ut simpliciter loquar, eodem me-  
dicationis ductu utendum est, quem ad coeliacos  
& dysentericos habes præscriptum. Cæterū quod  
dignum indicatione hic uisum est nobis: acrim-  
rerum comestiones frequentiores eis aptæ existunt,  
& maxime quibus cicatricem factam esse consecuta-  
mus: acrim enim rerū comestio uelut refractionē  
quandam cicatricum operatur, quin & insitum calo-  
rē reuulsit, & concoquendū facultatem quodāmo-  
do refocillat. Porro uomitus à cena uentrē etiā in-  
melius transmutat, & actionis sue cōmonefactum;  
frequentes quoque dropacæ admoitiones ad manus  
ac crura, thoracemq; & uentrem, itemq; rubefaciēda  
ex malagmatibus & ex sinapi eis commodæ existunt.

Potiones



Potiones etiam quasdam ad dysenteriacos & cœlia eos præscriptas lientericis præpotandas exhibere cõuenit, quale & hoc catapodium existit. Catapotium dysentericum, maxime uero lientericis conueniens. Malicorij, myrrhæ, ciususcq; drachmas octo, alumi

nis scissilis drachmas quatuor, succi hypocistii = dis drachmas quatuor, cum aqua catapodia ad erui magnitudinem ex his formato, indeq; quinq; aut seprem iuxta ægri vires exhibito.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN DECIMO SERMONE AETII CONTINENTVR.

**D**E debilitate iocinoris, & his quibus sanguis per uentrem defertur. caput I.

De oppilatione hepatis. cap. II.

De hepatis inflammatione. cap. III.

De hepatis abscessu. cap. IIII.

Cura hepatis exulcerati. cap. V.

De hepate in scirrhum indurato. ca. VI.

De lienis affectionibus cognoscendis: ex libris Philagrii. cap. VII.

Intemperiei splenis cura. cap. VIII.

De inflatione splenis. cap. IX.

De splenis inflammatione. cap. X.

Cura splenis in scirrhum indurati. cap. XI.

De splenicorum uestione. cap. XII.

Splenicorum dieta. cap. XIII.

Cura eorum in quibus splen, frigida, uenter uero calida affectione laborat. cap. XIII.

Cura splenicorum quos tussis infestat. cap. XV.

Cura eorum quibus splen in magnitudinem excreuit, simulq; durus est. cap. XVI.

De ictero seu morbo arguato. ca. XVII.

Cura arguati. cap. XVIII.

De malo corporis habitu. cap. XIX.

De hydropse siue aqua inter cutem. cap. XX.

Ascite ac tympanitæ hydropis cura. cap. XXI.

Epithemata hydropica. cap. XXII.

Malagmata quæ euacuant humorem.

cap. XXIII.

Epithemata quæ post euacuatos humores adhibita, pro glutino sunt. cap. XXIIII.

Aquam ducentia remedia, hydropicis ualde commoda. cap. XXV.

Quæ ad ciendam urinam hydropicis bibuntur. cap. XXVI.

Cura post euacuationes. cap. XXVII.

Cura hydropis qui propriè subtercus appellatur. cap. XXVIII.

Cataplasmata ex lib. Asclep. ca. XXIX.

Chirurgia hydropis subter cutem. cap. XXX.

Reliqua predictorum cura. ca. XXXI.

Communis dieta omnium hydropicorum. cap. XXXII.

## AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE EXVE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-  
BIBLI SIVE QUATERNIONIS  
TERTII SERMO SECVNDVS ET EX  
ORDINE DECIMVS.

De dispositionibus iocinoris ac lienis, eorūdemq; affectionibus.

De debilitate iocinoris, & his quibus sanguis per uentrem defertur: Galeni. Cap. I.



**I**NTEMPERIES quidē causæ sunt, ex quibus iocinoris debilitas producit, dispositio nes autē diuersas in ipso faciūt: quū enim circa inflammationem aut scirrhum circa hepar, propter solā debilitatem, sanguinis effluxio cōtingit, tūc sanē propriè hepaticos ipsos egros appellat, quemadmodū coeliacos & stomachicos uocare cōsueuerūt, eos qui neque inflammationē, neque aliquē aliū præter naturā tumorem in uisceribus habēt. Calidē itaque intēperies, tū eos qui prius adsunt humores, tū etiam hos qui per uenas mesenterij ad ipsum hepar deferuntur, adasunt ac cōburiūt. Frigidē uero intēperies, humorē, qui iā in ipso cōtinetur, crassum & lēuē egrety mobilē reddūt: eū uero qui defertur, pituitosum ac crudū & semicoctū. Ceterū sicca intēperies, sictores & desiores humores facit. Humida autē tenuiores & magis aquosos. Itaq; ubi calida intēperies circa hepar cōstitit, colliquationes fiūt, primū quidē humorū, deinde etiā carnosē ipsius hepatis substantiæ, bilisq; per utrē euacuat, fortens ac crassa, abundeq; colorata, uelut in pestilentibus febribus fieri solet. Vbi uero frigida intēperies assue-

rit, neq; assidue excretionēs, neq; multæ fiūt. Diuturnū autem sic malū, & per dies aliquot acuatim eis profluet utrē: ceterū egesta nō similē putorē habent his quæ per calorē sunt colliquata, neq; colorē etiā, neq; cōpagē, sed specē præ se ferūt sanguinis putrescētī & in grumos congelati: & si quis diligēter inspiciat, uelut limus & sex sunt sanguinis crassioris: cōfī milla enim atræ bili colore apparēt, quin & plures & iudicatu difficiles colores iuxta eandē dispositiō nē in extremētis apparēt. In sicciore autē intēperie, recrementa adhuc sicciōra uidebuntur, egriq; magis sitiēt. In humida uero, humidiora, & plura erūt recremēta, sicutq; minus infestat. Quādoctūq; igitur egesta uideris loturę carnis recēs mastrati animalis similia, uelut si quis cum aqua sanguinem confudisset, certissimum signum debilitatis ipsius hepatis habebis: eodem modo, si uelut fecem sanguinis conspexeris per sedem excretam, hepaticum & horce signum esse scito. Si igitur sanguis tenuis & serosus destillat, ægri uisceris signum iudicatio: sin uero uelut sex fuerit, supercalescētī & sanguinem superassantis: incipit enim aliquando etiam citra febrem in frigida scilicet intemperie ipsa adfectio, quo tempore tenuis sanguinis serum prius excernitur: temporis autem progressū, corrupto circa uiscus sanguine, leues febres accedunt, quarum

quarum quum inexpecti medici negligentes sint, atq; ægrum omnino febrī carere putant, quum nihil per uentrem excretum sit, ipsū ægrum lauante, conceduntq; negligentiōri diætā uti, atq; ita uenter rursus corruptum sanguinem ex cernit. In huiusmodi igitur affectionibus primus curationis scopus sit, ut intemperiem ad contrarium deducamus. Calidā enim dispositionem semper refrigerare oportet, frigidam uero calefacere, similiterq; humidam resiccare, & siccam humectare. Cæterum omnibus hepaticis remedijs, tum quæ per os sumuntur, tum quæ foris insecus imponuntur, aliquid ex adstringentibus ammiscere oportet, quod firmitas uiscerū cōseruetur. Atq; in stomachicis idem facere non similiter cōducit, quum in ipsis adstrictoria qualitas aliās domine tur. Fomenta igitur in hepatis debilitate cōuenientia ex oleo fiunt, in calida quidē affectione, ex chamæmelino, rosaceo, & lentiscio, absinthio, aut palmis, aut aliquo alto consimili in oleo decoctis. In frigida uero dispositione, ex unguento nardino, cui thus & samfucus sint infarsa. In humida autē intemperie, ijdem oleis magis discutientia ac resiccantia incoquenda: uelut est iris, cuminum, ac ruta. In sicca demum intemperie, balnea sufficiunt dulciū aquarū, & humectans diætā cōmoda erit, cerata etiam atq; epithemata formēis similia sint, ex palmis scilicet, malis cotoneis, styrace, mastiche, ac aloē: in frigidioribus etiā polyartha conducunt, similiterq; in humidioribus. Porro in potu uti conueniet plerisq; eorum quæ in hepatis inflammatione sunt relata, si quidē calida intemperies fuerit: uelut est feridis ac intybi succus, fenicionis succus aut decoctū, perdicij succus, mel rosarū, & quæ his similia existunt: quin & Philonis antidotus semel tantū exhibita, omnē aliquādo calidā hepatis intemperie mirabiliter sanauit, quod etiam Philo de ea testatum reliquit. Vbi uero frigida in hepate intemperis fuerit, calefactiōibus ac firmitatem addentibus utendū est, uelut est nardi spica, capnium, quæ & chelidonia herba circa sepes enata, semen pelecini, & quæ his similia existunt. Vtilissimū & his nardi semini uigentū, quotidie mane cochlearij mensura ieiunis potatū, & à cena ante somnum eodē modo. In humida autē intemperie, simpliciora ex eis quæ ab oppilatione liberāt, exhibenda, & quæ à proprietate totius substantiæ efficacia existunt, uelut est, lupi nū hepar, quod sanē diligenter tritū drachmæ unius pōdere cum uino dulci aqua calida diluto præbetur. Hoc enim multiplici experimento cognitum omnibus hepatis intemperiebus cōmodum existit: ut potestate proprietate totius substantiæ hanc efficaciam habens, non calefaciendo, aut refrigerando.

De oppilatione hepatis, in quibus plurima remedia.

Cap. II.

A flatibus nebulosis & cōcoctū difficilibus: aliquādo autem & à crasis humoribus uiscosissq; in finibus uenarū ex sima hepatis parte enatarum, per quas ex uentre ac intestinis alimentū digestio ad hepar cōtingit, oppilationes fiunt. Cōsequitur autē ad ipsas, grauitatis circa dextrū ilium cum dolore sensus, aliquādo quidem obtuse, aliquando uero uehementis, & quandoq; quidem absq; febre, quandoq; cum febre. Crassa enim & uiscola ac multa, omnino amplius reliquis oppilat, & maxime si ægri à cibo uehementiori motu utantur: si uero acris sint & multa quæ

in cibo sumuntur, dolor ex oppilationē uehementior sit, quū obturata corpora simul & tensionē perferāt, simulq; pūgātur. Cæterū quū uaporosū & crassi flatus multitudo coaceruetur, quæ exiit nō habet, non grauitatis solum, sed & distensionis sensus oboritur. Quare attenuantiū & oppilationem dissoluentium quāmcelserrimus requiritur usus: oppilatio enim in ueterata nō tantū in hepate, sed in omni membro putrefactionē operatur, febrēq; accendit. Præclare autē & citra molestiā ab oppilationē liberat, simulq; firmitatē uti hepar, tū stomacho addit, pelecini qui in frumētis nascitur semē, tritū cochlearij mēsurā, cum uino aut aqua mulla in potu acceptū. capnū item, quod & chelidonia nomen inuenit, succo eius expresso & desiccato: reponitur autē is in pastillos redactus, & semel quidem exhibitus dolorē omnē admittere aut præbitus, in totum ab affectione liberat, ultra hoc quod & firmitatem uiscerū addit: decoctū quoq; huius herbæ potatū similē efficaciam habet, etiā si ualde febricitant ægri: aliquando autem herba ipsa exiccatur, cōtusq; & cribrata cochlearij mensura exhibetur. Aliud. Lupi hepar siccum drachmæ pondere, cum piperis granis 1x. ac myrrhē magnitudine fabæ, in passo calido datum, cōsestium auxilium. Aestatis autē tempore, alternis diebus, ter potandum præbeto. Liberat ab oppilationē etiam eupatorium, simulq; firmitatem addit, similiter quoq; stœchas, tum coctā, tum siccā tritaq; data: plantaginis scilicet radix, & semen, foliaq; sicca trita, siue per se unum quodq; siue simul exhibeantur. Lauri cortex trius potatus, spica nardi, fructus pistacij, amygdalæ amaræ, anthemisi siue chamæmelum, anagallidis quæ ceteruleum florē habet, succus, radices acori, eryngij, radices dulcis decoctū urinam ciet, & aluū emollit. Radix dracunculi uiscera omnia repurgat, crassosq; & instar uisci tenaces attenuat humores. Filicis succus cochlearij mensura ex aqua mulla potatus, hepar repurgat, oraq; meatuum ac uenarum aperit, citra manifestā calefactionē. Præscriptū autem ita antē est de his quæ tum simas, tum gibbolas hepatis partes ab oppilationē uendunt, in tertio nimirum Sermone.

Catapodium hepatis oppilationem remouens.

Radices chamæpityos drachmas 1111, radices cichorii dra. 1111, cōiuncto, ac melle cocto excipito, nucisq; ponticæ magnitudine præbeto: aquæ etiam calidæ cyathos tres ab eius exhibitione absorbendos dato. Cæterū non modo radices horū hepaticis optinentur, sed & succus & decoctum. Pastillus hepaticus, ex amygdalis amaris. Seminis anisi, apij, asari, amygdalarum amararū decorricatarū, comæ asinthij, singulorum drach. 1111, apparato, & tū aqua pastillos formato, ex quibus drach. 11 febre carentibus cum uini diluti cyathis 1111, præbeto: febricitantibus autem, cum aqua mulla. Urinam ciet, & placidē calefacit. Aliud hepaticum ualde commodum, Seminis pelecini, capnij, cosij, cuiuscq; drac. v. cōiuncto ac cribrato, & cochleare 1. ex aqua mulla dato. Præclare enim summouet oppilationem. Aliud hepaticum pulchrum, cuius uisum ne contemnas,

Lenticulam torrefactam ac probe tritā cochlearij mensura ex uino bibendam præbe. Commodum est hoc & lienī, ex posca, aut aceto mullo. Aliud, experimento constans. Comæ absinthij, piperis, costi, calsiæ, radices genianæ, amygdalarū amararū, singulorum

singulorum unc. i. fœni græci sextantem, seminis peledini sextantem. Exhibeto cochlearium quomodo-  
cunque uelis. Aliud, ad hepatitis oppilationem.

Cacani scrupulos duos, alij octo habet, costi scrupulos sex, spicæ nardi, iridis, phylli, lupinorū siccorum, baccarum lauri, fœni græci, rhei pontici, singulorum scrupulos sex, piperis, phu, asari, cuiusq; drachmas quatuor. quod si pidis siccæ scrupulos tres ammisueris, efficacius operatur. Aliud simplicius, quo assidue utimur, ualde admirandum. Cacani sextantem, fœni græci sesquandam, piperis uncā unam, cyperi uncā unam, costi uncā unam: contundito & cribrato, ac cochlearium unum cum condito præbeto. decumbat autem æger super affectam partem. Aliud. Potamogetonis siccī drach. ii. comæ absinthij drachm. i. croci, costi, spicæ nardi, cuiusq; drachmas duas, amomi drachmam i. idur cochlearij mensura aridum. Aliud. Piperis drac. iiii. docadiadis herbar, quæ & musci appellatorem habet unc. i. costi tridentem, alij drach. iiii. contundito, cribrato, & cochlearium in potu exhibeto.

Aliud Philagrij. Rhei pontici unc. i. castorij scrupulos tres, farinæ lupini scrupulos iiii. piperis grana vii. contundito, cribrato, & mane cochleariū unum præbeto ex condito.

De hepatitis inflammatione, & cognoscendo utrū hepar,

an musculi eius sint inflammati. Cap. iiii.

Galeni. Hepar consimiliter ut splen & inflammatur & abscessu purpuratur, uerum raro scirrhus, hoc est, abscessu duro afficitur. Inflammato itaq; hepate, dexteri ilij tumor consequitur, & maximè si gibbosa parte inflammati fuerit, facilius per tactū cognoscitur tumor, grauitasq; coincidit illum totum distrahens, & dolor in dextram usq; clauiculam ac scapulam pertingit, ut conuelli penitus æger uideatur: linguæ color in principio quidem rubicundior fit, postea uero denigrescit: appetitus deiectio, fastidium, cibi uerhemens, & implacabilis sitis: uomitus quibusdā constringibilis puræ atq; etiā uiscellinæ, post autē & æruginosæ: alius autē ipsius est adstricta, nisi sanè cum uisceris debilitate inflammatio est oborta, febris autē acuta, inæqualis, quæ plerunq; ad uesperam & noctē exacerbatur: sequitur & spiradi difficultas, uisciculæ parue, ut plurimū siccæ, per quas nihil omnino reieciatur. Aliquando autē per uomitus biliosa pauca quædā reieciuntur, quæ res perosas; decepti, qui ex pleuritide hanc educationem fieri putauerunt. Cæterū & costæ nothæ ut plurimum cōdoliunt, & color corporis subueritur in arqui morbi specē permutatus: singultus quoque consequuntur. Accelsionis autem tempore quidam delirio apprehenduntur, & acie lotū excernunt; & sanè inflammationes quæ iuxta sinā hepatis paritē cōtingunt, plus fastidij, & nausæ, & uomitus biliosos, ac uehemētē sinū inducunt: quæ uero in gibba parte fiunt, dolores circa respirationem intendunt, uisciculasq; irritat, clauiculamq; magis cum dolore conuellunt. Quandoquidē autem musculis hepatis incumbētib; inflammationis, quidā decepti hepatis eam inflammationē esse suspiciantur, necessarium fuerit distinguere inter se has affectiones. Hepar etenim inflammato, tumor secundū lineamenta rotundus, figura uidelicet ipsius hepatis, succumbit, quiq; ad corporis decubitus similit conformatur: maior enim apparet corpore ad

sinistram latus reclinato: minor autem rursus ad dextrum deuoluto: nimirum hepate sub nothas costas cedente, neq; uisui, neq; tactui similiter succumbente, amplius autem in hepatis inflammatione, incumbens cuticula, naturali modo habere conspicitur, musculis autem inflammatis, cutis circūtentur, ut si quis digitis apprehensam attrahere uelit, ea minime sequatur. Propriissimè autē tactus discernet siue in alto, siue in superficie inflammatio ipsa cōsistat. Porro hepate inflammato, sanguinis detractionem expeiri oportet a cubito, si nihil id fieri præpediat. Incidenda autem in dextro cubito uena interna, ita ut substratam arteriam obseruemus, quæ si non appareat, media: si uero neq; ipsa appareat, superior. Multitudinem autem extrahendi sanguinis, ex corporis reperies qualitate, ætateq; & natura, horaq; temporis, ac regione, ampliusq; ex uiribus ægri: quæ si id ferre queant, semel quantum satis est, detrahendum, si uero nō, per uices paritum. Cæterum incisio ipsa oportune in prima & secunda die contingit: si uero urgeant dolores, & adsint uires: etiā septima uenę incisionem facimus, quæ facta post modicum intervalum, simpliciter clyssere euacuamus, maximè si non sponte egerat alius. Sequenti autē uenę sectione die, curbitur cum scarificatione affigendæ, rursumq; post unam diem curbitur apponenda: non pauci enim à secunda eorum adhibitione opem senferunt magis quàm à priore. At uero ante uenę incisionē & post eam, fomentis utendum est ex lanis succidis oleo imbutis, & impositis: cōuenit & ex passo cretico fomentū cum rosaceo aut lentiscino aut melino aut cœnanthino. Optimū autē fomentū hocce est. Chamemeli, anethi humidij, si adest, rugæ uiridis, seminis lini, cuiusq; unc. i. calicū papaueris numero x. olei sextariū i. semen lini contusum in lincolo colligato, & cum alijs in cacabum coniectū ad prunas decoquito donec uires suas distribuat, deinde olla in seruētū cinere collocata, ex ea multo tēpore cōfidenter foueto, post fomentorū irrigationes cataplasmatis uti oportet, ex semine lini & fœni græci, farinæq; hordeaceæ aut triticæ, his uel omnibus uel uno aliquo ex eis, aut quibusdā in aqua mulla decoctis, ammiscedū etiā absinthiū & masticæ ac melilotū. Quod si uehementior sit ardor, etiam ea quæ astringunt sunt ammisceda, uelut sunt mala cotonea. Oleum uero quod additur rosaceū sit, aut melinū, aut lentiscinū. Si uero feruor adhuc perseueret, cotonea mala cum polstia imponenda. Remittente autē uehemētī calore fucus optimus & althææ radicē decoquito, & decocto eorum semen lini, farinasq; hordei, fœni græci, ac lolij insarcito: quod si durior inflammatio succumbat, etiā chamæleonem aut chamæpityn, aut posilum, aut asarū, aut daucum, & yngijq; tū semē, tum radicē ammisce re oportet, aliquando autem & fucus cum althæa decoctus ac trita cataplasmati cōnectuntur. Cæterum calidius & magis emolliens reddideris carapasma, si terebinthinæ, aut resinæ pinus, aut picis quadransem addas. Brasicæ autem crudæ folia cum melle trita ac imposita, omnes induratas inflammationes dissoluūt. Hinc ad cerata trāsundū ex oleo cyprino aut glaucino apparata, alihææ radicibus simul admixtis. Utendum etiam ex palmis cerato, hepatis inflammationibus summè accommodato, maximè si stomachus per consensum simul sit affectus, & costæ coaffictæ.

coaffictæ. Habet autem hoc modo. Palmas interio-  
re medulla exempta, diligenter contundito, ac cum  
pari cerato rosaceo in mortario probè committito, ac  
unito, assuloq; modico oleo rosaceo imposito. Aut  
myrrhā in uino ueteri adstringente maceratam, pal-  
mis ammisceto, & panniculo uetis detritæ excepta  
imponito. A ceratis ad epithemata ex styrace, & ex  
meliloto, & ea quæ polyarchia appellantur, & tam  
antè ad colicos & stomachicos descripta sunt, tran-  
seundū. Compositio autem epithematis ex styrace,  
hec est. Styracis pinguis, carnis palmarum, costi, ma-  
stiches, calsiæ, singulorum trientem, sampluci sextā  
tem, croci semundam, uuæ passæ semunciā, ceræ sexa-  
uncem, unguenti nardini bellem. Porro in inflāma  
tione hepatis ubi magni circumstent dolores, etiā  
pharmaca dolorem leuantia in potu eis exhibere cō-  
uenit, ita tamen ut assiduū eorum usum deuite-  
mus: simplicibus autem potionibus frequendus utē-  
dum: senecionis itaque decoctum itaqum maximè  
commodum, aut fucci radicis dulcis obolos duos  
cum aqua calida exhibito. Aliud. Picridis seridis,  
aut inrybi fucci cyathum unum cum aquæ calidæ  
cyathis tribus præbeto, mellis etiā cochlearijs duo-  
bus assulis. Ad hoc enim quod refrigerat, ac firma-  
tem uisceri addit, etiā ora uenarum hepatis repur-  
gat, neq; tamen frigidas intemperies magnopere læ-  
dit. Potest autem seridum ac inryborum substantia  
hepati commodare, tum si sine humorum, aut ferosi  
ac utitū sanguinis complexu, intemperies in ipso  
fiat, tum si humiditatis eufusum; tandem adsit cū  
intemperie cōplexus: mellis uero ammixtio humi-  
ditatem per urinā excludit. Quapropter etiā exic-  
cata ac contusa utiliter potui inperguntur, eorum  
quoq; decoctum potatum magnam commoditatē  
prebet. Quodd si nō infestet calida aliqua intēperies,  
sed oburatione tantum uiscus ipsum uexetur, ex ui-  
no albo, tenui, ac uetusto, cum aliquo urinas ciente  
pharmaco, potata magnificè auxiliantur. Magni  
etiā pretij in hepatis inflammatione capni herbae,  
quæ etiā chelidonia appellatur, succus habetur aut  
eius decoctū. Auxiliatur & præscriptus ex amygda-  
lis amaris pastillus, nisi penitus magna caliditas ad-  
sit. Aliud. Cochlearum terrestrium carnem opti-  
mè conterito, & uini nigri cyathos tres affundito,  
calefacto, ac bibendum præbeto. Cæterum hæc iux-  
ta omnem suam substantiam efficacia existunt, qua-  
le est hepar lupini, cuius rei magnum periculum fe-  
cimus, inquit Galenus, usus autem eius idem qui co-  
chlearum existit: optimè enim conteritur, & drach.  
i. cum uino aliquo dulci præbetur. Hæc enim phar-  
maca omnibus hepatis intemperiebus conuenire ui-  
dentur, quum neq; calidas neque frigidas intempe-  
ries lædant: febrientibus tamen lupi hepar melius ex  
aqua, aut seridis succo, aut aliquo consimili exhibe-  
tur. Epithema ex styrace. Costi unc. i. croci, thu-  
ris, aloës, ammoniaci thymiamatis, mastiches, styra-  
cis flauis, spicæ nardi, cuiuscq; drach. iiii. terebinthine  
unc. i. opobalsami drach. iiii. ceræ trientem. Vtere.

De hepatis abscessu: Archigenis. Cap. iiii.

Quodd si inflammatio ad permutationem apè se ha-  
beat, hoc est, principium permutationis ad suppura-  
tionē tam suscepti, omnes prædictæ de inflammatio-  
ne accessiones augebuntur: dolores (inquam) & fe-  
bres, & delirium, anxietas, desperatio, cibi fastidiū,

& displicentia maximè ab eius acceptance. A rigori-  
bus autem ferè in totum febriles accessiones initiū  
sumunt, præsertim si ad uesperam exacerbationes  
fiat. Adiuuare igitur permutationē ac puris eruptio-  
nem oportet, ut quàm celerrime fiat, ne maiora inde  
corpora corrumpantur, per uisum uidelicet cataplasma-  
tū ex semine lini, aut hordeacea & senci greci farina  
apparatorū, admixtis etiā resina, manna, pice, althææ  
radice, fercore colubino, fercore caprino, caridis, &  
quæ his similia existūt: fomentis autē utendū ex cru-  
da hordeacea farina, & spongijs decocto absinthij,  
abrotoni, ceteraurej, similibusq; imbuitis ac expressis:  
neq; uero incōueniēter emplastra quæ puris permu-  
tationē iuuare queunt, adhibētur. Quum autē perfe-  
cta suppuratio fuerit, dolores remittēt, omnesq; ac-  
cessiones mitiores apparebunt: cæterū rupturæ tēpo-  
re dolor rursum magis augefiet, quare etiā tunc ru-  
pturam adiuuare oportet, per cataplasmatum ad su-  
perficem atrahentium ac subadstringēdum usum,  
& per potiones alorificas: quales sunt quæ ex pipe-  
re & zingibere ac myrrha apparantur. Porro post  
eruptionē, aliquando quiddē per aluū, aliquando per  
urinas, puris transumptio contingit. Quidam etiā  
per os, puris educationem factam tradiderunt: uerum  
periculosior alijs per os transmissio existi-  
t: id uero quod excernitur nigrū est, iudicium & album repe-  
riatur, quod sanè salutare iudicatur. Aliquando au-  
tē humor qui ex abscessu promanat, inter pelliculā  
uentrē ac intestina amplectenti, peritonæon Græcis  
dictam, atq; ipsa intestina colligit: & facile sanè cu-  
ratur, si quis diducta cūssime cuticula humorem  
ipsum excludat, ea maxime parte qua tumor attollit-  
tur: aliquando autē rursus post factā isthæ collectio-  
nē, transumptio per intestina cōtingit. Ceterū in his  
quibus tumor foras prominet, sectionem obliquam  
supra inguē infligere oportet, ac per eā ipsam humo-  
rē euacuare, atq; etiā ulcus ipsum eluere, & pharma-  
ca liquefacta inijcere, donec perfecte curetur. Neq;  
uero negligendū, quo & hepatis post factā abscessus  
rupturā, remedia auxiliaria adhibeantur. Primum  
quiddē igitur emplastra emolliētia imponentur, dein  
de etiā resiccantia, quale est quod lcesum appella-  
tur, quoddq; ex salicibus constat, & quæ his similia exi-  
stūt. Si itaq; per urinas puris transumptio fiat, cōsimi-  
libus epithematibus utendū est circa totū ile, & iuxta  
pubē, & tū per cibos tū per pharmaca urinā ciente, re-  
purgatio eius adiuuanda. Pepones igitur in cibo eis  
conueniunt, & cucumeres costi, pastinacæ & sion.  
Ex pharmacis uero, meon & asarum, spica, calsia,  
dinamomum. Sunt & composita quæ huc pertinet,  
quorum compositiones paulo post dicemus. Per in-  
terualla autem etiā humores ipsos dulcorare opor-  
tet, uini scybelite, theri, ac protropi, similibusq; po-  
tu. Commoda est etiā ipsis potatio lactis. Si uero  
per sedem humoris transmissio contingat, epithema-  
ta quidem eiuldē materiæ approbamus: uerum pro-  
spiciendum est, ne alius cohibeatur, neq; etiā am-  
plius humefcetur: nam hoc ipsum tum per cibos, tū  
per pharmaca, ac epithemata fieri potest. Vt uinum au-  
tem & ad hos infusus per dycteres, quo intestina il-  
læsa conseruemus: ad quam rem pitanae, ac tragi, &  
oryzæ succi, appositi existunt. Quod si tamen per  
os puris educatio fiat, maximam ad hoc curam adhi-  
bere oportet, ut humores prius euacuentur: deinde

D cibis

cibus præbendus adstringens & stomacho gratus. Utendum & uino tenui & odoro. Venti uero epi themata ex palmis apparata, atq; ex cenanthe, ac eis similia imponenda, de quibus in stomachicorum ac dysentericorum tractatu est prædictum. Ad hepaticos. Folij malabathri, careophylli, spicæ nar di, costi, piperis, lupinorum siccorum, singulorum undā r. contundito, cribrato, ac scrupulos .iiii. præbeto cū uino. Aliud Philosophi hepatis, inquit, abscessus discutit. Radicis graminis decoctum his in die potarū, similiter & sceniculi radicū decoctū, & dauci. Myrrhā itē & picē sicā contundito ac cribrato, pillitoq; hepatis ex oleo cyprino inspersito & lanam puram oleo cyprino calido imbutā superponito, uehementer prodest hoc: utere confidenter.

*Cura hepatis exulcerati, Archigenis. Cap. v.*

Si exulceratio ex abscessu circa hepar relinquitur, aut illic ex acerbis humoribus ac erodentibus fiat, colligatio hæc adfectio appellata est. In his sane uenter cruenta, & putrefacta, ac saniosa excernitq; omnino consimilia ex hepatis ulceribus promanare solent, his quæ a mortuorum corporibus destillant: quare quidam inexpecti decepti, dysenteriam hanc affectionem esse putauerunt. Ructus autē foetidi consequuntur, & a dīborū acceptance grauitas præcordiorum: & pulsus eis est depressus ac densus, si uentis ægri amarulēti & iracundi: dolor circa locum sit ulcerosus, usq; ad clauiculam ipsam pertingens: multis autē una cū uentris recrementis etiā lotiū excernit saniosum sandarach colore: non parū uero frequēter ea quæ in urinis cōtinentur aquæ intercutē significationem portendunt. Cæterum omnīū periculosissima est hæc affectio, & modica omnino ægris est spes salutis: & tamen nihilominus aggredienda est eorū cura, cōsimilibus remedijs, eis quæ paulo antē dicta sunt, etiam his adhibitis, epithematisq; ex materia leniter adstringente, similibusq; fomentis. Liquoribus autē tum qui ad somētā, tum qui in cataplasmata adsumuntur, cortex pinus, palmisq; ac cyperi similiaq; sunt incoquenda, propriē autē ulcera repurgat lac scissile sepe acceptum: cui a liquidō parum mellis addere non ab re est. Post repurgatiōē distillate ad ea quæ carne replent festinandum. præstant autē id cibi moderati et boni succi, ac gestatiōes: quod si molestia id fieri pmittant, etiā exercitamenta conueniunt & uinum. Post cataplasmata uero, cerata et emplastra apta erunt, quorū sæpe in præcedentibus fecimus mentionem. Plurima præterea pharmaca quæ ulceribus cōueniunt, in potu sumuntur. Quale & hoc est, Andromachi ad hepaticos cōpositio, cyphoides appellata: quæ etiā ad omnia thoracis uitia cōducit. Vuarū passarū carnis drā. x. v. croci dr. i. calami indicī, dr. i. bdellij drā. i. et dimidiā, cinamomi drā. x. cassē drā. x. floris sicci odorati drā. ii. & dimidiā, myrrhæ drā. iiii. terebinthina drā. iiii. scobis aspalathi drā. ii. spicæ nardi drac. iiii. mellis drā. x. vini dulcis quātū sufficit. Adstringit mediocriter & resiccat ac discutit serosos ac uisidos humores, inquit Galenus, corrigē malitiam humorum & putrefactionē se opponit, intemperies sanat, extergit ac mundos facit, aperitq; meatus, cit urinam, atq; ea propter internas ulcerationes curare consuevit, & eos qui hepatici apellantur. Sunt autē hepatici propriē, qui ob hepatis

debilitatem per sedem cruenta liquidiora excernūt, quales sunt loturæ carniū animalium recens matatorum, quos ipsos ignarum uulgus dysentericos esse putat. Alia cyphoides Andromachifacit & ad tussis, & ad liquidorū per os reiectatones. Croci, cinamomi, mirrhæ, cuiusq; drā. i. bdellij drā. iiii. aspalathi obolos .iiii. floris sicci odorati drā. iiii. calami indicī drā. ii. cassiæ drā. i. spicæ nardi drā. i. terebinthina drā. x. vi. mellis heminā dimidiā, uuarū passarum pinguiū numero .c. lxx. carne earū optime mundata, uini ueteris adstringentis, quātū ad uuas passas, bdellium ac mirrhā maceranda ac conterēda satis est. Mel autē prius despumato, in coq; resinam liquefacto: & cum reliquis committito ac utitor, aliquando quidem instar clegmatis ad nucis ponticæ magnitudinem aut amplius exhibeto: aliquando uero aqua mulla dilutū bibendum præbeto. Inuenies & inter arteriaca remedia ad tussientes item & phthisicos pharmaca plurima his similia, quibus ipsi & ad ulceratum hepar uti oportet: proderunt etiā ea quæ ad renum ac uescicæ ulcera sunt descripta. Alia cyphoides, qua usus est comes Andreas, & Menas chirurgus, Croci drā. iiii. calami drach. vi. bdellij drach. ii. & dimidiā, cassiæ scrupulos .iiii. spicæ nardi sesquidrachmam, floris sicci odorati scrupulos .ii. & dimidiū, mirrhæ drā. iiii. terebinthina drach. iiii. aspalathi scrupulum unum, mellis sextantem, carnis uuarum passarum quadrātem, uini quantum ad hæc satis erit.

*De hepate in scirrū indurato, Galeni. Cap. vi.*  
Non solum autē ad prædictis affectionibus apprehenditur hepar, sed & in scirrū induratur, insinuatione uidelicet præcedente. Manifestiorem autē cognitionem hepar induratum ex hoc habet, quod tumor circa ipsum scirrū multo durior quā in inflammatione existit, multo etiā minore dolore uexatur. In huiusmodi quoq; dispositionibus corpuscula hepatis insita attenuantur. Cæterum temporis progressu, maiore tumore circa scirrū factio, difficulter eius cognitio per tactum cognoscitur, propterea quod iam aquæ inter cutem suffusio sit consequuta: unde his qui negligentius notas perscrutantur, tumor ad tactum laxus succumbit: color autē uniuerſi corporis in nigredinē pallore permixtam cōmutatur, uenter & pedes intumescunt, supernæ corporis partes gracilescent, & corpus ipsum tepescit: aliquando autē alius multa & tenuia excernit: urinæ uero à principio quidē multæ, uerū ubi iam ad aquam inter cutem dilapsi sunt omnino pauca. Porro incipientem hepatis scirrū sæpe curauimus ipsi: uero qui tēporis diuturnitate est extensus, neq; ipsē curauit, neq; alium quemquam qui curare eū posset uidit: in totum enim sic affectis aqua inter cutem accedit, & in longiori tempore corrumpuntur. Itaq; ad prædicta de inflammatione cataplasmata & fomenta, fordora quædam (inquit Archigenes) sunt annexenda. Cōstant autē ea quæ inflammationis adhibentur ex absinthij coma, nardoq; tum indicā, tum celtica, croco, cenanthe, unguento nardino, lentiscino, & mastichino. His igitur alibi radicem ammiscere oportet, & stercus caprinum, ammoniacum thymiamā, bdellium, medullasq; & adipēs. hæc enim incipientem in hepate scirrū, conuenientius simul adhibita dicta, sæpe curauerunt. Post somentā

menta autem & cataplasmata, cucurbitarū hepati affigenda cum scarificatione, & emplastrā adhibenda: primum quidem simpliciora, uelut est Mnasea, & quod ex succis conficitur, deinde etiam fortiora, uelut est melinū Serapionis, & quæ huic similia existunt. Post emplastrā malagmatis utendum, ex bacis lauri, aut eo quod polyarchiō appellatur, & similibus, quorum aliqua in colicis præscripta sunt: aliqua uero in splenis & arthriticis referuntur. Quod si neque proficiat, hīrudines admouenda: plurimum enim momenti habet ad curationem, sanguis earum sicut extractus. Commodus est eis & dropax & sinapis mus: si uero neque hoc modo res succedat, usque per frequentia interualla adhibeatur: ita ut aut per ferrum, aut per pharmacū crustū insignantur, & post earum casum, ulcera multo tempore fluere sinamus, conferunt etiam portiones conuenientium pharmacorum, uelut est Zopyros ad colicos præscripta, & quæ eupatorium habet admixtum. Complectuntur & urinae dentes antidoti aliquam in se commoditatem: uelut est quæ Bestiana uocatur. Scirrhus enim induratus particulè ob crassos & uiscosos humores in solidis corporibus imbibitos, necessario frigida habet dispositionem: quare & calefacientibus simul & tenuium parium pharmacis opus habent uerum his, quemadmodum dictū est, emollientia sunt præmittenda. Si enim uehemētē calida, antequam scirrhus indurata corpora præmollescant, exhibeantur, statim quidem manifestam diminutionem fecisse appareat, uerum immedicabile fit quod relinquitur, utpote nimis resiccatur. Quapropter facile est coniectare in hepati scirrhu necessarium esse emollientiū admixtionem. Simplicia igitur quæ ad hepar induratum bibuntur sunt: anagallidis quæ cæruleum florē habet succus exiccatus, itēque liquidus ex aqua mulsa: in moderatis autem febribus, ex aceto mulso: & scillæ alatae medullæ oboli. In seminis uiticis torrefacti dra. i. radix eupatorii, radix dracunculi, cortex radicis lauri. Aliud, quo Aegyptius curatus est, quum iam aquam inter cutem incidere promptus esset: Herbae fabinae, picis siccae, quæ in fundo doliorum uini reperiuntur, eorum præsertim in quibus uinum dulce uerustare est adeptum, utriusque æquales partes singulatim cōtundito & cribrato, atque ex ambo bus pariter cochlearij mensuram cū uino diluto præbeto. Aliud. Croci, spicæ nardi, casia, cuiusque drac. ii. costi, floris funi odorati, cinamomi, myrrhae, statæ cuiusque dra. i. mellis despumati dra. x. v. Ex hoc drac. i. cum uino mulso præbe. Optimum est hoc pharmacū in incipientib, duris scirrhi dispositionibus, cuius rei plurimū periculū feci. Aliud, ad omnes inueteratas hepati affectiones, atque ipsum etiam scirrhu. Picis siccae, costi, piperis, æquales partes cōtundito & cribrato, & ex eis cochlearium præbeto. Aliud. Myrrha troglodytēen optimā, & piper, pari pōdere tundito: indeque scrupulū unū cum uino meraco ueteri calefacto, ad dies tres aut quinq; exhibito. Oribasij ad hepaticos. Glauci drach. iiii. aloēs dra. ii. hæc arida cōterito, & cochlearij mēsurā statim à balineo exhibito: febre carētibz cū uino diluto, febrentibus autē cū aqua mulsa. Aliud Oribasij, ad diuturnas hepati affectiones, & circa si ma ipsius dispositiones, in quibus tum stomachus, tum uenter simul affecti sunt. Compositus uiridis de

coctū ad tertias redactum, cyathorū trium aut quatuor mēsurā præbe. Quin & sicca comæ dra. i. in potu exhibita, simili efficacia præstat. Verū ad multos hæc exhibenda sunt dies. Aliud, Oribasij. Champepyos, petroselinū, cuiusque dra. viii. baccarum lauri, piperis, costi, singulorum drac. iiii. cyperi, foeni græci, cuiusque drach. ii. præbe cochlearium ex aqua mulsa. Aliud. Anisi, gentianæ, amygdalarū amararū, absinthij, æquas portiones permisce: indeque cochleariū ex calida præbe. Aliud. Thuris undam unā, ammi, iacori, cuiusque drachmas quatuor, præbe cochleariū ex aqua mulsa. Oribasij antidotus hepati ca. Casia drachmas octo, aloēs, costi, corticis pinus, cuiusque drachmas quatuor, glycyrrhizes siccae drachmas octo, spicæ nardi, croci, anisi, hyssopi, rhei pontici, cuiusque drachmas duas, mellis sesquilibra. Mel decoque ac reliqua eo excipe, & nucis auellanae magnitudine præbe. Aliud Oribasij, ad hepaticos, ictericos, splenicos, & præcordia eleuat. Croci drachmas decem, floris funi odorati drachmas quatuor, casia drachmas duas, spicæ nardi drachmas octo, myrrhae, cinamomi, costi, cuiusque drachmam unam, mellis costi quantum his excipiendis sufficit. Præbe ad fabæ ægyptiæ magnitudinem cum uini mulsi cyathis tribus. Facit & ad thoracis dolores, atque eos qui plumbum colore habent. Aliud hepaticum pulchrum. Seminis pelecini, caprij herbae, costi, æquale pondus contundito ac cribrato, & drachmam unam ex aqua mulsa præbeto. Aliud. Foeni græci undā unā, trixaginis sextantē & undā dimidiam, costi albi quincuncē, petroselinū quincuncem, eupatorii quincuncem, mellis despumati quantum satis est. Datur sesquidrachmæ pondere. Eius utilitas experimento constat. Aliud. Castorij, costi, cyperi, amomi, cuiusque drachmas octo, piperis drachmas quatuor, petroselinū drachmas quatuor. Datur cochlearij mēsurā. Aliud, ad diuturnā uexationē & duriciem. Costi, foeni græci, piperis, foliorū rutæ uiridis, picis siccae, æquales partes cōmisce, indeque cochlearium cum aqua mulsa aut uino præbe. Aliud. Ammoniaci thymiamatis drachmas triginta duas, croci drachmas quatuor. Crocum tundito, cribrato, & cum aqua diluito: deinde ammoniacum addito, simulque terito, ac in pastillos redigito, ex quibus alijs drachmam unam, alijs duas præbeto. Aliud. Ammoniaci thymiamatis, costi, polij, foeni græci, æquale pondus misceto: indeque cochlearium siccum cum aqua mulsa dato. Aliud. Ammoniaci in tenuissimum puluerem redacti cochlearium unum, mastiches grana decem, præbe ex aqua mulsa, & admiraberis. Efficax est ad hepaticos iam desperatos. Aliud. Asclepiadæ: quo utimur, inquit Philagrius: quod ad hepar scirrhu induratum, atque etiam oppilationē obturatum, prospero successu accommodatur, ad aquæ inter cutem quoque suffusiones incipientes, & ad alias internas affectiones, circa uisum contingentes, optime facit. Habet autem hoc modo. Radicis gentianæ, chamæpityos, marrubij, petroselinū, radicis scolopendriæ, radicis panacis, terræ lemnia quæ sphaeris appellatur, sisonis, rubiæ, seminis brasicae, radicis eringij, baccarum iuniperi, seminis fraxini, trixaginis, seminis dauci, dictamni, cestri siue betonicae, singulorum drachmas octo, sellis urfi siccis, sinapis, seminis cu-



cumeris, aristolochis, piperis, spicæ nardi, costi, semi-  
nis erugæ, singulorum drachmas octo, hoc est omniū  
æquale pōdus, echij, eupatorij, polij, cuiusque simili-  
ter drachmas octo. Quidam etiam lupini hepatis, ac  
helenij tantumdem adiecerunt, quod & nos facere so-  
lemus. Orisabius autem neque fraxini semen, neque  
beronicam, neque trixaginem, neque dictamnium,  
neque daucum adscripsit. Mellis quantum his omni-  
bus excipiendis sufficit. Datur ad nucis autellane ma-  
gnitudinem cum palis cyathis duobus. Pharmacum  
hoc experimento cognoscitur. Semen autem fraxi-  
ni, arboris est ex qua fraxinea ligna quocunque in  
opere apta ac operæ obediētissima cæduntur. Epi-  
thema ex melilotis ad hepaticos. Meliloti sextan-  
tem, croci undam unam, ammoniaci thymifamatis  
libram i, ceræ lib. i, cerebintine trientem, cyprini;  
aut nardinij, aut gleucini unguentij plus minus quin-  
cuncem. Ammoniacum & croci in aceto dissolue.  
Porro in diæta totum suum esse existimandum est,  
siquidem omnis diuturnus morbus maiorē ex diæ-  
ta opem sentit. Quare cibi qui facile concoquuntur,  
eis exhibendi sunt, quicq; & incordiora uim & repur-  
gantem complectuntur. Neque uero ineptæ eis  
acrius comestiones sunt, si per intervalia, &  
post exercitia ac gestationes sumunt. Cæterum pro  
ratione motuum & exercitorum, tum quantitatē,  
tum qualitatē ciborum augere oportet. Vinum  
eis conuenit tenue, odorum, moderatæ quantitatē ac-  
ceptum. Dulcia enim omnia nocentissima sunt hepa-  
ti affecto. Vitandum & uinum multum, fructusq; ac  
bellaria omnia, præter amygdalas & pistacia: ex his  
enim moderate à reliquis cibis accipiendum. Vitan-  
da etiam crassa & uiscosa edulia, atq; ea quæ difficul-  
ter concoquuntur.

De lienis affectionibus cognoscendis, ex libris

Philagrii.

Cap. vii.

Quibuscumque sub sinistro illo dolor, aut diffusio, aut  
tumor subiacet, & dum conuertuntur, uelut aliquid  
ex illis locis conuellatur, imaginatio contingit, his  
lien affectus est. Quemadmodum autem reliqua cor-  
poris membra iuxta octo intemperierum genera  
affliguntur, ita & splen afficitur: uerum frequētissi-  
me frigidam & humidam sustinet intemperiem, ex  
cōsimili maxime diæta, atque ex his quæ uolupta-  
tis gratia accipiuntur, uelut sunt crassi succi placen-  
tis, itemq; potiones. In his igitur omnibus calor tem-  
pore debilitatur. Substantia enim splenis laxa & ra-  
ra est, promptissimaq; ad suscipiendum crassiores  
humores: etenim fecem ac uelut limum sanguinis  
ex hepate ad sese trahit, hoc modo sanguinem repur-  
gans, ex qua sece confecta & attenuata per maximas  
in ipso arterias seipsum nutrit. Signum autē certum  
& compendiosum intemperiei in splene, ea quæ  
eduntur accibuntur exhibent, & quæ forissecus cu-  
ticulæ iuxta sinistram illam accedunt. Si enim frigi-  
da intemperies iuxta ipsum fuerit oborta, omnis ci-  
bus & potus qui efficaciter refrigerare potest, facile  
& manifeste splenem lædit: pallium item frigidum  
extrinsecus admotū, maxime si in frigida aëris con-  
sistione amictantur, uentus etiam & aqua frigida  
tum in lauando, tum aliis quoque adhibita, frigida  
dā arguit splenis intemperiem. Eam uero ipsam in-  
temperiem omnia calida consolantur. Quod si cali-  
da fuerit splenis intemperies, à nullis quæ in cibo

aut potu exhibentur, aut etiam forissecus accedunt,  
dolorem perferit: & si quidem caliditas augeatur, nō  
solum nihil tumori apponitur, sed & contractionē  
amplius sustinet, præsertim si exurens simul addit se-  
bris. Cæterum & cibi & potus calefacientes, &  
quæ extrinsecus corpori calorem addunt, calidas  
etiam intemperies augent & exacerbant. Solatio au-  
tem sunt eis omnia refrigerantia. Si enim hi qui cali-  
dam habent dispositionem per intervalia frigide po-  
tu urantur, statim splen corroboretur, & minuitur,  
ægrumq; melius spirantem reddit: & uenter aliquā-  
do ex frigida potu flauam bilem profundit. Atqui  
tristitia adfectus, aut ira concitatis splen etiam, si cali-  
dam habeant intemperiem. Similiter etiam siicca in-  
temperiei in splene signa colligere oportet, maxime  
quum pro magnitudine propriæ naturæ non emi-  
net. Ea item quæ forissecus corpori adueniunt, atque  
intra ipsum deorantur, si arefaciendi facultate præ-  
dita sunt, splenem exiccant, quemadmodum etiam  
reliqua animalis mēbra desiccare consueuerunt. Qui  
enim laboriosam uitam degit, assidueq; circa mari-  
nas aquas uersatur, aut bituminosas, aut aluminos-  
as, aut sulphurentas, quicq; pharmaca assumit hāc  
habentia naturam, facillime exiccatur. Porro ubi hu-  
mida affectione splen fuerit deictus, atq; ea amplius  
inualuerit, in tantum eius incrementum facit, ut etiā  
uentrem peringat ac hepā. Confluunt autem humi-  
da dispositio circa ipsum consistere ab immodice hu-  
meantibus, diæta, & exercitio, aëre, & locis. Obo-  
riti solent & his qui circa palustres regiones frequen-  
ter uersantur. Amplius autem & humidus morbus  
præcedens, hanc affectionem producit: aquæ item  
largior potus, & holera humectandi ui prædita. Spe-  
cies quoque doloris unā cum prædictis signis in-  
ferantem intemperiem demonstrabit. In calida enim  
& frigida intemperie dolent. Minus uero, aut nihil  
omnino, in humida: minimum uero in sicca. At ue-  
ro ex prædictis coniecturam facere licet composita-  
rum in ipso splene intemperierum. Ferē enim in to-  
tum ubi calida intemperies fuerit intensa, & sicca etiam  
consequitur: & ad frigidam inueteratam humida cō-  
comitatur. Quandoquidem autem & humores in  
splenem confluentes, tumores produciunt: eorū quo-  
que diligentem considerationem facere oportet, qua-  
les nam sint tandem, atque id non solum ex prædi-  
ctis iam dispositionibus est faciendum, sed ex his quæ  
iam dicuntur. Bilioso enim fluore existente, uniuersum  
corpus calidius apparebit, etiam si non addit se-  
bris, oculiq; & urinæ per bilem coloratæ: siccitatem  
semper accusabit æger, & de siti conqueretur ac bi-  
li os infestante, cibum fastidit, & uigilijs infestatur,  
& frigidam desiderat unā cum hoc quod linguam  
subflauā habet: exacerbationes terdaneæ sient: suntq;  
ipsi ægri moribus iracundi, & qui præcipitanter ex-  
candescunt. Si uero atræ bilis sit fluor, materiæ ipsius  
atræ bilis scilicet, color tum in lingua, tum in reli-  
quo toto corpore apparebit: & appetentia aderit ci-  
borū: mœstiq; ac subristes ægri sunt, reliqua q; atræ  
bilis signa eis adsunt: exacerbationes uero quarto  
quoque die affligent. At uero ubi pituitosus humor  
in splenem deferatur, consimilis pituitosus aderit co-  
lor, ægriq; minime sient, & cibum appetent, nisi  
falsa fuerit pituita: tunc enim cibū fastidiunt ægri, po-  
culorumq; magis sunt appetentes: quin & coloris

cutis nitentis species demonstrabit tibi pituitosum esse humorē: & quod singulis diebus exacerbatur, urinæ quoque pituitosæ sunt: ipsi uero aegri secundum mores pigri sunt & segnes. Quidam uero ex eis qui frigidam affectionem habent, magnum & durum splenem acquirunt, atque ubi parum saltem confusæ edendi horam fuerint transgressi, & impasti manserint, dolore afficiuntur, propterea quod neque plenum, neque firmantem, neque sustentantem ipsum habeant uentrem, quicquid amplius ob inediam refrigeratur, & concalescentia opus habet. Quod si sanguis uisus existat in splenem confluens humor, possibile est ipsum colorem tum iuxta linguam, tum circa cutem permutari: inter appetentiam autem ciborum & fastidium medio quodam modo habent aegri: reliquisque magis languent, etiam si non parem uisceris tumorem habeant. Venæ autem uniuersi corporis, sanguine plenæ apparent, & urinæ subsulue.

*Intemperium splenis cura. Cap. VIII.*

In uniuersum quidem igitur splenis intemperies ferè citra tumorem sunt: eas autem tum per cibos ac potus, tum per simplicissima pharmaca ac fomentorum irrigationes que intemperiei contraria sunt corrigere oportet. Calidæ intemperiei cura. Calidam itaque intemperiem curabis per irrigationes usum ex rosaceo, aut melino, & per simplicia ex his composita cerata. Amplius autem & per uinæ acerbæ immaturæ succū & portulacæ & pampinos uitis, ac cōsimilia. Cibis uero & potibus utendum, in quibus calida intemperies castigatur reddatur, lauari etiam temperatarum aquarum. Quod si pharmacorum usus opus sit, rumidis acuti semen in potu exhibeatur, aut radicum, aut foliorum eius decoctum: aut plantaginis, similiterque limonij, quod cynoglossum appellatur decoctum. Sunt autem hæc in posca diluta conuenienda. Frigidæ intemperiei cura. Frigidas in splene intemperies sanant irrigationes, & unguenta, ac cerata, itemque epithemata, quæ moderata calefaciendi facultate prædita existunt: uelut est unguentum nardinum & cyprinum ac gleucinum, & cerata ex eis cōflata. Poteris & epithema pentamæron appellatum, cum modica cera liquefactum adhibere. A balineis in principio abstinendum, nisi quid obstat: cibi & potus moderate calefacientes exhibendi. Quod si medicamentis opus sit, conuenit eis calaminthæ, pulegij, scordij, trifolij, uitis, ac similium decoctum. Exhibenda etiam rumicis acuti radix, aut semen. Humidæ intemperiei medela. In humida splenis intemperie optimum pharmacum habebis salis florem, siue per se solum, siue cum aliquo simplici cerato imponere uelis. Solus enim calefactus & aliqua uesica exceptus, spleni adhibetur. In epithemata quoque ammiscetur, quemadmodum est prædictum. Quin & salisago & spuma salis, cum cerato aliquo ac modico aceto permixta, commodum pharmacum erunt ad humectandi splenis affectionem. Proderit & quinq; folij radix, & plantago sicca, & alumen scissile in testa exustum. Poteris etiam ex plantaginis folijs, radicibusque quinq; folij, & spuma ac flore salis, pari uel impari modo permixtis, sufficienti affuso aceto, & pice sicca in posca liquefacta, exceptis, cerata ite alba, ammoniacum thymiamate, ac modico rosaceo ammixtis, pharmacum usui reseruare. Melius autem compositionem facies, si & salicis succum addas, hic enim est

uno aut altero ex prædictis permixtus, efficacius pharmacum reddet. Eius autem collectio facile contingit. Lacrymam enim arbor incisa emittit. Conuenientissimæ autem his sunt fricationes, quæ discutiendi facultatem habent. Sicca intemperiei remedia. Sicca splenis intemperiem balineum dulcium & calidarum aquarum curat: inunctio item ex oleo dulci. Cibi citra refrigerationem humectantes, uelut est pitisanæ succus, & post eum qui ex halitica est acceptus. Irrigationes forinsecus profunt ex rosaceo, & cerata itidem ex eo apparatus.

*De splenis inflatione.*

Cap. IX.

Quum inflatio circa splenem est, tumor loci consequitur, qui imposita manu ad tactum cedit, & distensio nem loci infert. Verum inflatio ipsa aut in uentre oborta ad splenem transferatur, aut in ipso adeo splene generatur. Venosa igitur flatus generatio ex frigida membrorum ipsum producentium continetur. Quare tum uentrem, tum splenem concalescere oportet, præsertim his quibus utrumque membrum est affectum: atque id tum his quæ forinsecus imponuntur, tum cibis ac pharmacis quæ intra corpus deorantur, perficiendum est. Veri itaque auxiliabimur, si quidem per consensum sit affectus, diaphoreticâ confectionem exhibebimus, atque etiam alias quæ huic similes existunt. Panis uero ac edulia, uinumque quod in potu sumit, ex petroselino, aniso, cumino, ac fensone, similibusque cōspargenda sunt. Foris autem epithema ex feminibus quod paulo potius referetur, imponendum. Hæc enim pariter utrique uisceri auxiliatur. Proprie autem inflationes splenis dissoluere solent, tum ea quæ iam dicta sunt, tum uitis semine torrefactum, & melanthium, serpillumque & thymus, pulegium, origanum, rutæ semen. Pelecini autem semen & stomacho gratissimum, & omnibus uisceribus aptissimum est: si militer & rheon ponticum, & scordium. Hæc enim una cum hoc quod stomachum repurgant, etiam hepatis profunt, neque stomacho molestiam inferunt, cæterum unumquodque horum & per se, & alijs commixtum exhiberi potest, in posca decoctum, aliquando autem & mel eis adijciendum. Porro quæ his fortiora sunt, ea uitare oportet in his, in quibus uenter per consensum cum splene est affectus, maxime si inflatio sola infestet: quæ enim his præstantiora sunt, spleni in scirrhum indurato conueniunt, ubi uero solus splen inflatur præter uentris læsionem, epithema ex feminibus in principio est imponendum. Postquam autem flatus crassities fuerit attenuata, ammiscenda sunt ei ea quæ noxam depellere possunt, qualia sunt epithemata ex alumine & sulphure apparatus, quorum compositiones paulo post dicentur, ubi de splenis in scirrhum indurato tractabimus cura. Epithema ex feminibus: Asclepiadæ. Epithema quod Asclepiades ex feminibus composuit, hoc est, quod ad aquam inter cutem prosperè accommodatum pharmacum existit, & ad omnem inflationem conducit. Cardamomi, meliloti, herbaræ fabianæ, baccharum lauri, nardi celici, samfuci, trididis, radicis panacis, radicis cyperi, nitri, calsiæ, fœni greci, seminis apij, anisi, thuris, singulorum drachmas xxv. styracis quadrante, myrrhæ quadrante, terebinthinæ libras II, ceræ libras II, ammoniaci thymiamatis lib. I, mellis optimi lib. I, olei cyprini lib. I, uini quantum satis est. Facit & ad stomachi & splenis inflatio-

nes, itemq; hepatitisq; omnino pharmacum mag-  
ni faciendum.

De splenis inflammatione.

Cap. x.

In splenis inflammatione uenae incisio adhibeatur, si  
nihil id fieri uereciter etiam per clysterem assidue  
eluat, & maxime si uenae incidenda medella relin-  
quatur. Quocumq; autem tempore siue per uenae inci-  
sam, siue per clysterē euacuamus, semper aliquid ad  
stringendā facultate praeitū spleni imponemus, in  
principio praefertim, quum differimus euacuatio-  
nem: quo id quod influit reprimatur, & quod influi-  
xiōe sua preuenit, à loco depellatur: atq; ad sple-  
nis firmitatem conservandam utilis adstringentium  
sylua existit: quae quidē robusta sint, ubi floris im-  
petus fortis cōtingit: moderata uero, ubi mediocritas.  
Cognosces autē irruentis humoris magnitudinem,  
ex magnitudine & uelocitate generationis ipsius in  
flammationis. Itaq; si moderata fuerit inflammatio  
splenis, unum uetus ac austerum tenuiumq; partiū  
oleo dulci permixtū & lana succida exceptum im-  
ponemus. Si uero maior sit caliditas, rosaceum sit  
oleum, aut lentiscinum: quae si non adsint, oliuæ fo-  
lia, aut rubi, aut mali arboris in oleo decoquantur,  
atq; ipsa etiam mala, in decoctione etiam quaedā te-  
nuium partiū addantur, uelut est absinthium &  
pulegium. Quod si forti impetu fluxus feratur, ace-  
tū pro uino affundendum est. Post irrigationes ac ca-  
taplasma transendum. In quorum compositione  
hordeacea & loliacea farina assumantur, cum posca  
& mellis ac olei paucissima omnino mēsurā, in qui-  
bus absinthium ac pulegium sint decocta: aliquādo  
& myrobalani infarcitēdū. Optimum & hoc est. Hor-  
deaceam farinam & salicis folia cum aceto imponi-  
to, adipe caprino in aceto colligato: uerum melius  
redditur cataplasma, si caricē adiciantur. Optimum  
autem est & ex lini semine cataplasma, maxime ubi  
affuerit dolor. Accipitur autē seminis lini pars una,  
farinae loliaceae pars una, adipis taurini in aceto &  
sapa liquefacti, cuiq; deinde oleum cyprinū sit affu-  
sum, quantum his subigendis satis est. Ceterum cauē-  
dū ne locus post irrigationes & cataplasmata denu-  
detur, sed ubi haec fuerint ablata, mox ceratū ex cy-  
prino aut nardino unguetō imponatur. Cōmodum  
est autem seruientibus inflammationibus Nilei aut  
Nili epithema, cum cerato chamamelino & aceto  
emollitum: idoneum est etiam Philagrij stomachicū  
epithema: sunt autem ea integra ad stomachicos de-  
scripta, utimur autem aliquando, ob cataplasmatum  
penuriam, ad splenem inflammationem, furfuribus in  
uino, aut posca & oleo decoctis: quibus etiam absin-  
thium, & pulegium, aut thymum, aut origanum, aut  
lauri folia, aut artemissiam, & reliqua incidendi ac  
attenuandi ut praedita adiicimus: non seruente uide-  
licet inflammatione, & corpore praeuacuato. Si  
enim corpore non euacuato, quis calidioribus utat-  
ur, ipse sibi scirrhi autor fiet. Quod si ad permura-  
tionem in suppurationē ipsa splenis inflammatio re-  
pat, quod tamen raro cōtingit, adiuuare eam opor-  
tet, ne plura corpora putrefiant, per cataplasmata ui-  
delicet quae pus producunt de quibus in hepatis ab-  
scessu manifeste est praeditum: hepar enim frequen-  
tissime abscessum perfert ac exulceratur. Quare ex  
his quae de hepate diximus, ad splenis curationem  
exempla transumes.

Cura splenis in scirrhum indurati, Galeni. Cap. xi.  
Iam antea praeditum est, splenē quā celerrime sole-  
re in scirrhum indurari, sanguine circa splenitides in  
ipso uenas obturatu, ut neque externi, neque digeri  
ob crassitiē facile possit. Quare attenuantiū pharma-  
corū usu opus habet, citra tamen manifestam calidita-  
tem: ne uehementius inspissetur crassus humor in  
eo obturatus. Ammiscedum est autē eis quippiā ex  
adstringentibus & austeris, quo ipsius actio & ro-  
bur conferuetur. Si enim pra debilitate seculentū &  
atra bilis humorē, ex hepate, quemadmodum con-  
sueuit, non attraxerit, uisiosum humorem uniuerso  
corpori affricabit. Immedicabilia enim ulcera hoc  
modo affecti habebunt, & maxime circa crura, & co-  
lorem corporis uitiatum ad nigredinem uergentem.  
Diutius autē durante malo etiam aquam inter cutē  
incurrunt. Ob id igitur in ipso splene naturalem fir-  
mitatem custodire oportet, quo conueniens sibi ali-  
mētum astrahat, & sanguinem repurget, superfluaq;  
in ipso generata recrementa ad uentrem demittere  
queat, quae postea cum ciborū recrementis externū-  
tur. Ad hanc itaq; rem amara ipsi spleni offerimus,  
quibus aliquādo ex austeris quippiā ammisceamus.  
Amara quidem ut humoris crassitiem secent ac re-  
purgent: austeri autē ut robur & firmitatē eius con-  
seruent. Quale uero pharmacū hepati est absinthiū,  
tale existit spleni capparis cortex. Et quale est hepati  
eupatorium, tale spleni est scolopendrium. Simili-  
bus enim secundum genus pharmacis utraq; uiscera  
opus habent. Verum splenē tanto fortioribus indiget,  
quanto crassiore utitur alimento. Ceterum à ueteri-  
bus plurima potabilia pharmaca ad induratum lie-  
nem sunt descripta. In curando autem animaduersio-  
nem habere oportet, num curandi aegri uniuersum  
corpus frigidius sit, an calidius, nū humidius, an sic-  
cius. Eis igitur qui corpora natura habent calidiora,  
citra molestiam myricae folia dantur, uirgulaq; &  
radix: scolopendrium item, & rumicis syluestris, ma-  
xime uero acuti semen, soliaq; & radix: optime au-  
tem facit radices uiridis contusae succus cyathi unius  
mensura potatur. Probe facit & lycapfos, quae & an-  
chusa appellatur: danda autem radices eius drachma  
una, aut cacumina hederæ tria, aut folia eius, uel etiā  
radix: item polytrichon, & capnij, quod chelidoniū  
uocatur, decoctum ad tertias redactū, solia salicis  
& cortex, itemq; radix limonij, quod & cynoglof-  
sum uocatur: solia & radix, & semen quoque peder-  
ni. Haec enim neq; uehementem in se habent calidita-  
tem, neque si calidior temperatura addit, ei mole-  
stiam inferre solent: quapropter his tum ad praedi-  
ctos, tum ad reliquos utēdum in principio adfectio-  
nis: à mitioribus enim auspicari oportet. His autem  
efficaciora sunt, quae in ueteratis scirrhis conducūt, &  
corporibus agrestioribus, & qui omnē corporis habi-  
tū habent frigidiorē: trixago, gentianae radix, cala-  
mintha, pulegiū, & cyclamini radix, scordii, trifolij  
bitumen oleis semen, hyperici coma, acori, asari  
& eryngij radix, uiscicis semen torrefactum, centaureae  
maxime minoris succus, etiā si sit exiccatus, chamae-  
pitys, polium, lonchitidis radix, anagallidis quae  
caeruleum habet florem succus, glycyfides aut paeo-  
niae, itemq; dracunculi radix tum uiridis, tum sic-  
ca. Aliud. Caroi ex terra suscepti, radices rubrae,  
bryoniae, ammoniaci thymamatis, cuiusq; drach-  
mam

chmam unā. horum unumquodq; aliquando tritū  
ex posca datur, aliquando autem decoctum eorum  
præbetur: quod si sicca dare uelis, sufficit drach. plus  
minus unam exhibere. Conducit item hoc. Ammo-  
niaci thymiamatis sextantem, castorei unciam i. con-  
terito, & drachmā i. ex posca aut aceto mulso præ-  
beto. Aliud. Scillæ assatæ drac. i. corticis radicis  
capparidis drach. i. præbe ex posca, uel aceto mulso.  
Mouet enim crassos & uiscosos humores, inquit  
Archigenes: aliquando & cruenta non per urinas  
tantum, sed & per ventrem educit. Aliud. Thuris  
obolos duos, seminis fœniculi cochlearium unum,  
præbe ex uino. Aliud Mariani, præsens remediū:  
quod etiam si sit induratus, citra dolorem ipsum la-  
xiorum reddit, ut neq; significationē, neq; etiam sus-  
spicionem suffusionis aquæ inter cutem relinquit.  
Seminis uiticis cōtusi & cribrati per angustissimū  
cribellum dra. v. his qui perfectæ sunt ætatis ex po-  
sca bibēdas præbe. Aliud eiusdem, & ad splenem &  
hepar indurata, & principium aquæ inter cutem, &  
ad alui, & intestinorum, ac stomachi inflationem,  
simplex & periculo uacans. Bryoniæ radicem con-  
tusam & cribratam, repositam, ab aëre & uento in-  
taetam, ne quid inde transpiraret, adserua, & pro ui-  
ribus ægri præbe. Perfectæ mēsuræ exhibitionis est  
cochlearium unum, hydropicis quidem & splenicis  
ex posca; hepaticis ex hydromelite aut uini dulcis  
cyathis tribus. Pastillus ad splenicis, Asclepiadæ:  
liquefacit splenem, ut multo experimēto cōstat. Se-  
minis ericæ drac. vii. piperis albi drach. iiii. spicæ  
nardi drac. iiii. ammoniaci thymiamatis drac. iiii.  
scelopendrij drac. ii. costi drach. ii. cum aceto scilli-  
tico subigito, & drac. i. cum aceto mulso aut posca  
præbeto. Conuenientissimum autē spleni in scirrū  
indurato remedium existit ferrum aqua, aut uino,  
aut posca extractum. Ea ipsa enim aqua, aut uinū,  
aut posca in principio exhibitā iuctā & utilissima  
existunt, & per plures ex ordine dies dantur. Itaque  
febrientibus aquam, aut poscam diluā præbeto: eis  
uero qui teneram carnem habent ac febre carent, ui-  
num. Sit autem ferrum quod in ipsis extinguitur  
stomoma. Ipsi autem stomomati ferri squama,  
(quam in fabrilibus officinis ferrum dum ignitur  
& malleo tunditur, abijcti) postea agrestioribus  
hominibus utiliter exhibetur. Præclare enim hæc  
splenem liquefacit, utpote que consumendi facultate  
tem præstat, quare aliarum rerū complexu opus ha-  
bet, ne inde stomachus male afficiatur. In calidioribus  
igitur tēperaturis, pelecini semen ei ammiscere  
conuenit: ut si id non addit, scelopendrij: aut si  
neq; hoc haberi possit, absinthij comam, aut rumi-  
cis acuti radicem aut semen. In frigidioribus autem  
temperaturis, ad squamam ipsam, cassiam, aut amo-  
mum, costum, anisum, aut serpillum mōtium, &  
similia addere oportet. Quamquā tum in his, tum in  
omnibus pelecini semen maxime cōueniat. Omnia  
autem nūc dicta, itemq; ea quæ paulo antè sunt re-  
lata simplicia pharmaca, in principio cum posca di-  
luta coquantur, postea uero etiam meracore. Pro-  
gressu uero temporis etiam ipsa confusa & cribrata  
cum aceto aut aceto mulso exhibentur. Verum cer-  
tam uniuscuiusq; horū mensurā definire difficile &  
periculosum est, quā diuersæ eorū qui ea accipiunt  
sint naturæ: quare in principio parū quid ex uno

quoq; exhibendum, & pro ratione deinde exhibi-  
tionis mensura augenda, iuxta ipsius pharmaci, atq;  
etiam ægri uires. Omnia igitur prædicta quomo-  
docunq; tandem potata, aut semel saltem deglutita  
permanere solent: uerum glans unguentariorū, quā  
myrobalanon appellatur, nisi cū posca bibatur, facili-  
ter uomitu reijcitur. Licet igitur singulis prædictis  
simplicibus pharmacis per se uti, & duo item uel  
tria aut quatuor, permixta æqualiter uel inæquali-  
ter præbere. Ex compositis autem ferè pulcherrimū  
est, id quod ex olibis constat, ad podagricos descri-  
ptum Philagrij pharmacum. Efficax enim reperies  
ipsum, inquit Philagrius, & conuenientissimum ad  
omnia splenis uitia, præsertim cum tumore magno  
& duritia oborta. Sensibiliter enim huiusmodi affe-  
ctionibus auxiliatur: utpote quod uisua emollit &  
concoquit, ampliusq; diffundit & purgat, ultra  
hoc quod paulatim discutit & resecat. Est autē tum  
gustui, tum odorati suauissimū, maxime si pluri-  
mo desumpato melle mixtum, delingendum præ-  
beatur. Secūdo autē loco inter ea quæ ego noui est  
& hoc, inquit Philagrius, ipso sanè uisum probatum.  
Corticis radicis capparidis drach. vi. soliorum myri-  
cæ drachm. vi. squamæ stomomati ferri drach. vi.  
myrobalani drac. x. aut vi. ammoniaci thymiamatis  
drachmas vii. seminis pelecini drach. v. stœcha-  
dis drach. iiii. comæ absinthij drach. iiii. scelopend-  
rij drach. x. Exdpe aceto & informa pastillos, ac  
exhibe drach. i. ex posca aut aceto mulso aut uino.  
Hoc itaq; robustū est pharmacum, ut etiā ad durio-  
ra corpora quadret. Aliud eo imbecillius tale est.  
Pulegij drac. xii. radicis ruminis acuti dra. vi. semi-  
nis eiusdem drac. vi. capni iuxta sepes nascentis sic-  
ci drac. vi. pelecini drach. iiii. scelopendrij drac. iiii.  
spicæ nardi drac. ii. rhei pontici drac. i. corticis cap-  
paridis drac. ii. Exdpe aceto ac redige in pastillos, ex-  
hibe q; drach. i. quædam modum in præcedēt dictum  
est. Pastillus ad splenicis, splenē liquefaciēs: Ascle-  
piadæ. Seminis ericæ drach. iiii. piperis, ammo-  
niaci thymiamatis, spicæ nardi, cuiusq; drachm. ii.  
Quidam etiā costi drach. ii. & scelopendrij drac. ii.  
Arida contundito & cribrato, ammoniacū in ace-  
to dissoluto, ac simul in pastillos digerito: ex qui-  
bus drachmā unā cum aceti mulsi cyathis iiii. propi-  
nato. Qui huius pharmaci compositionem docuit,  
per tridū hoc suis catulo fe exhibuisse dixit: postea  
ubi catuli disciscisset, ipsum sine splene reperit. A-  
liud, ad spleneticos & hydropicos, quod optime u-  
rinam ciet, & uentrē emollit: Archigenis. Scillam  
magnā luto oblitā assatā, deinde repurgatæ internæ  
libras ii. accipito, daud unc. i. anisi, fœselis, radicis pa-  
naxis, iridis, cuiusq; unc. i. seminis urticæ sextantē, ce-  
drum, hoc est, fructū cedri sextantē, myrrhæ dra.  
iiii. saring erui unc. x. cū uino informa pastillos,  
& præbe dra. i. cū aceti mulsi cyathis iiii. Aliud, Ra-  
dicis panaxis, ammoniaci thymiamatis, corticis ra-  
dicis capparidis, radiculis, scillæ assatæ internæ, æquales  
omniū partes cōmitte, & obolos tres aut quatuor  
præbe: cōducit anhelosis & hydropicis. Pastillus si-  
mæ utilitatis. Cacuminū hederæ nigre drac. ix. spicæ  
nardi drac. v. seminis rutæ syluestris dra. iiii. ca-  
storij dra. i. iridis dra. vi. Cū succo uerbernacæ recte  
pastillos iformato, & p. qnq; dies mane dra. i. ieiun-  
is ex uino ueteri præbeto, Mouet urinas cruentas.

Atq; hæcenus quidem de pharmacis potabilibus. Cæterum ad splenem in scirrhum induratum etiam sanguinis detractionem commodam esse scimus, quæ inter paruam sinistræ manus digitum, & eum qui medio proximus est, fit facta. Quidam autem uenam retro sinistram auriculam suam diducunt, inquit Archigenes, & ex profuente inde sanguine splenem illinunt, ac magnam commodum sentiunt. Idè etiam hepate affecto faciunt, incidentes retro auriculam dextram uenam. Quare neq; absurdum fuerit etiam his auxilijs uritanimaduersionem tamè habita, ne arteriam pro uena disseceamus. Nos autem in his qui multo sanguine abundat, inferiorem in sinistro cubito uenam secare consueuimus, uerum & hic cauendum ne subiacentem arteriam simul disseceamus. A uenæ incisione, etiam cucurbitulæ spleni affigendæ sæpe & cū scarificatione, extrahédusq; per ipsas plurimus sanguis; quin & hirudines summa commoditate in ipsum splenis locum assignuntur. Locum etiam amplius per spongiam aceto muria imbutam fouendi, surfuribus quoq; in aceto decoctis, ablinthij coma, ac pulegio, & lauri folijs, similibusq; adiectis. Quidam autem lapidem molarem ad gagatæ longitudine octo digitum, & latitudine sex digitorum, secundum crassitudinem leuem, igniunt & aceto adspargunt, panniculoq; in aceto calido madefacto circumpositi, locis imponunt, & quam diu calidus sit, incumbere sinunt, atq; huic somento testimonium præbent, inquit Archigenes, tanquam quod insensibiliter deprimat tumorem. Post someniat ad cataplasmata transeundum, ex farina ordi ac solij, ablinthij coma, myrobalano & althææ radice, cum aceto mulso. Aut panem aridum cum capparibus cortice, & myrobalano contusum, cribratum, & cū aceto mulso decoctum imposito. Optime facit & sterco caprinum cum farina ordeacea ex posca caia plasmate impositum. Lupinorum item farina ex posca, & fabarum eodem modo. Cinis quoq; ex officina fabrilis, & bryoniæ radix cum caricis, aceto, & cyclamino, eodem modo. Brastica etiam syluestris cū melle imposita auxiliatur. Similiter & folia isatidis, & marrubij cum ordeacea farina ex posca. Cardamomum cum caricis. Cyclaminus cum caricis ex aceto decocta. Cataplasma optimū. Fœni græci tritentem, farinæ ordeacæ quadrantem, cardamomi unc. i. caricarum pinguium lib. i. uerbernacæ herbæ unc. i. ficus in aceto acerrimo macerato, fortiterq; in mortario cōundito, reliquisq; adiectis ac si mul unitis uitior. Optimū cataplasma & hoc est. Seminis raphani partes ii. foliorum salicis partem i. farinæ arci partes ii. seminis pastinacæ partes ii. in aceto cū pari saporis mēsurā decoquatur. Aliud, ad inueteratum malum, & corpora dura. Corticis radicis capparibus, radicis struthij, sinapis recētis, omnium æquales partes, farinæ tritici duplum ad omnium trium mensuram. Vtere ueluti prædictis. Aliud præclarū ad duritias. Stercus gallinarum album, siccum, cōtusum, ac cribratum cū aceto mulso decoquito, confidenterq; imposito. Vnguentum optimū. Ammoniacy thymiamatis, thuris, foliorū rutæ uiridum, sing. æquales partes cum aceto contere, & quā crassissime illita excicari permittit. Aliud, quod antea quā medeatur non abscedit. Ammoniacy staterem i. thuris staterem i. piperis staterem i.

Ammoniacy cum aceto contere, eodemq; etiā re liqua modo. Aliud. Ammoniacy staterem i. acaciæ stateres ii. aloës staterem i. thuris stateres ii. Apparatur autē hoc modo. Ammoniacy & aloën acethus in aceto macerato, acaciā autē cōtundito, cribrato ac prædicta cōtrita omnia ammisceto. Crocomagma etiam uulter cum aceto illinuntur: sæpe enim nō abscedit priusquā medeatur. Ceterū epithematū medelę magis fidendū. Pleraq; enim eorū quę in medicamentarijs libris referuntur ex alumine & sulphure cōposita, prædemonstratē habent adstrictoriā facultatem. Quare in eis animaduersionem habere oportet, non modo simpliciter facultatis eorū pharmaco rū quæ ammiscuntur: uerū etiā quātitatis ipsius mixturæ. Et enim in plagis quæ fluuiofum habent tumore, & maxime in quibus tumor laxus est, nihil peccaris, etiā si plurimum ex aluminosis aditeris. In tumoribus uero in scirrū induratis emollientem & diffusoriā facultatem præcelere oportet, quib. parum quiddā ex adstringēte sit admixtum. Vnū igitur ex simplicibus & naturalib. ac nulla arte apparatus, diffusoriæ & adstringētis simul est facultatis, ipse uidelicet salis flos, qui splenē in scirrhum indurātū sanatur, inquit Galenus, calidus in uesciā bubulam coniectus, & forinsecus impositus. Oportet igitur medicū ad affectionē respicere, & pro eius ratione tam adde re, tū adimere ex eis quæ in epithematū cōpositionē cōijciuntur, ueluti exempli grata, si duriciem emolli re uelit, ammoniacū & bdellium pingue, ac styracē optimū equaliter uniuscuiusq; drac. iii. ammiscere debet. Si uero crassos humores dissecare uelit, opopanax & costi tantundē addet. Quum autē humores diffundūtur, etiā diffusoria ac digerentia sunt ammiscenda: aut sterco caprinū in aceto dilutū addendū. Hoc enim & crassitudinem dissecat, & simul discutientiū uim habet. Quod si discutere tantum uelit, humoribus uidelicet antea sufficienter attenuatis, nitrū pro stercore caprino ammiscet. Capparibus autē cortex ammixtus ultra hoc quod dissecat & repurgat, etiā splenē corroborat. Habito igitur ad ea quę ubiliter accidunt respectū, aut emollientia augebis, aut attenuantia, aut etiā ea quæ discutit & robur addunt. Optimū autē epithema emolliens & diffusoriū hocce est. Cerae quadrantem, propolis sextantem, galbani dra. iiii. opopanax dra. iiii. Vtere: cōtunditur hoc pharmacū, & strumas recētes, omnemq; duriciem recens obortā dissoluit. Aliud malagma Asclepiadæ, quod articulos incuruatos relaxat. Bdellij pinguis, adipis uulini, ammoniaci thymiamatis, irisidis, cuiusq; drac. xvi. opopanax, galbani, thuris, canchryos, styracis, cuiusq; dra. viii. piperis grana c. lx. cera dra. xlviii. fecis olei irini fixantē ac uncia dimidiū, uini quantū satis est. Arida cōtundito, & cribrato. Ammoniacy, opopanax, thus, bdellium in uino dissoluit, liqueficientibus autē liquefactis, adfusis, ac simul emolliū uitior. Extremē emolliēdi facultate præstat hoc, inquit Galenus, neq; enim aliud magis eo emolliēs repereris: quod si irini olei inopia sit, cyprino aut sicyonio eius loco utor. Aliud malagma Amythaonis, ad præcordiorū distensiones: cōducit & articulis qui difficulter mouētur, omnemq; duritiē dissoluit, & priore quidē minus emolliet, magis autem digerit ac discutit. Cōpositio sic habet. Ammoniacy thymiamatis dra.

drach. x. xvi. ceræ dra. x. xvi. terebinthinæ drach. viiij. bdellij dra. viiij. myrrhæ dra. iiii. thuris drac. iiii. galbani drach. viiij. olei cyprini sexuncem, Myrrham, bdellium, thus, uino præmacerata conterito; ammoniacum in aceto dissoluto: liquefabilia autem liquefacito, affundito, ac uitior. Aliud prædicto longe efficacius, & fortius, inquit Philagrius: dissecidit enim & attenuat inspersatos humores, & uiscosos repurgat. Habet autem hoc modum. Malagma Asclepiadæ. Ammoniaci thymiamatis sexuncem, galbani, myrrhæ, cuiusq; sextantem, ceræ sesqui libram, thuris quadrantem, opoponacis quadrantem, radicis panacis sexuncem, propolis quadrantem, acetis sextarios ii. stercoreis capræ quadrantem. Ammoniacum cum aceto terito, deinde etiam thus, galbanum, opoponaca, & myrrhâ. Propolis autem cum modica cera in mortario tundito: ceram uero cum olei triente liquefacito paulatim donec cogatur decoquendo, & deinde propolis adiecta, ab igne tollito, percolato, ac frigefieri sinito, perpolitâq; tritis adjecto, unito, ac uitior. Cæterum epithema quod ego composui, inquit Philagrius, optimū ad diuturnas & frigidiore affectiones existit. Myrobalani drac. xlviii. ammoniaci thymiamatis dra. xlviii. bdellij drac. xlviii. scythicum uero bdellium maxime probe, corticis radicis capparis dra. xlviii. mannæ dra. x. iiii. opoponacis dra. viiij. styracis drac. iiii. uisci drach. xii. ceræ drach. x. iiii. floris salis drach. xlviii. Ammoniacum cū salis flore dissolue: capparia uero, myrobalanum ac mannæ cum aceto reliqua autem iuxta ignem emollito & in mortario tūdito, & trita eis adjecto, unito, ac uitior. Hoc pharma cum splenem consumit. Aliud. Verbenacæ uiridem cum manna terito, atq; axungia suilla ueteri excepta imposito. Dura enim corpora & diuturna malo affecta quam maxime inde iuuantur: reliqua uero integre sanat. Prodest etiam uerbenaca perse imposita, itemq; trixago. Aliud epithema Asclepiadæ, ad splenicos, consumit tumores. Foliorum sambuci tenerorum lib. ii. aloës pinguis lib. i. cum aceto terito ac lenito, linteoq; excepta imposito. Verum si malum recens est, uniuscuiusq; par pondus coniungito. Aliud. Seminis ericæ libram i. galbani lib. i. Semen contusum & cribro excussim galbano excipito, rursumq; tundito olei irini fece addita, quo malagmatis formam acquirit, & linteo lo inditū imposito. Vniuerso autē uiscere, recrementisq; eius, atq; meatib; opportunis, per emollientia, repurgantia, dissecantia, attenuantiaq; & diffundentia humores, ampliusq; etiā per ea quæ uias dilantant, tum in potu accepta, tum foris imposita preparatis, efficacius euacuare poteribus est utendū, ac primū quiddē simplicioribus, postea uero etiam fortioribus, ueluti exempli gratia: primum quidem epithymi drachmas iiii. cū seri lactis heminis v. præbeto. Dato autem eis epithymi drachmas iiii. tenuissime tritas cū modico sero, atq; ubi uenter operari inceperit, serū per se paulatim absorbendū exhibeto. Cæteri post aliquot dierū interstitiū, ubi uires recollerint, hiteram Archigenis ex colocynthide præbeto, aut quæ lusi appellatur. Post horum autem omnium usum, farinæ tenuissimæ radicis cyclamini sicæ drac. iiii. aut iiii. ex aqua mulla dato, atque quo sudorum exclusionē iuuēs, ggrū uelamentis cōregito, & in lecto

cōcalefacito. Epithemata disculforia & resicantia. Postquam corpus fuerit repurgatum, epithemata quæ digerere siue discutere & resicare possunt, utē dum, qualia sunt quæ ex auripigmento & alumine componuntur: ex quorum numero est etiam id quo ego, inquit Philagrius, utor. Ceræ tyrrenicæ drach. xc. iiii. resinæ pinus sicæ drach. x. vii. resinæ pinus liquida drachmas x. vii. auripigmenti drac. x. vii. aluminis scissilis drach. xii. Metallica terito, & liquefabilia cum modico oleo liquefacito, ac refrigeratis sicca adjecto, unito, & uitior. Aliud aurei coloris. Asclepiadæ, ualde pulchrum. Ceræ libras duas, resinæ pinus sicæ libras duas, auripigmenti sextantem, aluminis scissilis sextantem, calcis uiuæ unciam unā, olei cyprini uncias sedecim, acetū uncias sedecim. Aliud, ad splenicos & hepaticos. Aluminis liquidū, sulphuris uiui, nitri, ammoniaci thymiamatis, mannæ, radicis capparis corticis, singulorum sexuncem, picis libram unam, resinæ pinus sicæ libram unam, olei cyprini sexuncem, acetū quantum sufficit. Aliud epithema hepaticum, Iporeritū appellatum. Resinæ pinus sicæ libram unam, ceræ libras duas, picis libras duas, aluminis liquidū, nitri, sulphuris uiui, mannæ, cuiusq; libram unā, aloës sexuncē, pyretri, aristolochiæ longæ, bdellij, ammoniaci thymiamatis, amomi, uisci, cardamomi, olei, cuiusque quadrantem, acetū sesquiseptarium. Ammoniacum, alumen, sulphur, nitrum, cum aceto diluta terito: reliqua uero arida quidem contundito, ac tritis admisceo: liquefabilia autē liquefacito, atq; reliqua cum eis excipito. Optime faciunt & ex caprino stercore apparatus: plurima eorum quæ ad hydrospicos sunt descripta: & Machæreionis emplastrū, & emplastrum ex rumice, quæ in decimo quinto Sermone referuntur. Phoenigmi, cutem rubefacientes. Efficaciter autem in ipsis phoenigmi auxiliantur, cū quic ex sinapi apparatus, tum qui eis cōsimiles existunt. Cæterum corpore prius à superfluis humoribus euacuato, eos adhibere oportet. Pulcherrimus autē phoenigmus talis est. Phoenigmus Asclepiadæ autemeros, quasi eodē die auxilians inscriptus: qui sanè ab uniuerſa affectione liberat. Pyretri dra. octo, myrobalani, cardamomi, feminis uricæ, piperis, cuiusq; drac. octo, sinapis trientem. Omnia conterito, & aceto subigito, & tepescita ex intervallo per horas tres imposito, si saltem tamdiu sustinere possit: deinde ablato pharmaco lauari præcipito, in seruenioris solij desessu. A balneo autem cerato ex ro faceo apparato utēdum. Alius. Lepidij folia trita cataplasmatis modo imposito, atque ubi morsum sentiūt, in balneum inducito, & ablato pharmaco, in seruētē aquā immitto & perfundito. Difficulter enim ferunt nimis mordacitatem. Sani autem exeunt, inquit Archigenes. Idem remedium & ad coxendicum dolores efficacissimum reperitur. Summe etiā auxiliantur myrobalani cordes & nitrum. Nitrum per se terito, & parum acetū ammisceo, deinde resinam ac ceram cum pauco oleo liquefacito, affundito, emollito, ac uitior. Cæterum quod operæ precium est cognosce, fortia pharmaca non nisi corpore prius à superfluis humoribus repurgato, & probe cōcoquente, adhibere oportet. Smegmata, siue repurgatoria. Oportet autem locum ipsū sensim ad phoenigmorū rubefacientium toleran



tolerandam irritare: quod per repurgatoria smegeta= ta commode fieri potest. Componantur autem smegeta ex staphide syluestri, pterro, pipere, ac alcyonio, parti uel impari modo prout uidebitur coniectis. Quod si teneram carnem habeat æger, iridis, & cypri, & herbæ fabinæ aliquid his ammiscibis: aut farinam aliquam, ueluti erui, aut fabarum, aut cicerū. Quod si etiam odoratum reddere uelis pharmacum, casisæ quippiam & philli ac amomi adde. Si uero durius contingat curandum corpus, ex pumice adde, atque adare. Postremū autem phoenixm ex sinapi cōsimilibusque ueris: corpore prius uniuerso lā superfluis humoribus repurgato: ne uide licet uehementia calor is alia adrahat recrementa, duriorēq; reddat ipsum locum.

*De splenicorum uisione.*

Cap. xii.

Quodd si prædicta auxilia irrita sint, inefficaciterq; adhibeantur, ad uisionē patrociniū cōfugere oportet: ita ut uel per cauteria, uel pharmaca crustas inuramus, & multo tempore saniem effluere sinamus: corpore tamen prius per uenæ incisionem, & purgationem euacuato. Etenim quum ferē in totum uisitatis humoribus splenici sint repleti, & non præuacuetur uniuersum corpus, maligna ulcera ex crustis fieri cōsueverunt.

*Dieta splenicorum.*

Cap. xiii.

Porro diæta ipsorum splenicorum tempore inflammationis simplex sit, & quæ facile concoquatur: ueluti est halica lora, & prisanæ succus, panis madefactus. Si uero inflammatio diuilius remoretur, etiam autularum carnes eis concedendæ, & pisces petrosi aqua degenes. Vbi uero schirrhos sit perfectus, diæta attenuatoria exhibeatur, & acrium rerum comestiones per interualla. Proprie autem splenicis cōuenit caparis comesta ex aceto mulo. Vinum sit non ualde uetus, quod aqua permisceatur, in qua ferrum sæpe ignitum sit extinctum. Plurimum autem fiduciæ in exercitamentis ponendum, quibus ante cibum uti cōuenit, corpore superfluitatibus non abundante. Ex eorum autē genere ex superabundanti faciunt deambulationes et cursus: & noui sanē aliquos, qui ex his solis ab omni affectione sint liberati: gestiones etiā omnes conueniunt, proprie autem quæ sit in equo. Manifestum autē est quodd uociferatōis quoq; oportuna & in tēpore assumptæ eis summe opitulatur.

*Cura eorum in quibus splen frigida, uenter uero calida affectione laborat.*

Cap. xiiii.

Cognitū uero necessarium est, quodd in aliquibus splen frigidam intemperiem habet, & ob id caliditatis opus habet: uenter autem bile agitur, & contrariam spleni sustinet intemperiem: aut etiam citra priuatam affectionem, ex maiori qui bilem susceperat, flauam bilem assumit: & absq; hoc etiā, sæpe ob ægram concoctionem & ciborum in uentrē corruptionem splen afficitur: etenim aliquando quū frigiditatis sensus cum grauitate circa splenem percipitur, uenter biliosum uomitū reiecit: tunc equidem difficilis cura nobis instat, & quæ difficulter procedit: mirū sple ne calor is fortim expeccet: uenter autē atq; etiam uniuerso corpore refrigeratione indigente, atq; id uno & eodē tempore. Quo igitur quantum possibile est ueriusq; mēbri affectū effugiā lesionē, pro uisibus conabimur ut eos lā tristitia & cura, itaq; & uehementibus motibus, multa item inediā ac cibi auersione

auocemus, simulq; per ea quæ citra molestiā purgāt pharmaca, biliosum humorem euacuemus. Os uero uentris firmemus ac corroboremus, ne quid eorum quæ ex reliquo corpore ad ipsum influunt, susceperet. Cæterū corroboratio ipsius per ea quæ difficulter corrumpuntur, contingit, de quibus in secundo mentionem fecimus Sermone. Suffecerit autem ipsis exhibitiō modici panis cum oliui albis aut colymbadibus appellatis, citra potum, si balneum & prandiū differant, ne bilis effeatur. Melius autem est si prius quam bilis effeatur, ieiuni lauent. In prædio cibi eis præbeantur tum quantitas tum qualitas moderatæ: uerum ut splen illæsus permaneat, conuenit primum boni succi & actu calidos præbere, ac deinde postremum tum actu tum potentia frigida porrigere, ueluti lactucam & frigidum potum, ac similia: non frigida enim frigidis præbuitrata splenem illæsum ab his quæ postea ingeruntur frigidis, conseruant, ex quibus os uentris corroboretur, & calida ipsius intemperies corrigitur. Optimum igitur fuerit postremum omnium mala punica, aut etiam alia, aut pira, aut quedā quæ stomacho grata sunt accepta re: atq; eodem omnino modo etiam cœnam institueret. Conuenit etiam per ea quæ forissecus imponuntur hoc modo affectis opitulari. Refrigerant autem uentrem citra nocumentum forissecus imposita, oleum melinum & rosaceum: cerata item ex iisdem apparta, modica mastice ammixta, aliquando etiā oleo addito omphacino. Calidus itaq; uenter per prædicta lenitur. Ad splenē autē calefactiā adhibenda sunt, qualia sunt epithemata poliarchia appellata.

*Cura splenicorum quos tussis infestat.*

Cap. xv.

Quodd si tussicula splenicum infestat, si nūq; eiusdem generis adfectiones circa uentrē uiscera, ueluti si contingat & splenem & pulmonem eodē tempore crasis ac uiscosis humoribus aut aliquo alio frigido morbo detineri, tunc sanē podagricum pharmacum ex ossibus cōstans, uehementer utile tum spleni, tum eo modo tussientibus existit, & antidoti quæ eis similes habentur. Si quidem igitur similes contingerint adfectiones, similia remedia adhibere oportet: ubi uero diuersæ erunt adfectiones, diuersis pharmacis utendū est: ut si uisore si splē lā crasis & uiscosis humoribus, & frigidis liquoribus adficiatur: tussis autem a tenui & acri destillatione contingat, si modo possibile fuerit, & destillatio non urgeat uehementer, phar macis fluxum cōdenantibus abstineret cōducit, ueluti est quod ex papaueris calicibus constat, itemq; ex seminibus pastillus, & quæ his similia existunt. Vehementiore autem & aciore existente destillatione, & quæ periculum exulcerationis pulmonis mineat, utendum quidem ex papaueris calicibus confectione, uerum spleni epithemata attenuatoria imponantur, atqui nisi magna impendat necessitas, ea quæ stupefaciunt uisatē, capiti autem aliquis ex seminibus pastillus cum aceto rosaceo ad frigiditatem crassitudinem redactus imponatur: præstat autem ex ipsis in hoc præferendi usu, hi qui crocei appellantur. Cum aceto enim & rosaceo oleo triti, & ad frigiditatem spissitudinem redacti, lanaq; conuoluta excepti, ac incipiti impositi, tenuitatem destillatōis inspissant, simulq; exurentē & acrem in capite qualitatē refrigerant, tussis sedant, & somnū suauem inducunt. Post hæc autē theriaca per opium recens apparta

apparata in potu accepta, cuius ientibus quibus simul splen affectus est, auxiliatur.

*Cura eorum quibus splen in magnitudinem excrescit, simulq; durus exiit.* Cap. xvi.

Quidam ex splenicis immodice autē splenem habēt, ut non solum hepar & inguina contingat, sed & ob soliditatem attollatur, vitalesq; cordis vires maxime laedat, ac imbecillitatem inducat, utq; ex eo uniuersum refrigeretur corpus, ipsumq; adeo hepar tenuissimum & aquosissimum in ipsīs fiat, & eiusmodi quoq; sanguis. Horum sanē qui hoc modo sunt affecti curā reculare oportet; quod si cogamur tamē, à dubijs & hebetibus remedijs auspicabimur, periculo eis incumbente prædicto. Verū neq; intra corpus sumendum, neq; forinsecus adhibendum, ullum aliud quod uehementē pharmacum offeremus; neq; euacuationem etiā coaceruatim faciemus, sed paulatim & per simpliciorum medicaminum usum. Cæterum tum per os exhibitis, tum foris admotis, & quantum possibile fuerit conuenienti diætā, uirium imbecillitate refocillata, si in medius proficere ipsos uideamus, fortioribus omnino remedijs utemur, ita tamē ut sensim aucta ipsa apponamus.

*De ictero seu morbo arquato: ex libris Ruffi*

*& Galeni.*

Cap. xvii.

Icterus à similitudine ad animalculum, quod ictis, id est, uiuerra appellatur, nominatus est: est autem muftela syluestris, quæ auricolores oculos habet. Verum icterus morbus biliosus humoris circū corpus effusus est, ob fecerentis eum facultatis debilitatē, quæ eum segregare & ad proprios excretionis locos demittere nō ualet. Errare autem eos credendum est qui hepatis affectionem in omnibus icteridis adesse putauerunt. Conspicitur enim sæpe, quum hepar nihil male est affectum, flauæ bilis ad cutem effusio facta in iudicationibus morborum. Cōspicitur etiā circa febrem aliquando sanguis in bilem exagritatus per corruptionem uidelicet aliquam peregrinā: quā illis quoq; à uenenatarū bestiārum moribus continēgere consuevit: etenim qui quisplam à uipera morsus esset, uniuersum corpus præsini siue porraci coloris habuit, & quū assidue theriacē bibisset, celeritate sanatus est: quare nihil mirum est, talem aliquando contingere humorū in corpore permutationē, ut uniuersum corpus icterici colorē assumat. Quin & fieri potest ut propter naturalis temperiei ipsius hepatis mutationem, eiusmodi humorū corruptio contingat, ut aliquando herbis pallore albican- tibus totum corpus manifeste assimiletur, aliquādo etiā plumbi colorē induat. Quemadmodum etiā eiusmodi colores nigricantiores sunt, si ob splenē quam si ob hepar affectum contingat. Splene scilicet ad attrahendum ad se ex hepate atræ bilis humorem, & ad repurgandum sanguinem pro more suo debilitato. Fit autem aliquando icterus ob imbecillitatē uescic bilis susceptricis, quæ biliosum humorem, uelut cōsuevit, in sese ex hepate non attrahit, & ob id impurum sanguinem relinquit. Possibile est etiā eam nimis repleri, aut repletam propter repletionis multitudinem non posse euacuari. Aliquādo autem & propter obturationem aut debilitatem uenarum, quarum ora ex ipsa ad hepar deferuntur, biliosum humorem non adtrahit. Quare in icteridis affectionibus recrementorū figura necessariō con-

sideratur, quum in aliquibus multum colorata per flauam bilē appareant recrementa, quemadmodum etiā in alijs urinæ. In quibus enim ratione iudicationis bonæ in febribus, biliosus humor ad cutem prorumpit, his & recrementā & urinæ naturalis modus se habere uidebuntur. Quibuscumq; uero circa febres, unā cū grauitatis aluius aut doloris sensu circa dextrum illū, arquatus cōstigit, in his uescic bilis susceptricis obturationem factam esse putandum est. Quibus autem neq; grauitatis neq; doloris sensus circa ilium adest, in his splenem uisitati humoris causam esse iudicabimus. Si autē neq; dolor neq; grauitas circa illa infestet, neq; febris præcessit, & tamen sanguis in uniuerso corpore in bilem mutetur, atq; ita arquatus contingat, his pruriginosior cutis fiet, & magis etiam arefcet. In quibus uero atq; bilis humor unā cum sanguine ad cutē est delatus, hi omnino grauius afficiuntur. Consequitur enim ipsos tristitia præter rationem, & mordacitas eorum quæ circa uentrē sunt, difficultasq; spirandi, & cibos auersantur, & nigra lotia excernunt. Aliquando autē & per interualla quadam corpora ipsorum tepescunt: stercora uero chalcanti colore referunt, & aluus magis his resiccatur. Cæterum eos qui ex pallida bile arquatum contrahunt: nulla mordacitas eorum quæ circa uentrē sunt cōsequitur, neq; etiā in tantū auersantur cibos: sed obtusior tamen aliquando fit in eis ciborum appetitus, & stercora quidem albidā egeruntur, urinæ autē croci coloris, turbatæ tamen & tenebras referentes permanent. Communiter autē omnibus icteridis pigrities & tumor grauians ad morum corporis contingit, & ad dulces cibos animi habent alienarum: amaros uero non admodū auersantur, & uarijs imaginationibus uexantur. Prurius etiam uniuersi corporis comitatur, & difficulter exudant. Porro alba oculorum & partes faciei teporib; propinquæ, itemq; malæ pallorem ostendūt: uenæ etiā sub lingua repletæ reperiuntur, & abundantem humorem significant.

*Cura arquati.*

Cap. xviii.

Arquati igitur qui ratione bonæ iudicationis febribus perfectē soluti sunt, facillime sedantur: si ægri lauari cras aquarū dulcium uuantur, ac olei disculforij per frictionē, omnibusq; quæ rarefaciunt cutem: qualia sunt oleum chamæ mellinum, anethinum, irinum, gleucidum, amaracinum & rosmarinus herba oleo incocta ipsum plurimum disculforium facit. Diætā quoq; uniuersam humidiores in his constituere oportet, & ut mediocriter humorum crassitudinem attenuare possit. In reliquis autē icteridis duo maxima remedia principatū obtinent, sectio uenæ, & purgatio. In quib; igitur multitudo sanguinis unā cū bile in toto corpore abundat, & quos circa hepar aut splenē dolor aut distensio infestat, nihil uenæ incisio ne cōmodius fieri potest, si nulla alia res id facere prepediaris: particulatim autē & per uices sanguis est detrahendus, ne per coaceruatam euacuationē vires ægri prosternantur: neq; uero inepte clyster adhibetur, si uenæ sectio impediatur. A uenæ autē incisio etiā commodē clyster assumitur, qui propter stercoreum euacuationem spirandi facilitatem inducit, in testinā irritando ac mordendo, humores ad curis superficem delatos, ad ipsa retrahit & reuclit. Purgatiōes autē magis propriæ & familiares huic morbo existunt,

existunt, inquit Rufus. Cæterum eduljis ac potionibus itemq; pharmacis, humores prius attenuare oportet, oburationesq; deoppillare, atq; deinde pharmacum exhibere quod flauam aut nigrâ bilem ducit. Sint aut purgatiões iſtericis exhibendæ fortiores: ob ventris enim ſiccitatē, imbedilliores, inefficaces in iſtis cognoscuntur: quare in principio purgare non oportet, priuſquā per deopplantā bilis attenuetur, & quodam modo ad inteſtina reducatur, maxi- mi namq; malī cauſam, purgationes in principio datæ præberunt. Itaque conuenit primum deop- pilantibus mox dicendis uti, atque ubi attenuatio humorum ac deopillatio fuerit facta, tum deſſi conueniens, & forte (ut dixi) pharmacum purga- tiuum eſt exhibendum. Quod ſi primo purgatio pharmacō nihil proſiciat, rurfus forte aliquod deop- pillatorium pharmacum bibendū præbe, & poſt triduum rurfus uolentius poſſo ſecunda uice purga- to, inquit Rufus, ut etiam ad finem purgatiōis unā cum uehementiſſima mordacitate bilis excernatur, quæ cærulea magis ſit quā flaua. Ego itaque eu- phorbium epiſthimum, aloē, petroſelinum, & dau- ci ſemen miſceo, ac iſtericos purgo. Optime etiam ipſos purgat hoc. Piperis longi ſcrupulos nouem, piperis nigri ſcrupulos quinque, ſcammonij ſcrupu- los ſex, ammij ſcrupulos quatuor, ſeminis ſoenicu- li ſeſquiſcrupulū, ſeminis apij ſcrup. iiii. & dimidiū, caroi ſcrup. iiii. aniſi ſcrup. iiii. mellis quantum ſatis eſt, quo ad ſtirgimentū crāſſitudinem re- digatur. Datur, nucis ponticæ magnitudine cum co- chleari aceti albi & aquæ calidæ tantundem. In me- lancholicis autem ad prædictū dimenſum farinæ epiſthymi ſcrup. iiii. addere oportet. Vehementer commodum & hoc eſt. Colocynthidem magnam ſuperne perforato, electoq; ſemine id quod inſtar tomenti in ea eſt ſinito, ac uinum uetus dulce inſun- dito, & pernoctare in ea permiſſito: mane uero per paniculum detritæ uetiſſiſſime percolato, & uinum calefactum hiſ qui flaua bile abundant bibē dum præbeto. Ad melancholicos autem epiſthymi ſcrupuli ſex in uino dulci præcoquātur, id ipſumq; uinum colocynthidi inſundatur, ac ut dictum eſt, bibendum præbeatur. Cydamini quoq; radix tri- ta potata, poſt deoppillantiæ remedia, aptiſſima eſt ad uiscera repurganda, & ad bilem in uniuerſa cute excludendā per ſudorem: quare poſt ejus potione, ſudorū excluſionem per ueſtimenta ac concalēſa- tionem in lecto ſuare oportet. Dantur autem ad ſummum ex ea drachmæ quatuor ex aqua muſſa. Quod ſi inflammatio circa partem aliquam uicerū ſubiaceat, primum irrigationibus & cataplaſmatis utendum eſt, & poſt ea ceratis & epiſthematis ad ui- ſcerum inflammationem præſcriptis. Præſtat autem farinæ ammiſcere roſmarinum herbam, florem ſu- ci odorati, abſinthium, artemiſiam, abrotanum, ru- tam, cardamomum, chamæpityn, ſcordium, poliū, ac chamædryn. Hæc enim ſingula ammiſta urinam cient, quod morbo maxime conducit, & uisceribus inflammationis prodeſt. Cucurbitulis etiam utendum, hepate quidem aſſecto inanibus, & aliquando cum ſcarificatione: ſplene autem aſſecto omnino cū ſca- rificatione: inanēs enim ſplenē nihil ſuauē. Pharmaca autē quę in potu accepta ab obſturatione iſtericos li- berant, maxima ex parte urinā cient, uelut eſt apij de-

coctum, & adiant, ac ſimilia: Vtilis eſt & abſinthij cremor per ſe, & cum nardo indicā, ac ſunci rotundi odorati flos. Item pulegij decoctum, & calamim- theſer uerbenacæ rectæ ac oxallidis. Eſt autem oxal- lis rumex acri ſapore, ſuluis ramulis & folijs, cauſe quadrangulari eoq; ſemine reſerto, pallida radice: hæc ſane per ſe comēſta, & radice decoctum ad ter- tias redactum ac potatum celerrime auxiliatur. Pro- deſt etiam rumex ſatuius, & anchufæ radix, rubiæ radix, chamæpityos, roſmarini, & ariſtolochię. Miri ſice etiā prodeſt, ſerpillum, hypericū & eius generis plurima alia. Singula hæc in aqua ad tertias decocta cū uino dulci bibenda præbeto, aut cōiuncto & cri- brato, ac ſingulorum drach. i. dato. Præclare quoq; facit corticis raphani ſuccus, uino meraco dulci per- mixtus aut uino muſſo: ita ut ſucci cyathi duo, uni uini cyathō contempentur. Datur item ualde com- mode cichorij & ſeridis ſuccus, ſebrentib, quidem per ſe, febre carentibus cum uino, braſſicæ item ſuc- cus eodē modo, & cornu ceruini ramēta cochlearij meſura, petroſelinum, aniſum, aſarum, rheon: cō- modiffimum autem eſt chamæmelon, quæ & leucā themos adpellatur, itemq; buphthalmum. Aliud multū experimenti. Spumæ natri albæ drachm. du- as, in uino ueteri dulci macerato trium cyathorum meſura, & per totam noctem ſub diuo ponito, & ad triduum aut quatuoriduum bibendum præbeto.

Aliud præter opinionem. Vermes terrenos co- ctos ac cum myrrha troglodytā tritos, in fabæ magnitudinem ex paſſo aut uino muſſo dato, & po- ſtera die iſterum per lotium eſciant. Idem faciūt & abſq; myrrha dati. Exhibeto hoc ad triduum, ac utere cōſidenter. Paſtillus iſtericus, qui iſtericis, & hepa- tics mirabiliter cōducit. Amygdalarū amararū re- purgatarum drac. iiii. aniſi, comæ abſinthij, cuiuſq; dra. i. ſpicæ nardi dra. i. aſari dra. i. cōiuncto & cri- brato reliqua, amygdalas autē cū aqua terito, & pa- ſtillis informato: ex quibus dra. i. febre carentibus ex uini muſſi cyathis iiii. præbeto. Ceterū pharmaca quę in potu accipiuntur, omnia ſi fieri poteſt, in bal- neo exhibeātur, ubi ægri in calidū lauacrum cōſcen- dere parant. Plurimum autem diætæ uſurium reſocil- latrii intētum eſſe oportet, per quam uis diſcretua reparatur, & ſi quod membrum læſum ſit corrobo- ratur, ac præſens coloris corruptio repurgatur: quæ- propter conueniunt exercitiāmēta, & geſtationes, & inunctiones ac exudaſiones, ita ut ad pyriæria, hoc eſt, uaporaria ſicca, & ad ſolē, & in balneis quoq; corpus natri puluere uſti, ac uini ſece arida uſtaq; tenuiſſime trita deſtrictum. Optimū autē & ſerpyllū & thus pari modo cū oleo illita. Roſmarinus iſtæ herba in oleo decocta, ſi oleum illinatur, prodeſt. Ci- bi autem omnes incifoſij ſint & attenuatores, & qui cūq; inter attenuatoria edulia prædicti ſunt in ſecun- do Sermone: ex uolucrum quidem genere, mōrang: ex piſcibus uero, g. petroſis aquis degūt: ex oſtreis, herinacæ recētes. Olera uero ſint quę magis urinam dēt, præſertim ſeris, intyba, aſparagi paluſtres, ſmyr- nium, carduus, eryngium: ex ſariis autem conuenit braſſica & aſparagus eius, raphani, allia cruda & co- cta. Carnes autē ſerinae manſuetis magis ſunt aptæ: pro liquamine ſeu embāmāte, ualet acetum in quo, ſilla & ariſtolochia ſint macerata. Aſructibus abſti- nendum. Bellaria ſint amygdalæ, ſed modice ſuman- tur, &

tur, & cicer modicū torrefactum. Ex leguminibus cicer assatum, & maxime decoctum ipsorum assidue potatur. Ieiunium autem citrium comedat repurgatum. Vinum conuenit album & subadstringens, neque ualde uetustum: ubique autem mediocritas optima censetur. Quod si quippiā ex istero circa faciem & oculos relinquatur, urinæ autem appareant puræ, aliusque cōsuetio more egerat, & appetitus in nulla re obstat, neque infestis sitis: & ut compendio dicā, quum omnes prædictæ accessiones fuerint sedatæ, & tamen circa oculos uitiatu color relinquitur, narium infusis utendum: fortissimū autem omnium est elaterium cum lacte muliebri infusum, & facti & cyclaminī succus, & melanthium cum aceto: debiliior his est anagallidis succus, & succus radicis betæ. Depurgat autem cyclaminus crassissimū mucum: elaterium autem pisuitum & bilem. Omnium autem efficacissimum ad eos reperi aramentum sutorium lacte muliebri dissolutū ac naribus infusum: inde enim bilem large ex naribus destillantem ut debis. Oportet autē postea probe dilutam in ore detinere, dum infunditur hocce pharmacum. Præstat tamen primū cyclaminū infundi, quo crassa per eam euacuetur, & postea ipsum sutoriū aramentū.

De malo corporis habitu, Archigenis. Cap. x. x.

Quum corporis habitus in aquositate diffunditur, cachexia, id est, malus habitus à Græcis appellatur, in quo uniuersa corporis miscella laxior fit ac emollescit, quod maxime ex somno inæqualiter contingente fit manifestum: corpusque ipsum totum cum uirore albicans redditur ac inualidum, ita ut crura inter eundem uacillent, & in principio quidē concoctionis impediuntur manente etiam dum appetit: postea uero & fastidium accedit, & respiratio ipsis fit rara ac debilis, quæ moribus & actionibus condensatur. Alius etiam inæqualia excrementa excernit. Hæc affectio ut plurimū ex longo morbo congregatur: iam uero & ex uiscere quopiam in scirrhum indurato cōsequitur, maxime hepate & splene neque raro in dysenteria diuturna & affectionibus coeliacis contingit, ob consuetam item aliquam cohibitam excretionem. Capluntur autem hac affectione maxime senes, qui etiam maxime liberat: imo & pueri, qui facile pereunt, propter uitalis firmitatis debilitatem, & quod ob cutis raritatem succi in eis facile transpirant. At uero qui in uigore sunt, raro incurrunt, & facile se inde extrahunt. Quod si diutius adsit malum, in aquam inter cutem transit. Quod uero ad curam attinet, si quidem ex consuetæ excretionis cohibitione affectio cōtingat, ad mouere ac irritare eam ipsam excretionem oportet: aut uenā incidere in cubito, si nihil sit quod id fieri præpediat, paulatim ac partibus uicibus per triduum sanguinem detrahendo. Si uero uenæ incisio impediat, conuenienti medicina depurgante ipsos purgare oportet, & maxime ex hiera Archigenis ex eo lycynthide apparata. Quod si hepar sit adfectū aut aliquod aliud ex uisceribus, medelam adhibere his ipsis conuenit, per auxilia ad singula ipsorum super præscripta. A localibus autem remedijs, ad diætā uiribus reparandis aptam transeundum, per quam spes est eos qui huic malo sunt impliciti ad restitutionem in integrum perueniunt. Diætā autem qua uires resodillantur in moderatis deābulantibus

bus confistit, gestationibus, uociferationibus, & defricationibus siccis per lintheola ex lino crudo, deinde per inunctionē ex oleo, cui quædam quæ humorem resiccant sint infarsa, ueluti sunt nitrum & sales. Postea uero & exercitiætia moderata conducunt. Ad lassitudinis autē curationem balneum per interualla quædam adhibeatur: quod si quis ad frigidæ lauacrū aduersionē possit, compedio ad omnē malī curationē peruenerit. Aquæ item quædam naturales calidæ robori ac uiribus reparandis conducere rint, quales sunt aluminosæ, sulphurentes, ac nitrosæ. Mirabiliter autem ipsos iuuat assidua absinthij preparatio, & adhibiti dropaces. Cibi eorū sint simpliciter, & qui facile cōcoqui possint, parum conditi oleris uidelicet gratia: si quidē opus sit per ipsa urinam cedere, & aluū submollire, Vinū conuenit eis album, tenue, odorum. Bellaria omnia uiuent, omnia item nidorosa, & graueolentia: humoris crassi, & uiscosa, & quæ difficulter concoquantur, à cibis eorum sint aliena.

De hydropse, siue aqua inter cutem. Cap. x. x.

Hydropsis differentiat tres funtalius enim affectus, ab utre appellatur: alius tympanites, à tympano: & tertius farcites, aut iuxta carnē, hoc est, subter cutem, à Græcis etiā leucophlegmatias nominatus. Acries igitur fit, quū inter pelliculam peritonæū appellatam, & intestina plurima aquosi humoris collectio cōtinuatur, ut uere utris modo pellicula ipsa repleta esse uideatur: aliquando uero ubi peius habet ægri uisus ac scemora tumor productur, quando sane ascitæ & farcitæ hydropsis cōplexus factus appareat: unde aliquando quidem pedes inflantur, aliquando naturali modo habent. Tympanites uero flatus aëre replet ac superflui plurimā collectionē in ipsdem uētri incumbentibus locis facit, ut in principio sola inflatio esse uideatur: postea tamen flatus inspissatur, & ueluti nubilus redditur, atque ita unā cū flatu, quasi nebulosus humor consistit ac congregatur. Inferit autē tympanites multā circumtensionē, atque in ipso etiā usque ad scemora & pedes tumor procedit. Porro farcites per omnē corporis coagmētationem ac miscellam humorē disseminat, ut instar spongiarū aut papyri uniuersa caro permadefacta appareat: atque ob id totum corpus similiter ut illa intumescit, ac mortuo simile euadit. Cōmunitur autē omnis hydrops spirandi difficultatē, & tumorem, & grauitatem, & uisatū colorem inducit, ex uirore nimirum albicantibus ægris: fastidiunt etiam cibum, potum autē largiorē plurimū appetunt, maxime qui ex asferte laborat. Et enim humor qui in locis detinetur, falsus est, & putrefactus, quare & sitis & febris augescit: ferē enim in totū plurimū ex hydropicis febriūt. Cōsequitur autē aqua intercus omnes morbos qui habitū corrumpūt: una est enim ad hydropē aptitudo, coagmentatæ corporis miscellæ demollitio & ruina. Contingit autē hæc aut ob superexcellentiē hepatis frigiditatem, aut ob aliqua alia mēbra uehementer refrigerata, quæ hepar in eandē dispositionē deducere ualent: citra enim hepatis refrigerationē impossibile est aquā congelari, et aliquid in hydropē incidere. Coafficitur autē hepar spleni refrigerato, alioque & intestinis, maxime his quæ iuxta ieiunū intestinū sunt, pulmonibus & renibus, ac septo transuerso. Cōgregatur etiā ex immodica hemorrhoidū

euacuatione, aut ex fluxu muliebri, aut ob menstruum retentionem, aut ob aliam quādam magnam uulue affectionē. In his enim omnibus nulum præter naturā tumorem hepar habere conspicitur, & tamē aquæ inter cutem morbo corpus apprehenditur, ex sola refrigeratione hepate in his in principio affecto: post uero aliquando & durum fit, quod palam in illis uidere est, qui ex intempestiua frigida aquæ potione hepar acruarum refrigeratū habent, ut statim aquæ suffusionem operetur, priusquam ipsum in scirrhum tumore eleuetur. His autē qui ex frigida potu aquā inter cutem incurrunt, uehementes ciborum appetitiones sunt, propter oris ipsius ueteris frigiditatem. Mulier autē & à podagra & coxædico dolore uexata, aquā inter cutem inciderūt. Frequentissime autem eos qui cibum nō sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, itemq; ab arguto infestati, hydrops consequtur, coeliacā item affectionē & dysenteria. Notum est etiā quosdam qui ex recta spiratione quam orthopnoeam uocāt, in aquā inter cutem sunt deducti. Ceterū huic affectioni nō minus foemina quam uiri sunt obnoxii: pueri uero ut plurimū ab hydropse farcite apprehenduntur. Est autem tympanitis omnino periculosus, minus eo ascites: adhibetur enim in eo pertusio siue punctio, quam paracætesin Græci appellāt, & reliquis quoq; remedijs promptius quam ille obedit. Sarcites quoq; aliquando curabilis fit per ea quæ cuti adhibentur humore detrahentia ac resicantia pharmaca. Omnes autē inueterati hydropes & qui iam habitu corruptum, sunt periculosi. Fiunt etiā aliquando bullæ inter peritonæum pelliculam & intestina, figura uesicæ similes, & serosum humorem continentes: hæc ipsæ sanè per fluctuationes quasdam in aquales depræhenduntur: nimirum propriū locum secundum lineamenta quadam distributum ac uelut circumscriptum, in quo humore tenentur.

*Ascite ac tympanite hydropis cura.* Cap. x x i. Quum itaq; difficilis sit, quædammodum prædictū est, aquosæ affectionis cura, plurimo artis auxilio opus habet: in his igitur qui febricitant hydropicis febre intermittente curā faciemus: itaq; cataplasmata ex farina ordeacea, althæaque ac caricis ipsis adhibebimus, ita ut in tympanite quidē magis ex feminibus flatus discutitibus cōmiscamus: in ascite uero magis ea quæ euacuat humore. Cæterum post principii efficaciora sunt cataplasmata quæ pro ordeacea, fabacea farina sulcipitū, itemq; eruinā, cuiusq; parē mensurā, coquantur autē cū muria, aut aceto mulso. Præstat etiā loliacea farina cū caricis, & absinthio, hyssopoq; & origano ex aceto mulso: itē bulbi cū melle: aut armentariæ bouis sterces ex posca siue aceto mulso: habeat autē quartā partē sulphuris utui inspersam, admirandum hoc est, ac minime prætereundū. Valet & caprinū sterces in pueri incorrupti, & uenerē nondum experti urina impositum: humorē enim per uentrem euacuat. Valet & lupini farina, aut hedere folia trita & uino decocta: aut siccū partes duæ cū cupressi coma, & nitro: aut lens palustris in sigillino uase delicata, trita & imposita, aut cochleæ crudæ cū carne sua tritæ impositæ: non enim priusquam humor defecetur discēdūt: aut alumen plurimū seu caprino exceptū im-

pone: aut caricas, nitrū, castorium, marrubium, aut filicem in pila contundito, & raphanos donec collisquescant coquito, deinde simul terito, & farina ordeacea adiecta, cataplasmatibus modo imposito. Cataplasma optimū ad ascitem. Lathyridū partes iij, squamæ æris partē i, radicis chamæleonis partes iij, coquantur in aceto mulso in quo adeps taurinus sit præliquatus. Aliud optimū ad ascitem. Stercoris columbini partē i, stercoris caprini tantundem, bulbophthalmi herbæ tantundē aut leucanthemi, hæc tula in acerrimo aceto ac melle coquātur. Aliud. Salis fossilis partē i. salis cappadocici partem unā, lathyridum contusarū partes tres, coquantur simul aqua marina aut sulphurenta. Optimū est hoc pharmacum. Sensibiliter enim uidebis materiā euacuatam, & tumorē discussum. Aliud. Rhois quo tinctores coriorū utuntur sextariū i, pollinis frumentacei aut loliacei aut farinæ fabaceæ sextarium i, thuris quadrantē, aluminis scissi quadrantē, imposito cū aceto mulso hydropicis, splenicis, dysentericis, ac coeliacis. Aliud. Radicis cucumeris agrestis unc. xvi, siccū pinguium unc. xvi, radicis althææ unc. xvi, Radicem unāquamq; per se tundito ac cribrato: ficus uero cū uino coquito, ac probe terito, siccaq; trita inspergito. Vitor, per aluum enim humorem edutur. Aliud. Elaterij, staphidis syluestris, succi hyssopi, fellis taurini, siccū. Omnia in mortario tundito, subigito, ac uitior. Poteris & prædicta in secundo Sermone cura uti, de diuersis uidelicet terræ differētijs. Cataplasmata, quæ magis ad tympanitem faciūt. Farinæ fenigræci, farinæ ordeacæ, uirgularū rubi, comæ absinthij, foliorum rutæ, seminis apij, cumini, sisonis aut ligustici, mellis, & uini, & olei. Aliud, ad hydropicos inflatos. Panis cōtusi sextariū unum, cumini sextarij quartam partem, samfuci quadratē, pyretri sextantē, euphorbij unciam unam. Cū uino mulso uniuersam spinā & aluum usq; ad mamillas & pudēda cōtegitur, alterisq; diebus soluūt, atq; id quāquies aut sexies facito. Ego pro euphorbio struthion conieci. Vnguentū Apolloni. Stercus accipitris cū syluestris brasicæ succo alsidue illinito, mirifice facit: uerum melius fuerit si aequale sterces ammifueris. Aliud. Laterem diligentissime instar uasis sigillini assatum cū hyoscyami aut plantaginis succo terito, & quā crassissime ad solem frequenter illinito. Vnguentum ad hydropicos. Radicis cucumeris syluestris, radicis bryoniæ, utriusq; libras duas, staphidis syluestris sexuncæ, nitri sexuncem, olei libram unam, aquæ marinx sextarium unum. Quod si non addit aqua marina, pro ea muriam cōiuncto, resinæ à nauibus unā cum cera derafe, apochyma Græci appellant, libras tres. Radices tenuiter cōtundito, nitrū & staphidem terito, & per triduū madesacito, deinde usq; ad aquæ consumptionem coquito, percolato, & apochyma adijcto, quo liquefacto uitior, ex eo sæpe illinens tumorem.

*Epithemata hydropica.* Cap. x x ii. Adepide. Epithema hydropicis ualde commodum, quod adiacet humore abforderi: quo etiā priuatim, inquit Archigenes, utor. Farris dufini appellatū mo la triti sextarios duos, floris lapidis assij sextarium unū, aliq; autē duos habet, mannæ sextariū unum, diligēter terito, & adipe suillo ueteri probe subactō, & per

& per noſtem in uino macerato excipito. Eius autem quantitas tanta ſit, quanta ad hoc ut ad tactum molle reddatur, pharmacū ſuffecerit. Aliud. Seminis rube ſylueſtris, quod beſa & harmala quidam appellat, contuſi & cribrati ſextariū unum, mannæ ſextarij dimidiū, adipis ſuilli ueteris quantū ſufficit, ut prædictū eſt apparato. Aliud, cui reſtimonium præbet Oriſabius. Foeni græci trientē, farinæ orda cææ quadratē, ſtercoris columbini trientē, reſinæ pinus ſiccæ lib. i. picis librā unā, ceræ lib. i. axungie ueteris libras duas: quæ eliquari poſſunt eliquato, & ad alia in mortario cōtufa & cū aceto trita adfundito. Aliud ex farinis epithema. Picis ſiccæ libras duas, reſinæ pinus libras quatuor, & ceræ libras tres, olei ueteris librā i. farinæ tritici, ordeli, fœni græci, baccarum lauri, aniſi, ſalis, farinæ radicis chamæleonis nigræ, ſingulorū beſſem, uini auſteri ſextarium unum, apparato ut prædictum eſt, ac uitor. Facit & ad hepaticas diſpoſitiones. Ego autē, inquit Aſclepiades, & chamelææ quadrantē adici, & pro triticea farina, irinam admiſci. Pharmacū, quod omnem tumorem generoſi reſecat. Cimoliæ quadrantem, ceræ quadrantē, olei quadrantem, ſalis unciā i. reſinæ à nauibus cū cera deſaſe drach. centū & ſexaginta, farinæ fœni græci drachmas uiginti, ſoliorū braſicæ uiridium quincuncem. Liquefacta reliquis tritis in mortario adfunde. Aliud epithema ualde pulchrum. Stercoris caprini ſextantē, ſtercoris bubuli ſextantē, ſtercoris columbini ſextantē, farinæ fabacæ ſexuncem, calaminthæ, ſalis nitri, ſeminis apij, ſeminis daucis, ſeminis fœniculi, cumini, cuiuſcūq; unc. i. panis aridi quadrantē, mellis ſexuncē, terebinthinæ quadrantē. Vitor. Epithema ex ſtercore caprino ad hydropicos, qui hepar indurātū habent apparatū. Olei cyprini, aut ſi hoc non adſit uetuliſſimi lib. i. i. ceræ lib. i. i. & dimidiū, ſtercoris caprini beſſem, baccarū lauri decorticatarū beſſem, iridis beſe, terebinthinæ lib. i. ſinapis, nitri, cyperi, pyretri, ſeminis raphani, corticis radicis capparis, cuiuſcūq; quadrantem, medullæ colocynthidis unciā unā, fœni græci unciā unā. Aliquādo quidē arida liquefactis inſperguntur: aliquādo uero aceto prius ſubigitur. Ego autem, inquit Aſclepiades, colocynthidis ſextantem adijcio. Quod ſi alius fluat, omnino colocynthidem amoueto: ſtercus autē caprinum ſi quidem aridū ſit, tunditur & cribratur: molle autē & recens aceto dilutum teritur. Malagma, quo Eras uſus eſt: quod imponendum eſt: nec prius amouendum, quā ſua ſponte decidat. Viſci lib. i. lapidis aſij ſexuncem, calcis uiuæ quadrantem, olei cedrini libr. i. Viſcum & oleum ad calidum ac feruentem cinerem coquito, inſperſiſq; aridis tritis, remolſito ac uitor. Aliud. Caricarum pinguiū lib. vi. aut. i. i. ſpumæ nitri lib. i. origani lib. i. ſulphuris uiui quadrantem, cochlearū aphricanarum libram unam. Arida contundito & cribrato, ac ſicis cū carne cochlearum contuſis excipito, & melle cōto ſufficienti adieſto uitor in linæolum inſarſis. Aliud. Radicum braſicæ tenuiſſime tritarū libram unam, calcis uiuæ lotæ librā i. elaterij quadrantē, axungie ueteris libras tres. Ad formam malagmatis reducto, & in linæolum inſarſito, ac per omnem alium imponito, alternisq; diebus ſoluito. Vrinam prolicia, Malagma ipoterium inſcriptum; pharmacum accom-

modatum, ac proſper ſuccēſſus, cuius periculū ſecū, inquit Philagrius, in hydropicis, ſplenicis, & affectionibus inueteratis: deprimat enim tumorem. Reſinæ pinus torrefactæ lib. i. i. i. ceræ lib. i. i. picis lib. i. i. aluminis liquidi, nitri rubri, ſulphuris uiui, mannæ, cuiuſcūq; librā unam, aloës ſexuncem, pyretri, ariſtolochiæ, ammoniaci, bdellij, amomi, cardamomi, uifci, probe ſubacti, myrrhæ, radicis cucumeris ſylueſtris, ſucci ſycomororū, cuiuſcūq; quadrantē, olei libras tres, aceti ſexquiſextariū. Quēadmodū moris eſt apparato, Arida aceto diluitur. Malagma ex bacis lauri aridis, ad hydropicos & ſplenicos, omnem duritiā diſſoluit, abſceſſus in profundo ſitos abſorbet. Ceræ, reſinæ pinus, picis brutæ ſiccæ, nitri rubri, baccarum lauri aridarū, ammoniaci thymiamatis, adipis uitulini probe ſubacti, ſingulorū lib. unā. Arida cōrundito, ac per tenuiſſimū cribrū excutito: quē uero eliquari poſſūt liquefacto, eiſq; arida inſpergito ac unito, deindeq; ammoniaco cū aceto diſſoluto affuſito. Ego etiā nitrū cū aceto diſſoluo. Emplaſtrum Tonſoris appellatū, ad ſplenicos & hydropicos. Hoc tonſor ex Bythinia uſus, multos à coxenſi dolore in totū liberauit. Picis ſiccæ lib. i. i. i. ceræ lib. i. i. reſinæ pinus lib. i. i. farinæ fœni græci, polialinis radicis herbæ chamæleonis nigræ, cuiuſcūq; beſſem, cumini tenuiſſime triti trientē. Apparato, & ut dictū eſt, uitor. Emplaſtrū pardalis appellatū: Andree. Pharmacū inueteratis hydropicis proſpere ac cōmodatum. Grani emijj depurati, rhois rubri, ſpumæ nitri, ſalis ammoniaci, ariſtolochiæ tenuis maxime corticis, radicis cucumeris ſylueſtris, terebinthinæ, cuiuſcūq; drac. i. i. i. piperis cōmuni, piperis longi, ammoniaci thymiamatis, iridis, bdellij, thuris, cardamomi, xyloballami, caſiæ, myrrhæ, amomi, adipis taurini, adipis caprini, reſinæ pinus ſiccæ, cuiuſcūq; drac. x. ceræ ſexquiliobrā. Viſci probe ſubacti ſextantē, unguētū irini aut potiſ ſecis ſexuncē, ſucci ſycomororū ſextantē, ſi haberi poſſit. Cerā, reſinā, adipem caprinum, liquefacto, reſrigerato, & cerai modo ſeuigata ac cōtecta aſſeruato. Bdelliū autem & ammoniacū & ſucci ſycomororū ſextantē, præcedenti die in uini quincuncem macerato, ſequentiq; in ſole terito, & cōſecto in mortarij cerato bdelliū & reliqua cū eo adijcto, & diligētē tundito, deinde arida trita paulatim addito, & per bīdium tuſa in denſam pellē recōditō, ne quid inde tranſpirēt. Quādam autē hyſſopi drac. i. i. i. addunt, & irinū largius affundunt, quo modo uſus eſt Eras Cappadox & Aſclepiades. Facit ad multas & uarias affectiones, facit ad hepaticos, ſplenicos, ſuppuratos, & arthriticos, podagricos qui à calefactione ſuauantur, & coxædicum dolore laborātes, pleuriticos, præcordiorum affectiones, & omnia quæ concalefactione opus habent. Vtere & ad ſtrumofos, emplaſtro ad ſtrumæ magnitudinem facto & impoſito: ſuppurat enim, perforat, rumpit, eademq; attrahit, & cicatricē inducit. Cōducit & ad oſſa contrita, educit ſpinas, & omnia in profundo fixa: facit & ad ſuppuratos præclare, & ad omnes duritiās internas. Inflammationes autē internas eadē die ſoluit. Vitor & ad tubercula, diſſoluit & cancerata & panos. prodeſt cōuulſis & ſcorpion percuiſis: ſumme autē hydropicis conſert. Quod ſi & ad falſitudinē neruorū adq; dolorē lenit dū uti ueliſ, ad unā emplaſtri partē, irinum, nardi-



num, cyprinū, sulinum, butyrum, lentiscinū, adipē, celypum, mel, singulorum æquales partes misceto, & ad solidi strigimeni crassitudinem redigito, ac utitor. Epithema hydropicis, splenicis: abscessus & furunculos sanat: humores in profundo & in articulis resiccat: hydrocephalis, hoc est quibus aquosus humor in capite cōsistit, itemq; herniæ quæ hydrocele appellatur, pro glutino exsistit. prodest & hemictæniæ, tubercula quoq; atheromata ac steatomata Græci à spicacū, siue ut aliq; uolunt, pulicē, itemq; pinguitudinis in se complexu appellata, curat. Nitri, chalcantisi, salis, spumæ nitri, cuiusq; quadrans, ceræ septuncem, ceræ septuncē, olei lib. i. in estate aut temē dextantem. Oleum cum cersa donec non inquit, amplius coquito, ceramq; eis adiçto: quæ liquefacta, reliqua in mortario terito, ac ad mellis cōpagem redigito: eisq; cocta infundito, ac utitor. Est enim experimento cognitum.

Malagmata quæ euacuant humorem: ex libris

A/elepiade.

Cap. xxiii.

Grani cniidij repurgati drac. x. medullæ colocyntidis drac. viii. succi cyclamini sicci drac. xvi. scamoniæ, elaterij, piperis albi, myrrhæ, cuiusq; drac. iiii. polypodij drach. viii. abanthij drach. x. vi. amurcæ drach. x. vi. fellis taurini drach. xvi. sagapeni drach. viii. cerati cyprini quantum his excipiendis satis est. Sufficiat autē cerę dextas, olei cyprini uncia x. viii. hæc linteolo insarta peçtini ac lumbis impositio, ita ut os utrūq; custodias illæsum. Summe prodest, inquit Archigenes, adeo ut quidā hoc solo se hydropicos sanatos cōfidant. Aliud, quod large cit urina, totiq; affectioni opitulatur. Radicis cucumeris syluestris, radicis chamæleontis, arifolochtæ lōgæ, corticis radicis rubi sicci, singulorum librā unam, eruginis uermiculatæ, recemendi plūbi, aluminis scissi, seminis apij, sulphuris, acori, asari, peroseleini, nardi celticæ, cardamomi, singulorum trientē, ceræ libras duas, cerebintinæ liquidæ, picis brutiæ, adipis taurini, cuiusq; librā unam apparato, & imposito, ut prædictum est. Aliud. Veratri nigri, nitri, piperis, fellis taurini, singulorum æquale pondus melle cocto excipe, & utere ut dictum est.

Epithema, quæ post euacuatos humores adhibita pro glutino sunt.

Cap. xxiiii.

Mellis libras duas, myrrhæ sextantē, thuris uncia unā. Mel usq; quod uiscosum fiat decoquito: eiq; myrrhæ ac thus tenuissime trita adiçto, simulq; subigito, & spongæ nouæ insarta per omnē alium imposito, colligatoq; cute quodammodo constricta, & tertio die soluto. Aliud. Thuris drac. viii. gummi drac. o. rosmarini herbæ exsiccatæ drac. decē, mellis libras duas, apparato, ut dictum est: similiterq; utitor post euacuatos humores. Aliud epithema, quod post humorum euacuationem, toti affectioni se opōnit. Lapidis asij sextantē, farris mola triū uncia unam, thuris trientē, chamæleæ contusæ & cribratæ drach. iiii. adipis suilli ueteris quantum sufficit. Vere ut dictū est. Emplastrū Magnus appellatur: quod quidam etiā Hephæstidis nomine insigniūt: facit ad finis, & fistulas cōglutinat ac resiccat præter opinio-nem. Egregiū censetur & ad hydropicos & ad herniæ hydrocele appellatā. Spumæ argēi, sexuncē, lateris furno assati sesquialibrā, scoriz argēi, quæ helcysma Græcis appellatur, librā unā, olei libras tres,

ceræ sesquialibrā, succi coriandri sesquifextarium, aliq; sextarij dimidiū accipiunt. Oleum, spumā argenti, helcysma & laterē tenuissime tritū, itemq; succum, donec amplius non inquinet decoquito, deinde cerā liquefacito, & percolatam adiçto, ac unitis utitor. Quæ difficulter alias sanantur ad cicatricē perducit. Præstat autē arida prius cōtundi, & cū succo in mortario teri, ac deinde decoqui. Quidā autem pro cera, pentatheton pharmacū coniecerunt, & ad hydropicos usq; humorē resiccarunt. Epithematis igitur per seueratiis & propius utimur, si absit febris: quod si febres sint cōiunctæ, per interualla quædā assumuntur. Cæterū ad tumores crurij hydropicorum, pānem madefacere oportet, terereq; ac sale tenuissime trito ammixto, illinire, ac quatuor horis sinere. Quod si aquosus humor defluat, spongia mundare, ac panniculū uestis detritæ extergere, oleoq; myrteo, aut melino, aut lentiscino inungere.

Aquam ducentia remedia, hydropicis ualde comoda.

Cap. xxv.

Smilacis quæ iuxta aquas in sepihus reperitur, ac silicis quas producit quæadmodum horētis smilax, quæ lobia appellatur, huius foliorū succū sextarij unius mēsurā accipe, & ad tertias decoque, indeq; cyathū unum bibedum præbe. Aliud. Smilacem accipe, & donec flaccescat in aqua decoque, deinde unā cū decocto folia ipsa tere usquequo succus inde exprimatur: & ex eo cyathum quotidie bibedum præbe, donec sanetur: in his autem qui perfectæ sunt ætatis, plus omnino exhibedum est. Aliud, quod aquam ducit. Seminis cniidij drachm. iiii. aloës unciam unam, grani cniidij scrupulos vii. scamoniæ scrupulos tres, cum succo scorpiuri cærulei colorē habentis capotia informato, & ex eis his qui iam primū inciderunt scrupulos iiii. exhibito: quibus autē in tumorem malum processit, scrupulos vi. ieiunis.

Quæ ad ciendam urinam hydropicis bibuntur.

Cap. xxvi.

Porrò toto curationis tempore, aliquo istorum potum utendū erit. Cancrī fluuialis decortici interioris exsiccati, manibus ac pedibus, auulsis libr. i. asari libr. i. In aqua permisce ex ipso flumine unde cæcri sunt extracti, ac bibendum præbe: aliquado pro asaro, opobalsamī par pondus coniçitur. Aliud. Corallij drachmā unam, aluminis scissi drachmam unam, cum calaminthæ succo aut decocto in pastillos digerito, & ex ipsis oboliū unum, cum calaminthæ decocto bibedum præbeo. Summe (inquit Archigenes) & nephriticis cōducit. Laueris item decoctum exhibeto, idemq; lauer. ededum dato, aut triū folij bitumen olenis drachmam unam, ex uino, aut iunci odorati, aut nardi, aut asari, aut plu, aut mēdoctum, aut corticis radicis ari, aut ipsius radicis drachmam unam, ex uino, aut seminis uiticis drachmam unam, ex uino, aut radicis bryoniæ concisæ decoctum, aut anagallidis cæruleæ succum per se, aut arnoglossum ab aridorum ciborum comestione ne quotidie paucum comedendum præbe, ita ut inde de reliquo cibo utatur: aut seminis hyperici drachmam unam, ex uino, aut cicerum decoctum, aut scillinum acetum assidue sorbeant. Etenim ex eorum numero quæ citra grauitatem urinam cient, est scilla assata delincta ex melle: aut scillam assatā terito, eiq; farinæ erui albi par pondus ammisceto, siccat, ac drac

ac drachm. i. ex uino dato : aut posium , aut fam-  
 schum ex uino decocta bibēda præbe. Egregie etiam  
 commodam myurum herbam perhibent, quæ folia  
 alimo similia habet, uerum per terrā strata est, ac ue-  
 lut corymbos in summo oblongos habet: hanc itaq;  
 decoctam assidue bibendam præbeto, experimento  
 cōstat. Aut herinacum terrestrem excoriat, efusq;  
 carnem in sole exiccat, ac drachmam unam ex ui-  
 no tritam præbeto. Præter opinionem etiam faciūt  
 uermes terreni cocti triti ex uino potati. Est & com-  
 positum pharmacum quod urinam dati ipsi conue-  
 nientissimum, hocce: Carpobalsami, spicæ nardi, cas-  
 siæ, cumini, radicis dulcis, hyperici, floris iunci odo-  
 rati, alari, amomi, dauci, fmyrni, petroselinī, calami  
 aromati, piperis, felis, spondylii, omnium equa-  
 le pondus. Conducit etiam unumquodque per se.  
 Orybasi pharmacū aquam ducens. Salis ammo-  
 niaci drachmam unam, mastiches drachmas duas,  
 euphorbi drachmam unam. Hæc pro una uice dan-  
 tur: est autem ex forissimis remedijs. Potiones a-  
 quam ducentes, ex Asclepiade. Cæterum per in-  
 terualla longiora ut cōuenit pharmadās aquam du-  
 centibus, nam incōmodus est assiduus eorum usus,  
 utpote quæ uires ipsas dissoluit. Similiter autem &  
 his quæ urinam ciēt per modica interstitia utendū  
 est. Ducunt autem aquam, quādmodum conuenit  
 inter Eran, Dioscoridem, Asclepiadem, & Archige-  
 nem hæc. Radicis struthii decoctum, polypodij de-  
 coctum, coricem radicis tithymalli charactæ appel-  
 latū contusum & cribratum scrupulorum quatuor  
 pondere in uino per integram noctem macerato, ac  
 mane uinum ipsum bibendum præbeto: euestigio  
 enim aquam educit. Aliud. Radicis cucumeris  
 syluestris contusæ & cribratæ obolos duos in uino  
 adstringente per triduum macerato, ac per dies tres  
 ex ordine præbeto, factiq; interstitio rursus eodem  
 modo, dato quousq; tumor demittatur. Inde enim  
 aquositas leniter secedit: neque stomachum hoc læ-  
 dit, & uires conseruat. Aliud, quod multam aquā  
 per alium ducit. Ex solano hortensi succum ex-  
 primito, & quotidie donec perfecte curatur, cyathū  
 unum bibendum præbeto. Aliud. Salis fossilis  
 melle subacti & assati drachmas duas, piperis longi  
 drachmas ii. conterito, & cum succo pitisanæ totum  
 præbeto. Hæc enim est perfectum dimensum. A-  
 liud. Radicis umbilici ueneris drachmam unam,  
 scillæ repurgatæ drachmam unam, contere, & cum  
 uini mulsi cyathis duobus per horam pro una uice  
 ieiunis bibendum præbe. Aliud. Euphorbi dra-  
 chmam unam, salis communis drachmas tres, casto-  
 rij drachmas quatuor, alij drachmam unam habent,  
 contundito & cribrato, dimidium æ: ex aqua calida  
 exhibeto. Aliud. Chamælæ, petroselinī, pipe-  
 ris, æquales partes omnium contundito, & cochlea-  
 rium ex aqua calida dato. Elegma ad hydropicos.  
 Seminīs ricini ex herba quæ dici appellatur depura-  
 ti numero grana triginta quinque, spumæ nitri co-  
 chlearia duo, probe contrita melle excipito, atque  
 id totum delingendū præbeto, & aquæ mulse ca-  
 lidæ cyathos tres, ab eius sumptione bibendos por-  
 rigito. Euacuat adherentem humorem, citra læsio-  
 nem: & purgat aliquādo usq; ad dies aliquot. Opor-  
 ter autē ante eius sumptionem commodā diætā uti,

Aliud inexpectabile. Grani cniidij repurgati dra-  
 chm. quatuor, lathyridū mundatarū drac. quatuor,  
 euphorbi drac. duas, aloës drach. ii. gummi drac. tres,  
 aqua subigito, & catapotia erui magnitudine for-  
 mato, ac perfectis ætate læpē præbeto, & uini mēi  
 immixti cyathos quatuor inde bibendos dato. Reli-  
 quis autē iuxta uisum tolerantiam exhibendum.  
 Aliud Xistidi, siue Spiculatoris, ex cuius folijs usu  
 sanabatur. Grani cniidij repurgati drachmas octo,  
 probe conterito, squamæ æris drachmas sex, lapidis  
 magnetis drachmas sex, seminīs ricini drach. qua-  
 tuor, succi scillæ mundatæ cyathos duos, mellis cy-  
 thos duos. Succum & mel usquequo cogatur coqui  
 to, ac reliquis adiectis catapotia ciceris magnitudi-  
 ne formato, eaq; pro uiribus exhibeto: ita ut aqua  
 mulsa ab eorum sumptione bibatur. Pueris autē u-  
 nicum tantum præbitum sufficit. Aliud. Aeris  
 usi drachmā unam, foliorum rutæ drachmā unam,  
 stercoris columbini drachmam unam, salis commu-  
 nis parum. Hoc totū cum dimidia hemina uini te-  
 nuis præbeto. Aliud potabile, lagenium appella-  
 tum, cōmodum his quibus uenter plurimū tumer,  
 & reliquum corpus molle est & laxum. Radicis  
 bryoniæ repurgatæ drac. xx. myrrhæ drach. octo,  
 cumini æthiopici drac. vi. anisi drac. vi. seminīs cap-  
 paris drachmas sex, uini adstringentis sextarios ii.  
 passi creti sextarios iiii. Radicem bryoniæ cū re-  
 liquis in mortarium cōjctio, atq; citra myrrhæ ad-  
 mixtionem tundito, omniaq; in uas uitreum recon-  
 dita affusis liquoribus macerato, & post septimum  
 diē percolato, ac myrrhā simul dissoluta: indeq; cy-  
 athos quatuor ante cibū exhibeto, & rursum interie-  
 ctæ die cyathos quinque præbeto: ac rursus interposita  
 die, cyathos sex offerito, atq; deinde rursus carnē fe-  
 rinā assatam edēdam dato, & uinum austerū mera-  
 dius in potu. Aliud pharmacū, quod prospere accō-  
 modatur, & aquā multam per sedem educit, optime  
 etiā cit uirum: Grani cniidij depurati drac. iiii. ra-  
 dicis bryoniæ drac. iiii. scillæ crudæ mundatæ dra-  
 c. x. cumini æthiopici drac. iiii. lathyridū drac. ii. myr-  
 rhæ drac. iiii. uini adstringentis sextarios iiii. Arida  
 tusa per dies septē macerato, ita ut quotidie bene cir-  
 cumagites: deinde percolato, ac dissoluta myrrhā,  
 prima diē cyathos tres præbeto, secunda duos, ter-  
 tia unū. Facta autem purgatione, uisum resocilla-  
 trice diætā uitior. Aliud, urinā ciens, aromaticum,  
 Crunion à torrentis similitudine appellatum, quo  
 usus est Eras & Asclepiades. Oportet autē purgati-  
 o quod ei præscriptum est præpurare, atque ita  
 ipsum quod urinā ciet pharmacum exhibere. Purga-  
 tium autē quod præexhibetur hoc est: Succu tithy-  
 malli recentis cyathos ii. aloës drachm. iiii. Aloēm  
 in succo dissoluito, & in catapotia magnitudine ci-  
 ceris redigito, indeq; duo, aut pro uiribus dato. Por-  
 rō ubi probe purgatis, ipsam urinā ciens pharmacū  
 propinabis, cibo bis aut ter per diem exhibito. Cū  
 animaduersione autē utaris, & ubi urinā profluam  
 uideris, ne amplius dederis: quod si nō feceris, urinā  
 cohibere nequis. Cōpositio ipsa hæc est. Seminīs  
 apij drach. x. ii. myrrhæ dra. vii. dauci drac. vii. croci  
 dra. vii. mei dra. vii. phu drac. vii. acori drac. iiii.  
 floris iunci odorati drac. iiii. seminīs feniculi drac.  
 iiii. aut vi. alari dra. vi. spicæ nardi, cassiæ, cinamo-

mi, sefelis, fabinae, singulorū seſquidrachmam. Exci-  
pe uino odorato, & paſillos, quosdā triobolares,  
quosdam diobolares, alios etiā unus oboli pōdere  
formato, eosq; pro uiribus præbere. Facti & ad cal-  
culo laborantes cū uini diluti cyathis tribus. Aliud,  
urinam ciēs. Seminīs fœniculi, cardamomi, radicis  
eryngij, corticis radicis capparis, cuiusq; drachmam  
unā, ſtercoris colubini cochlearia duo, contere, & cū  
aqua cataportia ciceris magnitudine informa, & v.  
ex eis quotidie præbe. Potius hydropicis cōmodus  
experimento conſtans, qui tū per urinas, tum per uē-  
trem euacuat. Caroi ſcrupulos uiginti ſeptē, fœnicu-  
li uncias tredecim & dimidiā, aniſi ſcrupulos xiiii.  
& dimidiū, cumini lati ſcrupulos v. mei ſequiſcrū-  
pulum, iridis ſiliquas tres, mellis ſequiſilibrā, uini li-  
bras ſex, exhibe menſurā medioerem ſeuini in in-  
ſeſſi ſolij balnei præcalefactam: eſt & ſauae guſtui.

Alius potus ciens urinā, ex cuius uſu inſignem ui-  
rum tympanite detentum, ſeruaſi uidimus, etiā ſi à  
multis medicis iam eſſet detritus. Ammoniaci thym-  
iamatis ſextārem, radicis herbæ lonchitidis ſextā-  
rem, petroſelini ſequiſuncā, calami indiçi, coſti, cina-  
momi, ſpicæ nardi, piperis lōgi, myrrhæ, ſtaſtes ſin-  
gulum uncā unam, ſeminis rutę quadrātem, plu-  
drachmas quatuor, ſtyracis drachm. quatuor, phyl-  
li quadrātem, mellis deſumpuā quātum ſufficit. Ex-  
cipe melle, & fabæ ægyptiæ magnitudine præbe, cū  
calidæ aque cyathis tribus. Aliud ualde cōmodum,  
duci urinam multam, & ad lumborum dolores fa-  
cit, itēmq; eos quibus pituita in uniuerso corpore  
abundat, ad pleuriticōs, peripneumonicos, quarta-  
narios, articuloſū morbum, ac tetanicos; quibudā  
cum uino, aliſquibus cū aceto muſſo, alijs uero cum  
aqua mulſa. Habet autem hoc modo. Ariſtolochiæ,  
myrrhæ, abſinthij, abrotoni maxime ſeminis, iridis,  
canchryos, ſinguloſū drach. iiii. aniſi, cedridum, ra-  
dicis panacis, pyrreri, ammoniaci thymiamatis, car-  
damomi, ſinguloſum drac. i. cumini drach. ii. & o-  
bolum i. Digerito in paſillos, quorum aliqui tres,  
aliqui duo, aliqui unum obolū habeat: eosq; pro ui-  
ribus exhibeto. Oribaſij ad hydropicos. Amara ex  
aceto muſſo cōſectio, paulatim euacuat, nihil ex ui-  
ribus ſubuertens: eſt autem in ſtomachicis relata. A-  
liud urinam ciens, Oribaſij. Aluminis liquidi ad ſa-  
bæ magnitudinem in aqua diſſolue, & per linteum  
excolatum bibendum præbe. Aliud. Opobalfami,  
ſpicæ nardi, carpobalfami, caſiæ, cumini, radice  
dulcis, hyperici, floris iunci odorati, aſari, amo-  
mi, dauci, ſeminis ſmyrni, petroſelini, calami aro-  
matici, piperis, ſefelis, ipodylij aut umbilici ueneris,  
omnium æquale pondus, præbe cochleariū cum ui-  
no muſſo. Conducit etiā unumquodq; per ſe. Peſ-  
ſus ſiue talus ad hydropicas mulieres. Aniſi, cumi-  
ni, cardamomi, niri, ariſtolochiæ, pulegij, ſcentegre-  
ci, medullæ ficis, omnium æquales partes cum ui-  
no ſubige, ac utere.

*Cura poſt euacuationes.*

Cap. xxxvii.

Poſt auxilia quæ humores euacuant, ligamentis ægrū  
amplecti & conſtringere oportet, ab extremis au-  
tem paritibus incipiamus, ac ligamentorum diſtri-  
butionem ad ſuperas partes faciamus: ita ut ſæpe  
ſuper ipſa ligamenta ſpongias poſita imbutas im-  
pamus iuxta tumefactas maxime partes. Ventri ue-  
ro uniuerso quædā ex præſcriptis epithematis im-

ponantur, quæ poſt euacuatū humorem adhibeant.  
Reliquum diætæ concedendum: quæ ſanè in mo-  
deratis deſubulationibus ſua eſt, exercitationibusq;  
ac frictionibus. Adhibeantur autē & inunctiones  
& exercitamentā: ſi ſol addit, in ſole, capite tamen uela-  
to: ſi frigus ſit, in domibus per ſubiectū ignem cō-  
calefactis; aut iuxta ignem: obuoluendi etiā ægri in  
pellibus ſole uſitis, aut in arenā deſodiēdi. Poſt exer-  
citia extergantur, aliquando etiam lauentur propter  
fatigationē: in balneo autē ſiue inſpiratione, ſiue con-  
fricatione huiusmodi utantur. Samſuci, niri, cumi-  
ni, melanchij, ſeminis rutæ ſylueſtris, ſinguloſū un-  
ciam i. ſoliorū rhododaphnes ſecorum, ſextantem.  
Vendum quoq; in ſole luti obſitione, quemadmo-  
dum prædictum eſt in ſecundo De terrarum diſſerē-  
tijs Sermone. Porro quum res ſeliciter proceſſerit,  
& tumor fuerit imminutus, & uires aliquantulum  
in integrū reſtitutæ, præ omnibus ex frigida laua-  
tio fiat. Neq; uero balneæ ſponte naturæ calidæ in-  
ep̄te hoc tempore ipſis exhibentur: ac exſertione au-  
tem cibi offerēdi: qui ſanè cōmunes ſint cum hijs  
poſt hydropis ſubter cutem curam deſcribentur.

*Cura hydropis qui proprie ſubtercus appella-  
tur.*

Cap. xxxviii.

Hydrops ſubtercus, qui aliſquibus etiā leucophlegma-  
tias appellatur, maximā curādī rationem in inſola-  
tionibus habet: itaq; tumefactæ partes ad ſolem ex-  
ponantur, capite ſaltem uelato, cauendo etiam ne tu-  
mor uehementius ſupercaleſcat. Si enim corpus ſu-  
percaleſcat, febres accedunt, unaq; cum ipſarū febrili  
generatione tumores duplicantur, atq; id multo ma-  
gis quum febres remittant, ac tumor refrigerationē  
capiat. Vendum igitur frictione prima quidē die  
per modicum oleum moderate ac moſſiter facta: in  
progreſſu autem & ſicca & multa & cum intenſio-  
ne magis appreſſa: deinde etiam per linteā aſperio-  
ſa. Oleum autem quod ad inunctionem apparatus,  
ſcillam mediocri magnitudine ad tres olei ſextarios  
habeat incoctam, aut canchryos uncia una ad hēmi-  
nam olei addatur, & facta percolatione uſitor. Ab  
inunctione autem exercitijs utantur, ac pro uiribus  
currant: indeq; ſudorem per linteā aſperioſa extergant,  
& poſt hoc oleo dulci ungantur. Cæterum poſt  
dies aliquot nitro tenuiſſime trito per uniuerſum  
corpus large coſpergantur, ſuſtineāq; ejus mor-  
ſu exudationem, deinde rurſum ſudorem extergant,  
ac oleo dulci ungantur. Optime autem facit & fri-  
ctio ex ſale in aqua aut oleo trito donec uiſcoſum  
reddatur, ſi cum eo in ſole aut iuxta ignē fricentur.  
Valde enim celeriter & ſudores elicit plurimos, &  
carnē cogit, ſiue in ſole, ſiue iuxta ignem deſicet,  
modo caput habeat probe contextū. Vendum & in  
pulvere uolutationibus, ſi aut cōmolia tenuiſſime tri-  
ta ſubſternatur, aut ſuper aſum lapidē deuoluatur.  
Aliquādo autē & arena probe à ſole ſignita, aut pel-  
libus ſimiliter à ſole ſeruefactis ægrum occultare o-  
portet, capite tantum uelato, & ſacie cum ſpongia  
aſidue exteſa. Poſt hæc autem aqua marina, aut ce-  
tiam aluminioſa aut ſulphurenta lauentur. Aliſqui-  
bus enim qui ad huiusmodi lauacra adſueuerunt, ea  
ipſam ad deterendum morbum, tum ad habiū  
ualentiorē reddendum ſuffecerūt. Adhibenda etiā  
his obſitio ex luto, ueluti prædictum eſt in ſecun-  
do De terrarum differentijs Sermone.

*Cataplasmata ex libris Aselepiade.* Cap. xxi.  
Optime conuenit & his cataplasmarum admolitio, eo  
rum præsertim quæ resiccare simul & uisceribus fir-  
mitatem addere possunt, pueris maxime ac alijs qui  
mollem carnem habent: qualia sunt ex malis coto-  
neis, myrtil bacetis, pampinis uitis, malicorio, ac lenti-  
cula decoctis, aliquando quidem per se, aliquando in-  
uiscem permixtis. Efficacissima sunt etiam corna exa-  
cinata tenuiter trita: item rhus culinaris cum polen-  
tæ flore, & quæ eis similia existunt, & alumen sanè  
cum duabus adipis caprini partibus subactum. Neq;  
uero incoueniens rûta ipsa censetur, si per interualla  
adhibeatur, neq; bulbi cû melle triti. Plurimû etiâ co-  
hibent ac adstringunt tumorè organum, aut thyma,  
aut absinthiû, aut hyssopû, aut nîtrû cum caricis dili-  
genter trita: aliquândo hæc ipsa lolitacæ farinæ in po-  
sca decoctæ permixta adhibentur. Stercus item bubu-  
lum conuenienter resiccatum, non inepte cum posca  
aut aceto mûlso imponitur, infarsa sulphuris quar-  
ta parte. Caseus quoq; recens multû coaguli habes,  
optime ad omnes tumentes partes impositus facit.  
Similiter & cochleæ crudæ tritæ & impositæ: ad glu-  
tinatur enim neq; discedit priusquam uniuersus hu-  
mor resicetur: fermentû etiam sale multo permixtû  
cômode locis adhibetur, aut panis cum puluere hyssopi:  
aut sabacea farina aqua marina & melle cocta,  
pari absinthii modo adiecta: aut farinam halicæ fer-  
mentato, & cum raphani emollito coridice imponi-  
to: aut lentem palustrem in sigulino uase siccato, ac  
terito, & cum prædictis cataplasmatibus uice imponi-  
to. Porro ex eorum quæ tumores cohibent numero,  
est & id quod byne appellatur: est autè ordeû mades-  
factum, quod germen emisit, & deinde unâ cum ena-  
tis ligulis tostum est: si tritum pro cataplasmate im-  
ponatur. In principio igitur adstringentibus cata-  
plasmatis utendû est, deinde paulatim ad resiccantia  
transseundum, postremum etiam ea quæ firmitatem  
adant ad disciendâ. Cæterum omnia impinguentia &  
resiccantia, cerata, ac malagmata, similiaque uitanda  
sunt, uelut quæ insilient & tumores distendant. Alia-  
due autem & crura, & manus, aliaq; tumefactæ  
partes in sole aut iuxta ignem, ex his inunguntur.  
Sulphuris uiuû, thuris, aluminis scissi, æquales sin-  
gulorum partes aceto conterere, ac utere. Experiri etiâ  
Herodoti remedium conuenit, neque enim minus  
quàm ipsa fricatio auxiliari potest: uiscidis itaque bu-  
bulis aut etiam alijs magnis omnino, ac probe infla-  
tis, & uacuis, tumentes locos pulsato, atque id auto-  
ritate tû Archigenis, tû Herodoti factio: inde enim  
citra molestiam caro condensatur, neque dolore,  
neque repercussione durtiore resultant.

*Chirurgia hydropsis subter cutem.* Cap. xxx.

Omnibus prædictis efficacius auxilium in hac hydro-  
pis specie chirurgia præstat, Aselepiade auctore. Fissu-  
ras autè circa internû talum insigere oportet in loco  
quatuor digitorû spatio supra talû eminente, ea pro-  
funditate, qua quis in uenæ sectione utatur. Pauco  
enim sanguine in principio euacuat, per reliquû tẽ-  
pus indelinger aquosissatis excretio procedit, citra  
omnem inflammationẽ, ut neq; claudi fissura possit,  
nisi humore omni ante expenso, & homine gracili  
relicto, atq; id citò cõstringi, nulla inflammatione fissu-  
râ occupare, sed ipsa in quadam cõgruenti temperie  
permanente, quo omne alienû per ipsam excoletur,

& ut nullo opus sit extrinsecò pharmaco. Præterea  
periculû hic nullum uerendû est, uelut in hydropsis  
ascitæ pertusio: non enim coaceruatim quædamo-  
dû illi euacuatur: at uero si quis uelit, excretionem plu-  
rima facta, eam cohibere, nihil uetuerit ipsas in talis  
fissuras linamentis oburare, ligamentisq; cõstringe-  
re, atq; ubi rursus prodire quid uelimus, laxatis li-  
gamentis, & ablatis linamentis, gestatoq; ac moto  
ægro, excretionẽ irritare. Leonides autem inquit,  
Quod si excretio fissuræ supra talos tardius prodeat  
necesse est etiâ alias corporis partes findendo deduce-  
re: uelut scrotum tumefactum, scemora, pudenda,  
locus supra manuû iuncturas. Quidam enim uulnus  
culis pluribus acalgoribus incutis, plurimâ aquo-  
sam substantiâ exhauerunt. Et Hippocrates sanè nõ  
supra talos adhibet chirurgiâ, sed iuxta scrotum &  
scemora uulnacula insigere iubet, eaq; sale maxi-  
mè cõfricare: hic enim modus paulatim & incessan-  
ter humorẽ educit, & ualde celerè compressionẽ tu-  
mores ipsos recipere, ipse tradit. Porro si aliquibus  
excretionẽ amplius mouere uelimus, post impacta  
uulnacula, & talorum lancements, eos ipsos pro  
deambulatione, ferculo gestamus, aut lectica sub-  
limes circumuectamus. Ceterû Archigenes ita  
prodit, Nõ sunt audiendi, inquit, q; per huiusmodi lanti-  
nationes nihil excerni dicunt, quin potius cum fidu-  
cia hæ ipsæ incutiendæ: nam & nos, inquit, his cutis  
fissuris inueni uis, & per ipsas quàm plurimum ex-  
clusimus humorem, ut & scemora, & furæ, & supe-  
rior uenter euidenter sint demissa ac compressa.

*Reliqua prædictorum cura.* Cap. xxxi.  
Maximum hydropsis subter cutem auxilium uomitus  
præstat, quod ipsum difficile est in ætate puerili adhi-  
bere, propterea quod non facile, ut id admittant per  
suaderi possunt: quare uarias excogitauimus artes,  
quibus uomitum concitemus: nonnullas uidelicet pin-  
nulis aut digitis oleo illitis irritando: aut fuscis affata  
oleo imbuta, & piperis puluere cõpersa, post deabu-  
lationes à somno exhibeatur. Butyrû etiâ cum melle  
gustandum præbeatur: aut raphanus coctus adipose  
cõditus detur, aut salsamêtum pingue cum oleo mûl-  
to offeratur, aliquando etiâ aceto ammixto. Sunt  
et alia plurima quæ uomitum mouent, relata in tertio  
Sermonè. Amplius autè tum uetrem, tum intestina  
ligamentis adstringant, itidemq; omnem cutis cõer-  
ceant tumorẽ. Fiant autè ligationes ab extremis parti-  
bus incipiendo, & ad supernas procedendo. Vindictæ  
etiâ partes, manus uidelicet & pedes, oleo cyprino  
prius illinatur: spongie itè imponatur late ac acida  
muria optime expressæ: potest & iuncus odoratus,  
aut rosmarinus, aut pulegiû, aut calamintæ, & maxi-  
me omnîû absinthium in ipso aceto decoqui. Post  
uero ligamenta ipsis spõgijs circumdantur. A uomit-  
u prospiciendû ut inferior aluus inclinationem ad  
uomendû permuter: ueteri falamento crudo ante ci-  
hum reliquû accepto. Mercurialis itè cocta saleq; ac  
oleo cõdita in uino tincta fumatur: aut decocti  
ipsius sesquicyathû cû sale dato: quædã etiâ in ascle-  
dicta his exhibito. Præbenda & que urinã cient, uelut  
est daucus, fesceli, cardamomû, radicû asparagi deco-  
ctû, trixaginis, radicis trisoli decoctû, aut ipsius ra-  
dis dra. i. ex uini cyathis iiii. radix eryngij sicca cû  
uino, itè decoctû eius in potu acceptû, seminis uiscidis  
drachma una. Cômode etiâ feminis hyacinthi bulbi

drachma una cum uini cyathis tribus potatur:urinā enim ducit. Quidam autem hyacinthi flore coria tingunt. Inter omnia autem pharmaca quæ omnibus hydropicis, maxime tamen eis qui subtercutaneo dicto laborant, exhibentur: præstantissimi sales theriaci censentur tum cibus ammixti, tum in liquamenta additi eorum qui ad perfectā ætatem peruenerunt. Eorum autem apparatus in XIII. reperies Sermone.

Communis diæta omnium hydropicorum: Archigenis. Cap. XXXII.

Post quotidiana exercitia communis omnibus hydropicis diæta hæc sit. Ab aridarum rerum comestione initium faciemus: quoddam si tamen intensa sitis inest, parum quid delibandum dabimus solacii tantum grata, & leniende sitis. Sit autem uniuersus cibus facillis concoctus & sufficiens coactus: exolutus enim aptus est ut in aquositate commutetur: sit itaque panis optimus clibanites, qui salem, ammum, & sceniculum habeat admixtum, conueniunt etiam cochleæ assatæ, oua affata, & auculæ sicciores, uelut perdices, coturnices, turtures. Ex terrestribus, lepus, capra syluestris, dorcadæ. Ex mansuetis extremæ suum partes: ex aquatilibus, cancri, locustæ, herinacæ recetes, squillæ. Olerum rarus sit usus: quæ uero ex eis exhibentur acriora sint, & magis syluestria, uelut est co-

ronopus, eryngium, pastinaca, porri capitati, allia cocta. A leguminibus uero abstineant in totum. Pro liquamine utantur aceto cum pipere & lasere, aut quibusdam ex oxyporis cito penetrantibus ad colicos descriptis. Sales sint ex rosmarino, fœniculo, hyssopo, silphio, ligustico, & apii semine compositi. In potu tantum præbendum quantum ad infringendā aliquo modo sitim sufficit: incommodus est enim eis plurimus potus. Porro maximā ciborum partem in cœna accipiant: omnes autem placentas ex simagine & passo apparatus utent, plurimos tamen fructus & secundas mensas. Concedendæ tamē palmulæ, nuces, amygdalæ, uua penilis, mala punica, pistora cocta, ac carice, omnia moderate, neque omnia quotidie. Vinū autē sit tenue, & quod diet urinā. Dulcia uero uina & uinum multum uitanda. Lectus nō ualde mollis sit, præsertim his qui hydrope subtercuti laborant: subternantur autem arundinum folia, & herbæ resiccantes, uelut est uitex, pulegium, calamintum, & similia. Mirum est enim quantum huiusmodi per somnum resiccant, ut constat iam quosdā frumēti aceris obuolutos & absconditos à somno surrexisse firmos ac resiccatos. Opera etiam ipsa quibus reguntur, apparentur duriora. Moderata autem sit & probe temperata ipsa domus secundum anni tēpus.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

VNDECIMO SERMONE AETII  
CONTINENTVR.

<b>D</b> E diabete, hoc est profluuium urine. cap. i.	Cura eorum in quibus lapis atteri non potest, neque item per lotium excerni. cap. xiiii.	De resoluta per paralysim uestica. caput xxiiii.
De renum cruentam urinam excernentium debilitate. cap. ii.	Diæta post exactos lapides, adseruans ne alij renascantur: & de affligētis humoris cognitione ex lapidis colore. cap. xv.	Ad eos qui se in somno permingunt. cap. xxv.
De his qui per circuitum quandam sanguinem mingunt. cap. iiii.	De renum inflammatione. cap. xvi.	De inflammatione uesticæ. cap. xxvi.
De calculosis renibus. cap. iiii.	De duritie renum. cap. xvii.	De sanguinis ex uestica eruptione, & de grumis eiusdem. cap. xxvii.
Cura renum calculosorum. cap. v.	De suppuratis renibus. cap. xviii.	Que tubercula in uestica concoctione indigent. cap. xxviii.
Diæta præseruans ne lapides renascantur. cap. vi.	De dysuria, id est, emittendi urinā difficultate: & stranguria, id est, stillicidio urinæ. cap. xix.	De uesticæ ulceribus. cap. xxix.
Vnguentū renale, Oribasij. cap. vii.	De difficultate emittendi urinam in se bribus. cap. xx.	Diæta ex libris Archigenis. ca. xxx.
Diæta eorum quibus renes lapide laborant, reliqui uero totius corporis habitus gracilis est. cap. viii.	De ischuria, id est, urinæ suppressione. cap. xxi.	De uesticæ fluxione, & his quæ capillorum forma exeunt cum urina caput xxxi.
De calculosa uestica. cap. ix.	De scabiosa uestica. cap. xxii.	De priapismo & satyriasi: Galeni. caput xxxii.
Pharmaca lapides uesticæ atterētia & urinam ducentia. cap. x.	Simplicia remedia ad suppressam ac egre prodeuntem urinam, si aut eius multitudo, aut crassities in causa sit. caput xxxiii.	De seminis profluuiio: Galeni. caput xxxiiii.
Communia remedia uesticæ & renū calculosorum. cap. xi.		De seminis in somnis profluuiio. caput xxxv.
De hircino sanguine. cap. xii.		
Antidoti uaria ad calculosos. caput xiii.		

## CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-  
BIBLI SIVE QUATERNIONIS  
TERTIUS SERMO TERTIVS ET EX  
ORDINE VNDECIMVS.

*De Renum & uesicae affectionibus: Et de priapismo, ac seminis profluvio, rebusq; ueneris.*

*De diabete, hoc est profluvio urinae.*

Cap. 1.



**D**IABETES diuturna est affectio circa renes cōstituta, multū porū inducēs unā cū hoc quodd quicquid bibitur, simul ut accēptū est per urinā reijciat. Qui dā autē affectionē hanc hydro-pē, siue hyderū, & siphonē à fuorij instrumētū similitudine appellant, aliq̃ urinā leuitatē uocant, aliq̃ diptacō ab inexplēbili sibi appellauere. Cōcomitatur āgros pertinax sitis, neq; ulla satietas ex aluius liquoris exhibitione cōtingit. Aliquādo & sitis supra sitim inexplēbiliter āgros urget, hoc est, ut assidue potū assumerē cogant, neq; tamē satietur, propterea quod diuissime per lotiū expellitur potatū. Ceterū proprius renū affectus diabete existit, q̃ uidelicet immoderate humorē appetitū, ipsumq; propter debilitatē retentū in eis facultatis cōtinere nō possunt. Quēadmodū enim in appetitū nibus caninis, & in quibuscūq; liēteris uehementissime quidē appetētiā oboritur, quē multos cibos, eosq; assatim accipere cogit, uerū nihil ferē ex acceptis retinetur: sed in caninis quidē appetitū nibus ob grauitatē reuomuntur in liēteris uero tū ob grauitatē, tū ob praeientē retētiā facultatis infirmitatē, inferne cruda excernūtur. Eodē modo etiā in renibus uehementissima serosi humoris appetētiā cōtingit, propter debilitatē autē retentū in eis potū, et ipsum humorē acruatim in uesicā excernunt. Aretaeus etiā haec addit, Viscera ipsis urī uidentur, anxij sunt ac animo dubij, & non longe post moriuntur: igne amplius ardere se putāt, accēditq; sitis & mictio festina: sed quāuis aliquādo parumper urinā retineant, in tumescit lībi, testes, & coxę: quod si adhuc amplius mordēs caliditas in uisceribus augeatur, superior uēter corrugatur, & uenę in ipso eleuātur, uniuersum habitū gracile habet, & tabes totius corporis grauius accedit. Porro aliq̃ sunt qui non mingant, neq; ex eis aliās potatum trāspirat. Quare ob potus infatietatem, & humoris inundationē, & uesicę circūtensionē, acruatim uentre rūpūnt. Ceterū humores uisiosi in ipso renum corpore imbibiti, affectionem ipsam inducūt. Scopus igitur in curationibus nobis sit, ut humorū acridinē deleamūs, sanguinēq; ac cū eo permixtū serosum humorē admodū tardiorē reddamus, & renū interitē reuocemus. Archigenis. Itaq; mox ubi acceperit malū, nondum ad perfectionē progressum, opimū est cubiti secare uenam, & moderate sanguinē auferre. Vidēdū etiā mediocriter urinā cētibus, quę uisatū in renes imbibitū humorē repurgare possunt. Quod si uero inueteratū sit malū, neq; uenę sectio assumatur, neq; quicquid urinā cit exhibeatur. Cōsidit enim in inueteratis uires, & ex uenę incisione totū corpus aerius redditur, & urinā cētia in ipsis multiplicat malū. Maximū autē remediū huic affectioni, ut statim poratū reuomat. Sit autē perquam frigidus ipse potus,

reliqua itē dicta conueniūt uti frigidiorē: quare olera refrigeratiā minimeq; urinā cētia in cibo profunt, pro forbidio autē pūsanē frigus frigidus probatur. Materia etiā ipsa ad exudationē diuertēda. Optima uero, inq̃ Aretaeus, est in dolio facta euaporatio, ad exudādū, eo modo ut caput extra doliū promineat: frigidūq; aērē attrahat, reliquū uero corpus oē cale fiat. De cetero uelut estuatē febrē, causon Gręci appellant, curare oportet, quo celerrime suis extinguitur: polētę itaq; florē aceto & rosaceo subactū cataplasmae modo prae cordijs imposito, utris item folia tenera trita, aut umbilici ueneris, aut portulacę, aut seridis, & quęcūq; alia cōsimilia: prae bibendū etiā sanguinarię succū ex uino nigro assidue praeberet. Symphytum item & palmarū cremorē, baccarūq; myrti & pīorū. Vermes quoq; terrenos coctos ex aliquo prae dictorū succorū. Cibi exhibeantur boni succi, mordacitate carētēs, & qui acridinē obtundere possunt, uelut sunt oua forbilia, & similago, & halitica ad forbitonis formam apprata, carnes porcing macrę probe coctę. Vinū sit rufum, crassius, frigida amplius dilutū, ad falguginosorum humorū prolutionem, qui sitim inducūt. Vinū enim corporis miscellā ad dulcorem permutat: neq; uero in cōmodē exhibetur eis caseus rectē cōpactus circa salē, & lac per filices aut ferrū ignitū salsum, seroso humore adempto. Porro si prae dicta auxilia frustra adhibeantur, affectioq; ipsa augeat, nō absurdū fuerit etiā stuporē inducētibus uti, ita ut soporiferū antidotū ex papauerū capitibus apparatū exhibeamus, aut aliquē ex dolorē leuātibus pastillis, infuso etiā soporifero utēdum, uelut est opium erui magnitudine cū pari modo castorij, aut etiā maiore: haec in passo critico dissoluantur: nō ut in colicis fieri solet, cū oleo rutaecor: refrigerare enim in his pręsumimus. Infunditur etiā uuluer oleū in quo uermes terreni sunt decocti. Forissecus autē retro ad lumbos & ad pectinē illitiones & cataplasmata refrigeratiā adhibēda, qualia sunt quę ex lactuca, umbilico ueneris, lētūcula palu stri, perdidio, & similibus apparāt. Cerata etiā his locis ex rosaceo adornata imponēda, aut ex chamaemelinogubda ex prae dictis succis ammixtis. In quibus autē uehementē stupefacere sensum inēdimus, etiā mādragorē succū in cerata ammiximus. soliorū itē papaueris succū, & similia. Per interualla autē quędā, etiā antidoti ad lethalia uenenā destinatę exhibeantur, & maxime theriacę ex uiperis cōstitas, Andromachi inuēto, rectē apprata, & ea q̃ Esdre inscribitur.

*De renum cruentam urinam excernentium debilitate: ex libris Rufi.*

Cap. 11.

Renum porro & alia affectio est, in qua tenue sanguinis serū mingitur, quod ipsum itēdē propter renum debilitatē contingit, quemadmodum in hepate fieri solere diximus, atq; propter amplitudinē osculorum ex uena caua urinam ad renes excolantium. Quum enim ampliores meatus sint, quiddam etiā ex sanguine uenę laxatū emittit; aliaq; itidem crasse

sa: adeo



sat adeo ut postquam ea quæ mixta sunt cõstitierint, subsidentia quedã in vase repeririãtur, & superne quedam concreta, marinum maxime pulmonẽ similitudine referentia. Concocto igitur cibo & in uenas distributo, qualia dicta sunt minguntur; recens autẽ ingesto & crudo adhuc cibo, pura & aquosa, quæ nihil subsidens habent, per locum ejiciuntur. Nihil uero dolitant, aut omnino parũ, & electo lotio leuati melius habent. Extenuantur autẽ & emaciuntur tẽporis progressu omnes, & magis adhuc hi qui plus sanguinis mixtu excernunt. A principio itaq; cõuenit his quies, & cibi adstringentes, & uinum nigru in potu. Ab his quæ urinã cient, & à colitu omnino abstinentum. In potu autem hæmopticoia pharmanas exhibenda, maxime uero sanguinarie succus, & radices symphyti decoctum; & tragacanthus in uino nigro macerata. Siftit uero sanguinis ex renibus eruptiones straiotæ aquis innatãtis succus potatus, & radices magnæ crocodilidis iuxta aquas nascentis, quam Syri orophen appellat, decoctum, pconizæ siue glycyldes grana fulua xii. ex uino. Cornu cerui uisi drachma una ex uino, folia salicis trita cum uino, lysimachij succus, lapidis hæmatitæ drachma una, ramentorum loti arboris cremor, radices spingæ albæ decoctũ, & similia, quæ in sermone de hæmopticois sunt prædicta. Porro inferius autẽ renibus & lumbis imponuntur ea quæ ad multibrem fluxũ deseri bẽtur epithemata, item ea quæ ad sanguinis per spiritum refectiones sunt descripta: & quæcunque unã cum eo, quod adstringunt & resicant, etiam robur addere possunt; qualia sunt rubi folia, & glandes, & myrti ac quercus folia, itemq; myrti bacce, malicorium & balauftia, & perdicij folia, & similia palmis pãsis excepta, & imposita. Post hæc habitus cibarijs, lacte ac aucularũ carnibus, suillis etiã ac macris refectus est, quo uniuersum corpus ad pristinas ut res reducatur, & renes corroborati propriũ obeant munus. Est autem proprium renum munus, serosum humorem à sanguine secernere & excolare.

De his qui per circuitum quandam sanguinem mingunt. Archigenis. Cap. III.

Quidam per circuitum quoddam sanguinem è renibus excernunt, simili modo ut ex hæmorrhoidibus in se de fieri consequuntur; & in principio quidem propterea quod circa ullum aliquem dolorẽ excernitur, nihil in totum mali formidant ægritubi uero diuturnior fuerit affectio, & aliquando cohibeatur quod promore externi consuevit, grauitatẽ inducit, aliorũq; pessimorum morborum causa existit, sanguine nimis ut aliis particulas dilabente. articulares enim affectiones in aliquibus ex cohibitione accidunt, aut uertigines, aut deliria ex atra bile, & insanie, aut oculorum cæcitates, qualia etiam mala hæmorrhoidibus cohibitis contingunt: ut plurimum uero in malum habitum corporis & hydropem delabendi aptitudo inde oboritur. Manifestum autem sit sanguinem è renibus excerni, quod ipsi ægri ex creti sanguinis transitum iuxta renum locum sæpè sensu percipiunt, & maxime quum urinẽ ammixtus sanguis reperitur. Contingit affectio hæc magis in ætate uigoris, præsertim iuuenibus qui licetius rebus ueneris utuntur. Quidam autem sanguinem ex renibus excernunt, propter uenę rupturam in renibus factã. Quemadmodum contingit his qui graue onus leua-

runt, aut ualde saltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud quippiam tale uolentum perulerunt. Aliquando autem & ob acres ex supernis defluentes humores erosio uenarum contingit. Conandum igitur statim in principio, ut sanguinis impetus cohibeatur, præsertim in his qui eum secundum circuitum excernunt. Si enim ab exercitatione, ut dictum est, excrecio contingit, non tuto cohibetur itaq; uenę sectio in cubito commodata fuerit his qui per circuitũ sanguinem excernunt, paulo ante circuitum adhibita, eis uero quibus ob ruptam uenam promanant, statim in principio. Cæterum sanguinis detractionem pariri melius erit, ut paulatim eius reuulsio ac diuersio fiat. Locis autem circa renes spongij posca imbutis cooperantur, aut lanis succidis cum rosaceo & aceto. Post hæc etiam emplastrum imponenda cruentis uulneribus glutinandis apta. Commode etiam cucurbita adhibetur, præsertim si suspicio sit inflammationem adesse in his, qui ob uenę rupturam sanguinem mingunt. Cõueniunt item potiones hæmopticois aptæ. Porro ubi sanguinis excretio cessauerit, diætã utendum est, unde non multus sanguis gignatur, maxime in his qui per circuitum excreuerunt, & supernæ corporis partes assidue exercendæ. In his uero qui ob uenam ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis suppressionem curabimus per ea quæ in loco de exulceratione dicentur. Emplastrum renale. Cere sequuntandam, croci staterem unum, uictellorum ouorum numero duo, palmarum numero decem, æteri & rosaceti quantum satis est.

De calculosis renibus: Archigenis & Philagrij. Cap. III.

Renũ calculi homines prouectæ ætatis magis quam pueri apprehenduntur; quemadmodum uesicæ calculi pueri frequentius quam ætate prouecti. Causæ autem generationis horum calculorum assiduæ existunt cruditates, unde materię incoctæ ac crudæ multitudo congregatur, & ardor circa renes & uescicam exoritur, qui humores ad assans eos cogit, & in lapidem induratur, ad modum toforum qui in aquis reperuntur, quæ in aeris præsertim balnearum uasis coquuntur. Consistunt autem lapides in renibus iuxta uentriculos ipsorum aut parui, aut maiores: & aliquando quidem pauciores, aliquando autem plures: & magnitudine, & forma, & colore, & asperitate, & multitudine inter se differentes; nigri enim & subalbidi & pallidi reperuntur. Ex eorũ numero rotundi & leues facile excernuntur, nõ itẽ qui alia quacũq; forma præditi sunt, maxime tamẽ oblongi & asperi difficulter excernuntur. Accedit ægris loci dolor, tumore nusquã foris apparente, nisi inflammatio per lapillos productur: spina ægre flecti potest, & totũ corpus ad motũ pigru est: crura torpẽt, & maxime cruris reni affecto propinquũ. Urinẽ circa obturationis principij pauca, aquosẽ minguntur: postea uero perfecta earum suppressio cõtingit, aliusq; nihil excernit, uerũ propriũtudines multas ad egerendũ facit. Excernitur autẽ aliquando sanguis propter uisceriã calculorũ, præsertim asperiorũ. Cæteri ubi lapsi ex renibus fuerit emotus, & ad uescicam delatus, urinae multæ prodeunt arenosam subsidentia habentes, & alius similiter large egerit. Sensum autem æger percipit, ueluti calculo à renibus ad uescicam transeunte.

Cura

## Cura renum calculosorum.

## Cap. v.

Quum lapis in renibus fuerit obturatus, & uehementissimos intulerit dolores, sanguinis etiam multitudo periculum minitantis materias ad tensione affectam partem aduocat, ob acutos uidelicet dolores. Vena igitur cubiti propinque manus in corpore ex repletione affecto secunda est: uerum multo minus euacuandum est quam ipsa repletionis copia exposita: neque enim futurum speramus, ut omnino cito à renibus excidat lapis, præsertim si magnus existat: quare seruari oportet, sanguinem in eam quæ cum tempore futura est in corpore expensam. Itaque qui sanguinis multitudinem congregarunt, eis uenæ sectio commodata existit: qui uero uitioso humore abutuntur, eis purgatio apta est, quæ abundantiori humori conueniens erit, neque omittenda hæc est, nisi aliud quiddam id fieri prohibeat. Post sanguinem euacuatū aut expurgatum humorem, cōmunis ad omnes calculosos curatio quam infra subieciimus adhibenda. Doloribus igitur repente aut paulatim irruentibus, & per areularum cū urinis excretionem aut stas: deinde quæ aquosis urinis excretis, & prædictis sanguinis consequentibus ægri alio per clysterem infundere oportet furfurum decoctum, caricarumq; ac foeni græci & aristolochiæ: & si quidem decenter euacuentur, sineres: si uero non, etiam bis aut tertium infundere, atque id maxime si uenæ sectæ aut purgationis auxilium sit relictum. Cæterum ubi sufficienter excreuerit uenter, quædam infundere oportet, quæ corpusculorum circum lapidem sitiori inflammatio nes lenire & laxare possunt: id ipsum uero oleū anethinum facere poterit, adipe gallinaceo recenti in eo eliquato, & maxime anserino, & phasiani, aut etiam butyro: quæ si non adsint, etiam fœnum græcum & altheæ radicē oleo decocta infundemus. Insestiones item in balneis assumendæ, ex decocto fœni græci, altheæ, anethi, artemisiæ, caricarum, & oleo. Maxime uero assumendæ sunt insestiones in balneis, & post hoc statim ægri in solium tepidius demittendū, atque id assidue facere non ab re est. Fomenta quoque locis adnota commodant ex furfuribus, præsertim in prædictis decoctionibus incoctis. Post fomenta conueniunt cataplasmata ex farina tritici, cum semine lini & fœni græci, melleq; & oleo anethino aut gleuicino, ita ut in decoquendo etiam altheæ radicem coctam & cribratam cataplasmati inferamus: in fine autem cocturæ terebinthina quoque iniiciatur. Optimum etiam cataplasma sit ex lupinorum farina in passo cocta, peucedani radice quam tenuissime trita, & chamæmelo in puluerem redacto ad farinam lupinorum ammixtis. Bonum est & panem passo decoctum circa lumbos & uentrem imponere, neque tamē absurdum foret eadem cataplasmata uesicæ ac peccini adhibere. Oportet autem coaceruatim alia super alia cataplasmata adferre, priusquam primum frigeat: aut si id non libeat, calefactorio alio extrâ contingere ne refrigerentur: id quod commodè fieri potest per facellos, aut alia uaporatoria cataplasma ti imposita. Multis enim ad lapides per urinam electionem hæc sola suffecerunt: uerum tu etiam ea quæ urinam cient præbibenda dato. Urinam autē multam ducit, mei athamanici, plu pontici, acori, graminis, & nardi decoctum, calami aromatici, amij, dauci, oreoselinii, hyperici, rosamarinii, asari, radi-

cis asphodeli, radici bryoniæ decoctum, coccus ite tinctorius. Ex his singula eisdem similia tum per se, tum inuicem permixta data, urinam manifeste mouent. Crassa autem lotia ducti, radici cardui decoctum, radici rubiæ farina potata, radici capparis cortex, & similia. Excuscat autem facultates ad excretionē irritando, allitū, chamædaphne, asparagi uitis albæ, asparagus, tertium scillæ decoctum, primo ac secundo diffusum. Deductū autēd renes ea quæ calculos cōfringūt, peucedani radix, bryonia, apii, radicula. Cæterū lapides ipsos in renibus cōfringūt, ac atterūt, siō, adiatū, bdellitū, uitis semen, oxymyrtilines radix, radici lauri cortex, palstri semen, tribuli decoctum, farxiphagi, betonice, radici graminis, damafonij radici, cicris iusculū, radix cyperi, lithospermō, te colithō & liquefacendo lapidē dictum, lappæ, quæ philanthropos & xanthium dicitur, semen quod in spinosis pilulis reperitur, & lithospermō alsimilatur: asparagi palustris radices, utrum combustum tritum, altheæ semen & radix, rumicis domesticæ radix, pruni arboris gummi, ex spogijs marinis lapilli, uermes terreni cocti: horum singula partim decocta, partim tenuissime trita, præbeto bibenda. Sunt & composita plurima lapidem frangenda, ex quorum numero utiliora in cura calculosæ uesicæ subijgam. Porro ea quæ urinam cient ac lapidē frangunt, tunc exhibere conuenit, quum uehementes dolores remittunt. Transinoto enim lapidē & ex sede agitato dolores quiescūt. Quod si obfirmati sint lapides, plurimus potus uitandus, itemq; ea quæ urinam ducunt: fomentis autem & cataplasmatibus ac infestationibus membra relaxanda, & uenter per infusa ac infusua euacuandus, ne ureteres meatus urinam ex renibus ad uesicam transmittentes comprimentur. Post hæc autem doloribus aliquantulum lenitis, etiā cucurbitæ uulter ipsis adhibentur & præsertim pressius affixæ, inflammatione uidelicet id non impediēte. Adeo enim coaceruatim transuolent sæpe cucurbitæ ipsos lapides, ut repente dolores supprimant, lapidē nimirum in uesicæ amplitudinem transuectio: quapropter in principio superne à rene cucurbitæ sunt affigendæ, & ad inguina adrahendæ oblique secundum meatuum qui ureteres appellantur situm. Cæterum si calidius sit ægri corpus, sitisq; uehementer infestet: sit autem uniuersum corpus iā per uenæ sectionem, aut purgationem, & efficacissimos clysteres præuacuatum, ac nulla superfuitate abundet, si quidem consueti fuerint ad frigida potum, & nullum ex uisceribus debile existat, frigidam aquā frequenter & acuatim ægro bibendam exhibuimus, & confestim corroboratis renibus, obturatum in ipsis lapidē expulerunt. In repletis autem corporibus & abundantibus superfuitatibus, & in his qui uiscera debilia habent, uitare oportet frigidæ potum. Sæpe autem delat ex renibus in uesicam lapides, & præ magnitudine circa collam uesicæ detenti, in extremum periculum ægrum deducunt, tum propter dolorum acumen, tum quod urinam excernere non permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri oportet, ita ut supini stentur, & longe altiores coxarum uertebrae habeant: deinde multiformiter eos commouere, quo omnibus machinantibus adhibitis lapidē ex ipso uesicæ meatu excidere faciamus: post uero ægros iubere

subere ut alacriter urinam eijciant, & electio lotio si-  
neret:atque ubi lapis non fuerit euacuatus, rursus  
mouere,atq; hoc ipsum saepe repetere. Quod si non  
euacuetur,catheter instrumentum prolestandae uri-  
nae aptum immittatur, quod pro aegri aetate con-  
gruent sit: moderatum: eoq; humor educatur:  
post uero per portiones lapidem in amplitudine uesti-  
cae existentem confringere ualentes,lapis ipse attera-  
tur. Si uero ex uestica quidem excidat calculus,iuxta  
medium autem meatum ipsius pudendi obfirmetur,  
& uulnerando exulcerationis periculum indu-  
cat,decoctum quoddam ex praedictis urinam ducenti-  
bus plurimum exhibendum est,iubendusq; aeger ut  
multam urinam congreget, eamq; postea emingat  
ac diligentius expellat:ita enim detractus lapis celes-  
titer excidere consuevit. Noui autem, inquit Phila-  
grius,quendam in quo quidam aliis lapis fuit pro-  
gressus,non penitus autem quam in summo puden-  
do fortiter obturatus,& parum absuit quin homo  
periret,propter urinæ suppressionē,& maximū do-  
lorem. Angusta igitur uolsella ipsum lapidem ex-  
trahere non potuimus,quare sensim & quiete agita-  
uimus perquam tenui auriculario specillo,quum ue-  
ro neq; hoc modo eum extrahere possemus, secare  
statuimus,uulnusclo superne iuxta glandis magni  
tudinē incusso. Inferne enim secare non expedit,  
quandoquidē ferē semper in fistulam proficit,ac po-  
stea per ipsam fissuram urina excernitur. Porro ubi  
per urinam prodierit lapis,lac asinum melle mo-  
dico mixtum praebatur,& reliqua etiam diæta cō-  
modior,uelut ad ulcera fieri consuevit,cōstituitur,  
ob uexationem uidelicet in locis ex lapide factam.  
Inde uero praeseruare hominem oportet, ne rursus  
renes lapide infestentur. Smegma Archigenis, ad  
uesticam & renes affectos, ut arenam per lotiū exter-  
nant,quo in balneis sudans utaris. Piperis, calcis  
uiuae, sinapis, fecis uini utrae, caphidis, syluestris, ni-  
tri, adarces, pumictis, aluminis scist, sulphuris uiui,  
aqualibus partibus utere. Ex oleo praëllitis locis.

Diæta praeseruans ne lapides renascantur. Cap. vi.  
Maximi ad lapidis generationem praecauendam mo-  
menti, moderatus cibus & bonæ concoctiones ex-  
stunt: satietates enim & cruditates nō solum exasper-  
rant morbum, sed etiam quum nō sit, generant. Quare  
aegros admonere oportet, ut à cœna saepe uomāt,  
& ablinthium assidue bibant, & per tempus certum  
conuenient temperaturæ ipsorum purgatiuo phar-  
maco se per uentrē purgent. Cibos autem deligant  
ei quibus nec satietates nec cruditates contingant:uri-  
nam etiam clementibus utatur: passinacā in dies eden-  
tes ualde percoctam, & feniculi, sion, cardui, pule-  
gium, calamintum. Et ex marinis herinacis recen-  
tes, sitombos, locustas, gammaros, & cæros fluuiā-  
tiles: atq; hæc quidem quotidiana sint, per plures au-  
tem dies radicis eryngij decoctū bibant, similiterq;  
trixaginis, & dictamni, ac radicis tribuli, reliquaq;  
pharmaca lapidem atterentia partim iam prædicta,  
partim dicenda. Oportet autem ipsam etiam aquam  
per omnem uictum purissimam esse & percolatam:  
uinum item tenue, album, urinam ciens: exerdiamē  
tis uero utendum est mediocribus, & fricationibus  
in balneis ex nitro assato, & fece uini utrae, ac pumi-  
ce: pillo theris item assidue utantur, ac reliqua adseruā-  
te diæta, quæ in calculosæ uesticæ loco dicitur.

Vnguentum renale, Oribasij.

Cap. vii.

Cyprini lib. iiii. ceræ lib. ii. terebinthinae lib. i. unguen-  
ti amaracini & laurini cuiusq; lib. i. centaureæ, casto-  
rij, saryrij, myrrhae, piperis, euphorbij, cuiusq; quæ-  
drantē: cyperi, pyretri, pulegij, cuiusq; unciam i. sub-  
ige, & in fine etiam opoballami trientem ammi-  
sce. Quidam euphorbij sesquunciam tantū adiungunt.

Aliud malagma: hoc exquisitū est ad eos quibus  
renes aut uestica lapide laborant, inquit Archigenes:  
neq; reperias aliud his affectionibus conuenientius.

Picis liquide, italicas heminas duas & dimidiam,  
ceræ, resinæ pinus, sulphuris uiui, cuiusque sesquili-  
bram, nitri sesquilibram, pyretri sexuncem, fecis uini  
ustæ lib. ii. nasturtij, italicum sextarium i. staphidis  
syluestris sextarium unum, galbani sexuncem. Lique-  
scibilibus liquefactis arida trita infarcito. Empla-  
strū renale: facti ad colicos & coxendices: est autem  
Asclepiadæ. Ceræ trientē, styracis sesquunciam, aloës  
sesquunciam, croci, pyretri, opopanax, galbani, thu-  
ris, cuiusq; unc. i. ammoniaci thymiamatis sextariē,  
olei ueteris trientē. Apparatu quā pro more subadū  
confidenter usurpato, & miraberis, inquit Asclepias.  
Aliquod uero olei tantum sextariē cōijcimus.

Diæta eorum quibus renes & lapide laborant, reliqui  
uero totius corporis habitus gracilis est: Phila-  
lagrij.

Cap. viii.

Maligna corporis constitutio est in qua renes quidem  
lapide generant, uniuersi uero corporis natura gra-  
cilis existit. Etenim quum lapide laborantes phar-  
macis & uictu indigeant attenuatorijs, hæc ipsa gra-  
cilibus corporibus maxime contraria existunt. No-  
ui enim quandam qui ob renem ex lapide affectio-  
nem huiusmodi diæta usus, proprios digitos ægre  
mobiles, obtusiq; sensus, & ueluti strepentes ac exa-  
refactos sentit: Medici autem ipsi familiares refrige-  
ratos digitos ipsius rati, & resolutionē, quā paraly-  
sin Græci uocant, meditati, pharmaca ex euphorbio  
& adarce adhibuerunt: quorū usu affectio multo pe-  
ior reddita est, & accessiones semper ad superiores  
partes progressæ sunt: unaq; uehementissimos dolo-  
res intulerūt. Post uero ubi eger me accessisset, inquit  
Philagrij, & quæ contingerant circa ipsum decla-  
rasset, auxilium meū implorabat. quare diætā ei in-  
ueni, per quam citra omnē renum læsionem uniuersū  
sani corporis siccitatem sanauit. Pisane igitur succū  
excogitauit, & ex piscibus in petrosif albis degētes,  
itemq; maritimos, & quæcūq; alia nihil uiscosum  
habentia. Simili modo & ex uolucrum genere quæ-  
cūq; cōsimilem habēt carnem, ueluti sunt perdicæ  
montanæ, attagines, sturni, turdi, & merula; & de-  
inceps colibæ in turribus habitantes, & passeruli iti-  
dem in turribus nidos fruentes ac habitantes, deinde  
etiam gallinæ in altioribus locis connutritæ. A  
lacte autem reliquorum quidem animalū abstinere  
iussimus, solo uero asinino uiu indulgimus, & ut  
compendio dicam, media inter ea quæ impinguant  
& attenuant esse oportet, quæ his ciborum loco ex-  
hibentur.

De calculosæ uesticæ.

Cap. ix.

Generantur etiam in uestica lapides, pueris frequentius  
quàm ætate procreatis. uoraces enim pueri sunt, &  
perpetui motus, & cibis utuntur oblatis & nociuis  
utitur, & neq; horam cibū capiendi seruant ordinā-  
tam: quin etiam prius quàm prior assumptus cibus  
concoqua

concoquatur, alium ingerunt: & quum uehemētius a cibo moueātur, crudus & incoctus in uenas cibus distribuitur. Mollia autem sunt ipsorum corpora, & quæ facile cedant, eiusq; rei gratia obturationem circa renes non perferunt. quum uero crassissima lotia in uesicæ amplitudinem perferant, ibidem ueluti uini fex, & limus aquæ subsistunt, ac postea ex loci caliditate desiccata lapidescunt. Cæterum aquæ impuræ, & multo limo referent, itemq; duriore & uehementer frigida, lapidum generationē adiuuāt. Lapidis igitur in uesicā obortus in principio subiectis pharmacis subducere conabimur.

*Pharmaca, lapides uesicæ attrahentia, itemq; uinum ducentia.* Cap. x.

Sunt & pharmaca quæ lapides in uesicā attrahunt: porri semē, foeniculi syluestris radix, artemisia, chamæmelum, amaracus, althææ radix & semē, carpobalsamū, non quod circa aquas nascitur, graminis radix, adiantū, philletærij radix, smyrniū semen, oxymyrstines radix & semē, rumicis radix, pæoniæ grana fulua comesta, umbilici ueneris radix, leucanthemū, lapides spongariū, amomū, tecolothon, lithospermon, scolopendra herba, lapis qui ab agris per lotiū electus est tritus ac poratus, lappæ herbe, quæ xanthiū & philanthropos dicitur, semē uermes terreni recētes cocti triti cū uino, aut cōdito, aut alio quopiam potu, ex uino & melle, propomati nomine Græcis appellato, paliuri semen, amomum, quod ipsum & aquas lapidē gignētis depurgat, si cū ipso amygdalæ amaræ gummi coquatur: uitis lacryma, pruni arboris lacryma, hoc est gummi, radiculae radix cum panacis radice & capparitis cortice similiter lapidē per urinā eijcere facit: thuris granū cum uino multo, abrotoni semē cum piperis pari modo ex uino. Horū unūquodq; cum uino albo datur decoctum, aut siccū in spersum, aut cum melle, aut cum quopiam ex uino & melle potu. Danda etiam in potu ea quæ urinā ducit: eis quidē qui calidiore habitu præditi sunt, eucumæris semen, apij, petroselinij, hyacinthi bulbi semē, uiole albæ semē, croci radix, & similia quæ ad calculosos renes sunt prædicta. eis uero qui temperatioris frigidiorē habent, his calidiora præbetor: quale est meon, phu, acorus, carpobalsamum, tris, & similia in renū affectionibus prædicta. Orisabij, ad calculosos renes & uesicā. Herbæ prosopidis quæ scordij appellat, & Romana lingua personata, est autem folio lato, similis symphyto, huius unc. i. piperis dr. i. dridis unc. i. trita in uitro reposita. Datur inde cochlearij pleni mensura cū hydromelite: datur autem quarto quoq; die. Aliud Orisabij. Corticis radicis uerbacif decoctum large per dies quinq; bibendum ex ordine præbe, & interiectis decem diebus, rursus per quinque præbe.

*Communia remedia uesicæ & renum calculosorum.* Cap. xi.

Acetum mulsum aqua tēperatum omnibus & calculo siue renum siue uesicæ laborantibus exhibēdum est, qualicumque tandē temperie præditi sunt, & qualēcunque sanguinē gignant: acetum itē scillinum. Caradus etiā frequenter exhibēdus est. Oportet autē radices eius recēs et terra extrahās, si tempus ita ferat, aut aridas iuxta aliud anni tēpus, in uino albo substantia tenui decoquere, & largius eā potionē offerre. Crassę enim urinæ copiosam multitudinē ducit, tum ex

omnibus uenis, tum ex calculosis partibus deacta. Carduus igitur secundum totius substantiæ suę proprietatem, & pro priuati tēperamenti facultate, uim crassos humores deurahēdi habet. Orisabij. Comodæ sunt etiam calculosis, cicadæ aridæ tritæ, potu insperse tum per se, tum cum nardi spica: congruenter autem miscetur ad cicadas duas & dimidiam, nardi drac. i. Dato ex eis per dies nouem: primum, cochlearium unum, deinde ii. postea iii. deinde rursus i. & post i. hoc modo progrediendo, donec nouem ex ordine portiones fiant, i. ii. iii. i. ii. i. ii. i. De passerulo. Sunt & alia quæ aliam naturam habent, & per hanc ipsam prædicta efficaciam prædita sunt: quali sanē præstat passer troglodytes appellatus: est autem passerulus minimus iuxta sepes & muros uisum quæritans, estq; hoc animalculum omnium auicularum minimum, ea ex epta quæ regulus appellatur: similis est autem regulus in multis, præterquā quod in fronte auricolares pennas non habet. est etiam troglodytes passer regulus paulo maior & nigrior, caudamq; semper sub rectam & albo colore retro interpositam habet: magis itē garrulus quā regulus est, & sanē iuxta summum alæ lineamētum cinerei amplius coloris, breues itē uolatus facit: naturalem autem uim omnino admiratione dignam habet. Itaq; sale conditus & crudus in cibo acceptus, morbum perfectē sanat: & noui adeo quosdam ob eius usum nunquā amplius ab affectione uexatos. Conditur autem optime pen nis euulsis, atq; inde largo sale adobruus, & postquam fuerit arefactus comeditur, & affectionē perfectē sedat. Melius autem est etiam aliter ipsos edere si plures contigerint, coctos nimirum, eius præsertim generis quod per hyemem ubiq; apparet. Exhibetur autē & alio modo. Passerulus non deplumis in ollulam conijcitur, ac deinde operculo addito uritur, animaduersioe assidue habita, ne fallaris quum in cinerem sit redactus, & in aërē exhalans per exustionem totus consumatur: consueuit enim hoc contingere tum ipsi, tum alijs quę uruntur: quapropter præstat ollæ operculum non oblinire, ut per interualla quędā operculo adempto uisionis modum intueamur. Exhibendus est autem semel omnis unius passeruli usti cinis per se, aut modico orisabij & pipere ammixto, quo saporis iucunditate oris commēdetur. Vtius itaq; passerulus peregre proficilientibus commodus est, licetq; melle cocto exceptum in promptu habere. Melior autē mihi uiderur condendi modus, atq; adhuc dictis præstantior, si quis præeuulsis pennis uisum passerulum sale adobruat. quod & ego facio, inquit Phlagrius. Arbitror enim & sanguinis naturam quiddam in se complecti, quod minime uulgariter proficit: cui amplius steroris efficaciam accedit, quam exustione debilitorem reddi planē credo. Proderit etiam eis qui abundante assatos edere integros, ita ut nihil ex eis præter pēnas abijciant. Atq; hæc quidem sunt quæ secundum proprietatem totius substantiæ efficaciam existunt. Cæterum non minus generose etiam compositæ facultates calculi affectionem in renibus & uesica deterunt: prius autem quā ad eas progrediar, unius simplicis pharmaci mentionē faciam ualde celebris, quod perfectam affectionis destructionem promittit, & quodam modo ad ea quæ ex proprietate totius substantiæ

stantiæ operationem faciunt accedere uidetur. Haber autem hoc modo. Pharmacum simplex ad calculosos, cui Marcianus testimonium præbet, medicus Apher. Leporis pellem in ollulam conijce, & in furnum demitte, atq; ubi uis fuerit, ut probe cocti possit, acceptam tere, & ex ipsa cochlearium unum cum uino seuinis in solij calidæ aquæ inscensu præbe. Si uero uelis experimentum pharacæ ipsius accipere, ex eo in unum conijce, & in uisum item lapidem ex flumine acceptum inijce, & coctum per paucas horas sine, & in grumos lapsi dissoluatur. Presbyteri Indi pharmacum ad calculosos, quod iisdem externum lapidem in grumos resoluiere posse quidam aiunt, quemadmodum id quod præcedit.

Acori, phû, hyperici, cuiusq; drachmas sex, seminis porri drachmas xii. spicæ nardi drachmas decem, calsiæ, lithospermi, cyperi, cuiusq; drachmas xxv. excipe melle. Datur magnitudine fabæ. Aliud, quod lapidem celerrime per urinam expellit. Alio rum unguiculos siue nucleos septem, piperis granouem, contere simul quam tenuissime, & cum uino albo ueteri adstringente, per una uice in balneo bibendum præbe, ubi ad calidum eius locum fuerit ingressus. A dolore quidem hoc ægrum liberat: alio quando autē & lapidē post unicā potionē exigat.

Oribasij nephritidis. Acori, mei, phû, asari, farxiphagi, piperis nigri, seminis rutæ, betonicæ, spicæ, nardi, piperis albi, singulorum æquales partes accipe: & ex eis siccis cochlearium cum uino adstringente aut aqua præbe. Aliud, Oribasij ad affectionē renū, quod & somnū inducit. Anisi, apij, petroselinij, spicæ nardi, piperis albi, nigri, & longi, singulorum drachmas decem, cinamomi drachmas octo, myrrhæ drachmas quatuor, opij drachmas quatuor, castoreij, sifonis, dauci, cuiusq; drachmas duas, seminis hyoscyami seculidrachmam, farxiphagi, rhei, betonicæ, calsiæ, cumini, seminis cucumeris decorticati, cuiusque drachmam i. excipe melle, & nucis ponticæ magnitudine præbe ex aqua calida. Facit & ad ulcera. Aliud eiusdem celebre. Piperis nigri, albi, longi, farxiphagi, betonicæ, petroselinij, asari, nardi celticæ, spicæ nardi, omnium æquales partes misce. Dato drach. i. cum condito calido temperatam.

De hircino sanguine.

Cap. xii.

Gangui hircinus tum ad nephriticos, tum ad calculosos præfens remediū: nam & præexistentes lapides soluit, atq; ita per lotium externi eos facit, ut etiam alij amplius non gignantur: præterea & dolorem sedat. Colligitur autem hircinus sanguis hoc modo. Quum uua maturascere coeperit, ollam nouam accipito, & infusa in ipsam aqua, donec terreum deposuerit olla coquito: & accepto ē grege hircō ætate matura, plus minus quatuor annorum, eq; mactato, eiusq; sanguinē medium olla excipito, ita ut eū qui primū effluxit, itemq; postremū penitus relinuas: medium autem inspissari sinito, & in olla situm per acutam arundinem in multa frustra dissecato: indeq; reticulum denso, aut lineolo raro, aut cribro arctiore coctum sub dio exponito ut insoleat & roscidus fiat, cauendo ne hymbre cōmadefcat: porro ubi exicatus fuerit, cum diligenter terito, & in pyxide adseruato, & remittente malo cochlearium plenum cum passo cretico exhibito. Cognominatur autem pharmacum hoc Theu chir, hoc est manus dei. Huius &

nos, inquit Philagrius, in breui tempore non aspernandum periculum fecimus. Aliquādo autem modis commendandi gratia parum solij, aut amomi, aut similitum ammiscemus. Ego, inquit, hoc pharmacum cum troglodyte passerulo permixtum, cuiusdam penitus nihil loci ejiciēti post magnos dolores exhibui, & permagnum lapidē auritum ab eo expulsi. Antidorus Iuliani diaconi, cuius frequens periculum meo tempore fecit: calculos enim & in renibus & in uelica constringit, & paulatim per locū expellit: facit ad comitiales probe ducit menses ob densitatem aut frigiditatem restrictos. Olsium ceruinorum uisum quadrantem, castoreij, piperis albi, agari, acori, amij, calsiæ, amomi, farxiphagi, cordis capparis, radices panacis, calamini hæ, coaguli seporini, serpilli, petroselinij, singulorum unc. i. mellis quāum sufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine: ad renum affectionem & mensura purgamenta, cum uino mulso: ad comitiales, cum uino aquatad bestias utrusque estantes, cum uino. Antidorus ex hircino sanguine. Componitur ex hircino sanguine antidotus huiusmodi. Sifonis, serpilli xii. spicæ nardi scrupul. xii. piperis communis scrup. xii. piperis longi scrupulos xii. cumini cithiopici scrupulos vi. petroselinij, dauci, rhei pondici, croci, caroi, ligustici, myrrhæ, acori, cuiusque scrup. xii. sanguinis hircini exiccati, uelut prædictum est, scrupulos xx. xvi. mellis despumati quāum satis est. Datur auellaneæ nucis magnitudine condito caliditatem peratam: datur autem in balneo in calidi solij inscensu. Alia, Archigenis: celebre & clarum est, inquit, ad calculosos & hoc quo uxor: hæc antidoto inquit, usus est etiam Philorimus & Iustinus. Spicæ nardi drachmas decem, croci drachmas octo, myrrhæ drachmas quinque, castoreij drachmas quatuor, & obolos totidem, calsiæ, floris iunci odorati, cinamomi, cuiusque drachmas quatuor, alij drachmā unā tantum habent, costi drachmas duas, scordij, polij, cuiusque drachmas tres, asari drachmam unā & obolos quatuor, mei drachmam unam, piperis albi & longi, dauci, petroselinij, opobalsami, rosarum siccarum, singulorum drachmam unam, carpobalsami obolos quatuor, quidam etiam sanguinis anatis sex minæ drachmas duas, & succi radices dulcis drachmas duas addunt. Excipe melle despumato, & fabæ magnitudine præbe cum uini mulsi diluti cyathis duobus, aut aqua calida. hanc etiam Oribasius commendat.

Antidoti uariæ ad calculosos.

Cap. xiii.

Archigenis. Spicæ nardi, seminis apij, dauci, cuiusque drachm. quatuor, aluminis fidi drachmam unam, cinamomi, calsiæ, floris iunci odorati, cuiusque drachmam unam, croci obolos tres, myrrhæ tantundem. Trita cum uino cenantithe subigis, & cum uino mulso obolus unum præbe. Præclarum, inquit, huius pharmaci experimentum feci, neque præstantius aliud reperis, neque ad huiusmodi affectionem destruendam, neque ad lapidis coactionem prohibendam, neque ad iam compacti attritionem, neque ad defecationem, neque ad educationem & repurgationem limosæ in urinis fecis: coadiuuante præsertim diætâ, quæ potissima præseruatix facultatis pars est existimanda. Philagrii pharmacum ex damafonto constans, quod secūdi ordinis esse dicit.

Dama

Damaſonij drachmas decem, ſeminis dauci drach. ſex, radicis dauci drachm. ſex, radicis herbæ laniaræ, corticis radicis capparis, cinamomi, cuiuſque drachmas ſex, caſiæ drachmas octo, beronicæ, piperis, cuiuſque drachmas octo, nardi celticæ, iridis, acori, aſari, ſeminis ſœniculi, petroſelini, cardamomi, ſpicæ nardi, cyperi, coſti, ſarxiphagi, ſeminis apij, myrrhæ, ſeſelis, radicis panacis, zingiberis, piperis albi, cuiuſque drachmas quatuor, lapidis ſyriaci maſculi drachmas ſedecim, lapidis ſœminæ drachmas ſedecim, ſeminis ſmyrniij, lincurij quod ſuccinum itemq; eleſtrum appellant, cuiuſque drachm. xvi. ſeminis erucae drachm. xvi. mellis quantum ſufficit. datur nucis ponticæ magnitudine cum radicis aſparagi paluſtris decocto, aut floris iunci odorati, aut radicis dulcis. Datur à balneo. Aliud Philagrij, ex damaſonij pharmacum, quod tertij ordinis eſſe ait in lapide atterendo. Facit & ad renum affectiones. Damaſonij drachm. x. iiii. ſeminis dauci, radicis herbæ laniaræ, corticis radicis capparis, caſiæ, nardi celticæ, cuiuſque drachm. vi. alij drachmas xvi. habent, iridis, mei, aſari, ſœniculi, cardamomi, cyperi, petroſelini, coſti, ſeminis apij, myrrhæ, croci, cuiuſque drachmas ii. ſeſelis drachmas iiii. radicis panacis drach. iiii. quidam & zingiberis drach. iiii. & piperis iſe drachm. iiii. addunt, mellis aut quantum ſatis eſt, & utere quemadmodum prædictum eſt.

Oribaſij, ex libris ad Euſtathium, antidotus Xenophili. Facit ad uetiſcæ & renes calculoſos & exulceratoſos. Aterit enim lapilloſos, & ulcera ſanat. Caſiæ unciam unam, ſarxiphagi trientem, betonicæ, cyperi, petroſelini, coſti, tribuli, ſeminis uitiſis, lithoſpermi torrefacti, cuiuſque ſextantem, ſeminis apij ſeſquiunciam, phylli, ſpicæ nardi, aſari, dictamni, baccarum lauri, ſeminis ocymi, ſingulorum unciam unam, zingiberis drachm. iiii. nucum pinearum quas ſtrobiloſos Græci vocant ſex uncem, mellis lib. ii. in balneo exhibeto, aut ante balneum ex uino muſto aut paſſo chryſaico magnitudine fabæ.

Andromachi antidotus ad calculoſos, quæ paulatim confringit & extrudit lapides, donec uetiſcam perpurget, & pellucidum lotium procedat: & quod maximum eſt, ita perſanat, ut nec in poſterum gignatur. Habet autem hoc modo. Seminis dauci, aniſi, ſeminis cucumeris decoricati, ſeminis apij, petroſelini, myrrhæ, cuiuſque ſeſqui drachmam, caſiæ, cinamomi, nardi celticæ, cuiuſque drachm. i. trita aqua ſubigito, & ad paruorū lupinorū formā redigito, ſeiunis aut quotidie per dies triginta cū aque cyathis tribus exhibeto. Ceterū ad huius pharmacij apparatū religioſe, inquit, accedēdū eſt in lignea enim piſa, & piſtillo iſe ligneo hæc cōmūdēda ſunt: oportetq; amplius eum qui hæc cōtundat neq; annulum ferreum geſtare, neq; caldamentā clauſis ferreis tranſſe, & atq; id ut myſterium habe. Aſclepiadæ ad calculoſos compoſitio. Carpoballami, lapidis qui in ſpōgijs reperitur, pulegijs ſicci, ſeminis maluæ ſylueſtris ſicci, ſingulorum æquales partes conſuſas & cribratas reponito, indeq; cochlearium unū cum uini diluti cyathis tribus præbeto. Alia compoſitio celeſtris. Eleſtri ſive ſuccini unc. i. lapidum qui in ſpōgijs reperiuntur unciam unam, ſarxiphagi unc. i. Dantur ex ea ſcrupuli duo quomodocunq; ueliſ. Pharmacū ex cardamino ligno ualde celebre.

Spicæ nardi, piperis, hyſſopi, tecoliti, cuiuſque unc. i. piperis albi ſcrupuloſ v. iiii. caſiæ ſcrupul. i. x. helenij ſive inulæ ſcrupuloſ v. i. ſobis eboris ſcrupuloſ xii. ligni cardamini ſcrupuloſ xii. mellis quantum ſufficit. datur ex eo oboli tres cum condito, aut aqua mulſa. Aliud laudatum. Seminis braſſicæ drachmas vi. cyperorum, petroſelini, eleſtri, piperis ſingulorū unciam unam, mellis quantum ſatis eſt. datur nucis ponticæ magnitudine cum condito febre carentibus, aut cum aqua mulſa. Aliud. Curbitam aridā exure, & dneris cochlearium unū, ut ueliſ bibēdum præbeat: aut carapotia ex cinere ſormato ac exhibeto, & celerrime per lotium calculum extrudet. Aliud, quod calidioribus præcipue conducit. Ex portulacæ ſuccum exprimito, eumq; reſſiccatum in carapotia redigito, & drachmam i. exhibeto, ad miraculum uſq; lapidem per urinam expellit. Aliud. Cancroſ iiii. aut v. aut vii. impari ſolum numero ſub teſta uiuioſ exure, & contriti eorum cineris cochlearium i. cum condito præbeto: q; calculoſos renes ſanabit. Aliud. Phu aqua ſerue factum bibendum præbe, omneſq; lapides educet: quod ſi Miſthridatis compoſitione abūdeſ, eam quæ ſcincos admixtoſ habet, unā cū decocto præbe. Experimento cōſtar: utere. Conditum Oribaſij. Viſi ſextarioſ duodecim, mellis ſextarioſ duoſ, piperis ſeſquiunciam, ſarxiphagi, betonicæ, mei, phu, ſpicæ nardi, petroſelini, caſiæ, cuiuſque ſextantiē. Aliud conditum, ad uetiſcæ lapideſ accommodatū. Sarxiphagi, ſpicæ nardi, cuiuſque drach. iiii. piperis unciam i. carpellæ, zingiberis, mei, aſari, caſiæ, ſiſoanis, petroſelini, acori, dauci, ſingulorum drach. iiii. mellis ſextarium unum, uini ſextarioſ iiii. aut v.

Aliud renale. Spicæ nardi, phu, ſarxiphagi, betonicæ, aſari, lithoſpermi, petroſelini, cuiuſque unciam unam, coſti uncē dimidiū. Ex hoc arido cochlearium unum in conditum mitte, idq; æger hora ante prædium bibat. lapideſ aterit, & per urinam expellit, neque amplius cogi lapidem permittit. Aliud Oribaſij conditum renale: facit enim ad inueteratoſ renū doloreſ, & ad difficultatem emittēdi urinā ex uetiſcæ, ad ſtrangulationem item ac urine ſuppreſſionem, ad eorundem etiam membrorum frigiditytē: calloſas durities extrudit, lapideſ confringit, & ad alias affectioneſ eodem modo probè facit. Sarxiphagi drachmas duas, betonicæ drachmam unam, petroſelini ſcrupul. vi. ſpicæ nardi ſcrup. iiii. phylli ſcrupul. iiii. rhei ſcrupuloſ iiii. iriſionis ſcrupul. vi. piperis ſcrupuloſ xii. mellis ſextarium unum, uini boni ſextar. iiii. Aliud pharmacum renale. Zador, id eſt, zeduaræ, galangie, liguſtici, ſeſelis, cardamomi, piperis longi, piperis albi, cinamomi, zingiberis, ſeminis ſmyrniij, careophylli, phylli, ſtachyos, myrobalani, phu, coſti, ſcordij, ſilphij ſive ſaſerpiſij, rhei barbarici, pæoniæ: alij etiam arboris nucis uileſcum & paliuri ſemen, itemq; ſarxiphagum ac caſiā ſiam addunt. Ex hiſ ſinguliſ ſtateres duoſ cōmiſce to. Datur cū cōdito aut uino uetere ad balneū iturſi, & ſine balneo, uel ſepi ſimiliterq; mane. Abſinthion renale, ualde bonum. Petroſelini unc. i. ſarxiphagi ſcrupul. xii. betonicæ ſcrupuloſ xii. ſeminis iriſionis ſeſquiunciam, ſpicæ uardi ſcrupul. vi. phylli ſcrup. vi. rhei pontici ſcrupuloſ vi. calami aromatiſci ſcrupuloſ quinque, dictamni ſcrupuloſ iiii. mellis



sextarium unū, uini sextarios quinq; præbe medio cris procul mensura sexenis. Pharmacum lapides in renibus atterens, adeo ut in una die commoditatē suam offendant. Abrotoni drachm. viii. croci dra. viii. herbæ anthyllidis drachm. xvi. foliorum rutæ uiridum drachmas x x xii. Probe contrita in pastil los digerito, & ex eis drach. i. cum aceto mulso præbeo. Vtere ipso, inquit, assidue: mirum enim quantā utilitate præstet.

*Cura eorum in quibus lapis atteri non potest, neq; itē per lotium excerni.* Cap. xiiii.

Quod si uesicæ lapides per lotium excerni nō queant, sed in meatu sint obturati, & urinæ suppressionem inducant: ægrum supinum decumbere, uelud distū est, oportet, ita ut coxarum partes magis sursum uergant: indeq; huc atq; illuc multiformiter cōmouere, quo ex meatu excidat, post uero ita adhuc supinum & positu sursum uergentem mingere iubere. si uero neq; sic excernere possit, per cathetrem instrumentum urinam proleat. Quod si ob lapidis asperitatem uesica incidatur, & ex hoc subruentia mingant, aliquando uero purulenta, & submucida, illis ipsis si ue mingant, siue non mingant, plus quā alijs dolorum adest. cæterum in potu exhibenda sunt his phar maca quæ lapidem atterere prædicantur, & ulcera ipsa sanāt, quibus uero ulcera nondum sunt oborta, lapides autem in uesica detinentur, hi pellucida & tenuia ac aquosa mingunt: quin & arenā subsidentē urinæ habent, & in lorij eiectione dolores augescunt. Quod si neq; per hæc adhibita phar maca lapis in uesica atteri possit, ad sectionem trāsundum, quē pro more infernē fiat, atq; ita lapis subtrahatur & fissura quā diligenterissime carne repletur, cicatrixq; inducatur, ne fistula per successum oboriatur.

*Dieta post exactos lapides, adseruans ne alij renas cantur: & de affligentis humoris cognitione ex lapidis colore.* Cap. xv.

Post exactum lapidem, & cicatricem ulceri obductam dieta constituenda est, ne eos renasci cōtingat. Consectura etiam faciendū tum ex alijs, tum ex exacti lapidis colore, cuius humoris materia in corpore abūdet, ex qua adeo lapides cogantur, alij namq; subalbidī apparent, atq; hi pituitosiores humores ostēdunt: alij uero pallidi sunt, & bilem abundare demōstrant: alij autem coloris rufescei sunt, ob superfluatē uidelicet à plurimo calore bilem: alij nigri, qui atq; bilis humorem exuperantem declarant. Omnes igitur quomodocunque calculosi à cœna assidue uo mant, neq; quicquam feruens in cibo sumant, quod renes & uesicam exallescere possit. Caere autem conuenit cibaria substantiæ duræ, & quæ ægre manducatione atteruntur: itemq; ea quæ multam substantiam habent, plurimumq; similiter nutriti, & quæ acruatim digeruntur antequā perfectē concoquātur: grauis item qualitatis, & quæ difficulter cōmutantur, ac supernant, & egrē per aluum subeunt, ac instant: item quæ meatu obscurunt, aut aliās diutius in corporibus insident: ex huiusmodi enim cibis uēter labore fatigatus, ipso aut crudos aut semicoctos ad hepar & renes digerit, atq; ita quod rudicū cumulatim allatum est, ineptē præterq; naturam excolatur, & cum uulmulo ad renes progressum, statim coactum inspissatur ac resistat. Quare omne lac præter asinum eis incommodum existit: hoc enim in-

quit Archigenes, & substantia tenuissimum est, & facultatis facilimē dissolutis. Igitur mirabiliter articularum tumores & nodos (quos & callosæ duri ciei modum ex uitiosi lactis usu pueri sustinere coguntur) leuigat & delet, unde admodum duxit, ut ipsum calculosis assidue hemina mēsurā exhibeat, post matutinas deambulationes, ac quē id adseruandū à lapidis generatione gratia præ omnibus alijs fiat. Potus alijs sit aqua calida, fontana, pura, de fecata, leuis. Vinum autē tenue, urinam ciens, nō ualde uetus. Dulcia enim uina calculosis sunt nocua. Porro ut compendio dicam, omnis dicta in frigiditate temperatura præditis, exquisitē attenuatoria sit: in calidioribus uero, inter attenuatoria & impinguentia media, salietatem uero præ omnibus alijs uitare oportet, dulcium præferim & ex casco cōstaturum ciborum: unde & cruditate infestissimam eis censere oportet: in quam si quando incidunt, impastos & absq; cibo manere decet. Frigora quidē magis quā æstus cauenda. In temperatis uero locis degant in quibus anni tempora & horæ nimio seruo re non insistent. Assumantur etiā ociosæ deambulationes, & exercitia moderata, segnities enim & otii eis nocēt. Cæterū uentrem semper probē laxū habere oportet: hic enim si bene subierit, purior lotia prodibunt. Vnguentis utantur quæ locos defendere queant, ne facilē grauius obædantur: epithemata etiā cutem rufescientia, itemq; lancinantia, dropacesq; & sinapismi adhibeantur. Malagma autem exquisitum hoc est, neq; facile reperias aliud, inquit Archigenes, ad huiusmodi affectiones magis accomodatū. Picis liquidæ heminas ii. & dimidiā, ceræ sesquilibrā, resinæ pinus sesquilibrā, sulphuris uiui sesquilibrā, staphidis ægrestis bessem, galbanū sexuncē. Liqescibilia eliquantur, & insper sis aridistis, simul optimē subacta & unita imponuntur. Varosa asperitas ex hoc inducta mucū plurimū ducit, & pruritus non malum facit, adeo etiam ut uolupte sit, si per resolutionem refrigeretur. Quod si alitquādo leuis molestia inde oboriatur, cerato eam lenire oportet per unā diē, ac deinde rursus eadem imponere. Cōuenientissimū etiā renibus est, si super uētris locum idem malagma imponatur. Sinapismi item calculosis apti sunt, & naturalitē aquarū usus: lauent autem non sæpe, ungantur autē frequenter. Curiose etiā temporis oportunitas dispicienda est, ut uenam secemus, si quidem sanguis abundare uideatur, aut ut purgationibus conuenientibus utamur in eis quibus uitiosi humores coaceruantur. Biant autem & ea quæ urinam ciunt per interualla quædam tum simplicia, tum composita præscripta: in huiusmodi enim omnibus quicquid modicē restitutum est, faciliē ad debitam commutationem deuenit. A iunt autem quidam terram ex latere ueteri uitam cum uermibus terrenis, & petini crassius illitam, præparare ut lapis in uesica aut renibus per lotium eiciatur.

*De renum inflammatione Rusti.*

Cap. xvi. Ob plurimas causas renes inflammantur, nā & humores corrupti, & plage, & auriatones, & pharmacorum portiones inflammationē generant, & præsertim equitationes continuæ & uehementes. Accedit ægris dolor pullatilis retro iuxta primum dorsi uerticulum, paululum supra spursas costas, distendit autem

rem dolor sursum usque ad hepar, præsertim dextero rene affecto, deorsum uero usque ad uesicam & pudendum, lumbosque & coxendices, pectinem item ac femora, conseqitur etiam stupor propinquus curis, & neque recta erigi possunt, neque pedibus ingredi, & siue sternutatio, siue aliqua alia concussio irruat, uehementi dolore landantur. frigent eorum extremitates, & magis suræ ac pedes: adeft urinæ emitendæ difficultas, minguntque assidue ac laboriose, in principio quidem tenuia & aquosa, in quibus nihil subsistat, inflammatione uero in peluis proficiēte, rubicundiora, deinde etiā crassa & mucosa, adfuntque febres uehementes. Quod si adhuc amplius inflammatio augetur, hæc omnia tidem sunt uehementiora. His accessit nauſea, & stomachi morbus, & uomitus bilis. Quidam autē ipsorum usque ad animi deliquium anguntur & exudat. Siftitur ipsis uenter adeo ut instentur, & assidue ructus emitant. Sequitur fastidium uehemens, & quibusdam continuè sunt exacerbationes: quibusdā uero per interualla, in uniuersum autem uentris egestio, & urinæ multa excreto dolore ipsos præcedunt. Noui autem ego quēdam, qui post uehementem uexationem animo linguebatur multumque exudabarubi autem restitutus sibi animum recepit, simul ab omnibus molestiis liber euasit. Renes igitur inflammatos hoc modo curare oportet. Aegrum in lecto mollissimo decumbere oportet, ac primo die a cibo abstinere, non tamen in multis dies inedia extendere. Urinæ enim puriores & aciores per inedia reddite, uehementissimos morbus insigunt: itaque in principio forbitonibus tenuibus morbus leniētibz conuulſe oportet, & aquæ calidæ potu. Aquā uero multam in principio non laudo, priusquam concoctæ & consumptæ fuerint inflammationes: neque item eorum quæ urinam dent usum: obledunt enim mordaces humores inflammationis paribus inducendo. neque etiam purgatiuum pharmacum exhibendum, ueluti quidam cōsueuerunt. Per clysterem autem maluæ decoctum, aut seminis lini, & fœni græci, cum oleo infundendum, ammixto etiam melle, aut pisanæ succus cum oleo & melle. Cæterum copta non multa infundatur, ne repleta intestina comprimant renes: ubi uero stercorea prodierint, & intestinum fuerit euacuatum, oleum iniiciatur anethinum aut gleucinū cum butyro, eliquatis in his adipibus quibusdā, anserino uide licet aut gallinaceo, aut medulla ceruina. Subeunte autē uentre, incumbente lanam ex oleo calido assidue irrigare oportet: melius tamen fuerit si anethū, ruta, althea, & artemisia, oleo sint incocta. Porro si adhuc maiori acumine renes affligantur, & uehementior exurgat dolor, uenam cubiti secare cōuenit, sanguinis detractione repetita, & si post id auxilij aliquid ex inflammatione relinquantur, ac cataplasmata procedendum, primum quidem ex farina in aqua multa cocta, aut ex semine lini, postea etiam ex chamæpity, polio, abrotono, trixagine, asaro, iūdo odorati flore ammiscendū, atque tum nō amplius in aqua multa cataplasmata coquenda sunt, sed in passo. Mixturæ autē modus sit, ut ad farinæ partes .iiii. quorūdam ex prædictis pharmacis partes .i. commisceantur. Bonum est & hoc cataplasma. Galbanī, cerebintinæ, farinæ erui, cuiusque drachmas quinquaginta, iridis drachmas .iiii. cerati ex gleucino, aut amaraci-

no, aut irino, aut cyprino, aut aliquo consimili oleo apparatū libram unam, farinæ triticeæ sextantem passū credi quātū satis est. Apparato, ac supra ilia ac lumbos imponito. Facit idem ad uesicam inflammata, tam, si peccini imponatur. Quod si per cataplasma dolor non leniretur, cucurbita lumbis ac ilijis est adhibenda, & fissuris impactis plurimum sanguis attrahendus, deinde spongiarum foru utendum, & in calidam aquam descendendum, in qua calamus aromaticus, chamæmelum, flos iunci odorati, semen lini, anethum, maluæ syluestris radices sint incoctæ. Prius autem & uesica ingens aqua & oleo semiplena ipsis locis imponatur, fomentis etiam pinguioribus admotis, postque etiam ceratis: quin & malagmata amplius imponenda. cerata quidem conueniunt ex cyprino aut irino apparata: malagmata autem odoratissima sint, qualia sunt hepatica ex styrace conſlata. Cæterum dolore affligente bibenda sunt pharmaca quæ dolorem leuant: eiusmodi sanè. Calicis papaueris tostī oboli dimidium, styracis tantundem, thuris obolum unum, seminis cucumeris grana uigin-, seminis apij quantum tribus digitis comprehendī potest, opij ad crui magnitudinē. Hæc omnia quā tenuissimè terito, ac cum aqua dulci permixta pro uice una exhibeto. Statim enim quiescet dolor, & obdormiet æger. Conferunt item consimiles pastilli dolorem leuantes. At uero ubi perfectè concoctæ fuerint inflammationes, & quiescerint dolores, tunc etiam per urinam cientsa purgandum: ueluti sunt acorum, meon, plu, petroselinum, gramen, calsia, chamæpitys, polium. Horū unumquodque ex aqua coquendum est, & cum uino & melle bibendum. Cibi autem post concoctas & consumptas inflammationes exhibendi, sunt panis optimus, maximè clibanites: ex uolucris, montanæ: ex marinis, herina ceti recentes: ex oleribus, fœniculum, apium, daucus, & syluestria omnia, & cucumis coctus. Hæc enim optimè urinam prolestant: maximè uero id præstant pastinacæ probè percoctæ, & crithma, & scandix, & gingidia. A concoctis inflammationibus urinæ his prodeunt multæ & crassæ, & in quibus bonum est quod subsidet, atque hæ ipsæ maximè iudicant ac fecerunt morbum: aquosæ autem mictiones & puræ ac pelluentes, ægrè morbi fecerint indicat.

De duritie renum.

Cap. xviii.

Quæcumque durities circa renes oboritur, dolores quidem non amplius inferunt: ægris autem ex uacuo uetris loco ueluti quippiam pēdere uidetur, & stupor adeft coxendicū, & impotētia crurium, minguntque pauca, & reliquo corporis habitu aqua inter cutem laborantibus maximè similes existunt. Quidam etiam temporis progressu manifestè hydropem cōtingit. Hos itaque ceratis & malagmatis, itemque frictionibus ac pinguius fomentis remollire oportet, & urinam ducentia eis exhibere. Ventrem item ex altheæ, fœni græci, & caricarum decocto subluere, melle & nitro ac oleo iisdem adiectis. Ad noctem item insula per clysterem conueniunt, oleum anethinum cum butyro & adipe anserino.

De suppuratis renibus, Rusi.

Cap. xviii.

Quibuscumque renum inflammationes ad puris permutationē uertuntur, his omnes in renibus inflammationis prædictæ accessiones extenduntur, & febres cum

horrore irruent, atque id maximè circa uesperam. Iam uero & tumor quodammodo circa illa apparet, & uehementis caloris sensus ipsos circa renes aspicit: mingitq; ruffa & pura. Vbi uero suppuratio fuerit perfecta, tunc & febrim & dolorum accessiones minores contingunt, & grauiatis sensus magis circa affectum renem infestat: tempore rupture magis exacerbat, ad quam etiam humorum excretio cum ipsis urinis consequitur, inuehuntur & sordes quædam ex substantia renum eloræ, ut plurimum enim ad uesciam ex renibus erumpens pus desertur, quod sanè conductibile putandū est. Aliquando autem & ad intestina eruptio deuoluitur, & per sedem pus euacuat. Quibusdā uero neq; in totū suppuratione erumpunt, sed circa renes per multū tempus consistunt, donec caute adhibito aut alio modo forinse cas aperitione & educatione moliantur. Igitur postquā abscessus signa apparuerint, quā celerrimè adiuuare oportet tū suppuratōis, tum puris eruptionē. Quia in re spongiæ aqua & oleo, itemq; fursuribus imbutæ assidue proderūt: fatus gratia admogetur eundem usum etiā cataplasmata præbēt, ex farina ordea cea cum sicium & althææ ex aqua mulla decocto, aut ex cretoso passo. Bonū est & ipsas ficus ammiscere tritas, & absinthij contusam, aut chamelæam, aut trin, & bryoniam: addatur & cerebinthina, pix, māna thuris, itus ipsū, columbæ stercus, polium, & quæ similia his existunt, & simpliciter omnia adhibeātur quæ in hepatis abscessu suprà approbauimus. In malignis & putrescentibus humoribus, quos ex febrim acrimonia cognoscēs, etiā rosæ in cataplasmata cōmiscēdæ, & myrti bacce, eruiq; ac lentis farinæ. Hæc enim eisq; similia humorū putrefactionē sistūt. Post hæc emplastris utendū quæ pus permutare possunt, quemadmodū in hepaticis est prædictū. Quod si ruptura morietur, acriori infuso alius est subluenda, ueluti ueratri nigri cremore, raphani ite & alliorū ac cucumeris syluestris radices cremore. Macerare autē hæc in aqua maris aut salustine uel muria oportet, parumq; olei ammiscere, quo infusa lubrica reddantur. Hæc sanè per dynterem insunden da, iubendiq; ægri quo plurimò tēpore apud se deitineant: consueuerunt enim sæpe ipsam suppurationē dirumpere, unā cū hoc quodd uidētre emollire solent. Si uero uehementiores sunt dolores, pitisanæ succus infundatur & lac recens multum: infessus quoq; in aquam & oleum apparetur. In potu leniora urinam ducentia exhibeantur, ueluti cucumeris semen decorricatum ex aqua mulla, palmulis in ipsa incoctis. Dāda etiam tris cum melle despumato delingenda, aut ipsū mel in decoquendo in passillum redactū. Remorātem item rupturam iuuat cuminum eq; passo, ruta cum uino mullo. Si uero ex habitu corporis & doloribus languidioribus coniecturam facias, ob crassitatem pus ipsū non exernit, foeniculi decoctū in potu dato, & chamæpityos, pulegiq; & origani. Post rupturam autem caruncule parue oblongæ cū urina excernuntur: si quidem maligna fuerint ulcera, humores foetidi, liuidi & mucosi: si uero benigna fuerint, etiam pus ipsū album, & æquale, & leue, absq; odore graui, & paucū reperitur. Lac itaq; cum melle post puris eruptionem eis præbendum: & primum quidem asinum aut equinum, ad ulcera enim repurganda conducit, quum uero re

purgatione amplius opus non habent, & morsus sunt obuiosiores, indigetq; æger nutrimento, tunc etiam bubulum lac eis exhibendum 11. & 11. heminarum mensura. Amplius autem omne lac recens multum calidum præbendum est, animalis in domum ubi æger decumbit deducto: hoc & aliorum interiorum ulcerum optimū est pharmacum, & graui puri maximè amicu, & corpus probè nutrit. Porro ad uires refocillandas ac resitueandas, ægrum decumbentem mollior fricare singulis diebus mane conuenit, & primū bubulo lacte nutrire: postquā uero concoxerit lac, sorbitionem ex pitisana apparatus præbere, aut amyllum, aut similaginem lotam cum lacte coctam. dandum & lac ouis permixtum, & fusculum gallinæ pingue. Ex oleribus conueniūt, malua, seris, rumex, porulaca, asparagus palustris, cucumis, lactuca, omnia cocta, neq; quicquam crudum uorent. Hæc sanè morsus obrundunt. Ceterum succedentes repletiones uomitu euacuare oportet. Vt uero facile uomant, cucumeris semen tritum ex passo eis præbeatur: aut pitisanæ succus cum passo. Oleo autem cyprino præsertim illinantur pennæ, quibus item ad uomitum iritentur. Non solum autem ad repletiones uomitus laudo, uerum si quis omni mense audenter uomat, forte & renum ulcus, & quicquid inde mali accedere possit, dissoluat. Reliqua dicta eadē sit cum ea quæ postea ad uesciæ ulceri dicitur. Ex his uero quæ urinam ducūt simpliciora iam sepe dicta itemq; dicenda, ad repurganda renum ulcera bibantur. Quum uero munda fuerint ulcera (quod inde tibi palam fiet, si neque testorū etiā ulcers obductum cum urinis excretū appareat, neque etiam pus excretum sit seculētum, sed subalbū, & leue, & æquale, & paucum) tunc sanè pro emplastris malagmatica assumenda sunt: id quod ex semini bus cōstat: item quod ex bacis lauri: & quod Apolophanium inscribitur: & omnia quæ cutem rubefacere possunt, quale est id quod ad calculi affectionē est prædictum. Pro his uero quæ urinam cient resiccantia adhibeantur: quare cibus ipse adstringens sit, & pharmaca quæ corpora cogant. Conferunt etiā dropacæ, & sinapismi, & naturalium aquarum calidarum, & frigidarum usus. Porro ad inueterata renum ulcera, pharmaca sunt assumenda, quæ ad exulceratam uesciam describuntur. Atqui nosse oportet omnem exulcerationem, & uesciæ, & renum, ægre curabilem esse, præsertim quæ ex erosionē sit oborta, adeoq; paucos nouimus qui ab ea perfecte sint liberati: si uero extrā suppuratio uertatur, in inflammationem magis tumescit, & ad manum & ad oculum magis euidenter exposita est. His merito medici manū admoliuntur ubi maxime tumor attollitur, curantq; adhibent quæ ad communia & caua ulcera requiruntur: non ignorandum tamen ea in fistulam abire solere, quare diligentiori omnino indiget tractatione. De disuria, id est, emittendi urinā difficultate: & stranguria, hoc est, stillicidio urine. Cap. XIX. Disuria dicitur, quum metere æger cupit, & cum uiurinæ excernuntur. Stranguria autem appellatur, quum paulatim & guttatim urinæ defillant, & assiduam ad mingendum irritationem faciunt. Hæc autem contingunt aut ob acrimoniam urinæ, aut ob exulcerationem uesciæ, aut ob uesciæ debilitatē: aliquando autem & affectis renibus aut hepate, quum

quā abscessus rūpitur, & pus per uescā excernitur, assiduam iritationem ad mictionem propter acedinem suam inducit. ex intemperie etiam quadam ægra igitur in propria læditi actione. necessaria igitur est scire causas quæ stranguriam & disuriam præcesserunt, atq; ad ipsas remedia adornare. Si igitur frigiditas has affectiones præcessit, oleo rutaceo calido pectinem fovere oportet, ægrumq; in famulici aut rutæ decoctū desidere, ac si mū uentrem contigere ac calfacere; aliquando & per sedem oleum rutaceū calidum infundere, & cibis urinam cidentibus uti quæ concalfacere possint: aromatum etiam decoctiones in potu exhibere, potest etiam præberi in potu theriace cum passō aut uino mulso. Sin uero biliosiores sint urinæ, & mordacitas circa uescicam contingat, ac urinæ stillicidium inducat: tum sanè exuperantem uisofum humorem quā celerime purgare oportet, & cibis temperamentum insudicibus uti, ita ut ab omnibus acribus ac falsis abstineamus: in potu autem plurima aqua calida dulcis exhibenda, ægerq; assidue ad mictionem cogendus: si enim acre recrementum diutius in uescica moreretur, partes ipsas corrodit & exulcerat. Conueniet igitur continuus fomentis uti, & amylo cum lacte decoctum, itemq; cum palmarū decoctū absorbendum præbere. Vinum autem dulcis præbeatur. Optimū est & ipsum lac calidum potatum. Quod si acrimonia adhuc augeatur, etiam per colem lac ipsum cum amylo in uescicā infundatur, & pastillus ex physalide cōstans in potu sumatur. Porro si aliud membrum sit affectum, & id ipsum per uescicā expurgetur, manifestum est illi priorem curam deberi, ita tamen, ut neque uescicam negligamus.

De difficultate emittendi urinam in febribus. Cap. xx.  
Philumen: Fit & in febriū malignarum principio urinæ emittendæ difficultas, ut & inde uescica affligatur, & paulatim cum dolore urinam emittat: neq; uero sola molestia hæc est, sed & signum totius neruosa pars affectæ. Ad inum uentrem igitur & pectinem, inguināq; & coxendices, lana pura oleo dulci imbua, in quo ruta, anethum, aut oleum sicyonii sine decoctā, imponatur, lanæq; amplius cum minum quā tenuissimè tritum infundatur, & si alius eis sit adstricta foeni græci & maluæ decoctiones infundantur. Infectiones etiam afficiuntur usq; ad umbilicum & lumbos totos, ex artemisia, foeni græci, rutæ, pulegij, & maximè famulici decoctō, oleo itidem ammixto. Quod si accessiones urgeant, etiam uescica sectio adhibenda est, & diæta exquisita, quæ maxima parte ex forbitionibus cōstet. Vitur itaq; halica lora cum anetho in aqua mulsā desumpta cocta, aut pane loto, aut forbilibus ouis. Post hæc & malua cōueniet, friabilis cocta, & porrum capitatum in tribus aquis decoctum, & tenerrimi pisces. Post fomenta uero, cataplasmata adhibeantur ex eadem materia apparsa. Vrgentibus autē doloribus, cucurbitæ cum scarificatione ad inum uentrem affigantur. Ceratum uero ad has affectiones conuenientissimum hoc est: Maluæ syluestris radices in oleo sicyonii cum modica aqua coquantur, donec aridæ fiant, & ipsæ quidem abijciuntur, oleū autem cum rutæ succo permiscetur, ut quarta olei pars de succo rutæ addatur: hisq; amplius cera sufficiens & parum castoreij adijciat. Cæterum potus ita affe-

ctis cōmodus est cucumeris satui semen, quod præmaceratū decorticatur, deinde triū cochlearium II. mensura ex aquæ cyathis III. præbeatur. Lotium enim citra molestiam ducit, & dolores circum locos infestantes euestigio dissoluit. A reliquis autem quæ urinā cient, quamdiu febres persistierint, in totū abstinendum est. Mod enim ex febrili calore totius corporis humores, per ea quæ efficacia urinā cient, ad uescicam prius afflictam deducuntur.

De ischuria, hoc est, urinæ suppressione. Cap. xxi.  
Ischuria, hoc est, urinæ suppressæ affectionem, etiam ipsum nomen declarat: ægris enim in totum urinā supprimitur ac cohibetur. Atq; id aliquando ob imbecillitatem cōtingit, uescica eā quæ in ipsa continetur arcē cōplecti ac exprimere nō potente, aliquando autem & inferiore meatū a crasis humoribus obturato, aut lapide obstructo, quandoque autem ob inflammationem aut talem quempiam tumorem meatum angustum reddentem, & perfectè obturantem. Sanguis etiam in grumos concretus in uescica, suppressæ urinæ causa existit: pus item crassum per ipsam uescicam a renibus, aut hepate, aut alio quopiā inferiore membro excretum, urinæ suppressionem operatur. Accidit & sanis sæpe urinam ipsorum cohiberi, aut ob negotiorum importunitatem, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut somnis, si diutius continuerint mictionem. Afficiunt enim in his comprehensiuā & urinam obuolens uescicæ uis, ex immodica uidelicet repletionē & tēsiōne: imō quantum amplitudo ipsius uescicæ expleta circumdenditur, tāto angustior seipso fit meatus. Vrinam igitur ob inflammationem suppressam uenæ sectione curabimus, fomētis item ac cataplasmatibus alijsq; remedijs adhibitis, quæ iam sæpe ad inflāmata sunt prædicta, & in sequentibus describuntur. Si uero sanguinis eruptio præcesserit, coniectare oportet sanguinis grumos suppressæ urinæ causam esse: hi itaq; dissoluendi sunt eo modo, qui de eruptione sanguinis ex uescica dicitur. Quod si lapis sit qui urinā supprimit, & hunc ex loco excutere ac dimouere oportet, quemadmodum de calculosis est prædictum. Si uero crassi humores in causa sint, fomentis & infectionibus ac cataplasmatibus cura concedenda est: ab his uero quæ urinam cient in totum abstinendum, uelut in loco de difficultate emittendi urinam in febribus est relatum. Quibus uero citra inflammationem & eruptionem sanguinis, aut aliam quandam ex prædictis causam, urinæ excretio supprimitur, propter ægrum uescicæ sensum contingit id scilicet, quapropter irritando submonere, ac excitare eius actionem oportet, & per infellus auxiliari, nitrog; ad meatū admoto, aut nitri spuma, aut dimidiis cōtritīs. Quod si ita nō procedat, ad catheterum usum confugiendū, perq; hoc ipsum instrumentū immisissum urinæ prolestandæ. Vrinā ducentia nequaquam bibant, ne multitudine eius uescica distendatur. In sanis autem, quū ut dictum est ob negotiorum importunitatem lotiū diutius retenti uescicam debilem red dat, auxiliari oportet ipsi, ambabus manibus supra inum uentrē ad motis, ac urina lentè expressa. Ad urinam ægrè prodeuntē. Cucurbitæ semē præmū datum aqua macerato, quū uero emollitum fuerit, sufficiant aqua affusa terito, percolato, ac succum bibendum præhero. Verè, experimento constat.

De scabiosa uesica.

Cap. xxii.

Quibus uesica scabitis, his pruritus tum imi uentris, tum peccinis succedit, inq̃ urinis asperæ & fursuracæ subidentia deferuntur: progrediente uero morbo, uesica exulceratur, accessionesq̃ ad ulcera præscriptæ inducuntur. Nosse igitur operepretitū est, quod non penitus curabile sit malum, cōnam tamen ut pro uiribus leniatur. A mordacibus igitur & quæ humores acriores ac falsiores reddunt abstinentū. Exhibenda autē uina dulcia & lac & gallinæ aut hoc dorit aut agnellorum carniū iuscula, palmarumq̃ cremor, similago item & amyllum, ac sorbitiones ex his apparatus, pisces molles carne omnes coctos: & exoleribus quæcunq̃ urinam quidem subducunt, nihil uero mordax in se habent, uelut est pastinaca probè cocta, crithma, fœniculi, apium, hipposelinum, asparagus, cucumis, & quæcunq̃ eius generis existit: nam & urinā agentibus mitioribus tamē, uesciam subpurgare oportet: periculum enim est ne fortioribus exulceretur, quod omnino peius extat. Vinam itaque commodè ciente cancri, & pinæ, conchæ, & herinacæ marini recentes, & herinacæ terrestris caro exicata, & drachmæ pondere potu accepta. Neq̃ minus cōmodæ cicadæ censendæ, & uermes terreni tres ex passio potati. Non inconueniens item fœni græci succum cum melle forbere: id ipsum enim & intestini morfus obtrundit, & si ad uesciam procedat, scabiem eius mitigat. idem etiam tragacanthus facit, iucundus est item baccarum myrti cremor cum uino potatus, aut mali coronel cremor, aut cuiuscunq̃ alterius adstringentis fructus. Hæc autem adstringenda, inquam, pruritus quidem mitigant, affectionem uero nō sanant. Dieta porrō optimi succi sit, & per aliquot dies uiuant. Sero autem lactis alius subducatur, Medicoribus etiam exerditijs moderatè utantur. Aliud, quod confestim auxillatur. Serpillum cum cicere satis diu coquito, percolatumq̃ decoctū bibendum præbero. Oribasij, ad agrè meietes. Amomi, cardamomi, floris iunci odorati, cuiuscq̃ drach. v. costi, castorij, myrrhæ, cuiuscq̃ drach. iiii. casisæ drach. i. mellis quantum satis est, datur fabæ Aegyptiæ magnitudine cum uino tēperatum. Aliud eiusdē. Petroselinij, baccarum myrti nigrarū, singulorū drac. xvi. seminis apij drac. xxii. ammij drac. viii. nardi celidici dra. iiii. myrrhæ drac. ii. mellis quantum sufficit, datur drac. i. ex aqua mulsa, aut uino diluto cyathorū iiii. mensura.

*Simplicia remedia ad suppressam ac agere prodeū tem urinam, si aut eius multitudo, aut crassities in causa sit.*

Cap. xxiii.

Vrinam difficulter prodeūtem & suppressam, uiscera herinacæ terrestris sanāt exicata ac fustia agro undiquaq̃ probè cōtecto. Oportet autem ipsa sale condire ac excicare. Quin & in potu accepta siccā trita quantum tribus digitis apprehēdi potest ex uino multas urinas cēt; carnis item herinacæ in sole exiccata drac. i. ex uino datur, & urinā multā citra molestiā educit. Aliud, Afelli qui & millepedæ sub aquario stabulatis uasē, egregiè difficultatē emittēdi urinam soluunt, si duo aut tres in modico garo coquantur, ipsumq̃ garum cum aquæ cyathis duobus bibatur.

Aliud. Vermes terrenos tres aut quinq̃ tritos ex uino mulso aut aqua mulsa præbero: citō enim urinam ducūt. Forinsecus autē artemisiæ folia cū myr-

rha trita peccini illini, itemq̃ imo uentri, & lorum prodibit. Aliud. Perdicium herbā terito, & affuso oleo feruefacto, atq̃ ipsa uesicæ imponito. Eandē item herbā cum oleo coquito, ipsaq̃ protecta lanam oleo imbuto ac imponito. Aut peponis pulcherri mi pelliculā cum modica ipsius carne imo uentri imponito & colligato, & prodibit urina. Si uero arida sit pellicula, ipsam in aqua macerato, & imponito, ac colligato. Incessus etiam eis ex samfuci maxime decoctū apparentur, aut si id non adsit, ex decocto rutæ artemisiæ & althææ.

De dissoluta per paralyssim uesica. Cap. xxiiii.

Ex his qui paralyssi exolutā uesciam habent, alij quidē præter uoluntatē urinam emittunt, & quanto plus id eis cōtingit, eo minus periculo sunt obnoxij: alij autem lorum non excernunt, sed eo suppressio uesicæ & lumbi eis distenduntur similiterq̃ peccen: femora autem tumefacta habēt, & quum nō ejiciant lorum subiecta mēbra mortificātur, neq̃ ita longè possunt moriuntur. Quum igitur lædi cōtingerit nervos qui ex spinali medulla ad musculum uesicæ collū claudentem deferuntur, exoluto musculo, inuolūtaria urinæ excreto contingit. Si uero proprij uesicæ nervi fuerint affecti, nervi aut musculi qui ceruicem uesicæ cōplectuntur, uires suas consuētas in actione sua ualidi sunt, urina ipsa cohibetur. Cæterū quum cuidā ob casum spina in anteriore partem esset luxata, & inflammatio succelsisset, tertia die urinæ suppressio ei accessit: curauimus autē ipsum, inquit Galenus, ueluti contra inflammationem renitētes. Alius autem quū cecidisset, uertebri retro inueris & luxatis, præter uoluntatē urina ab eo prodijt, citra tamen uesicæ dolorē, ex quo coniecturam fecimus nervū esse læsum musculū eius qui uesciam claudit, & propterea medellā spinali medullæ adhibuimus, affectis inquam, uertebri. His igitur quibus citra casum urina supprimitur, hoc modo auxiliari oportet. Incessus asidui in fœni græci, seminis lini, althææ, rutæ, ac artemisiæ decoctū cū oleo eis apparētur, & loci ex oleo calido rutaceo, aut sicyonio aut gleucino sæpe per diē & noctē, & maxime post incessus irrigentur & perfundantur; curabitur etiā locis affigēdæ, & cataplasmata imponēda ex cruda ordeacea farina, ex ui noq̃ dulci & uino mulso. In aluū autē per clyster infundatur centaureæ, & radicis cucumeris agrestis decoctū, addito oleo rutaceo & melle. Post sublatā uero aluum oleum rutaceum sicyonio ammixto infundendum, adiecto aliquando etiam modico castorio. Vnguenta item & medicamēta illitu lassos neruos rescicienda, acopa Græci uocant, & supra resolutiones sunt descriptæ, cum spinæ, tum imo uentri adhibenda. Castorium itemq̃ theriacē in potu propinanda. Modicus autem eis cōuenit potus & uomitus qui pituitam educunt. Post euacuationes sinapi simi, tum peccini, tum lumbis cōmodi sunt. A quibus cerata quæ partes mitigant, & malagmata odorata imponantur. Porro urinæ suppressionem quæ ob fauciatam spinam, aut casum, aut uertebri luxationem, aut ob lethales accessiones concursus, suborata est, impossibile est curare, quare cautē remedia adhibere oportet. Cæterū eos qui præter uoluntatē urinā emittunt, curare conuenit roborādo per mordacia cataplasmata, & malagmata, & per rubefaciētia ex sinapi apparatus, & arenæ a sole feruefactæ iniectione,

infectione, aquisq; naturalibus, primum quidem calidis, postea etiam frigidis & maxime sulphurelens & bituminosis. Exercendæ etiam ac perfricandæ partes, ueluti in loco de resolutione est prædictum. Urinam autem ducentia nequaquam exhibeantur. Dieta uero calidior & siccior sit, nisi acriores ac mordaciores appareant urinæ.

Ad eos qui se in somno permungunt. Cap. xxv.

Affectio hæc pueris maxime contingit, eam Archigenio hæc descripsit. Pulmo hœdi moderate affatus, & citra panem largè ad triduum in cibo accipitur, eos qui lectos commingunt, corrigat. Aliud. Leporis cerebellum siccum potatum ex uino lectos permungentes sanat. Aliud. Testiculum leporis siccum in uinum radito, & bibendum dato. Quidam autem leporis cerebrum in uescam porcina coniectum & assatum, unà cum uescia edendum præbent. Etenim ipsa porcina uescia per se uisita, & in potu exhibitâ, iuuat. Simili modo & ouilla uescia facit cinerem itaque eius ex posca præbeto. Aliud. Adipem anserinum drachmæ pondere, cum coagulo leporino oboli pondere, & cum polenta subigito, & reclinatis in lectu præbeto. Aliud. Linguae anserinæ coctæ per triduum exhibitæ affectionem sanant. Quidam affatas præbent. Aliud item Archigenis. Myrrhæ, calamintu, cuiusq; obolum i, terito, & cum uino odore ante coenam bibèda præbeto. Aliud eiusdem. Raphanidem marinam coctusam urito, eiusq; cinerem totum bibendum præbeto. Aliud. Rutæ præsertim syluestris semen torrefactum duarum drachmarum pondere bibendum præbe. Aliud. Castorei drachm. i. in potu præbe. Quod si acriores & mordaciores sint urine, lactuæ feminis drachm. i. bibendam dato. Aliud. Galli guttur ustum ac tritum cum aqua tepida ieiunis bibendum porrigat. Aliud. Gnaphalum aut anthyllum herbas quibus pro tomato & strato uisus est eger, easq; perminxit, siccato, urito, & cum potu exhibeto. Cæterum in somno pudendum illinant ex cimolia cum perdicis succo. Circumligent etiam femora infra inguina, quatuor digitorum distantiâ, atque hoc per uiscis uirgas. Porro ubi stiterint, omnino amplius dormiant: multus enim potus affectioni incommodus existit. Atqui si diuturnum & inueteratum sit malum, uelut eos qui præter uoluntatem ob resolutionem uesciæ urinam emittunt, curato. Differunt autem hi ab illis, in eo, quod his per somnum saltem hæc accessio cõtingit: illi uero quibus ob musculi colli uesciæ resolutionem hoc accidit, etiam dum uigilant, eodem modo afficiuntur.

De inflammatione uesciæ. Rufi. Cap. xxvi.

Morbörü qui circa uesciam oboriuntur, grauissimus & maxime mortalis inflammatio existit. Consequuntur autem ægros communia inflammationis signa. Febri acuta infestantur, & uigilant, & delirantes aliena loquuntur, & uomunt biliosa pura, & lotium eijcere non possunt: durus sit pectus & pubes cum uehementi dolore, & egerendi appetentiæ uelut in tenebris fieri solent: quod uero egeritur tenue est, & subsidentiam non habet. aliquando & inflammationes sequuntur, & alius adstricta est, intestino recto ab inflammatione uesciæ compresso. His itaque si nihil aliud prohibeat, uenam citra cunctationem in principio morbi secæto, & paucis cibo adseruato,

& aque potu, locos uero oleo in quo anethum, semen lini, aliquando etiam ruta & althea incocta sint irrigato. In decoctum item seminis lini & sceni græci insidere facito, odorato aliquo semine, ueluti per trofelinu, daucou, aniso, simul incocto. Admoneaturq; æger quo in aqua decocti desidens mingat: uescia enim non satis robusta est ad amplectendam & expellendam urinam, igitur ipsum ægrum aut alique ex adstrictis scite ac placide pectine premere oportet, neque id ultra modum ne dolor inde intendantur. Est autem inuentum hoc Philumeni, qui hominem hoc modo à se tractatum urinam eiecisse testatur. Cæterum primum omnium aluus leni infuso subluatur, & post stercorem educationem, olei quo supra ad irrigationem usus es, in intestinum solari & leniendi doloris gratia iniiciatur. Præstat autem & papaueris calicem simul cum oleo incoquere, & adipem anserinum aut gallinaceum rectem in ipso oleo eliquatum simul infundere. Ego uero, inquit Rufus, uehementioribus existentibus doloribus optimum magnitudine erui cum modica myrrhâ & crocolanæ illium, in podicem indidi, & statim dolores quiesuerunt, confestimq; æger obdormiit. Post clysterem & infusa, infususq; & irrigationes, etiam cataplasmatibus utendum ex cruda ordeacea farina, capibus papaueris, & hyoscyami folijs, ac medico mandragoræ succo adiectis. Fomenta autem fiant per aquam & oleum in uescis bubulis simpliciter admodum, aut potentiam calidam in sacculis ad dextræ uescis paniculis ligato, & pro sotu ad moueto. Post cataplasmata, etiam cerata imponantur, ex æsypo, & cera, & scionio aut gleucino oleo cum castoreo apparatus. Quod si nec sic mali tumultus cesset, uescia curbitam affigemus locis unâ cum scarificatione. Cæterum ubi euident declinato apparuerit, ad emplastrum & malagmata transeundum est. Porro catheteris immersionem ad inflammata uesciam in uiro quidem non probamus: etenim quam laboriose immittiqueat, dolores exacuit, & inflammationem auget, uerum mulieri ipsum adhibere nihil absurdum: breuis enim in ipsis urinæ meatus existit, & recta sita, ut citra dolorem hoc molimen admittatur. Si uero urinæ suppressæ periculum urgeat, necessario ad catheteris usum confugimus, non quod affectionis molestiam tollat, sed ut urgentem urinæ suppressionem corrigit, & à præcipiti periculo liberet. Post urinæ profectionem rursus ad eadem mitigatiua auxilia accedendum, utque quo inflammatio soluitur, aut suppuretur. Solet autem sæpe repente inflammatio solui, erysipelate iuxta cutis superficie oborto, & permanente, neque rursus intro recurrente: imò & lotio multo eiecto, sæpe id eadem iudicatione liberum hominem reliquit. nihil minus tamen etiam si hæc appareant, si idem remedijs insistere oportet, quandoquidem ut plurimum tensione aliqua facta ac oborta, continuæ exacerbationes sunt, & mali constituto diuturna. At uero ubi periculosa accessiones cessarint, & morbi constituto iam fuerit inueterata, ad uingenta quæ humores ex profundo euocant ac transferunt, mercuria critica Græci appellant, & ad malagmata transeundum est, quæ cutem rubefacere possunt.

De sanguinis ex uescia eruptione, & de grymibus eiusdem. Cap. xxvii.

Est



Est alius acutus uesicæ morbus, rumpitur autem uena in ipsa, & partim quidem sanguinem foras mittit, partim uero intus cõdenatur. Sanguine autem cõdenato, & grumis coactis, eger animo linquitur & pallescit, pulsusq; paruos, obscuros, & desos habet, mœrore angitur, refrigeratur, ac uiribus destituitur. quum uero grumus aliquando in urinarũ meatum incidit, is etiã lorĩ excretionem supprimit. uerum omnino difficilioris curæ cõsensa est eruptio ex erosiõne facta. Quare quàm celerrimè uelut etiã in alijs sanguinis eruptionibus auxilliũ ferre oportet, extrẽmas partes constringẽdo, & pectinẽ ex spongijs posca imbutis irrigando. Quod si inflãmationẽ suspensam habes, lanas succidas uino & rosaceo madidas imponito. Cæterũ ob prædictũ periculũ, compendiarĩ curã facere conuenit, & nequaquã rem differre: si quidẽ nihil prohibeat, uenã secare partiã sanguinis detractiõne, ut eo modo sepe & paulatim sanguis detractus reuellatur: a gri uero in decumbẽdo sursum uersus collocetur, & coxendicibus ipsorum leuandis & simul refrigerandis spongiæ posca imbutæ subdantur, aut pelles substernantur: summè autẽ profunt urgente malo cucurbitulæ illijs ac lumbarũ affixæ. Post irrigationes autẽ cataplasmatibus utendum sanguinariã, rubo, plantaginẽ, perdicio, mali punicis floribus, lentisci & myrri folijs: horũ unumquodq; cum polentæ flore pro cataplasmate imponendũ est, & frequenter priusquam tepescat, altero imposito, auferendũ. Optimè etiã faciunt ex palmis acacia & hypocisthidae ac alumine apparatæ cataplasmata, & quæ his similia existunt. Summè autẽ cinis linteoli usi auxiliatur, si palmis ammiscetur, aut aliquid ex epithematis infarciatur. Spongia item pice liquida imbuta, uisã & epithematis ammixta mirificè sanguinis eruptiones sistit. Cæterũ detritæ uestis panniculus ustus, & spongia usta, non solũ forinsecus locis appositæ, sed & cũ plantaginĩ, aut sanguinariæ, aut herbæ sideritidis succo uesicæ insula, maximo opere auxiliantur. Oportet autẽ infusi fistulam aliã catheteri similem esse, uerũ ex summo utriculũ aut uesicam adaptatã habere. Quandoq; & sedi hæc insula profunt. Inseßus autẽ conueniunt ex confusili materia constructi: nam & posca & lentisci decoctum, itemq; rubi & similiũ eis conuenit. Danda autẽ & in potu pharmaca educationi sanguinis apta tum simplicia, tum composita, uelut sunt rheon poticum tenuissimè tritum, & loti arboris scobes & ramenta, præsertim corticis eiusdem, & glycyfides aut pæoniæ grana rubra x. i. terra samia, & lemnia, phragis appellata, hippuris, centaureæ magnæ radix, thuris cortex, & similia. Optimum uero & hoc est, quo Archigenes usus est. Ad sanguinem mingentes, Archigeni. Aluminis scissilis drachm. i. gummi obolum i. tragacanthæ drach. ii. in passo diluito, & in pastillos redigito, & ex eis obol. ii. cũ passo præbeto. Ad sanguinis uesicæ eruptionem Asclepiadæ. Balaustij, acaciæ, succi hypocisthidis, cuiusq; drac. iii. aluminis scissi drac. ii. in pastillos cum aqua digerito, & obolos iii. cũ uini myrticæ cyathis iii. exhibeto. Porro quibus sanguis in uesicâ in grumos cogitur, primum tentandũ est ut pharmacis diffundatur: artemisia igitur in potu præbenda est, & elichrysum, & cyrenaicus succus, aut laser purũ, aut conyza præsertim parua, absinthiũ, rapha

ni semen, rubi succus, betæ succus, leporis coagulũ, aut hædi, unumquodq; cũ aceto mulso. Ego autem, inquit Galenus, pharmacum eis præbui bibendum quod lapidẽ confringit ex aceto mulso: imò ipsum per se acetũ multum exhibui, & quibusdã ipsorum grumi dissoluti paulatim per lotium prodierunt. Quod si hoc modo nihil proficiat, sed urina supprimitur, necessitatẽ inducet catheteris adhibendi, per quẽ ubi urinas eduxerimus, rursus prædicta in potu exhibebimus præfatiã ad grumorum coactorũ dissolutionẽ, si uero nec sic grumi dissoluatur, intercapedinem inter anũ & pudendũ perinæon Græcis dictã infernè dissicare oportet, quẽadmodũ in calculosa uesica est prædictũ, & eductis grumis de cætero uelut ad sanguinis eruptionẽ uesicæ optulabimur. ubi uero sanguinis eruptio cessarit, uelut alia ulcera curato. At uero sanguinis ex coele eruptiones, episthemata colem refrigerantia, & quoddam ex prædictis infusum sanant.

Quæ tubercula in uesica maturescere oportet.

Cap. xxviii.

Optimum quidẽ est in principio conari quo tubercula dissoluantur, ut ne in pus permuteatur: si uero id cõtò fieri nõ possit, auxiliorũ usu ea matura facere oportet, quæ supra renibus cataplasmatibus modo dixi imponenda, atq; amplius adhuc nasturtio cũ erui sarina & melle, & colubino stercore cũ caridis imposito. Fomẽtis autẽ & alijs remedijs utendũ, quemadmodũ istic est prædictũ. Vt plurimum uero circa uesicæ collũ suppurantur, quapropter etiã urinæ stillicidium amplius inducitur, suppuratur & in uicinis sedi locis, & magis recemẽti egestionẽ impediunt. Suppuratur etiã circa pectinem utrinq;: uerum non difficile est ea cõescere, tum loci dolore, tũ grauitate, atque ipso adeo tactu: duriora enim & calidiora sunt corpora quæ suppurationẽ incurrent. Ex tuberculis etiã quædam foras uertuntur ad sedẽ, quædam quocũq; cõtingit defluxus. Periculosa igitur & hæc sunt ac omnino letalia, periculosiora autem sunt quæ intus rumpuntur.

De uesicæ ulceribus, R. u.

Cap. xxix.

Si uesica fit exulcerata, aut propter abscessũ, aut ob tuberculum quod præcessit, aut ex rupturã, aut ob fluxionis erosionẽ, aut ob aliã quamcũq; causam: ægros dolor acutus uesicæ omni quidẽ tempore committatur, maxime uero tempore missionis & excretionis puris, & si quidẽ sordida fuerint ulcera, secus lenta simul excernuntur, & mucosa, & quæ crassam subsidentia ad modũ farinẽ habent: aliquando autẽ & pelliculæ tenues ad modũ foliorũ & lamiarum cũ urina excernuntur. Si uero serpendo depascat ulcera, subruẽta excernuntur & saniosa ac foetentia. Ad hæc accedit urinæ emittendæ difficultas, & pudendi arectio ac petulãtia, & dolor non solũ quũ uriniæ meatus fuerit affectus, sed & quum tale quippiã in profundo existit. Cognoscetur autẽ num in profundo, siue iuxta urinæ meatũ sit affectio, ex eo quod si in amplitudine sua uesica sit affecta, dolor circa pubem cõsequatur: Si uero iuxta collũ uesicæ ulcera constant, tẽpore missionis tantũ & maxime ubi mingere inceperint ac cellauerint, dolor sentitur, atq; id amplius cõtingit, si urine sint acriter. Omnes quidẽ igitur assidue decubunt & neq; erecti stare possunt, neq; reclinati quiescunt, ab indeclinẽte dolore, febribus, uigilijs

uigilijs, & colliquatōne perimuntur: alij quidē ci-  
tus, alij tardius. Dolores enim acuti sunt & ulcera  
inducenda, partim quod urina assidue ea contingat,  
partim quod urina natura acris existat, neq; quāvis  
plurima excernatur, uis uersa uesica euacuari possit:  
sed semper ex urina quippiam in ipsa relinquitur,  
quod continēte ulcera constringit: semperq; uesica lo-  
tus plena existit. etenim quū multitudine eius euacua-  
tur, uesica cōtrahitur, & quod in ea relictū est quā-  
tumuis modicū, id ipsum omnes eius partes contin-  
git, & quantū rursus repletur, paulatim simul exten-  
ditur. Propter hoc ipsum itaq; & quod neruosa est,  
infrangibilia ut plurimū eius ulcera existūt: periculo-  
siora autē sunt quæ ex erosionē orta sunt, & modica  
spes est ea restaurādi. Attamen quoniam sepe etiam  
præter expectatōnem quædā eueniant, cura est ag-  
grediēda, per quam si nihil aliud, certe accessorijs do-  
lores minuentur. Primum igitur persuadendus est  
æger ut decumbat, & in lecto quietem toleret, idq;  
maximē si febres simul adsint: deinde remedia feбри-  
bus intermittētib; adhibēda. maximum uero hic  
fuerit lactis porus, neq; scio an post ullum aliud re-  
medium secundo saltem loco id sit habendum: nam  
& asperitates lenit, & ulcerationes eluit, aliasq; affe-  
ctiones extergit: reliqua uero diæta frugi sit & com-  
moda, ut ne urina acris fies, mordēda ac irriter ulce-  
ra. Per pharmaca etiā consolari ægrū oportet, quæ  
superne pectinem amplectantur, & si quidem cū in-  
flammatōne exulceratio cōsistat, cataplasmata ex lini  
semine, & foeno græco apta erūt, & reliqua quæ in-  
flammatōnē soluere possunt: infusionses sit & fomenta  
ex oleo & per spōgias, quin & cerata imponēda ex  
ceffypo, butyro, adipe anserino, & styrace appara-  
ta, & ceratum myrteum, quod pro cerusa, famiam  
terram, aut lemniam, sphragidem appellatam, aut  
minum linopicum, aut diaphryges habet ammixtū.  
Quod si loci uiolētius coarctentur, nardinum qui-  
dem sit ceratum. maluæ autē radices probē in aqua  
mulla coctæ, deinde tritæ, in ceratum infardantur,  
aut cerata ex meliloto & foeno græco similiter adhi-  
beantur, aut quod tetrapharmacum, itemq; quod  
enneapharmacum inscribitur. laxationem enim ma-  
li faciunt, uerum his omnibus aliquid satis amplum  
de styrace addendum. Porro si exulceratio pascen-  
do serpat, epithematis subadstringētib; utendum  
est, atque his quidem calidis, ut ob calorem quidem  
partes circumdolitantes leniendo uiuent, ob potesta-  
tem autem ipsorum nomen uicinos locos apprehē-  
dere prohibeant. Sylua horum sepe iam relata est,  
utpote in palmis, uuis palmis, gallis, malicorio, alu-  
mine, acacia, hypodisthide, & similibus sita. ex his  
singula aut palmis excipiūtur, aut cataplasmatas ex  
loliacea farina. decoctio autem sit in posca. Vten-  
dum etiam pharmaci per catheterem infusionē, ita  
ut in inflammatijs & exasperatis lacrecēs multum  
infundatur, aut rosacei optimum recēs tepefactum.  
Si uero nihil horum adsit, aqua dulcissima tepida  
assidue infundenda, mordacitatis tempore instantē:  
in insectinum quoq; per sedem pitlance succus infun-  
dendus est, & seminis lini succus, & cucumeris semē  
decoctum tritum cum lacte, rosaceo oleo ad sin-  
gula instillato. Cæterum ubi clysterem adhibere ue-  
lis ei qui uescicare habeat affectam, non supinum i-  
psū decubare oportet: nec enim permittunt ue-

sicæ infusum intrā transire, utpote indurata & gra-  
ues factæ, & intestino incumbētes, uerum in genua  
prorum reclinare hominem oportet, atque ita infu-  
sum adhibere. In hac enim situs figura uesicæ sece-  
dunt & intestinum laxant, quo infusum assumere  
possit. Frequenter autem & in aquam calidam desi-  
deant ægri, & in decoctiones relaxantes: nam hæc  
mitigant dolores. At uero ubi ulcera iam pascendo  
proserpant, per catheterem iniicienda sunt quæ depa-  
sitionem sistere possunt. Multa autem eius generis  
sunt, sed plurimis itemq; nobis familiare est, ex char-  
ta siccam pharmacum, quod cum rosaceo infundere  
oportet. Facit & Musæ pastillus, cum passo cretco  
tepidus infusus. Quod si uero sordida sint ulcera,  
pharmaca infundenda sunt, quæ repurgandi uim ha-  
bent: uelut est Epigoni chlora, siue uiridis compositio  
item quæ his appellatur, multo rosaceo diluta,  
aut ea quæ ex herbis constat, aut huiusmodi quæ-  
piam alia. Si uero acrimonia consequatur & mor-  
dicitas, lacrecēs multum cum opūno amylo in-  
fundatur, aut pompholyx pluribus aquis clota &  
exiccata, atq; deinde cum lacte diluta, aut collyrium  
Aster inscriptū, aut quod Cynariū appellatur: aut  
pastillus ex physalide, aut panchrestus, a comodita-  
te dictus, qui somnū inducit. Quum uero repurgata  
fuerint ulcera, adiuuare oportet quo ad cicatricem  
perducatur, atq; id per infellus adstringētes & eius-  
dem facultatis epithemata. Emplastrū igitur ex ouis  
comode superponitur, & ex hordeo uiso, & ex cad-  
mia, tripla eorum parte cum cerato myrteo, aut ro-  
saceo cōtemperta. Si uero magis fluxione affectio  
insestetur, post repurgatōnem uelutem, emplastro ex  
salicibus, aut iceljs, aut ex lolio utendū est, donec in-  
torum ad cicatricem perducantur. Atqui nosse ope-  
repretum est, quod in quibusdam ob solidam cicat-  
ricem induritam, seminis meatus excæcantur, & uis  
generandi perditur: ita ut appetentiam quidem ha-  
beant ad coeundum, nihil autem in totum seminis  
emittant, atque hæc affectio penitus incurabilis exis-  
tit. Cæterum si ad multum tempus exulceratio du-  
ret, quædamodum in perisq; fieri consuevit, tunc san-  
guis apprehendunt: quare in exacerbationibus  
quidem cataplasmata, & fomenta & irrigamenta le-  
uētidi uim habentia adhibeantur. remissionis uero  
tempore ductus ad destruendum malum apto uten-  
dum est. Pecten igitur iuxta membranæ peritonæi  
appellatæ, locum per malagratum ad hanc rem de-  
stinatorem impositionem rubefiat: sunt autem huius  
facultatis, id quod ex lauri baccis constat, & epi-  
thema uiride appellatum, & similia, maximē uero  
quæ ad calculosos renes sunt prescripta, quin & si-  
napismo utendum, & diæta uiribus reparandis apta  
est constituēda. Quod si non mansuecant, & diutius  
durent affectionis dispositiones, crustas circa pecti-  
nem & peritonæam membranam insligere oportet,  
aut per pharmaca, aut per ferrū, si necq; ut per mul-  
tum tempus ulcera se per effluxionem repurgent.  
Neque uero ineptē pharmaca dolorem leuantia in  
poru exhibueris, si uehementes insistent dolores. Et  
sanē quidam iam papaueris succum erui magni-  
tudine cum croco & myrrha lacte dissoluit in po-  
dicem indiderūt, aut cerato ex adipe anserino appa-  
rato permixtum & lana exceptum eodem modo  
intru-

intrulerunt, scimusque eos non vulgarem commoditatem inde consequutos. Assumantur etiam quæ per os exhibentur, si quidem urgeat urinæ emittendæ difficultas: ueluti est papaueris albi tostii semen, quod drachmæ pondere tritum in tres cyathos decocti floribus iuncti odorati, aut calami indicii, aut radicis dulcis inspergitur & exhibetur: his forisora sunt meon, phu, acorum, daucus. Plurimum autem exulcerationis dolor mitigat hoc semen cucumeris granorum triginia, nuces pineas duodecim, amygdalas amaras decorticas quinque, croci quantum ad colorandum satis est, quotidie ieiunus accipiat cum lacte recens multo, aut passo protropo, aut uino, aut sapa, quod si lenius reddere uelis, pro nucleis pineis malua semen pari modo recte conieceris. minore item molestia ab egro procedet urina, si tragacanthus prædictis cõmiscatur. Probè aut exulceratione iuuat uerbernae rectæ folia cum passo potata, in duobus cyathis dissoluta, quod facillè potu accipere possint. Ad urinæ difficultatē quidem & ad ipsam exulcerationem pariter cõueniunt, papaueris albi semen, amyli, myrti baccae nigrae, singulorum drachmæ quatuor, croci oui assati dimidium, unito, & drach. i. ex passo dato. Quod si multum pus efflueret, ferulæ usitæ drach. i. ex passo diluto exhibita, ipsum repurgat. Deinde aut singulis diebus cucumeris semē decorticaum, & crocum, obolorum ii, pōdere, & nuces pineas pitydas appellatas desquamatas v. & ani si obolos iii, simul trita cum uino multo ex calida aqua temperato, exhibeto. Cyphi item & cyphoides ad hepatis ulcerationes præscripta, in paucis ad eodē diebus uesticæ ulcera perferant possunt. Ego autē, inquit Archigenes, ad uetera ulcera hoc usus sum, neque opus fuit mihi pharmaco magis uariiegato. Trixaginis, chamæpityos, cuiusque drac. xxi. alari dra, vii. pipēris albi drach. v. ii. cinamomi drac. i. quā uenissimè terito, & unita simul reponito. Ego, inquit, ex eo cochlearia ii, cum passo diluto præbeo. Quum uero morsus contingit ulcerosus, amyli cochlearis duobus, & seminis cucumeris granis xv, adiectis, quod uolui sum assequutus. Sufficerint quidem igitur uolentibus bona methodo remedijs uti, hæc à Ruso & Archigene præscripta pharmaca. Apponā tamen & alia cõsimilia itidem à ueteribus tradita. Sint autē præscripta eorum quæ describentur quod ad usum pertinet exēpla. Andromachi, ad ulceram renum & uesticæ. Seminis lini, seminis papaueris albi, seminis cucumeris repurgati, tragacanthi, singulorum drach. ii, amyli drach. iii, cum aqua contento, & in passillis nucleis ponticæ magnitudine redigito: ex eisq; drach. i. cū passo diluto dato. Asclepiades autem & Eras hoc modo apparent ad asistendos morsus, & sanguinis ex uesticæ eruptiones. Seminis lini torrefacti, seminis cucumeris repurgati, seminis papaueris albi, tragacanthi, cuiusq; drach. vi, passii quantum satis est, apparato, & ponticæ nucleis magnitudine cum passii diluti cyathis ii, præbeo. Ad sanguinis eruptiones, cum aqua dato. Oribasi, ad uesticæ ulcera. Profunt & his quidē quæ ad renes affectos sunt descripta, propriè autē in potu accepta, portulacæ succus cum passo, graminis decoctus, lac, utinum dulce, cupressi coma cum myrrha, erui magnitudine. Ad uesticæ dolores, Seminis lini cochlearium i, ex passo, scellamum, seminis hormini drac. i,

oxyfchoeni semen, loti arboris bacca, seminis papaueris drac. i. cum aqua multa, floris cotoneorum decoctum. Eiusdem, ad renū & uesticæ exulcerationem. Nucum pinearum heminā italicam, physalis das numero x, nuces iuglandes octo, alij x. habent, croci drachmas viii, seminis rumicis drachm. viii, opij drach. iii, seminis cucumeris decorticati drach. iii, seminis apij drach. iii, mellis costi quantum satis est. Datur obolorum iii, pondere. Aliud, Andromachi, ad uesticam exulceratam & urinæ emittendæ difficultatem. Nuces pineas xxx, amygdalas præmundatas uistas viii, carnes palmarū xxxv, tragacanthi drachmas quatuor, succi radicis dulcis drachm. ii, croci obolum i, myrrhæ tantundem. Ex adipe passo, ac utere ut dictum est. Aliud, ad uesticæ ulcera & inflammationes. Nuces pineas xx, seminis cucumeris grana xx, amyli obolos iii, spicæ nardi drac. i, seminis apij drach. ii, spica & apij in sextario aque uno coquuntur, deinde ad decoctū prædicta miscetur. dantur cyathi ii, ad uehementēs morsus calesfacti. Aliud, Amyli drac. viii, baccarū myrti nigrarū maturarū carunculae dra. viii. seminis papaueris dra. xvi, passii protropi quantum satis est, apparato, & nucleis ponticæ magnitudine ex passo dato. Pastillus ex physalidibus, ut tradit Eras. ualerat renū & uesticæ affectiones, etiā si pus aut sanguis, aut corpuscula mucosa, aut fibris similia, aut crassa, per urinā exeat. Facit & ad scabiosas affectiones, & scilicidū urinæ, & ulcerationes agræ cicatricē recipiētes: idem & bibitur, & in uesticā inijcitur. Granorū herbe physalidis numero x xv, sunt autē haliacabo similia, paulo tamē maiora: amygdalarum thasiarū decorticarum, croci, nucum pinearum tostarum, seminis rumicis hortensis desquamati, singulorum drachm. iii, seminis cicutæ, opij, seminis fœniculi cuiusq; drac. iii, seminis hyoscyami albi, seminis apij, cuiusq; drac. vi, seminis cucumeris satiui desquamati drach. x. Excipe passo, & drach. i. præbe febre carentibus, cum passii diluti cyathis ii, febricitantibus cum aqua. Cæterum si uehementēs fuerint dolores, etiam ante somnum præbe. Per catheterē item injice. Vtere autem ut efficacissimo. Quidam etiā nucleis ponticæ tostæ drach. iii, addunt. Aliud, ad omnem renum & uesticæ exulcerationem, omnemq; emittendi urinæ difficultatē, & calculi affectionem, Portulacam exuocato, succumq; reficicato, & in passillos redigito, drachmamq; i. cum aqua calida potandam præbeo. Pastillus ex tragematis siue bellarijs, ad renum & uesticæ exulcerationes. Vuarum passiarum albarū mundatarum bessellem, nucleū pinearum sextantem, seminis cucumeris decorticati, baccarū myrti exacinararū, amygdalarum amararum delibratarū, aut dulcium, amyli, palmarū pinguiū, seminis apij, singulorum sextantem, seminis papaueris albi drach. iii, tragacanthi, croci, radicis dulcis, cuiusq; drach. iii, myrrhæ dra. ii. Redige in passillos cū cretico passo. Exhibe drac. i. cum passii cyathis ii. Aliud, experimento constans, Olympii sophisæ, ad exulceratam uesticam, Rheipontidi drachm. iii, seminis cucumeris decorticati drachm. iii, seminis hyoscyami drachm. ii, seminis malua drachmas quinque, nucum pinearum tostarum drac. vi, seminis apij drachm. i, amygdalas amaras delibratas lxx, cum sapa subige, & ponticæ nucleis magnitudine

gnitudine præbe, cum pãsi diluti cyathis tribus.

Asclepiadæ pharmacum accommodatum, ex cuius usu multos renum affectiones in totum liberatos scimus. Oportet autem ad multos dies pharmaco hoc uti. Sanat etiam vesicæ affectiones: datur & calculosis, remediõ est & colicis. Habet autem hoc modo. Nucum ponticarum repurgatarum, amygdalarum amararum mundatarum, seminis cucumeris depurati, feminis caroli, singulorũ drach. iiii. feminis papaueris albi, aut si non adsit, citæ drachm. vi. croci, feminis maluæ, opij, culusq; drachm. vi. feminis hyoscyami albi drach. xii. feminis apij drachm. xii. excipe melle cocto & informa pastillos, datoq; obolos iiii. cum aquæ mulsæ cyathis tribus. Aliud, ad exulcerationes renum & vesicæ. Damasonij drachmas duas, palmarum drach. x. nucum pinearum drach. viii. feminis cucumeris drach. iiii. anisi drach. ii. amygdalarum amararum drachmas ii. croci drachmã unam, dato obolos vii. ieiunis cum passo diluto. Quod si damasophilum non adsit, eryngium coniice. Vtere etiam Xenophilum antidoto ad calculosos capite xiii. præscripta, & similibus quæ ad exulceratam vesicam itemq; renes ualent, unã cum hoc quod arenulæ minguntur.

*Dieta ex libris Archigenis.*

*Cap. x x x.*

Vitet æger omnem delassationem, & longiorem ac esseruentem gestationem, maximè uero quæ sit in equo, uigiliisq; & omnem uehementem condictionem, & ecõuerso perpetuum otium, & balneorum assiduitatem: amplius autem & cruditates, & supra quàm conuenit repletiones, & ne quid crudum in cibo accipiat, & neque quod ægrè concoquitur, aut faciliè corruptitur, aut inflationes parit, sumat: maxime tamen uitet quæ faciliè acescunt, & quæ crassi humoris sunt, quæ urinam cient, quæ ægrè fecernuntur, quæ difficulter infernè excernuntur, & quæ amplius uentrem perturbant. item omnia acris & feruentia, & quæ accepta amplius adstringunt, & magis resiccant, & non nutriunt, & quæ stomacho inimica sunt, & quæcunq; bilem aut pituitam præcipuè gignere possunt, quare & multus potus, & meracior potus, ac ieiunus potus, omnes incommodi existunt, & uice uersa longa sitis, & inedia, & eduliorum uarietates, & superflua condimenta, omne item nidorosum & graueolens & putridum & crudum præsertim olus incommodum. Hæc enim omnia tum renũ, tum vesicæ ulceribus inimica sunt, arqui si quando appetitui gratificari uelimus, lactuicæ cauliculos, aut serin, cruda & cocta minore offensione sumere possunt. A placentis uero & alijs pinguibus abstinere oportet, & à plerisq; bellarijs. Vna passa enim non incommoda est, & nuce pineæ recentes duabus aquis macerata, & amygdalæ uirides quidem, maturæ tamen & probè mūdatur, siccæ uero non uetustæ, sed præmacerate & decorticate, licet & piscatium sumere, melius quidem uiride, aut si id nõ adsit, madefactum, minime uero uetustum. Thebaica autem palma caryotus qui os non habet, siue id à natura, siue arte ita contigit, acerbior est, & stomachi & renũ & vesicæ debilitati conuenit. Cæterũ genera quidem reliquorũ tandem describãtur: spectatim autem panis sit recens clibanites decenter apparatus. Ex uolucribus montanæ & teneræ carnẽ habentes & nõ antiquæ, Ex pedestribus conuenien-

tiores sunt hœdorũ extremitates, Ex aquatilibus ad renum & vesicæ ulcera magis congruunt, apua marina minima assidue comesta, non inepti sunt etiam aselli parui, & qui gobij appellatur: extergunt item ulcera gámarus, locusta, & aliquantulũ etiam squilla, cancer autẽ fluuialis uelut remediũ præbeatur, & herinacius recens familiariter permittatur: ex cõchis uero & peloridibus parũ quiddã uarietatis gratia detur. Pro liquamine autẽ intinctus ac uoluptatis gratia acetũ modicum, & quàm minimũ gari albi & boni concedendũ. Parcẽ autem utendũ est pipere & laseris succo, nasturdoq; & sinapi, ab eruca uero in totum abstinendũ, nam & uenerẽ excitat: coctus autẽ omnibus renum & vesicæ affectionibus insensissimus est, & maxime senibus ac natura imbecillioribus. Omnia porro quæ in cibo sumuntur, medicis multitudine finit, etiam si utilia esse feratur. Aqua pluuiã nõ corrupta omnino melior est: ex alijs uero quæ nullam omnino gustanti qualitatẽ exhibet, exquiratur. A frigida potu in totũ abstinendum: frigidum enim ulceribus inimicũ. Balinei uero rarus sit usus: quo uero aliquãdo appetentiæ gratificemur, & lassitudine resoueamus, permittatur. Cæterũ naturales aquas experiri non inutile fuerit: aluminosas uidelicet, sulphureas, & consimiles, quales sunt albulæ, & lactei temperamẽti atq; repositis. Frigida etiã lauare ac irritare cõmodissimum est: supra naturam enim ulcerationes ægrè sanabiles, tũ externas, tum internas destruit. De albularũ aquarum potu. Conferent itaq; aquæ albulæ si adsint, & cõsimiles post matutinã deambulationem, trium heminarum mensura prima die potatæ, deinde usq; ad quinq; & sex heminas perueniendũ. Ad hoc enim quod intestinum eluunt, æt etiã ipsarum uulginosus uesciam ad doloris sensum percipiendũ hebetat, & humoribus segregatis puriorem ac lucidiorem sanguinis uaporẽ reddit. quin & ipsæ aquæ ulcera utiliter repurgant, & cum uoluptate infra subeũt, atq; adeo nihil ægro sanando efficacius depræhendere possis: hora autem calidior ad eas accipiendas apta est. Quod si nõ adsit huiusmodi aquarum qualitas, adsint autẽ aliæ nullam gustui qualitatem exhibentes, sed late se ad gustum diffundentes, hæ ipsæ reliquis meliores sunt censendæ, & proximo ab eis loco bituminosæ. Nitrosarum etiã si adsint & salstarũ experimentum sumere prodest: maiorẽ enim quàm credi potest sæpe ex his succedentem uidi effectum. Interapedine autẽ & distantia à balneo facta, aridarum rerum comestio primum utilis est, nisi sitis simul adstricta: enim aqua calida modica sitis extinguẽda est, aut aliquo uino dulciore. Adsit autem & cenanthibis & myrtis uinum: nam ea post balnea & exercitia utiliter ad ulcera delabuntur.

*De uesicæ fluxione, & his quæ capillorum forma exeunt cum urina, Archigenis. Cap. x x x i.*

Fit aliquando & fluxio circa uescicã, ut aliquando quiddẽ mucosa, & folijs ac laminis similia, itemq; crassa excernantur, & aut crebro, aut post temporis morã lotia reddantur: aliquando autem aquosa & tenuia. Nouimus autem quosdã etiam pilos per lotium de cisse, modo inuicem perplexos, modo simplices, & aliquando ualde longos, aliquando breues, atq; eos omnes à fluxione productos. Hæc sanè Archigenes, Galenus autem de hoc ita inquit: Capillis similia  
G etiam

etiā Hippocrates cum urina prodijisse uidit, & nos sanē uidimus quandoque palmi longitudinem, quandoque etiā longiora aut breuiora: ex colore autem & compage persuasus sum, ex crasso & uiscoloso humore calefacto & resiccato in uenis eos coactos esse: quare quum primum uidissem, per urinam dentia pharmaca medelam futuram speravi, atque ita ferē omnibus contigit. Cæterum quibus hæc affectio accidit, nulla renalis mali accessione, neque antea neque postea sunt uexati, postquam uidelicet per urinam ducta pharmaca sunt curati. Archigenes autem ad hæc inquit, fluxiones ex locis remouere oportet, u-niuerſiq; corporis habitum, maximē uero circa re-nes & uelicam locos uendicare atque corroborare.

De priapismo & satyriasi: Galeni. Cap. xxxii.

Priapismus, tentigo est membri pudendi, & auctio in longum & spissum citra rei ueneræ appetitiā ex caliditate quadam acquisitiua cum inflammatione quadam & dolore locorum consistens. Appellatur nem autē accepit priapismus à Priapo uidelicet Sa-tyro: tale enim à natura habentem pudendum homi-nes fingunt & pingunt. Fit autem affectio aut ob di-lata uenarum ac arteriarū in pudendo ora, aut fla-tu uaporoso iuxta antrosum neruū, ipsum inquam pudendum, oborto. Mihi autē, inquit Galenus, pro-pter uirumque fieri uidetur, sæpius tamen ad disla-tata uenarum ora consequi. Aliquando autem pro-pter abstinendam à rebus ueneris: quidam hac affe-ctione apprehenduntur, atq; hoc ipsum eis qui mul-to semine abundant, simulq; præter consuēdinem se abstinēt, euenit, quum non per frequens & mul-tum exercitium sanguinis abundantiam discusserint, maximē uero hoc illis contingit, qui rebus quidem ueneris opus habent, in imaginationem autem ipsa-rum perueniunt per uisiones quæ ipsos in rerum ue-nerearum recordationem impellere possunt. Cæte-rum doloris eis contingunt, quales tetanici habent, & hi qui reliquis membris distenduntur: inflatum enim & distentum pudendum conuulsionis modo afficitur, & ex præcipit hoc modo affecti pereunt, nisi confestim eis auxilium feratur, quum uero mo-riuntur, uentre inflantur, & frigidum exdant, id quod & eis euenit qui alijs conuulsionis modis pe-rimuntur. Propter dolores igitur & inflammatione-s uenam secare statim à principio conuenit ab affe-ctione præhenſos, & in inedia adseruare usq; ad dies tres, irrigareq; pectinem & coxendices una cum pu-dendo ex lanis succidis uino & oleo imbutis: siti itē premere, & aluum obstruatam euacuare non acri ni-mium dysiteri, ne inflammationes exacerbentur. Ci-bum autem exhibere frumentaceum paucum atque omnino nihil inflantem, & in aquæ potu continere. Quod si diutius durescit affectio, etiam cucurbitæ cum scarificatione affigendæ sunt: si amplius san-guinis multitudo adiacere uideatur, hirudines an-hibendæ in ipsū locum: cataplasmata uero impo-nenda sunt ex cruda ordeacea farina. Optimum etiā fuerit aluum submollire per betæ & maluæ deco-ctum pauco mercurialis succo admixto. Concha-rum item decoctum in potu exhibendum: ab effica-cioribus autem purgantibus pharmacis in totum abstinendum. Cauenda etiā quæ urinæ ciendæ sa-cultatem habent. Vitendum autem cibis frumenta-cis generis, qui leniter attenuare ualent, citra mani-

festam calefactionem. Lumbis uero quæ euidenter refrigerant imponenda, uelut est solanum, portula-ca, hyoscyamus, & semperuiuum. Necessariū autem coles & interapedo inter anum & pudendum ex aliquo leniter refrigerante illinitur, uelut est argenti spuma, cimolia, & cerusa, si aceto, aut posca, aut aqua sine diluta. Optimē autem facit in ipsis ceratum ex rosaceo optimo apparatus, & frigida aqua sæ-pe elutum, si tum pendens, tum lumbis imponatur. Porro in latus decumbere ipsos ex reſte, & subſtere care quæ ad seminis profluium dicuntur: in po-tu amplius præbere quæ ad illos describuntur. A spe-ctaculis uero & narrationibus, ac commemoratio-ne eorum quæ ad uenerem excitare queant, penitus sunt arcendi.

De seminis profluiuio: Galeni.

Cap. xxxiii.

Profluium seminis excretio est eius præter uolunta-tem, citra pudendi tentiginem. Nomen autem habet ex eo quod inuitis profluit semen. Fit autem affe-ctio ipsa ob retentiua in uasis seminarijs facultatis imbecillitatem. Quemadmodum enim in his qui se-cundum naturam integris uiribus præstant, ea quæ in nutrimentum cedunt retinentur, & excrementa excernuntur: sic in his qui præter naturam habent, excrementa aliquando ob expulsiuæ facultatis infir-mitatem retinentur, & ob retentiue debilitatem ex-cernuntur, aut etiam ob aliquam aliam affectionem, quæ seminariorum uasorum partes eodem modo quo expulsiua secundū naturam facultas mouet: ue-luti in comitialibus, & alijs uiolentioribus conuul-sionibus cōtingit, aliquādo etiam in his qui ex con-uulsione moriuntur, ut uidelicet semen eis excerna-tur. Profluiū igitur seminis uasorū seminariorum affectio est, non pudēt, quæ dolorem quidem non ita ualde inferre solet, molestia autem nō uulgarem & pollutionem exhibet ob asiduum & inuitis con-tingentē seminis fluxum. Oboritur autem aliquādo etiam ex seminariorum uasorū fluxione: quandoq; etiā satyriasi præcedente profluiū seminis succe-dit. Contingit autem affectio maximē pubertatem transgressis circa decimum quartum annum, imò a-lijs item ætatibus. Est autem semen quod profluit a-quosum, tenue, citra appetitiā coeundi, & ut plu-rimū quidem citra sensum, quandoq; uero cū uolu-nate quadam promanās. Corruptur affectis sen-sim uniuersum corpus ac gradiescit præſertim circa lumbos. Consequitur & debilitas multa non ob multitudinem seminis profluentis, sed ob locorum proprietatem. Non solum autem uiridis, sed & mu-lierculis hoc accidit, & in feminis sanē ægrè tolli-tur. Cæterū cura communis est cū ea quæ in omni fluxione adhibetur. Primum igitur in quiete, & pau-co cibo, ac aquæ potu affectos adseruare oportet: de-inde etiam lumbos & pubem contegere lanis uino & rosaceo, aut cenanthino, aut melino madefactis, neque uero ineptæ sunt spongiæ posca imbutæ. Se-quentibus uero diebus cataplasmatibus ex palmis, ma-lis, acacia, hypocistide, cenantho, rhoë rubro, & si-milibus, insensibus item adstringentibus utendum est, ex lenissimis, rubi, myrtili, & similibus in uino auste-ro siue mero siue diluto decocto. Cibis autem uten-dū qui ægrè corruptiuntur, & difficulter permutan-tur, & resiccandi uim habent. Dandum etiā cum po-tu ac cibis uiticis ac cannabis semē præſertim tostū,

rutæ

rutæ item semen ac folia, lactucæ semen, & cauliculi, ac nymphææ radix. In potu uero quodidie pro communi aqua, aqua in qua ferrum sæpe extinguitur est, præbeatur. Quidam uero corticem radicis hali-cabæ ex aqua eis bibendum præbuerunt, neque ineptum fuerit huius aliquando periculum facere. Antidotus etiam hæc magnæ celebritatis, tum ad hoc modo semen profundè res, tum ad assiduam in somnis profluuiam, commodè exhibetur. Seminis salicis drach. vii. calaminthæ drach. vi. seminis utricis albæ drach. v. rutæ drachm. iiii. seminis cicutæ drachm. ii. cum aqua in pastillos digerito, & ex eis ad ponticæ nucis magnitudinem cum poscæ cyathis tribus præbeo. Omnem uero acrium rerum usum, & multi uini potum, & olerum exhibitionem uitare oportet: digtam uero uniuersam resicatoriam & adstringentem constituere. Post prima autem mox tempora ad actiones & exercitium diætam transendum, per quam totum corpus & præsertim affecta ad sanitatem perducantur, & plurimo quidem tempore circa actiones immorandum: paucis uero lauandū, si aut lassitudinē aut crudelitatem mederi uelimus. Bonum fuerit etiam, si nihil prohibuerit, ad frigidæ lauationem desigere, quæ omnem morbum ex fluxione obortum depellere consueuit, maximè si medicamentaria qualitate aqua prædita sit, uelut sunt in albulis aquæ, quæ etiam in potu acceptæ eis summe profunt. sunt autem sapore subfalso, & tactu lætè teporis. Conuenit item per interualla quædam, illitionibus & epithematis & malagmatis uti, quæ rubefacere & emollire possint, atq; ea quæ in profundo hærent ad superficiem transferre. Decubitus porro frequenter in latus fiat, calaminthæ folijs, & rutæ ac utricis substratis. Epithema autem in eis uisum hocce: Capillum ueneris multum, conuadito & terito cum aceto, aut apij succo, aut seridis, aut psyllijs, eoq; cochlearum carnes coctas excipito, & simul in linteolum infarta coxendicibus imponito. Vendum uero & præscripto ad priapismū cerato, & his quæ paulo mox ad feminis in somno profluuiam dicitur. Omnem autem de rebus uenericis cogitationem excludere oportet.

De feminis in somnis profluuii, Philagrij.

Cap. xxxiiii.

Semen in somnis profundere dicitur, quicunque dum dormiunt naturæ genitale semen emittunt: quod ipsum eis ut plurimum ob uitæ humoris materiam, aut materię multitudinē, aut ob partium seminaliū robur cōtingit. Lam uero quidam & ob animi morositatem, aut inediam, per somnos præter consuetudinem semen excreuerunt, quod id materię acrimonia irritat, non ob partium seminaliū robur pertulerit. Huiusmodi sanè, qui uidelicet animo morosi fuerunt, aut inedia diutius perculerunt, in totū se nulla imaginatione præcedente, citra sensum etiam, in somnis profuit semen. Reliquis autē non solum cum pudēdi intentione, sed etiam cum quadam propoſita imaginatione, quæ in somnis occurrat, inordinate semen profunditur. Cæterum pessimus corporis habitus hic est, quum semen multum & calidū aliqui generat, quod eos ad excretionem urget, atq; postquam per coitum eiecerint, exolutionem oris ueneris patiuntur, & toto corpore exoluntur, debilesq; fiunt & sicci, & tenues, & pallidi, oculos etiam cauos

habent hoc modo affectū. Quod si a coitu uenero abstineant, propterea quod ita afficiantur, capite discruciantur itemq; stomacho, & æstu fastidioq; anguntur, nihilq; magnopere ex cōtinentia iuuantur: contingit enim eis per somnum semen profundentibus consimilia perpeti offēdícula, qualia cōtundendo perpelli fuissent. Quidam uero ipsorū mordax, & calidum semen percipiunt in excernendo, uelut ipsi consueuerunt. His igitur, inquit Galenus, consulere oportet, quo a cibis semen gignentibus abstineant: accipiant autem non solum cibos, sed & pharmaca quæ semen extinguant, uelut est utricis semen coctū & persi frutum: folia item & flores uenerem cohæbere creduntur, non comesta tantū, sed & in potu sumpta & substrata. Lentium uero decoctum etiam membrigitentem remittere ac sedare aiunt. Portulacæ comesta, & lactucæ semen potatum, & nymphææ radix & semen in cibo accepta, semen refrigerando extinguunt: Ruta uero comesta calore suo semen coagulat & corrumpit. Calaminthem autē assidue edētes generandi potētia priuari dicuntur, id quod similiter & uiolæ albæ semē, & hederæ cacumina nigra faciunt. Cæterū aqua fabrorum ferrariorum in qua ferrū sæpe extinguitur est, assidue potata, citra molestiam immittit semen. Horū autē omnīū sylua uniuersa in secūdo huius tractationis præscripta est Sermonē. Compositis porro ad ipsos utor, tū his quæ ad feminis profluuiū sunt præscripta, tum hoc ipso. Ammij grana vi. feniculi tantundem, foliorum rutæ parum quiddam cum caricis pinguibus tribus, per mensem semel edito, aut quotiescunq; uelis, qui assiduam eorum quæ uehementer refrigerant usum, tum in his quæ per os exhibentur, tum in eis quæ sorinsecus apponuntur, uitare oportet: uelut sunt ea quæ ex papauere & mandragora apparentur unguenta. Illitiones autem a balneo adhibeantur ex mediocriter refrigerantibus. Sunt autem hæc: oleum ex crudis oliuīs expressum quod omphacinū appellatur: rosaceum maximè quod ex omphacino est apparatus, & melinum. Componenda autem sunt aliquando unguenta compage crassiora, ne uidelicet faciliē defluat. Compositio uero ipsorum est ex cera, & succo aliquo adstringente aut refrigerante commissis, hoc modo. Cera partem unā cum quaduplici oleo liquefacto, deinde in mortario cum manibus sufficienter emollito, & paulatim ex succo refrigerante quantum expedit instillato, unīto, ac utitur. Succed uero ad hanc rem apti sunt, succus semperuiui, solani, umbilici ueneris, psyllij & sanguinaris, tribuli, perdicij, nymphææ & portulacæ: uerum hæc succum non emittit, nisi ad eam consulum in pila, æliquis alijs tenuis succus affundatur, uix præsertim immaturæ, & rosarum, qui sanè in ætate faciliè parabiles sunt. Alij uero multi etiam alijs temporibus haberi possunt, uelut lactucæ, seridis, stratorisq; & lentium quæ in aquis nascuntur: semen lini etiam in aqua coctum, succum moderate refrigerantē reddit: rhamni item foliorum succus, & quæ his similes existunt. Optimum etiam censetur laminā plumbeam lumbis supponere, tum eorum qui in somno, tum qui aliās semen profundunt: multum enim refrigerare consuevit. In his uero qui plūbi duritiem ferre non possunt, consulere oportet, ut ex prædictis herbis quædā arefactæ substernantur, quibus etiam



uiscicis folia & modica ruta ac calaminthe commiſceantur, maximè uero ipſæ roſæ. Proſunt enim hæc circa renum læſionem. Vehementes namque refrigerationes eorum quæ lumbis ſubduntur, renes iniuria afficiunt. Ipſum etiam ſtratam pellicum ſit, & non ualde molle. Decubitus porro ut plurimum in latus fiat, uſitata forma decubitus ſupina, ne lumborum arteriæ inde ſupercalſcant. Atque hæc quidem communis eſt omnium quibus ſemen in ſomnis profluſit cura. Cæterum eos qui prædictum uitioſum corporis habitum & conſtitutionem habent, de illis dico, quibus ex coitus uſu ſtomachus inſurſa aſſicitur, illos, inquam, obſeruari oportet, quando maximè ſeminis multitudo, quæ excretionem expetat, cõgregata appareat: & tunc in die quadam modo derato acboni ſucci cibo uſi, à cœna quum ad ſomnum uertuntur, coſtu uſuſ: ſequenti uero die quum ſufficienter dormierint, & à ſomno ſurrexerint, lintheo corpus perfricent, donec cutis quendâ attrahat ruborem: deindeq; olei cõſtitutione, & inſritu moderatè utantur, & aliquântulo temporis ſpatio interiecto, panem bene ſermẽtatum, dibanitem, purum, modicum ex uino diluto accipiant, atq; hoc modo ad conſueta munia obeunda perueniant. Eo uero tempore quod inter olei inſritum & panis exhibitionẽ intercedit, ſi locus adſit in uiciſia aptus, in eo pauliſper deambulent: ſi uero hyemis tempus inſit, melius fuerit tamdiu intus deambulare. Abſtineant autem à ſpectaculis & lectionibus quæ ueneræ rei uſum in memoriã reuocare poſſunt. Et quotidie ſanè hoc modo affecti exerceantur hiſ exercitiis generibus, quæ per ſupernas partes ſunt. At uero corroboracionẽ ſtomachi ex eſu panis cõmunem designamus in omni homine, cui bilis eſſet ueſcit, & qui ſtomachũ exolutum habet. Quare & hi circa horam tertiam diei modicũ panem ex uino cum calida aqua diluto madefactũ accipiant, atq; ita ad conſuetas operas prodeant.

De hiſ qui re ueneræ uit non poſſunt. Cap. xxxv.  
Qui re ueneræ uit cupiunt, ignaua autem & impotentia mēbra habent, infernas corporis partes exerceant, inguinatq; & femora hiſ confricent, pipere uidelicet, nitro, & euphorbio cum oleo, unguentisq; ex huiusmodi rerum ammixtione apparatus: exempla autem componendi paulo poſt dicemus. Dormiant in mollibus lectis, legantq; quæ ad coſtum cohortantur, lectionibus itæ ac ſpectaculis eiufmodi aliſideant. Cæterum edulia & pharmaca ipſis conueniunt caſeſcentia & infantia, ueluti ſunt, cicer, fabæ, halica, porri, bulbi, paſtinacæ radix & ſemen moderatè, nux pinee, ari radix cocta, colocafi radix cocta, iteq; dracunculi, urticæ ſemen, rapi ſemen, erucæ tum ſolia, tum ſemẽ, maximè agreſtis, coſtus & piper cum uino muſſo, ſatyrium, ſeſamum, horminũ, amygdalæ moderatè, aniſum, polypodes & concharum genera omnia: perdidiciſtem oua ad coſtum excitant, & teſticulis galli. Seminis uero multitudinem augent omnia bono ſucco prædita: teſtes uulpiſ ſicci rriti cochlearij menſura potaſi innocuam & mini me uanam membri tentiginem faciunt: partes etiam renes ſcinci amplectentes ad tentiginẽ pudendorum excitandam bibuntur. Orchis, herba eſt quæ teſticuli appellationem habet, eius maior bulbus cũ lacte potatus tentiginẽ ciet: minor uero cũ aqua potatus,

tentiginem remittit. Compoſitũ tentiginem ciẽs, & faciẽs ad languorem membrorum, ac reſolutionẽ. Sinapis, radicis panacis, ſeminis erucæ cuiuſq; drach. vii. ſeminis cardamomi drach. iiii. piperis grana x. redigito in paſtillos cũ erucẽ ſucto, & dato dra. i. ieiunis cum uino ueteri adſtringente. Aliud. Seminis hederæ nigræ, ſloris chamemeli, ſeminis oxyſchoeni, cuiuſq; drach. iiii. ſeminis erucæ, piperis albi, ſinapis, cuiuſq; drach. i. pyretri drach. iiii. excipe melle, & ad ſtrigmentori ſpiſſitudinem redige, præbe à balneo nucis põticæ magnitudine. Aliud. Putandum cerui aridum urito, & drachmā unam cum uino meracore præbe. Experimento conſtat. Aliud, quo & ego uor. Seminis hormini, ſeſami, piperis, ſeminis erucæ, ſinapis, nucum pinearum, caudæ ſcinci, ſatyrij, ſloris ſunci odorati, ſtyracis, ſeminis porri, uux paſſæ, ſingulorũ æquales partes, melle quantum ſatis eſt: præbe drachm. i. Aliud, quod etiam ipſe uor. Salis cõmunis torrefacti ſeſquiſextarium Italici, hoc eſt, uncias x. xvi. ſeminis hormini ſcrupulos duodecim, ſpicæ nardi unciam unam, ſalis ſcinci uncia i. caudæ ſcinci drachmas quatuor, ammi ſcrupulos duodecim, ſatyrij ſextantẽ, piperis unciam unam, ſeminis cardamomi uncia unam, ſeminis ſceniculi unciam unam, myrrhæ unciam i. ſeminis erucæ drachmas ſex, ſeminis uerbenacæ ſupinae aridi drachm. tres, ſeminis ſanguinarie ſicci dra. ii. nucum pinearum uncia unam, phyſalidum drachmas iiii. ſeminis hyperici drach. iiii. contundito, cribrato, & ad uesperam cochleariũ quomodo cũq; uelis exhibeto. Aliud uehementẽ efficaci. Myrrhæ, piperis, ſpicæ nardi, tragacanthi, cuiuſq; drachmā i. thuris ſeſquidrachmā, croci drach. i. ſtyracis, galbani, dauci, ſeminis hormini, cuiuſq; dra. ii. cãchryos, ſeminis ſceniculi, ſeminis lini, ſeminis urticæ, ſeſelcis, cumini Aethiopici, aniſi, ſeminis erucæ, cuiuſq; drachmas vi. erui albi coſti drach. vi. ſeminis apij drach. iiii. ſeſami non loti drach. x. amygdalas amaras uel bratas quindecim, amygdalas dulces triginta, nux pinea centum, bulbos crudos magnos ſex, mellis quantum ſufficit, ut ad cerati craſſitatem redigatur, præbe drachmā i. ante cœnam, cum uino muſſo maximè, aut uino auſtero. Facit ad tentiginẽ, & ſuperabundantem rei ueneræ uſum ciendum, in ſenibus præſertim & debilitatis. Facit & ad liberorum procreationem. Vnguentũ efficacisſimũ. Olei uerutuliſimi librā i. erucas in tithymalliſ repertas nona: ginta ſex: erucas in æſtate, dum in uigore eſt herba, accipe, & in oleũ coniectas ad ſolem per dies ſeptem expone, & poſtea oleo ueteri: ani & pudendi intercã pedine, itemq; lumbis ex eo confrictis. Idem etiam pinus erucæ faciunt, & tentiginẽ uehementer ciet.

Oribafij ſatyria. Zingiberis, radicis ſatyrij ſuperioris, cuiuſq; drach. vii. caudæ ſcinci, mei, ſalari, petroſelini, cardamomi, ſeſelcis, cuiuſq; drach. iiii. ſeminis erucæ drach. iiii. cinamomi drach. iiii. hormini, piperis, ſeminis urticæ, cuiuſq; drachm. ii. ſloris ſunci odorati drach. i. ſpicæ nardi drach. i. ſanguinis hircini ſicci cochleariũ plenum, datur drachma i. cum uino, imbecillioribus uero cum lacte. Oribafij, ad pudendi læguorem ac reſolutionem, præſertim ſenum. Seminis erucæ drachm. ii. cumini unc. i. portulacæ unc. i. excipe melle, & mane ac uespera cochlearium præbe. Porro ad coſtuth conciat paſſer troglodytes

dytes appellatus, in cibo acceptus. Verum his, qui frequentius & supra quam conuenit inde coeunt, uirinam capræ bibendam præbe. Oribasij, tenguinem ciens. Piperis, petroselin, nucum pinearum, scobis pudendi ceruini aridi, terebinthinae, æquales omnium partes melle excipe, & cum uino bibédas præbe. Aliud, Oribasij. Stellionemustum quam tenuissimè conterito, deinde oleum affundito, atque ex eo magnum dextri pedis digitum inungito, & coito: ubi uero à coitu cessauis uelis digitum ipsum abluito. Aliud eiusdem. Leporis coagulum, aut leonis adipem pudendo illinito: deinde trita piperis genera cum tragacanthi succo testiculis intercapedini inter anum & pudendum, ac lumbis oblinito. Ex Rusti libris unguentū efficax tenguine ciens. Myrrhæ drachmam unam, sulphuris uiui drachmā unā, cnicī interforis drachmā unā, pyretri obolos duos, melanthij drach. ii. piperis grana xxx. grana cnicidia depurata uiginti, cōtundito, & cū drachma una succi scillæ terito, ceræq; undam unam, cum olei cecini besseliquato: mellis item quadraniem adijcito. Vutor. Post coitū uero cum linteolo loci diligenter extergantur. quidam uero hoc unguento sedem illi-

nunt. Porro Rufus etiam hæc addit. Facile est, inquit, & hic remediū reperire, his qui uenere uiri non possunt. Adolefens enim quispiam nos accessit, & se uehementer coitū appetere confessus est, uerum ubi commiseretur, semen emittere non posse, sed statim plurimos sibi per sedem erumpere. In hoc itaq; cōsecuram sed, uasorum seminariolorum siccitatem adesse: quod ipsum etiam adepta sanitas demonstrauit. nam postquam humida & boni succi diæta esset usus, semen emisit. Alius item adolefens domesticus minister, confessus est se, quando cum muliere rem haberet, semen effundere non posse: quum uero dormiret, plurimum ei semen prodire. Visum itaque mihi est, uasa eius seminaria propter multam unā cum frigidityte humiditatem, calferi non posse: propterea quod caliditas in coeundo ad corporis superficiem diffunderetur. In somnis uero amplius calferet, propterea quod somni interna calefaciant, & refrigerant exteriora. Quare hunc ipsum infernas partes exercere iussi, atque id maxime præ equirationem. Castorium etiam bibendum peribui, & diætā omnem calidam & siccam constitui.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

DVODECIMO SERMONE AETII

CONTINENTVR.

**D**E ischiadicis siue coxendicium dolore. cap. i.

De herba iberide, quæ & cardamine appellatur, eiusq; sinapisino. cap. ii.

De uisione. cap. iii.

Cura affectionis exacerbatæ. cap. iii.

Epithemata & malagmata ad ischiadicis. cap. v.

De podagra & arthritide siue articulorum morbo. cap. vi.

Causæ uniuersales. cap. vii.

Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus. cap. viii.

Quare multo tempore aut pauco morbus duret. cap. ix.

Quæ sit incuruatorum articulorum causa. cap. x.

Quæ causa generationis toforum in artubus. cap. xi.

Quæ causa sit cur inflammationes in podagricis non facile suppurentur. cap. xii.

Quomodo ex inflammationibus & consequentibus accessionibus, siue symptomatosis, adligens humor cognoscatur. cap. xiii.

Sanguinei humoris influentis signa. cap. xiiii.

Biliosi humoris signa. cap. xv.

Pituitosæ fluxionis signa. cap. xvi.

Bilis atræ influentis signa. cap. xvii.

Serosarum fluxionū signa. cap. xviii.

De his qui ex humorū complexu suo-

re instantur. cap. xix.

Diætæ & cura podagricos præseruās. cap. xx.

De olei & salis affricu in podagricis. cap. xxi.

Vniuersalis methodus curationis podagricorum. cap. xxii.

Cura eorum qui ex sanguinis copia ægrotant. cap. xxiii.

Quod eleuatas & incuruas uenas ex membris fluxione instantis, uelut in uaricibus, auferre oporteat. caput x xiiii.

De perustione in morbo articulari. caput xxv.

Cura in fluxibus sanguineis post sanguinem euacuatum. cap. xxvi.

Cura eorū qui neque uenæ sectione, neque purgationem sustinere possunt. cap. xxvii.

De his qui ob bilis influxum ægrotāt. cap. xxviii.

Parabola remedia ad inflammationes non ualde fruentes. cap. xxix.

De stupeficientibus medicamentis caput xxx.

Vnguentū recalcifactoria quæ post stupescit uinum adhibentur. cap. xxxi.

Pharmaca & edulia eorū qui stauæ bilis influxu instantur. cap. xxxii.

Cura eorum qui ob pituitæ influxum ægrotant. cap. xxxiii.

Cura eorum qui ex atræ bilis influxu ægrotant. cap. xxxiiii.

De his qui ob tenuem & serosum influxum ægrotant. cap. xxxv.

De fluxionū inter se complexu. caput xxxvi.

Cura affectionum ex sanguinis & bilis complexu. cap. xxxvii.

Cura bilis ad pituitā permixtæ. caput xxxviii.

Cura humorum atræ bilis alijs permixtorum. cap. xxxix.

Cura durorum humorum qui post inflammationes relinquuntur. caput xl.

De tumorum cydorum & incoctillum cura. cap. xli.

Malagmata diuersa, in quibus etiā Lucij malagma est, ad articularum distortiones destinatum. cap. xlii.

Cerata podagrica. cap. xliii.

Vnguenta & acopa diuersa ad podagricos, articulorum dolores, ischiadicis, membris exolutis, & tremettes. cap. xliiii.

Ad durities in artubus instar toforum. caput xlv.

De medicamentis purgatiuis articulari morbo accommodatis. caput xlii.

Antidoti podagrice. cap. xlvii.

Qui podagrici lauandi sint, & quomodo. cap. xlviii.

# AETII MEDICI GRAE- CI CONTRACTAE EXVE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLI SIVE QUATERNIONIS

TERTII SERMO. QUARTVS ET EX

ORDINE DVODECIMVS.

*De ischiadicis siue coxendicis dolore, deq; podagra & articulari morbo, quem Graeci arthritidem appellant.*

*De Ischiadis siue coxendicis dolore. Cap. I.*



ARCHIGENIS, Ischiadici, hoc est ex coxendicis dolore affecti, proprie dicitur quibus dolor circa iuncturam quandā uertebrarū innititur. Antecedit autē & quasi aufpicatur hoc malum aliquando quidem uiciniorum musculorum dolor, & maxime lumborū: aliquādo uero ab ipsa iunctura initium fit affectionis. Iam uero quandoq; etiam contingit ut uertebrī dolore ferē sublato, circa poplitem solū afflictio hāreat; alijs autē iuxta talū: quibuldā uero totū crus equaliter dolore affigitur. multis itē circa inguina dolor figitur, & tū sanē uesica ipsa molestia transilumens, urinae difficultatē inducit: & tūc maxime totū crus à coxendicibus usq; ad calcaneū dolorē perferē, & non solū si ipsum crus moueatur conuulsiones inferē, uerū si etiam aliqua alia corporis pars agitur. Generant autē hanc affectionē asiduae cruditates, & immodicus rei uenereq; usus: aliquando etiā deambulationes concitiores, & haemorrhoides suppressae, & uomendi consuetudo intermissa, & purgationes mēstruae, aut etiā aliae familiares excretionēs impeditae, & exercitorū contemptus. Cōmūnis quidem igitur ischiadicis, podagris, & articulari morbo existit ualida alicuius humoris ubertas, quae affectum articularum nexū occupat: quo impleto exporrecta neruosa corpuscula tensione affliguntur, atq; ex his oboritur dolor. Cae rerum ad affligentis humoris cognitionem conferēt diæta quae praecelsit, & anni tēpus, & aeris nos ambiētis status, aetasq; & habitus, itemq; color corporis: amplius autē & doloris specimen, siue seruēs & pungens, siue stupidus. Initium igitur curationis fiat ab affligentis humoris euacuatione, & si quidē humoribus ex æquo redundarit corpus, prae omnibus uenae sectio adsumatur: deinde etiā purgatio: postea uero ea quae dicuntur pharmaca oportune & ordinare adhibeantur: ita ut in manibus quidem & pedibus pharmacis fluxum repellētibz utamur, circa coxendicum uero iūcturam id facere uideamus: quum enim hic cōnexus in alto situs sit, sanguis ex uicinis & ambiētibz uenis ac musculis ad ipsum impellitur: quare lenitius in principio opus est pharmacis ad coxendicū dolorē, atq; ea neq; omnino refrigerent, neq; fortiter calfaciat. Etenim quae refrigerāt, ad connexum materias impellunt: quae uero uehementer calefaciunt, aliam amplius materiam ex adiacentibus partibus adtrahunt. A multitudine itaq; sanguinis coxendicū dolorē obortum uenē sectio curat, si primū cubitū uenā fecimus: deinde etiā eam quae iuxta talos est, aut poplitem. In principio enim omnium inflammationum diuulsiōriam uenae sec-

tionem facere oportet, uelut si pes sit inflammatus, ex uena ē directio loci affecti sita sanguinem extrahemus. In affectionibus uero iam inueteratis, maxime quidem ex ipsis locis affectis extrahemus: aut si id fieri non possit, ex uicinis. Post sanguinis uero ē cubito detractionem, à talo repetita sectione auferre oportet, secunda est autem interna uena iuxta talos sita: uiriliter enim imbecillis auxiliatur. Et scito, inquit Galenus, coxendicum dolorē in una die curationes per hanc ex cruribus euacuationem, maxime si non à frigiditate sine obortu, sed ex uasorum sanguinis circa coxendicē repletionē. In omni equidem coxendicū affectionē, praecipue tamen ea quae humoribus ex æquo redūdantibus oboritur, si quis prius quam corpus euacuet, acribus pharmacis ad affectū particulam utatur, egerime sanabilem affectionem reddit, utpote multitudine ibidem insolubiliter condensata: supra reliqua enim inspissatur & uiscosa redditur, & ob acrium pharmacorum caliditatē & siccitatem non dissimile quippiam assationi perpetitur. Ab euacuatione igitur totius corporis, ut quae maxima facultate ad huius affectionis curam praestet, curandi initium faciemus: & non solum à cruribus, sed & à cubito primū sanguinem extrahemus. Sunt & uomitus ischiadicis cōmodi, atq; adhuc amplius quam per uentrē euacuationes, nimirum retrahētes humores infra repentes. Eos igitur in principio affectionis facere à cibo expedit. Inueterato uero malo etiā à pharmacorum uomitū dentitū acceptance, ita ut à medicocribus incipiamus. Porro quibus iam indissolubilis humorum coactio in ipso articulo à medicis per immodicum acrium pharmacorum usum facta est, his cucurbita quam maxima cum scarificatione locis affixa auxiliatur, & purgatio per insulam efficaciora. Qui igitur iā dicta prae oculis habuerint, etiā praescriptis à ueteribus medicis pharmacis iuxta methodū poterint uti. Itaq; post uenae in cubito sectionē, & à talo itē sanguinis detractionē, aut per purgatiū euacuationē, ubi uidelicet alius leniori clysteri infecto excreuerit obturata, irrigare locos oportet, primū quidē ex oleo rutaceo, postea uero etiā efficacior irrigatio adhibenda quae lenim calfacet, & materias ex alto ad superficiē attrahere possit, qualis est quae ex cyprino, aceto, nitro, & cāchry cōstat: ita ut octo quidē cyathi olei cyprini, quatuor uero acris aceti, duo autē nitri, & unus cāchryos conijciantur, & donec ter aut quater effluant, coquantur: post uero expressus & in lanis succidis exceptus succus sup affectos locos imponatur, uerū quotidie renouare hanc irrigationē oportet, & tribus uicibus hoc foris admoto pectus animaduersionē habeto. Multos enī, inquit Archigenes, uidi q nullo alio praesidio opus habuerūt. ego uero, inquit, post dicta etiā simpliciorē

simplicidorem dysterē infundo, & sequēti die acrorem, atq; haud scio an ullus tam degener coxendicum dolor reperitur, qui huic præsidio non cedat: aut si aliquando ad primam adhibitionem non cessat, post alterum eius usum penitus excidit. Apparet autem acrior dyster hoc modo. Mellis selquiyathū, olei tantūdem, aquæ cyathos ii. nitri drach. vii. terebinthinae drach. iiii. hæc unita & calefacta infundito, & podici fomentum apponito, quo diutius infusum cōtineatur, nam sic magis operatur, ut plurimū uero mucosam humiditatem extrahere cōsuevit, aliquando autem & sanguinem, quando etiā maior commoditas resultat. Quod si adhuc affectio ipsa perstiterit, paucis diebus interpositis, non tamen ut prioris præsidij utilitatem demoliamur, rursus dysteri utemur pro simplici aqua, cœcraurē decocto ad prædicta affuso, quo robustus pharmacum reddatur. Suprà opintonem aut ipsi commodat cucumeris syluestris radix in tenues partes concisa, dein de paulū cocta, atq; decocto eius cum solo melle infuso, citra omnem mordacitatem euacuat affligentē humore. Optime etiam facit lupinorum amarorum decoctū cum pari oleo infusum. Sæpe enim, inquit Archigenes, hæc prædicta cura ad omnes ischiadicos mihi sufficit. Quod si tamē affectio adhuc remoretur, cucurbita quam maxima cum plurima flamma locis affigatur, uulnuskulis etiam altioribus per scarificationem impactis. Cæterum & reliquam curam referre operæ pretij existimo, ut nota sit, si quādo usus eius necessario expetatur. In omni enim tempore plurima curationis principia cōstituenda; hoc enim modo facilius affectio destruitur, si assidue præsidiorū permutationes fiant. Itaq; ubi rursus meri coeperis, uomitib; uteris siue à coena, siue à raphani acceptance cōcitatis; deinde loci affecti & totū corpus in balneo per nitrū extergatur, post balneū autē loci ex unguento per adarē & euphorbiū cōposito sillantur. Deinde rursus aliud mendendi initium à purgatione facies. Solitus autē fui, inquit, purgatiū ad ischiadicos assumere huiusmodi. Colocynthidas quotquot uelis accipito, & derafa ac proiecta medullas ipsas oleo optimo expleto, & totam noctem finito, deinde oleo per se effuso, cum uacuo colocynthidis calice aquā una & dimidia olei mensura commesurato, ac in ollam fundito, atque cum ea ipsa communi aqua colocynthidas ipsas donec flaccescant, coquito: & expressas ipsas quidem abijcto, liquorem autem excolatō, & affuso ad ipsum oleo seruescacito, ac panis stiliginē confusi & cribati quantum satis erit inspergito, manibusq; satis diu emollito, ac pilulas ad nucis ponticæ magnitudinē formato, ex eisq; xxiiii. pilulas à balneo exhibito. Si uero fortius reddere pharmacū uelis, ad hāc dosim ueratri nigri corticis tenuissime triti obolos tres, & scammonia scrupulum unum adijceto. Possum autem idem de hoc præsidio quod suprà de dysteri dixi referre, quod uidelicet solū aliquando sufficit etiā eam quæ per multū tempus indurata est coxendicum affectio nem exirpare licet itaq; eo sæpe uti, multitudine tamē eius imminuta, & sanē moderatam eius multitudinē obseruauimus numerū xxiiii. pilularū. Eis uero qui pilulas deuorare non possunt, colocynthidis cremorē exhibito hoc modo. Colocynthidē quam maximā perforato, & electo semine, relicto autē eo

quod instar tometi inest in totū, colocynthidē ex utro dulci uterū expleto, & per totā noctē finito, si quā defecto ex ea operculo cooperito. Mane uero excolato per panniculū uinū, & tepesactum bibedū præbeto. Si uero parua fuerit colocynthidis, duas pro una uino expleto & exhibito. Quod si efficacior reddere uelis hūc cremorē, ueratri nigri obolos tres adijceto, & scammonia selquibololum. Cæterū per interualla quadam prædicto dysteri ex cucumeris uidelicet syluestris radice apparato, etiam ad ipsos utaris.

De herba iberide, quæ & cardamine appellatur, eiusq; sinapismo. Cap. ii.

Quod si uestigium quoddā affectionis relinquatur, herba iberidis quæ & cardamine appellatur, radix assumenda est: etenim odorem & saporem ac figurā cardami, hoc est, nasciturū habet. Multa autē ubiq; nascitur, maxime tamen circa uetera monumenta murorum & circa ufas in incultis locis, folia autem habet nasciturū uere quidē uiscerū, & nasciturio multo maiora: longitudo uero caulis cubiti parui est aut paulo amplior: & siatē florē laetū promit, & tūc sanē efficacissima celsatur: semē fert quā minimū, atq; id ipsum per totū caulē enascitur. Radix uero acerrimū habet odorē, & maxime omnium nasciturio similem. Hæc æstate maxime recentē effodito (arida enim uires amittit) & diligenter mundito: munditur autē difficulter, & ætūgia ueteri modica excipito, ac itūcturæ coxæ & uniuerso cruri imposito, adalligato, ac incūbere finito, mulieribus quidem non infra duas horas, uiris autē per quatuor horarū spatiū, si possibilesit id perferre, excitat tumores cū ardore & rubore, ueluti sinapisinus facere solet: post uero in balneū inducto, nullo unguento aut smegetate eis illito, ubi uero modicū exudauerit, in solū ob seruariē mordacius desiderare iubeto, idq; fortiter perferre cogito. morbum enim cū ardore in principio inferre cōsuevit: deinde educto. Ferme enim semper, quam uis ab alijs fuerit importatū, sua sponte pedibus ingreditēs, exhibēt. Verū à balneo ad oleū multū paucum admodum uinum ammisceto, & conuallata illinito, ac humore cum aspero panno deterfo, crus ipsum cū leuissimis lanis cooperito. Et sanē cōsuevit hoc ipsum præsidij nullo alio inde auxilio opus habere, quod si tamē aliquando uestigij affectionis relinquitur, uicenis horis siue diebus interpositis, rursus eodē præsidio utaris. Atq; hic quidē sinapismi est modus. Ceterū pharmacum ipsum plures quā sperare possis in se cōplectatur cōmoditates, & cū minori acrimonia eius usus perficitur. Hoc autē utendū modo etiā ad inueteratos capitis dolores, omnesq; alios diuurnos dolores, quacūq; tādē corporis parte cōstitierint ad affectiones itē ægre solubiles, & resolutiones persanandas uilicet. Ceraui ad ischiadicos: Archigenis. Porro interfectis diebus quibus ab exhibitione remediū quiescit, ceraui locis imponatur huiusmodi. Opoponacis drach. viii. in aceti cyathi ii. dissoluito, deinde cerę trientē, cū bese olei cyprini liquefacto, refrigeratoq; ac leuigato, & ad dissolutū opoponaca cōijceto, unito, ac unitor.

De uestione.

Cap. iiii. Veteres, inquit Archigenes, etiam uestione in ischiadicos usi sunt, ut per cauteris ferreas igni candefactas, tum per struthū & aristolochia radices coxæ iun-

tura in altum perusta, itemq; crure per intervalla quædã, circa dolentes maxime locos cautere admo-  
to. Quidam uero alij ad propinquæ cruri affecto ma-  
nus locum inter magnũ digitũ & indicem me-  
diũ, circa infernum magni digiti siue pollicis arti-  
culũ, capriniũ stercus feruẽs per forcipem impo-  
nunt, sic coraq; uariant ac permutant, donec sensus  
ustionis ad locũ affectum perferatur: tunc enim suffi-  
cientem ustionem esse dicunt. Dioscorides autẽ hanc  
rem ita tradit, Caprinum, inquit, stercus feruẽs, &  
& extenso magno manus digito, cauum locum circa  
inferni articuli eiusdem digiti finem notato: dein  
de locũ ipsum ex oleo prælinito, & lana conuoluta  
oleo imbuta ad cauum locũ substricta, sigillatim ca-  
prinum feruẽs factum imponito, quousq; sensus per  
brachium ad affectam coxã procedat. Anylus autẽ,  
nos, inquit, etiã huiusmodi uerẽdĩ modo uimur: ster-  
cus caprinum siccum feruẽs facimus, eoq; uetrem ma-  
gni digiti affectũ pedis perurimus paulo infra un-  
guẽ usq; ad os ipsum ustione penetrante. Hæc ipsa  
ustio extremas coxendicũ affectiones, & quẽ nul-  
li alij prælito cedunt, dissoluti. Ceterum post ustio-  
nes portũ solita cũ sale trita, aut olusius nigras cũ se-  
samo illoto cristas, aut nucum interiora trita, ad locum  
crustosum imponito. Eis uerò qui molles carnes ha-  
bent, hac cũ melle adhibito. Tertiò autẽ die ab ustio-  
ne, lentisculam coctam cũ melle donec crusteq; penitus  
excidant, cataplasmatũ modo imponito: atq; deinde  
suppuratorio ductu uitior, ulceribus ad plures  
dies adseruatis, ne citatius eis obducatur. Nouimus,  
inquit Archigenes, plurimos qui ex prædictis ustio-  
nibus operi senserunt: uerum nobis, inquit, ad coxa-  
rum affectionis demolitionẽ prædicta remedia suffe-  
cerunt, itemq; malagmata quæ paulo post dicentur:  
apposuius autẽ De ustione, ne uidelicet usus  
ignoretur.

*Cura affectionis exacerbata.*

*Cap. IIII.*

Archigenes. Tempore porrò exacerbationis relique  
partes fascijs circumligandæ sunt, & diligenti frica-  
tione contrahendæ: irrigationes item locos impin-  
guantes, & per uices mutatæ, ex oleo scyoniũ cali-  
do adhibeantur, & cum lana conuoluta contegan-  
tur. Cataplasmata autem ex semine lini ac fœnigreci  
affectis partibus imponantur. Maxime uero quæ ex  
loliacea farina apparantur, ac quædam calefactia  
assumunt, & althææ radicem. Mitigant etiam uehe-  
mentes dolores ex oleo fomenta, & ex misto frictio,  
itemq; sale in sacculis calfacto. Potiones ad ischia-  
dicos. Succus cyrenæicus exacerbationes diffundit,  
erui magnitudine potatus, aut deuoratus. Sũme fa-  
cit & castorei dra. i. cum opopanax obolis tribus.  
Alia potio ad ischiadicos. Farinẽ erui, anisi, fœnicu-  
li, singulorũ parem mensuram coniungito, tundito &  
cribrato, obolis nouẽ in dimidia uini hemina da-  
to. Multa crassa per urinam ducit. Vbi uerò purum  
prodire uideris lotiũ, ne amplius præbeo. Alia.

Centaurej minoris ramulos cõrundito & cribra-  
to, ac seuius cochleariũ ex aqua calida ad horas tres  
aut plures dato. Alia. Radicem rubiæ contundi-  
to, & cribrato, similiterq; præbeo, sanguinem per  
urinam educit, quotidie autẽ bibetẽm lauato. Auxi-  
liatur item irionis semen cum uino, & smyrnĩj semẽ  
eodẽ modo. Seminis nasturij dra. i. cũ uino: radicis  
capparis corticis dra. i. cum uino: radicis iridis trite

drach. i. cũ passio: ruta syluestris, & domestica, cum  
anisi decoctio: symphyton in perris nascens, cum ui-  
no multo decoctũ: radicis althææ decoctum, aut cen-  
tauræ minoris: ammoniaci thymiamatis dra. i. ex  
aqua multa: seminis hyperici dra. i. quod ipsum &  
stercora educit, itemq; pituita: Baccæ iuniperi ex ui-  
no: Bitumen per catapodio deuorati: caprobalsamũ  
ex aqua multa. Ceterũ & potiones dolorẽ lenientes,  
itemq; soporiferæ, ubi dolores restiterint, cõmode  
assumi possunt: maxime tamẽ omniũ antidotos quæ  
pæonia appellatur, in tertio decimo Sermone descri-  
pta. Ego autẽ, inquit Archigenes, etiã in exacerbatio-  
nibus prædicto clysteri usus sum, eo uidelicet qui ex  
terebinthina & nitro constat, & euidentem permiua-  
tionem feci. Poteris autem & cucumeris syluestris  
decoctũ in exacerbationibus uti. De reliqua diæta,  
Archigenis. Subiungentibus autẽ ex ordine & paucis  
reliqua curam. Præ omnibus igitur adhortor uẽ con-  
tentiones, & exquisitæ negotiorũ incommodatates  
eis exhibeantur, nõ solum a cibo accepto, sed etiã si-  
medi cibi tẽpore, diæta unctoria & impinguatẽ cõ-  
stituta, quo similiter carnis incremento sit. Consultũ,  
Nani si hanc ueluti neruorũ operculũ, acquisierint,  
tutum simul ad omnẽ externam causam inuentũ ha-  
bebimus, simulq; commodã ex ercitationem: omni  
unctoria diæta potiorẽ apponemus. Vngantur au-  
tem ab expertis & gymnasijs exerceantur. Minime  
enim molesti labores fient cũ perito præexercitatio-  
re: & manus sanẽ exercitijs tritæ cõmodiores sunt  
mollioribus ad curationem. At uero significandum est  
etiã quod ischiadici ab assiduis flexibus & deambu-  
lationibus, & moderato cursu quã cõmodissime  
opẽ ferre possint. Præcedat itaq; gestatio in equo,  
deinde naturalũ aquarum usus, primum quidem  
calidari, deinde etiã frigidari, si enim ad frigidã la-  
uationem adulescant, sola suffecerit ad incolumitatẽ  
acquirendam. Ceterũ diæta tempore quidẽ exacer-  
bationis forbilis sit & modica, per intervalla uerò  
solidior & reparandis uiribus magis accommoda-  
ta, habeatq; acriũ eduliorũ comestiones quasdã per  
aliquot dies adiunctas. Eorum autẽ syluam sæpe ita  
apposuius, uirpote quæ nihil uiscosum, aut crassũ  
succũ, aut ægre concoctile, aut quod difficulter dige-  
ritur, cõplectitur. Bonæ uerò concoctioni in primis  
consulane, nõ solum damni quod ex cruditatibus  
prouenit ratione habita, sed & incrementi carnis, qua  
præ omnibus ischiadici opus habent. Quin & qualita-  
tates eorum quæ ægre concoquũtur fugiendæ sunt,  
præsertim eorũ quæ urinã ducunt. Alium autẽ pro-  
be solutũ habere expedie: preinuntur enim & aggra-  
uatur articuli, ubi ipsa fit adstricta. Neque uero assid-  
ue profluat uenter. Nam id imbecilles reddit, &  
quod cum purgationis impetu à toto corpore atra  
cũ est, id ipsum uicinas partes replet. Contingit ita-  
men etiã aliquando à periculosa dysenteria oborta  
omnem coarum molliẽdem ac apitudinẽ ad affe-  
ctionem corrigi & emendari. Præstat etiã uomitus  
per intervalla siue à cibo accepto, siue à raphanis.  
Neque later nos quoddã uerato ad ischiadicos usos  
esse. Scimus item ueracrum efficaciter auxiliari: Ve-  
rum nõ suspicamus eius usu opus esse ad hanc affe-  
ctionẽ, uirpote quæ ab antiã tradita cura extirpabi-  
tur. Cataplasma ischiadici. Farinam lupino-  
rum amarorum in aceto multo aut posca deco-  
ctam

etiam imponito. Aliud. Calaminthen præsertim uiridem, aut si haberi nequeat, cum posca locis imponito, est enim præsidium præclarum. Aliud, faciat ad uehementes dolores. Papaueris calices in aqua mulla decoquito, ipsi scq; proiectis farinam or deacea aq; mullæ incoquito ac imponito. Aliud.

Calices papaueris uirides terito, & adpersa polente farina, in pastillos redigito, eosq; in umbra reficatio. Vfu uero expedite in sufficienti aceto distillatos ac calefactos imponito. Aliud Asclepiadæ, ischiadicis, podagricis, & ariculorum morbis euestigio auxiliatur. Fœnum græcū in sicile uas confectū & posca sufficere affusa per integrā noctem macerato: mane uero ad ignem appositum donec solua tur coquito: deinde in mortario tritum, & sufficere melle affuso calefactum, & linteolo exceptū ad affectos locos apponito, & fasciola adalligatum finito, idq; per dies duos aut tres facito. Aliud. Radicis symphyti sexuncæ rasæ & in tenues partes cōcisam in pilam testaceam conijcito & enixe terito, atq; ubi contrita fuerit, manne quadrantem, & ouorum recentium crudorum candida tria unā cum luteis adijcito, rursumq; enixe terito, & contritis lib. 1. adipis suilli ueteris probe subacti addito, unito, ac linteolo excepta imponito. Euestigio dolores mitigat, & præsertim cum fluxione articulorum obortos. Aliud Asclepiadæ. Fœni græci mola triti, corticis radicis mandragoræ, manne, cuiusq; quadrantem, oua cruda recentia x. radicis maluæ lib. 1. radicis symphyti lib. 1. carnis cochleæ terrestris sexuncem. Vt prædictum est apparato diligenter, & sublatum reponito. Vfus uero tempore pharmaci partem unam, adipis suilli ueteris partes duas accipito.

*Epithemata & malagma ad ischiadicis.* Cap. v. Malagma, inquit Archigenes, quod ualde multo experimento nobis constat, est subserpium, uerum curbitam prius ad dolentes locos affigere oportet: ipsum autem malagma aliquandiu inhæreere consue uit, quare expectabis eius uilitatem. Colophonizæ lib. 1. baccharum lauri bessæ, seminis raphani trientem, corticis capparis libram unam, picis aridæ librā unam, pyretri libram 1. ceræ libras duas & dimidiā, fœnigræd bessæ, iridis libram 1. sinapis bessæ, nitri libras duas. Nitrum cum aceti libris duabus terito: deinde reliqua arida inspergito, simulq; terito, affusisq; liquefactis, emollito, ac utitor. Hoc quidē igitur malagma eiusmodi est, quod malum penitus extirpat, cutē rubefacit, & materias ex alio ad superficiem educit, quo sanē in principio nō oportet uti. Verū quod sequitur leuissimum est & multæ commoditatis, quoq; citra formidinem conuenit uti. Cere trientem, styracis sesquunciam, fairyri sesquunciam, aloës primariæ sesquunciam, ammoniaci thymiamatis sextantem, croci unciam unam, pyretri unciam 1. opopanax unciam unā, galbani unciam 1. thuris unciam unam, olei ueteris libras quatuor, aliquando autem sextantem solum in æstate: Apparato, & utitor. Præter opinionem etiam facit ad ischiadicis emplastrū pardalis appellatū, quod ad hydroscipos inuenies descriptū. Leuē emplastrum, malū penitus extirpans. Olei ueteris libras duas, plumbaginis, salis communis, terebinthinæ, singulorum libram unam, quamvis æris quadrantem, æruginis, herbæ lanariæ radicis, chamaeleonis nigri radicis,

aristolochiæ, sinapis, singulorū sextantē, aliquando etiā cæchyros unciam unam, aut pro eo pyretri tantundem. Auxiliatur etiā capiti ad hemipariciam impostum. Hicq; ad ischiadicis, hoc, inquit, usus sum ad Frōinū statim ab exacerbationibus imposto. Cere drachmas centū, uisci drachmas sedecim, terebinthinæ drachmas uiginti quinque, galbani, myrrhæ, iridis, cuiusq; drachmas sex, cedriæ heminæ dimidiū, olei cyprini heminæ dimidiū. Ceram, cedriam, cū cyprino oleo liquefacto: deinde resinā & galbanum adijcito, & ablatis ab igne statim uiscum addito: & ubi dissolutum fuerit, irim inspergito & unito, & ad myrrhā in mortario cū aceto trita affundito. Quidam etiam nitri drachmas duas adiecerunt. Asclepiades autē ita inquit, Malagma quod ischiadicis statim post exacerbationum remissionem imponitur, facit ad ossa cōtrita ac omnem neruorum per consensum affectionem, omnemq; duritiem dissoluicfacit item ad alias inflammationes, comprimit & cōmittit malignas cicatrices. Prodest luxatis & collisitis, & ad omnes malignas mamillarum dispositiones. Est enim ualde generosum. Ceræ, terebinthinæ, uisci, galbani, myrrhæ, iridis siccæ, singulorum drachmas quadraginta octo, olei cyprini quantum sufficit. Galbanum cum cera in mortario contritum & emollitū cum cyprino liquefacimus, deinde ablatis ab igne uiscū inijcimus, & ubi dissolutū fuerit, irim inspergimus, & ad myrrham cum aceto in mortario tritam affundimus. Commodant etiā ipsi emplastra ex sale: quale & hoc est. Salis drachmas centum, picis sexuncem, olei libras quatuor, cerusæ libras duas. Sale per se quā tenuissimè terito, similiter & cerusam, deinde oleum ad ipsa in mortarium affundito, & postquam sufficienter triueris, excepta usquequo manus non iniquent coarquit ad lenium ualde ignem, deinde picem liquefactam & percolatam inijcito, ac rursus ad cōpagem quæ manibus nō adhæreat reducto, & utitor. Malagma ex silphio, ischiadicis ualde præclarum. Ammiij drachmas duodecim, silphij, seminis rutæ syluestris, baccharum lauri repurgatarum, singulorū unc. 1. medullæ colocynthidis drach. 11. nitri, abrotoni, cardamomi, cuiusq; drachmas quatuor, ceræ, adipis uitulini, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; sesquunciam. Arida liquefactis ab igne ablatis insperguntur, simulq; in mortarium ad ammoniacum cū aceto tritū infunduntur. Quidam uero ammoniacum cum cera liquefaciunt, & ad cōpagem manus nō iniquantem redigunt. Aliud malagma, quo Theodorus proprium patrem curauit, quū ob dolore suspicere non posset. Cere, picis liquidæ, aluminis liquidæ, æquales partes accipiet: liquefactis illa liquefacto, & ad alumē cum aceto tritū affundito, emollito, ac utitor. Asclepiadæ, ad ischiadicis: facit & ad colicos: securusq; in exacerbationibus exhibetur: scabiē etiam quam pforam Græci appellant, citra exulcerationē sanat. Ceræ, picis liquidæ, picis aridæ, cuiusq; lib. 1. sulphuris uiui, aluminis cōsisilis, nitri rubri, cuiusq; sexuncē. Quæ eliquari possunt, eliquato, aridaq; quā tenuissimè trita paulatim adspersito, simulq; in mortario posca madefacto cōmiscero, emollito, ac utitor. Quidā picē aridā & resinam pinus, ac cerā, per singulos dextantes sumunt, oleiq; sextantem addunt, ac reliqua, ueluti prædictū est. Ischiadicum mirabile,



mirabile, Thuris, euphorbij, ammoniac thymiamatis, pyretri, picis, cere, singulorum quadrantem, resinae pinus aridae, sexuncem, olei cyprini sexfic, fellis taurini quadrantem. Thus, euphorbium, ammoniacum, unumquodque per se quam tenuissimas in partes una cum felle teritur: liquescibilia uero liquefacto, & pyretro inspergito, eaque ad trita funditor, unitoque, ac uitor confidenter. Experimento constat. Melius autem apparatur, si ammoniacum quam tenuissime tritum liquefactis inspergatur, atque eo eliquato thus tritum adijciatur: euphorbium uero cum felle teratur. Vnguenta & acopa, quae neruorum lasitudinem in ischiadicis rescindunt. Ad coxendicum doloris praenotae radicem in oleo ad triduum cotulam accipito, & quarta die paululum cotam illinto. Ceterum prepurgandos eos scito, ex succo thymymalli guttis quinque tantum cum caricis acceptis, aut ex corticis thymymalli cremore. Corticem autem ipsum contusum & cribratum quatuor scapuloz ponere in uino per integram noctem macerato: mane uero excolatum uinum praebeto. Aliud, Nycteri de herbam, quam unguentum Helenes appellant, oleo decoquito, & per diem unam in oleo manere sinisto, percolatoque & illinito. Aliud, multo experime to coferat. Herinaeum terrestrem uinum in oleum coniectum donec flaccescat coquito: deinde eo extracto, farinae adarces sextante oleo insijcto, & olei cyprini undam. Vitor autem illito ex eo loco. Ceterum oleum ipsum in quo herinaeum coquitur librum duarum pondus esto. Aliud ischiadicum, quod isotheon appellatur. Facit & ad resolutiones, & ad omnem neruorum per consensum affectionem. Casterum, opopanax, euphorbij, cypri liquidum, ammoniac thymiamatis, galbani, terebinthinae, singulorum sextantem, medullae ceruinae tridentem, styracis unc. 1. olei styracini tridentem, olei irini sexuncem, piperis unciam unam, cerae libram unam, olei sicyonii lib. 1. olei ueteris libram unam. Ammoniacum, galbanum, opopanax cum uino terito: liquescibilia uero eliquato, & ab igne ablata reliquis affundito, ac probe unito: styracem uero in pila tridito, ac paulatim ex phar maco ei addito: ubi uero dissolutus fuerit, cum reliquis unito, ac uitor. Acopo, ad ischiadicis efficacissimum est, quod inter communia acopa post articula ria remedia refertur, & Orchesta inscribitur: eo itaque confidenter uitor. Viere, & similibus acopis ac unguentis quae istis describuntur. Inspergime ad ischiadicis in balneo. Inspergimen ischiadicum efficac. Farinam lupinorum in balneo inspergito, & in exudatoria tabella prostratum sudare facito. Aliud, facit & ad inueteratas affectiones. Costi, piperis albi, pyretri, cuiusque quadrantem, niri unc. 1. sedis uini usque lib. 1. confusa in balneo inspergito. Aliud. Costi quadrantem, pyretri quadrantem, niri unciam unam, piperis albi, adarces, euphorbij, cuiusque unciam unam, sedis uini usque libram unam, samfuci sexuncem, confusio, cribrato, ac in balneo uitor. Hiera, ad ischiadicis inspergimen lenitum doloris. Picis aridae partes octo, sulphuris parte una, terito ac misceto, & praeloto aegro dum corpus adhuc caler inspergito, & cum chara contegito, atque donec sua sponte decidat, sinisto: nihil autem uetat aegrum lauare chara adhuc inherere. Alia insper sio. Adarces, staphidis agrestis, canchryos, sinapis,

cardamomi, piperis, euphorbij, sulphuris uiui, cuiusque unciam unam, confusio, & cribrato: aegro uero induto, & in secunda balnei domo reclinato, pallo prius ad tabellam subfrato, ad dolentem locum inspergito, & contente adfricato: deinde in calidam desiderare facito, & prolium educto ac extergito, rursumque inspergimen insijcto & adfricato: postea uero dum adhuc calidum corpus habet, eiusmodi mala gma imposito. Cineris caulium brasicae ustorum quadrantem & unciae dimidium, cineris lignorum ficulnorum agrestium ustorum tantundem, picis aridae libram unam, cineris lignorum uitis ustorum quadrantem & unciae dimidium, sulphuris uiui quadrantem, axungiae libram unam. Liberabitur enim aeger, atque id breui ab omni dolore, ut incantatio ni similis facultas uideri possit.

De podagra, & arthritide, siue articuloz morbo.

Cap. VI.

Podagra & arthritica affectio eiusdem speciei inter se existunt. Differt autem podagra ab arthritide non toto genere, sed affectis locis. In omnibus enim debilitas est articuloz diuturna cum fluxione. Quae quidem si in pedibus perficiatur, Podagra appellatur, si uero in aliquo coxarum uertebro, Ischias, hoc est coxendicum morbus nominatur. Si uero in multis corporis articulis innititur, Arthritis, siue morbus articularis uocatur. Contingit autem aliquando ut repente irruat malum aequaliter per omnes articulos dispersum: quod ipsum euenire consuevit, his qui consueuerint coaceruatum relinquere, & licentiore diata utuntur: ut plurimum uero clanculum & paulatim fluxus irruere solet, alteri enim cuiusdam magni digiti pedis articulum dolor inuasit, alijs uero calcanei extremum, rursusque alijs cauum pedis, aut ex calcamenti, aut ex consimilis rei affricu. Ceterum initio à pedibus sumpto, paulatim ad genua malum procedit, ad coxendicum item ac coxarum iuncturas, deinde ad manus, singulis articulis particula tim affectis, quando sane proprie, ueluti praedictum est, arthritidis & articularis affectio appellatur. Qui uero extreme ab hac affectione apprehenduntur, his & spinæ, uertebrae & costarum iuncturae, & genae dolent, aliquibus autem & iris siue corona pupillae oculi ambiens, necesse est aliqua osium conexio, quae ab hac affectione sit immunis.

Causae uniuersales.

Cap. VII.

Generant autem affectionem cruditates coaceruatae, & ebrietates, atque his adhuc amplius immoderatus rei uenerae usus: iam uero & deambulationes concitatores quam pro more, & stationes diutius productae, & familiares excretiones suppressae, & consuetorum exercitiorum intermissiones. Ut plurimum uero aptitudines à parentibus in filios ac posteros transferuntur. In uniuersum uero amplius omnium crudorum humorum multitudo affectionis causa existit, quod humorum multitudo affectionem inducit. Quando quidem igitur humorum multitudo in corpus digeritur, hiisque ipsi ad pedes deferuntur, & in ipsis partes omnes distendunt, inflammationesque & dolores inferunt, manifestissimum sane id existit. Nam & tumore attolluntur affectae partes, & uenae sanguinis in ipsis apparent repletae, & euacuatis ipsis in naturalibus habi tum aeger reducit. Verum multitudo influens non in omni

in omnibus æqualis existit. Etenim alij ex caliditate ægrotant, alij ex frigiditate, atq; exinde etiam refrigerando, aut calefaciendo, aut rescicando opem ferunt. Quæ ob causam membra fluere infestentur.

Posteaquam igitur humorum multitudo in corpore cõgesta, hominẽ molestia afficit, unumquodq; quidem membrum quod primum affectionem percepit, affligentem humorem a se repellit: eum ipsum uero suscipit aliquid ex uicinis membris ac subiectis. Itaq; quã fortiora mēbra eum depellant, & imbecilliora suscipiant, id adeo citra intermissionem cõtingit, donec id quod propellitur ad omnium debilissimum membrum peruenierit, & in ipso permāserit. Vnã quidem igitur fluidarum affectionum generatio hæc est, membris uidelicet fortioribus superfluum demittentibus, suscipientibus autem imbecillioribus. Cæterum articuli ipsi ex assiduo motu de biliosos redduntur.

*Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus.*

Cap. viii.

Magnitudo morborum ex fluxionibus oborturũ ad humorum influentium multitudinem consequitur. Si enim plures humores fuerint, maior etiã affectio contingit: si pauciores, minor. Cæterum multorum recrementorum influxus ob multas causas accidit. Etenim & copiam humorum multam esse oportet, & uias latas per quas feruntur, & partem quæ a fluxu infestatur raram, & facultatem in ipsa debilem: & membrorũ eum delegantiũ uires fortes, quo magna affectio fiat. Verum si paruus futurus est morbus, prædictis contraria omnia cõcurrere oportet.

*Quare multo tempore aut pauco morbus duret.*

Cap. ix.

Porrò ut multo tempore aut pauco morbus duret, etiã prædictis sunt causæ, tenacitasq; insuper & crassitudo humorũ. Etenim sanguis multus & crassus, densa pellicula conclusus, & a uiribus debilibus seigniter correctus, tempus auget & producit. Qui uero cõtrario modo habet, minuit & breuius facit. Ceterũ & in alijs corporis affectionibus, siue in superficialibus, uelut erysipelas: siue sub cuticula, ut herpes: siue in carnosiss partibus, uelut inflammationes, recrementa ut plurimum feruntur. In podagricis autem & arthriticis appellatis, usq; ad iuncturas per alitũ repleto ex fluxione cõtingit, unã cum hoc quod nervi permadescunt & distenduntur, itemq; ligamenta & pelliculæ, omniaq; circum circa sita: atq; ob id sæpe usq; ad quadagesimum diem morbus extenditur. Etenim quum etiã cessauerit fluxus, neq; amplius ex supernis feratur, repleta adhuc multo humore existētes iuncturæ, eũ ad circumstita mēbra delegant. At uero si tenuior sit fluxus, celerrime ægri sanantur, nisi male omnino curentur. Quod si uero quis ex medicis ueram methodũ ignorans per res solutiuas semper omnes inflammationes curet, non in quadraginta tantũ dies, sed & in quadringentos, & in omnem reliquam ægri uitam inflammationes cõtedet. A mala enim curatione podagricis pleraq; mala accidunt, maxime uero calli & artuum durities, & articularũ curuatae ac cõtrações, propter medicorũ ignorantiam sunt, qui neq; per uenæ sectionem, aut purgationem euacuant, sed redundantem in uniuerso corpore humorẽ, quĩ ad iuncturas desertur, & proinde articularũ morbos producit, per

ea quæ moderate adstringat repellunt. Quidã enim ex ipsis inflammationes immodice resoluunt, tũ per aquæ & olei mixtionem, tum per cataplasmata ex cruda ordeacea farina apparata, attrahuntq; per cataplasmatum caliditatẽ humorũ copiam ex subiectis locis. Quin & ob hanc ipsam inducant laxitatem, affectas partes debiliores, & ad recrementorum susceptionem aptiores reddunt.

*Quæ sit incuruatorum articularum causa.* Cap. x.  
At uero alij medici immodice refrigerant, alij autẽ uehementer discutunt. Ex quo sanẽ neurolas partes in spissari contingit, incuruariq; & distorqueri, ob redundantium uidelicet humorũ susceptionem. Contingit item callosas & calculosas coações in ipsis emergere, & neruos spontaneo motu se mouentes congelari, ligamenta item & neruos qui tendines appellantur, qui sanẽ apertissimi ad hoc perferendum censentur, propterea quod substantia ipsorum densa & solida existat.

*Quæ causa generationis toforũ in artubus.* Cap. xi.  
Generatio quidem igitur toforum siue callorum in artubus induratorum, materiam quidem habet crassos humores, causam autem efficientem, qualitatem calidam & siccam. Quemadmodum uidere est & in tofis: qui in æreis uasis ex limosæ aquæ incoctione generantur. At uero pharmaca quæ ualde refrigerant, si assidue adhibeantur, nõ solum crassos humores congelant, sed & tenues. Quemadmodum uehementissimum frigus cõgelat aquam. Quæ uero aceruatim & immodice discutunt, id quidem quod tenue in ipso fluxu est, euanescere faciunt: quod uero reliquum est, inspissant & conglutinantq; id eo amplius, si ad hoc quod discutit, etiam immoderate calefactoriam habeant facultatem.

*Quæ causa sit cur inflammationes in podagricis non facile suppurentur.* Cap. xii.  
Causa cur podagricæ inflammationes nõ facile suppurentur, primũ quidem est affectarũ partũ substantia, tũ natura, tũ pro more egre permutabiles existens. Ad hoc enim quod natura dure sunt neurolas partes, etiã tolerandi cura angitur ea quæ molestiã inferre possunt, præsertim tamen pedum & manũ extrema, quin & carne nudata: magis hę sunt partes minusq; calide & humectę, & ob id etiã reliquis partibus frigidiores: imò & influentes in podagricis inflammationibus humores corruptioni minus sunt obnoxij, & pharmaca similiter adhibita inepta sunt ad putrefactionẽ ac suppurationẽ. Etenim alia ex eis refrigerat & repellunt, alia uero discutunt, alia autem rescicant. Contingit tamen aliquando in quibusdam inflammationẽ aut suppurari, aut erodi. Quum enim crassus humor uehemẽter fuerit cõdensatus, & dein de non ita uehemẽter, sed moderate calefactus, necesse est ipsum suppurari. Acri uero & erosiuo humore influente, erosio contingit, quemadmodum & marcor in quibusdam succedit, irruente uidelicet in membrum humore qui putrefacere potest: quamquam raro hæc in podagricis contingant.

*Quomodo ex inflammationibus & consequentibus accepcionibus, siue symptomatibus, adsignetur generis humor cognoscatur.* Cap. xiii.  
Quomodo quidem uniuersũ corporis intemperiem cognoscere & curare oporteat, iam antẽ in quarto Sermone est præscriptum, huius uidelicet tractationis.

tionis. Quomodo uero quis inflammationes in partibus inflammatis consistentes cognoscere possit, necesse est & hic paucis referre. Apparet autem id ex eis quæ accidunt & consequuntur: quæ si quidem frigida fuerint, refrigerant: calida uero calefaciunt: mixta autem mixtas etiam signorum species inducunt. Quo uero manifestior fiat hic sermo, quæ iam dixi, repetam, singulatimque retrastabo.

*Sanguinei humoris influentis signa.* Cap. XIII.  
Humor sanguineus si multus fuerit, & circa summam caliditatem moderatus, repletionem efficit, & tumorem ingentem: non uenarum modo, sed totius membri affecti circa cutem: eumque calidum quidem moderate, uehementer autem rubentem, pulsus autem adest in alio inflammationis mediocris. Qui hoc modo sunt affecti, neque refrigerantia neque calfactoria ualde prædicia adhiberi sument, & assidue ac continue exacerbantur, quandoquidem assidue & æqualiter sanguinis allatio cõtingit, quamquæ & per circuitum quidam irratione uexentur, quum non continue sanguis defertur, & exacerbationum accessiones omnino quotidie sunt, uerum non ita durant ueluti hæ quæ ex pituita oboriuntur. Urinæ uero eorum qui sanguinem redundant, fuluæ sunt, & mediocri crassitudine præditæ: aliquando etiam subsidenti albâ, aut nubẽ, aut tale quiddam in medio pãdens quasi suspensum habentes. Quod si magis ad pituitam declinet sanguis, albiores & crassiores: aliquando uero & conturbatæ reperiuntur urinæ, & multum est quod in eis subsidet. Venæ autem in his ampliore sanguine fuscescent replentur, & in tumorem attolluntur. Aetas uero ab adolescentia usque ad ætatem uigoris apta fiet ad multitudinem sanguinis producendam. Edulia ite boni succi & quæ maxime alunt, & exercitia moderata. Ex temporibus uero, uer, & regio temperata.

*Biliosi fluxus signa.* Cap. xv.  
Quod si uero biliosus sit fluxus, color cutis inflammatus loci, aliquando quidem flauior quam secundum naturam apparebit: aliquando uero rubore cum flauo permixto, quando uidelicet flaua bilis sanguini est permixta. Caliditas autem uehementissima & feruentissima adest, quæ amplius refrigerantibus pharmacis gaudet. Qui enim ita habent, uehementer à refrigerantibus iuuantur medicamentis siue actu siue potentia talia existant. Exacerbationes uero his per tertium queneque diem mouentur, & præcípites quidem irruunt, citius uero uigore remittunt: per uentrem enim & per urinam recrementa superflua his euacuantur: per cutem etiam transpirant, uapore quæ tenuium partium existant. Lora eorum subfulua sunt, & subflaua: quandoque etiam acra, ut in mictu ne urinarium arrodant meatum. Curæ autem ingētes, & iræ, & uigiliæ, & illuuiæ multæ, & sanguiatio nes, & diæta omnis bilem gignens & attenuatoria, ex acribus uidelicet & salis eduljis, huius humoris influxum præcedunt. Aetas uero & temperies corporis calida & sicca ad eum apta est. Hora autem siue anni tempus æstiuum: consimilis item regio.

*Pituitosa fluxionis signa.* Cap. xvi.  
At uero si pituitosa sit fluxio, ad digitorum appressio nem cauis sit tumor subluxus & existens & moderatus, & color dolentis membri albus. Dolores uero aliquando quidē fortes, aliquando uero mediocres, & exacerbationes quotidie paulatim irruunt & au-

gentur, & per plures horas durat, & breuem intercapedinem habent: imò neque unquam integre remittunt. Aetas autem hoc modo amplius afficitur senilis, & temperamentum humidum & frigidum, & consimilis ambienis nos aeris status, & tempus hybernum. Aliquando autem & frigoris sensum in alto locorum affectorum ægri percipiunt. Vita uero ociosa & socordia ad pituitosi humoris generationem plurimum conferunt. Edulia item refrigerantis & humectantis ac inspissantis facultatis, & balnea à cibo, unde & urinæ crassissimæ ab eis prodeunt, & sæpe conturbatæ reperiuntur: Atque hæc quidem signa sunt pituitæ naturæ frigidæ prædominantis. Nam & hæc ipsa propriè pituita appellatur.

*Salsæ pituitæ signa.* Cæterum si salsæ pituitæ fuerit influxus: color membri affecti & tumor eodem modo habent, ueluti de pituita est prædictum. Pruritus autem maximus & mordacitas infestat locos. Urinæ uero tum his tum prædictis, aliquando quidem tenues & aquosæ, aliquando uero crassum in eis est quod subsidet, suntque coniurbatæ.

*Bilis atræ influentis signa.* Cap. xvii.  
Quod si ex atrâ bile sit fluxus, qui sane potentia frigida est & siccus, quod raro tamē cõtingit, frigoris sensus quandoque affectis adest, & corpora in profundum ueluti aterantur aut scalpantur afficiuntur. Colores uero tumores nigriores sunt, & circuitus exacerbationum per quartum quemque diem redeunt. Sunt autem exacerbationes tum magnitudine, tum impetu mediocres. Aetas uero quæ magis hunc fluxum generat, est uigore inclinatio, & uergente temperies autem frigida & sicca, & natura quidem superfluitates pituitosas generat, non autem atræ bilis. Quæ uero ex degeneratæ & mutata caliditate fit, flaua bile superaffata & nigram generante oboritur. Præcedit porro hunc fluxum diæta ex eduljis atrâ bilem gignētibz, & lassitudines immodicæ. Regio autem et apta est frigida & sicca. Tempus autumnii, & consimilis aeris status. Urinæ uero ut plurimum in principio tenues eis sunt & aquosæ propter obturationes: postea uero quam secundum naturam atriores, & modicè crassæ, & quod subsidet in eis aliquando fuscum est, aliquando uero mixtum, subruentū uidelicet & fuscum reperitur.

*Serosarum fluxionum signa.* Cap. xviii.  
Sed uero serosa recrementa influant, dolores non ita magnos inferunt, quemadmodum etiam neque fluxu infestatas partes in tumorem ualde exciant. Secundum speciem uero consimilia perficiunt, qualia humores solent, qui cum eis eiusdem generis existunt. Pituitoso enim sanguine demanente, serosa in ipsa pituita recrementa, consimiles quidem secundū speciem dolores inferunt, secundum magnitudinem uero multo minores. Vbi uero alij humores defluerint, consimiles etiam illis serosæ ipsorum superfluitates inferunt dolores.

*De his qui ex humorum complexu fluore infestantur.* Cap. xix.  
Nosse porro operæ precium est, quod aliquando fluxus fluxui cõmiscetur, aut calidus frigidus, aut uisissim frigidus calidus, & secundū utriusque horū qualitatem exacerbationes fiunt, & cõtinget quandoque ægrum bis in die exacerbationum accessio nem sentire.

*Dieta & cura podagricos præferuans. Cap. xx.*  
 Qualis quidem igitur diæta unicuique prædictarum temperum cõueniens sit, iam ante prædictum est in quarto huius tractationis Sermonē: superfluum uero est eadem his scribere. Cæterū ad ea quæ istic relata sunt, uomitus in uniuerso ferè omnibus qui podagricam affectionem defugere uolunt, commo- di sunt, præterquam eis qui thoracem & caput, quæ facile læduntur, habent. Quibuscunque igitur ex exercitijs, aut alijs quibuscunque modibus, recremen- ta in uentrem cõfluunt, his uomitus ante dñum pro- dest. Qui uero sanguinis copiam aggregatur aut humores pituitosos, post acceptum dñum uomant per aliquot dies. Venus uero omnes podagricos ex- treme lædit, & præsertim si assidue aut intempesti- ue ea utantur. Etenim uoluptas per se neruorum corporum robur & firmitatem dissoluit, multo ue- ro magis si cum uehementi motu perficiatur, & ob id mēbra affecta longe imbecilliora fiunt, & prom- pte ac expedite confluentia recrementa suscipiunt. Adhibetur tamen eius usus aliquando, propter con- suetudinē uictosam semine plurimum iritātē: quum uidelicet multi & noxijs fuerit humoris. Generatur autem tale in naturis proprie multi feminis appella- ris, & oportet sanè, quo molestia eius uitetur, pro- hibere ne eius copia in feminarijs uasis generetur. Quomodo uero feminis generationem prohibere oporteat, iam prædictum est in eo qui hunc præces- sit Sermonē.

*De olei & salis affricu in podagricis. Cap. xxi.*  
 Operæpretium porrò est nosse, quod omnes qui se, ne in podagricam affectionem incidant, adseruare uo- lunt, & præsertim eos qui humecta & frigida na- tura sunt, magnifice iuuant sales cum oleo quàm te- nuissime ertiti & affricu, nō quidem tempore infla- mationis & doloribus instātibz, sed quum hæc re- mittunt, nisi uehemētē siccā temperie ægri sint præ- dicti. Omnibus enim qui hoc modo fricatur, insitus calor augetur, & quod præter naturā est discutitur, recrementa q̃ consumuntur, & affecta membra fiunt robustiora, ac aduersus affectionem firmantur, mi- nimèq̃ ei obnoxia redduntur, maxime si diligenter singulis diebus mane & uespere, ubi dolores, quæ- admodum dictū est, remiserint, per omnem uitā hoc præsidio utantur. De quo sanè aulim confiderenter pronuntiare, inquit Philagrius, quod etiam solum sufficit his, qui uel maxime circa diætā delinquit, aut immodice refrigerantur, aut ægrotant ex labore, aut re uenere nimis sunt usi, aut quēcuncq̃ alii for- tem excessum admissērūt: quare omnino postquam inflamationes quieuerint & dolores, eo utendum est.

*Vniuersalis methodus curationis podagri-  
 corum.*

*Cap. xxii.*  
 Itaq̃ prius dictis rursus in memoriā reuocatis, pronū- ciamus & membrorū debilitatem, & humorū co- piam, primas causas omnium fluidarum affectionum esse, præcipue tamen podagræ & articularis morbi. Quare duplex etiā sanationis scopus nobis præfige- tur. Euacuatio reducēdis humoris & corroboratio partium debilitatarū. Euacuatio itaq̃ fiet aut per uenę sectionē, aut purgationē. Post uniuersalem autē eu- acuationē, calidi quidem fluxus refrigerari amāt, frigidi uero calefactionē: humidī resicari, siccī hu- mectari gaudent. Et tenaces quidē ac uiscosos discin-

dentibus & extergentibus curare conuenit, crassos uero tū eisdem, tum quæ amplius attenuatoriā uim habēt, acres uero per ea quæ mordacitatē obtundere possunt. Amplius autē ea quæ assidue influunt, per repellentia prohibēda sunt, itemq̃ per ea quæ resic- cant. Quæ uero per circuitum iritāt, quum quidē in- fluunt impediēda, quū uero nō deferuntur, tum sa- nē ea quæ iam illata sunt, euacuationē requirunt, ad quā iudē debilitatarū partium corroboratio accedat.

*Cura eorū qui ex sanguinis copia ægrotāt. Cap. xxiii.*  
 Quū igitur sanguinei humoris fuerit influxus, & do- lor mediocris, qui neq̃ calore suo neq̃ frigore mani- feste infestes, locus inflammatus pharmaco quidem fortiter adstringente, modice autem resicātē illina- tur, eiusmodi autem est id quod ex acaciā & utroq̃ uerauro apparatur. Afflineat autē æger ab omni ci- bo & motu, & uini etiā potu. Et si fluxionis impet- us non ualde magnus fuerit, & pharmaco adhi- bitum commoditate sua ostenderit, rursus cū paulo tenuis substantiā aut posca large dilutū quo frigimē- tosi reddatur, illinatur. Cæterū neq̃ aqua neq̃ oleū pedibus adhibetur, sed & si illitū abluere oporteat, quo uidelicet aliud illinatur, posca mediocriter tepe facta abluatur, aut cum plātæ alicuius aut ferē deco- cto, usq̃ quo id quod influxit sedetur. Cataplasma ob id etiam imponendum ex malis maxime coto- neis, aut mespilis, forbis, cornis, hippuri, sangui- naria, aut folijs quercus tenerioribus, singulis pane permixtis & uino ueteri maceratis. Idē uero ipsum & per alia quædam eiusdem materiæ existentia con- fieri potest. De quibus rursus postea sermonē repe- temus. Porrò si sanguinis motus in uniuerso corpo- re uehemētē inualuerit, utendū nihilominus prædi- ctis pharmacis, ne uidelicet particula repleatur, & dolores fortes ac diuturnos inducat. Euacuatur autē id quod ex sanguine reducitur, quātum sanè id uires & affectio permittunt, & maxime si qui continetur sanguis bene fit temperatus, & homo ipse ad sangui- neas euacuationes sit aduersatus. Cognosces uero sanguinis impetū, tum ex tumore præter naturā, tū ex doloris magnitudine & uelocitate. proportiōa- biliter enim tū ad copiam sanguinis, tum ad allationis eius modum, impetus ipse cōtingit. De sectione uenæ. Eos igitur qui multo sanguine abundāt necessa- rio secta uena fortiter euacuabis, non solū semel, sed iterū atq̃ iterū & pluries detractiōne paulatim repe- titā. Si enim uenæ sectione ommissa, repulsiōis phar- macis fueris cõsilijs, magni mali autor eris. Ex igno- bilibus enim mēbris ad principalia & uitæ necessa- ria sanguis repulsijs, deinde in aliquod horū irruēs, uelut in hepar, aut septū transuersum, aut thoracem, aut pulmonem, aut in ipsum denique cor, pro mor- bo mortem inducit. Quapropter maxime necessa- ria est sanguinis ac reliquorum humorum in san- guineis influxionibus euacuatio, præsertim in his qui sanguine redundant, itemq̃ reliquis humorum recrementis, ac lautiore diætā utuntur. In his enim antequam dolores oboriantur, uenam secare opor- teret, bis in anno sanguinem large derrahendo, & pur- gare quoque eosdē, si licet modo per singulos mē- ses. Cæterum in omnibus dieb̃ horis uenam secare cōuenit his qui uehemētibus doloribus sunt appræ- hensī, adeo ut etiam si quis pransus sit, nihil uerius tamē uenā secare possit, atq̃ id maxime si ex uentris

locis cibis ad intestina fuerit dilapsus. Vbi uero in uentre adhuc cibus deineatur, euacuatione prius per uentriculum facta, ita paulatim sanguinem detrahet. Secunda est autem & directio cruris fluxione infestati uena praesertim in brachio inferna, ita tamen ut obseruemus in eius sectione subiectam ipsi arteriam. Si uero haec non appareat, media, ita ut & in hac obseruemus subiectum neruum. Quod si uero manus dextra dolore infestetur, uena in dextro crure secamus, iuxta talos aut popliteum, aut plantam pedis: post secam uero uenam si dolores adhuc perseuerent, & fortis tensio sit in affecto membro, saepe in ipso inflammato crure uena incisa, & multo sanguine detracto, hominem ab omni dolore liberaui. Memini itaque inquit Philagrius, cuidam in quo humores aequaliter omnes & multus in primis sanguis redundabat, bis sanguinem ex secta uena detractum, in quo manifeste cognoui quantam uim habeat uena & directio membri affecti secta. Quam enim dexter pes ei fluxione infestaretur, uena dextre manus iuxta, confectum & molestissimum est liberatus: quicquid tribus interpositis diebus alterum item crus fluxum infestaret, uena sinisterae manus secta, similiter a dolore liber euasit. & quum inde pharmaco ex croco curaretur, perfectam sanationem recepit. Verum hic quemadmodum praedictum est, multo sanguine redundabat, & uniuersum corporis habitum eiusmodi habebat, qui non facile posset exsolui. In his uero qui contrariam huic corporis dispositionem habent, parca sanguinem detrahere oportet.

*Quod eleuatis & incuruis uenas ex mēbris fluxione infestatis, ueluti in uaricibus, auferre oportet.*

Cap. xxiiii.

Operae preium est, inquit Rufus, etiam alios auxiliorum modos excogitare: Ego quidem igitur articulis pedum fluxu infestatis, laudo si quis uenas quae ex superioribus in pedes deferuntur excindat, ueluti uaricosa in furis excindi solent. Etenim paries hae tempore praesertim inflammationum apparent in tumore eleuatae, & uenae circū circa rubent, & sanguine repletae conspiciuntur, atque qui ita affecti sunt, magis a dolore uruntur, & frigidius gaudet. Si igitur quis uenas ueluti in uaricibus excindat, multitudo sanguinis non amplius influere & inflammationem facere, quemadmodum antea consueuit, potest, atque id praesertim in sanguinea podagra conducet. In alijs uero articulis, utpote coxendicibus ac cubitibus & similibus fluxu infestatis uenae non ualde apparēt. Quod si contra contingat, eam in his cas quae altius eleuatae sunt, excidere oportet.

*De perussione in morbo articulari.*

Cap. xxv.

Crustas igitur saeuere oportet, aliquas quidem paulo altius loco fluore infestato, aliquas uero propius, atque id cauterijs facere praestat, aut si id aeger ferre recuset, cum medicamentis. Longe autem praestantior est cauteriorum usus; nam & citius & siccius perurunt. In uniuersum uero pedibus ex fluxu infestatis, loci circa uirumque talum forinsecus & intrinsecus inuendi sunt, cauterijs iuxta magnas ibidem sitas uenas admotis, paulo altius supra talorum locum. Inuendus item locus inter magnum pedis digitiū & cum qui ei proximus est, medius, ubi saniae uenae magis tumefactae conspiciuntur, praesertim ex eis maximae. Quibusdam autē & articulos ipsos

perurere expedit, quā submucidi ualde conspiciuntur, priusquam durities ad modum toforum in eis generetur. Sciendum tamē, inquit Rufus, quod in articulis submucidorum perussione, ulcera aegre curabilia oboriuntur, uerum ubi cicatrices coaluerint, maximum robur ipsis articulis praebent, ut non amplius ad suscipiendum influentia recrementa sint apti. Et de his quidem haec tenus. Oportum autem & iam reliquam curam post sanguinis euacuationem aptam describere.

*Curā in fluxibus sanguineis post sanguinem euacuatū.*

Cap. xxvi.

Post sanguinem euacuatū affectam partem aceto ueteri tenuium partium cum rosaceo rigare oportet, & praesertim si in alio herere dolorum causa uideatur. Etenim acetum propria sua tenuitate usque in altum progressum, expeditam rosaceo uia exhibet, quod natura sua dolores lenire potest. Ceterum si in superficie dolor consistat, per uini & olei usum magnopere iuuatur, astate quidem tepidorum, hyeme uero calidorum. Deinde etiā cataplasma utendum quae inflammationes lenire possunt, citra hoc quod prouocent & prolecent fluxiones. Talia autem sunt, farinae sceni graeci & hordei, fabarumque & cicerum tritae uino coctae, potest etiam aqua modica affundi, ubi uinum nimis forte extet. Quin & passio ac modico rosaceo unaquaque ex praedictis farinis cocta dolore mitigare consueuit. Oportet autē cataplasma ta omnino semper calida esse: quod comode fieri potest, si assidue permutantur, & lana forinsecus contendantur. De pharmaco ex croco. Quum itaque praedictis praesidijs adhibitis uehementes compescuerimus dolores, parū quiddam de pharmaco ex croco ammiscimus & praesertim ad cataplasma ex fabis apparatus, ne uidelicet coaceruatim transiis fiat. Deinde etiā amplius quid de pharmaco ammiscendum est, postremum uero pharmaci ipsum cum rosaceo dissolutum, & ad bonam compagem redactū imponemus: diffusiū enim celerrime, si liquidius fiat. Hoc itaque pharmaco saepe post euacuatū sanguinem, doloribus ualde imminutis statim usus sum, loco prius ex aceto rosaceo perfuso: multam enim utilitatem breui ostendit quare ipso assidue ad podagricos utimur, utpote quod laude dignum experimentum nobis exhibuit, inquit Philagrius, in pluribus enim solum hoc sufficit ad perfectam curationem semper quidem cum rosaceo dissolutum, aliquando uero uino tenui & fuluo ammixto, quantum sanie eius conquassando & excipiendo pharmaco satis fuit. Ceterum hoc ipsum in his factū est, quibus adhuc aliquid ex fluxione ad inflammationem locum deferret. Quandoque autem pro uino acetum addimus, maxime ubi tum quod inferitur repellere uolumus, tum discutere iam in loco contentum. Passum etiā aliquando pro uino additū mollibus corporibus profuit. Verū enim uero & ad passillū ex acacijs & uerauris apparatus, adiectū hoc pharmacum saepe quod influit prohibendo, & quod adest euacuando, & membrum confortando, non parum iuuat. Solum item post sedatos dolores durius impositum robur partibus addit, ut adstricta & recrementorum influxui minime obnoxia, ac breui fortia reddantur. Hoc quidē igitur medicamento uarie & multiformiter usus sumus, multosque iuimus, tum instante dolore, tum etiam

etiam eo sedato. Habet enim repulsoſiam uim, pau-  
cam quidem illam, propter acetum & crocum. Ha-  
bet & concoſtoria & diſcuſſoria ac moderate re-  
ſiccantem, rursus ob crocum & galbanū thurisq; &  
ammoniā thymiatis ammiſtionē. Diſcuſſoria au-  
tem tum in his ipſis ſita eſt facultas, tum in pice & a-  
ceto. Merito itaq; podagricis inflammationibus con-  
uenientiſſimum cenſetur. Nam & fluxū moderate  
repellit, & caſtaciendo ſenſim concoquit, & conten-  
tum diſcutit, & debilitatis membrīs firmitatem in-  
duct. Cōpoſitio autem hoc modo habet. Galbanī  
drachmas x x x i i i. thuris drachm. x x x i i. croci dra-  
chmas ſedecim, ammoniaci thymiatatis drachmas  
quadraginta octo, ceræ drachmas nonaginta octo,  
picis aridę drachmas c c c c l x x v. olei roſacei dra-  
chmas quadraginta octo, acetī albi acerrimī hemina  
unā. Ceram, picem, roſaceum leno igne liquefacta  
excolato: galbanum autem & crocum, ammoniac-  
um, thus, cum aceto terito, & ad liquefacta & abi-  
gne ablata in cacabum adjecto: unitaq; in mortariū  
quod modicam aquam frigidam habet, diſſundito,  
& ſufficienter emollita extrahito, ac quædam modum  
prædictum eſt uitior. Hoc quidē modo Philagrius  
apparare pharmacū ipſum præcipit. Quidam uero  
poſt eum etiā opij unctā unam, ad hanc cōpoſitio-  
nem adiecerunt, eoq; ad uehementes dolores ſedan-  
dos uſi ſunt. Alij autē uſus tempore inſtante parum  
quiddā opij addunt ad maximos cruciatus compe-  
ſcēdos. Paſtillus ex acacijs & ueratrīs. Porro ex aca-  
cijs & ueratrīs pharmacū hocce eſt. Paſtillus poda-  
gricus admirabilis ad podagricos & morbiū articu-  
larē, inflammationesq; & omnia pruriginofa: in prin-  
cipio enim illius manifeſtā uilitatē exhibet, ut ea-  
dem etiā die lotus æger deambulet. Vbi uero dolor  
in uigore eſt, in cōmode adhibetur. Quidā enim in  
uigore affectionis eo uſus, coſeſtim quidem ſibi in-  
de ſuauari uſus eſt: paulo uero poſt conaleſcit &  
reſiccato loco, à maximis doloribus æger apprehen-  
ſus nos acceſſit, quare quum acceſſiſſemus & didi-  
ciſſemus factum, cognouiſmus quod membra in ſu-  
perſice poſita conuulſionis modo affecta eſſent, tum  
ob inflammationem, tum ob exortam ex pharmaco  
adſtrictionem & diſtentionem. Diſtensæ autē erant  
& in profundo ſitæ partes ex cuticulę exterioris ad  
incerna impulſu. Abluto igitur prius cum aqua ca-  
ſida illito paſtillo, cataplaſma ei imponi iuſi ex a-  
qua muſſa diluioſe apparatus, & ex oleo modico  
dulciſſimo, farinĩſq; ſeni graeci & fabarū, atq; hoc  
ipſum ſeci propter eam quæ ex ipſo pharmaco ei cō-  
tigit oppilationemq; & conſtrictionem: quum ue-  
ro dolores euetiſſigio eſſent ſedati, à reſoluētib; diſ-  
ceſſi: etenim cataplaſmata & irrigationes in fluidis  
diſpoſitionibus adhibita incurabilem reddunt mor-  
bum. Verum paſtilli ipſius compoſitio hoc modo  
habet. Acaciæ nigræ drachmas triginta duas, acaciæ  
flauæ itundem, glutinis fabrilis pellucidi, aut quod  
magis expedit, glutinis piſcium drachmas triginta  
duas, ammoniaci thymiatatis drachmas ſedecim,  
glauçij drachmas ſedecim, aloës drachmas ſedecim,  
thuris maſculi drachmas octo, ueratrī albi & nigri  
cuſuſq; drachm. viii. Aceto ſillicitico trita cogito  
in paſtillos. Vſus uero tempore eoſdem in aceto eo-  
dem liquefactos illinito, & exicare permittito, æ-  
grumq; in balneo demittiſſo, & ubi inde redierit,

ſimiliter uitior. Torū paſtilli pondus drachmarum  
cētum & ſexaginta octo eſt, hoc eſt undarum x x i.  
Hoc pharmacum podagricis inflammationibus in-  
choantibus cōuenit, & ſolū ſufficit, ſi nō multatudo  
fluxus redunder: & multo amplius, ſi per plumbi  
ſuccum fuerit diſſolutum & liquefactum. Fit autem  
plumbi ſucci hoc modo. In mortarium plumbē  
ſuccum aliquem refrigerantem ſimul & adſtringen-  
tem inſinij, & cum piſtillo plumbeo in ſole, donec  
craſſior reddatur terito, atq; ita iniectum paſtillum  
& contritum illinito. Sit autem ſuccus ipſe plan-  
taginis, aut oxylapathi, aut ſanguinariæ, aut uuæ acer-  
bæ immaturæ, aut ſemperuiui, aut aliquarum con-  
ſimilium herbarum, quæ & ipſæ commodæ ſunt  
in principijs inflammationum. Hoc ipſum itaque  
pharmacum ex plumbi ſucco, non ſolum in prin-  
cipijs & progreſſu, ſed & in uigore mali aliquando  
commodum exiſtit. Et Philagrius quidem hoc mo-  
do de paſtilli uſu ſcripſit. Quidam uero paſtilli ex  
croco ad dyſenteriam deſcripti, atque huius ipſius  
pares partes aceto aut plumbi ſucco terunt, & dua-  
bus ante balneum horis illinunt, atque ubi lauerint,  
à balneo huius ſimiliter illinunt, & egregie teſti-  
monium huius uſui præbent. Diæta eorum qui ob  
ſanguineum fluxum ægrotant. Inflammationes ex  
ſanguine inſluxu obortas, quædam modum dictum  
eſt, curare oportet. Cæteri cibos eis exhibere oportet  
qui minus nutriunt. Quales ſunt holera, & ſpi-  
noſæ plantæ: & ex uolucris, montanæ: ex piſci-  
bus uero, qui in petroſis aquis degunt. Alium uero  
facile ſubeuntem habere oportet, & ſi quidem offi-  
cio ſuo non ſua ſponte fungatur, ſimpliciori aliquo  
clyſteri ſeu inſuſo eluatur.

Cura eorum qui neq; uenæ ſectionem, neq; purga-  
tionem ſuſtinere poſſunt. Cap. x x vii.

Quandoquidem uero quidam adeo formidoloſi ſunt  
& mollicie fracti, ut neq; nomen uenę ſectionis aut  
purgationis audire ſuſtineant, non melius tantū, ſed  
& fortunatius eſt nullū talem contingere. Et tamen  
ſi ad curandos eos cogamur, prædicere oportet diu-  
turnos dolores eis aſſuturos, & uigilias, articulo-  
rumq; torturas & claudicationes, præſertim ſi craſ-  
ſus & multus ſit ſanguinis inſluxus. Abſtinentia qui-  
dem igitur ciborū illis conſtituenda eſt, & clyſteres  
moderate fortes inſinijendi, & pharmaca umbilica-  
ria imponenda, epomphalia Graecis appellata, quæ  
ſanè umbilico impoſita aluū ducunt. Vtendū etiam  
his quæ ſedi apponūtur, glādulīs uidelicet, uelut eſt  
cyclamini ſuccus, & elateriū, & ſimilia, quorum  
in tertio Sermone ſeci mentionē. Vtendū & poſt aluū  
exolutū, unguētis diſcuſſorijs, & frictionibus eiuf-  
dem generis, & omnibus quę ſuperfluum euacuare  
poſſunt ex locis fluxu inſeſtatis. Etenim repulſoria,  
ſi nō prius uniuerso corpore euacuato aſſumantur,  
periculū inducunt. Cataplaſmata igitur eis impone-  
re oportet ex pane, fabaceaq; & ſeniſſigrei, ac dicerū  
farina, atq; aqua muſſa aut adipe ſuillo non ualde ue-  
teri. Scarificationibus itē iuxta affectū locum uren-  
dum. Irrigare autē aliſidue oportet ex aqua & oleo,  
& aliquando cataplaſmata ex lixiuijo apparare, quo  
per eroſam cutē, uelut per riuos malū euehatur. Hu-  
iuſmodi hominibus cōueniūt itē ceratorū formā  
habentia medicamēta, ex oleo ſicyonio, nitroq; &  
cera apparatus, quæ humorē ad locū delatū diſcutere  
poſſunt.



possunt. Pharmacum ex lixiuio & spuma nitri digrens ex exhauriēis inspissatos humores, est autē pharmacum ip̄sis cōmodissimum, & facile parabile: excitar bullas, & cutē erodit. Spumā nitri albā quam athenesiam appellant, drachmas viginti quinq̄, terebinthinā drach. triginta sex, olei drac. cccc lxxx. lixiuū ficulnē, hoc est, exustis lignis & aqua extinctis, loturæ eorum percolatæ drachmas octoginta quatuor, ceræ drachmas cxxl. Oleū, ceram, terebinthinā, & lixiuū, hoc est aquam ipsam, ut prædicti, coquito, & quum pars maxima aquæ fuerit consumpta, spumā nitri prius tenuissime tritam adijcitur, unctio, ac utor. Huiusmodi sanē sunt inflammationum podagricarum ex sanguine curationes.

*De his qui ob bilis influxum ægro-  
tant.*

Cap. xxviii.

Quod si uero inflammationes ob biliosum influxū fiāt, tum & in his cōmunis scopus euacuationis adligē-  
tis humoris existit. Fiant autē euacuationes in principio, tum per uomitū, tum per uentrē. Danda itaq̄ pharmaca bilem educēta, ex quorū numero aliqua per utramq̄ uīā bilem exigunt, uelut est thlaspi: hoc enim acetabuli mensura potatū & superne & inferne purgat, atq̄ tantū sanē de eo semine ad summum datur. Constat autē quod & purgatoria medicamēta ex scammonia apparatus flauum exagitat & euacuant bilem: horū uero compositiones iam antē re-  
tulimus in tertio Sermone. Faciemus tamen & in hoc Sermone quorundā mentionem, sed pauciorum & paulo post. Purgare igitur eos oportet confiden-  
ter, & secundaria uice, si res ita postularit: confestim enim in euacuationibus subsistunt & sedātur. Quod si tamen neq̄ hi purgari uelint, neque sustineant, ob quamcūq̄ tandem causam, tum sanē & his, quem  
admodū dictum est, mederi conuenit per umbilica-  
riorum purgatiuorū impositionem, & per ea quæ sedi subduntur. Per insusum item alui ipsorū elua-  
tur. Et cataplasmata adhibeantur ex fabacea & hor-  
deacea farina, adipe suillo recenti & insulso, tenuiq̄  
chamaemeli farina ac aqua. At uero hæc ipsa postea  
ius imponenda sunt: in principio autē usq̄ ad uigo-  
rem ea quæ ex semperuisi apparātur, & ros uiri-  
dibus, perdicij herba, anchusa, sanguinaria, helxine,  
sideritide, portulaca, rumice acuto, atriplice, solano,  
plantagine, hyoscyamo, lēticula, & stratiote palustri  
bus, blitō, lactuca, seride, malua satia, ramentis cu-  
cubitæ, umbilico ueneris, flore uiolarū, mali puni-  
ci cortio. Horum unūquodq̄ cum pane ex farina po-  
lentæ impossum dolorē tollit, & maxime psyllij se-  
men aqua feruenti maceratū, & postquam succulen-  
tum factū fuerit, pro cataplasmate impossum. Vn-  
guentum itē ex plūbi succo ad sanguineis inflatio-  
nes præscriptum his cōmodissimum existit. Cōmo-  
da sunt & mala cum pane trita imposita, & quæ his  
sunt similia. Et cerata Hippiones & Ambrosiæ no-  
mine insignita, & quæcūq̄ ex cera, chamemelo, &  
rosaceo apparantur: adijcitur autē succus quispitæ ex  
prædictis refrigerantibus, & ouorum cōcidum, &  
aqua cum modico aceto, quorū compositiones pau-  
lo post subnectemus. Optimū autem pharmacū po-  
eis est ceratum ex rosaceo betæ succo quantū satis est  
adfecto. Vidi etiam quandam hac affectione occupa-  
tam, qui immisisis in frigidam aquā pedibus & ali-  
quandiu in ea detētis præclaram opem tulit. Alium

item uidi qui ostreorum carnibus cum argenti spu-  
ma & uiridibus hyoscyami folijs ac oleo ueteri di-  
ligenter tritis utebatur, & tum illinēdo eas, tum im-  
ponendo probe restitutus est. Licebit autem per o-  
streorum penuriam, carnibus concharū fluuialium  
uti. Atque hec quidem conueniunt, si mediocris in-  
flammatiō & ardor adsit. Nam si magna fuerit, ad  
erysipelarum modum curationē instituemus. Ci-  
cutæ nimirum folijs & papaueris ac mandragoræ  
& hyoscyami adhibitis, quibusdamq̄ medicamen-  
tis compositis stuporem inducentibus, quæ ex papa-  
ueris succo & similibus constant. In horum tamen  
medicamentorum usu immodici caloris deletionem  
pro scopo habere oportet, quæ sæpe in una continē-  
git hora: postquam statim stupefactio ablato, cata-  
plasma ex fabacea farina, adipeq̄ & aqua impona-  
tur. Etenim ubi ea quæ uehementer refrigerant, diu-  
tius adhæserint, stuporem ægrumq̄ ac languidum  
sensum corpori inducunt. Quapropter quū in fer-  
uentibus doloribus fuerimus ad stupefacientium u-  
sum coacti, postea resouebimus partes per ea quæ  
calescere possunt.

*Parabilia remedia ad inflammationes non ualde  
feruentes.*

Cap. xxix.

Reliqua ex eorum numero quæ facile parantur, quæq̄  
doloribus non ualde magnis profunt. Palmularum  
glandulæ sunt, & mali medicæ ramuli, citrium  
autem ipsam appellant & aureum malum. Quin &  
fructus ipsius medulla sapore acris, pani aut pollini  
ammixta in cataplasmatibus cōmodissima est. Quem-  
admodum etiam si oleo coquatur & cera sufficiens  
ad oleum adfecta pedibus imponatur. Cōmodum  
est & symphytum per se pro cataplasmate imposi-  
tum, & cum pane aut cerato permixtum. Et malico-  
rium aceto incoctum, aut aridum tritum cum pane  
subactum. His ergo utaris. Optimū autem cata-  
plasma podagricum & hoc est. Cupressi uirgula  
teneriora & pilulas in ollam coniecta cum aqua ma-  
rina, donec flaccescant, coquito. Deinde in mortariū  
culinarium transumpta, ad cerati formam terendo  
redigito: & linteolo excepta, dolentibus locis im-  
posito. Hoc cataplasmate quotidie ante somnum uto-  
r, etiamsi non adsit dolor, per integrum annum.  
Nam perfecte ægrum sanat. Mirifice etiam facit cu-  
pressi decoctum, si ex eo æger sæpe perfundatur.

Aliud. Cypri, hoc est ligustri folia uiridia trita  
in pastillos digerito, usus uero tempore aceto dilu-  
tos illinito. Barbari autem Indit arida ipsa folia con-  
tusa & cribrata reponunt, usu uero expetente aqua  
feruenti subigunt, modico etiam aceto adperso, ut  
rhois culinarij decocto, atque hoc modo inflamma-  
tis, aut si hæc haberi nequeant, brasiacæ. Reperies au-  
tem mane cataplasma aqua plenum. Sensibilis enim  
diffusio & exhaustio contingit, adeo ut æger exu-  
ctionem sensu preceperit, & maxime iuxta ungues.  
Vitiatur tamen color, eum ad fuscēdinem corrumpens,  
quapropter aliqui cerato liquido ungues pre-  
linunt. Aliud cataplasma, quod eadem hora  
dolores sedat. Cerebrum porci cum amylo &  
rosaceo tritum, & panniculo infartum imposito,  
& confestim liberabitur æger, ut deambulare pos-  
sit. Optime faciunt item maluæ aqua coctæ & tri-  
tæ impositæ, celerissime enim dolores sedant.

De stupe

*De stupeficientibus medicamentis.* Cap. xxx.  
Composuerunt medicis, quemadmodū pædictum est, ob excellentes dolores, aut etiam ob ægrorum molli-  
ciem quos curare cogimur, & neque minimum do-  
lorem tolerare possunt, medicamenta stupeficientia  
appellata. Hæc enim nequaquam affectiones ipsas in  
quibus dolores fiunt, curant: uerum stuporem & sen-  
sus hebetationē membris inducendo, quietem quan-  
dam doloribus obducunt, quapropter si ad huiusmo-  
di pharmaca usum, aut ob excellentem dolorum  
magnitudinem, aut ob immodicam caliditatem ery-  
sipelatis cōsimilem, cogamur, utemur quidem mo-  
dice, quo feruor immodicus refrigeretur, aut sensus  
oblæsiō deleatur. Ad hoc etiam animaduersione ha-  
bita diligenter, ne quid post uehementis caloris & do-  
loris extinctionē, ex stupefactiuo pharmaco in mē-  
bro permaneat. Sunt autem medicamenta stupefa-  
ctiua huiusmodi. Asclepiadæ epithema dolorem  
leuās, podagrīcis & articulari morbo commodum:  
usus eius est in ipsis exacerbationibus & excellenti-  
bus feruoribus inflammationum. Opij drach. iiii.  
croci drachm. i. panis filiginei quantum satis est: u-  
numquodq; per se lacte bubulo maceratu terito, &  
unita imponito. Aut hæc ipsa cū lacte trita cerato ro-  
saceo excipimus & uiuimur. Aliud, quod conse-  
ctum à doloribus liberat: oportet autē ante pharma-  
ci impositionē ægrum lauare, atq; ita exteris locis  
statim adhibere. Succī abstinēij trientem, croci trien-  
tem, ceræ tantundē, opij unc. i. irini sexuncem. Opiū  
& crocum in passo diluito, & assulo cerato unito ac  
utitor. Asclepiadæ pastillus podagrīcis, dolorem  
leuans. Vsus eius competit tempore exacerbationū.  
Aloēs lib. i. centauræ sextantem, thuris trientem,  
myrrhæ trientem, lapidis asij, opij, succi mandrago-  
ræ, styradis, aluminis scissi, cuiuscq; sextantem: exci-  
pe, ac subige passo, & ad pastillorum formam reduci-  
to. Vsu uero expetente lacte dissolutos cum plū-  
nulis illinito, supra illitum locum linteolo imposi-  
to passo imbuto.

*Vnguenta recalsfactoria quæ post stupefactiuorum  
usum adhibentur.* Cap. xxxi.

Quum itaq; stupefactiuis usq; ad feruoris inflāmatiō-  
num deletionem fuerimus usi, post calefacere mem-  
bra cōuenit cataplasmatīs ex castorio & thapsia cō-  
positis: si enim hoc non fecerimus, debilia & intem-  
perata reddita mēbra perpetuo fluori obnoxia red-  
demus, & quæ in actionibus facile offenduntur: quæ  
propter unam atq; alteram unguentorum recalsfacto-  
riorum compositionē apponam. Ex quorum nume-  
ro & hæc est. Succī thapsiæ drac. viii. piperis drach.  
xiiii. adarces, cāchrys, euphorbij recētis, cuiuscq;  
dra. xx xii. Si uero recens euphorbiū desit, duplum  
eius sume: staphidis sylvēstris drac. xii. pyretri dra.  
xii. terebinthinæ drach. xvi. ceræ drachm. xxiiii.  
olei cyprini libras vi. Altera, eiusdem usus. Pyre-  
tri, castorij, helenij, adarces, piperis, euphorbij, zin-  
giberis, niri, ceræ, singulorum drachmas viii. iri-  
ni quantum sufficit. Pro pauperibus autem satis fa-  
ciunt, allia, thymus, origanum, saureia, sinapi, & si  
milia.

*Pharmaca & edulia eorum qui flauæ bilis influ-  
xu instantur.* Cap. xxxii.

Exhibenda est autem & cyclaminus à flauæ bilis influ-  
xu infestatis. Huius enim radix quā tenuissimè

trita cum aqua mulsa aut passo pota, biliosum hu-  
morem per sudores excludit. Dandæ autē ex ea dra-  
chmæ quatuor corporibus magnis & robustis, reli-  
quis uero pro uirū tolerantia. Adiuuare uero opor-  
tet sudorem excludentem corpus calefaciendo & fri-  
cando, ita tamen ne affectos locos cōtingamus. Præ-  
benda quoq; in potu ea quæ urinā dent, talia enim  
bilem per lotium euacuare consueuerunt: pastillus  
itē ex seminibus soporifer, & qui à triangulari for-  
ma Trigonis appellatur, & consimiles, doloribus  
infestandis commode à flaua bile affectis exhiben-  
tur. Nam & somnus alii soporis inde oboritur, &  
fluxiones ab ipsis rescitatur, atq; id maxime si post  
corporis per purgatiū euacuationem exhibeantur.  
Edulia autē eis apta quæ refrigerant, non tamen hu-  
meant: humiditas enim auget fluxiones. Dandum  
item eis lactuca semen ob somnum conciliandū, &  
papaueris semē tum in cibo, tum in potu. Mala etiā  
& sorba & mēspila præbenda, & quæcūq; ad hoc  
quod refrigerant, fluxus cohibent allationem. Cæ-  
terum à uino omnino exacerbationis tempore absti-  
nendū est. Intercapedine autem pura reddita parum  
ex eo cōcedendum. Porro inedia ab amara bile inse-  
stos extreme lædit: nam bilem acriorem reddit.

*Cura eorum qui ob pituitæ influxum æ-  
grotant.* Cap. xxxiii.

Horum itē curationem à pituitæ euacuatione princī-  
pium sumere oportet. Euacuatur autem humor pi-  
tuitosus per uomitus quidem, nihilominus tamē &  
inferne per uentrē. Vtilis est autem in hac affectione  
per inferna purgatio, siue iuxta manus, siue iuxta pe-  
des hæreat morbus, & multo adhuc magis si iuxta  
omnes corporis articulos fluxus uis fuerit dispersus, fa-  
miliarior enim pituitæ uia & minus periculosa per  
intestina existit. Si enim in superiore uentrem uisio  
lenter adtracta non euacuetur, periculum inducit.  
Quapropter tutius est ut ad infernam excretionem  
ducatur. Euacuata enim in una die morbi utcunq;  
inueterati robur contundit, quare in podagra innæ-  
tum ex pituitoso humore fluxum, & mediocriter af-  
fligentem, & qui tum potentia tum actu calidis re-  
medijs deletatur, purgare oportet. Ante purgatio-  
nem uero modice adstringentibus utendum, atq; id  
magis adeo circa initium fluxionum. Atqui si eua-  
cuatio per purgationes fieri non possit, quæ sanè uel  
sola sæpe sufficit ad affectionem fluidarum curatio-  
nem: tum inedia & fame utendum est ad plures dies.  
natura enim pituitosa eam bene tolerare possunt. V-  
tendum etiā cōfricationibus discussorijs ampliusq;  
efficaciōribus infusis, & pharmacis crientibus urinā.  
Cæterum quæ ratione nutrimenti præbentur edu-  
lia, natura sciora sint, & minus nutritæ, ueluti est  
oryzæ fuscus & bromi, qui inter frumentacea refer-  
tur. Nuces iuglades paucae, pistaciaq; & nux thasia,  
& uuæ passæ, & capparīs ex aceto mulso. Quadoq;  
etiā parui pisciculi in petrosīs aquis coacti, & aui-  
culæ mōrnanæ assatæ præbeantur. Vinum autē præ-  
beatur quā minimū interualli tempore, tenue, sul-  
uum & uetus. Cataplasmata autem quæ frigidis flu-  
xionibus cōueniunt imponenda. In principio qui-  
dem terebinthi folia uiridia & tenera cū adipe suil-  
lo recēt, & rosaceo, modica cera cocta. Apta sunt  
ipsi & cupressi folia & pilulæ uino cocta. Et cyperi  
radices, & rhamni folia. Post principium uero pi-  
tuitosis

tuitosis conuenit ex eruo & lolio ac scœnogræco cataplasma. Quemadmodum etiam ea quæ ex ciceribus constant, aristolochiæ radice trita ammixta, centaurea & gentiana, & pœonia, & bryoniæ radice ac fructu. Ex amaraci item coma, & artemisia, abrotanici folijs & adianto, uitice, lauro, pulegio, famulico, menta, brasiica, silymbrio, serpillio, silice, scœniculo, eruca, & reliquis quæ saporis acris, aut salis, aut amari sunt, & maxime si dolores circa ardorem ex refrigerationis sensu sint oborti. Singula uero ex his cum pane & adipe recentia pro cataplasmate imponito, quanquam nihil uetet unūquodque per se adhibere. Optimum est etiam fœmum ex passio mari mixto apparatus. At uero quinquæfolij radicis & malicorij æqualibus partibus decoctis perfusi ad fo ui, inquit Archigenes, circundoltes partes. Imò & tritis ipsis magis inflammata loca cataplasmati modo contexti, arque hoc ipsum multis uelut oblectans & resistens remedium dolores ex pulit, aliquibus autem ut pharmacum nulli inferius ipsos mitigauit, rarissime uero circa commoditatem apparuit. Mansuescissimum uero & hoc est. Altheæ folia cocta trita tum per se, tum cum polline, aut ordeacea farina imponantur. Cerarum item ex radice eius, quæ hibiscum appellatur, cocta in aqua mulla trita, constat autem cerarum ex gleucino aut irino. Imponatur uero his qui tum uehementer calida, tum ualde frigida auersantur, mediciscribus autē delectatur. Pharmacum porro conueniens noui, inquit Philagrius, podagricis qui unā cū doloribus frigoris sensu perscitantur, id quod ex laurino componitur. Quum enim & alia eiusdem generis sint cum ipso, tantum tamen cōmoditatem à nullo exhibitam scio. Compositio autem hoc modo habet. Pharmacū ex oleo laurino. Cere, adipis suilli ueteris, resinæ pinus siccæ, terebinthinae liquidæ, cuiusque drach. xvi. cypri ni, laurini, ægypti, butyri, cuiusque drach. xlviii. galbani, medullæ ceruinæ, cuiusque drach. xvi. Hoc quidem igitur medicamentum consistit à dolore liberat eos qui in dolore frigoris sensum percipiunt. Admirandum etiam in his pharmacum est, quod ex croco constat & galbano, supraque ad sanguineum influxum prescriptum est, & in omni tempore adhibetur. Sunt autem & alia pharmaca his apta. Quemadmodum ea quæ Myracopa appellantur, & quæ ex ipsis cōponuntur cerata, sunt autem hæc commensurata & proportionata cera ad unguenta ipsa ammixta. Pharmacum ex metallicis. Optimum uero & ipsis pharmacū est ex metallicis ad sauciato nervos à Galeno apparatus, cuius & nos admirabile periculum fecimus, inquit Philagrius. Quum enim parium quā tenuissimarum sit, ad profundū corpusculorum progreditur, & attenuat, & discutit. Compositum igitur existit in prædicta dispositione post sedatos dolores admotum, aut quū mediocres existit, non solū enim discutit, ut dictū est, sed & repellit. Cōpositio uero hæc est. Chalcidis drach. viii. misyos drachmas xvi. Squamæ æris drac. xiiii. thuris drac. xiiii. galbani drach. xii. colophonice drac. xvi. cere drach. xvi. olei drach. cxxviii. acetici acerrimi quantum satis est. Metallica cum acetico in sole estivo terito ad plures omnino horas: Deinde thus adijcto, rursusque diu terito, & liquecibili bus liquefactis, refrigeratis, & erasis admixtis un-

to, ac uitor. Pharmacum ex uino & oleo, Galeni.

Aliud pharmacū ex oleo & uino Galenicū, conueniens in declinationibus inflammationum, & post eadem omnibus podagricis. Spumæ argenti, drachmas xvi. olei ueteris drachmas cxxii. ad podagricos uero sufficit, si anniculum sit oleum, uini ueteris sului pellucidi aque leniter dulcis drachmas cxxii. Coquito simul ad compagem manus non inquinantem. hic enim est optimum eius apparatus. Nam qui triplum olei accipit, diutius coquitur, & magis resiccans redditur. Porro in his qui post dolores uehementis frigoris percipiunt, aliud Galenicum pharmacum ex euphorbio ad sauciato nervos descriptum conduci. At uero adhuc pharmacum podagricis commodum, tum in inflammationum remissione, tū post eadem existit, quod Aegyptium appellatur, & quod ex laniis succidis uisus apparatur. Habetur autem inter multæ commoditatis emplastra in xv. Sermonem huius tractationis.

*Curæ eorum, quæ ex atræ bilis influxu agrotant.* Cap. xxxiiii.

Dicatur autem ex ordine & de atræ bilis influxionibus, quæ & ipsæ omnino uniuersali euacuatione præcedente opus habent, hoc est uenæ sectione, aut purgatione. Quando quidem igitur ad atram uergunt bilis, euacuatione per ea quæ ipsam repurgant: quādo uero ad sanguinem atrabile infectum declinant, per uenæ sectionem. Si uero ambo hæc simul per totum hominem redundarint, non unū aliquod ex prædictis adhibere sufficerit, sed præsecta uena, deinde depurgare cogimur, quod ipsum & in alijs affectionibus duplici euacuatione indigentibus erit faciendum. Priusquā igitur totum corpus euacuamus, arque in ipso etiam euacuationis tempore, dico sanè in principijs, repulsoijs & sensim simul calefacientibus utendum est. Post euacuationem uero his quæ sensim calefacere, & attenuare, & discutere possunt, utemur. Sunt autem repulsoia quidem simulque leniter calefacientia, terebinthi folia & cupressi, cypri radices, & similia. Calefactoria autem simulque attenuatoria & discussoria, bryoniæ radix & cyclamini, syluestrisque cucumeris. & raphani, lauri item folia mollia, & pastinacæ, & caualidis, sinapis, nasturtij, conyzæ, brasiicæ, iridisque & ocymij & aliorum innumerorum folia. Ammiscenda autem sunt hæc pani aut cuiuspiam ex prædictis iam sæpe farinis, & adipti asnerino aut gallinaceo, butyroque & æsypo, atque id maxime in humectis & mollibus corporibus, quo lentiora reddatur. Quin & post huiusmodi pharmacorum impositionem, prescripto ex croco pharmaco, & eo quod ex metallicis constat, uti conuenit, ampliusque quod Madia: rioni inscribitur, & quod lsis appellatur, similibusque, quorum compositiones in xv. Sermonem traditas reperies. Etenim huiusmodi pharmaca relictum in membris humore concoquant, eundemque attenuant & discutiunt, ampliusque membra debilitata corroborant. Cōmodissimum autem pharmacum per interualla exacerbationum dolore non infestante, ad atræ bilis fluxiones est Corax, quemadmodum etiam passilli, Andronius inquit, & Musæ, & qui ex centaurea, itemque qui ex laniis succidis apparatur, & consimiles in xiiii. Sermone descripsi. Illinuntur autem cū uino dulci. Miscentur etiam ad prescriptum

ex croco pharmacum, & ad id quod ex metallicis constat, ita tamen ut parum quid ex pastillis ad multa pharmacum partem commisceamus, ut uidelicet pastilli xii. pars ad unam pharmaci partem addatur, hoc est ad pharmaci lib. i. pastilli unda una. Aliquando autem minus. Quum enim euacuat & discutere uoluerimus, minus de pastillo adijcimus, corroborare autem & firmitatem addere, plus. Quod si neque perfecta, neque absque dolore sint exacerbationum inflammationum species uniuersis corporis, praeter affectas partes, tum per interualla, tum tempore exacerbationum uehementius & diutius facta, & maxime si non fuerint praeuacuat.

De his qui ob tenuem fluxum aegrotant. Cap. xxxv. Si serosi sint humores qui ad articulos influunt, non paruum signum tenuitatis ipsorum est, quod neque tumorem magnum habeant inflammationes, neque diutius durent, imò neque molestiam aliquam in moribus perpetuantur aegri, postquam quiesuerint inflammationes. Eorum igitur qui ob tenuem fluxum aegrotant, remedium quod eadem die opem esse ferat, purgatio est per ea quae serosos humores euacuae possunt facta. Fluxiones autem quae non ita ualidum dolorem inferunt, saepe in solo irrigationum sortu subsisterunt, ex oleo uidelicet rosaceo & uino dulci suppressae, addita cera ammixta, ipsi cumque sanis succidis exceptis, modicam etiam aliquandam nistri spuma. Quin & quod ex cote naxia & ferri affricu dederunt, & in ea congregatur, illitum iuuat. Et felinusa terra, & cretica, & samius asper, & lemnia, sphaeris appellata, uino & posca, & aceto ac passo diluta, illita eodem modo profuerunt. At uero & caseus recens coactus impositus mediocres inflammationes etiam solus iuuat, & cum posceta, aut farina praesertim ordea cea. Habet enim in se non modo quid repulsiuum, sed & discussorium, per quod & tenues fluxiones repellit, & humores in articulis euacuat. Lentius etiam ramuli teneri & fructus, similiterque myrti & terebinthi, & pirorum, ac quercus, oleae, puniceae, mespilorum, cerasi, pruni, rubi canini, & rubi, cuius etiam fructus & uirgula idem operantur, & ut simpliciter dicam, quaecumque res in fructibus, & folijs, & succis, & radicibus aliquid amari, aut acris, aut salis, aut nitrosi habet, simulque cum amaritudinis, & acoris, omniumque praedictorum moderata qualitate non adeo excellit, adstringitque mediocres dolores ex fluxione abortos iuuat. Sufficit autem una cum his ad perfectam saepe curam fames ipsa. Quemadmodum etiam clyster omnibus fere podagricis conuenire uidetur, & maxime in quibus uenter assidue cohibetur. Rura etiam uiridis & pastinaca uiridis uulter ipsi pro cataplasmate imponuntur, maxime quibus uenter cohibetur, ampliusque quibus pungitui sunt dolores & inflantes. Ammiscere autem omnibus his expediat adipem, quandoque & polentas, & farinas quasdam, quae haberi possunt, mel item ac passum, & rosaceum, quo humecta & liquida conseruemus. At uero si & fermetum modicum hoc tempore ammiscas, nihil peccabis. Hoc igitur modo etiam plurima ex hortensibus tibi commoda fuerint, si ipsa iuxta praedictas qualitates iudicaris, amaram nimirum & sal-

sam, acidamque & adstringentem atque acrem, quae omnes sint mediocres. Inuenies autem aliquando & dulcem qualitatem una cum his permixta in eadem etiam planta. Ea quoque quae in mari nascuntur, plerumque talia sunt, utpote quae Lacucae appellantur. Sunt autem germina laeta & oblonga ac utridiora, tenuia & subrugosa, ac ueluti conduplicata ad litorea maris per fluctus eiecta. praestantiores autem sunt cum posca decocta. Viridia item quae in fuce siue alga tinctoria ad radices fura sunt. Et ad haec quae in petris maris reperiuntur similitudine fungorum, reliquae germina mollia commodant eodem modo. Omnia enim huiusmodi apte commiscuntur adhibebus ac farinis. Quin & corpedo tum marina, tum fluuialis, iuxta alium quandam modum, non in paruis solum, sed in magnis quoque inflammationibus congruit. Naturali enim facultate quadam stuporem inducit, & dolores & corporibus tollit. Quapropter ipsam uiuentem assidue ad mouere inflammationis locis oportet. Cocta item adhuc uiua in oleo, deindeque extracta, ac modica cera cum oleo eliquata, commo dissimum pharmacum omnibus dolore afflictis podagricis redditur. Consimili efficacia uermes terreni appellantur praestant, si in oleo coquantur, & cera posita in oleo liquecat.

De fluxionum inter se complexu. Cap. xxxvi. Quum itaque iam simplicium & immixtarum inter se fluxionum curatio sit relata, nulla difficultas amplius est, etiam mixtarum curam inuenire. Satis enim manifestum est, quod ad humorum complexum, consequenter etiam curationes oporteat mixtas esse. Congnitiones autem mixtarum fluxionum ex praedictis simplicibus affectionibus sunt sumendae.

Cura affectionum ex sanguinis et bilis complexu. Cap. xxxvii.

Si igitur sanguineae & biliosae affectiones concurrant, & propterea tumor magnus & ruber, & quodammodo flauus ac feruidus, membrum fluxione infestatum apprehendat, & dolores nunquam remittentes incumbat, & exacerbatio uehementer quidem alternis & tercio quoque die fiat, benignior autem singulis diebus: omnino sane manifestum puto, quod medicationis initium a uena sectione primum fiat, consequente exinde biliosi humoris purgatione. Satis constat autem quod & euacuationum tempore repulsiuorij uteretur, quod uidelicet frigida & adstringentis sunt facultatis: Et deinde primum mitigatorijs & refrigerantibus quidem utendum, non autem amplius adstringentibus. Adstrictio enim tumorem inspicillat ac cogit, ut egre discuti & resolui possit, si diutius ea utamur. postremum uero etiam his quae concoquere & discutere tumorem possint, utendum est. In principio igitur iuxta euacuationem, inquam, tepus, utile pharmacum eiusmodi affectionibus est ex acacia & ueratis pastillis in mortario plumbeo cum semperuiui, aut plantaginis, aut sanguinariae, aut sectionis, aut umbilici ueneris, aut rumicis acuti, aut solani, aut uuae acerbae, aut hyoscyami, aut lacucae succo dilutus. At qui iuxta augmenta & uigores affectionum, etiam ea quae ad sanguineas affectiones dicta sunt, in cataplasmata ammiscere expediat, succosque item iam relatarum herbarum, & ipsas adeo herbas tritas. Postquam uero feruor inflammationis cessarit, concoquentibus cataplasmatibus &

medicamentis utemur: parte etiā affecta uulnificulis impactis scarificata, praesertim si appareat tumefacta.

*Cura bilis ad pituitam permixta. Cap. xxxviii.*  
At uero si pituitosi humores biliosis fluxionibus ammiscantur, si quidem unio & permixtio ipsorum eodem tempore hominem infestet, miscere etiam remedia oportet, eorumque multitudinem purgare per ea quae bilē simul & pituitā educere possunt: forinsecus autē cataplasmata imponenda pari aut impari modo permixtis his quae pituitosum & biliosum euacuant fluxū. Et pari quidē modo utraq; coniiciemus, quū affligentū humorū mixtura equalis fuerit. Im pari uero, si alter humorum redundarit. Nec uero obliuioni tradendum, quod aliqua ipsorum in principio recte adhibentur: aliqua uero iuxta mali progressum & uigorem. Quaedam uero eo remittente & circa declinationem.

*Cura humorum atrae bilis alijs permixtorum, Cap. xxxix.*

Eadē etiā methodo uteris, si atre bilis fluxiones reliquis fuerint ammixtae, tum iuxta exacerbationum circuitus, tum iuxta continuitatem. Nec enim solum ad affectionum cōplexus est respiciendum, sed & num assidue & citra remissionem, an iuxta circuitum infestet. Primū quidē igitur & in illis euacuationibus cōuenientibus utendū est: Deinde ubi quidē assidue infestantur, cataplasmatis dolores sedandis uti expediat: Vbi uero per circuitū moueantur, instaurandis quidē doloribus mitigatoria cura, per interualla uero corroboratoria membrorum utemur. Manifestum autē quod quae magis seruēt, maiori refrigeratione opus habet: quae minus, minori. Omnia tamē seruentia refrigerare oportet. Quaecumque autem fluxiones pruriginosae fuerint, obrundentibus & discussorijs curabuntur. Quaecumque uero mordaces, obustis tribus solis. Et quae in alto sitae sunt, per ea quae tenuium partium existunt: quae uero in superficie, per simpliciora. Omnium autem horum sylvium in fine secundū huius rationis Sermonis praescriptam habes.

*Cura durorum humorū qui post inflammationes relinquuntur. Cap. xl.*

Duri & reluctantes aliquando tumores post inflammationes relinquuntur, qui ex crasis humoribus generationem habent, in corporibus praesertim durioribus, & quae aegre per discussoria exoluuntur, & male curantur. Huiusmodi enim non curati statim se ipsis peiores sunt ad uitae actiones obeundas. Caeterum huiusmodi tumores sedant, pharmacum Machaerionis, & Piscatoris, & Aegyptium, & consimilia, de quibus dicitur x v. Sermonem in pharmacorum multae commoditatis relatione. Dicitur autem & hic, ubi ex ordine de tumoribus qui egre concoquuntur tractabimus. Sunt etiam parabilia pharmaca ad hanc affectionem si ruri uiuamus, sicuti fici, & syluestris quoque grossi cocti, triti & impositi, tum soli, tum cum quadam ex praedictis farina & adipe. Cyclaminum item & cucumeris syluestris radix, & althea bis cocta, & carica pinguis, adiantum, aena, urtica, bryoniae radix, bulbi anethi, abrotoni, bupthalmi, iris folia, itemque marrubij, ita ut singula praedicta cum uisio, pice, & sulphure uiuo permisceantur.

*De tumorum crudorum & inconcoctilium cura. Cap. xli.*

Crudi tumores ex materia albidore ac leniore con-

gregantur, diuque durant, neque concoquuntur, neque discuti possunt. Quandoque uero primis quidem discussis loci statim fluxione infestantur: & inaequali magnitudine semper permanent tumores, & in quibusdam sanē penitus absque dolore fiunt, in alijs uero dolore quodam comitante. Quandoquidem igitur diuturnos uideris tumores citra dolorem, per discussoria curato, diligenti animadversione habita ne quid relinquatur induratum, quod incurabile aut aegre ualde curabile reddatur, & maxime ubi callosarum duricorum generationem uideris in articulis futuram. Si igitur citra dolorem uideris crudos tumores, emollientibus ad discussoria ammixtis curato, ne quid penitus induratum relinquatur. Si uero cum dolore contingant tumores, non modo discussorijs, sed etiam quae unā cum hoc quod discutitur, lenire possunt, expedit uti. Manifestum autem est, quod si fluxus tenuis & modicus cum doloribus quibusdam deferatur, inde tumores post inflammationem remissiones oboriantur & infestent, atque id maxime in his euenit qui delicatius uiuunt, aut frequenter lauantur, aut plus quam oportet inambulant, uel etiam rebus ueneris utuntur. Oportet igitur in his ad tumefacta imponere pharmacum ex salicibus, ita ut adglutinari possit apparatus: aut ex aspidibus constat ad strumosos destinatum, aut aliquod consimile: praesertim quum sensus aegris adest coxendicem aut femur, inquam aliquid ad inferiora deferatur: quumque dicunt se affici uelut formicas repente sentiant, doli etque, & iam refrigeratur, iam calescit membrum. Quin & lauantes per fimegmaria ex adarce, alcyonio, & pipere defricare oportet. Adstringentia igitur sunt simulque discussoria pharmaca, quibus necessario utimur ad crudos & dolentes tumores, uel ut symphytum petraeum, terebinthi uirgulta, scopulorum uiride, cyperos, & similia, de quibus saepe dictum est, cum pane multo & rosaceo permixta, praesertim in his qui humido & albo corporis habitu sunt praediti. Ex compositis autem conuenit eis pharmaca ex succis quod cum uino fluauo & subadstringente est emollium, & Galeni phoenicium cum multo rosaceo liquefactum, & locis liquidius impositum. Caeterum in tumoribus citra dolorem conueniunt adiantum uiride, folia urticae, altheae, chamamelum, uua passa pinguis, fertula campana, melissophyllon, lauer, citrij exterior cortex, & similia: Ad quae singula cicerum & lupinorum farinae, & panis, & olei ueteris ac sicyonij, & adipis fuillit ueteris, tantum ammiscendum est, ut mollis ad tactum compositio reddatur, & morsum nullum ad membrum accedere permittat. Ex compositis autem pharmacis conueniunt his, id quod ex croco & galbano constat, & quod ex liquecibilibus apparatus, ac mox referetur ut Machaerionis, & Piscatoris, cum cerato ex oleo sicyonio aut alioquo consimili liquefacta. Atque haec quidem in mollioribus corporibus adhibentur. In durioribus autem & quibus tumores non dolitant, conueniunt uiridis folia, praesertim arida, & amaracū, amarantum ari & arisari radix, smyrnium, althaeae radix, elaphobosum, cricae folia, sceniculi folia, silix, silymbrium, scandix: erucicae folia & sinapis uiridis. Composita autem conueniunt tum praedicta citra cerati ammixtionem, tum liliis, & Aphrodite appellatae, & alia infinita istidem

dem uiribus prædita. Huiusmodi autem pharmaca unâ cum hoc quod tumores exolunt, etiam fluxiones naturæ suæ aptitudine repellunt: Quod ipsum etiam probe faciunt cupressi pilulæ uirides cum uino coctæ, prædictorum leguminum farinis & fusillo adipe ammixtis, quandoq; uero & lauri ramuli, & rubi folia, & similia ammiscuntur. Efficaciora autem prædictis sunt, & agrestioribus corporibus ac tumoribus qui ægeritine cōcoquantur conuenientissima, abrotonum, ammoniacum thymifama, anemonarum radices & hastulæ regiz, bryoniæ radix, pulegiū, dracunculi radix, bdellium, buphthalmū, gentianæ radix, & myrobalanus. His autem adhuc fortiora sunt capparidis folia, glastum, betonica, cyclamini radix, brasiçæ uisæ cenis, ruta, panaces uirides, peucedani radix, scilla, scis syluestri fructus, trifoliū asphalites, trixago, sulphur, pix. Adatur autem singulis prædictis panis & adeps, aut prædictorum leguminū farinæ, quandoq; etiam caricæ. In quibus omnibus scopum tibi propositum habes, ut circa partis affectæ combustionem & afflictionem curam facias: quapropter etiam necessaria est prædictarum farinarum, itemq; adipum admixtio. Tantum autē commiscere ex eis oportet, quantum uehementem uniuscuiusq; uisum obtrudere uolumus. Ammiscēdus autem est non solum adeps fusillus, sed & caprinus, & utulinus, & taurinus, ceruinus & asnerinus: Medullæ item omnes ammiscendæ habito naturæ cuius di corporis respectu. Et cochleæ unâ cum testis trite, & sine alterius rei admixtione, aut caprino stercore cum aceto trito ammixto impostæ, tumores laxos & molles destruunt, & adstringunt, qui sanæ ex lentis & crasis humoribus oboriuntur. Porro operæ præcium duxi admonere, diligenter animaduersione opus esse, ne diu te indurata aliqua tumoris pars relinquantur, quod sanè ubi uideris factum, his quæ fortiter emollire possunt, ueris, respectu simul ad habitu corporis habito. Ex malagmatibus autē fortissimū est Lucio inscriptum ad articulos distortos.

*Malagmata diuersa, in quibus etiā Lucij malagma est, ad articulorū distortionem destinati. Cap. xlii.*

Malagma Lucij ad articulos distortos inscriptum, facit ad thoracis affectiones & abscessus in profundo, ad neruos contractos, & articulos stupore occupatos. Latini distortionem, & Græce ancylos appellamus, facit opisthotonicis, & ad omnem neruorum per cōsensum affectionem: Ad neruorum item lassitudinem acopon egregium est irino aut cyprino diffusum. Bdellij, adipis utulini, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusq; sextanti, opopanacis, galbani, candryos, thuris, styracis, cuiusq; drach. viii. pipæris grana c. lxx. ceræ sexuncem, terebinthinæ sexuncem, sedis ungueti irini aut cyprini sextantem & unciæ dimidium, uini quantum sufficit. Ammoniacū, opopanaca, thus, trito cum aceto, liquefabilia uero liquefacto, & ab igne ablatis sicca inspergito: deinde etiam trita ipsi adijcto, & unita in mortarium diffusio, ac fortiter emollito, extractisq; uitior. Optimum est etiam eis ex pice brutia Galenicum pharmacū ad rabidi canis morsum descriptum. Habet autē hoc modo. Picis brutiæ libram i. opopanacis quadrantē, acetū acerrimi drac. i. apparato quādā modū de rabidi canis morsu prædictū est, Sermone sexto. Aliud pharmacū ex liquefibilibus, Gale-

nicum, quod cōcoquit simul, & attenuat tumores. Quo sanè in mollibus corporibus uel solo utendū. In durioribus uero ammiscendum est ei id quod ex metallicis cōstat ad fauciatos neruos destinatū, ita ut mixtura ubilibet iuxta corporum & affectionū naturā fiat. Habet autē hoc modo. Opopanacis unic. i. terebinthinæ chiæ unc. i. propolis tenerræ quadrantem. Si uero propolis tenera non sit, admiscebis terebinthinæ trientem; quod si neq; in totum propolis haberi possit, conijcto picis brutiæ sexuncem. Opopanaca in aceto albo cōtere. Hoc pharmacū prædictos tumores cōcoquit, & humores in alto sitos adtrahit, discat, & repurgat. Cæterū quod ex metallicis constat, item Galenicum, ad fauciatos neruos destinatum, hoc modo habet. Chalciditis, misyos, æruginis uisæ, cuiusq; drach. viii. colophonis, bessæ, squamæ æris drach. xxxiii. ceræ drachm. xvi. olei drac. cxxviii. resinæ drach. xvi. galbani drac. xii. acetū quantum sufficit. Chalciditis, misy, æruginis, æris squamā cum aceto in sole æstiuo contere ad plures horas, & liquefibilibus liquefactis & affusis, uni, emolli, acutere. Aliud Galenicum. Ad eos qui tenerū corpus habent & neruis faucij sunt descriptū. Chalciditis uisæ, misyos uisæ, cuiusq; drachm. viii. Squamæ æris drac. xxxii. thuris drachm. xxxii. ceræ drach. xvi. olei drach. cxxviii. resinæ drach. xvi. galbani drach. xii. acetū quod satis est: Apparato ut dictum est. His itaq; pharmacis utemur per se, ubi dolores ex profundo dissoluere uelimus. Miscebimus autem pharmacū ex liquefibilibus cōstans, ubi tumores fuerint obdurati. Malagma ad podagricos & articulos morbos ualde generosum. Liberat à tota affectione, uisus eius est per exacerbationum interualla. Ceræ lib. i. terebinthinæ lib. i. spumę nitri sexuncem, floris lapidis asij sexuncem. Thuris sexuncem, olei cyprini lib. i. lixiui coactiliariorum, siue pileariorum, quantum sufficit. Arida contundito, cribrato, & cum lixiuo ad liquidū cerati crassitudinē trito, & liquefabilia liquefacta tritis affundito, unito ac uitior. Aliud. Calcis uiuæ, thuris, cuiusq; drach. iiii. terebinthinę drach. iiii. ammoniaci thymiamatis drach. iiii. spumę nitri drach. iiii. adipis taurini drach. viii. floris lapidis asij drach. ii. cerę trientē, olei trientē. Liquefabilia liquefacto, & cū siccis unito ac uitior. Valde præclarum est. Resorbet collectiones circa articulos congregatas, & à dolori uis uindicat. Aliud, quod in totum ab omni affectione liberat. Seminis cicutæ, comę cetauræ, iridis illyrice, agardis, cardamomi, fœni greci, corticis radicis mādageris, singulorū sextanti, terebinthinę lib. i. olei ueteris sexuncē, ungueti syriaci, aut salicæ appellati, sexuncē. Terebinthinā cū oleo ueteri modice coquito. deinde unguetum addito, & ablatis ab igne arida trita inspergito: & unito, emollitq; in eis æreum aut stanneum reponito, uase tamen prius ex unguento malabathrino siue foliato illito. Hoc pharmacum crassos & mucosos humores trahit per obscuros meatus. Aliud ad eos qui à naturæ et articulare morbu cōtaxerunt. Vt pote quibus genua, humeri, cubiti, & reliqui articuli dolent. Ceræ, colophonis, resinæ pinus, cuiusq; sexuncem, terebinthinę unc. i. fœni greci sicci contusi & cribrati trientē. Cyprini trientem aut quantum satis est, Eliquatis liquefibilibus fœnum græcū insperge, & utere.



& utere. Aliud Ceratum ad articulem morbum pulchrum. Cere, adipis porcini, colophonias, resinę pinus, cufusq; lib. ii. butyri lib. i. cerebinthine lib. i. galbani trientem, adipis taurini lib. ii. cefypi lib. i. Liquefac, percola & adserua. Vfus uero tempore uento nardino dissolue aut etiā gleucino, & linteo lo exceptū impone. Aliud ad articulum morbum & podagricos, ut prae admiratione conserneris. Cere drach. c. rosacei drac. c. c. foliorum sideritis tenerorum drach. c. styracis drach. x. thuris drach. viii. niri drach. viii. mānæ drach. x. Liquefacta cū reliquis tritis unito, ac utitor. Sunt autem & alia quā plurima pharmaca quæ tumores tollere possunt post inflammationes adhibita: Maxime uero omnium quod ex aspidibus cōstat ad strumas desiri prūfacit ad eos quibus laxi tumoris magnitudinē detrudere uolumus: Subuertit enim quā plurimū tumores laxos, itemq; duos, eosq; simul diffundit. Cōstringit autē & cōdensat articulos prædare omni no si quod ex salicibus constat ei ammisceatur. Ego autē, inquit Philagrius, penuria pharmacorum ex metallicis præscriptorum, id quod ex salicibus apparatur ammisui & maximopere profeci articulis inde cōstrictis, densatisq; ac corroboratis, obfirmato uel delicti fluxionum humore prius euacuato. Licebit autem si quis ruri uiuat, & prædictis pharmacis careat, ex adipe qui ad manum sit, & arida pice cum resina pinus, aut etiam alia resina quæ haberi possit, pharmacum in cerati formam apparare, ipsiq; chalcanthi quancū uililiter recte habere uidebitur ammiscere: Salem item ac mysi, auripigmentum, & similia: Quin & uiscum & irin, aristolochias, pæoniam, peucedanum, gentianam, centauream, artemissiam, thymum, origanum, nitrum, niri spumam, thus, myrrham, styracem, propolin, mastichen, ac alia innumera his consimilia licebit reperire, indeq; pharmaca tumores cōstringentia componere, quemadmodum nos fecimus non paudes communibus ad podagricos & articulum morbos pharmacis inde apparatis. Philagrii pharmacū ex nitro & oleo.

Nitrum accipito friabile & nihil calculosum in se habens, idq; ipsum quā tenuissimè terito, olei tantum ad ipsum in mortariū affundēs quo trita simul ad mellis crassitudinem redigatur: atq; ubi satis diu contriueris cacabo excepta, ad lentum ignem nō fumantem coquito, assidue agiādo donec ad bonam compagem reducantur, animaduersione habita ne liquidius pharmacum relinquatur, quod ubi configerit, pharmacum penitus liquidum euadit, & neque in posterum inspissatur, nisi multam aliam sustineat coctionem, quę uim eius sicciozem, & ob id affectis dolore membris inuilem reddit. Probare autē eius compagem tempore coctionis oportet, ad testam aridam ipsum destillādo, testa nō prius humectata, quemadmodū in alijs pharmacis facere solemus. Resoluitur enim nitrū per aque cōactū. Sit autē oleum quod nitro affunditur dulcissimū, tenuiū parū aut rosaceū, aut chamæmelinū, aut anethinū, aut uetus, aut cīdnu, aut si yonū. Quandoq; etiam chamæmeli humidæ siue aridæ, aut iridis tenuissimè tritæ, aut aristolochiæ, aut aliusq; cōsimilis partē ammiscere prodest. Si quidem autē repellere simul ac discutere uelimus, aut etiā calidos dolores curare, cū rosaceo ipsum pharmacum coquemus, aceto quādoq; in co

ctione aut modico passo affuso. Si uero amplius discutere uelimus cum aliquo alio oleo coquemus, ammixtis etiā quibusdā præscriptorū aridorū, iuxta haberi uidelicet curādi corporis & cōpagem ipsius tumoris. Hoc sanè pharmacū dolores in alto obortos quā celerrime sanat, atq; id eo magis si non biliosum sit, neq; multū calidum quod influit. Neq; uero solū podagricos dolores ex professo iuuat, uerū etiā eos qui tales nō sunt, sed ex fluxionibus cōgregati & disculsiōni alijs resistentes. Viūmur itaq; ipso si post sedatas inflammationes dolores in alto permaneant. Pharmacū ex urina Bordonis, hoc est, muli apparatū. Aurahit quidē hoc priore præstāius. Cōuenit autē magis crasis & crudis fluxionibus, præsertim si cū chamæmelo uiridi uel sola, uel cū adipe porcino rectū, fuerint prius cataplasmatīs modo cōrectæ: cū arida uero iudē eodē adipe ammixto, ampliusq; farina fabacea, aqua & oleo ac modico passo adiectis. Quin & ipsa anthemīs, quæ & chamæmelon dicitur, ualde calidos dolores & inflammationes maximopere ex natura sua iuuat, statim post uigorē adhibita. Etenim cui rarefacit & attenuat moderate, & biliosos humores trāsīrare facit, adeo ut huiusmodi inflammationes etiā sola, nihil ex attenuatorijs & incisorijs, ueluti est artemisia, & aristolochia, & calaminthe, & alia infinita, admixtū habēs, curret. Hoc itaq; pharmacū ex argēi spuma & urina apparatū, de quo sanè sermonē instituit, scio quosdā circa totius affectionis uigorē, nō modo iuxta particulas exacerbatōnes, aliquādo uero & augmētū tēpore, ad dolētes locos pro cataplasmate impo fuisse, humoresq; forinsecus extraxisse, & tumores qdē maiores reddidisse, dolores tamē omnino sedasse ac extirpasse. Ceterū odor ipsius intolerabilis est eis q; tēnero olfactu sensu prædicti sunt. Cōpositio uero talis est. Vini muli masculi nō castrati, sextarios Italicos iiii. spumę argēi lib. ii. Spumę argēi tenuissimè tritā in mortario habeto, eiq; urinā affundito, ad solē uidelicet æstiuū exposiē paulatim urinā instillato, & postquā ad mellis spissitudinem peruenierit, urina scilicet cōsumpta, olei unc. x. iiii. addito, adipis porcini ueteris unc. x. vi. & usq; quo nō amplius inquinari manus, coquito. Vfus uero tēpore linteolo exceptū imposito. Oribasius autē axungię lib. i. cōiecti, & medullæ ceruinæ nō falsæ beissē, & mellis lib. i. ii. reliqua uero eodē modo. Scribunt porro quidā proprii muli urinā accipiendam esse. Resistit enim & obluatū morbo ex natura sua hoc animal. Efficaciū autē, aiunt, redditur, si quis dū coquitur ipsa semel in cacabū expuat, & semel in terram. Atq; hæc cum quibusdā barbaris nominibus inueni ret licet ascribere, quę sanè curiosam penitus habent scripturā, atq; ob id superfluum & indecorū mihi uisum est, inquit Philagrius, ea ascribere. Etenim cū tra eorū nominum intentionē ac nomenclaturam, ipsum pharmacū apparatū, eodē modo efficax est, sicut id quod cum nominibus præparatur. Hippione Anthi uiridis unc. x. v. i. scilicet recētis sex uncem, olei omphacini septuncem ac uncē dimidium, aque sextarios iiii. Anethum & scillā in aqua & oleo ad tri-duum macerato, deinde donec aqua consumatur coquito, & percolato oleo ceræ nouæ lib. ii. adiecto medullæ ceruinæ libram i. aut si hæc non addit,

adipis ceruſini libram unam, adparato & uitior.

*Cerata podagrica.*

Cap. XLIII.

Ceratum ex ſucco ſeneſionis ualde pulchrum. Ceræ libram unam, olei chamæmelini dodrantem, adipis porcini recētis ſexuncem, croci drachmas quatuor. Crocum cum ſucco ſeneſionis terito, liqueſcibilia aurem liqueſcito, percolaro, & ſucci quantum expedit paulatim inſtillato, fortiterque agitato, atque ubi reſiſerint, ad crocum tritum adiſcito, & ſubacta unito, ac uitior. Ceratum dolore leuans, ad inflammationes in uigore conſtitutas. Appellatur autem Manus Aſclepiadæ. Facit ad excellenter in ſtammata, eadem hora liberans citra dilationē. Succi haſtulæ regiæ cyathos IIII, ſucci ſolanī cyath. IIII, ſucci bupthelmini cyath. IIII, ſucci perdicij cyat. IIII, ceræ, butyri recentis, axungie, medullæ uitiulinæ, caldis utruſque quadrantem, terræ cimolifæ drach. XII, terræ ſamiæ drach. XII, ſandarachæ drach. XII, nitri bernicarij, ſpumę nitri, cuiuſque drach. XII, ſecis uini uſtæ drach. XII, gluſinis chartarum, hoc eſt polliſ cocti, drach. XII, olei boni lib. III, apparo & utere. Aliud ad præſcripta item effiac. Ceræ, color phoniæ, adipis anſerini, ceruſæ, cuiuſque drach. XVI, picis drach. IIII, ſucci braſiicæ, cyathi dimidium, ſucci ſoni græci cyathi dimidium, ſucci ſeminis lini cyathi dimidium, ſucci ſtratiotæ cyathi dimidium, ſucci ſerulæ campanæ cyathi dimidiū, lactis bubuli cyathi dimidium, oua gallinarum numero IIII, olei libras I. Ex hiſ cerata duo ſcito, eaſque unā cum eis que Aegyptia inſcribuntur, in promptu habeto, quæ pauci adeo homines habent, apparato conſidenter, nulliq; reuelato, & plus quā hominis nomen aſſequeris. Podagricum aliud ceratum approbatiffimum. Facit ad inflammationes & dolores, etiam in principijs impoſitum celerrime ſanat, & neruus arefactus emollit, adeo ut quidam ei hanc ſaculatore inſelle non credant, diſſoluit & pedum nodos tumores condylomata Græcis appellata. Olei cicini lib. II, ſucci mandragoræ, drach. XXXI, ſucci artemiſiæ, drach. XXXIII, ſucci rumericis, drach. XXXIII, reſinæ pinus, drachmas XLVIII, terebinthinæ, drach. XLVIII, adipis anſerini, drach. XLVIII, ſucci rubi, drach. XVI, butyri recentis drach. XLVIII, lycij indiſci drach. XXXIII, ſanguinis hircini ſiccī drach. XVI, lacrymæ hedere drachmas XXXII, galbani drachmas XLVIII, opopanax drachmas XXXII, Lycium & ſanguinē hircinum & panacis ſuccum cum modico uino terito, & aſſuſis ſuccis, ſi quidē liquidi aſſuerint, aut ſiccis, ſi illi haberi nequeant, unio, liqueſcibilia autem liqueſcito, eiſque trita adiſcito, & ad lenū ignem coquito, ſpathula aſiſdue agitando donec cogātur. Cæterum ligna quæ ad coctionem eorum ſuburuntur, ari dā uicis farmēta eſſe oportet. Ceratū podagricum ex bryonia. Egrege facit ad omnes inflammationes & dolores articuloꝝ. Hacluſus & in uigore & in remiſſione ſucceſſum & gloriā reperi. Reperies enim inflammatas partes corrugatas & citra dolorem. Frequenti experimento nobis cognitum eſt: ſam multos eo ſeruauimus. Radiciſ cucumeris ſylueſtris drachmas CCCCLXVI, ſcilleg munda drachmas CCCCLXXX, radiciſ haſtulæ regiæ drachmas CXLIII, olei raphaniſi drachmas CCCCCXCVII, ceræ drachmas CXLIII, galbani drachmas XLVIII. Herbas omnes in aqua ſufficienti per triduum ma-

deſcito, ſingulis diebus bis ipſas ſenſim agitando. Deinde aſſuſo oleo, coquito, donec oleum ſolum reſingatur ad lentum omnino ignem, percolato deinde, & ceram ac galbanum in mortario diligenter trita & emollita addito. Quibus omnibus poſtremū liqueſactis, & ab igne ablatis uitior ad omnes doloris affectiones. Hoc etiam ad uicerū diuturnas inflammationes ſum uſus. Ceratum in multis approbatum, ad inflammationes pedum, diſcutiens citra dolorem. Vtere eo in uigoribus, & magis in declinationibus. Olei anethini quincuncem, chamæmelini quincuncē, butyri quincuncē, adipis anſerini quadrantē, ſarinæ lupinorū ſextantē & dimidiū uncia. Liqueſcito & agitando refrigerato, in mortariūq; inſundito, terito, & ouorum quinq; croceæ ſingulatim inſicto. Deinde & lupinorum ſarinam inſpergito, unito, uitior. Ceratū Iacobi Phyſiciffæ, ad ſeruētes pedū inflammationes. Ceræ albæ ſexuncē, roſæ cæci recētis unc. xv, ouorum quinq; candida, aquæ ſepruncem & uncia dimidiū. Ceratum ad prunas liqueſcito, & diligenter agitando refrigerato, deinde in mortario fundito, & adiectis ſingulatim ouorum candidis terito, poſtremū inſtillata ſenſim aqua omnia rite unito, & noua olla ſufficienter prælota exſcripto, & inſuſa aqua pura ſinito, quotidie aquā permutando.

Vnguentū ex acopa diuerſa ad podagricos, articuloꝝ dolores, iſchiadicos, membris exolutos, extremes.

Cap. XLIIII.

Vnguentum Aſclepiadæ. Facit podagricis, articuloꝝ doloribus, & ad omnem neruorum perconſenſum affectionem. Vini ueteris ſextarios duos, lanarum ſucidarum ex locis ſub alis libram unam, ſpumæ nitri libram unā. Lanæ ſuccidas in uino per triduum maſeſcito, deinde expreſſo liquore, ſpumam nitri tenuiſſime tritam inſpicio, diſſoluiturque, ac olei libras duas addito, & cōquallaſta in uitrum uas reponito, & uitior, quotidie agitans & ex eo illiſens locos affectos à ſomno, & ante balneum, & poſt balneum, & à cena. Aliud unguentum ex ſale podagricos à tota affectione liberat. Salis ſordidi, hoc eſt ipſius terræ libram unam, aluminis ſciſſi libram unam, ſecis uini ueteris ſextarium unum, ſloris lapidis aſij trientem, Arida ſigillaſta unum quodque per ſe diligenter terito, deinde oleū ſecē adiſcito, ſimulq; terito, & ad trita demū oleū ueteris ſextarios duos aſſundito, cōquallaſta, reponito, ac uitior. Qui dā etiā mellis librā unam addunt. Aliud ſitidē Aſclepiadæ. Thuris quadratē, ammoniac thymiamatis, zingiberis, piperis, ſalis ſordidi, ſloris lapidis aſij, aluminis ſciſſi, cuiuſque uncia unā, galbani unciam unā, opopanax ſeſquunciam, terebinthinæ quadrantē, olei cyprini, laurini, ſamſucini, & ceræ, ſinguloꝝ ſexuncē, æceti quantum ſaris eſt ad ea quæ diſſoluerē oportet. Vtere in frigidioribus. Aliud optimum. Spumā nitri albā cum oleo ueteri terito, coq; locos affricato, & miraberis. Aliud, Aſclepiadæ. Vini ueteris ſextarios tres, olei ueteris ſextarios duos, uirguloꝝ lauri libram unam, ſoliorum teneroꝝ aut pilularū cupreſis teneriorum libram unam, ceræ libram unam, galbani unciam unam, ſanguinis teſtudinis terreſtris ſaris largam copiam. Herbas in aceto macerato, deinde coquito, & ad decoctum liqueſacta reliqua addito ac unito, & ſanguinem

testudinis recenti affuso cōquassato, & utitor. Olei gleucini præparatio. Oleum gleucinum dolores & lassitudines nervorum quàm maxime sedans. Habet enim uim calefactoriam relaxantem; facit ad affectiones uulvae, & ad omnem nervorum per consensum affectionem. Facit ad rigores per circuitum repetentes, quotidianæ præsertim & quarantæ febris. Omni enim acopo præstantius est. Maxime autem facit ad eos qui tum retro, tum ante dissenduntur, opisthotonicos & emprosthotonicos Græcis appellatos, si calidum puris lanis exceptum locis imponatur. Compositio eius hoc modo habet. Olei omphacini primarij libras octo, uini salerni ueteris odorati sextarios quinquaginta italicos; musci ex uua aminæa, hoc est adstringente alba sextarios itali eos centum quinquaginta, olei libras duodecim, aspalathi libras quinq; spathæ unguentariæ quam palmam elaten appellant, libras quinque, hedydari hoc est seminis pelecini sesquilibrâ, artemisîæ libras duas & semissem, cyperi libras duas & semissem, pi peris sesquilibram, musci qui splanchon & hypnō & bryō Græcis appellatur, libras duas & semissem, xyloballami libras duas & semissem, afari libras duas & semissem, calisæ nigræ libras duas & semissem, carpopallami, scœnigræci, cuiusq; lib. ii. & semissem, foliorū myrti aridorū dextantem, rosamari ni sicce lib. v. calami aromatici libras quinque, iunci odorati floris libras quinq; thuris libras quinque, crocomagmaris primarij libras, quinque, nardi celtici libras quinq; zingiberis libras tres, quidam uero libram unam & quadrantem, aristolochiæ longæ libram unam & quadrantem, styracis pinguis libram unam & quadrantem, calisæ fulgæ libram unā & quadrantem, ladani, seminis cardamomi, amomi, radicis pagnæ, melisiothi, samfuci, cuiusque libram unam & quadrantem, bdellij sesquilibram, croci libram i. & besslem, costi libram unam & besslem, rosarum siccarum libram unam & quadrantem, opobalsami uasculæ parua quinq; hoc est besslem, hoc est hemicæ tercia partes duas, unguenti malabathrini libram unam. Arida contundito, & rariore cribro excutito, omniaq; uino ueteri macerato. Bdellium autem & ladanum præmacerata in pila terito, & ad arida prius macerata adiçto. Sit autem uas unguentarium staneum, quod diligenter operum ad dies & noctes duas finito. Deinde uas flassidam, ita ut nihil roris ei adhaereat accipito, ac pure exprimito, & ex acinis excolato, inq; aliud uas stano illustratum ipsum mustum infundito. Sit autem magnum uas & capax: quo etiam ad ebullitionem musti locus amplius supersit. Deinde omnia in ueteri uino macerata, itemque oleum ipsum in mustum iniçto, & spatha unguentaria bis per diem agitato. uero spatham diligenter detergere oportet, ne quod adheret ei acidū factum pharmacum corruptat. Cæterum uas ipsum operculo & pallijs pluribus superne contegatur, & diligenter obligeur, supponaturq; uasi circulus ex quacunq; materia qui ipsum sustentet. Quomodo uero dies quindecim præterierint, amomū cōsum iniçiat, rufumq; ut dictū est agitur. Tri gestima autem die in diplomate coquito, atq; ubi ter uel quater effebuerint ab igne ablatis statim opobalsamū indiçto, agitaatq; & probe cōfecta reperfieri finito. Deinde totū oleū resta excipito; secem autem,

hoc est calida per sportulas primū manibus, postea etiā prelo exprimito, & abiectis rebus instar sceni exiccatis, unguentum per se curato: malabathrinum uidelicet unguenti in diplomate in aqua calida prætefactū ei adiçto, & cū spatha agitato, & probe unito, & per biduum cōsistere finito, ac mūdīs testulis excipito; indeq; in uasa uitrea transferens reponito. Quidā etiā ammoniaci thymiamatis lib. i. & quadrante adiçtū. Acopon ex abiete apparatus.

Abietis semē maxime maturū circa Septembrem est mensem. Verū quocunq; anni tempore libuerit, ipsum semen oleo iniçere oportet: præstat tamen si prius contusum iniçias, & per dies quadraginta stinas. Nos autem, inquit Galenus, etiā ad tres & quatuor menses permisum macerari; deinde liquore seminis expresso, ipsum quidē semen abieciū, oleū uero per linteolum excolauimus. Sit autem oleum dulcissimū, & ad libras olei uiginti quinq; seminis modius italicus unus iniçiat. Itaq; ubi oleum, ut dictū est, excolaueris, ac semen segregaueris, ceræ libras iiii. terebinthine chiæ besslem ei adiçto, & mo dice quo uniat̃ur calefacto, excipito ac utitor. Hoc pharmacum cōuenientissimum est ad omnes spontaneas lassitudines, itemq; nō spontaneas, & ad nervorum per consensum affectiones. Eo uti conuenit ad eos qui iuxta carnem atq; omnem corporis molem crudos humores congregarunt, siue concoctione, siue uia discussione opus habeant. Acopon ex populo nigra. Bonum est etiam acopum, quod ex populi nigræ floribus componitur. Est que huiusmodi. Ad florum populi nigræ iam iam prodeuntū modium unum, olei dulcissimi libras uiginti iniçitur. Melius tamen fuerit, si flos moderate contusus oleo iniçiat. Exponatur autem ad solē, & singulis diebus agitur, & in domum calida deponatur. Post menses autem tres florem exprimito, ipsumq; abijçto. Oleum uero ut acrimoniam arcens, & lenissimū, & diffusorium adseruato: uelut id quod ex abietis semine est apparatus. At uero & terebinthina sexuncem iniçere licet, aut minus, aliquando item parum ceræ: quidam enim maxime liquidorum medicamentum usu gaudent, quidam uero crassiorum. Hæc autem pharmaca crudos iuxta carnē & cutem humores discutere possunt, præsertim non ualde crassos, neq; uiscosos. Quod si quis confestim & necessitate moram omnem excludente apparare cogatur, semē ipsum in oleum coniçere oportet, & in diplomate coquere. Infundere autē ad oleū in decoquēdo tantū aquæ aut uini, quātū cōsumi potest, ut tamē quadruplū aut quintuplū oleum extet. Oleū samfudnū sâsucinū etiam oleum eodē modo apparatus. Cōuenit autē tēpore hyberno, & in regione frigida, & cōstitutione aëris frigida. Potest & ad hoc ceræ & resinæ quippiā addi, si corporibus ex eo illitis, diutius ipsum adherere uelis. Acopon unguentum Marciacon. Unguentū Marciacon præclarū ad articulorū morbos & corporis lāguores ac resolutiones. Styracis primarij flauī trientē; medullæ ceruinæ sextantem, ceræ albisimæ quadrantē, mastiches puræ quadrantem, terebinthinae chiæ unc. i. cœsypti unciā i. opobalsami unciā i. olei omphacini, unguenti nardini cuiusque sexuncem, Styracem in pila cōtū de, opobalsamo paulatim instillato. deinde liquefacta liquefacto & percolato, eisq; styracē iniçito: quoliue

quo liquefacto in mortarium omnia transferro, & pistillo donec quàm albisimū fiat terito, & ac uitor.

Vnguentum Orcheæ, siue Saltatoris, dolores remittens ac relaxans, ischiadidis ac arthriticis commo- dum, multo experimento cognitum. Hoc Saltator quum gymnasiolorum consuetudinem reliquisset, & in articulare morbum incidisset, usus sanatus est. Cuius item periculum in multis alijs factum est.

Habet autem hoc modo. Altheæ, feminis lini, scenigræci, rutæ, fabæ, singulorum libr. ii. Hæc in aqua madefacta, & terio die post cocta, ut quàm crassissimus eorū liquor fiat, percolato: & succi quidam excolati lib. iiii. cōiuncto, olei uero ueteris, medullæ ceruinæ, opobalsami, adipis anserini, unguen- ti nardini, singulorum libras duas, ceræ colopho- niæ, & resinæ pinus, singulorum libras iiii. euphor- biæ, opoponacis, terebinthinæ, singulorum libr. i. cas- storei sexuncem, addito, ac uitor confideret. Pen- tamæron, hoc est quinquimembre vnguentum.

Syracis unciam unam, mastiches sextantem, ceræ albæ quadrantem, opobalsami trientem, unguenti nardini quincuncem. Ceram cū nardino super pru- nas liquefacto, styracem uero cum opobalsamo te- rito, & ad ceratum unā cum mastiche iniuncto. Lique- facta quæ percolato, ac in mortario diligenter terito, do- nec quàm albissima fiant. Vitor. Decamæron, hoc est decumanum, Oribasij. Spicæ nardi, folij, eu- phorbiæ, piperis, costi, adarces, singulorum unciam unam, mastiches sequunciam, opobalsami quadran- tem, ceræ sexuncem, unguenti nardini libram unā.

Alia uaria unguenta. Vnguentum ad morbum articulare, & omnem neruorum per consensum affectionem, approbatum. Syracis pinguis un- ciā unā, ladanij pinguis unciam unā, mastiches unciam unā, ceræ sextantem, olei sicyonij quadra- tem, adipis anserini libram unā, uitor. Aliud mirabile. Asphodeli radicem in superficie dera- sam accipito, & cōtusam cum oleo sufficiente coqui- to, percolato, & ad oleū modicū syracis cōiuncto, quo eliquato sycomorū succum addito, & unis uti- to. pedes autē si inde illeueris, confestim dolorē seda- bis. Aliud, per multā experientiam cōstans, celer- rime dolores mitigans. Adipis hircini recētis lib. ii. heliotropij tria grana habētis foliorum uiridum si- brā i. ouorū assatorū lutea quinque, rosacei optimi triētē. Vere. Aliud. Olei dulcis sextarios v. scē- nigreci sextarios iiii. radicū altheæ, maxime uiri- diū, uerbernacæ foliorum, singulorū fasciculū man- ipularē, galbani dra. iiii. scenigræci mundati & lo- tum cū uerbernacæ & altheæ ad biduum in aqua ma- defacto. tertia uero die infusum oleū ad lentū ignē coquito, assidue quæ agitato, ne focum græcum adhuc rescat cacabo, postquam uero herbæ omnem liquorē emiserint, eas extrahito, ac oleum percolato, seorsim uero cū modica olei parte galbanum præmollium liquefacto, percolato, & ad reliquum oleum adijec- to. Vitor sensim & quàm plurimum inungendo. sa- cit ad omnem neruorum per consensum affectionem, & dolores à frigore obortos. Aliud ad idē. Me- dullæ à medio scillæ quadrantem, feminis cucume- ris syluestris quadrantem, scenigræci repurgati sex- tarium italicum i. anethi uiridis sexuncem, samu- ci sextarium italicum i. baccarum lauri sextarium i. ferulæ campanæ lib. i. ceræ lib. i. bulborum ciba-

riorum quadrantem, adipis porcini recētis libr. x. uini ueteris odorati sextarios vi. Omnia in uino ad triduum præmacerato, & deinde adipe liquefacto ad macerata infuso, omnia ad uini consumptionem coquito, exprimito, ac percolato: & reliquis abie- ctis, ceram ad adipem liquefacto ac ammisceotatq; hoc ipso, ut præter opinionē præstati uitor. Smeg- ma podagricum. Ceræ sexuncē, colophonis sex- uncem, succi feminis lini trientem, adipis anserini sextantem, terebinthinæ quadrantem & uncia dimi- dium, olei omphacini dextantem, ammoniaci thy- miamatis unciam unā, thuris quadrantem, lactis bubuli quadrantem & uncia dimidium, candida ouorum nouem. Ammoniacum, & thus, cum lacte & succo feminis lini terito, deinde candida ouorum adijuncto: liquecibilia autem liquefacto & refrigera- to, atq; ad trita ammisceot, & psyxide lignea excipi- to. Vitor autē tum pro emplastro, tum pro unguen- to. Vnguentum Castini, ad podagricos & arthri- ticos, eo sanauit quendam uniuerso corpore langue- factum & exolutum, unice tamen articulo rui mor- bo prodest. Adipis leonini unc. i. adipis ursini lib. i. adipis equini lib. i. adipis uulpis lib. i. castorij sex- tantē, medullæ taurinæ sexuncē, medullæ ceruinæ quadrantem, adipis struthocameli quadrantem, adi- pis phasianij saginati quadratē, euphorbiæ sexuncē, opoponacis trientē, mastiches lib. i. syracis triētē, myrrhæ trientem, thuris sexuncem, ammoniaci thy- miamatis sexuncem, heliotropij tria grana habentis unc. i. pæoniæ sextantē, artemisiæ unc. i. phylli sex- tantē, nardi celticæ sextantē, radicis altheæ cōtusæ & cribrate unc. i. rutæ uiridis dra. iiii. radicis cucume- ris syluestris unciam unā, hippuris herbæ unciam unā, aristolochiæ dra. iiii. aloës lib. i. sanguinis dra- cunculi libram unā, ceræ sexuncē, colophonis sex- uncem, unguenti nardini libras octo, olei suffumiga- bilis libram unā, opobalsami septuncem. Arida quàm tenuissime trita in mortarium ad styracem cū opobalsamo & ruta tritum indito, unito, ac uitor sedulo. Vnguentum ex hedera, ad arthriticos, ac omnem musculorum aut neruorum per consensum affectionem. Mirabiliter etiam ischiadici prodest.

Foeni græci lib. i. baccarum lauri numero centū, pilularum cupressi numero xxx. sabinae lib. i. rosma- rini lib. i. olei dulcis aut ueteris lib. i. ceræ lib. i. resi- næ pinus lib. i. terebinthinæ sexuncem, succi hederae trientem, aquæ sextar. iiii. Herbas in crassiores par- tes contusas ad triduum in aqua macerato, deinde adiecto oleo sufficienter coquito, & percolato, lique- scibilia liquefacta adfundito. Hederae autem succū cum aceto diluito. Refrigeratis deinde liquefactis omnia in mortarium diffundito, & quàm plurimū diligenter terito, reponito, ac uitor. Acopon ad molestias ex laboribus & fastigationibus obortas, facit & ad neruorum per consensum affectiones, ue- hementer cōmodum est. Hoc uitor, inquit Asclepia- des ad fatigatos. Samu- ci sextarium i. rosmarini cōtusi sextarium i. scenigræci sextarium i. cardamo- mi sextarij dimidium, sabinae sextarij dimidiū, uini dulcis sextarios vi. olei optimi sextarios iiii. ceræ lib. ii. Arida in uino cōiecta per triduum mace- rato, deinde affuso oleo ad prunas assidue agitando coquito, & quum sæpe ebullierint percolato, cerā quæ in eis eliquato, refrigerato, reponito ac uitor, quan-

doq; quidem immixtio, aliquādo uero cū quodam unguēto diluto & liquefacto. Aliud arthriticum, Asclepiade: pharmacum prosperi successus, Ballo in scribitur, quo usus quā antea multo tēpore paralyti cus fuisset, ab illa affectiōe liberatus cōualuit. Olei melini, olei cyprini, olei myrtel, cuiusq; trientē, olei ueteris sesquilibram, cere libram i. terebinthinæ sex uncē, galbani quadrantē, mannæ trientē, opopanax cīs sextantē, castorij sextantem, radiciſ bryoniæ triē tem, æruginis sextantē, spumę niri albę trientē, pipe ris sextantē, pyretri sextantē, euphorbij sextantē, adi pis hœdini sexuncem, aceti quantū satis est. Bryoniā & pyretrū cum aceto coquito & percolato, eoq; de cocto arida terito, & reliqua liquefacta eis infundit o, ac unito. Vtitor aliquando immixto, aliquādo liquefacto cum quopiā unguēto. Anthi utride acopon, ad podagricos & arthriticos cōsido experimē to cognitū, utere & ad ischiadicis cōsidenter. Phussequiuncā, mannæ sesquiciam, œsypis sesquiuncā, ammoniaci thymiamatis sextantem, aluminis scissi drachm. v. æruginis dra. v. terebinthinæ quincuncē, spumę niri albę trientem, opopanax drach. v. galbani drach. ii. medullæ ceruinæ drach. v. olei cyprini trientem, olei melini trientē, ceræ quincuncē, mel lis quincuncem, olei ueteris lib. i. Acuginē, ammo niaci, alumen, mannā, opopanax, cum modico ace to tere, eisq; liquefacta affunde, ac utere ad omnes cū oleo melino eliquato: In inueteratis uero affectio nibus etiā adarces & euphorbij, cuiusq; unc. i. adde.

Aliud eisdem. Opopanax quadrantem & drach. iiii. terebinthinæ drach. iiii. ammoniaci thymiamatis scrupulos x v. œsypis scrupul. x viii. æru gnis scrup. x vi. propolis scrup. x v. aluminis scissi, ladanī, aristolochiæ rotundæ, lacrymæ hederæ, singulorū scrup. vi. spumę argenti scrup. iiii. falis ammoniaci scrup. ii. camphoræ unc. i. colophoniæ qua drantem, ceræ quadrantem, olei quadrantem, utere cum unguento quopiam dissoluto. Aliud acopō unguentum ad paralyticos in principio. Olei gleu cini, cyprini, irini, laurini, singulorum libram unā, ceræ trientem, terebinthinæ sextantem, œsypis sextan tem, castorij unc. i. euphorbij drachm. iiii. ex hoc tū affectæ partes, tum eæ quæ facili affectiōi obnoxie fiunt, illinuntur. Aliud acopon ad coxendicum morbum inueteratum, distortiones & resolutiones paralyticas. Est autem, inquit Asclepiades, ualde effi cax. Olei ueteris libras ii. irini sexuncem, styracini sexuncem, baccharum lauri sexuncem, terebinthinæ, euphorbij, ammoniaci thymiamatis, castorij, pipe ris, opopanax, galbani, cuiusq; sextantē, medullæ ceruinę trientē, & drach. iiii. Liquefabilia liquefaci to, & ad arida affundito, unito, ac utitor. Aliquādo quidē immi xto, quādoq; uero cum rosaceo aut alio quopiā unguēto liquefacto. Arida uero uino terun tur. Vnguentū ad opisthoronicos, & quibus cani no more os distorquetur, ex melle apparatū. Olei irini, rosacei, gleucini, cyprini, cuiusq; sexuncem, ce ræ quadrantem, mellis unciam unam. Aliud, ad eadem. Ceræ drachmas quinquaginta, terebinthi næ drachmas x v. œsypis, medullæ ceruinæ, galba ni, ammoniaci thymiamatis, spumę niri albę, bac charum lauri aridarum, singulorum drachmas vi. olei ueteris sextarios sex, uini heminam unam. Vti tor. Vnguentum ad resolutiones, ualde pulchrum,

Sphæritidis, hoc est, cupressi pilulas ferentis sextā rem, marrubij sextantem, herbæ caualidis quæ bul borum figuram habet sextantem, stercorum cameli unciam unam, ampeloprasii unciam unam, eryngij unciam unam, cyclamini unciam unam, bituminis unciam unam, peucedani drachmas quatuor, terræ ampeltditis unciam unam, feminis apij, cyperi, lapi dis gagatæ, dictamnī, cuiusque unciam unam, sul phuris drach. iiii. lactis asinini sextantem, unguentū fusini quadrantem, medullæ cameli quadrantem, adipis asinini unciam unam, pilorū ex cauda simiæ drach. iiii. olei ueteris sextantem, aceti dodrantem. Apparatum reponito: usus uero tempore cum un guento aliquo diluto utitor. Acopon Eræ Cappa docis, ad resolutos, & in uniuersum ad omnem do lorem musculorum & neruorum. Rutæ uiridis, pulegij, cyperi, fenigreci, mercurialis, marrubij, ros marini, aristolochiæ, amygdalarum amararum re purgatarum, singulorum libram unam, niri sextan tem, iridis terebinthinæ, baccharum lauri, radiciſ cu cumeris syluestris, ammoniaci thymiamatis, sabinae cuiusque libras duas, myrti uiridis libras tres, folio rum lauri aridorū libras tres, ueratri albi sexuncē, ceræ libras duas, bdellij libras quatuor, uini cōgios quatuor, olei congios tres. Quę contusione opus ha bent, crassas in partes contundito, ac modicam aquā, qua cōsua tantum humectentur, affundito, deinde uinum & oleum adiçito, & per diem unum finito. Sequenti uero frequenter agitando coquito ac per colato. Postremum ceram & terebinthinam addito, itemq; bdellium in modico uino prius tritū. Acopon ex rubetis quod omnem affectionem tollit. Ra dicis cucumeris agrestis uiridis libras sex, olei dul cis libras sex, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, ceræ, cuiusq; sexuncem, ranas rubetas appellatas uiuas nu mero sex, rubetas traieçto per pedis plātam filo in oleū demissas donec flaccescāt coquimus: deinde ex tractis per plantas filo traieçtis ranis, syluestris cucu meris radicē uiridē cōcisam inijcimus, atq; donec ui res suas in oleum transmutat, coquimus & ex cola mus: postremum liquefacta, iidem percolato, ad oleum addimus, & in uitro reponimus. Vtere mane & uespere ad podagricos, arthriticos, ischiadicos & resolutos. Per huius usum nouimus homines à pos dagra & chiragra toto corpore distortos post lauacrum in tantum cōualuisse, ut citra omnem offen sionem obambulant. Quandoq; apparauimus, in quit Asclepiades, hoc pharmacum additis ad hanc descriptionem samfuci libra una, unguenti crocini li bra una, opobalsamī quadrante, sanguine testudinū numero decem. Aliud, ad podagram & articula rem morbum mirabile. Facit & ad diuturnum capi tis dolorem, materiam ad supericiem ducens, & ad frontem ac sinciput. Caniculam paruam probē sa ginatam uiuam, & mustellam uiuā in olei sextarios nouem, ac butyri libras tres, coniçito, atq; donec uieta fiant animalia coquito: deinde in percolatum oleum calidum pedes aut manus per totam diem imponito. Galenus autem ait. Quidam uulpeculas & hyænas oleo incoquunt, eoq; articulum more hos curant, atque alij quidē ipsas uiuas in maxi mum lebetem inijcunt: alij uero mortuas, ac deinde unā cū oleo quā diuissimē coquunt. Solia deinde ac urnas ex oleo calido explent, atque deinde arthri ticos

ricos incendere, ac multo tempore in eo morari su-  
ben. Porro oleum hoc maxime discussorium reddi-  
tur, adeo ut etiam ad superficiem extrahat ea quæ in  
profundo corporum continentur, quæ ex re magna  
commoditas consequitur. Quin & herinacæ terre-  
stris uisui oleo incocti ipsum discussorium reddunt.  
Etenim oleum hoc dolores sedat, tum affectis articu-  
lis in ipsum demissis, tum etiam ipsidem ex eo illitis.

Alia unguenta podagrica. Terram nigram, quæ  
præsertim in lentacula reperitur, aut etiam aliam nig-  
râ cū aceto terito, ac illinito. Sedat dolores & infla-  
mationes etiam in his qui multa prius experti nihil  
profecerunt. Aliud. Cypri folia uiridia trita in  
pastillos redigito, eosq; usu expetente cum aceto te-  
rito ac illinito. Aliud. Croci undam unam, salis  
usti undam unam, spumas nitri numero decem, oui  
luteum unius in spinæ decocto ad tertias redacto, te-  
rito. Aliud. Vitrum in aceto probe tritū confide-  
ter illinito. Aliud. Alumen aceto tritum illini-  
to. Aliud, quod ad genus fluxionē solum pro-  
fuit, multis antea frustra admotis. Marmor, hoc est,  
crustulam non usitam, contusam, & cum rosaceo tri-  
tam illinito. Ego autem scobem & ramenta marmo-  
ris lota & resiccata in promptu habui. Vsu uero ex-  
petente cū rosaceo trita adhibui. Aliud, ualde bon-  
um. Tecolithi, glaucii, myrrhæ, cuiusque undam  
1, aloës drachm. iiii. Terito, ac siccum adseruato.  
Vsu uero exigente, luteum oui & uinum austerum  
ammisceto ac illinito, & si circumtendat cum so-  
lo uino adhibeto. Aliud. Aëritem lapidem cum  
ouo ac modico rosaceo illinito. Aliud. Vrticæ  
semen & hirundinis nidum cum sapa terito ac illi-  
nito. Aliud mirabile, pro diuturnis. Mameram  
aqua macerato, deinde tritam illinito, & miraberis.

Aliud, multa experientia cognitum, inueteratæ  
etiam affectioni accommodatum. Stercoris coc-  
ciæ quadrantem, cum pari axungia tritam illinito.  
Vtere, inquit, neq; cuiuspiam patefacito. Multos enim  
seruauit. Aliud. Caninū stercore albi cum aqua  
calida tritū, atq; ita tepefactū quam crassissimè illini-  
to, & solia oleis alicuius supra illationē imposito.

Ad durities in artubus instar toforum. Cap. XLV.

Est & hoc optimum pharmacum ad durities artuum  
in tofos coactas. Sunt præterea & alia quædam, ma-  
ximè uero Galenicum, quod ex caseo componitur.  
Ac nostrum itidē ex huiuscemodi rebus apparatus,  
inquit Philagrius. Radicis peucedani drachmas ii.  
ammoniaci thymiamatis drachmas ii. myrrhæ dra-  
xiiii. aristolochiæ drachmas vi. pumicis drach-  
mas vi. castorij drachmas iiii. lanarum succidarum  
ustarum drachmas viii. floris lapidis asij drachmas  
sex, si uero non adsit, salis ammoniaci usti drachmas  
sex, propolis teneræ drachmas sedecim, stercoreis ca-  
nini siccis drachmas sex, uisci drachmas sedecim, æru-  
ginis drachmas sedecim, squamæ grise drachmas xvi.  
aramenti furorij drachmas sex, mifyos drachmas  
sex, ceræ drachmas centum, resinæ pinus drachmas  
c. l. picis drachmas c. l. olei ueteris quantum sufficit,  
acceti quod satis est. Hoc quidem igitur nostrum  
pharmacum spissitudine auctum, & imminutum ac  
liquefactum prout probe habere uidebitur, iuxta  
curandorum corporum differentias, extrahit ac eij-  
cit tofos in artubus coactos. Aliud Galenicum,  
quod omnibus ferè corporibus adhibuitur cōgruit.

Est autem tale: Caseus bubulus uetustissimus,  
adeo ut ob acrimoniam edī non possit, cū porcina car-  
nis inueteratæ ac salis decocto teritur, & probe emol-  
litus ad durities artuum imponitur. Est & aliud ab  
eodem cōpositum. Pinguetudinis pernæ porcinae ue-  
teris libram unā, casei caprini uetustissimi libram i. ad  
pis taurini libram unā, apochymatis, hoc est, resinæ  
cū cera ex nauigijs derasæ liquefactæ libram unam,  
medullæ ceruicis bessel, hyssopi quadrantem, cypri-  
ni sex uncem, uisui Aegyptij hemina dimidiū. Lique-  
scibilia liquefacto, & reliqua ammisceto. Aliiter  
apparatur emplastrum ex perna. Iusculi pernæ ue-  
teris porcinae libram unam, celsi trientem, ammo-  
niaci thymiamatis librā unam, medullæ ceruinæ se-  
ptuncem, adipis taurini libram unam, ceræ sexun-  
cem, apochymatis cæ nauibus derasæ sesquilibram, cy-  
prini libram unam, casei caprini ueteris libram unā,  
opopanax unc. i. Aliud, ad tofos artuum. Gra-  
num enidium desquamatum internum cū myrrhā  
& aceto terito ac illinito, usque ad excessum mirabi-  
le est. Aliud, ad durities artuum muliebrum, &  
eorum qui teneras carnes habent, experimento cog-  
nitum. Cadmiam quam tenuissimè tritam ac myr-  
teo cerato exceptam imposito. Aliud. Spumā  
nitri cum oleo ueteri & modico croco ac aceto tri-  
tam illinito. Præstat tamen si nitri spuma cum croco  
& aceto teratur, & cum cerato liquido illinatur.

Aliud, ad tofos pedum, quod contentum perrum  
pit & euacuat eadē ferme hora, sanatur idem ut ne ci-  
catrix quidem relinquatur. Mala mandragoræ ac  
cipito, semēq; euacuato, ac tenuissimā squamam eis  
obductam derahito, atq; carnem ipsam probe teri-  
to. Et ceratū ex adipē suillo & cera factū adfundito,  
unito, ac utor. Hæc tria pari pondere sumuntur, aut  
adipis plus additur. Vtere, experimento constat.

Aliud. Calcem uiuam, & nitrum, pari pondere  
axungia excipito ac imposito. Aliud. Dioscori-  
dis. Ammoniacum cum pice arida ad ignē emolli-  
tum imposito. Aliud. Styracem cum ieiuni ho-  
minis saluā emollitum imposito, hoc est, mandu-  
cando atritum adhibeto. Facit & sesamum non lo-  
tum tritum impositum.

Demedicamentis purgatiuis ad articulare mor-  
bum accommodatis. Cap. XLVI.

Quum plurima sint & uaria medicamenta purgantia  
a nobis in tertio huius tractationis Sermone tradi-  
ta: inde sanè repetere oportet quod cuiq; sit accom-  
modatum. Propriè tamen in podagricis & morbo  
articulari hæc exhibētur. Vniuersale ex hermoda-  
ctylis, quo assidue utor. Hermodactyli siccī recens-  
tis undam i. anisi, cumini, piperis cōmunis, croci, pi-  
peris lōgi, seminis cicci interni cuiusq; scrup. ii. myr-  
rhæ dra. i. euphorbij recentis scrup. iiii. mastiches  
scrup. vi. casia scrup. i. mokhi siliquam unam. Dan-  
tur ex eo scrupul. iiii. cum aqua mulsā, confestim  
minuit dolores. Quandoquidē autem huiuscemodi  
medicamenta fortem euacuationem facere non pos-  
sunt, & quod ex ipsis intus relinquitur, condensatū  
& ressecatū tofos in artubus generare consuevit, cō-  
uenit usus tēpore ad singulos exhibitionis modos  
scamoniæ siliquas ures addere. In pituitosis uero la-  
thyridas numero v. & agarij scrupul. i. Si uero hu-  
moribus redudē æger, post dolores sublatos eū rur-  
sus cū hiera aut alio forti purgatio, temperamēto



corporis apto, purgato. Aliud purgatiuū podagricum, ad dolore affectos prædatur. Calsiæ scrup. i. eu phorbi j selsquisrupulū, iij. hoc est, chamæleonis nigri scrup. iiii. radicis alypiadis, hoc est, chamælae scrup. iiii. radicis pæoniæ scrupulos iiii. anisi, zingiberis, cumini, mastiches, floris cnidi, piperis, culusq; scrup. viii. hermodactyli sex tunc. Datur ex eo scrup. iiii. cū uino mulso. Antidotus purgatoria ex betonica filiens febrē. Facit summū ad podagricos, ter in mēse data; facit ad elephanticos & hydropicos, maxime aqua subter cutem laborantes. Est ex ualde laudatis, Comæ absinthij drachm. x. xiii. betonicæ drachmas x. xiii. seminis rutæ syluestris drac. xvi. centaureæ minoris drach. xvi. calsiæ drach. x. xiii. corticis uerauri nigri drachmas viii. contundito, cribrato, ac coherleari unius mensura dato ex aqua calida, asinimaduersione habita ne pharmacum ultra modū purget: est enim inexuperabile. Apud alios etiā laudatum reperit, si gentianæ & chamæpitylos, ac aristolochiæ longæ, cuiusq; drachmæ viii. addantur, chamædryos item drachmæ x. xiii. Omnia, inquit, hæc melle excipio, indeq; ad summum coherlearium unū exhibeo.

## Antidoti podagricæ.

Cap. XLVII.

Pharmaca quæ podagricis & morbo articulari correptis per os exhibentur, plurima quidem sunt & uaria ac diuersa. Cognita itaq; a me ipsorum multitudinem, tum eo quod tetrapharmacū, a quatuor rebus ipsū constituentibus appellatur, tum quod ex hyperico constat, itemq; quod ex gentiana paratur, & si milibus, quibus pro consuetudine Medici ad simpliciter podagricos utuntur, ipsæ sanè propriū pharmacū composui, inquit Philagrius, quale iudicauit sufficienter ex calsiæcere posse, non tamen expers facultatis moderatè humectandi, & attenuandi crassos ac uiscosos humores, & quod prædare omnino potest excretionū uias dilatare, unā cū hoc quod uim subducendæ alui & mouendæ uring complectitur. Quin & naturales actiones excitat, & transpirationem in sensilem ac obscurā procurat. Compositio autem hæc est. Radicis pæoniæ recentis drac. i. croci cilicij drach. iiii. rhei pontici drachmas iiii. calaminthæ montanæ, comæ saluæ, cacuminum stœchadis, seminis thlaspeos, epithymi, centaureæ maioris radicis, cuiusq; drac. iiii. centaureæ minoris succi drac. iiii. succum accipito, quū in summo uigore herba est ac floribus prægnās. Iridis illyricæ, seminis rutæ syluestris, piperis longi, seminis anethi, cuiusq; drac. iiii. ligustici, seminis apij, petroselinii macedonici, seselis malsiliensis incorrupti, origani, cacuminum thymi, seminis trifolij bitumen olentis, seminis cardamomi medulla priuati, seminis dauci, piperis albi, cuiusq; drac. ii. mei athamatici drac. ii. asari drach. ii. spicæ nardi, adici, calsiæ, polypodij, thuris, galbani puri, terebinthiæ, bdellij scythici nigri, pinguis, ac resinosi, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; drac. vi. radicis symphyti recentis siccæ, fabinæ, radicis rubiæ, helenij, agarici, herbæ scordij, seminis paliuri, sarxiphagi, betonicæ, radicis cydamini siccæ, seminis uiticis tosti, cuiusq; drachm. viii. mastiches chiæ, radicis bryoniæ recentis siccæ, terræ lemnis quæ sphragis appellatur, opobalsami, cuiusq; drachm. xvi. succi peucedani, drach. xvi. qui si non adsit, conijciendæ sagapeni drachm. viii. & radicis peucedan-

ni recentis siccæ drachm. xvi. pastilli theriaci drach. xvi. habeant autem pastilli carnis partes duas, panis partem unam; compositio autē ipsorum in Seramone de theriaca dicta est: styracis siquidem addit calsiæ, si uero non, flauū & pinguis drach. x. xiii. niger enim ut uitiosus reprobandus est: aristolochiæ rotundæ non rugosæ & plenæ drach. i. osium centaureæ uinorum aut bubulorum ex furis recentium, & ut probè conterri queant, ustorum drach. i. mellis attici despumati quātum satis est, quo ad bonam elegendam tū cōpagem pharmacum reducatur. Arida omnia contundito & cribrato; mastichem autem & thus unūquodq; per se sensim, nec in latas crustulas abeat, terito & cribrato, deinde prædictum pondus ex eis expendito, & reliquis aridis uitis ammisceto. Bdelium autem & ammoniacum ac galbanum & peucedani succum aut sagapeni, in mortuario coniecta tundito, deinde ad ignem emollito, & postea cum modico melle liquefacto, & in pila opimè terito. Similiter autem & terebinthinam per se cum modico melle dissolutam ad reliqua in psam conijcito. Styracem uero in mortario constanter tundito, opo balsam paulatim ad eum infuso ac melle calido, deinde similiter in pila terito. Expedit etiam cū modico melle styracem liquefacere ac deinde terere. Ceterum ubi hæc sufficienter fuerint unita & dissoluta, paulatim arida trita addito; melle itidem sensim affuso. Ad finem uero centaureæ succum per se cum opo balsamo terito ac reliquis unito. His uero omnibus probè commissis, mellis despumati tantum addatur, quantum suffecerit ad pharmacum delingibile futurum, & quo per dulcorem ægro commende tur. Quare si gustu pharmacū iudicaueris, nihil peccaris, etiā si piperis augeas modū. Noui namq; ego ipse quendam qui eo usus plus sibi de pipere ammiscere iussit, itaq; ammiscui sæpe tantum ex ipso post reliquorum omnium mixturam, quantum quisq; pro gustus sui modo expetiuit. Satis uero manifestum est, quod quando quidem præseruare aliquem ad podagricum malo uelimus, tunc sanè plurimum piperis iniungere non ab re est, & præsertim in hyeme, & si humores frigidi fuerint ac diuturni. Porro centaureæ succus tempore ueris, quum in uigore herba est ac florem fert, ex ea uiridi ac contusa exprimitur, deinde percolatus, usque ad mellis solidioris spissitudinem in sole reficatur. Cæterum in compositione pharmaci, si is qui eo usus est amarū delectetur, amplius quàm drachmas quatuor ex succo centaureæ ammiscere expedit, atque id maxime si distillationes dissoluere uelimus, si uero æger amara aueretur, quatuor omnino succi drachmas iniungere oportet. Ex hac uero antidoto ad elegmaticis cōpagem redacta ad summum coherlearium i. exhibetur. Dupliciter insuper pharmacū hoc apparatur. Vno quidem modo pastillis theriacis, ut dictum est, ammixtis, itemq; osibus uitis. Alio autem modo dextra pastillorum & osium admixtionem præparatur. Licet etiam si quis uelit post sufficientem mellis mixturam, mel ipsum in duas ex æquo partes diuisas, deinde ad unam partem, dimidium præscripti ponderis, tum pastillorum theriacorum, tum osiustorum infarcire: est autem dimidia pars pastillorum theriacorum drachmarum viii. Osium uero ustorum dimidia pars est drach. x. xv. Quandoquidem uero

dē vero pastillos theriacos impossibile est per se con-  
tundi, si non cum alijs aridis tundantur, oportet eos  
quantum possibile est in mortario tundere, ac modico  
uino ueteri dulci madefacere, deinde in pila tere-  
re ac cum largo melle dissoluere, atque demum ad re-  
liquam mixturam diligenter coaptare. Cæterum  
quum humectare oportet & mollire, attenuareq; &  
crassa dissiccare, repurgare item ac euacuare infartos  
humores, itēq; uias dilatare, nihil ex pastillis theria-  
cis, neq; ex osium cinere ammificare oportet. Vipe-  
rarum enim caro quàm celerimē ad cutem ac super-  
ficiem dīgeri ac distribui solet. Quapropter ubi re-  
crementorum copia adfuerit, & uis fuerint obtura-  
tæ, minimē tutò uiperarum caro exhibetur: sed pos-  
tea quū confectauerimus humores attenuatos esse,  
& dilatas uias. Osium uero substantia facultatē ha-  
bet consumendi ac resicandæ, ad eū etiam sola afsi-  
duē & oportunē exhibitā inueteratum articulare  
morbum curret. Vt uero ne quid ex humoribus resic-  
etur ac lapidescat, incurabileq; aut aegrē medicabile  
reddatur, tempore præseruationis eam minimē mi-  
scebimus, sed postea, si ita uidebitur. Consumit enim  
& resiccat humores in ipsis articulis iūcturis re-  
lictos. Forinsecus etiam quādo discutere animus est,  
pharmacum hoc oleo ueteri ac sicyonio dilutū ma-  
ximopere profuit, maximē si citra osium additio-  
nem est apparatus. Tunc enim non modo diffusio-  
riam, sed etiam coactōriam facultatē acquirit. Qua-  
re eis qui non discussione solum, sed & exterarum  
corporis partium corroboratione opus habent, cō-  
modissimē hoc modo adhibetur. Hoc pharmaco si  
& arthriticis & podagricis medeberis, minimē poe-  
nitueris. Hepaticos item ex obturatione affectos,  
itemq; splenicis curabis, & ad uipera morfos, & qui  
uenenum hauserunt, & comitali morbo apprehen-  
sos, si eo oportunē uarieris: quin & aliorum morbo-  
rum per ipsam curationem fieri reperias sufficientē,  
de quibus sermonem producere minimē operæ pre-  
cium existimo. Theriaca itē ex uiperis, quæ An-  
dromacho inscripta est, de qua plurima tradidit Ga-  
lenus, uuliter exhibetur frigidioribus & magis hu-  
mectis corporibus, forinsecus etiam cōmodē illini-  
tur cum oleo ueteri ac sicyonio dissoluta, ut dictū  
est. Sales quoq; Theriaci, & ex gentiana pastillus, &  
qui ex hyperico constat, & similia, his qui ex multo  
& crasso fluxu ægrotant, uisita existunt. Verum his  
qui ex biliosa fluxione afficiuntur, & ut simpliciter  
dicā, omnibus calidiori temperamento prædictis hæc  
ipsa nocentissima sunt, & quod suprā relatum est no-  
strum pharmacū. Ex horū enim pharmacorū potu  
non solum nihil opis ferunt hi qui calidiori tempera-  
tura prædicti sunt, sed & resolutionibus immedicabi-  
libus apprehēduntur, sepe nimis resiccat, & in uitio-  
sos humores dislabuntur qui eos erodunt, & in qui-  
bus aliquādo pessimē intereunt. Porro & in huiusmo-  
di pharmacorū usu etiam raritatem & densitatē cu-  
randi corporis respicere oportet: ampliusq; & æta-  
tem, & anni tempus, & regionē. Ad hæc itaq; respec-  
tu habito minus aut plus de eo dabis, neq; uero mi-  
nus & ad magnitudinem aut paruitatem corporis  
respiciedum. De uiperarum usu. Viperarū esus  
omnibus podagricis & arthriticis plurimum cōmo-  
ditatis affert, quemadmodū etiam anhelosis, & ele-  
phantiasi correptis: exigūt enim per cutem omnia re-

dundantia recremēta, siue calida siue frigida fuerint,  
quæ morbi ipsius sunt causa. Oportet autem crassa  
& uiscosa ex ipsis prius attenuare ac euacuare: quod  
ubi factū est, reliqua faciliē per uiperarum esum euac-  
uantur, nimirum ad cutem delata atq; excluda. Quas  
propter etiam in sole ipsarum serarum comestione  
facere iubet, ut pole quod inde uiuentur, atq; ui calo-  
ris humorum delatio foras seratur: curandum tamē  
ne caput probē cōtegere ab æstu negligamus. Opor-  
tet autem recens captas esse uiperas, & iustæ magni-  
tudinis, & non ex maritimis: tales enim sicciosæ  
existunt. Cæterum ex uipera ipsa sum caput, tum  
caudam amputare oportet, itemq; interanea omnia,  
abijcere, ac ex tribus aquis lauare, deinde cum aqua  
& anetho maximē uiridi, & modico cōgruentis oleo  
coquere, & post sufficientem coctionem congruenti  
sale condire, ac uiperam uelut anguillam comeden-  
dam exhibere. Porro quidam ex harum comestio-  
ne plurimum exudant, & pediculorum copiam ge-  
nerant. Omnes tamen qui eas comederunt, maximē  
se alleuatos sentiunt. Quapropter his qui corpus re-  
crementis exundans habent, etiam bis ac ter in anno  
exhibere conducit: bis quidem ueris tempore, semel  
autem in autumno. Quod si uero sint quibus cor-  
pus per insensibilem & obscuram trāspirationem,  
aut etiam per sudores naturales euacuetur, his omni-  
no uiperarum esu interdiciemus. Periculosa enim sit  
huiusmodi ipsarum comestio propter immodicam  
per cutem exhalationem. Dicemus autem ex ordine  
& de alijs antidotis. Antidotus ex quatuor rebus  
constans. Tetracharmacum igitur ex quatuor re-  
bus apparatus, & à quibusdā Mysterium appella-  
tum, ex gentiana componitur & aristolochia, baccis  
lauri, & myrrha, æquali pondere confectis. Datur  
autem singulis diebus ex ea cochlearij dimidium ex  
aqua calida ad præseruationem. Prodest pituitō-  
sis: biliosis autem lædit. Antidotus ex hyperico.

Antidotus ex hyperico à quibusdā hoc modo  
descripta est. Antidotus sanans podagras, coxendi-  
cum morbum, & ut in uniuersum dicam, omnes iū-  
cturarū & articulorum morbis implicatos per an-  
num potata. Firmat stomachum, & uisum acutiorē  
reddit. reliquosq; item sensus clariōres & illustrio-  
res facit: euacuans leniter per urinam; unde etiā neq;  
aliud uisum membrū offensionem sensit. Neq; enim  
materiā ex affectis locis ad aliam corporis regionē  
depellit, quemadmodum epithemata forinsecus con-  
trahentia & cohibentia facere solent: sed causas mor-  
borum tum per uiscē, tum per alui locos expellit,  
atq; uniuersum corpus sanius reddit. Quare etiam  
comitali correptis morbo, auxiliatur in potu.  
Alios item à diuturnis & uehementer grauib; capi-  
tis doloribus liberauit, qui etiam de sanitate sua iam  
desperauerant. Splenem uero & hepar in scirrhum  
indurata moderatim ac demulcet. Articularem au-  
tem morbum ad eū efficaciter sanat, ut etiam duri-  
cies instar toforum in articulis quibusdam per uim  
morbicā coactas dissoluat. Compositio autem hoc  
modo habet: Trixaginis dodrantem, centaureæ bes-  
sem, aristolochiæ rotundæ septuncem, radicis gen-  
tianæ sexuncem, comæ hyperici quincuncem, petro-  
selini trientem, mei athamantici quadrantem, phu-  
pontici sextantem, agarici sextantem. Mellis despū-  
maui lib. iij. Hoc autem modo parato. Vnumquod-

que per se contundito & cribrato: deinde ponderata simul misceto, ac rursus cribrato, quo accurata permixtio fiat. Deinde mellis despumato ammisceto, ac pastillos formato pondere drachmæ .i. atq; ex eis unum pro uise exhibeas. Vfus eius est circa tertiam horam diei, ubi uenter onus suum pro consuetudine deposuit: pharmacum uero ipsum cum aquæ calidæ sequeuiyaho liquefacito. Oportet autem eum qui bibiti, si nihil prohibeat, deambulare, quo ex motu euntis pharmacum inferna cotingat. Porro pharmacum hoc aliàs quidem præclarè efficax est, utpote ex fortibus simplicibus compositum: amplius autem efficacius redditur per aristolochiam, quæ natura sua ardicularibus morbis auxiliari solet, & duris corporibus in primis prodest. Ex cancris autè pharmacum etiam mollibus corporibus cõducit. Habet autem Antidotus ex cancris compositio hoc modo. Cancrorum magnorum uisuum ustorum in creto uase, trientem, gentianæ incorruptæ quincuncem. Thuris integri & non secti albi unc. .i. Datur inde cochiearium unum. Ad cancrorum uero exustione ligna uicis aduruntur. Pharmacum ex fluuialibus cãcris uisus. Describã porrò & aliud pharmacũ corporibus recemẽtis abundantiũ & mollibus cõducens: est autè id quod à rabido cane morsus datur, cuius cõpositionem in Sermonè de rabidi canis morsu tradidimus, huius in quã operis sexto. Adieci autem ego, inquit Philagrius, ad huius pharmaci apparatus, etiam petroselinĩ drachm. viii. ut plurimum uero x. quo urinæ ciendæ uisum acquirat. & multos sanè arthriticos iuuat, præsertim quibus tenerum & album corpus fuit, mediocrius myrri mensura ex co data, aliquãdo ex aqua sola, aliquando ex aqua multa. Quin & melle despumato sæpe ipsum excepi, quo ualidum & citra transpirationem adseruarem, deinde uero ueluti prædictum est, bibendũ exhibui.

Antidotus ex centaureis. Antidotus podagrica ex duobus centaureæ generibus est, ex uehementer laudatis & præter opinionem auxiliantibus, quod ipsum experientia testatur. Nam multos eius usu seruatos noui. Est enim adeò salutaris podagricis, ut quosdã per x. annos podagra correptos, eius usus ad iter pedibus faciendum præparauerit. Est autem stomacho grata, aluo confers, & urinam ciens. Habet autem hoc modo. Centaureæ minoris comæ, cẽtaureæ maioris radicis, trixaginis, gentianæ, aristolochiæ rotundæ, singulorum æquale pondus, puta lib. .i. cõrundito & cribrato, & drach. .i. præbeto per dies x. ex aqua calida. In sequentibus autè ex ordinè anni diebus ccc. x. v. drachmæ dimidium eodẽ modo præbe. Alia antidotus podagrica usu cognita. Anisi, cumini Aethiopici, piperis communis, piperis longi, seminis nucis interioris, cuiusq; drach. .i. euphorbi drach. .iiii. mastiches drac. vi. myrrhæ drachm. .iiii. moschi siliquam unam, caudæ scinci unius extremũ. Mellis quantũ satis est. Datur in uicis auellanæ magnitudine ex aqua multa. Hac amicus quispia usus bis in hebdomadè ex ipsa bibendũ præbuit, & affectos locos ex uiridi unguento Antho inscripto cũ rosaceo aut melino singulis diebus illeuit, multosq; seruauit. Antidotus podagrica experimento constans, accipitur per annum. Anastasi. Agarid unc. .i. rheĩ un. .i. petroselinĩ sextantem, phu sequeunciam, gentianæ quadrantem, hyperici sextan-

tem & uncia dimidiũ, cẽtaureæ unc. .i. Aristolochiæ longæ sequeunciam, & rotundæ quadrantẽ & uncie dimidiũ, chamædrys trientẽ & uncia dimidiũ, cinamomi un. .i. solij unc. .i. aloës primarię unc. .i. mei sextantẽ, aut spicæ nardi duplũ. Alia antidotus podagrica experimẽto cognita, datur per annum. Doari Episcopi. Agarici un. .i. rheĩ Barbarici unc. .i. petroselinĩ sextantẽ, phu sequeunciam, gentianæ quadrantẽ, hyperici sextantem & uncia dimidium, centaureæ trientem, mei sextantem, aut spicæ nardi trientem.

Qui podagrici lauadi sint & quomodo. Cap. xlviii. Manifestum quidem existit quod post inflammationem remissionẽ omnibus podagricis balneum cõmodissimum existit, quandoq; autem & in uigore utiliter adhibetur, si æger pruriginè aut uigilijs uexetur, aut aliàs labore sit fatigatus. Lauare autem oportet tempore remissionis, ita ut spongias aceto & sale permixtis madesactas locis affectis circũponamus, ut à fluxione immunes permaneant. Amplius autè linteis siccis & plurimo nitro totũ corpus psicra, & ut acri diutius immoretur iubere, & moderatè nõ solum calidã, sed frigidã adhibere, & in ipsarũ solijs desidere. Vtile autè est balneũ natura siccioribus, & gracilibus, & colore nigrioribus, & qui à tumore in totum sunt liberati. In huiusmodi enim affecta particula nõ intumescit adeo magno tumore excitato, uerũ distrahĩ, uelut à cane apprehensas, in profundo sitas corporis partes aiunt, & inopinabili tensione distendi. Et inhorrescent sæpe, pellicula quæ os ambit, à fluxione salsa aut acri & tenui ualde acerodẽte uellitata. Hi à balneis opẽ sentiũt, quapropter nõ semel tantũ, sed iterũ atq; iterum os lauare oportet, & in aère per omnia moderato, citra aliquã pinguedinem adhibitam immorari, hoc enim modo magis euacuabũtur. Deinde oleo dulci cũ aqua cõquassato illitos in aqua calidã demittere, & in eo aliquandiu morari præcipere. In frigidam uero minimè demittatur, nisi immodicè caloris sensus infestet. Vt plurimũ uero tepida aut lactei tẽperamenti aqua perfundatur in prima balnei domo. Si uero cum tumore quodã nõ ualde magno post euacuationes subito aliqui dolore uexentur, conueniet in aère balnei reliquũ corpus per sicca linteia usq; ad rubefactionẽ perfricare. Utendũ autem & exterforijs smegmatis ex adacæ, nitro, pipere, euphorbio, staphide agresti, æquali pòdere cõiectis, apparatis. Atq; his quidem reliquũ corpus contentè desiccũ excitetur: pedes uero eorũ muria moderatè perfundendi sunt, & in calida aqua nõ morandũ, frigidã uero ne cõtingeda quidẽ. Quod si balneum nõ adfuerit, eos qui ab acrioribus fluxionibus uellcantur, aqua dulcissima calida perfusos fouere oportet, & totũ corpus ex oleo chamæmelino in seuiuo illinire: alios uero temperamento non calidos, & qui tamẽ tumore habent post euacuationes relactum, si balneum non adfuit, curribitulis admotis curabimus, initio à lumbis factò, (ursum usq; ad scapulas progrediendo, fricabimus etiã per sicca linteola & per exterforia smegmata iam dicta. A talibus enim hi tum in balneo, tum citra balneũ opem sentiunt. quale & hoc est ex profundo humorẽs euocãs ac trãsferens, quod metasyncriticò Greci uocant. Eo itaq; in balneo uantur, aut si balneũ non admittũt, post exercitiã ex eo desiccẽtur, deinde spongijs extergatur id quod ex hac arida inspersio-

ne corporibus adheret. Cōposito eius hæc est. Nitri rubri lib. i. sinapis sicci lib. i. i. fabinae lib. i. i. uerae tri albi lib. i. sulphuris utui lib. i. Alud Andreae comitis. Nitri, ueratri nigri, piperis æqualibus partibus utere. Præter opinionem aut eis cōducit. Sic cum Magnum ipsi affectis locis in balneo inspersum. Estq; hoc. Recremeti siue scorix ferri, spumæ nitri albæ, cuiusque æquales partes misce, & odoris gratia parum folij & costi adde. Sic cum quod psilothro podagrico inspergitur. Mastiches, thuris, lapidis asij, pumicis assati, alcyonij, staphidis aggregatis, cimolix, ueratri albi, samfuc, spumæ argenti, amyli, careophylli, spicæ nardi, cyperi, floris iunci odorati, buglosi, singul. lib. i. auripigmenti unc. x. sandarachæ unc. x. saponis quantum satis est. Prædicta omnia, excepto auripigmento, sandarachæ & saponis, cōtundito, cribrato, & sicca in promptu habeto. Vfus uero tempore calis uitæ unc. x. in oryxæ aut pitfanæ succo dissoluito, & auripigmenti unc. i. sandarachæ unc. i. saponis drac. iiii. & prædicti sicci cochlearia ii. magna, omnia quàm tenuissimè trita inspergito, ac unito, eoq; pedes aut etiam alios lo-

cos fluxione infestatos illinito. Cæterū qui hoc sicco inspergimine utitur, hoc modo digitam suam insituant. Thoth, hoc est, septembri, iac & edant & bibant. Phaophi, hoc est, octobri, allia edant. Athyr, hoc est, nouembri, in totum nō lauent. Choiaç, hoc est, decembri, bralsicam ne edā. Tybi, id est, ianuario, mane meracum bibāt. Mechir, id est, februario, betam ne edant. Phamenoth, hoc est, martio, dulcietum in cibo, tum in potu sumant. Pharmuthi, id est, aprilis, raphanū ne gustent. Pachon, id est, maio, polypum ne edant. Pauni, hoc est, iunio, mane frigidā aquam sumant. Epiphi, hoc est, iulio, à ueneris abstineant. Mefori, id est, augusto, maluā ne edant. Sic cum Maloriani. Aluminis scissi sextantem, pumicis unc. i. terito & in uitro reponito. Vfu uero expecte, uino adstringere locos prælauato, & quodammodo extergito, ac siccū ipsum inspergito, tenerisq; manibus affricato, & siccati finito. Rursusq; idem per diem octies factio, & toties similiter si possibile sit in nocte, & uidelbis tumores quàm celerimè discussos & resolutos. Ego utriusq; & aluminis & pumicis equale pondus cōiecti, & magis sanè successit.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

DECIMO TERTIO SERMONE AETII

CONTINENTVR.

<b>D</b> E his qui ab homine morfi sunt. cap. i.	ne & usus. cap. xxiiii.	De salamandra. cap. lii.
De his quos canis momordit. cap. ii.	De amodyte aut cēchria. cap. xxv.	De lepore marino. cap. llii.
Ad leonum, pantherarum, ac urforum morsus. cap. iiii.	De sepe. cap. xxvi.	De rana rubeta. cap. lvi.
De suum morsu. cap. iiii.	De cenchrite siue Acontio. caput xxvii.	De rana palustri. cap. lv.
De his qui à fēle morfi sunt. cap. v.	De ceraste. cap. xxviii.	De hirudinibus. cap. lvi.
De morsis à crocodilo. cap. vi.	De dryino. cap. xxix.	De ephemero. cap. lvii.
De bestiis uirus eiaculantibus, & primum quibus artibus adhibitis ea tolerantur. cap. vii.	De amphibena & scytala. cap. xxx.	De dorycnio aut solano furioso. caput lviii.
Illitiones præseruatix. cap. viii.	De pareia & spathiuro. cap. xxxi.	De aconito. cap. lix.
Que apposita uenenatis animalia occidunt. cap. ix.	De peliade & elape. cap. xxxii.	De melle quodin Heraclea ponti nascitur. cap. lx.
Communia remedia ad omnes uenenarum iaculantium ferarum plagas. cap. put x.	De basilisco. cap. xxxiii.	De coriandro. cap. lxi.
De uespis & apibus. cap. xi.	De draconibus. cap. xxxiiii.	De psyllio. cap. lxii.
Ad stellionis morsum. cap. xii.	De chersydre. cap. xxxv.	De cicuta. cap. lxiii.
Ad salamandræ morsum & lacertæ chalcide. cap. xiii.	De rana rubeta. cap. xxxvi.	De simlacc. cap. lxiiii.
De muere araneo. cap. xiiii.	De turture seu pascinaca marina. cap. put xxxvii.	De succo carpasi. cap. lxv.
Ad scolopendræ plagam. cap. xv.	De murena. cap. xxxviii.	De herba sardonis. cap. lxvi.
Ad araneæ idum. cap. xvi.	De dracone marino. cap. xxxix.	De hyoscyamo. cap. lxvii.
De tetragynathis. cap. xvii.	De scorpio marino. cap. xl.	De mandragora. cap. lxviii.
De percussis à phalangio. cap. xviii.	De culicibus. cap. xli.	De succo papaueris. cap. lxix.
De his quos scorpio percussit. caput xix.	De muscis. cap. xlii.	De toxico. cap. lxx.
De morsis ab aspidē. cap. xx.	Ad pulices. cap. xliii.	De his qui ixtian hauserunt. cap. lxxi.
De uiperæ maris & scæminæ morsu. cap. put xxi.	Ad cimices. cap. xliv.	De chameleone. cap. lxxii.
De dipsade. cap. xxii.	De uenenis. cap. xlv.	De fungis. cap. lxxiii.
De hamorrhoidē & hamorrhoidē. cap. put xxiii.	Methodus præseruatix ne quis à ueneno pharmino ledatur. caput xlvii.	De sanguine tauri. cap. lxxiiii.
Præparatio sanguinis testudinis maris. cap. xxiii.	Quomodo cognoscantur qui uenenum iungserunt. cap. xlviii.	De lacte in grumos coactō. cap. lxxv.
	Communia remedia & cura omnis uenenis. cap. xlviii.	De gypso. cap. lxxvi.
	Ad eos qui cantharidas hauserunt. cap. put xlix.	De ceruisa. cap. lxxvii.
	De buprestis. cap. l.	De argenti spuma. cap. lxxviii.
	De eruca pini. cap. li.	De argento uiuo. cap. lxxix.
		De calce, sandarachæ, & auripigmento. cap. lxxx.
		De thapsia, ueratro, elaterio, & agarico. cap. lxxxi.
		De rutæ, sylvestris & melanthij nomine. cap. lxxxii.

- cumentis, cap. LXXXII. De Antidoti Mithridatica usu, cap. c.  
De acernato frigida aquæ potu, caput LXXXIIII. Antidotus Esdrae aut Prophetae doctoris, cap. CI.  
De frangulatis, cap. LXXXIII. Antidotus pæonia, cap. CII.  
De his qui ex alto ceciderunt, caput LXXXV. Antidotus aromatica optima, Galli, cap. CIIII.  
De præseruantibus & præfagis animæ libus, cap. LXXXVI. Antidotus ex duobus piperis generibus, cap. CIIII.  
De theriaca ex uiperis Andromachi, cap. LXXXVII. Antidotus Athanasia, cap. CV.  
Pastillorum scilliticorum præparatio, cap. LXXXVIII. Oribasij theriaca qua Marcus Imperator usus est, cap. CVI.  
Hedychroi confectio, cap. LXXXIX. Oribasij theriaca ex Bryonia, caput CVII.  
Pastillorum theriacorum præparatio, cap. XC. Antidotus Hadriani, cap. CVIII.  
De reliquis quæ in antidotum coniunguntur, cap. XCI. Antidotus Acharistius, cap. CIX.  
Modus conficiendi, cap. XCII. Philagrii Antidotus ex sulphure uiui, caput CX.  
Post quantum tempus ea sit utendum, cap. XCIII. Theriaca Democratis, cap. CXI.  
Quanto tempore efficax sit, caput XCIIII. Antidotus Theodoretus ex anacardijs, cap. CXII.  
Modus probandi theriacen, cap. XCV. Theodoretus aliter apparam, caput CXIII.  
De exhibitionis mensura, & ut edimodo, & quibus conueniat morbis, caput XCVI. Theodoretus per acetum mulsam apparam, cap. CXIII.  
Sales Theriaci ex libris Martiani, cum quibus cõsentit Galenus, ca. XCVII. Picra siue amara per acetum mulsam apparam, Oribasij, cap. CXV.  
Antidotus Mithridatica, cap. XCVIII. Cyphi ex rebus XXCVI, cap. CXVI.  
Confectio Cypheas, cap. XCIX. Cyphi ex rebus XXVIII, cap. CXVII.  
Musciaphij confectio, cap. CXVIII.  
Thymiana siue suffimentum Berenice, cap. CXIX.

- ces, cap. CXIX. De Elephantiasi, ex libris Archigenis, cap. CXX.  
Cura elephantiasi affectorum, caput CXXI.  
De his qui castrantur, cap. CXXII.  
De uiperarum esu, & de pruritiibus, Archigenis, cap. CXXIII.  
Illitiones ad tumentes corporis emittentias, cap. CXXIIII.  
Dieta Elephantiasi correptorium, caput CXXV.  
De pruritu, Archigenis, cap. CXXVI.  
Ad pruriginosus papularum eruptiones, cap. CXXVII.  
Ad pustulas psyracæ Græcis appellatas, & ad papulas ex seruire aut sudore obortas, cap. CXXVIII.  
Oribasij ad nigras cicatrices inalbandas, cap. CXXIX.  
Ad ulcerosus papularum eruptiones, tum in tibijs, tum in toto crure obortas, cap. CXXX.  
Ad cicatrices nigras ex ulceribus relictas, cap. CXXXI.  
De Vitilagine seu albo, caput CXXXII.  
De leuce vitilagine altius insidente, Galeni, cap. CXXXIII.  
De lepra, Archigenis, cap. CXXXIIII.

# AETII MEDICI GRAE CI CONTRACTAE EX VE-

## TERIBVS MEDICINAE TETRA-

### BIBLI SIVE QUATERNIONIS

#### QUARTI SERMO PRIMVS, ET

#### EX ORDINE XIIII.

*De noxiarum animalium morsu, & de bestiis uirus ei aculantibus. Et de Elephantiasi, pruritu, scabie, alipo, lepra, leuce. Et de antidotis multa utilitatis.*

*De his qui ab homine morsu sunt.*



Cap. I.

De noxiarum animalium morsu scribere auspices, initium ab his qui ab homine morsu sunt faciemus, ut Archigenes inquit, in his igitur quos homo momordit, loco ex oleo prælito, fœnituli radicem tritam cum melle cataplasmatis modo ulcers imponito usque quo repurgetur, deinde his quæ explere possunt utitor. Cuius generis & hocce est. Mellis, terebinthine, buryri, adipis asnerini, medullæ cerui, aut si nō adsit, utuli, æ aqua libus partibus liquefactis utitor. Si uero sinus statim in principio fiat, cum aqua mulsâ diligenter eluto, & spongiam nouam Africanam melle cocto imbutam imponito, & ligamentum quod ad sinus referetur obligato, ac tertio die soluito. Aut myrrham terebinthina excepta ut malagma imponito. Aut æstritum melle cocto exceptum ueluti collyrium indito, & postquam repurgaris, coagulato: uel ossa utulina ad albedinem usta, & pice liquida fusa cocto melle, aut utrilque ex æquo simul excepta, in sinum indito, uel

mannam, aut ipsum adeo thus cum myrrha terito, & cum uino ac oleo imponito. Emplastra autem cruentis uulneribus destinata & adglutinatoria eis conueniunt. in expasis quidem & planis ulceribus, uiride ex atractylide. In sinibus uero cruentis emplastrum Picatoris, ex aceto apparatus, & Athenna, & Nigrum appellatum.

*De his quos canis momordit.*

Cap. II.

In his uero quos canis momordit, statim acetum irrorato, & expassa palma morsum percutito. Deinde nitrum cum aceto tritum ex alto supra morsum destillato, & spongiam nouam posca aut aceto imbutam imponito, & ad tres dies obligato, ligamentum superne ex posca aut aceto, prout uisum fuerit, madefacito. Egregie enim auxiliatur. Post hec uero ut commune ulcus curato. Aut perdicium herbam cum sale tritam imponito, quotidie eam alterando donec excidat crusta. Deinde ubi ad cicatricem perducere uolueris, ipsam per setricam imponito. Quod si magnus sit morsus, quemadmodum à magnis canibus infligi solet, prescripta in sexto Sermonem metho do curato, ueluti eos qui à rabido cane sunt sauciati.

Si uero

Si uero cauus & angustus appareat morfus, in principio cum aceto, ut dictum est, irrorato. Deinde nitrum titidem cum aceto tritum ex alto superstillato, & anetho sicco usto morsum expleto, & linteolum co-uolutum ex aceto masefactum indito, & obligato. Post triduum uero soluto, & reperes morsum repurgatum. Idem facit & cum inu tritum morfui inditum. Postquam uero ulcera fuerint repurgata, praedicto pharmaco utere liquefacto ad hominis morsum re-lato. Si uero inflammatio succedat, lenticulam cum malicorio coctam & tritam imponito, aut rubi fo-lia contrita. Aut panis medullam in betæ succo masefactam cum modico rosaceo pro cataplasmate adhi-beto. Ad uulnera uero iam suppurata erui farinam cum melle subigito & morsum expleto. Summè e-nim auxiliatur. Aut irim cum melle & linamentis indito, ac supernè lenticulam coctam tritam cum mo-dico melle & rosaceo pauco imponito. Repurgatis uero iam ipsis cum praedicto liquido pharmaco ex-pleto, ac deinde his quæ cicatricè inducere possunt, utitor. Emplastra autè ad demorfos à cane uel urso aut similibus animalibus statim à principio comò-de adhibentur ex sale & cerusa apparta. Etenim ue-nenosum humorem in moribus ex dētibz relictum expurgant, & callosam ex impactis dentibus con-cretionem explanant.

Ad leonem, pātherarū, ac urforū morfus, Cap. III.  
Horum animalū consimiles sunt morfus: nam robu-sita sunt hæc & unguis, implicant quicquid con-tingerit unguibus penetrantia, & corpora ipsa dilaniant. Persequendo autem in manducatione nō solum carnes dilaniant, sed & ossa aliquando ad po-lentæ similitudinem confringunt, indeq; & uicini stmulis afficiuntur nerui. Satis uero manifestum est, quod corpora quæ in eiusmodi ac tantis calami-rates inciderunt, non effugiant periculum abaliena-tionis: nā etsi maneant, putrefactionem suscipiunt, & ulcera serpentina inducunt. Huiusmodi igitur uulne-ra cum aceto elota & circumfusa, solutis item cor-poribus ac ossibus extractis, emplastris integere o-porter, & post suppurationem partium dilaniatarū, repurgantibus linamentis curare & cicatricem indu-cere, quæ admodum in communibus ulceribus solemus. Emplastra autem his cōuenientia sunt, id quod ex salibus constat, & similia, cuiusmodi etiā hoc est, Asclepiadæ pharmaci, ad cruenta uulnera aecom-modatum, & ad intercosis neruos & ad urforum ac leonem morfus. Aeruginis rasæ drac. viii. alumina nis rotundi drach. viii. squamæ aris drac. xii. man-næ, galbani, cuiusq; drach. xii. ceræ unc. x. vi. resinae pinus aridæ unc. x. xii. olei lib. i. Arida & galba-num aceto terito, & liquefabilia liquefacta adfundi-to. Aliud, emplastrū Venarum appellatur, admi-rabile. Radicis symphyti, comæ dictamni, iridis Il-lyricæ, atramenti Indici, aluminis scissi, misyos, am-moniaci thymiamatis, myrrhæ, cuiusq; sextantē, sa-lis cappadoci quinquecentum, aris usti trientem, ari-stolochiæ rotundæ, iridis asragalitiidis, gallarum, rosarum siccarū, squamæ aris, singulorum unciam unam, æruginis quadrantem, picis fæquilibræ, resi-næ pinus siccæ libras quatuor, olei triseum & dimi-dium uncie unius. Metallum in aceto terito. Habeat autem & ceræ sesquilibræ. Quod si marcedo sub-sequatur & ulcus serpendo depascens, optimè facit

subscriptum uiride emplastrum, carnem arrodens, exest usque ad os, & squamas ejicit, ac ulcus serpens compescit, & in uniuersum utile est ad omnia inue-terata eiusmodi actionis, & maxime in quibus ue-neni corruptio est, & corpora sunt abalienata: quibz etiam immixtum pharmaci adhibere oportet. In alijs uero dissolutum. Habet autem hoc modum. Spumæ argenti unc. i. squamæ aris unc. i. nitri, atra-mēti sutorij, salis ammoniaci, eruginis, singulorum sextantem, cyperi quadrantem, olei sexuncem, acetū scillitici quantum sufficit. Arida aceto terito ut strigmentitiam spissitudinem acquirant, & liquefacta adfundito, & in uitro reponito, aceto acri affuso, ut pharmaco ipsi innatet. Ad confectionem autem & præparationem si acetum scilliticum haberi non pos-sit, scillam cum aceto coquito ac utitor.

#### De suum morfu.

Cap. IIII.

Quandoquidè uero & in uenationibus à syluestribus suis læduntur quidam, operæ pretiū est & de his facere mentionem. Vulnera itaq; ab ipsis incussa gra-ua sunt, propterea quod non solum profunda, sed & magna existant: adglutinatio autem medica-tionis ductu ea curare impossibile est. Nā unā cum conuulsione labia uulnerum discindunt, imò & adu-runt. Mutuo enim dentium inter se aruitur, ac uelut ad cotem affricti utuntur, ad uindictam eorum qui eis obueniunt currentes. Aduisa itaque corpora cru-stam quandam iuxta uulnerū labia inducunt. Qua-re suppuratorium & nō adglutinatorium curatio-nis modum in eis adhibere oportet.

#### De his qui à sele morfi sunt.

Cap. v.

Omnia ferè quæ ad canis morfum dicta sunt, etiam à sele morfibus conducunt. Propriè autem eis conueni-unt, mel, terebinthina, oleum rosaceum, simul eliquato ac utitor. Aut centauream tritam cum melle im-po-nito. Aut galli stercus liquidum cum adipe gallina-ceo subigito & imponito.

#### Demorfis à crocodilo.

Cap. vi.

Primū quidè eos quos crocodilus momordit, quàm turissimè custodire oportet, in domo conclusos sene-stras non habentes: etenim ob contrariā quandam as-fectionem ferè in totum syluestres maxime feles ad demorfos accedere consueverunt. Remedia autem his eadem quæ ad morfos à cane ac ad reliquos re-lata sunt, conueniunt. Propriè autè humanum ster-cus & misy simul trita & imposita ad eos faciunt. Aut piscium garum, aut carniū salarū iusculum morfui infunde, aut salem & myrrham equali pon-dere in acerrimo aceto quam tenuissimè contere, & cerato excepta impone. Aliud. Stercoris hyæ-næ, drachmas iiii. æruginis drachmas ix. adipis asneri-ni drachmas sex, galbani drachmam unam, ceræ dra-chmas octo, olei drachm. xii. Aeruginem & ster-cus aceto terito, & liquefacta affundito. Quod si hyæ-næ stercus non adit, porcino utitor. Apollo-nius autem inquit, demorfos locos acuri muria aut piscium garo perfusos ac fortos, adipe crocodili elia-quato illinito, & linamentis inditis obligato: aut carniū salarum pinguioribus partes tufas indito, aut melanthium cum aceti fece tritum imponito. Hæc enim & ulcus serpens compescunt, & mor-fus euestigio ab inflammatione uindcant. Post hæc autem lenticulam coctam cum melle tritam ca-taplasmatas modo adhibeto. Erui uero farina cum melle



melle subacta, aut iride cum melle morsum expleto. De cætero uero ulcera renuitio, & per cõmunia auxilia ad cicatricem perducito.

*De bestijs uirius et aculantibus, & primum quibus artibus adhibitis uenenata animalia tollantur.* Cap. vii.

De uenenatis animalibus scripturi, primum præsidia quædã indicabimus, quibus ea tollantur & perimantur. Perimuntur itaq; ex syluariũ ac materierum exustione, in quibus uitam degunt. Verum in his quæ intra domos reperiuntur, feruentẽ aquam in eorum lustra ac latebras infundere expedit, & acidam muriam feruentem per instrumentum fusorij, siphona Græci uocant, immittere. Vespis uero oleum infundatur, & aspidius fumus ipsarum tentorijs ac habitaculis obfundatur. Quæ substrata ab omni uenenata bestia præseruent. Iuxta uias quidẽ igitur & in domibus ab omni uenenato animali præseruat substrata, abrotonũ, conyza, dictamnũ, uitex, echion, calaminthe, solanum, hastula regia, saluia, peucedanũ, hypericũ, polium, samfucus, gentiana, origanus, ruta syluestris, serpillum, laurus, pulegiũ, cupressi, aut cedri coma, aut ramentia, cardamomũ, lysimachion, melanthium, bitumen. his addatur & gagates lapis.

Suffusiones præseruantes, quæ incensæ uapore suo uenenatas bestias abigunt. Viticis folia, bitumen, calastriũ, melanthium, cornu ceruinũ aut caprinũ, nasturtium, cardamomũ, galbanũ, propolis, peucedanum, panax, popanax, conyza, cupressi, aut cedri rametia oleo imbuta, gagates lapis, sagapenum, polium, canchryos radix, filix, bacca lauri, & similia graueolenta. Quum enim uenenata animalia omnia angustos habeant meatus, quàm celerim repleantur, & ab huiusmodi odoribus obturantur ac suffocantur. Refertur etiã de stercore crocodili, quod per infundibulũ suffusũ, feras ipsas uenenosas ex latibulis suis exigat. Archigenes autẽ, ungulæ caprarũ & pili, inquit, suffusi fugant bestias uenenosas: procul enim per ipsorũ odorẽ relegantur. Stratonis suffumigiũ. Galbani, radicis cãchryos, cornu cerui, melãthij, cuiusq; uncia unam. Omnia terito, & in pastillis cum aceto redigito, atq; ubi uti uelis, oleo madesfacio, ac incensa per mediã domũ suffuso, aut in ipsum ferarum latibulũ per infundibulum uaporem immittito. Aliud suffumientum, scorpions deturbans, & omne reptile ex ædibus exigens: galbani, sandarachæ, butyri, adipis caprini, æquales omnĩũ partes in pilulas redigito, & ut dictũ est, suffuso. Probẽ facit & pyretrum cũ sulphure suffusum. Mirificẽ item Beronices suffumientũ facit, quod in hoc ipso Sermone descriptum est, ubi ipsum cyphi etiã reperitur.

*Illitiones præseruatue.*

Cap. viii.

Illita autem ferarum accessum prohibent, easque suagant: althææ semen & acetum cum oleo, bacca lauri & galbanum oleo trita. Panacis semen & flos & succus cum oleo: uehementer efficax est oleum, in quo cedrina signa uisidia incoquuntur. bacca iuniperi cũ oleo, conyza, peucedanum, silphium, saluia, hastula regia, abrotonum, galbanũ. Horum unumquodq; excellenter facit aceto & oleo dilutũ, aut etiã quædam ex his, aut omnia mixta & illita. Aut castorium cum medulla ceruina & angustio narcisino illitum uehementer efficax est. Apollonius autem inquit, Qui ex syluestris rutæ succo oblinuntur,

omnibus uenenatis bestijs manus admouet, & non mordentur. Dracunculi item succo manibus illitis qui uiperam tenuerit, non mordebitur. Semen autem dracunculi aqua tritum & latibulis ferarum insectum, ipsas in terram fugat. Probẽ facit & solani succus illitus. In uniuersum autem omnem feram cuiusque earum adeps illitus fugat.

*Quæ apposita uenenata animalia occidunt, & de his quæ in edulia & potiones incidunt.* Cap. ix.

Venenatas bestias occidit galbanum cum spondylis & oleo appositũ. Cãcri appositus scorpio, ipsum occidit. Lychinis syluestris scorpions fugat: quod item facit pastinaca semen. Cæterum & aquarum quas in potu accipimus animaduersionem habere oportet. Non pauci enim perierunt ex quibusdam bestijs in edulia & aquas dum coquuntur collapsis, atq; id maxime in peregrinationibus euenire solet. Quapropter tunc culinæ procul ab arboribus extruendæ sunt, propter feras in eis latibula habentes. quin & salamandra quandoq; & eruca calefactæ obsonijs incidunt. Præcipue itaq; pinus & picea arbor sugiẽda: in his enim letales sunt erucæ. In obsonia quidẽ igitur dum coquuntur, illabi cõsueuerunt serpens & salamandra, & erucæ, in uinũ uero uiperæ.

*Communia remedia ad omnes uenenum eiacularium ferarum plagas.* Cap. x.

Per prædicta quidẽ igitur præcauere oportet, ne in malignas bestias incidamus. Si uero cõtingat ab animante quopiam uenenum iacente percipi, huiusmodi remedijs cõmuniter utemur. Si quidẽ leuior sit plaga aut morsus, posca calida eum proluemus, deinde uero locum ipsum exugemus. Verum qui exurtus est, prius os oleo colluat, ne inde sedatur, atq; ita ore ad morsum admoto exugat, & expuat uenenum. Cauere etiã oportet, ne exulceratã aliquam internam oris partem habeat exurtus. Post hæc uero cinis aut subactus pro cataplasmate imponatur. Maxime autem ad hanc rem conducit, ex ficulis lignis exustus, aut laurinis, aut lignis uitis, qui si non adsint, eo qui haberi potest utendum est, diligenter ad hoc potissimum adhibita, ut inflammatio in loco excitetur, & materiæ ad morsum prouocentur. Quod si minus nobile sit membrum, & uehementior morsus, cucurbitam cum plurima flamma ad morsum adhibe, & uicinos locos circumcirca impectis uulnusculis scarificato: attrahetur enim una cũ sanguinis & flatus attractione ipsius bestia uenena. Deinde ad tepide large haustu uomere iube: & sic deinceps pharmaca exhibe. Vigilans etiã æger adseruandus est, ac desides per totum curationis tempus, donec euidentem remissionem acceperint molestiæ concomitantes. Venter item adstrictus citra dilationem per insusum eluatur, & uesicæ quoque cura habeatur, quo citra impedimentum lotium excernat. Optime autem auxiliantur, si statim in principio post incurbitas plagas imponantur animalia parua discerpta, & adhuc intus calentia, uelut sunt gallinæ, hœdi, agni, porcelli. uenenum enim exungunt, & dolores leniunt. Apti sunt etiã his cataplasmata dilaniantia, uelut sunt allia cum melle, cepæ cum sale, ruta cum melle, silphium tritum inspersum, laser, piscis salis maxime uetus, allium usum, plantago cum sale, melissophillon, uirgula sic cũ melle, sullum recrementũ aceto coctum, calaminthe,

minthe, stercus caprinum cum aceto. Summè autem facit ad omnem bestiae uenenatæ plagam, præterquam aspidis, calx usua cum oleo & melle crassitudine cerati imposita. At uero & inurere morfus ipsos expedit usque ad crustæ productionem. Aut sinapi largum cum rumice acuto imponere, aut falem tritum liquida pice exceptum. Præter opinionem autem facit ex uiperis theriace Andromachi emplastri modo imposita. Emplastra uero ad omnem uenenosum animalis istum conueniunt, ex dictamno apparatus, omniaque quæ atrahendi uim habent, qualia sunt & quæ ex sale, & quæ ex chamæleonis radice constant, & aphroditæ appellata. Egregiè autem hoc auxiliatur. Spumæ argenti libram unam, cerusæ libram unam, resinæ pinus libræ unam, olei ueteris libras tres, ceræ sex uncem, ammoniaci thymiamatis tridentem, galbani tridentem. Cerusam, argenti spumam, & oleum coquito, donec non inqueant manus: deinde liquefacta adijcito, unito, & uti tor reposito ad omnem morsum, & ad abscessus, & tubercula mamillarum, panos, sinus, fistulas, parotidas: ad miraculum enim usque disciuit ipsas. Vitiator & ad carbunculos. Arcet uehementer inflammationem, & raro citra magnam commoditatem & efficiam adhibetur. Portiones communes. In potu autem citra dilationem in omni uirulenti animalis morfu, theriace Andromachi præbeatur, aut Mithridaticæ, & consimiles compositiones. Ex simplicibus uero, uiticis semen cum uino tritum bibendum præbeto, rutæ syluestris semen cum uino similiter tritum dato, platani pilulas, polii, polemonij quod & philergium appellatur, drachm. i. leporis coagulum aut cerui, allium, trixaginem, dictamnium, salusam, castorileum, ex unoquoque drachm. i. bryoniæ radicem drachmæ pondere: seminis trifolij, bitumen olentis drachm. i. Prodest & conyza & chamæpitys & scordium, cuiusque drachm. i. ex uino. Auxiliatur autem omnino cancri fluuiales cocti aut assati comesti. Ranae item elixæ & comestæ. Verum si qui earum esum auerterent, ranas donec uitæ redantur coquito, & iusculum ipsum ignaris absorbendum præbeto.

De uespis & apibus.

Cap. xi.

Quod si quis ab apibus & uespis illeſus permanere uelit, cum maluæ folia cum oleo illita, & eruca siue bruchus cum oleo illitus aduersabunt. Quandoquidem uero quidam ab his claculum percussus, ob dolorem perturbantur, putantque se à maligno aliquo animante petitos esse, necessarium existimo prius ostendere quæ signa ad horum plagas committunt. Hos itaque qui ab apibus punguntur, dolor istus cõsequitur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu sitarum: stimulus autem omnino in percussio loco reperitur. Eadem etiam hos quos uespa pupugit concommittatur, sed intensior: uerum stimulum uespa in percussio loco non relinquit. Auxilium autem utrique ferunt, luto aut stercore bubulo eis illito cum posca, aut maluæ folijs impositis cum posca, aut cimolia cum malua & posca, aut selsam cum posca. Naturaliter autem optulatur ueneranda & uiuifica crucis imago in sigillo ferreo exculpta, & plage appressa. Non enim permittit amplius inflammationem generari. In potu præterea ipsis foliorum lauri tenero rum drachm. ii. cum uino austero præbeto.

Ad stellionis morsum.

Cap. xii.

Qui à stellione morſi sunt, assidue & cõtente dolitant, morſusq; locum liuidum habent. Iuuatur autem euestigio si caepe & allia cataplasmatris modo eis imponantur. Auxiliantur amplius eadẽ comesta, uino meraco post eorum acceptiõnem absorpto. Viliſter etiam selsam eis imponitur, aut melathium aqua multa affatim affusa.

Ad salamandræ morſum, & lacertæ chalcidis.

Cap. xiii.

Quos salamandra percussit, eos dolor uehementis & crustæ productio consequitur. Adhibeatur autem eis cõmunis cura iam prædicta. Qui uero à lacerta chalcide appellata percussus fuit, eos tumor pellucidus cõsequitur, ueluti nigrore in ambitu plagæ relucente. Consequitur autem & putrefactio. Curatio uero eadem illis accommodanda est, quæ ad muris aranæ morſum refertur.

Demure araneo.

Cap. xiiii.

Mus araneus colore quidem mustelæ similis est, magnitudine autem muri, unde & mygales apud Græcos obtinuit nomen. Os autem sublongum habet & exiguum caudam. Dentes uero tenues, atq; eos duplici ordine sitos in utraque maxilla, quo fit ut quatuor dentium ordines habeat. Qui igitur ab eo morſi sunt, his uulnera manifesta sunt: quadrifido enim ordine uulnera conspiciuntur. Et sanguis quidem primum purus promanat, paulo post uero saniosus. Animal enim ipsum putrefactione occidit. Consequenter etiam bullæ insurgere, quas si quis dirumpat, carnem subiacentem seculentam uidebit, & fissuris dispartat. Inſlatio autẽ sequitur demorſos. Cæterum hoc animal frequentius ad testes insilire solet, eosq; uerbere impetere non hominis solum, sed cuiusq; etiã bruti animalis. Auxiliũ autem ferũt quum ob putrefactionem periclitantur, post prædicta cõmunia remedia adhibita, ab huiusmodi rebus. Lauri foliorum tenerorũ drachm. i. aut. ii. cum uino tritas bibendas præbeto. Conueniunt etiam ipsis omnia prædicta cõmunia remedia in potu accepta ex uino dulci. In pecoribus uero & fumentis illa ipsa cum aqua trita naribus infunde. Est enim ipsis præſens remediũ: unde etiam hominibus similiter in potu præbeto. Morſum porro cum cumino integito & alio, putamine extrinſeco non abſecto, eadem etiam cum oleo trita assidue & diligenter locis circumſiſis illinito. Si uero ruptæ fuerint bullæ, & ulcera oborta, adda muria proluẽ, & ordeum uſum tritum impone: uerũ non rumpẽtur, nisi prægnas fuerit mus araneus, qui morſum inflixit. Quod si exulceretur, mallei punci doliſis coriũ coctum tritũ impone, ulceraq; ex eodem decocto, aut magis myrti decocto, perfusa foue. Strato uero inquit: in muris aranæ morſu locum scarificato, ac ipsum murem araneum uſum cum aceto cataplasmatris uice imposito, aut sinapi tritum itidem ex aceto. In potu uero panacea exhibeto, erucam, capparis corticem, gentianæ radicem, & uerbenacam rectã cum cum uino bibendam præbeto, tum pro cataplasmate impone: maluæ item folia impone: & antidotum magnas bibendas exhibe.

Ad scolopendræ plagam.

Cap. xv.

His qui à scolopendra icũ sunt, eadem remedia conueniunt quæ ad muris aranæ morſum sunt prædicta, & sales tum liquida pice impositi: & cedria cum

cum melle: & allium cum folijs fici, & cumino, eruoq; ac uino. In potu uero etiam ea commodant, quæ à mure araneo morbis. Amplius autem & absinthium & menta cum uino.

Ad araneæ idium.

Cap. xvi.

Est & araneæ genus, quod isæu cōtinentes dolores inducit: rubor uero circa præcordia, & uringē emittēde difficultas egros cōcomitatur: aliquādo uero & suffocationes. Ab eo percussis rutam syluestris, & uitis albae semen aut folia bibenda præbe. Allium etiam largē edendum, ac uinum insuper meracum absorbendum exhibeto.

De tetraginathis.

Cap. xvii.

Tetraginatus, species est phalangij subalbida, pedes scabros habens, & iuxta caput eminentias duas, unam rectam, alteram latā, ut existimes eum ora quidem habere duo, maxillas autem quatuor, & lineam per os æqualem. His qui ab eo percussis sunt, cōmuniter quidem eadē accedunt quæ à scorpio percussis. Propriè autem in ipsis plaga cōtēte dolet, & percussus locus subalbidus est: tumor uero faciei & caput occupat, & percussæ partes uelut ad articulos graciles sunt: dūbium item ac alimentum non sentiunt membra, & post adeptam sanitatem uigiliæ intensæ succedunt. Opem autem ferunt ex calamintūq; potu, aut trifolij, rutæ, panacis, polij, & his quæ ad percussos à phalangio referuntur.

De percussis à phalangio.

Cap. xviii.

Phalangiorum genera quidem plura sunt: quæ uero apud eos qui de noxijs bestijs scriperunt referuntur, ut plurimum sex numero existunt: unum quidē ex eis rhagium, alterū lupus, tertium formicarium, quartum cranocolaptes, quintum sclerocephalon, sextum scolecion appellatur. Ac primum quidē rhagium, id est, acinuum, figura rotundum est, colore uero nigrum, acini uuæ nigræ similitudine, unde etiam appellationem accepit. Et os uideri iuxta mediū uentrem habet, pedes uero ex utraq; parte quā breuissimos. Alterū uero lupus appellatū muscas perdit, eisq; pascitur: ac corpus quidem habet latum ac uolubile, partes uero circa collū ipsius incisæ sunt, amplius autē & os eius eminentias tres habet. Tertium autem myrmecium, hoc est, formicarium dictum, formicæ maximæ asimilatur, colore est fuliginosum, corpus uero eius uelut astris quibusdam insignitū est, maximè circa dorsum. Quartum deinde cranocolaptes, sublongum est, & uiride, stimulumq; iuxta collum habet, atq; si in quē irruat, locus circa caput petit. Quintum sclerocephalum dictum, caput habet fæxum & obduratum: lineamēta uero per omne corpus similia animalibus illis, quæ circumuolitant noctu lucernas. Sextum autem scolecion, siue uermicularium appellatum, sublongū est & submaculosum, maximè circa caput. Atque hæc quidem species phalangiorum enumeratur, quas sanè obseruare oportet. Quæ uero percussos ab eis concomitantur, cōmunia sunt iuxta magnitudinem & paruitatem discreta. Morbus porro tenuis est, ut uix cōspici possit, tumor autem liuidus, quibusdam etiam rubicundus: frigiditas adest circa genua & lumbos ac scapulas, quandoque uero totum corpus aggravatur. amplius & dolor assiduus adest, tremor, pallor, uigiliæ: quibusdam uero pudētē tēdgo, & circa caput pruritus, aliquando etiā circa furas, oculi humecti & la-

crymantes ac caui, & uenter inæqualiter eleuatur. Intumescit autē uniuersum corpus, faciesq; & maximè circa linguā partes, ut impeditum habeant fermentationem: quibusdam uero & urinæ emittēdæ difficultas adest: quod uidentē tēdgo & dolore. Si uero minxerint, aquosæ ipsorū sunt urinæ, quædam aranearū textis similia in se habētes: & uomitus quoq; cōfusus est: aliquid uero per lotiū, & per uentrem talia excrementa. Cæterum in calidam aquam demissi à dolore leuari sibi uidentur, post uero conuēte dolent pudendū. Senioribus uero pudendum plurimum laxatur, ac minimè intenditur. Atq; hæc quidem cōmuniter ad omniū isæus sequuntur. Si uero cranocolaptes aliquē percusserit, caput magis dolet, & uertigines consequitur, frigus cōtinentes, delirium, corporis lactatio, & stomachi puncturæ. Omnes autē à phalangij percussis assiduus balneis iuuantur: plaga etiā ipsa ex trifolij bituminosi decocto cum oleo prolatur, totū uero corpus ex cerato liquidissimo pingue fiat. Iuuantur etiā fomento spongiarum in calido aceto tinctarū, & sæpe ad plagam adhibitarum. Cataplasmata autē eis conueniūt, bulbi, sanguinaria, porri, fursures aceto cocti, ordeacea farina folijs lauri cū ea in uino aut melle incoctis, rutæ, grosi ficus, caprinum stercus cū uino, famsucus cum aceto, syluestris ruta cū aceto, itemq; cyperus. Asclepiades autem hoc inquit, utere ualde laudato. Seminis rutæ syluestris, seminis erucæ, staphidis syluestris, canchryos, seminis uitis, pilularum aut foliorum cupressi, æquales omniū partes aceto terito, & melle exceptas imponito. Idem & in potu acceptum auxiliatur. Aliud laudatur, quod similitur & potatū & impositum iuuat. Sulphuris uisū drach. iiii. galbani drach. iiii. succi cyrenaiici drach. ii. aut si non adfit, laferis drach. iiii. amygdalarū amararum repurgatarū drach. ii. in uino diluito, & melle excepta imponito. Bibendū etiam, ut dictū est, præbeto. Amplius uero & cupressi folia aut pilulas tritas cū uini & olei hemina una à phalangio percussis dato. Aut anisum, aut daucū, aut cuminū, aut melanthiū, aut pipere, aut agarium, singula drachmæ pondere præbeto. Aut amij drach. ii. aut iris drach. i. aut hyperici dra. i. aut trifolij bituminosi quantū tribus digitis apprehēdi potest. Conueniūt etiā lauri bacæ, scorpiorum, serpillum, silphium, calaminta, chamæpitys per se & cum ruta ac pipere, singula uero ex uino. Aut mentæ falciculum posca meraciore coquito, & decocti cyathos ii. præbeto. Idem & famsuci, & radidis spinæ albæ decoctū, ac trixaginis & pulegij præstat. Lixiuū item & radidis hederæ succus cum aceto. Vtere etiā ad eos remedijs à scorpio percussorum, & ex uispiris theriaca, & cōsimilibus.

Asclepiades, ad percussos à phalangio: hæc Chariton utebatur, & per hominum conuentus oberrans à phalangij percussis auxilla promittebat. Seminis pondylii fici, calamintæ, æquale pōdus simul terito, & ex uini cyathis ii. præbeto, atq; id sæpe per diem facito. Aliud eiusdem. Succu cyrenaiici, seminis dauci, mentæ sicæ, spinæ nardi, singulorum æquale pondus coagmentato cum aceto, & drach. i. cum poscæ meracidoris cyathis iiii. præbeto, & à potu ægrum in calidam aquam demittito. Quod si succus cyrenaiicus non adfit, pro eo lafer purū coniicito. Aliud ualde præclarum. Canchryos, seminis rutæ,

769  
rutæ, piperis, myrrhæ, staphidis agrestis, singulorū  
drachmam unam, radicis cyperi drachmam unam,  
coagmentato, & drachmam unam, cum uini odo-  
rati cyathis iiii. ac mellis cyatho i. exhibito. Auxi-  
liatur item eis alij esus, balneum, & uinum.

De his quos scorpio percussit. Cap. xix.  
A scorpio percussus uehementissimum plagæ dolor con-  
sequitur, frigiditasq; ac tensio, & stupor, circaq; pla-  
gam & totum corpus frigidus sudor, & his qui iu-  
sta infernas partes percussi sunt, inguina excitantur,  
ac incumescunt, qui uero circa supernas, locus sub a-  
lis, & hæc quidem leuiter percussis adsunt. Validius  
autem istis, ardor circa plagam adest, quemadmo-  
dum in ambustis, & uerrucarū instar formicarum  
eruptio, circa labra & totum corpus, ut grandine se  
impeti putent, facies distorqueatur: sordes circa ocu-  
los adsunt glutinosæ, & lacrymæ uiscosæ: durities  
articulorum, anusq; prodiit cum egerendi cupidita-  
te, spuma circa os est, & uomitus largus, singula-  
tus, conuulsiones opisthotonicis similes. His igitur  
serpillum, altheæ radicem, & elaphoboscum biben-  
dum præbeto. Præter opinionem autem facit elap-  
hoboscus tum uiridis comesta, tum sicca potata.  
Pastinacæ item syluestris semen & nuces ponticæ:  
hæc enim in zona gestatæ non permittunt aliquem à  
scorpio lædi. Aliud. Cochleam hortulanam ma-  
ximè accipito, eamq; unā cum testa tritam plagæ im-  
ponito, & confestim sedabis dolorem. Idem etiā uer-  
mes terreni facere dicuntur. Aliud. Cæcrum flu-  
uiale cum uino & laesere terito, ac bibendum dato.

Aliud. Verbenacam rectam aut uiridem pro  
cataplasmate impone, aut siccam tritam bibendam  
præbe. Aliud. Cumini, melanthij, seminis uitæ-  
cis, singulorum par pondus tere, ac drac. i. inde ex  
uino exhibe. Poteris etiam omnibus communibus  
auxilijs prædictis uti. Aliud, hoc & ad phalangij  
& scorpij ictum facit. Syracis drachm. vi. sulphu-  
ris uiui drachmas sex, pyretri drachmas iiii. semina  
rutæ syluestris drachmas iiii. castorij drachmas  
duas, seminis erucæ drachmas duas, cum sanguine  
marinæ maximè testudinis subige, aut si non adsit,  
terrestris, & nucis ponticæ magnitudine præbe cum  
posca aut ex aceto. Alia antidotus, excellenter ad  
scorpij ictum conducens: quæ etiā ad meipsum ægrè  
affectum usus sum, & seruatus. Habet autem hoc mo-  
do. Castorij, succi cyrenaidi, piperis, cuiusque  
drach. iiii. costi, spicæ nardi, croci, succi centaureæ,  
cuiusque drachm. ii. mellis depumati quantum suf-  
ficat. Datur nucis ponticæ magnitudine. Datur autem  
à scorpio ictis cum uino diluto, ab aspidæ morsis  
cum aceto diluto. Detrahendi uim habet, adeo ut  
digestos etiam in membra ueneni succos eruat: &  
ob id etiam ad uulnæ stragulationem utiliter cum  
hydromelite exhibetur. Aliud. Aristolochiæ lon-  
gæ, melanthij, radicis panacis, seminis rutæ sylue-  
stris, æquales omnij partes committit. Dantur in-  
de drac. ii. cum uini meraci hemina una. Optimè au-  
tē ad eos facit, similiterq; ad phalangij morsum anti-  
dotus ex quatuor rebus ad podagricos descripta, ex  
aristolochia uidelicet, gëtiāna, myrrhæ, & bacis lau-  
ri. Dato etiā si abundes ex theriaca. Ad plagam autē  
scorpionē ipsum qui percussit, si inueniri queat, im-  
ponito. Aut stillicionem dissectum plagæ adhibeto.  
Calaminthe etiam quæ iuxta aquas nascitur im-  
po-

nea, confestim dolores remittit & tollit. Alium  
quoque aut per se aut cum sale tritum imponatur,  
aut syluestris ruta, aut scorpiurus herba. Ego uero  
syluestris rutæ drachmam unam in aceto tero, & ce-  
ræ undam unam, resinæ pinus quadrantem liquefa-  
cio, & parum olei affundo, unio, ac impono. Est  
mirabile pharmacum. Quin & ouillum stercus ui-  
no coctum & impositum, confestim dolore liberat.  
Vtere item præscriptis communibus emplastris, &  
eo quod ex dictamno apparatur, & quæ ex salibus  
quæq; ex chameleonē constant.

De morsis ab aspidæ. Cap. xx.  
Aspidum apud ferarū scriptores tres species reperiri  
nuntur. Quædā enim ex eis terrestres appellantur. Que-  
dam uero Chelidonæ, & circa fluuiorum ripas,  
præsertim Nili, lacubula habent. Aliæ uero Pryades  
nominantur. Terrestres quidem igitur maiores sunt,  
& quandoq; usq; ad quinque cubitorum longitu-  
dinem reperiuntur. Maximè uero Pryades bicubi-  
tales sunt. Chelidonæ autem, cubito maiores repe-  
riuntur, & colorem hirundini similem habent. Prya-  
des uero cinereo colore uiridij & ad auri co-  
lorem declinæ. Terrestres uero ut plurimū & ipse  
cinereus sunt coloris, quanquā & subuirdes reperi-  
untur. Cæterum accessiones & signa cōmunia sunt in  
his quos aspides momorderunt. Vulnere enim in  
demorso loco ueluti ab acu puncta inueniuntur. Bi-  
na quidē ex masculi morsu, ex foemellæ uero qua-  
tuor, citra magnum dolorem, à quibus nihil effluit,  
nisi uiolentum animal sit quod morsum inflixit.  
Consequitur autem stupor, pallor frontis, refrigera-  
tio, assiduū hiatus, palpebrarum nictationes, colli in-  
clinatione, capitis grauitas, segnitudo, & collapsio in so-  
mnium profundū. Ad finē uero & conuulsio. Mors  
autem in tribus ad summū horis ex terrestris morsu  
sequitur. In chelidonidæ uero ictu præsentissima ad-  
est. Porro his qui à pryadē conspuuntur, caligo oculo-  
rum succedit, & cordis dolor, faciei tumor, ac audi-  
tus corruptio. Tardius autē mors consequitur. Aus-  
xilium autem ab aspidæ morsu ferunt, & præsertim  
quos pryas momordit, ex acerrimi acetii potu: dan-  
dum autē est quousque acetii qualitatem circa dextrā  
præcordiorū partem percipiant: hepar enim in mor-  
sis ab aspidæ primū aiunt sensu priuari. Cæterum ad  
pregnationē an uicturus sit percussus, centaureā cum  
uino tritam bibendā præbeto: si quidē enim uomit  
pharmacum, morietur: si nō, uiuet. Quo uero malis  
genitibus ueneni distribuit & in corpus digesti probè  
euomatur, alia trita cū zytho exhibeto, donec nau-  
seabundus reddatur. Aut opopanacæ cū uino diluto  
dato, & cōfestum uomitionem operabitur. Numerius  
autem inquit: Organum uiridem aut aridā pro æ-  
gri uiribus cum uino dato. Post uomitum antido-  
tis theriacis utēdum & communibus remedijs præ-  
dictis. Vtiliter autem ad plagam imponuntur, post  
cucurbitarū adhibitionem & scarificationē, centau-  
rea cū myrrhæ & modico opio. Rumex autē si cata-  
plasmatis modo imponatur, nihil lædetur. Præter  
opinionē uero auxiliatur theriace tum plagæ im-  
posita, tū potata. Profunt autē & assidue excitationes  
cū euulsionibus & plagis, & uniuersi corporis mo-  
tus, & aqua marina calida pro fomento asperfa,

De ulpere maris ex femina morsu. Cap. xxi.  
Vipera femina colore quidem est subflauo, multis  
K instar

instar rotarum nodis exornata, magnitudine cubitali, longissima vero palmos tres aequat. Caudam autem habet acuatam in tenuitatem desinentem, non paulatim imminutam, estq; omnino carne nuda cauda & aspera. Oculi uero subrubri, & caput laetius, & angustius collum. Vētre autem sinuosiorem habet, & in gressu ad summum caudæ nititur, sensim uero inambulat, & quatuor habet caninos dentes. Vipera uero mas eiusdem est coloris: uerum caput angustius, & collum crassius habet, & uniuersum corpus tenuius, & quodammodo prolixius: gressum autem supernè circa ventrem firmat, & alacrius mouetur: dētes autem caninos solum duos habet, paulatim uero cauda ei imminuta est, quemadmodum & reliquo serpentum generi, non acuatim uelut in uipera foemina dixi, & per hoc sanè à foemina differt. Reperiuntur igitur in eis quos uiperas mas momordit uulnera in plaga binati in his uero qui à foemina demorsi sunt uulnera quatuor. Primū autem ex eis excernitur sanguis, deinde sanies sanguinolenta & oleosa: deinde tumor billosus, feruidus, bullulosus, subruber, deinde liuidus & denigratus & proserpens. Os adeo exiccatum, ardor, exolutio, & frigidi horrores insulsi, aliquando & bilis uomitus, tormina, capitis grauitas, uerigo, pallor, singultus, febris, spiritus & anhelitus celer, color plūbeus, sudor frigidus. Mors in horis septem, aut ut longissimè absit tertia die, in his qui non seruantur, & maxime his qui à uipera foemina sunt icti. Cōuenit igitur priusquā cruenta prodeant lora, alij plurimum edere, & unum meracum multum bibere, & acuernere. Efficacissimum enim in eis remediū est allij edus, ac merador uini posito, inquit Archigenes: ad eū si quis multū eius sustineat usum, itemq; meriporum, nullo alio auxilio habeat opus. Dato autem citra dilationem theriacen ex uiperis bibēdam, eandemq; plagæ superponito. Quin & ipsam uiperam excoctam & coctam, capite ac cauda & interaneis uisceribus omnibus reiectis, uelut anguilla edēdam præbet. Caput autem amputatū diligenter per uolsellam teneo, & morsui imposito ea parte adhuc calente cofigit collum: id enim extrahet uenenum. Aut quempiam qui ore plagam exugat adhibeto, qui, ut supra dictum est in communibus remedijs, os prius habeat ex oleo collutū. Aut gallinam dissecato, & interne adhuc calentem morsui imposito, atq; hoc remediū frequenter ac assidue repetito. Scarificare autē per ambitū oportet demorsum locū, & ecubitas admouere. Postea uero fraxini folia rundito & exucato, & succum quidem in potu exhibeto, quod uero ab expresso succo reliquum est ad morsum imposito. Est autem fraxinus arbor ex qua fraxinea appellata ligna cæduntur: est enim ualde efficax ad uiperarum morsus hæc arbor. Melissa phylli item folia & succus cum uino potatus & uulnere impositus euident auxilium confer, etiā si iam moriatur æger. Aiunt autem si quis melanthij drachmas IIII. edat, non moriturum. Similiter etiam melaphroditos herba efficax est. & cancri fluuiales cum lacte triti & potati & plagæ adhibiti. Magnificè etiā profunt ranæ coctæ comestæ, & iusculum earum bibiti. Præstat & nasturium plurimū edere, ac tritum quoq; cū uino bibendum exhibere. Facis autē mirabiliter testudinis sanguis exiccatu cū

syluestri cumino potatus. Vtendum etiā omnibus cōmunibus remedijs suprà relatis: superuacaneū autem fuerit eadē sæpe scribendo repetere. Maxime uero utendū est Anchusæ radice, & heliotropio cum uino. Dandus & hæmatites lapis. Auxiliari & raphani large in cibo accepti, deindeq; uomitu reiecti. Statim uero à uomitu theriace Andromachi exhibeat. Post scarificationē & gallinarū impositionē plagæ ex trisoli bituminofo decocto calido per multum tēpus proluatur ac foueatur. Nā si pauco id tēpore facias, peius afficiuntur. Deinde porrū & panē cū sale imposito, aut allū cū aceto, aut cinerē ipsius exusti, aut fraxini cinerē, aut alium quēuis cū aceto, aut fastulæ regię folia, aut fycomori folia cū pane, aut lauri solijs teneris coctis & cū oleo tritis locos integre prius quā claudantur, aut caprinum stercur imposito cū uino. Asclepiadæ epithema, ad uiperæ morsum. Sgapeni, piperis, laseris maxime cyrenai, opopanacis, cuiusq; unc. I. galbani sextantem, sulphuris uiui sextantē. Succos aceto dissoluito & arida trita inspergito, & ad emplastrī formam redacta plagæ imposito. Forinsecus autē solijs sici aut urticæ contegito. Aliud. Centauræ, aristolochię, radicis pucedani, æuales partes contundito, cribrato, & aceto subigito, adiectoq; galbano in emplastrī formā reducto. Aliud. Canchryos, staphidis syluestris, aristolochię, radicis bryoniæ, singulorū partē unā, opopanacis partes duas, aceto subige, & utere ut dictum est. Vtendum & prædictis communibus cataplasmatīs & epithematīs, maxime uero Andromachi theriaca. Aliud ualde bonum. Cancrorum fluuialium carnes terito, & adiecta tride & calaminthe rursus sufficienter terito, idemq; rursus modico sale addito facto, & pastillos informato, quibus in umbra exiccatis usitor, in potu quidem ex aqua mulsā, aut uino: in cataplasmata uero, cum lacte dissoluito.

## De dyspnea.

Cap. xxxii.

Dyspnea à quibusdam causis appellatur, estq; uiperę species, quæ in maritimis magis locis reperitur, magnitudine cubitali, ex crassa in tenuem desinens. Notas autem habet per omne corpus fuluas & nigras: caput uero angustius. Sequitur autem ab ea morfos, præter ea quæ de uipera dicta sunt, & sitis intolerabilis planè, adeo ut etiam si multus eis potus exhibeat, sitis non sedetur. Et tamen neque per urinas, neque per uomitum, neque per sudores quicquam excernitur. Duobus igitur preuent modis, aut ob multam sūm exusti, si potum non sumant: aut ob multam expletionem distentus rumpitur uēter, uel infernè circa inguina, uel circa sūmum ventrem, quæ admodum in hydropicis fieri consueuit. Cæterum & his ueluti à uipera morsus auxiliamur: propriè autem in his poriones magis urinas dentes exhibeant. Alius item per insusum eluatur, & oleo cū decoctionibus exhibitō ad uomitum cogantur. Ad plagę uero locum post exactionem, & scarificationem, & ecubitalium affixionem, & dissecatas galinas, calcem uitam cum oleo imposito, & emplastrā adtractoria, & theriacen.

## De hamorbo ex hamorrhoidē.

Cap. xxxiii.

Animalia hæc colore quidem sunt arenoso, magnitudine autem tres palmos æquant, & in tenuem ac angustā figurā caudam paulatim desinūt. Sunt autem igneo

igneo oculorū fulgore, rectaq; & tardē prorepiant. Per corpus uero multis notis albis & nigris uariata sunt, & asperioribus squamis obſita, quapropter dum ſerpūt, ſonus auditur. Et ſcœmina quidem uentri incumbens per terrā reptat, & grefſum infernē circa caudam firmat: mas uero circa uentrem in grefſu nititur, & collū in ſerpendo extendit. Conſequitur horū morſum color iſti ſod cruentus, mali coloris & nigricās: ex quo niſi in principio effluit, præterquam paucum quiſpiam aquoſum. Stomachi adest dolor, & ſpirandi difficultas. Deinde ſanguis ex naribus profluit, & ex foraminibus ipſius morſus. Et quicquid eſt in toto corpore carnicum, id rumpitur & ſanguinem profundit: atq; hæc quidem in maris hæmorrhii morſu contingunt. A ſcœminæ uero hæmorrhoidis morſu ad hæc & anguli oculorum ſanguine manant, & gingiue dentium, & unguium radices: & ut ſimpliciter dicam, per omne corpus ſanguinē efferri contingit. Dentes præterea excidunt, & gingiue putrefiunt. Horum porro curam facere oportet, primum quidem ſanguinis eruptiō obſtando ac reſiſtendo per ea quæ apertè ſanguinem liſtere poſſunt, deinde cataplaſmata plagæ imponendo ex ſolijs uidis coctis tritis cum melle, & portulacæ ſolijs cum polenta. Antea uero quàm cruenta prodeat uſina, aliū multum edant, & uinum multum dilutum bibant, & ad uomitum cogantur: deinde conſectum theriace exhibeant, & poſtea piſces multos, alijs tritis, cum oleo dinctos, edant. Sumant item in cibo panem & uiam paſſam dulcem, & deinde uino diluto largē hauſto uomāt. Plaga uero aqua frigida proluatur. Veſica autem ſpongij calidis foueatur.

*Preparatio ſanguinis teſtudinis marinx, & uſus.*

Cap. xxiii.

Teſtudinem ſuper ligneum aut ſtile uas ſupinum reclinato, cuiusq; caput ſtatim amputato, & leuata ipſa ſanguinem ſuppoſito uafe excipito, & congelatum deinde per harumidinem in multas partes ſecato, atq; operculi uice cribrum uafi ſuperponito, & ad ſolem locato, ſiccatum uero reponito, ac uſitor ad uiperæ morſum drachmis duabus exhibitus, ex poſcæ cyathino: ſequenti deinde die ſicci ſanguinis drachm. iiii. cum aceti cyathis duobus dato: & tertia deinceps, ſanguinis drachmas octo, ex aceti cyathis tribus.

*De ammodite, aut cenchria.*

Cap. xxv.

Ammodites magnitudine quidem cubitalis eſt: maior enim non pingitur, neque ſcribitur, colore uero arenofus, per corpus autem maculis nigris inſignitum. Caudam autem habet prædurā ſupernē diſciſſam. A quibuſdam uero cenchrias, hoc eſt, miliaris, ob caudæ inſtar miſij duritiem appellatur eſt. Latiores autem maxillas quàm uipera habet, quumq; in multis alijs ei ſimilis ſit, colore magis diſcerni poſteſt. uipera enim ſubſaua eſt. Cæterum ab Ammodite percuſſos ſeſtina ut plurimum mors ſequitur. Qui uero breui non pereunt, hiſ ſanguis ex uulnere promanat, & uulnus intumefcit, paulo poſt autē ſanies efferitur, ſequiturq; capitis grauitas, & animi deliquium. Qui uero opem diſpoſiti ſunt, in tri-duo intereunt, quanquā aliqui uſque ad ſeptimum diem durarint. Celerius uero mors adest hiſ qui ſcœmina ſaudantur. Auxiliū porro & hi ſerunt,

primum quidem a cōmunib; remedijs, utpote a cucurbitularum appoſitione cū ſcarificatione per ambitum uulneris locorum, & ſuperiorum pardum conſtrictione, & ad ipſam plagam ſcalpellī admotione. Proprie autem eis auxiliatur mēia cum aqua muſſa potata, caſtorium, caſia, & artemiſiæ ſuccus cum aqua. Danda etiā in potu theriace, eadem quoq; plagæ imponenda. Utendum & emplaſtris attritorijs: poſtea uero cataplaſmata, quæ ad nomas ſiue uelcera ſerpentia conducunt, imponenda.

*De ſepe.*

Cap. xxvi.

Serpens qui ſeps appellatur, lōgitudine quidem duorum cubitorum reperitur, ex craſſo autē in tenuem abit, recta uero ac tardē proſerpit: caput habet latū, os acutum: uniuerſum autem corpus multis albis notis perſerum. Cæterū hiſ qui ab eo percuſi ſunt, ex uulneribus manifeſtus ſanguis excernitur, paulo poſt uero ſanies graueolens, tumor & dolor languidus eſtat affectæ partes putrefactæ dealbantur, ac totum corpus uidiſigini (quæ alphas appellatur) ſimili colore inſicitur: deſluunt capilli toto corpore, atque intra tres aut quatuor dies pereunt. Porro opem & hi ſentiunt ex eiſdem rebus quæ in uiperæ & cenchriæ & ammodite morſu relatæ ſunt. Exhibenda eſt præterea portulaca multa in cibo, & uinum bibendum myrtites meracius. Conueniet item ſpongiam calido aceto imbutā morſui imponere, & ex butyro cū melle locum illinire, aut milij cum melle, aut paleas unā cum terra eis adhærentes exuſtas illinire.

*De cenchrite ſiue acontia.*

Cap. xxvii.

Cenchrites ſerpens eſt magnitudine duorum cubitorum, figura autem craſſa in tenuem abeunte, colore uiridi maxime iuxta aluum, ut milium colore reſeratunde & cenchrias, hoc eſt, miliaris appellatur. Aiunt etiam hunc ſeipſo fordorem fieri, quum milium floret. Ceterum ubi ſe ad lædendum parat, extendit ſeipſum, ac uſuſu ſaculum uibratum corporibus inuolat, atque hoc modo uerberat. Ab huius morſu omnia quæ de uipera dicta ſunt ſequuntur, atque etiam grauiora, adeo ut etiam putrefactiones & carniū deſluxus conſequantur, ac grauior item mors ſuccedat. Cæterū remedia ſimiliter eadem quæ ad uiperæ morſum hiſ conducunt.

*De ceraſte.*

Cap. xxviii.

Ceraſtes magnitudine cubitalis eſt, longiſſimus cubitorum eſt duorum, corpore uero arenofus eſt, & iuxta caudam deſquamatus: eminentias habet in capite duas, cornuum ſimilitudine. Partes uero circa uē trem ex ordine ſquamis obſitæ ſunt, quapropter in ſerpendo ſonum ſibilo ſimilem edut, per obliquum autem non rectā prorepiat. Cæterum percuſiſ ab eo eleuatio ac tumor plagæ capitis clauſi ſimilitudine inſurgit, & ſanies profluit uini colore aut nigricans, & maxime per ambitum, uelut in cruentatis ac ſugillatis alijs fieri conſueuit. Reliqua item quæ in uiperæ morſu dicta ſunt, etiā hiſ ſuccedunt, cum intentione uehementiori. Vt plurimum uero uſque ad nonum diem ſuperſunt. Remedia autem eadem quæ morſis a uiperæ conferunt.

*De dryino.*

Cap. xxix.

Serpentes dryini appellati abundant magis iuxta Helicepontum, latibula autem habent in quercuum radicibus. Eſt autem dryinus ſœtidus, unde & ſi quis eum nō uideat, ſœtore lod cognoscatur. Eſt autem



cubitorum duorum longitudine, & obelus, ac asperimis squamis circa uniuersum corpus munitus. In his ipsis squamis mulce pennis areis latibula sua habere dicuntur, quæ tandem ipsos serpentes occidunt. Ad eod autem malignæ ac noceris naturæ est, ut si quis eum calcet modo, illius pedes excoriet, & tumorem ingentem circa crura inducat. Et quod magis mirum uideri potest, alunt etiam Medici curantis ægrum manus excoriarî. Si quis autem, inquit, animal ipsum occidat, omnia quæ odorat ab eius fœtore corrupta putat. Porro qui ab eo percutiuntur, his tumor insurgit nigricans, dolor uehemens, nome, delirium, corporis siccitas, singultus, uomitus biliosus, aut omnino uomitus simplex, urina suppressio, tremor, interceptio uocis, stupor, scissura & mortificatio per cultorum locorum. Plurimi etiam intereunt. Porro & hi ipsi quoque ex his quæ in uiperæ morsu dicta sunt, opem sentiunt, itemque ex communibus remedijs iuxta consequentium accessionum proportionem adhibitis.

*De amphibæna & scyala.*

Cap. xxx.

Animalia hæc inter se similia sunt: non enim ex crassissimis in caudam tenuem abeunt, sed æqualis crassitudinis per totum existunt, ut neque cognoscant uidentur eas, iuxta utram partem caput aut cauda sint sita. Differt autem amphibæna à scyala, in eo quod ex utraque parte progrediatur; unde & amphibæna Græcis est appellata. Galenus autem amphibænam animal biceps esse dicit. De hac bestia ferunt, quod si foemina uterum ferens ipsam transgrediatur, conceptum male pariat ac abortiat. Cæterum ab utroque animante demorsis, contingit morsum obscurum esse, ac uix apparere, ueluti sunt muscarum puncturæ: quapropter etiam si mordeant, non enecant tamen, uerum inflammationes inducunt, ueluti contingunt etiam ab apum ac uesparum stimulis. Quare transferatur ad hos quoque quæ de illis sunt relata, uerum facultate infiore. Aiunt autem scyalam chalcidicæ eiusmodi accessiones sequi, quales à uiperæ morsos. Vnde & ipsidem remedijs ad eius morsum utendum, & ut compendio dicam, ad omnem uenenatæ feræ morsum: cuius speciei hic non reperis nomenclaturâ, auxilia eadē quæ ad uiperæ morsum cōducunt.

*De parca & spathiuro.*

Cap. xxxi.

Parca serpens in Syriæ locis reperitur, colore autem alij quidem æs referunt, alij uero nigricant. Morsum autem etiam si inflixerint, non enecant: uerum quem admodum amphibæna & scyala, ita & hic plaga sua tantum inflammationē inducit. Quare ex ipsidem etiam curentur, & ex his quæ de cherythro referuntur. Cæterum spathiurus in locis iuxta chalcidem magis inuenitur. Est autem animal ex crasso in caudam abiens tenuem, latum habens caput, ac mures comedens. Neque uero hic morsu enecat, sed inflammationes tantum inducit. Quapropter ab eis percussis itidem consimilibus remedijs curentur.

*De pelidae & elape.*

Cap. xxxii.

Signa quidem horum animalium apud ueteres non sunt descripta, utpote quæ omnibus sunt manifesta. Conringit à pelidae morsus dicitur circa locum, & putrefactio, non periculosa tamen, & uexatio ac obfuscatio oculorum, ex ueneni nimirum ad ipsos distributione. Curantur autem succo pulsanæ ac oleo in potu exhibitio, & oxylapathi decocto, & simplicioribus remedijs ad istericos descriptis. Oculi uero lo-

tio pueri uenerem nondum experti proluatur tum per se, tum muria ammixta. Caput item similiter ex eisdem perfundatur. Post purgationem deinde corporis opobalsamum cum melle illine, aut collyrium aliquod uisum acuens quod meatus rarefacere potest. Simul enim cum lacrymarum profusione & uenenum excernetur. Si uero dolor consequatur oculorum, cum lenibus collyrijs mitigare oportet, quæ tamen non stupefacient. Elapis porro morsum tormen uolulosum consequitur. Alijs communibus auxilijs curantur. Maxime uero his quæ tormina leniunt, & urinam dant.

*De basilisco.*

Cap. xxxiii.

Hocce animal magnitudine est palmorum trium, subflauū, & capite acuto. In capite autem eminentias tres habet. Vm uero super alia omnia reptilia maximam acquisiuit, ut nulla ex eis queat uel sibilum saltem ipsius sustinere. Quin & si quod ex reliquis animalibus uenenum iaculantibus ad cibum aut potum capiendum properet, & basilisci iuxta locum præsentiam persensit, retro cedit, necessarij etiam ad uitam nutrimenti negligens. Cæterum percussos ab eo totius corporis ardor comitatur, itemque liuor: defluunt capilli & corpore confestim, & in instanti omnino tempore mors sequitur. Neque uero corpus ipsius mortui ullū aliquod animal carniuorum attingit: si uero fame coactū ipsum contingat, tum & ipsi illico eodem loci mors instat. Aiunt autem quod conspectus modo, & sibilas auditus, eos qui ipsam audierunt, tollat, similiterque ab ipso conspectus. Quare uanum & superfluum diximus auxilia contra eum referre.

*De draconibus.*

Cap. xxxiiii.

Animal quidem hoc uenenum non facit, attractione autem & ui sua enecat. Abundant quidem igitur dracones in Aethiopia & Lycia: colore autem differunt: alij enim nigri sunt, alij rufi, alij cinerei coloris: & rursus alij quidem cubitorum v. sunt, alij uero x. sunt: qui ad xxx. cubitos se extendunt: quidam etiam maiores narrantur. Squamis autem obstiti sunt per totum corpus asperissimis: magnos oculos habent, & supra oculos præminentias quasdam similitudine pellium flexibilibus superciliorum. In mento autem excrecentiam quadam habent, quam barbam appellant: maxime hiantes sunt oris rictus, lingua exerta, & dentibus magnis similitudine syluestrium suum, cum quibus etiam fracturas & collisiones corporum inferunt. Quare curationes ueluti ad mordentia animalia sunt, non ut in his quæ uenenum iaciunt.

*De cherythro.*

Cap. xxxv.

Serpens hic cherythri appellationem inde habet, quod in principio quidē in aquosis degit locis, & hydrus appellatur ab ipsis aquis, hoc est, Narix: postea uero siccos incolit locos, & ex compositione locorum, cherythri, id est, natricis terrestres nomen inuenit. In terra itaque degens, cherythrus appellatur, & tum sane seipso leuior redditur. Equidem in humidis locis ex humido uisui exaratus, non purum uenenum habet: quū uero terrestris sit, maxime merum & nocentius id acquirit. Cæterum similitudine est aspidis terrestris parua, præterquam quod ceruicem non ita laram habet. Hoc enim insigne solum aspidēs præ se habent. Qui igitur ab his morsu sunt, eis communiter eadem accedunt, quæ in aliorum serpen-

serpentium morfu: ueluti est tumor, continuus dolor arsius, liuidus locus & seculentus, uertigo oculorum, exoluto, uomitus biliosus foetidi. Proprie autem motus totius corporis inordinatus, ut & per uentrem quædam inordinatè feratur. Mors autem intra tres dies. Porro ex communibus remedijs etiam hi opem ferunt, & ex theriacis antidotis. Priuatim uero cupressi pilularum drachm. .i. & myrri bacca rum itidem i. drach. terito, & cum melle rosaceo aut uino mulso in potu exhibeto. Iuxta affectum autem locum calcem uiuâ & similia cum oleo imponito.

De rana rubeta.

Cap. xxxvi.

Rubeta, ranæ species est, quæ palustris uitæ conditio- nem in terrestrem mutauit, unde & rubeta appellatur: hac autè mutatione, similiter ut chydrus, ægrè curabilem afflictionè eis qui in eam inciderunt, inducit: est enim animal magnitudine nihilo minus testudine parua: exasperat autè & uibrat terga dum spiritu expletur, atq; ob id ipsum audientius euadit. Ad lædendū itaq; & manifestè insurgit, & salibus interpositum spatium cōtrahit: rarò quidè morsum infligens, uerum anhelitū consequit ueremeter uisum lentum inducere, adeo ut etiam si anhelitu contingat tantū, eos qui propè sunt lædat. Plura autem de hoc animante historijs relata relinquimus, his tantum quæ cogniti utiliora iudicauimus, appositis. Cæterū qui ab eis læsi sunt, his omne corpus intumescit, & diffinditur, ac citò omnino pereunt. Porro quæ opem auxiliariè his ferre possunt, ex uniuersalibus & communibus antidotis ac epithematis huc transfe- rantur, itemq; & reliquis quæ ad curationem per- tinere uidebuntur.

De turture seu pastinaca marina. Cap. xxxvii.

Qui à marina pastinaca percussus sunt, his uulneris lo- cus manifestè apparet; sequitur autè dolor peridnax, & totius corporis stupor: acutum enim & firmum habet aculeum, quo uehementissima ui in altū impul- so nerui sauciantur. Quapropter in aliquibus mors dependente totū conuellit corpus comitatur. Narrat quidam, si quis cauda pastinacæ quæ istū intulit, au- ferat, & in arborem, maxime quercū, suspendat ac si- gat, ipsam quidem arbore arefcere, egrum autè sana- ri, atq; id iuxta contrariæ affectionis & remedij ra- tionem cōtingere. Cæterum auxiliū ferunt percussus ab ea, ubi stupor & refrigeratio totius corporis con- sequatur, ex calidis illitionibus & cōsimilibus cata- plasmatis. Proprie autè furfures aceto cocti & pro- cataplasmate impositi eis auxiliatur, & ipsum adeo acutū assusum pro fotu ualde prodest. Magis autem conueniunt eis attractoria, & quæ tenuius partium sunt, ac calida, quo nimirum per attractoriā facultas- tem uenenum ex profundo atraahatur, & per calo- rem frigiditas mitigetur: & quæ tenuium sunt par- tium in altū prorepent. Ad hæc igitur rem in prom- ptu habebis apta. Sulphur uiuum urina ueteri riga- tum, marrubium, lauri folia, echium, radicem pa- naciæ, saluiam & similia, a uero si his careas, fermē- tum acidum cum liquida pice emollitum imponito: mirabiliter enim auxiliatur. Cum his concordat emplastrum Piscatoris, & ex bryonia passillum tum impositus, tum ex uino calido diluto potatus, eue- stigio autem utilitatem suam demonstrat: describes- tur autem in fine huius Sermonis. Dato item & lau- ri decoctum, aut succum cyrenæum erui quantitate

cum myrrha magnitudine fabæ, ac modico pipere terito, ac dato cum uino: aut silphium, aut laser ex uino: aut succi fici guttas quinque cum tribus ser- pilli granis bibendas præbe.

De murena.

Cap. xxxviii.

Morsus à murena eadem accidunt quæ morsis à uipē- ra: quapropter etiam similia remedia adhibenda. Dato autè & fici succū cum serpillio, ut prædictū est.

De dracone marino.

Cap. xxxix.

Ad marini draconis plagam, locum percussum cum plumbo fricato, ipsumq; draconem dissectum pla- gæ imponito. Serpillum item tritum aut lentu- lam coctam pro cataplasmate imponito. In potu ue- ro abstinthium cū uino diluto præbeo, aut saluiam cum passo. Mirè etiam his conduct ex bryonia & eruo passillum cum uino potatus.

De scorpione marino.

Cap. xli.

Scorpij marini plagam sanat nullus dissectus & im- positus, sulphur uiuum cum aceto illitum. Lauri bacca tres trites in potu acceptæ.

De culicibus.

Cap. xlii.

Quandoquidem & hi hominū corpora lædunt, etiam de ipsis pauca dicemus. Culices funguntur cedrinò- rum lignorum scobe cum aramento sutorio suffi- ro. Idem faciunt cupressi pilulæ, aut coma, aut ra- menta: & uini sex sicca, & conyza, & bubulum ster- cus postquam contraxerit nigrorem. Aut melan- thium uel abstinthium oleo coctum illine, & culices non appropinquabunt. Aut melanthium cum aba- sinthio, aut cerusam cum aramento sutorio in bu- bulo stercore suffuso.

De muscis.

Cap. xliii.

Muscas necat, ueratrū album tritum, lactū, aut aquæ mullæ inspersum. Aliud. Semen hyoscyami, & ueratrū nigrum, & argenti spuma simul trita, & cum polenta irrigata & subacta, butyroq; aut adipe nidorosa facta, & in massas coacta, & muscis expo- sita, ipsas occidunt.

Ad pulices.

Cap. xliiii.

Pulices necat rhododaphnes, aut cumini decoctum ge- sperum. Idem & aqua marina facit.

Ad cimices.

Cap. xliiii.

Ut ne cimices gignantur, chamæleonis nigri decoctū facit, si ex eo lectus proluatur. Deinde sutoriū ara- mentum cum selle tauri terito, ex coque lectum il- linito. Aut etiam oleum per se, aut cum aramento sutorio inungito.

De uenenis.

Cap. xlv.

Ex animalibus exitiosa & letaliter corruptètia, sunt cantharis, buprestis, salamandra, eruca pinorum, ra- na rubeta, lepus marinus, rana palustris muta, hiru- dines. Ex seminibus autem, hyoscyamum, corian- drum, cicuta, psyllium. Ex succis, papaueris suc- cus, opocarpasum, succus thapsiæ, elaterium, succus mandragoræ. Ex radicibus, thapsia, aconitum, fixias, ueratrū nigrum, agaricū ephemeron. Ex oleribus autem, taxus, solanum furiosum, herba sardonis, papauer cornutum, ruta syluestris. In his etiam fungorum genera connumerantur. Ex ani- malibus uero, sanguis tauri, mel Heradea Ponti urbe natum, lac coagulatum. Ex metallicis, gy- psium, cerusa, calx, auripigmentum, sandaracha, spuma argenti, argentum uiuum. Ex his uero quæ nobis familiaria sunt, unum multum acer-

uatim à balneo ponim: similiter & aqua frigida accersuati à balneo aut cursu ingesta.

*Methodus præsueruatiua ne quis à ueneno phar maco ledatur.* Cap. XLVI.

Quòd si quis uenenum habeat suspectum, praeuere omnino oportet, prima cura ad hoc adhibita, ut corpus ita appareat, quo læsioni ac ueneni impressio- ni minime obnoxium reddatur: quam ad rem bo- na concoctio uel in primis conducit. Cibi autem ac gratia sumendi sunt boni succi & magis carnosissimi madurissime habita, ne quod obsonum cõsuetum non referat colorem, aut odorem, aut gustum, aut qualitatem. multa enim uenena à prouidis & pro- be considerandis facile cognoscuntur. Qui igitur in potu aut cibo ueneni suspectum habet, si signis certis quale sit id deprehendat. Ex odore namq; & amaritudine potus & cibi, optum cognoscatur. Ex colore autem cerula, gypsum, calx. Ex his uero quæ in cibo & potu innatant, lac coagulatum, & recens mactati tauri sanguis. Ex foetore autem & qualitate ac odore, rana rubeta, & lepus marinus. Quin & reliqua ex alijs quibusdam signis noscuntur, de quibus sigillatim amplius dicetur. Cæterum præsueruatiua sunt, quæ si quis ieiunus præsumat, & post sume- re ueneni contingat, minime ab ipso ledatur: suntq; huiusmodi. Calaminde quotidie accepta ex natura sua omni letali pharmaco resistit: & si in ueneni sus- picione exhibeatur, destruit iam acceptam exitio- sam facultatem. Theodorus autem ita inquit: Anti- dotos quæ incorrupta manens omnia uenena uin- cit, hæc est. Nucum iugladium unc. i. caricarum pin- gulum sextantem, sesami unc. i. unumquodq; per se rundo, deinde etiam simul pistillo ex oleo optimo madefacto, & pastillos nucis Ponticæ magnitudine formato, ex eisq; unum aut tres dato, & non contin- get ipsum in uniuersum ullum aliquid letale phar- macum. Quidam etiam rutæ trientem ammiscet. Strato autem, commune est, inquit, hoc præsidium ab omni exitioso pharmaco præsueruans. Rutæ folia xx. nucis iuglandes ii. caricas ii. falsis grumum i. Hæc ieiunio præsueruanda dato, & à nullo letali phar- maco ledatur. Alia antidotos Asclepiadæ, ad ex- itialia uenena, quæ ante data adseruat: si uero ab ac- cepto ueneno derur, ipsum cognobile facit. Baccarū iuniperi drac. ii. terræ lemnisæ quæ sphragis dicitur drachm. ii. contere, & melle aut oleo excipe. Vsu ue- ro expetente ad nucis ponticæ magnitudinem ex æ- que mulsæ cyathis ii. à balneo bibendum præbe. Hoc quidem igitur pharmacum si nulla letalis adsit uis, sumptum manet, neque per uomitum reijcitur. Si uero quippiam letale haustum sit, nauseam mo- uet, & uomere cogit, ut acceptum uenenum una cū amido excernatur. Quidam dimidiam tantū par- tem lemnisæ terræ, ex iuniperi baccis consijunt, & cum oleo omphacino subactis, similitur uiuntur.

*Quomodo cognoscantur qui uenenum sumpse- runt.* Cap. XLVII.

Cognoscere autem & discernere oportet eos qui tale quippiam sumpserunt ex signis quæ coincidunt & consequuntur. Vbi enim in aliquem placida & be- ne composita prius mentis, & bonæ itidem habi- tudinis, accedente etiam iusta ciborum concoctio- ne, statim & de repente uariæ accessiones irruant, præsertim ab accepto statim cibo aut potu, ueluti si

accedat tussis, aut foetida sanguinis per os relectio, aut molestia & ægra lotij excretio, aut dolor in ala- to nitens, aut ardor iuuenilis & uehemens, aut sen- sus erosioni, aut stuporis percussio, punctura item, tremor, singultus, contractio, eruptio bullarum, li- uor, tumor, coarctatio, quarundam partium pu- trefactio, uomitus foetidus & plenus, manifesta alie cuius uenenosæ qualitatibus apparitio & demonstra- tio. Ex his omnibus si quid repente ab accepto fa- bo sano homini acciderit, ueneno infectum esse hunc ipsum existimandum est.

*Cõmunia remedia & cura omnis ueneni.* Cap. XLVIII.

In his igitur qui ignari uenenum sumpserunt, aut qui- bus circumtectum exhibitum est, communibus re- medijs est utendum. Itaque ubi adhuc datum uene- num in uentre est, & ob id morsum & nauseam in- fert, aut etiã alias accessiones, euestigio ad uomitum infectus cogendus est, aut mox inde à ueneno uide- licet accepto, sua sponte, aut aqua & oleo tepidis in potu datis, aut butyro, si oleum nõ adsit, cum aqua calida dato. Licebit & malux decoctum exhibere cum oleo, aut foeni græci, aut seminis lini, aut fursu- rum, aut psianæ succum, aut seminis urticæ decoctum: unumquodq; ex his oleo ammixto. A uomitu au- tem raphanos multos edendos dato, aut cū aqua tes- pida ritos absorbendos: aut si hæc non adsint, nitrū cum aqua præbeto, rursumq; uomere iubeto. Post sufficitem uero uomitum communia remedia pau- lō mox dicenda in potu exhibeto. Dato etiã id quod ex iuniperi baccis & terra lemnia est præscriptum. Quòd si uenenum antea ad intestina descendit: & tormina circa umbilicum induxerit, dysenteria effica- cissimo alui euacuare oportet, ex malux uidelicet, althææ, foeni græci, fursurum, centaureæ, aristolo- chiæ, & similium decocto, mellisq; & nitro largo, itemq; oleo ammixto. In cibo uero exhibeatur ra- phanus, & salsamentum, alliaq; & cepæ. At in potu, uinum recens mari mixtum. Si uero in uescam im- petum fecerit uenenum, in aqua & oleum utere de- sessu, ita ut in aqua ipsa foenum græcum, ac lini se- men, malua syluestris & satua, ammiq; semen sine decocta. In potu etiam idem ammi semen præbe- dum, aut apium, aut sceniculum, aut spicam nardij, & similia odorata, & simpliciora urinam cientia. Si uero uescam rodant uenenum, cucumeris semen de- squamatum & tritum cochlearij mensura ex passo diluto præbeto. Similitur autem & si uentrem uehe- menter exurat, idem semen dato, ab omni calido- rum rerum adhibitione abstinento: & his quæ ad cantharidem & buprestim referuntur utendo. Cæ- terum ad cutem iam delato ueneno, irrigationem adhibeto, & illitione ex oleo modico calido, in oleū item aut aquam & oleum in solio desessu. Cibos autem facili digestibiles & sorbitiones cū melle ex- hibeto: piscibus item recentibus teneris, & uolucris- bus facili concoctilibus uitior. In potu deinde uis- num album & rufum, uetus & quam odoratissimū præbeto. Quòd si ad caput decurrat ueneni, ut gra- uitas & sopor consequatur, primum quidem aliud per insulum ex foeni græci, seminis lini, althææ & cu- cumeris syluestris maxime radice decocto subdu- catur. Deinde sternutatorium ex struio & pipere adhibeatur, & cydamini succus aut elaterij naribus infundatur: odoramenta item admoveantur casto- rium

rium, & similia cum aceto diluta, Præterea & præfer uantibus præsidij utendum est, eoq; quod ex nucleis & caricis constat, & quod ex iuniperi bacis ac Lemnia sphragide apparatur, & theriaca Andromachi ex uiperis, & Mithridatis antidoto, & consimilibus. At uero si composita non adsint, parabilibus utaris, & communiter ad omnia ferme uenena destinatis. Communiter autem ad omnia letalicia uenena facit irionis semen cum uino & oleo. Lemnia sphragis cum uino: egregie enim & quam celerissime uomitum procurat. Aut nuces iuglandes cum caricis & ruta edat, aut hæc ipsa decoquit, & decocto accepto uomat, aut seminis lini, aut malux, aut fœni græci decoctum cum oleo sumat. Porro ad accessiones quæ cum frigore incidunt, abortivum in aceto mulso cum sale daro: item irionis semen, eryngij radicem, spicæ celticæ radicem, serpillum, bryoniæ radicem, castorium, porri succum, laser, sagapenum, opopanax, succum cyrenalicum, rutæ syluestris semen. Polij etiam ac scordij & betonicæ, cuiusque drachmam unam cum uino aut aceto mulso.

Ad eos qui cantharidas hauserunt. Cap. XLIX.

Qui cantharidas acceperunt in corpus, his statim uirus eorum in nares distribuitur odore picis. Pidis item aut cedrix qualitas linguæ inferri uidetur. Sequitur autem & stomachi morbus, uentrisq; ac renum, & maxime uesicæ. Quandoq; & sanguinis excretio per urinam & aluum fortes morbus concomitatur. Vnde sanè locus circa os uentris uehementer dolet, adde ut ipsum pectoris os, quod chodrum xiphoidea à capitis gladij figura Græci appellat, dolore afficitur. Inflammat autem & dextrum ilium: deinde urinæ ejciendæ difficultas, imò & suppresio cõsequitur. Amplius autem & uis uisui oculorum consumitur, delirantq; & à loco in locum iactantur. Cæterum auxilium sentiunt, si quam celerissime uitum dulce eis præbeatur, nucleis pineis recentibus aqua calida præmaceratis ac probe tritis ei ammixtis, aut cucumeris semine decorticato similiter ammixto. Lac etiam assidue cum melle modico primum exhibendum, postea & per se recens mulctum. Aliquando & adipem asnerinum aut gallinæ ceum liquefactum potui adfundito, aut terræ famiæ drachm. i. aut rosmarini drachm. i. ex aqua mulsa dato. Dada etiam iura pinguis porcina, aut ouilla, aut asnerinæ carnes etiam agnæ, gallinarum, porcellorum recens natorum pingues ac probe coctæ, & cerebella porcina. amplius autem de iure absorbendum præbeatur, donec affectus ad uomitum concitetur. Bibat insuper uinum dulce tepidum plurimum dilutum, ubi biberit autem, unum quodq; uomitum rejiciat, rursumq; bibens uomat, idemq; sæpe repetitis uicibus faciat. Post uomitum uero lac recens mulctum, aut pisanæ succus, uel halicæ, aut oryzae, aut malux, aut seminis lini succus cum adipe asnerino uel gallinæco per dyster infundatur. Quod si exolutiones & morbus oboriantur, lac bubulum recens mulctum assidue bibendum & citò reuomendum exhibeto. Aut uitis germina contusa cum passo diluto dato. At uero contrariæ affectionis ratione quantum nihil aliud his auxiliatur cantharidum alæ & pedes cum passo potata, & scorpj radix tri ta ex passo potata, quæ iddè optimè ad buprestim facit. Dandum & ex uiperarum theriaca parum quid,

aut ex Mithridatis antidoto. Porro ubi accessiones fuerint sedatæ, farina hordeacea cum aqua mulsa isto imponatur, & uniuerso corpore ex oleo gleucino aut cyprino illito, æger in balneum deducatur, & in folio diutius moretur. Cibis autem facillè concoctilibus, & acrimoniam lenientibus multo tempore utatur. Vinis item dulcibus & lactis potu.

De bupresti.

Cap. L.

Buprestis species quidem est cantharidis, uerum uirosius tum gustus, tum odor. Ab eius autem haustu uehemens stomachi & alui dolor consequitur. Intumesceat item os uentris, uenterq; ipse ac totum corpus at tollitur, quemadmodum in hydropicis fieri consueuit, & lorium cohibetur. Cæterum eadem remedia quæ ad cantharidas dicta sunt, etiam ad buprestis sumptione exhibentur. Proprie autè post uomitum à iusculis pinguius & passo coctitum, & post euacuationes per dyster, sicus aride pingues in cibo cõueniunt, & decoctum, ipsarum in potu cum uino. Cõmodissimè autem tum his, tum qui cãtharidas acceperunt, est muliebrelac ex ipsiis mamillis assidue exuctum.

De eruca lini.

Cap. LI.

Eruca pinus potata, statim dolor circa os & palatum oboritur, & lingux inflammatio fortis, & stomachi aluiq; ac intestinorum adflictio uehemens, cum prurigi nolo circa interna sensu. Ardor itè per totum corpus, & stomachi fastidium. Cæterum eadè his auxiliatur quæ ad cantharidas sunt relata. Proprie autè oleum mellis pro simplici oleo exhibitur, & uomitum reiectum.

De salamandra.

Cap. LII.

Salamandra animal simile est stellioni, asperius & sca brum magis quam lacerta uenenata. Penetrat autem hoc animal per ignem ardentem, nihil quæ læditur dissecta & discedente ab ipso flamma. Si uero per tẽpus aliquod in igne immoretur, consumpto frigido in eo humore, exurit. Comitatur autem salamandræ acceptionem, inflammatio linguæ: mens impedita & turbata: tremor quæ cum stupore quodam & exolutione. Quædam etiam corporis partes per ambitum liuescunt, adde ut etiam decidunt sæpius putrefactæ: primum equidem maculæ albæ per corpus apparent, deinde rubræ, postea nigræ cum putrefactione & defluuii capillorum. Danda uero & his quæ in cantharide sunt relata, ut inde uomant. Proprie autem resinam pinus cum melle triam delingendam præbeat: aut etiam galbanum cum melle, aut nuces pineas tritas cum chamepityos decoctis: aut urticæ folia lilij incocta cum oleo. Præter opionem autem eis auxiliatur ranarum iusculum, si eryngij radices in eo coquantur.

De lepore marino.

Cap. LIII.

Lepus marinus reperitur ferme in totum inter lolligines, animal paruum, uirosius odorem habens. Concomitatur autem eos qui eum in corpus ingesserunt, sapor in ore similis piscibus uirosus: paulo uero post aluum dolitant, & color corporis ad arquat si militudine permuat, deinde plumbeus redditur, cum faciei tumore. Incenduntur autem pedis plætæ, & pudendum tumefactum cohibet urinæ effusio: nem: progrediente uero malo etiam cærulei coloris lorium emingunt, quandoq; etiam sanguinolentum. Deinde nauseabundi facti biliosa uomunt sanguine permixta, & piscium lorium olentia. Exudant itè graueolentia, & omne piscis genus auersantur ac

odio habent præter cancerum. His igitur lac asini-  
num recens multum cum passo assidue præbeatur,  
aut si hoc non adsit, bubulum, aut malug decoctum.  
Indeque confectum uomant, deinde radicis cyclamini  
tritæ drach. iiii. cum uino diluto dentur. Aut uera-  
tri nigri drachmam unam, aut scammonia scrupuli  
duo cum bubulo lacte aut aqua multa. Aut mali pu-  
nici acini, uel cedrids, hoc est, cedri fructus triti ex  
uino. Aut picem liquidam, aut cedratim modicam  
cum passo deligendam dato. Anferis item sangui-  
nem adhuc calentē cū passo bibendū præbeto. Edat  
& cancos asiduos; piscem enim nullum admittit. Si  
gnum porro saluis iudicabis, si piscem edere possit.

De rana rubeta.

Cap. LVIII.

Ranæ rubetæ duæ sunt species: Altera quidem surda  
est, altera uero non. Surda autem exstiosa censetur.  
Pascitur autem in arundinibus roris licu uiuens, ex  
ea sanè uenenum apparatur. Quod qui acceperint, fe-  
bris comitatur, extremæ partes incendantur, frequē-  
tissimè anhelatione ac difficili spiratione anguntur. Tu-  
mor autem sequitur corporis cum pallore buxo in-  
tento, fœtorque oris & singultus. Quandoque etiam  
seminis inuolutarium profluuium contingit. Cœ-  
terum facile opem reperiunt, si post aquæ & olei uo-  
mitum, uinum meracum multum sumant, aut picē  
cum uino. Radicem etiam harundinum, in quibus  
ranæ rubetæ pascuntur, confusam ex uino bibendū  
dato, aut cyperum ibidem enatam pondere drach-  
marum duarum ex uino. Aut maris testudinis san-  
guinem cum leporis coagulo & cumino ex uino  
præbeto. Porro dolium insuper aut furnum igne  
seruofacto, igneque extracto laterem imposito, &  
ægrum immittit, multumque ac diu exudare iubeto.  
Cogatur autem & ad continentem inambulationē,  
cursumque ac exercitationem, propter contentum in  
ipsis sputorem. Vehementer enim efficax exercitatio  
in ipsis existit. Quotidie etiam laeuer.

De ranâ palustri.

Cap. LV.

Qui ranam palustrem acceperunt appensione priuan-  
tur, sequiturque oris humectatio, nauſea, uomitus, &  
oris stomachi leuior morsus. Curantur autem uini  
multi potu cum omnibus que calfactoriam uim ha-  
bent: uelut est cyrenaticus succus, laser, silphium, cumi-  
num, piper & similia.

De hirudinibus.

Cap. LVI.

Hirudines cum aqua deuoratæ faucibus adherent, aut  
iuxta quempiam stomachi locum, aut ipsi ori uen-  
eris: & primum quidem sensum exugunt sanguinē,  
expletæ autem his que degluimus, uiam obstruunt.  
Superexpletæ uero etiam sanguinem quem ex uxe-  
runt foras profundunt, ut imaginationem inducant  
tanquam sanguis ex internis locis reſectetur. Cæte-  
rum qui affectis contingit exuctionis sensus, is si-  
gnum sit tibi hirudinem deglutitam esse. Excuit au-  
tem ipsas muria continuē & paulatim absorpta, atque  
id eo magis si acida muria sit, & laser ei ammiscetur.  
Idē facit & nix aceto dissoluta & assidue absorpta.  
Gargarissit insuper nitrum cum aqua, aut aquā  
sinapinam, aut aramentum sutorium cum aceto, aut  
sinapi, aut hyssopum, aut origanum. Si uero infernē  
circa os uentris hirudo adhareat, prædicta idēdem  
omnia bibenda dato, præter sutorium aramentum,  
utendum etiam his quæ alium soluere possunt, aut  
medicamento purgatiuo. Cum excrementis enim

exire consueuerunt. Nos autem per alij multi esum  
habentes, nullo ex prædictis opus habemus.  
Quæ postremum gutturi affixæ sunt, hoc modo ex-  
cutere oportet. Ægrum in solium calida expletum  
usque ad collum immittito, & frigidissimam aquam  
ore tenendam exhibeto, eamque frequenter permuta-  
to. Egredietur enim inde hirudo frigida appetentia  
profecta.

De ephemero.

Cap. LVII.

Qui ephemerum quod aliqui colchicum aut bulbum  
syluestrem adpellant, in corpus adsumpserunt, hos  
pruritus totius corporis concomitatur, non dissimili-  
lis ei qui urticæ aut scillæ irritamentis lacessitus exci-  
tatur. Circa stomachum insuper acrimoniae senti-  
unt & urunur cum multa grauitate. Inualeſcente  
autem malo, per alium cruentum quiddam ramena-  
tosam admixtionem habens effertur. His ueluti Saa-  
lamandra accepta auxiliari oportet, per uomitus ui-  
delicet assiduus & insulorum immisionem. Cæte-  
rum antequam inualeſcat ueneni, queri foliorum,  
aut glandium, aut malicorij decoctum cum uino præ-  
beto, aut origanum cum lixiuiō, aut uuas passas pin-  
gues tritas cum lacte exhibeto. Mirabiliter autē au-  
xiliatur lac bubulum recens multum assidue pota-  
tum, & in ore detentum, ut alio auxilio nō sit opus.

De dorycnio aut solano furioso.

Cap. LVIII.

Dorycnio siue solano, ut alij appellauerūt, furioso po-  
tato, in gustu ueluti lactis quedam qualitas sentitur,  
singultus adeſt continuus, humectatio linguæ, &  
sanguis acuatim reſicitur, atque per alium ramen-  
tosa quedam feruntur, quemadmodum in dysente-  
ridis fieri consueuit. Antē quā uero quid tale con-  
sequatur, post uomitum & dysenterem, aqua multa,  
aut lac asinum recens multum assidue potatum  
auxiliatur, passum item tepidum cum aniso pota-  
tum & amygdalis amaris tribus: pectuscula etiam  
gallinarum probe cocta, & omne cōchyliorum ge-  
nus crudum & assatum in cibo acceptum, & locustis  
& gammari, & tufculum ipsorum in potu.

De aconito.

Cap. LIX.

Aconitum uero quod quidam trim syluestrem appella-  
lant, statim dum potatur linguam edulcorat cum  
quadam adſtrictione, deinde paulo post in lingua  
amareſcit, & conſtrictione mandibularum concomita-  
tur, & oris stomachi morsus, & laterum dolor, pec-  
torisque grauitas ac præcordiorum: materia enim que  
piam circa umbilicum innititur, & cum multis  
flauibus consequentibus corruptio contingit, graua-  
tur item caput & tempora contremiscunt, oculi ue-  
ro turbatores fiunt, & subcrenti, ac lacrymas  
profundunt. Quod si diutius perseueret malum,  
etiam tremor ac concussio ac tumor totius cor-  
poris sequitur. Cæterum his post uomitus & in-  
fusa, origani potu succurrendum est, & rutæ, mar-  
rubij, abſinthij, erucæ, abrotoni, chamelææ ac  
trixaginis cū uino. Aut coaguli ceruini, aut hædi,  
aut leporis potu ex aceto. Aut ferri recrementum, aut  
ipsum ferrum, aut aurum siue argenti, aut lapidē molarē  
omnia igne candefacta in uino extinguito, ipsumque  
uinū calidū bibendū præbeto, aut lixiuium cū uino  
dato. Aut pulli gallinacæ tenerū & pinguiſſimum  
coquito, & decoquendo eliquato, donec ossa sola re-  
linquantur, & tufculum per se uel cum uino bibenda  
dū exhibeto. facit & uinulinū pingue ius potatū, &  
uomitum

uomitum reiectum. Maxime uero proprie facit trixago potata & castorium, & iris ac ruta. Quoniam aliqui à nullo horum se auxilium sensisse afferant.

De melle quod in Heraclea Pōti nascitur. Cap. LX.  
Hoc mel siue in potu siue in cibo acceptum easdem adflictiones infert quas aconitum: in Heraclea enim Ponti urbe aconitū gignitur, ex quo colligitur ibidem istud mellis genus. Conueniunt igitur eadem auxilia in aconito iam relata, & magis uidetur rutę folia ex uino mulso potata.

De coriandro.

Cap. LXI.

Coriandrum potum ualidam & asperam uocem facit, & delirium furiosum, non dissimile illi quod ab ebrietate proficiscitur inducit, hoc accedente etiam quoddam turpia dicta infecti loquantur, & per omne corpus odor coriandri transpiret. Auxiliatur autem eis uomitus ex oleo irino, & uinum meracum cum per se, tum cum abinthio potatum. Oua item in unum uasculum euacuata conuulsata & tepescita ex murelaq; absorpta, ius itidem pingue falsum tum anserinum, tum gallinaceum, passum etiam, & anisum in uino acido siue uappa sumptum.

De psyllio.

Cap. LXII.

Psyllio potatum totius corporis frigiditatem inducit, & stuporē cum exolutione & mœore. Auxiliatur autem his eadem quę coriandro hausto.

De cicuta.

Cap. LXIII.

Cicuta potata uertiginem & caliginem oculorum inducit, adeo ut neq; minimum cernere possint, singulum insuper ac mentis percussione & frigiditatem sequitur deinde suffocatio, & segnitie ac liuor, postremum conuulsi spiritui in respiratione suppresso strangulantur. In principio igitur per uomitum ex aqua & oleo cicutam excutere oportet. quod uero ad intestinum delapsum est, per euacuationē expurgetur. Deinde tanquam ad maximum remediū ad passū meraci potum perueniendum, ita ut in intervalis meraci potus bubulum lac aut asininum recens multum, aut abinthium cum pipere in potu exhibeamus. Rutam item & castorū ac mentam cum uino. Aut amomi drach. i. aut styracis drach. i. cum semine urticę ex uino. Aut lauri folia, aut silphium, aut lale, aut succum cyrenaicum, aut apij semen, aut iridis radicem, aut fesei malsilense, omnia ex uino dulci, aut nitrum cum aqua larga. Totum præterea corpus calefacere conducit & præsertim præcordia. Ad uehementiorem item motum, ac cursum æger cogatur.

De smilace seu taxo.

Cap. LXIII.

Smilax quę & Thymion, atq; apud Romanos taxus appellatur, potata frigus totius corporis & suffocationem inducit, & celerem omnino mortem. Cæterum remedia eadem quę ad cicutę haustum relata sunt, eis auxiliantur.

De succo carpasi.

Cap. LXV.

Carpasi succus potatus soporē grauiorem inducit & sensus hebetat absq; dolore, exudationē etiā facit, & repentinam suffocationem cum extisioſe saniei reiectione. Opē uero sentit ex his quibus curatur qui cicutam hauserunt, & toxicū, atq; item ephemeron.

De herba sardonía.

Cap. LXVI.

Herba quę Sardonía appellatur, & ranunculi species est, potata furorem & conuulsiones inducit, malasq; contrahit, ut risus imaginem de se præbeat qui eam

hausit, à qua dispositione etiam sardonius risus non admodum boni nominis adagio uulgo circumfertur. Est enim accessio grauis omnino quę falsi risus prætextu præsentem & insperatam mortem inducit. Cæterum qui eam hauserunt, post uomitum, & aquę mulsę ac lactis potu iuuantur, totuq; ac irrigatione & pinguefactione totius corporis, per calefactoria ungueta. Immittendi etiam sunt in aquam & oleum calidum, inungendiq; ac fricandi plurima post egressum ex solio perfractione. In uniuersum enim uelut ad conuulsionem curam moliri oportet: castorio itē cum passo & perse in potu dato, & si qua ei consilia existunt.

De hyoscyamo.

Cap. LXVII.

Hyoscyamus acceptus delirium quali ebrii obnoxii sunt, inducit, & iactatione corporis cum distortionē. his succedit exolutio animi deliquio similis, & oculorum rubor, pruritus: deinde tremor, suntq; omnino deliri, & putant se flagris corpore cædi. Cæterum facile curantur aquę mulsę largo & lactis potu, si haberi possit, asininum. Id uero si non adacta primum aut bubulum exhibendum. Facit autem & ad eos uinum falsum, & urticę semē, similiter & folia cocta ex uino falso. sinapi præterea, & raphanus, nasturtium, cepe, & allia eis conueniunt unūquodq; ex uino falso. At uero quiescere eos conuenit, ut uinum eo mellis concoquatur. Auxiliatur etiam eis muliebris lactis exutiō.

De mandragora.

Cap. LXVIII.

Mandragorę radicem nemo latenter exhibere potest. etenim trita quidē liquida grauem quandam & nauſebundum odorem exhibet, & gustui etiam amarulenta est & iniucunda. Certa tūdem copia, & mensura ad lædendum exhibetur: de cætero uero molestias quidem facit, interitum autem serius inducit. Cæterum ex his qui radicem hanc hauserunt: alij quidem segnes & languidi tristesq; ac exoluti sunt, & refrigerati in grauem ueternolum soporem delabuntur, & si quis eos excidit uix audiunt, & excidat cito rursus recidunt: Alij uero calidi quidem minime sunt, uerum mente perturbati tarde in obliuioſum soporem incidunt. Cura itaq; adhuc perturbatis adhibenda est post uomitum, coriandri semine aut pulegio tenuissime trito in potu cum aqua calida dato, aut his quę uentrem inferne exoluere possunt. Eis uero qui graui sopore preſi sunt, post uomitum, origanum ex aqua frigida exhibendum est: ual de enim inde iuuantur. Dandū etiam abinthium in passo diluto. Caput uero ex aceto rosaceo irrigandum est ægro assidue excitato. Odoramenta etiam naribus admouenda, castorium, ruta, pulegium cum aceto. Porro mandragorę mala perfectē maturā à quibusdam comeduntur citra noxam, semine tamen reiecto: & si plura quàm oporteat edantur, plus somni quàm iuxta naturam conuenit, inducunt. Immaturo uero & crudiora & præsertim cum semine comesta, maximum periculum inferunt. Sequitur ab eorum accceptione ardor supra perficem corporis. Lingua uero & os excicantur usq; eo, ut neq; salua hæ partes humectentur. Hiant semper, ore citra intermissionem aërem atrahenſes. Et si non statim auxilium feratur, conuulsi pereunt. At uero si remedia afferantur, facile curabiles existunt, aquā nanque cum theriaca ex uiperis Andromachi



machi potantes ab omnibus molestiis liberantur. Vehementer autem iuuatur in aqua frigida natio-  
ne, maxime si aliquandiu in ipsa immorentur.

De succo papaueris. Cap. LXX.

Quemadmodum de mandragoræ radice prædictum est, ita neq; papaueris succum quispiam latentem sa-  
no homini exhibere possit, propter saporis proprie-  
tatem & amaritudinem ac graueolentiam odoris, &  
quod certa copia ad interitum inferendum exhibea-  
tur. Quando igitur aliqui uoluntarie hoc pharma-  
cum biberint, siue id manifestare noluerint, siue uo-  
lentes dicere non possint, per huiusmodi accessiones  
cognoscuntur. Sequitur enim eos qui eum accepe-  
runt in somnum grauem collapsio, cum frigidityte  
& pruritu intenso, ut aliquando eum ipsum excitetur,  
odorq; opij per totum corpus effertur & exhalat.  
Inferior maxilla laxatur, tumescunt labra, irruit sin-  
gulus, distorquetur nasus, adest pallor, liuor un-  
guis, præcordiorū diuulsio, respiratio parua & fri-  
gida, & per interualla fissuræ ad finem etiam cōuul-  
sio. Auxiliatur autē his post uomitionem ex oleo,  
& acrioris dysteris infusionem, acetum mulsum po-  
tatum, & acetum calidum per se, & uinum uetus, ru-  
sum, meracum, largum cum absinthio & casta, & ni-  
trum cum aqua. Et origanum cum lixiuio, rutæ syl-  
uestris semen, piper & castorium ex aceto mulso, sa-  
tureiæ & origani decoctum cum uino. Oportet autem  
& hos odoramentis excitare, & in calidum so-  
lium immittere, & fouere ob pruritu. post balneū  
autem pinguis iuscula, & medulla ceruina exhiben-  
da. Manifestum autem quodd & his & omnibus qui  
etiam aliud uenenum sumperunt, dari debeat the-  
riace tum ante tum post uomitum.

De toxico.

Cap. LXX.

Toxicum inde appellatum uidetur, quod Barbari sa-  
glitas, quas toxemata Greci uocant, ex eo illinirēt.  
Concomitantur autem eos qui toxicum biberunt, la-  
biorum & lingue inflamatio, furor adeo uehemens  
ut ægri uarijs imaginationibus obuersantibus cōer-  
ceri non possint, atq; ob id adeo etiam ægre curen-  
tur, & raro aliquem seruati contingat. Vinculis igitur  
eos constringere oportet, & cogere ad pasci cum  
rosaceo potum, & uomitum per immissionem pin-  
nularum. Deinde iusculum pulli gallinacei pinguis  
absorbendum dato. Auxiliatur autem eis rapī semē  
potatum, magis proprie autem quinq; folij radix,  
& sanguis hirci uel capræ, & cortex quercinus cum  
lacte tritus, & mala cotonea comesta, aut decoctum  
iporum potatum, & pulegium potatum, amo-  
mumq; & carpobalsamum ex uino. Quod si quis  
periculum effugiat, multo tamen tempore in lecto  
decumbet. Suppidus autem & dubiæ ac uadlantis  
rationis per reliquum uitæ tempus manebit.

De his qui ixiā hauserunt.

Cap. LXXI.

Ixiā quæ & ulophonō appellatur potata saporem &  
odorem ocyimo similem habet, lingue autem inflā-  
mationem fortem infert & furorem: recremento-  
rum uias omnes obstruit, murmuratq; ac rugitus in-  
testinorum cū animi deliquio inducit, quum tamen  
interim nihil excernatur. Auxiliatur autem eis post  
largam uomitionem & uentris per dysterem subdu-  
ctionem, absinthij cremor cum uino multo aut ace-  
to, aut aceto mulso potatus, aut syluestris rutæ semē,  
aut silphij radix, aut tragorigani decoctū cū aliquo

ex prædictis, uel cum lacte. Aut resinæ terebinthi-  
næ & nardi & silphij cuiusq; obol. i. ex uino. Aut  
castorij & rutæ & terebinthinæ singulorum drac. i.

De chameleone.

Cap. LXXII.

A chameleonis potum, morfus uentris & lingue tumor  
cum rugitus intestinorum sequitur, facies distor-  
quetur, & uomitus spumofus, & tremores, & con-  
cussiones, & totius corporis conuulsiones, ac uocis  
interceptio cōcomitantur. qui uero album chame-  
leonem hauserunt, etiam strangulantur. Ceterum cu-  
rantur ex his quæ ad fungos sunt relata. Datur eis &  
thlaspiot & betæ succus, & triticæ pilasæ succus  
ex passo, absinthij cremor, & nitrum cum aceto mul-  
so, ubi uero uomuerint, lac recens mulsum saepe ex-  
hibeto, & aluum cum lubricis infusus eluito, uelut  
est fœni Græci & althææ decoctū. Præcordijs etiā  
fomenta ac calastoria adhibeto.

De fungis.

Cap. LXXIII.

Fungorum aliqui genere, aliqui copia noxi sunt. Infe-  
runt autem suffocationes strangulationibus non ab-  
similes, quibus constrictum prius quàm penitus uincā-  
tur, auxiliari oportet, per raphani aut rutæ foliorū  
largam comestitionem. Dandum & nitrum bibendū  
ex posca tepida aut aceto mulso, ita ut his liquoris  
bus hyslopum, origanum, thymumq; sint incocta,  
atq; inde ad uomitum cogantur. mirabiliter autem  
iuuantur lixiuq; ex farmentorum cinere excolati po-  
tu, atq; eo amplius si ex pirastri ligno lixiuolum sit fa-  
ctum, aceto ac nitro ad cinerem eius adiecto. sylue-  
stri uero pira, aut arboris iporum, pirastri uideli-  
cet, folia cum fungis cocta strangulādū uim ex eis tol-  
lunt, insuperq; ab eorum acceptione comesta, auxi-  
liantur. Bibitur & cōmode aristolochiæ drach. i. aut  
absinthij ex uino, melisophillō cum nitro, radix pa-  
naxis cum uino. Nasturdum item uiride edat aut se-  
men bibat. Cæterum Philagrius gallinaceum ster-  
cus album inquit, tritū exhibemus ex posca aut ace-  
to mulso, huius enim manifestum habemus experi-  
mentum quod ad fungorum strangulationes auxi-  
lietur. Oportet autem & acrisinsulo aluum euacua-  
re. Quando uero quidam fungi à feris uenenum iac-  
culābus arrosi aut insecti, aut etiā in locis ubi eius-  
modi bestię latibula sua habent, enati, non modo  
suffocationem inducunt, sed & intestina exulcerant,  
absinthij & sicum decoctum large in potu exhibē-  
dum est, & origanum cum melle, indeq; uomens-  
dum, deinde uero theriacē bibat, & in calidam aquā  
demittatur.

De sanguine tauri.

Cap. LXXIIII.

Sanguis tauri recēs mactati potatus in aluo in grumos  
cogitur, agram quæ spirationem inducit ac suffoca-  
tionem: comprimit etiam os uentris, & cōtinuas cō-  
uulsiones infert. Inuenitur autem horum lingua ru-  
bra & gingiue corrosæ, & sanguinis grumi inter-  
dentes. in his itaq; uomitum uitamus, etenim grumi  
in ore uentris coadunati uomitum impediunt. Da-  
mus autem eis quocūq; grumos dissoluere possunt.  
grossos igitur ex fico maxime syluestri succi plenos  
cū posca & nitro dato, aut fici succum eodē modo,  
aut lixiolum ex cinere lignorum fici, aut ramulos fi-  
ci tritos cum nitro & posca præbeto, at uero sylue-  
uestris fici fructus etiā siccus comestus euestigio gru-  
mos dissoluit. Datur & silphij radix utiliter ex ace-  
to, & amarantū, & brasicæ semen, & conyzæ folia  
cum pi

cum pipere & lixiufo. Alius autem pinguibus & lubricis infusus eluatur.

De lacte in grumos coactio. Cap. LXXXV.

Lac coagulatam aut multū & acuatim haustum, suffocationē aliquando infert in grumos coactum. Auxiliatur autē his coagulum omne, maxime uero leporinū ex aceto potatū. Etienim coagulū recētī lacti infectū ipsum cogit & infissat, id uero quod li coactū est, est natura sua dissolutū. Datur eis & calaminthæ uiridis succus, aut folia arida trita, & tuniperi bacce, item ea quæ ad sanguinem in grumos densatum sunt prædicta. Vomitus uero etiam in his recusamus, neque quicquam omnino salsum exhibemus.

De Gypso. Cap. LXXXVI.

Gypsum potatum in lapidem induratur, ac strangulationem inducit: quapropter eadem auxilia quæ ad fungos relata sunt, huc transferre oportet, ita tamen ut in his pro oleo, maluæ, aut foeni græci, ac sicuti decoctum exhibeamus, aut oleum cum aqua mulsā. His item eadem decocta per clysteres infundenda.

De Cerusa. Cap. LXXXVII.

Cerusa ob colorem suum latere non potest, accepta enim palatū inialbat, linguæque ac gingiuas, in quibus etiam pars aliqua cerusæ reperitur. Infert autem singultus & tussis, linguæque ac faucium ariditate: frigescunt corporis extrema cum delirio & mentis percussione, & difficili motu siue torpore. His porro aqua mulsā exhibenda est, aut sicum & maluæ decoctū, aut lac calidum, aut sesamum tritum ex passio, aut lixiuifum ex cinere sarmentitio, aut oleum irinum. Omnibus enim oleum large ammiscere oportet, ab uno quoque uero uomant, facit & scammonia cum aqua mulsā potata.

De argenti spuma. Cap. LXXXVIII.

Argenti spuma potata grauitatem stomachi inducit, aluique ac intestinorum, cum torminibus uoluulosis intensis, quæ circa umbilicum maxime inuoluntur. Lotum supprimitur, corpus intumescit, liuescit ac plumbi colorem induit, & articuli incendantur, ac ardent. Ad finē uero & suffocatio sequitur. Confert igitur post uomitū à decoctionibus lubricis factū, hormini semen, & myrrhæ oboli tres ex uino, aut absinthium, aut apij semen, aut hyssopum, aut piper. Et columbinum sterus cum uino & oleo, aut cum uino mulsio & oleo. Si uero nimium profusa sit aluus, lauacra calida, & carnes suillæ pingues affatæ cōueniunt, & aquæ potus, & oleum similiter in potu.

De Argento uiuo. Cap. LXXXIX.

Argentum uiuum hydrargyros Græcis appellatū potatum, eadem infert quæ argenti spuma. Consimilem etiam curam ex postulat: Auxiliatur autem imprimis lac asininum recēs multum potatum ac uomitu reiectum.

De calce, sandaracha & auripigmento. Cap. LXXX.

Calx, sandaracha & auripigmentum potata dolorem uentris & intestinorum cum uehementi morfu inducunt. Iuuantur autem succi maluæ potu, aut seminis lini, aut oryæ, aut halicæ pinguibus iusculis potatis, aquaque mulsā, & lacte calido, si ea assiduò uomitu reiecent.

De thapsia, ueratro, elaterio & agarico. Cap. LXXXI.

Ex his quæ homini ob commoditatē in usum ueniunt, aliquando uero pericula inducunt, est thapsia, ueratrū album & nigrum, elaterium agaricum. Quandoque

que enim & hæc suffocationem inferunt & purgationem ultra quam oportet: Agaricum uero in quibuscumque per alium non subductum, tremorem & resolutionem produxit. Suffocationibus igitur, ueluti in fungis dictum est, nos opponemus, aut uelut de albo ueratro relatum est in tertio Sermonē, Purgationes autem ultra modum factas per ea quæ cohibere possunt, sedabimus, & per ea itidem quæ firmitatem corpori addunt, de quibus similiter in tertio Sermonē est prædictum.

De rutæ syluestris & melanthij nocumētis. Cap. LXXXII.

Lubricorū & acrimoniam hebetantium decoctorum potum cum largo oleo opus habent, qui ea hauserūt.

De acruato frigide aquæ potu. Cap. LXXXIII.

Frigida aqua acruatim pota, aut etiam unum mersum, aut passum, à balneo maxime, aut cursu, aut concitatoribus exercitamentis morfus & dolores inducunt. Verum in his statim uenam secare oportet, & per clysterem euacuare.

De strangulatis. Cap. LXXXIII.

Strangulatis, adhuc tamen inspirantibus, & aërem attrahentibus sternutatorium naribus admotum auxiliatur, & uenæ in cubito sectio. Piper autem ex aceto si ue posita bibendum dato, & ad uomitum cogito, coartatis deinde colli locis aquam & oleum calidum adhibeto, aut anethinum calidum, aut adipem aserinum. Ianis insuper mollibus collum amplectendū est ac fouendum.

De his qui ex alto ceciderunt. Cap. LXXXV.

Ex alto præcipitatis euestigio auxiliantur uitis farnēta aquæ incocta, si aqua in potu sumatur. Quod si æger potam aquam non ferat, sed uomitu reiecta morietur. Si uero is qui cecidit, sanguinē expuit, & uenarum ruptura sit suspecta, farnēta ipsa uirito & aqua resinguit, ipsamque aquam percolatam bibendam dato, quo inde sanguinis grumi dissoluuntur, ac uero sarmentis non præsentibus cinerem quæcunque pelluto, & lixiufo inde utitor.

De præseruantibus & præfagis animælibus. Cap. LXXXVI.

Quando uero & præseruatua quædā ac præfaga animalia descripta sunt ueteribus, quæ iuxta contrariæ affectionis rationem uenena produunt, ex his etiam magis probata eligemus atque hic apponemus, quo uisueris sermo huius tractationis perfectior fiat. Pisto itaque in libro de animalibus ait: perdicem qui domi nostræ connutritur uociferari ac clamare circumplicare, ac lacerare cortem in qua perdisces connutritur, ubi cognouerit medicamentum quoddam intra ædes parari aut aliud uenenum. Menelabus autem, aquila, inquit, intra ædes connutrita insillit & arceat eos qui talia moluntur. Simonides uero paunonem tradit, cognito apparato medicamentō, ad locū prodire & clamare, seque expandere & medicamentum ex uasis dispergere, aut etiam effodere, si qui dem sit sub terra desossum. Aristodemus porro ichneumonē domi nutritū medicamenta sub terram desossa præfagire scribit. Pherecydes autem narrat plicatam marem obseruare & arguere ac nominatim deferre eos qui talia faciunt, aut in domum important. Cæterum post præscripta uenena, etiam antidotos multi usus & commoditatis, ex perimentis quoque cognitis ex ordine subnectemus.

De theriaca ex uiperis Andromachi. Cap. LXXXVII.  
Ordinem autem à theriaca Andromachi hæc de ea scribit. Quum multa discordia sit circa theriaces descriptiones, nos Andromachi descriptione ut lōge opus uisumur, quæ etiam in regum usus apparatur. Fit autem apparatus eius hoc modo. primum quidē scilicet pastillos apparare oportet, propterea quod resiccatione per multos dies opus habent. Apparatur autem hoc modo.

Pastillorū scillitorū preparatio. Cap. LXXXVIII.  
Scillam accipere oportet recentem, probe coalitam, ru-  
fam & non ualde magnam, eamq; non ut quidam  
faciunt, luto, sed fermento mundo integræ, & in ca-  
cabos in quibus panes allantur inditam in furnū ut  
assetur immittere. Deinde extractā per ambitiū pur-  
gare, & acceptis internis partibus tenerioribus eas  
ipsas probe terere, & farinæ eruinæ ex eruo rufo re-  
centi factæ, duas tertias scillæ partes inspergere, ita  
ut erui quidem libræ sint duæ, scillæ uero tres. Quā-  
quam aliquando ex æquo ambo commisceantur.  
Hæc ipsa inquam, unire ac committere oportet, in-  
deq; paruos orbiculos formare, rofaceo oleo in his  
conformandis adhibito, deinde in umbra resiccare,  
atq; bis per singulos dies uersare.

Hedychroi confectio. Cap. LXXXIX.  
Ari, asari, amaraci, aspalathi, opobalsami, floris iunci  
odorati, calami aromadici, phu pontici, singulorum  
drac. x. xylobalsami, cinamomi, costi, cuiusque drac.  
xii. myrrhæ troglodyticæ, folij, spicæ nardi, croci,  
castæ, cuiusque drac. x. x. amomi drac. vii. mastiches  
drachm. v. uini ueteris odorati dulcis quantum sa-  
tis est. Arida contundito & cribrato, crocum uero  
cum uino in pila diligenter terito, deinde myrrhæ &  
mastiche adiectis ac probe tritis, opobalsamum adij-  
cito, ac arida inspergito, simulq; comisis omnibus  
pastillos tenutores formato, uino in his conforman-  
dis adhibito: ipsos deinde pastillos in umbra refrige-  
rato, singulisq; diebus uersato.

Pastillorum theriacorum preparatio. Cap. xc.  
Cæterū pastillos theriacos hoc modo apparato. Vipe-  
ras facinoras accipito, nō quocūq; tēpore captas, sed  
desinente uere, nondū uero inchoata æstate. si uero  
uer diutius hybernū sit, iuxta æstatis principium,  
non ita diu post uergiliarum ortum, quęcumq; enim  
uiperæ prægnantes sunt, eas uitare oportet, neq; ad  
confectionem pastillorum adhibere. magis enim  
exasperatæ seipsas reddunt prægnantes. Ipsas igitur  
accipito quum in latibulis suis delitescere cessant,  
& de cætero in locos sub diu egrediuntur, & non  
adeo malignum habent uenenum. intus enim delite-  
scentia animalia, & calendis aëris ui minime per-  
cutit meatus resoluta, nocentiorum & magis exitio-  
sam ueneni uim in se coacervant. Sunt autem anima-  
lia ipsa subflaua, ingentia, & agilia: oculos subru-  
bros habent, collum angustū, & laeius caput, & cau-  
dam æcuratim in tenuitatem abeuntem ac carne pe-  
nitrus nudam, uentrem autē sinuosiore habent, &  
gressum circa caudæ summum firman, caudā ipsam  
non circūuoluentia, fed magis contortentia, & le-  
tius inambulanti. His enim signis femina à mare  
dinoscitur, insuperq; quod quatuor habet caninos  
dentes, quum mas tantum duos habeat, & angustius  
caput, ac crassius collum, & totum corpus tenuius,

caudamq; paulatim in tenuem desinentem, non acer-  
uatim ut femina, neq; omnino carne nudatam. Cae-  
uer enim oportet ne mares uiperas in antidoti con-  
fectionem aliumus. Neq; uero minus etiam reli-  
qua serpentium genera uiperæ similia uitanda sunt.  
Similis est autem uiperæ maxime quidem ammo-  
dyes, imò & hæmorrhus, & cæchrias, & seps. Quos  
omnes ex prædictis in eorum tractatu signis digno-  
scere oportet, & præcipue ex colore. flauo enim &  
subfuluo colore uipera est, alia uero genera arenosi  
sunt coloris, aut fusca, aut nigricantia. Verum non  
oportet etiam prædicta de unoquoque signa alia ne-  
gligere. Has sanè uiperas prædicto tempore eadem  
die aut præcedente omnino captas accipito. ac pri-  
mum quidem ipsarum capita ac caudas amputato,  
in tantum sanè, quantum uideris in eis carne nuda-  
tum. At uero non amputationis tantum respectum  
habere oportet, sed & nū sitam ex angustia & immo-  
bilitate ac omnino mortua animalia appareant: talia  
enim ut inutilia ad antidoti compositionem censenda.  
Si uero prædictis partibus amputatis, motū quē  
dam uideris in reliquo corpore superstitem, & ani-  
malia ipsa cruorem aliquandū in se conferunt, hæc  
ipsa ut optima in antidoti confectionem sunt ammi-  
scenda. Post hoc uero ipsorum pellem totam dilige-  
ter excoriat, adipēque ac omnibus pectori insitis  
ut inutilibus reiectis, carnes ipsas ex duabus aut tri-  
bus aquis lauat, posteaque in ollam puram insin-  
dat, & cōgruentem aque mensuram affundito, ac ane-  
thi uiridis fasciculū addito, subiectis que lignis ui-  
tis coquito. Quod si effuerat olla, solet enim assis-  
dere in decoquendo aqua bullire & ex olla effundi,  
quotiescunque hoc ipsum contingerit, frigidam aquā  
irrorato. Modum autem decoctionis sufficere ius-  
dicabis, ubi carnes à spinis discelsisse uidebis, peni-  
tus que separatas, ut ne quid ex ipsis spinis inherens  
carnibus te fallat. Ad manum deinde peluim apposi-  
tū habere oportet mudam, & ex iusculo cocturę ali-  
quid cōtinentem, atque in eam ipsam deputatas car-  
nes inijcere. facile enim resiccantur, & proinde diffi-  
culter conterri possunt. At uero ubi carnes ipsas pu-  
ras feceris, ac manibus diligenter expresseris, eas pō-  
derato, & in pilam culinariam asperiorē conijcito,  
ac fortiter aliquandū terito, paulatimq; iusculum in-  
stillato. Vbi autem quā tenuissimæ fuerint trita,  
panis purissimi recentis aridi non ex ueteri farina  
apparati confusi & cribrati, quartam carnis partem  
addito, aliquandū autem quintā solum, & rursus pau-  
latim iusculū quod satis est affundito, ac in cōcoquendo  
quā diligētissime unito: atq; ita pastillos medio-  
res tenues formato, modico opobalsamo in his for-  
mādis adhibito. eosq; deinde in umbra siccat in do-  
mus superiore coenaculo, ad meridiem, aut omnino  
ad septentrionē sito. Versare autē ipsos assidue opor-  
tet quo æqualiter resiccantur, & ne aliqua pars diu-  
tius humecta permanēs, putrefactioni obnoxia fiat,  
& periditetur. Postquā uero sicciores fuerint facti,  
eos opobalsamo optimo oblinito, & in uitreo uase  
adseruato: ac quicquid puluerulenti & albi ex eis per  
sistū productū est post dies aliquot linteo extergito.  
perforatur enim, si id ipsum eis diutius adherescat.

De reliquis que in antidoti conijciuntur. Cap. xci.  
Cæterum simplicia pharmaca quæ cum tribus an-  
tea præparatis pastillis in antidoti confectionem  
conijciuntur

conſiſcuntur hæc ſunt. Paſtillorum ſcilliticorum drachm. xlviii. paſtillorum theriacorum, drachm. xxxiii. maſſæ hedychoi, drachm. xxi. piperis nigri drachm. xxiii. opij Thebaici recentis, drachm. xxi. roſarum ſeccarum repurgatarum, drac. xii. ſcordij creſci, ſeminis buniadis agreſtis, cuiuſq; drach. xii. iris illyricæ non corroſæ, drachm. xii. agaric ponici albi, drachm. xii. cinamomi, drach. xii. aut caſiæ duplum: ſucci glycyrrhiſæ ſicci drach. xii. opobalfami optimi, drach. xii. myrrhæ troglodyticæ drach. vi. croci ciliij drach. vi. zingiberis nõ perforati, drachm. vi. rhei ponici recentis, drach. vi. radicis quinq; ſofolij, drach. vi. calaminthæ montanæ, drach. vi. comæ marrubij in uigore conſiſtentis, drachm. vi. cacuminum & foliorum ſtochadis, drach. vi. petroſellini macedonici, drach. vi. coſti recentis, drach. vi. piperis albi, drac. vi. aut nigri loco eius drach. ix. piperis longi non corroſi, drach. vi. diſtanni creſci, drac. vi. iuris maſculi integri & in partes non comminuti, drac. vi. ſloris iunci odorati, drach. vi. terebinthine chiæ, drachm. vi. caſiæ ſitulae, drac. vi. ſpicæ nardi, drach. vi. radicis gentianæ, drac. iiii. comæ poſij, drach. iiii. ſtyracis calamitæ, drac. iiii. ſeſelis maſilicis incorrupti, drach. iiii. ſeminis thlaſpis, drach. iiii. ſeminis ammi, drachm. iiii. comæ chamædryos drach. iiii. chamæpityos, drac. iiii. ſucci hypocythidis ſicci, drach. iiii. foliorum malabathri, drach. iiii. ſpicæ celicæ, drach. iiii. aniſi helladii, drach. iiii. mei athamantici, drach. iiii. ſeminis foeniculi, drac. iiii. lemnis terræ quæ ſphragis appellatur, drach. iiii. chalcitidis ſemialſaræ, drachm. iiii. amomi racemi, drach. iiii. radicis acri, drach. iiii. phu pontici, drach. iiii. carpobalfami, drachm. iiii. hyperici in uigore conſiſtentis, drach. iiii. acaciæ liquida, drach. iiii. gummi uermiculati, drach. iiii. cardamomi drach. iiii. dauci creſci, drach. ii. galbani puri, drach. ii. opoponaci, drach. ii. ſagapeni perſiciæ, drach. ii. bituminis iudaici, drac. ii. comæ centauræ minoris, drach. ii. caſtorij, drachm. ii. ariſtolochie tenuis, dra. ii. uini ueteris dulcis quātum ſufficit, mellisatici deſpumati libras x. aut quod ſatis eſt.

Modus conſciendi.

Cap. xciii.

Apparatur autem antidotus hoc modo. Sex drachmas caſiæ, & aliàs etiam xxxiii. quæ cinamomi loco ſunt coniectæ, per ſe tundito ac cribrato. deinde crocum primum in pilam coniectum cum uino probe terito. atq; ubi quā tenuiſſimus factus fuerit, ei cribratam caſiam addito, ac rursus inſuſo uino terito. ubi uero caſia ſufficiens fuerit trita, lemniam terrā cum uino modico in alia parua pila per ſe terito, & aſphalum ſiue bitumen ſimiliter diſſolutum ad crocum & caſiam inſiſcito, ac rursus aliquandiu terito. Reliqua uero omnia herbacei generis cum tribus paſtillis & cum caſtoreo tundito & per tenuiſſimum cribrum excutito. ſucculentia autem omnia, acaciā inquam, myrrhā, opium, thus, hypocythidis ſucci, & glycyrrhizam, opoponaca, ſagapenum, galbanū & gummi conſuſa, in competenti uini menſura una die ante macerato. Syracem uero in pilam magnam ac amplam coniectum cum opobalfamo terito, & priuatum unito. deinde & præmacerata ſucculentia in pilam inſiſcio ac probe terito, atq; ſi opus fuerit, uinum paulatim aſfundio. poſtquam autē & hæc ſufficeret fuerint trita, ſtyracem antea tritum, & caſiā, &

crocum & quæ cum eis ſunt adiecto, & diligenter unito. Chalcitidis deinde bonæ ſexuncem aut amplius in oſſulam paruam nouam ampli oris inſiſcitor, & ſupra carbonēs ardentes imposito, ac chalcitidem aſidue cum pura rudicula agitato. Quum uero liqueſcieri ceperit, & lutoſam ſubſidentiam acquiſierit, ſtatim ab igne auſerto, poſitiūque in terrā oſſula quo unitatur diligenter agitato, coagmetaq; pauliſper ſinito. Deinde ablato & abiecto eo quod in ſuperficie ſiccus & ruſum apparet, ex medio quod uiridius eſt & molle apparet, accipio, ac quatuor drachmas ponderato, eaſq; in mediā pilā inſiſcito, in qua reliqua prius trita habes, cum modicoq; uino in uno aliquo piſæ loco diſſolutas, cum reliquis cōmimito, ac modico addito melle deſpumato unito. Poſtquam uero chalcitis ad reliqua trita fuerit admixta, omniaq; nigrum acceperint colorem, tunc addito etiam terebinthinam cum modico melle prius diſſolutam. Qua deinde ammixta, arida etiam cōſuſa & cribrata adſiſcio, & reliquum item mellis paulatim ammiſcero. poſtea cum magno piſtillo omnibus quā diligentiſſime unitis, antidotū ipſam in moriari tranſfundo, & piſtillis lignis ex grauiſſimo ligno & poliſſimo fabrefactis, eam ad ſolem expoſitā in moriario tundito. deinde probe coniectā ſinito, & rursus poſt tridui aut quadruidum ad horas tres tundito, atq; id donec quadraginta trāſierint dies factio: deinde uas vitreis modico melle deſpumato prius imbutis excipio. neq; uero uas ualde expleto, ſed locum quemdam quo tranſſpirare pharmacum poſſit relinquiſſo. probeq; coniectū ac obligatum adſeruat. Hæc quidem igitur omnia ad pharmacum uſitatum ac conſeruationem ſunt deſcripta. Vt autem nigrum fiat, nõ ſcio quomodo in conſuetudinem uenerit, & ſanè quiſquis hunc colorem in eius apparatu nõ adſequitur, is irridetur. Modus uero adſequendi omnibus in promptu eſt. Noſſe tamē operæpreſtū eſt ex colore pharmacī, uim ipſius minime permutari. Quod uero circa colorem pharmacī offendamus & delinquamus, ob chalcitidem eſt plus uſto uſtam. ſi enim paruū ſuperatur rubicundiorē antidoti colorē reddit. Si uero amplius, non rubicundiorē, ſed à naturali paruū immutatum facit colorē. Per menſem porro antidotū ipſam uſitare oportet, & rudicula munda agitare, ne id quod in ſuperficie eſt, & quod uas cōtingit adheret, exareſcat. Cæterum tempore ad concoctionem non modico opus habet, quo matura uſui antidotus fiat, & iuſte concoquatur. Vt plurimum uero per duodecim meſium tempus coadunatur, & cōcoquitur.

Post quantum tempus ea ſit utendum. Cap. xciii.

Qui uero ipſa magis uigente & ualidore uti uolunt, etiam poſt unum menſem ea utuntur, præſertim ad eos qui à uenenatis beſtijs demorſi ſunt, & à uenenolis pharmacis infecti. hi enim quī grauiore malo urgeantur, potentiore etiam ab antidoto auxilio opus habent.

Quanto tempore efficax ſit.

Cap. xciiii.

Eſt autem pharmacum ualidum inquit Galenus, uſq; ad xxx. annum in hiſ affectionibus in quibus non tanta eſt nocentis cauſa. Quod ſi uero per tempus ſiccior fiat antidotus, eam in moriario coniectam & piſtillo triam, optimo melle deſpumato aſuſſo, & rursus unire ac excipere oportet, atq; id quotieſq; rursus aridior

aridior facta fuerit, faciendum est.

Modus probandi theriacen.

Cap. xcv.

Multū igitur ipsius potentie probandæ ac cognoscendæ gratia, aliquod purgatiuum pharmacum prius exhibent, deinde ab eius acceptione antidotum bibedam præbent, atq; hoc modo eius iudicationem per cõparationē quandam faciunt. Si enim valida & uigore efficax fuerit, purgationē fieri minime permittit, sua uel exuperās pharmacū purgatiuū facultatē. Si uero æque purgetur homo, ueluti si antidotū nō accepisset, manifestū sit eam inutilitatem & exitum esse, ut quæ retinere non potuit purgatiui medicamenti fluxum. Quidam uero papaueris succum duorum scrupulorū pondere aqua dissolunt, eumq; cani aut gallinæ uel columbæ bibendum præbent. Deinde etiam confectim antidotum dissolunt, ex eaq; nuncis ponticæ magnitudinem ori animalis infundunt, neq; quicquam mali inde comitatur.

De exhibitionis mensura, & ut eadē modo, & in quibus conueniat morbis.

Cap. xcvi.

Cæterum facultatis eius mensura non eadem in omnibus hominibus existit. Sicut neque liquor idem est, in quo dissolutam ipsam exhibemus. In uenenatis namque pharmacis, aut uenenum facultatis animæ, his plaga, nuncis ponticæ magnitudine in uini cyathis tribus dissolutam bibendam præbemus. In alijs autem affectionibus tum mensura, tum liquore diuersimodē utimur. Secundum affectionum enim diuersitatem, etiam pharmacorum quantitatem competenter metimur, & conuenienter similiter liquorem eligimus. Non enim solum ad bestiarum morsus & uenena à natura sua auxillatur, sed & ad alias magnas affectiones auxiliare pharmacū per usum experientia à nobis inuenitum est. Capitis igitur dolores diuturnos & uerrigines sanat. Auditū grauem & ut sum obtusum potu sedat, quādoque & gustus organū debilitatū emendat, & comitali morbo auxiliari conseruit. Auxillatur & suspensio, & qui orthopnoici dicitur ex aqua multa potata, dissecat & attenuat eas facile eductiles reddens coactos & uiscosos humores. cõmodat ueteri ac recenti tussi, & quibus pectoris aut laterū partes dolent, magnitudine fabæ, febre carentibus ex uino, mulso, febricitantibus ex aqua multa. Cõuenit & sanguinē per spiritū reijciētibz siue ex pectore, siue ex pulmone ductio fiat, si quidē recens sit elatio cū posca, inuenerato autē malo ex aquæ cyathis tribus, præsterit autē aquā ipsam radicis symphyti decoctū esse. Datur autē fabæ ægypticæ magnitudo ad noctē & mane. Sepe uero & sto machi uisita curauit, & salsitudi eius, ciborūq; inappetentiam in eorum desyderium & appetentiam suauiter commutauit. Quin & uentriculi distictilem concoctionem & imbecillitatem corrigit, similiterq; & stomacho inflatos, & intestinis tortos, aut colum dolentes placat. Aliquando autem & cholericæ affectioni præclare auxiliatur, corporis miscellam corroborans, & plerasque cohibens fluxiones. Maxima uero eius efficacia in his qui ex oris stomachi morfu animo linguuntur, cardiacos Græci appellant, apparet. præ multis enim & assiduus sudoribus corpore diffuente, & uiribus exoluto, quum ex uini potu sepe nihil opis sentiant, antidotus ipsa potu sudores sistit, & uires concidentēs uelut erigit ac fortiores reddit. Lumbicorum etiam omne genus mirabili

liter ex intestinis exigit, & hepaticas omnesq; inueteratas affectiones sæpe curat. Arquatum item morbū ex aliqua hepatis affectione obortū strenue sanat. Quandoq; & induratos lienes liquefacit, sordibus eorū & superflua substantia paulatim cõsumptis, atq; hoc cum aceto mulso data præstabilis facit. Deterit & lapides renū, omnēque terrenum & sordidū ex illis repurgat cū decocto petroselinī, difficilem itē mictionem uescicæ compescit, & in ipsa ulcerationes quandoq; per sanat. Laudatur & ob id, quod omnē insultum diuturni rigoris & algorem tollat, bilisq; uomitum accessionis exacerbationum tempore alia quando concomitantia sedet. Maxime uero quartanis cõducit, si quis ea ingeniose utatur. Ego igitur, inquit Galenus, multos quartanarios hoc ductu usus facillime liberaui, primum sequenti eos per uomitū à cœna euacuari. Deinde sequenti die mane abstinthij cremorem exhibui, atq; ita duabus horis ante accessiōē antidotū ipsam dedi; mirabiliter adeo sæpe successisse noui, ut cõfectim nulla accessione qui accepisset, impeteretur. Verum utendi tempus nō in principio morbi est, sed quum perfecta concoctio in urinis appareat. Etenim si in principio morborum siue ipsa, siue aliud pharmacum præbeatur, congeminat morbum. Datur & hydropicis cum sifari decocto & similibus, & eam præsertim quæ aqua intercutem & Græcis leucopilegmias appellatur, genere rose iuuare consuevit, per totū corpus digesta & distributa, atq; undiquaq; ex carnis exprimens humorem. Quapropter etiā his qui malo corporis habitu præditi sunt, optimū pharmacum existit, & elephantiūm sæpe curare solet, corruptionem corporis fieri prohibens. Et rigore neruorum conuulsis plurimum auxiliatur. Et membrorum resolutiones in potu accepta sæpe per sanauit. Credita est & foemina mensuras purgationes ciere, & immortuos foetus ejicere, quos natura propter debilitatem expellere non potest. Danda itaq; eis ex passo aut aqua multa magnitudine fabæ, ruta tamē aut dictamno in prædictis liquoribus decoctis. Podagra etiā affectus, & articulorum omnium fluxione infestatis opitulatur, maxime quum augmētū tempus præterierit, & status acuminis insisterit. doloribus enim sedatis per ea quæ eos mitigare possunt, antidotū in potu præbere oportet. Illatos enim fluores consumit, & alios inferri impedit. Maxime autem profuerit si sanā adhuc ipsam accipiant. Superfluos enim humores expendit & totam corporis miscellam permutat. Multū igitur in principio podagræ per assiduū eius potum perfecte ab affectione sunt liberaui. Admirari porro subit antidotum, quum ipsam nō modo corpore medentē uidemus, sed & ipsum animum sæpe ab affectibus male dispositum iuuare potentem; Exatrabile enim obortos animi affectus ipsa sedat. Etenim assidue exhibitiui pharmacum ex uenis & uicinis partibus atram bilem uelut exhaurit & consumit, quemadmodum etiam ex ferarum ictu illatum uenenum. Quin & aquæ formidinē pessimum morbū, quo à cane mori laborat, sæpe tollere cõsuevit, atq; ita mirifice tantorum malorū cõcursum impugnat. Cognita est præterea nobis antidotum, ut quæ in pestilentibus constitutionibus peste apprehensis unice auxiliari possit. Eos uero qui eā præbuerint pestilenti affectione apprehendi prohibet. Ipsa enim

uelut

uelut temperamentum quoddam & sanam constitutionem corporibus induci, redundantes humores consumendo, & refrigeratas partes concalescendos, insuper & innatam facultatem corroborans, ad naturales actiones probe obeundas. Cæterum in peregrinando maxime cõsulo ut ea utaris, quum frigidum existat aër per hyemem iter facis. Est enim ueluti bonum uiscerum indumentum, quod plurimam caliditatem ipsi exhibere potest. De Mithridate sane magno illo belli duce referunt, quod theriacem qui dem non biberit, neque enim adhuc in usu erat: uerum ex alterius antidoti, quæ postea Mithridatica ab illo appellata est, usu, ita corpus apparauerit, ut nulla ueneni uel lædi posset, & quum etiam leale pharmacum accepisset, mori non posset. Quum enim ab hostibus uinceretur, seipsum interficere urgebatur, quando plurimum ueneni haustus moris libi cõsiscere nequiuisset: Quapropter uocato quopiā ex amicis ei uigulum præbuit. Quare uides multæ mixturæ phar-maca multam etiam uim habere, quo corpora ex eorum usu corroborata, nullis ueneni affectionibus uel raro & difficulter admodum obnoxia reddantur, atque hac facultate uel in primis theriacem præditam esse constat. Porro tempus exhibitionis commodum est, quum probe concoxerit, ipsam accepturus, neque ciborum copia sit oneratus. Bis autem ieiunus, quo sufficiens tēporis interuallum superest ad ipsius pharmaci concoctionem. Anni præterea tempus, si multæ regionem inspicito, in quibus ipsum es exhibiturus. Aestate enim neque in totum dabis. Quapropter etiam eis qui in ætate uigoris sunt, & plurimum habent naturalem calorem, neque multum, neque sæpe pharmacum ipsum exhibere moneo: Quæ admodum contraria eis qui iam uergente & adfecta ætate sunt, tum plurimum, tum sæpe cum aqua, quam potus cõsulam ut cum uino accipiantur. In pueris uero pharmaci exhibitione omnino uitare oportet. Maior est enim pharmaci facultas quam uires eorum tolerare possunt, & corpus fane facile dissoluit, & insitum spiritum cito extinguit: Quemadmodum & lucernæ flammam oleum ipsum, si ignem superet, facile extinguit. Atque ego uere id narrare possum, inquit Galenus, puerum quandam ab intemperstiuo antidoti usu exolutum esse. Omnē namque ipsius habitum pharmacum ipsum dissoluit, & uicem fluorem commouit, atque ita noctu puer expirauit. Quod si aliquando calidiorē regionē inhabitēs, uitare oportet antidoti usum, sufficiente tibi illius loci aëris calore. Vnde neque hominibus qui sub primo solis ortu habitantes calidissimi sunt, & multum habent illius regionis calorem, antidotum theriacē cõuenire puto.

*Sales Theriaci ex libris Martiani, cum quibus consensit Galenus.*

Cap. xcvii.

Sales ex uiperis hoc modo apparatus. faciunt autem & ipsi ad omnia prædicta moderate, per assiduum usum commoditate exhibentes: quanquam sint qui eorum auxillarem potentiam penitus negent, per exustionem dissipari affirmantes ferarum facultatē. Ego uero dicere ausim, eandem quidem potentiam cum theriaca sales non habere, non tamen eorum uim per ignem perire, quum multa sint quæ per ignis familiarietatem meliora reddita conspiciantur, uelut est aurum, & calx, & similia. Viperæ enim integræ usitæ intentionem & malignam uim per exustionem

deponunt: Temperamentum autem auxiliare & symmetriam ab igne sumunt. Proprie autem in affectionibus cutis curandis sales commendantur, cuius generis sunt leuce, lepra, impetigo agrestis, elephantiasis, alphas, scabies agrestis, & raritas ac desiliuum capillorum, huiusmodi enim cuius uicia confestim delent, & acria crementa subter cutem reducenda optime dissolunt. Plerisque enim ex eorum usu sudor prolicuit, atque ita per exudationem corrupta substantia euacuatur, adeo ut quiddam in principio pediculos excluderint intra xiiii. ad summum dies: post hos enim nullus in corpore pediculus appareat. Quidam uero pro pediculis sputa pituitosa reiecta ad saluti reiectione initium facientes, deinde paulo post etiam sputa repurgata sistuntur. Licet autem tum in prandio, tum in coena eis uti, cum quibuscumque eduljis eos accipere uelis, neque ultra ad eorum accipionem prouocare oportet. Tanta enim ipsis insita suauitas est, ut magis uoluptatis gratia eos cõsentes quis dicere possit, licet igitur usque ad iii. coctilearia per diem eis sit sumere, maxime si cibus prius in uentre sit probe concoctus. Qui enim eos accipiunt, concoquant melius & cibi appetentiores sunt, floridius etiam corpus habent, & sensus omnes uegetiores. Suffusiones igitur incipientes & nondum congelatas egregie dissoluit, neque plane quis suffusionem incurrat qui eos quotidie accipiat. Purgationes ite lunares propter oburationem aliquam aut sanguinis coactionem suppressas cient. Idē etiam largum & impetuosum mensium desluxum sistunt. Quisquis autem eos præsumpserit omnes uenenorum, & uirum iaculatum bestiarum insidias euincet: neque etiam quum infectus fuerit, & postea statim sales accipierit, periculum incurrit, maxime si corporis sui temperamentum per horum salium usum multo tempore appararit ac uelut condierit, quemadmodum Mithridatem fecisse dixi. Præstat & pestilenti constitutione instante ad auxiliare hoc & mali depulsorium pharmacum confugere, præsertim si ei myricæ herbæ ammisueris. Morborum præterea omnium medicis sales exiit, maxime tamen eorum qui in renibus cõsistunt: lapides enim in eis aterunt, & plane marcos renes restituunt. uertigini uero & dolori capitis inueterato, morboque comitiali nulla alia cõgruētia medela exhiberi queat, si quis eos per integrum annum ex ordine large sumat. Noui & arquatos diuturnos, & splenicos, ac colicos, qui frequenter hanc affectionē inciderunt, per eos sanatos, hydropem etiam maxime subter cutem per eorum usum rescicauit & ingentem famem, bulimon Græci dicunt, dissolui. Vt quis etiam per frigidum aërem iter faciens minus frigore lædatur, comesti faciat. Rigores autem per circuitum repetentes diuturnos cohibent, & tussis humectas rescicant. Tabidos uero iam mirabiliter ad bonam corporis habitudinem reduxerunt paulatim eduljis adpersi: Exolutos autem à languore perfecte resoluiscere faciunt. Scio namque plurimos membris penitus resolutos per ipsos sanatos. Ad podagrā demum maxime incipientem, & omnino ad omnes articuli morbo affectos unicum hoc edulium cõstructum esse uidetur. Adhortor igitur eos qui à podagrā liberati sunt, ut eis continue utantur. Quidam uero uiperas totas extēdunt & siccant, posteaq; terunt ac eas in potu contra morbum articularum exhibent. Ceterum



uix satis dignis uerbis assequi queas, quantum diuturnas quartanas & deliria ex atra bile oborta dilatant & remouentur, si anie accessiones, & in interuallis quoque sumantur. Eneceat ite omne lumbicorum genus. optimum est etiam per ipsos maxime crassiores, dentes conficere. Non enim albiore tantum eos reddunt, sed neque dens postea laxior factus mouebitur, neque erodeatur, neque suporem incurrit. Extrahit etiam per ea puti recementorum copiam, ac caput purgant, & oculi leuiores reddunt. Apparatur autem hoc modo. Vi peras accipere oportet magnas, eiusmodi qualis prae diximus specie eodemque tempore capias, numero quatuor, non ultra biduum postquam captae sunt adseruas: sed si fieri potest, eadem quae captae sunt die, eadem in ollam figulinam puram magnam conijcere oportet, statimque supra ipsas pro sale ammoniaco, sale communem solum & exiccatum inijcere, praestiterit qui dem ammoniacum sale esse, si uero haberi non possit, communis & albi italici modij dimidui, hoc est lib. xx. inijcitur, atque id non in meridie facio, sed mane. Tunc enim rigentes adhuc bestiae ad mortu tardiores res sunt. Quod si phagi etiam arboris ramulo uiperas caedas, ad mortum ipsas tardiores reddes, & mira bile eis sopore induces. Est autem phagus species quercus. Quam igitur uelut dictum est, uiperas salibus grauaris & opresseris, pastillos insuper ad sales adijce hoc modo apparatus. Radicis gentianae, sesquialibra, aristolochiae roridae sesquialibra, comae caureae minoris lib. ii. seminis cardamomi lib. ii. marrubij, scorodij, apij, chamedryos, seminis rutae hortensis, singulorum lib. i. Hec omnia in crassas partes confundito, & cum amico melle subacta in v. aut vii. pastillos latiores, quo probe exuri queant, reducto. Hos equidem pastillos eo quo dixi modo preparatos habens ad sales uiuis uiuis iniectiones imponito. Deinde scillas electas, magnitudine sua manu expleres, recites v. in rebus partes diffectas pastillis superindito, alitque dimidui modij italici, hoc est x. libras alias salis supra scillas & pastillos inijcitur, & deinde olla operculo tria foramina habere obturato, eamque fornicem totam eo figulino, ut si rumpatur, nihil pereat, oblitino. Indeque sensim igni adhibeto, paulatimque circumlulum torreo, deinde aucta flamma per sculneorum aut uicis lignorum ollae subiectorum exustione, uaporem inde per foramina elatum obseruato, primum enim fumus multus caliginosus & turbatus ualde exigens apparebit, significationem perhibens, quod ignis iam feras ipsas contingit. Quo tempore diligenter cauere iubeo, ne quid ex illo fumo per respirationem haurias, aere nimis per ferarum exhalationem infecto, deinde ubi cessauerit uapor, & flammam quandam exillem per foramina conspexeris egredientem, tunc sane quam optime assatas puato, atque illa olla ab igne ablata, perque die ac noctem refrigerata, uista per apertam ollam eximito, & cum subscrisptis tundito. Sunt autem haec. Seminis rutae sylvestris dodrantem, hyssopi dodrantem, nardi celticae sexuncem, stachyos sexuncem. Est autem marrubio similis, non tamen spinosa planta seu frutex, seminis feniculi montani sexuncem, petroselinum macedonici trientem, comae origani dodrantem, seminis hormini tosti dodrantem, racemi amomi quadrantem, acuminum thymum dodrantem. Foliorum malabathri trientem, carpinum juniperorum baccarum lib. ii. seminis corian

dri sexuncem, piperis longi lib. ii. radicis silphij uncias xvii. zingiberis non corrossi lib. ii. seminis fatyrj quadrantem. Quidam uero radicis fatyrj conijciunt sexuncem, pulegij montani sexuncem, seminis mentae sexuncem. Aut si haberi non possit, herbae siccae sexuncem, cordylj & caliae cuiusque quadrantem, selis malsiliensis sexuncem, dnamomi unc. i. Maxime opore autem conandum est, ut crassiora ueluti sunt lignosa omnia contundendo attenuentur, neque quicquam ex eis reijciatur. Uisa autem per angustissimum cribrum excutito, bis & ter per eadem cribrella excutiedo, quo quam optime uniatur, atque ita omnia in uitreis uasculis reponito, neque statim uititor, sed post quadragesimum tandem diem. Inuenteram enim pharmacum maiorem comoditate de se praebet, maxime si extra omnem humiditatem ipsum siccum adseruaris. Ceterum colore non ualde nigredit. Ego uero, inquit Galeus, bestias ipsas non exuro, sed pastillos ex eis, quorum confectio in theriaca docuit, reliquis quae cum bestiis uruntur ammisceo, & simul exuro, quo eam quam in se habet amaritudinem, per exustionem abijciat, tantum autem pastillorum mensuram adijcio, quantum coeatura assequi possum quatuor numero uiperas habere, & sane sales uere optimi euaserunt, utpote qui neque ex uisione cinereu retulerint saporem, neque nigritudinem, sed & ob qualitate usus gratissimi sunt facti, & qui uim qua eos proprie praestare praedicant effusacore habent. Effundit autem quatuor uiperas magnas, pastillorum siccorum sextantem & unciae dimidium. Atque hic quidem est totus confectiois salium theriacorum modus. Oportet autem medicum uarie ipsis uti: utpote si sanguinem spuentibus sales hos exhibiturus sit, radicis symphyti contusae & cribrate sextam partem ad salis modum addet, ueluti si quinq; cochlearij pharmaci una symphyti addat. In phthisicis autem siue tabe factis & pectore suppuratis, iridis tenuissime trite aut dictam sextam partem salis poterit adijcere. Hepaticis uero chamaeapitum, splenicis cyclaminum radicem, aut capparum corticem, aut piperis addet sextam partem. Quod si ad podagricos apparare uelis, dimidium prescripti poderis fatyrj auferto, uitando ne rabiosas & membra exoluentes in ipsis excites uoluptates. Ceterum in renibus lapides quam maxime atterunt sales, si carpopalsamum, aut lithosperma appellatum habuerint ammixtum. Si uero uim contra uenena intensiore facere uelis, in salium confectioe scordij & marrubij duplicibus, insuperque anatum sanguinem siccum adijces. Eis uero qui a rabido cane morisi sunt, amplius conferent, si praenoxia radicem addas aut caneros exustos. Opisthoronicis autem qui retro neruis conuelluntur, maxime profuerunt, si castorei & opopanax parum habeant admixtum, in eis sane qui id tolerare possunt. Visum porro exacuit solubathri folij duplato pondere in confectioe additum. Concoctionem uero ciborum uiuant si casiae & costi eis sufficiens modus addatur. Ad inflationes autem cumini adijcitur. Vrinae amplius clerauci semen additum. Quartanas uero amplius soluunt, si uerbenacum rectam, & eupatorium, & succum cyrenaicum, aut ipsum laser adsumant. Verum ut summum dicam, Omne quod commodum & habile noueris affecto membro, id ipsum ad sales, siue in ipsorum confectioe, siue exhibitionis modo ammiscebo. Quin & amariores scito sales appa-

ros. Ex his enim quæ cum uiperis uruntur aristolochiam, & scordium, & cardamomum, & dimidium centaureæ detraho, eademq; postea cū reliquis quæ rudentur misceo, imò & stochadis parē scordij mēsuram addo, atq; ita gustu amariore sales euaserūt, & in usu sanē ad multa mihi commodiores sunt exapti. Porro cauendum est ne eos pręgnantibus & ab ubere lactantibus exhibeamus. Et ne pueris, ac tēperamento calidioribus, & pręsertim tempore æstiuo, & regione calida, & qui acuta & sicca febre laborant, eos quoquo modo prębeamus.

*Antidotus Mithridatica.* Cap. xcviii.

Hæc ut Antipater & Cleopater tradūt, ista capit, Myrrhæ drachmas vii. obolos iiii. spicæ nardī tantundem, croci drachm. vii. obolos iiii. opij drach. iiii. obolos ii. & dimidium, styracis drachm. v. castoreij drachm. vi. obol. i. cinamomi drachm. x vii. poslij drach. v. scordij drach. x vii. zingiberis tantundē, costi drachm. xvi. piperis albi drach. v. obol. i. piperis longi drach. xvi. seselis incorrupti drachmas v. obol. ii. petroselinī drachmas xiiii. seminis dauid drachm. xvi. casia drach. xv. thuris drach. xvi. succi hypodisthidis drach. vi. & sesquibolum. nardī celtici drach. iiii. seminis sceniculi drach. iiii. folij malabathri drach. iiii. acori incorrupti, phis, sagapeni, carpo balsami, hyperici, iridis illyricæ, acaciæ, gummi, seminis cardamomi citra medullā. seminis pelecini, singulorum drach. ii. lemnis sphragidis, confectiois cyphæos, partium scinci iuxta renes sitarum, singulorum drach. ii. seminis thlaspios drach. xvi. gentianæ drach. iiii. anisi drach. iiii. rosarum siccarum mundarum drach. iiii. mei drach. iiii. florum iuncti odorati drach. vi. opopanax drachm. vi. galbani drach. vi. obol. iiii. opobalsami drachmas vi. obol. iiii. aristolochias drachmā i. hyssopi drach. iiii. marrubij drach. i. chamæpityos drachm. iiii. rosmarini drach. v. terebinthinæ chiæ drach. vi. obol. iiii. mellis arctici despumati quantum sufficit. Vinū ne addas, sed prædissolutis melle calido succis, indeq; ita adiecta terebinthina, inspergitō sicca conuulsa & angustissimo cribro excussa. Vnitōq; & reposito omnia. Datur drachmæ pondere, aut ad summum siliquæ xiiii. ex ea exhibentur.

*Confectio Cyphæos.* Cap. xcix.

Cæterum Cyphæos, quæ in antidotum coniicitur, descriptio hæc est. Vix passē tenuis ac pinguisimæ de tracta pellicula & uinaceis, hoc est, ipsius carnis drachmas xiiii. terebinthinæ ustæ drachm. xiiii. myrrhæ drachm. xii. cinamomi drach. iiii. floris iuncti odorati drachm. xiiii. croci drach. i. bdellij drach. vi. onychos, hoc est, unguis aromatici drach. i. aspalathi drach. ii. & dimidium, spicæ nardī drachm. iiii. casia drach. iiii. cyperi drach. iiii. & dimidium. bacarum siniperi magnarum drach. iiii. & dimidium, calami aromatici drach. ix. Mellis quantum satis est, uini odorati parum, Myrrham, bdelliū, & terebinthinā usam contere cum uino ut mellis crassitudinem in duane deinde uinā passam per se probe tritam adijce, simulq; tritis mellis sufficere modū infunde, ac reliqua insperge, pastillisq; inde formatis utere. Vritur autem terebinthina hoc modo. Terebinthinam confice in ollam, & triplum aut etiā amplius aquæ infunde, & ad ignem adhibe, nihilq; omnino mouendo coque, ubi uero consumpta fuerit aqua & te-

rebinthina attenuata ac inualida reddita, ut digitis confringi possit, eam tolle atq; in antidotum confectio nem affume. Si uero infumpta aqua adhuc mollior appareat terebinthina, aliam aquam superfunde, rursumq; ad ignem adhibe, donec friabilis reddatur. Datatur autem cyphi ipsūm & per se commodè his qui hepar aut pulmonem, aut renes, aut aliquod aliud uiscus exulceratum uel obstrutum habent.

*De antidoti Mithridaticæ usu.* Cap. c.

Datur itaq; ad summum ex præscripta antidoti Mithridaticæ nucis pōticæ magnitudo. Eis uero qui ad integrum ætatem peruenerunt Græcæ fabæ; Augetur autē & minuitur hæc magnitudo in medijs ætatibus. Atq; his quidē qui febre carent ex uino danda est, aut uino mulso, aut cōdito, si quidē hepar habeat obstrutum, febricitantibus uero ex aqua, aut aqua mulsā. Facit enim ad antiquas stomachi fluxiones itemq; thoracis, & ad omnes inueteratas in profundū corporis exulcerationes aut abscessus: facit ad tabidos, & ad uentris inflationes. Et coactis mēditur, & reduct obstrusum appetitum, & bonum colorem corpori addit. Frangit lapides, sanas urinæ difficultatem & atram bilem congregari uetat: fortius in mortuos expellit, & ad alias item affectiones conueniens est. Acuit uisum eorū qui eam accipiunt, plurimam autem præsertim præsumpta uim habet, quod non permittat quempis à letali ueneno lēdi, qua gratia etiam à Mithridate composita est & appellata.

*Antidotus Esdræ aut prophete Doctōr.* Cap. ci.

Amomi scrup. xii. floris iuncti odorati drachmas ix. pyretri drach. vi. croci scrupulos xxxvi. cinamomi scrupulos vi. aut casia dupli, myrrhæ troglodyticæ scrup. xii. styracis calamitæ scrup. xviii. petroselinī scrup. iiii. seminis dauid scrup. iiii. tragacanthi scrup. vi. succi hypodisthidis scrup. ix. iridis illyricæ incorrosæ scrupulos xv. seminis sceniculi scrupulos vi. bdellij scrup. ix. thuris drach. i. sulphuris uiui scrup. vi. seminis papaueris albi scrup. x vii. casia scrup. xi. seminis hyoscyami scrup. xxx. spicæ nardī scrup. xii. seminis rutæ scrup. iiii. seminis ocymi scrup. iiii. rhoris culinarij scrupulos lv. seminis anethi scrupulos vi. asari drach. i. seminis cardamomi relecta medulla scrup. v. i. opij scrupulos xxvii. euphorbij scrup. vi. piperis scrup. xxx. rosarum siccarum scrup. ix. folij scrupulos xii. opobalsami scrupulos xiiii. uentris mergi scrupulos vi. lacæ scrup. xii. lycij iuncti scrup. xii. cariophylli scrup. xii. stercoreis reperi in aluo mergi scrup. vi. rhei pontici scrup. xii. mei ahamantici scrup. vi. floris nerij scrup. iiii. & dimidium, terræ cimolizæ scrup. xii. succi artemisiæ scrup. uiginti, foliorum seridis scrup. ix. spicæ celticæ scrup. xii. rosarū rhododaphnes scrup. vi. alij etiam castoreij scrup. xii. uerum ut castorij scrup. iiii. coniuncto. costi scrup. duodecim, gentianæ scrup. xii. cōfectio nis hedychoi scrup. ix. anisi scrup. vi. sisonis scrup. x vii. ammoniac thymiamatis scrup. xii. Quodōque & foliorum citri scrup. duodecim, uini ueteris odorati quātū satis est: mellis despumati primarij li bras v. uel vi. Apparatur autem hoc modo. Arida omnia cū croco & castorio ac hedychoo tūdito & per angustissimum cībribus excutito. Opium uero, myrrham, hypodisthem, bdellium, lycium, ammoniacum in uino macerato. Tragacanthum autē per se macerato. Sequenti deinde die rosas rhododaphnes

& serin terito ac unito, & tragacantho similiter probe trita reliqua trita adijcto, & cum succo artemisise unito, mel quoq; despumatum & tepefactum saepe instillato, ne tragacanthus exarescat. Deinde & arida tusa inspergito, sufficenterq; unita probe cõregita: in sequentibus uero diebus septem aut nouem in sole terito, & uasis uitreis excipito. Neque tamen uasa expleto, sed locum respiratori reliquum facito. Vfus eius est ad uenenum iaculandum animalium plagas, datur autem fabæ magnitudine ex uini cyathis duobus mane & ante somnum eodem modo. Illiniatur & plagg, eamq; à periculo uisicidat. Eis uero qui letale uenenum hauserunt post uomitus & ante, nucis ponticæ magnitudine datur, mane & ad somnum cum uino. Præsumpta etiam ueneno utim lædendi adimit. Ad capitis porrò dolorem eam in sapa diluta fronti illinito. Dato & ad somnum phasioli magnitudine modica aqua & sapa dissoluta. Furiosos uero ante somnum datur fabæ magnitudine ex sapa diluta: dissoluitur etiam cum sapa, & toti fronti & inter supercilia illinitur, per omnem item foris nasum ante somnum, maxime enim somnum inducit. Cæterum ad oculorum inueteratas fluxiones sapa liquefacta ad frontem usque ad supercilia illinito. Ad molares dentes erosos, iteq; ad densiù dolores cum sapa liquefacta & calefacta ore detinenda prebe, & confestim quiescet dolor. Ad tulsim uero diuturnâ & spiradi difficultatē ac orthopnoeā datur nucis ponticæ magnitudine nō febricitantibus cum aqua frigida, febricitantibus cum aqua mulla. Datur autē ex ordine per dies septē ante somnū. Ad tabidos uero subruenta expuentes & eos qui abscessum internum habent, fabæ magnitudine dato cum sapa modica frigida aqua diluta. Dato autem ad plures dies mane, & ante somnum, & sanabitur affectio quantumuis sit diuturna. utere igitur neque eam cõternito. Porrò ad diuturnos stomachi dolores ex frigida obortos cum sapa cyathis tribus, magnitudinē fabæ dato ante somnum: si uero febricitent, cum aqua mulla. Ad singultum uero ob repletionem aut frigiditatē datur fabæ magnitudine ex aqua mulla ante somnum. Ad hepaticas obstruendas fabæ magnitudine cum cõdito. Ad durices uero cum aqua mulla. Ad splenicos ex aceto aut aceto mulso. Arquato infectis ex uino mulso, hydropicis ex aceto mulso aut uino mulso. Illinito etiam cum anidoto tumefactas partes, & tumorē resiccabit. è lapide laborantibus datur cum sapa: ad urinæ difficultatē cum apij decocto, aut petroselinū aut aliquo consimili. Ad profluuium uetris & coeliacis & dysentericæ maxime incipienti, nucis ponticæ magnitudine dato, mane & ad somnum ex uino, in febriculis ex posca diluta confidenter uitior. Ad podagrā fabæ magnitudine præbeto cum aqua mulla. Eliquatam etiam cum sapa affectis locis illinito. Et si quidem principij fuerit affectio, liberabitur ac euadet. Si uero diuturnū fuerit malum, magnope reiuuabitur. Ad coxendices affectos & reliquos articulos corporis fluxione infestatos, eam cum unguento aliquo, gleucino puta, aut irino, aut sicyonio eliquato, ac articulis illinito. Ad Elephantiasim in principio præsertim, imò & his qui iam malo oppressi sunt, nucis ponticæ magnitudine ex aqua mulla bis per diem dato, eliquatam etiam cum uino toto corpori per nouem ex ordine dies in sole illinito: idice

dit enim paulatim à corpore cutis & ueluti squamula decidunt, & tota concretio & corporis miscella renouatur. Ad ægre parietes mulierculas ipsam per se ad imum uentrem illinito, & facile partus prodibit. Ad ulcera postremum maligna, & diuturna in cutis superficie oborta, uetis detrita panniculo exceptam imposito.

## Antidotus pæonia.

Cap. ciii.

Antidotus Pæonia uere pæonium pharmacum multo usu iudicatum & approbatum. Amomi scrup. x viii. croci scrupulos x l. radices pæoniæ scrup. xii. seminis pæoniæ scrup. xii. piperis albi scrup. i. x. piperis cõmunis scrup. xii. phylli scrup. i. x. euphorbiæ scrup. i. x. spicæ nardi unc. i. rhei pontici scrup. xii. costi scrup. xii. petroselini scrupulos x l. opij scrup. x. v. seminis hyoscyami albi scrupu. xii. alij scrupulos x viii. habet, styracis primarij scrup. i. x. myrrhæ troglodyticæ scrup. i. x. calicæ unc. i. pyretri scrup. xii. thuris scrup. x viii. castorij scrup. vi. calamint hæ scrup. i. x. mellis despumati quod satis est, iteq; uini, Opij, myrrhæ, thus, cum uino terito: styracem uero cum modico melle liquefactum similiter probe terito, atq; eis unito: adicetisq; aridis tritis melle excipito ac uitior. Dantur ex ea siliquæ iiii. & aqua calida ieiunis, frequenter etiam ante somnū prout res urget. Facit autem ad destillationes è capite, & tussis, purisq; reiectiones, tabidos, peripneumonicos, pleuriticos, præter opinionem enim thoracem extra periculum sistit, tum quod à destillationibus, tum quod ab ulcerationibus imminet, etiam si sanguinē reiecent. Ad anginam uero uino mulso diluta utere assidue gargillando, pinnulaq; etiam cum melle illini. Ad colicos autem & ex renum lapide affectos excellenter efficac exsistit. In exacerbationibus enim colicorum febre carentium exhibita euestigio dolores sedat. Si uero febrat, remissiones febriles obseruato, atq; ita exhibito. Frangit enim calculos, & ab urinæ difficultate liberat ea præsertim quæ ex crasis humoribus & propter obturationem est oborta. Infunditur etiam & maxime in ipsis colicis uehementissimis urgētibz doloribus cum oleo rutaceo, & statim à periculo liberat. Iogās autē febres maxime quotidianā & quartanā facile soluit duabus ante accessionem horis data. Quin & ægros ad resuscitanda corpora optime apparatus fecit. Datur autē non in principio morborū, sed quum perfecta cõcoctio apparuerit in urinis. Ceterū ad pestilentes & populariter grassantes morbos ex uisitato aëre obortos in corporibus summe auxiliatur, & in principio sanè data pestilenti prohibuit sepe dispositionē. Præseruit etiam à dysentericis & torminibus intestinorū. Inducit & somnos dolori minime obnoxios, neq; soporem ac stuporem infert, ueluti reliqua ad leuandos dolores apparatus: uerū somnū tamdiu derinet, quousq; pharmacum penetrarit, & causas dolorum dissoluerit. Et sanè multum ex ægris à somno surrexerunt adeo cõcoquendi facultate præstantes, ut obiliti sint an unquam aliquid à principio doluerint. Plura autem his & ultra promissa ei considerare potes. At uero si uisceris alicuius inflammatio adsit, cauere oportet ne exhibeamus eam priusquam inflammatio laxetur. Quod si tamē periculum maximū insitet, id ipsum præstas ac præstas dato, quo successure curationi per ipsam æger adseruetur, eaq; itadē uictoriā obtineat morbi.

Anidodus

*Antidotus aromatica optima, Galli.* Cap. ciii.

Facit ad omnes, maxime tamē inueteratas circa os ueteris, atq; ipsum adeo uentrem affectiones, & ad hepaticos. Est stomacho uehementer grata & effica. Cinamomi drachmam unam, aut casie duplum, amomi dextantem, spicæ nardi trientem, folij trientem, myrrhæ troglodyticæ drachmam unam, casie beselem, croci unc. i. floris iunci odorati unc. i. costi unc. i. piperis sexuncem, mellisatici despumati quantum satis est. Ego autem inquit cinamomi modum con-duplico, meliorq; auisus redditur. Datur nucis ponticæ magnitudine cum uino, aut uino mulso, aut etiam cum aqua mulla, si adsit febris.

*Antidotus ex duobus piperis generib.* Cap. ciiii.

Antidotus ex duobus piperis generibus, quemadmodum eam describit Archigenes, leuans dolorem, finiens febrem, resiccans & concoquens. Facit ad colicos. Hanc etiam Crito apparauit hoc modo. Croci drachmas sex, casie drach. tres, cinamomi drach. duas, costi drach. iiii. styracis drach. viii. piperis longi drach. iiii. piperis albi drachmas quatuor, galbani drach. iiii. myrrhæ drach. quatuor, quidam uero decem sumunt, opij drachmas tres, castorij drachm. v. Succulenta cum uino uetere terito, reliqua uero confutito & cribrato ac tritis adpersito, & mellis despumati quantum sufficit adijcto, unitoq; ac adseruato. Datur quibuscumque magnitudine fabæ, alijs magnitudine erui. Colicis uero à cibo præbeto cum uino austero cyatho uno. In affectionibus autē circa hepatis & uellicæ ex passo dato. Tabidis & pectore suppuratis fluxu tioneq; infestatis ex aqua mulla. Vitor & ad quartanas & ad alios diuturnos & per circuitum repetentes rigores, duabus ante accessione horis.

*Antidotus Athanasia.* Cap. cv.

Athanasia ut nunc apparatur, est autē Aegyptiorum inuentum. Croci, spicæ nardi, folij malabathri, costis, sceni greci, glycyrrhizæ, radicis cupatorij, petroselinij, styracis, casie, opij, singulorum æquales partes, mellis quod satis est. Datur ad summum nucis auellaneæ magnitudine, hepaticis quidē si nō febrant cum uino mulso, febrientibus uero cum aqua mulla, datur ad dies ex ordine septem. In angina cum melle delin-gendam dato, in affectionibus pulmonis & pleuriticis cum aqua mulla. Stomachicis, & qui non cōco-quunt cibum cum posca. In fluxionibus uero stomachicis ac alui in catapota informata dato, quibus deglutitis aquam frigidam præbe bibendam. Ad ex-ulceratam uellicam & uuluum cum tepida aqua. In morbo arquato, hydrope, & rhenum morbo cum uino mulso exhibeto. Ad febres diuturnas per circuitum redeūtes summe auxiliatur ante accessione accepta, his qui diuturna oculorum fluxione laborat ad noctem dato, & frontem ex ea illinito. Hæmoptoicis & dysentericis ex posca ante somnum exhibeto.

*Orisafij theriaca qua Marcus Imperator usus est que ante et post infectionem sumitur.* Cap. cvi.

Trifolij bitumen olentis seminis, rutæ syluestris, farinæ erui rufi, aristolochiæ rotundæ, æquales omnium partes in pastillos redige, & ex eis drachmam unam cum uino & oleo præbe. Alia confectio ualde bona. Farinæ erui rufi, drachm. xlviii. anisi, seminis sceniculi, ammi, seminis apij, singulorum drachmas octo, mei drachmas quatuor, seminis trifolij, opoponacis, serpilli, cuiusq; drach. iiii. cum uino

redige in pastillos, & cum uino ter præbe bibēdos.

*Orisafij theriaca ex Bryonia.* Cap. cvii.

Theriaca ex bryonia ad uenenatos animalium morsus & ueneni haustum, ad morsos à uipera & à scorpio percussos. Radicis bryoniæ, opoponacis, iridis, rosmarini, opij, myrrhæ, singulorum drach. iiii. aristolochiæ drac. v. thuris drac. vi. seminis rutæ syluestris drachm. vi. cumini drach. xvi. alij tres tantum drach. habent, farinæ erui drach. xvi. alij iiii. habēt, cum uino pastillos informato, atque ter cum uino præbeto. Philonis antidotus ad colicos præscripta est. Itheos antidotus ad rufim relata est.

*Antidotus Hadriani.* Cap. cviii.

Piperis drachm. xx. seminis hyoscyami albi drach. xx. opij drachm. x. croci drac. v. spicæ nardi, euphorbij, amomi, pyretri, cyperi, cardamomi, folij, rutæ siccæ, casie, castorij, seminis dauci, myrrhæ, peroselinij, cuiusq; drach. i. rosarum siccarum sesquidrach. seminis apij sesquidrachmā, zingiberis drach. ii. opobalsami drach. ii. mellis quantum satis est. Datur ad summum nucis ponticæ magnitudine, minimum uero fabæ Aegyptiæ modo. Facit ad colicos ante somnum data ex aqua calida: Stomachicis & qui reuomunt cibum ex posca, in urina stillididit ex aqua calida, hæmoptoidis ex posca, dysentericis eam in catapota redigito, & ab eorum deglutitione modicā poscam absorbandam præbeto. Tabidis ad noctem cum hydromelite dato, aride uero tussientibus cum melle delingenda exhibeto. Morbis à phalagis & uiperis cum uino mulso. Educit & menses cum uino mulso accepta, in quo pulegijs, aut calamintæ, aut ruta sint incocta. Colicis cum aqua mulla datur.

*Antidotus Acharisios, cui digna gratia referri nō potest.* Cap. cix.

Casie, myrrhæ, piperis albi, piperis nigri, castorij, galbani, styracis, croci, costi, opij, spicæ nardi, singulorum par pondus. Mellis quantum satis est. Datur magnitudine fabæ. facit ad omnia diuturni temporis purulenta in thorace, & ad hepaticos cum aqua mulla, & ad colicos eodem modo, ad splenicis cum acetos mulso. Reperias autem ipsam & ad alias plurimas affectiones approbatam.

*Philagrij Antidotus ex sulphure uiuo.* Cap. cx.

Febrem finit, hac, inquit Philagrius, omnino uitor ad diuturnos per circuitum repetentes rigores. Sulphuris uiui, seminis hyoscyami albi, seminis cardamomi citra medullam, styracis, opij, myrrhæ, cuiusq; drach. viii. costi drac. x. rutæ drac. x. croci drac. iiii. casie drac. x. piperis drach. xii. excipe melle attico despumato. Dato hora una ante impetum exacerbationis ex posca diluore calida, & post modicum interitum dormire iubeto. Somnum enim inducit, atq; omnes diuturnos febrium insultus soluit. Verum nō conuenit eā prius exhibere quam bona cōcoctio manifestissime ex urinis depræhēdatur. Bene prospicere etiā oportet, quo is qui accepturus est, redūdantibus excrementis nō sit onustus, & maxime si febres quotidianæ existat. Datur ad summum, quum adhuc in uigore est pharmacum, nucis ponticæ magnitudine.

*Theriaca Democratis.* Cap. cxii.

Medeatur hæc morosis animalantibus uirus faculantium, uiperarum, cerastæ, aspidum, narium terrestrium plagis, & paruarum bestiarum puncturis, itemq; uelparum. Et marinæ uerturis siue pastinacæ ac dracæ

conis iſtibus, phalangiorū item & ſcorpionum. Ap-  
paratur hoc modo. Iridis illyricæ, zingiberis, opo-  
panacis, opij, herbæ roſmarini, myrrhæ troglody-  
ticæ, ſeminis triſolij bitumē olentis, cuiuſq; drachm.  
viii. ariſtoloſchiæ drach. xi. ſeminis rutæ ſylueſtris  
drac. xii. radicis bryoniae aride albiſſimæ dra. xvi.  
ſerpilli, caſtorij, radicis eryngij, ſeminis apij, cumini,  
æthiopici reſcit, cuiuſq; drac. v. aliij dra. xii. habet,  
ſarinæ erui ruſſi, drac. x. xii. Omnia hæc contundi-  
to & cribrato, oppopanaca uero cū uino diſſoluito,  
etiā arida inſpergito & in paſtilloſ reducto, & ex  
eis drac. i. cū uino ueteri macillo bibēdam præbeto.  
Statim enim ut potatur cōmoditatem ſuā offendit,  
facit ad coli aut uentris inflationes ex aqua ter pota-  
tum, facit & ad eos qui intrinſecus aliqua parte do-  
lent, citra manifeſtam cauſam.

Antidotus Theodoretus ex anacardijs. Cap. cxii.  
Antidotus theodoretos, hoc eſt, diuinū munus, ad to-  
tum hominē utilis eſt, facit ad uertiginē & omnes ca-  
pitis affectiones, omniaq; pectoris uitia emēdat, ma-  
xime uero ſuſpirioſis, orthopnoicis, tabidis, pleuri-  
ticis, hepaticis, ſplenicis, & quibus exacerſit in uētre  
cibus, & omnibus diuturnis circa ſtomachū & uen-  
trem affectionibus prodeſt. Hiſ item qui ex longis  
morbis ſe ægre reficere poſſunt, & qui decolores  
ſunt, & quibus corpus in arquaſi colorē mutatur,  
& quibus aqua ſubter cutem effundi incipit, renum  
etiā affectionibus, & eis qui aſſiduo coli dolore af-  
ſiguntur, auxiliatur: omnemq; habitū corporis cor-  
roborat. Quin & febribus inordinate ueteracenti-  
bus, atq; etiā per certum circuliſ reuētib; ante ac-  
ceſſionē data prodeſt. Mirabiliter utilis eſt mulier-  
culis, quæ purgationis mēſtruae ſtilliditio ac ſcragū  
laru uexatur, & quæ ab uetro ſuffocatur. Soluit etiā  
uentrem circa moleſtiā. Educit enim ea quæ iam lon-  
go tempore inteſtiniſ inhæſerūt, & ut ſemel dicā, eſt  
diuinū donum. Huius enim uſu in omnib; ſenties  
ſucceſſum. Quod ſi quis uere & autūno præſertim,  
ſemel aut bis ea utatur, neq; circa diēſ magnopere  
delinquat, nullis morbis obnoxioſ fiet. non ſolum  
enim præſentes affectiones ſedat, ſed quas etiā futu-  
ras timemus impedit. Habet autē hoc modo, Croci,  
caſiæ, phylli, ſpicæ nardi, mei, agarici, rhei pōtici, ſlo-  
ris iunci odorati, acori, epithymi, piperis, ſarxipha-  
gi, iridis illyricæ, cariophylli, carpopalaſami, myro-  
balani intermi, cuiuſq; ſcrupulos ix. anacardiorum  
ſcrupulos x. aloëſ ſcrupulos x xvi. mellis deſpu-  
mati lib. iiii. Datur ad ſummū drachmarū iiii. pōde-  
re ex aqua muſſa, aut uino, aut uino muſſo, ſecundū  
quod cuiq; affectioni cōmodum fore putas. Cæterū  
ſi ſcammonij ſcrupulos ix. adſumpſerit, præter opi-  
onem ſtūā bilem purgat. Si uero epithymi ſcri-  
pulos ix. acceperit & ſcammonij ſcrupulum ſimi-  
dium, atram bilem expurgat. Id quod multo adhuc  
efficacius præſtat, ſi pro epithymo uerari nigri  
tictis drachmam unam aſſumat. In pituitioſis porro  
uiliſter ad eius exhibitionē colocynthidis medulla  
ruſa & tenuiſſime cribrata ammiſcetur.

Theodoretos aliter apparat.

Cap. cxiii.  
Aloëſ drachmas lx. & ſiliquas lx. agarici drachmas  
xxiii. croci drachmas vi. rhei pōtici drachmas vi.  
aſari drachmas iiii. coſti drachmas vii. acori dra-  
chmas ſex, cinamomi drachmas vi. xylobalſami  
drachmas quatuor, ſpicæ nardi drachmas iiii. caſiæ

drachmas vi. mei drachm ii. chamædryos drachm.  
iiii. maſtiche drachmas vi. piperis lib. albi drachmas  
iiii. mellis deſpumati quantum ſufficit. Dantur ex  
ea ad ſummum drach. iiii. ad emolliendū uentrem.  
Quod ſi quotidie ea utantidoto uti uelis, in aliqua  
ex prædictis affectionibus, nuds ponticæ aut am-  
pliori magnitudine præbebis. Quidam uero & pi-  
peris nigri, & albi, & longi, ſingulorum drachmas  
ii. addunt, item amomi, ſloris iunci odorati, zingia-  
beris, cuiuſq; drachmas duas, gentianæ inſuper  
drachmas duas, aliqui adiungunt.

Theodoretus per acetum muſſum apparat.

Cap. cxiiii.

Facit hæc magis ad omnes capitū affectiones, & deli-  
ria ex arabiſle oborta, itēq; inſaniā, facit ſtomachicis  
& colicis, hepaticis, atq; amplius adhuc ſplenicis &  
hydropicis. Habet cōpoſitio hoc modo: Spicæ nar-  
di, ſolij, croci, mei, caſiæ, epithymi, ſloris iſuci odora-  
ti, rhei pōtici, myrobalani, cariophylli, cuiuſq; drac.  
iiii. aloëſ ſextatē, carpopalaſami ſcrupulos xvi. zina-  
giberis ſcrupulos xvi. maſtiche ſcrupulos iiii. iri-  
dis trientē, anacardiorū ſcrupulos iiii. agarici ſcu-  
pulos vii. cordicis radicis ſcœniculi lib. i. aceti aceri-  
rimi ſeſquialtarium, mellis ſeſquialtarium. Cora-  
ticem prælorū in aceto per triduū macerato, deinde  
ut dimidium relinquantur coquito, percolato, & ad  
acetum mel adijcto, ruſuſq; ad mellis ſpiſſitudi-  
nem coquito, atque ubi tepuerit ad arida tenuiſſi-  
me trita in mortarium addito, & diligenter unito,  
reponito ac utitor uelut in prioribus dictum eſt.

Picra ſiue amara per acetum muſſum apparat.

Oribaji.

Cap. cxv.

Facit ad ſtomachicos, colicos, uulūæ ſtrangulatus, hy-  
dropicos. Corticis radicis ſcœniculi lib. iiii. aceti aceri-  
rimi lib. vi. Radices in aceto ad tertias coquito, &  
percolato aceto mellis libras iiii. adijcto, & ad mel-  
liſ ſpiſſitudinem coquendo redigito, refrigerato, &  
paulatim ad ſubſcripta tenuiſſime trita in mortariū  
addito. Sunt autem hæc. Aloëſ beſſem, iridis ſextan-  
tem, maſtiche unc. i. zingiberis, caſiæ, nardi celticæ,  
helenij, ſingulorū unc. i. piperis drach. iiii. mei unc.  
i. aut ſi nō adſit, nihil impedit. Datur cochlearij men-  
ſura cum aqua muſſæ cyamidis iiii. (Eſt id poculi ge-  
nus & Aegyptio uocabulo ciboriū appellatur) Ab  
acceptione etiā aquæ calidæ cyamos ii. abſorbeant,

Cyphi ex rebus xxxvi.

Cap. cxvi.

Thuris ſexuncē, ſtyracis pinguiſ lib. i. myrrhē trientē,  
ſolij quadrantē, coſti trientē, amomi quadratē, ſpicæ  
nardi quadratē, caſiæ quadratē, ſabini, cardamomi,  
ammoniaci thymiamatis, iridis, carpopalaſami, ſin-  
gulorū ſextatē, nardi celticæ, helenij, hypni, ſloris  
iunci odorati, alpalathi, cuiuſq; uncia unam, maſti-  
ches quadrantē, ladanij quadrantē, baccarū iuniperi  
magnarum & paruā, bdellij, ſingulorū ſextatē,  
ſeſeliſ unc. i. cyperi unc. i. croci trientē, ſeminis cu-  
preſi unc. i. aliij drac. i. habēt, calami aromatici dra-  
iiii. roſas uirides numero quingentas, terebinthinæ  
depuratæ ſequunciam, caricarum pinguiſ ſexun-  
cem, palmarum pinguiſ quadrantē, carunculæ  
uuarum paſſarum quadrantē, nucum pinearum  
quadrantē, ſucci haſtulæ regiæ uncia unam, mel-  
liſ ſeſquilibrā, uſci odorati quantum ſatis eſt. Arida  
contuſa & cribrata cū liquidis excipito, palmis, cari-  
cis, uuiſ palſis prius in mortario ruſis, deinde maſti-  
chen

chen tritam eis addito, & bdelliū ac pineas nuces ro-  
 fasy & thus unūquodq; per se tritū. poſtea etiā ſi-  
 racē adijctū, & ladanū per ſe mortario contuſa, de-  
 inde terebinthinā & mel adfundit, & arida infardit-  
 o. Ego uero thus, bdellium, myrrhā, & ladanum cū  
 uino tero, atq; ita ad ruſa in mortarium conſicco, &  
 paſtillis inde formatis uitor. Facit ad capitis dolorē  
 fronti illitum cū aceto, ſimiliter & ad oculorum lip-  
 pitudinem cum uino. Ad hepatis & rheuī exulcera-  
 tiones cū paſſo, ad obturationes eorundē cum uino  
 muſſo. Tuſiētibz, tabidit, orthopnoicis cum aqua  
 muſſa, ſtomachicis, ſplenicis, iſchiadicis cū aceto mul-  
 ſo. Ad tormina, lunaticos & morbum comitialē  
 cum aqua calida. Datur drachmæ pondere.

*Cypri ex rebus* xxviii.

*Cap. cxxviii.*

Aſpalathi, bdelliū, heleniū, ladanū, ſtyracis, myrrhæ, cu-  
 ſuſque drach. vii. baccarum iuniſperi magnarum l.  
 paruarum itidē l. ſucci haſtulæ regiæ trientem. Sa-  
 binæ trientem, croci ſextantem, coſti ſextantem, car-  
 damomi quincuncem, cyperorum quincuncem, ſe-  
 mintis cupreſi quadrantē, nardi celici dextantem.  
 Alij etiam caſiæ habent ſextantem, ſphagni ſiue hy-  
 pni quincuncem, amomi ſextantē, ſpice nardi ſextan-  
 tem, roſarum ſicarum quadrantē, floris iunci odo-  
 rati, ſextantem, nucum pinearum quadrantem, ſo-  
 liorum malabathri quadrantem, caricarum lib. ii.  
 uuarum paſſarum pinguum ſextantem, terebinthi-  
 næ chīæ lib. i. palmularum pinguum carūculæ lib.  
 i. mellis lib. v. uini ſextarios ii. Apparato & uitor  
 ut dictum eſt. Etenim quæ ex huiusmodi rebus ad-  
 parantur, ad prædicta optime faciunt.

*Mafuaphij conſectio.*

*Cap. cxxviii.*

Croci quadratē, ſtyracis unc. xxx. ladanū unc. xiiii.  
 galbani quadrantem, cariophylli ſexuncē, roſarum  
 ſicarum unc. xii. ſerulæ campanæ unc. xviii. hy-  
 pni (canalicula id parua eſt ex arbore quæ Damasce-  
 na dicitur, itemq; ea quæ Rhodacinea appellatur  
 exorta) beſſem, malabathri ſexuncem, arnabo unc.  
 xii. coſti, unguisum aromaticorum, caſiæ, zacathiū,  
 ſingulorum ſexuncem, aſari quadrantem carpopal-  
 ſami unc. xiiii. piſularum cupreſi quadrantem,  
 foliorum lauri quadrantē, chachula quod cāchryon  
 eſt, unc. i. amomi unc. xii. ſpice nardi, gummi, cu-  
 ſuſque ſexuncem. Vini lib. vi. cōtere & ad formam  
 quancunque uelis redige.

*Thymiana ſiue ſuſſumētum Berenices.* *Cap. cxix.*

Semina uiticis, melanthij, cornu cerui, ſamſuci, baccarum  
 lauri, abſinthij, ſulphuris uiui, bituminis Iudai-  
 ci, ſaluie, radicis cyclamini, aremiſiæ, origani, rutę  
 ſylueſtris, cumini, caſtorij, lapidis gagatæ, aniſi, co-  
 nyzæ, roſmarini, buccinorum uſtorum, reſinæ, ſin-  
 gulorum uncā unam, cedriæ ſextantem, picis zacyn-  
 thæ pinguiſ lib. i. Quidam etiam radicis pæoniæ  
 unc. i. ſed nos eam nō admittimus. Omnia cōtuſa &  
 cribrata, cedriæ, reſinæ, ac pice excipito, in paſtilloſq;  
 redigito ac uitor. Facit ad anginam potarum & ſuſ-  
 ſum, ita ut hiantē ore æger uaporem hauriat. Ad  
 omnem uero uſgillarū ſpectem uino liquefactū frō-  
 ti illinito, atq; ipli ſorinſecus naſo: quin & intrinſe-  
 cus nares ſublinito, & ſuper prunas proiecctū ſuſſito,  
 & ſomnū ægro cōſiliabit. Facit & ad ozænas ſordi-  
 dū & foetidū nariū ulcus, ipliſ nariſbus ex eo illitis  
 cū aceto. Fugat animalia uenenata, muſcasq; & culi-  
 ces ſuſſito. Et ut quidā tradunt, etiam immūdis ſpi-

ritus arceat. Porro de pharmaciſ doloreſ ſeuantibus  
 ſcriptum eſt in precedentibus quaternionibus, Ser-  
 monis noni Cap. xxxii. & octauī Cap. lv.

De Elephantiaſi. Ex libris Archigeniſ. Cap. cxx.  
 Elephantiaſis à quibuſdam leōtiaſis, ab alijs ſaryriaſis  
 appellatur. Elephantiaſis quidē à magnitudine & diu-  
 rurnitate affectionis nomen accepit, imō & propter  
 cutis aſperitatem, quæ in quibuſdam ſuccedere con-  
 ſueuit. Leōtiaſis autē appellatur, quum frons ægro-  
 rum cum quodā tumore laxior redditur, ad ſimili-  
 tudinem pellis flexilis ſuperciliorū leonis. Saryriaſis  
 uero dicitur propterea quod malæ faciei iſdem  
 cum rubore attollūtur, & muſculis maxillaribus ue-  
 luti conuulſionē patientibus, mentum ipſum dilata-  
 tur, quæadmodum etiam ridentibus euenire ſolet, ſi  
 militudine quadā ad picturas ſaryrorū: quin & ala-  
 critas uehemens ad cōitum iſpis adeſt, quæadmodū  
 & de ſaryris fertur. Eſt autē grauis morbus & pro-  
 pter ex eorū numero qui incurabiles exiſtunt, & gra-  
 uis quidem eſt iſpi ægro, intolerabilis autē conſpi-  
 cientibus, utpote qui ipſum omnino auerſantur, ad-  
 eo ut & plerique ex neceſſarijs & domeſticis ægri  
 ipſius cōuerſationem deuitent. Etenim ſuſpitionem  
 de ſe præbet malum tanquam ſit contagioſum. Atq;  
 ego ſanē malum eſſe affirmo cum iſpis cōuerſari  
 inquinatur enim aër quē inſpirando adtrahimus ex  
 ulcerum ſectore, & ex uitiaſa ſpiritus exhalatione.  
 Cæterum affectio iſpa non ſolum ob id grauis eſt,  
 quod indiſſolubile ſerē habeat ſtructuram & ap-  
 paratum, ſed quod principia generationis eiſ ſer-  
 mē ſint ignota, quū enim circa ſuperficiem iam ue-  
 ſtigia eiſ apparent, tunc nō gignitur, ſed perſcitur,  
 inuſ à uiceribus initio factis, & progreſſu uſque ad  
 cutem dilatato: quare non abſimile eſt, rumentes ani-  
 mentia etiam in internis oboriri. Appræhenduntur  
 autem hac affectione uiri magis quàm ſcæminæ, atq;  
 inter illos magis qui craſſum & uiſcoſum ac atra bi-  
 le redundant ſanguinem habent, & qui pituitā mul-  
 tam ſaliſam aut acidam gignunt. Amplius uero &  
 qui uictu craſſo & ægre cōcoctili uiuunt, & qui in  
 orio degunt. Non minus uero hiſ & qui multis ex-  
 erctijs inordinate uiuunt, & per hoc ſanguinē in-  
 ſpiſſant. Itēq; hi qui cibos aſidue in uentre corrumpunt:  
 quod uero ad ætatem attinet, pueri & iuuenes,  
 maxime quo tempore pubereſcere incipiunt. Regio  
 uero huius mali induit ærit, tum quæ ualde calida  
 eſt, tum quæ uehemētē frigida eſt. Et altera quidem  
 ob id quod ſanguinem adaleſcit: altera quod frigore  
 ſuo eundem congelet, & perſpirationes prohibeat,  
 ac inſum caloreſ ſuſſocet. Conſequitur eos qui  
 obnoxij ſunt ſunt malo, ſegnitiſ, ſpiratio tarda,  
 ſpirandi difficultaſ, morus difficiſ, aſidua cōſtri-  
 ctio alui, urinarū, ueluti ſunt tumentorū ſoria, excre-  
 tio, reſpiratio grauiſ & ſœtida, ruſtus continui, qui  
 etiā iſpiſ ægris aliquid moleſtiæ addunt, appetitus  
 non obtuſi quidē neq; inſlamād, impetus in uenerē  
 inſenſus. Iam uero ubi ad cutem progreſſum fuerit  
 malum; malæ primum craſtiores ſūt & menſū, de-  
 ſinde rubefcūt, non florido, ſed liuido rubore. Et ſub  
 lingua uenulę uariocole ſunt ac nigreſcunt: quod ſi-  
 gnum eſt etiam uiſcera iſpa in ſimili cōſtitutione eſ-  
 ſe, eiſmodi plane qualiſ in porcis quibuſdam circa  
 interna uidetur, quæ Grandinis nomine inſignitur.  
 Quandoq; uero & per omne corpus eminentiæ ap-  
 parent,



parent, & præsertim iuxta summā frontem ac men-  
tum. Corpus præterea ipsorum magnū esse uidetur,  
& cuiusdam intolerabilis grauitatis sensus eis ade-  
st, unde nec potu nec cibo admodum suauiter de-  
stantur. Pusillanimes sunt ad omnia, neq; præ uitæ  
amore uitam relinquere & cōtemnere possunt, neq;  
affectionem ipsam generoso animo perferre. Verū  
ueluti seipsos cōdemnantes se occulant, & notos ho-  
mines uitant. Quidam porro ex eis, ad modum eo-  
rum qui suffocantur aut strangulantur, maxime cir-  
ca somnos afficiuntur. Quædam modum igitur perfe-  
ctæ a malo eiusq; diuturnitate uictis frustra manum  
ad mouemus, ita & abstinere ab his qui iā affectione  
corripi & tentari uidentur, planè deperandum ho-  
minum & malignorum. Humanum enim & ple-  
num beneuolentiæ signum est, in extremis etiam ma-  
lis usque ad experimentum, procedere ad difficulta-  
tem affectionis compeſcendam.

*Cura elephantiasis affectorum.*

Cap. cxxi.

Quum igitur quædam ex prædictis signa affectio-  
nis apparuerint, circa dilationem sanguis auferatur  
particularim ex utroq; cubito. Reuoluit enim inde  
aliquo modo insitū calor, ut sensibilibiter corpus i-  
psūm alleuetur. Habendus tamen est modus in eua-  
cuādo. In multo enim inutili & uitioso sanguine pa-  
rum quiddā genuini sanguinis inest. Post sanguinis  
autem detractionē paucis diebus interpositis alius  
inferne subducatur, & primū quidem colocynthidis  
pulte utendum est, ex qua catapotia xviij. nucū pon-  
ticarum magnitudine exhibeantur. Eius autem apa-  
ratus prædictus est in coxendicum morbi tracta-  
tu. Sequenti deinde die xxi. catapotia præbeantur.  
Si uero ea accipere recusarit, per hierā nostram pur-  
gato. Mirabiliter autem eis cōducit per inensem se-  
mel data. Post dies autem aliquot sero lactis scissi  
utendum, ex eoq; nō minus tribus heminis, neq; ul-  
tra quinq; accipiendū. Sit autem lac asininum, si ha-  
beri potest, ex quo serū ipsum sumitur. Ammiscen-  
dum est etiā ipsi ueratrum nigri tritum obolorum  
pondere, & scamonis scrupulus i. ita ut hæc ipsa cū  
modico sero ieiunis præbeamus, atq; deinde ipsum  
serum paulatim per se exhibeamus. Hac enim pur-  
gatione frequenter utendū esse censeo. Omnino nāq;  
conandū est, ut omnē corporis miscellā ab affectio-  
ne occupatā liquefaciamus, aliāq; quædam ueluti ex  
intero regeneremus. Id ipsum uero fieri, si per inter-  
ualla oportune purgationes adhibeatur, & cibi ap-  
ponantur qui facile concoqui, & per corpus distri-  
bui possint. Post quorum acceptionē uomitus ad cie-  
bo fiat, deinde etiā à raphanis à ieiuniis, postea ad ue-  
ratrum perueniendū: ac primū quidem decoctum  
ueratri exhibendum est, deinde & bulbos ipsius con-  
tusos, & ad finē uirgas optimas ex eo præbebimus.  
Id uero quomodo fieri debeat, iam antea diligētissi-  
sime traditū est in tertio huius tractationis Sermo-  
ne. Post hæc autem uisum refocillariæ diæta uten-  
dum est. Ad os uentris & utrinq; ad uiscera cura-  
bisa inanis assignatur. E primo quidē circūit auxi-  
liorū hoc modo perfectū, rursus ad principii reser-  
uandum est. Et uenæ quidē sectio uitetur: ab hiera  
uero principium purgati sumatur, & reliqua conse-  
quenter faciendā, uelut prædictū est, ter & quater in  
anno eodem ductu repetito. Maligna enim & diffi-  
ciler cedens affectio est, quapropter plurima cura

opus est, ne in peius euadat.

*De his qui castrantur.*

Cap. cxxii.

Nouimus quosdam audaciores qui sibi ipsos testes se-  
ro resecarunt: castratis enim non in peius malum  
ipsum procedit. Neq; enim temere reperias, inquit  
Archigenes, ullum aliquem castratū elephantiasi la-  
borantem, neq; item facile mulierem: Quare etiam  
quidam ex confidentioribus Medicis manum ad-  
mouerunt, & quorū sanè ex eis ex sectiōne peri-  
culum euaserunt, per consequens curationis usum  
perfecte ab hac maligna affectione liberati sunt. No-  
ui etiam quendam qui ualde correptus esse existi-  
mabatur, à tali quopiam pharmaco curatum. Aceti  
optimi & cedriæ, singulorū cyamum i. succi brasie  
cæ cyamum i. cōmiscero & ieiunis mane præbeto,  
deinde ad uesperam ordeacē panem modicum ex-  
hibero cum quopiam uolucris leuissimum, & per so-  
lum hoc maximum curationis sperato succellum.  
Vtere autem ipso per annum, semel in hebdomade  
ex eo præbens, quandoq; tamen bis, quanquā ad u-  
sum eius aduſfactis etiam rigidus procedendum sit,  
nimirum ad duplam pharmaci mensurā. Quum ue-  
ro & ad cōsummalem morbum prædare faciat, eo sa-  
nè & ad ipsum utor, & præ omnibus alijs eius pro-  
fectum laudo. Facit & brasicæ decoctum quoidē  
potatum, quū ex cedria pharmacum nō datur. Mul-  
ti etiam sideriū herbam laudant: datur autem fo-  
lorum eius aridorū drach. i. ex uino austero. Noui  
& trifolium herbā bitumen olentem probe huc fa-  
cientem. Datur autē & ipsa drachmæ pondere trita  
ex uini cyathō uno, aceti uno, mellis una. Eboris  
etiā & cornu ceruini ramēta cochlearij mensura sæ-  
pe ad prædictā mensuram ammiscuntur. nam & per  
se ipsum unumquodq; eorū potatum utilissimū ex-  
istit. In regione Indorū elephantiasi affectō assidue  
per sedē eluere per urinæ asininæ infusionē hemina  
mensura calefacta consueuerunt. Crocodilum item  
terrestrem accipiunt, eiusq; extremas partes ampu-  
tant, ac interiora proieciunt, deinde fermento obuo-  
lutū assant, deinde ablato fermento, & scabricæ eius  
deras, carnis ipsius drac. i. quotidie bibendum præ-  
bent, & magnum sanè testimoniū de hoc remedio  
præbent. Præclare autē succus cyrenæicus facit, cui  
magnitudine deuoratū simul enim ut acceptus est,  
per omne corpus diffusus uehitur, Afelli item sub  
aquario uasē stibulantes, qui & millepedæ appella-  
tur, quinq; aut sex numero cum hydromelitis cya-  
mis iiii. triti potati præter opinionem tum his, tum  
suspensiois, & omnibus suffocatione apprehensis au-  
xiliantur. Multæ commoditates est & scillæ semen-  
trium obolorum pōdere in cyathō mellis semicocti  
delinctum. Asperam enim arteriam à pituita repur-  
gat, & coarctationem uiarum uocis probe dilatat.  
Similiter autem & passillorum scillitorum, qui in  
theriacis confectiōnem coniunguntur drachma una,  
exhibetur cum uino austero meraco trita. Ex calida  
autem datur. Theriaca porro ex uiperis Androma-  
chi compendium totius medicationis existit, si post  
purgationes per modica intervalia præbeatur.

*De uiperarum esu, & de pyuritibus, Archigenis.*

Cap. cxxiii.

Mirabile elephantiasis remedium uiperarum esus ex-  
istit, eas uero hoc modo apparatus edere oportet:  
primum quidem amputato capite & cauda, & de-  
trac-  
tracia

tracta pelle, exemptisq; interioribus uisceribus omnibus caro aqua pura bis ac ter lota, in olla instar anguillarum coquitur, aqua quidem sufficere affusa, & oleo modico cū anetho & porro, post sufficere deinde cocturā, iusculum moderato sale conditur, atq; ita ægro in sole desident exhibetur, capite tamen probe uelato. Neq; uero semel tantum aut bis uiseras edere satis est, sed sæpe id fiat, quum extra periculum sit, & insuper commoditatem afferat. Sint autem uisera recens capta, & ex humidioribus locis accipiantur. Nam quæ iuxta mare degunt, uehementer stipulosæ existunt. Videtur & ad ipsos salibus theriacis eos quotidie pro liquamentis ad intus exhibentes unā cum obsonijs. Suntq; tum saporem, tum odore grauisimi. Quin & ex betonica antidotus ad podagricos præscripta uiliter purgās, etiā his cōmodo exhibetur. Erut in uisuerum dicā, præter incidentes ipsis suffocationes, etiā quæ orthopnoicis præbentur, his uilia sunt, utpote quæ crassos humores nō modo in thorace, sed & in toto corpore contentos secant & diducunt. At uero ob id quod serinus est humor, ea quæ lumbricos enecant, & expellunt, etiā his danda sunt. Forinsecus porro cuti pilosorum assidue per modica interualla in balneo adhibendū est, oculis probe cōmunis, ne quid ex pilothro in ipsos dilapsum eos lædat. Commode item facies ipsa ex eo illinitur, utpote quæ maxime ab affectione sit correpta; multo etiā tempore in eius usu perseverādum est, donec cutis ipsa rubefiat, non tamen exulceretur. Quapropter ex pisanæ succo pilothrū appareat. Vrsinus autem maxime aut uulpius adeps, uel si hi haberi nō possint, taurinus cum sarmenditio cinere emollitus, & cum lixiuo coctus probe attenuat emittentes tumores, hoc enim modo etiā sapo præparatur, quem in usum conueneret oportet, si uirsinus aut uulpius adeps nō addit. Bona est & portulaca cū aceto trita, & semperuiū minus, quod Romani illecebram uocant, & Mercurialis decoctū tum per se, tum cū aridis quibusdam mixtum, & sic syluestris folia arida contusa & cribrata cum aceto illita, & in balneo affricata. Optime facit & decoctum ipsorum, & betæ & ocymo cum aceto tritis aut coctis dignam laudem tribues, si per eorum attritum fueris deterfus. Myrobalanus item cum aceto præstat: probe auxiliatur & alumen cum sale, & sandaracha æquis partibus in uino & oleo maxime lentiscino, aut si non addit, rosaceo tritis. Aridum quoque inspergimen ad albos siue uittigines nō nobis compositum liberaliter extergit & re-purgat. Est autem hoc: Alcyonium, nitrum, sulphur uiuum, myrti solia, & sicci agrestis solia siccā, singula pari mētura contundito & cribrato, deinde cum aceto trita oblinito, & in balneo affricato. Cōuenit & alcyonium allatū cum aceto tritum & affricatum: testæ item ostræorum omnīū usq; & cum pari melle ac modico aceto tritæ. Et acetī sece arida usita, cum sulphure trita in exudatorio loco commode ueris. Amygdalino autē oleo inungito, atque hoc modo corpus forinsecus illinito. Orisibij smegma ad elephantiasin. Pumicis, testæ sepiæ, nitri allatī, gallæ, cimoliz. cuiusq; sextantem, gummi uncia unam, arida affrica. Aliud opimum smegma. Nitri allatī, pumicis usitæ, testæ sepiæ usq; gallæ, cimoliz, cuiusq; sextantem, gummi unciam unam, arido

utere in balneo aut lauacro & aqua marina ablue.

Aliud efficax. Spumæ nitri albæ drachm. x. x. cimoliz drachmas xii. melanthij drach. ii. radicis bryoniae drachmas ii. alcyonij drachmas vi. sulphuris uiui drachmas iiii. radicis chamæleonis albi siccæ drachmas ii. trita in balneo inspergito, & affricato. Aliud smegma. Ad omnem corporis prurium & humoris atræ bilis fluxionem celebre. Verrari albi unc. i. verrari nigri unciam unam, baccharum lauri sextantem, cerusæ, pumicis usitæ, testarum sepiæ usitarum, pompholygis, rutæ uiridis, singulorum trientē, sulphuris uiui bessem, spumæ nitri albæ bessem, mellis bessem, aloës quæ in uetris oculis affertur soler, bessem, acetī quantū satis est. Vtere in balneo. Remedium ad psoras, Archigenis. Magni nominis est & ad elephantiasin laborātes, id quod ad psoram feram & nobis priuatim est apparatum. Id ipsum hoc modo habet: Rumicis satui, & rumicum acutum radicum, fasciculos manipulares duos in aceto coquito, deinde in mortario tuis, ac postea etiam in pila tritis, acetū paulatim infillato id ipsum in quo decoctæ sunt radices aut etiam aliud, atq; deinde hæc ipsis infarcito. Nitri drachmas xlviii. sulphuris uiui drachmas xxv. thuris drachmas xv. Omnia ad strigimentū crassitiem reducta unito, ac æstate quidē ad solem sæpe illinito, hyeme uero in balneo donec exudarint. Apparatū autem & nobis pharmacū ad elephantiasin summe cōgruum, huiusmodi. Rumicis satui & rumicis acuti radicum fasciculos manipulares duos in aceto coquito, & tundito, ac terito, ut prædictum est. Deinde hæc quā tenuissime trita eis infarcito. Alcyonij lib. i. sulphuris uiui lib. i. spumæ nitri bessem, testarum cochlearum usitarum trientem, radicis chamæleonis nigri sextantem. Omnia simul cōteruntur, donec ad strigimentū ipsius tudinē redigantur: & illinuntur æstate quidē ad solem sæpe, hyeme uero in balneo, donec exudent.

Illitiones ad tumentes corporis eminentias.

Cap. cxxxiij.

Illinantur autem tumores in cute efferati & inflammati ex glauci succo, aut polij, aut lycij, aut hypodisthidis, aut aloës, & similibus succis. Aut halicæ uel erui farina cum plantaginis, aut poplygoni, aut perdicij, aut portulacæ, aut brasiicæ succo diluta. Quod si caplastmaticis opus habeant loci inflammati, cum halica cruda poligoni, aut plantaginis, aut marrubij succo ammixto, contegantur. Postquam uero inflammationes mitigatæ, & laxatæ remiserint, herbæ sera piadis tritæficularis uiridis folia tenera aut semina probe terito, & ægrū ad solem calidum locatum ad horas ii. defricato, atq; ubi prodierit sudor, uinum meracum uetus odoratum bibendum præbeto, rursumq; herbam ipsam affricato. Deinde ipsum in aqua marina abluito, & hoc quotidie per dies aliquot facito, & reperies ad sanitatē consequendā successum. Optima est & hæc illitio Critionis. Ad tumētes emittēdas, & ad faciei pruritum, ac principium elephantiasis. Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulphuris uiui, singulorum par pondus in aceto dissoluito, & ex probe penitus cōritis pastillos formato, eosq; in umbra resiccat. Vtus uero tēpore postulante aceto dilucone illinito. Vbi autem exaruerint, subcripta cōfectione defricato. Est autem hæc. Saponis libram unam, ammoniac thymiamatis libram unā, thuris, quadran

quadrantem, spumæ niri albæ quadrantem, masti-  
cines quadrantem. Ammoniacū cum aqua prius tri-  
tum, & sapone ei adiecto, in singulo uale coquito,  
duobus sex tarijs aquæ affusus, atque ubi dissolutus  
fuerit, thus, mastichen, spumam niri, unumquodq;  
per se tenuissime tritū & unum adiecto. Deinde in  
mortarium translata & diligenter tusa in uitrum  
uas reponito ac uitro. Opime faciunt & hæc ad tu-  
mores nō inflāmatos illia. Ammoniacum thymia-  
ma ex aceto, aut marrubij succus & thus eodē mo-  
do, & uerbenaca recta, & fel capræ aut hirci, & flos  
æris cum melle, & caninum stercus cū aqua, & aloē  
cū thure ex aceto mulso potata & illita. Vtiliter il-  
liniunt & dictāni succus melle cocto & cedria per-  
mixtus, & sulphur uiuum cum liquida pice, aut fe-  
samum, aut amygdalæ amaræ, aut chamæleonis ni-  
gri radix similiter cum liquida pice, & alcyonium  
cum cedria. Efficacissima uero est cedria cum phocæ  
adipe aut edam ursino illita, ita ut simul eliquatis  
sulphur uiuum infarciatur. Valde efficac & hoc est.  
Si alumen liquidum lincolo ligatur, & usum,  
deinde cum aceto acerrimo & brasicæ, aut ocy-  
mi succo tritum, illiniri præceperis. Aliud. Thuris,  
aluminis scisci, cuiusq; sextantem, sulphuris uiui, ra-  
mentorum plumbi, cuiusq; quātum satis est, unio  
& leuiter illinito, eminen- tjs ex pumice præficatis.

Aliud. Ammoniacum thymia-  
ma, & sulphur uiuum, & columbæ stercus, & uirum tenuissime tri-  
tum, in aqua, aut uino, aut aceto terito, & prout cō-  
modum æstima-ueris illinito. Aliud ualde efficac.  
Cedriæ sesquilibram, aceti lib. ii. foliorum cupressi  
lib. i. folia tusa ad biduum in aceto macerata, deinde  
excolata aceto, cyparissum probe terito, etq; cedriā  
adijcto ac unito, & cū uuluris pennis ægro in sole  
locato illinito. Aliud. Efficacissima est & hæc illi-  
tio. Auripigmenti drach. vi. thuris drach. viii. costi  
drach. ii. calis drach. iiii. baccharum lauri sextantem,  
cedriæ drachmas iiii. Omnia teruntur, & cum so-  
liorum populū albæ arboris decocto in coquendo  
inspissato illinuntur. Aliud ad faciei eminentes tu-  
mores præcipue conducens. Mastiches unc. i. myr-  
rhæ drach. iiii. sulphuris uiui drach. iiii. olei om-  
phacini quantum sufficit, utere. Mirabiliter autem  
prodest ad faciei tumentes eminentias, ex melleia her-  
ba remedium. Tunduntur autem folia herbæ uiridita  
cum axungia ueteri, & imponuntur. Erubescunt fa-  
ciē inde plurimum partes quibus imposita sunt: con-  
trahuntur autem facie pane imposito, aut cerato ex  
oleo amygdalino, rursumq; in naturalem suum colo-  
rem restituntur. Postquam uero ex æquæ fuerint  
eminentie, illitionē talem parato. Thuris unc. i. gum-  
mi albi unc. i. cimonij trientem. Vno ueteri aut aceto  
terita illini. Emplastrum quod & ipsum ad maio-  
res & luentes eminentias facit, inquit Archigenes.  
Terebinthinæ drac. x. radices aristolochiæ drachm.  
iiii. radices capparis, ueratri albi, sulphuris uiui, la-  
pidis pyritæ, cuiusq; drach. ii. thuris drach. i. terebin-  
thinam liquefacto, & ab igne ablata reliqua tenuis-  
sime trita infarcio. Opime facit & Andronis passil-  
lus & Musæ pastillus similiter illitus uterq;. Maio-  
res porro tumores etiam emplastro aliquo discusso-  
rio cōtegantur: efficaciter eis auxiliatur emplastrū ex  
asellis ad meliceridas ulcera mellei humoris & stru-  
mas descriptū. Magis proprie autē hoc cōuenit. Olei

cicini lib. i. spumæ argenti drac. c. picis crudæ hemi-  
nam i. ad lenū ignem assidue agitādo coquito: atq;  
ubi coacta fuerint, ab igne ablatis chamæleonis ni-  
gri radice tenuissime tritam drac. x. pondere insper-  
gito, & ex cithymali succo parū. Aliud. Ceram  
& uiscum cum modico myrteo oleo liquefacto, &  
diphrygis triti quod satis est inspergito, ac uitro.

Aliud. Radicis panacis drac. iiii. niri drac. v. cal-  
cis drac. i. ceræ drac. ii. adipis ursini sextantē. Lique-  
facta aridis affundito, & miscro. Cæterum nigras  
eminentias, aut ualde liuidas, cū scalpello leuibus uul-  
nuculis impaictis incidito, deinde splenio cruentis  
uulneribus desinato, & quod inflāmatōnem acce-  
re potest, integro, eius generis est emplastrū Barba-  
rum appellatū, aut saltem tenuissime tritū oleo sub-  
actum, & lanis succidis exceptū imposito, & postea  
radicem maluæ tenerā cataplastatis uide adhibe-  
bit, aut cerato ex diphryge cicatrice inducēte uitro.  
Audendum autē in fortioribus corporibus, præfer-  
tim ubi prius corpori robur addideris, etiam ex co-  
riorum ad imptiginē feram descriptum illinere,  
dura tamen cantharidū ammixtionem apparatus,  
quod ubi factum fuerit, & bullæ eruperint, eas uiri-  
di Epigoni emplastro, quod līs a quibusdā appella-  
tur, integro, & per balneus curato, & tunc lac por-  
dum præbeto. Vkerationes autē oborras, cerato ex  
diphryge cicatrice obducente, aut melino cerato ex  
uino apparato, sanabis. Facit idem & ex pompholi-  
ge ceratū, & quod ex cadmia apparatū appellatur.  
Quod si curationē difficulter accipiant, uelut chiro-  
nia ulcera tractato. Si uero pascendo prosperant ul-  
cera, coracæ pastillo ex aceto mulso apparato uitro,  
aut pastillo Andronis. Aliud, ad utilissimam quæ  
leue dicitur, & ad ploras. Calx in uino aut rosa-  
ceo fermētata cū aqua illinunt, & post hoc ceratum  
rosaceū adhibetur. Aliud celebre ad elephāiasim,  
Aramenti sutorij partes iiii. aluminis scisci mada-  
facti partes vi. luto fusco subigito, & ægro nudato  
ac præferto, corpus eius illinito, deinde lauato, ac rur-  
sus eodē modo foueto, illinito, ac abluto: quod ubi  
ter feceris, cutē rosaceo inungito, ægrūq; per totā  
diē contegito, & reperiēs sanū. Aliud, ad elephāiasii  
affectos, carcinomata, podagrā, articularē morbum,  
firmas, cōdylomata, & cōuulsionēs neruorū. Vul-  
turis cerebrū unā cū capitis ossiculis & reliquis car-  
nibus capitis accipito, & in uino dulci coquito, atq;  
excolata quidē illa proijcito: cum iusculo uero ipso,  
euphorbij, croci, aramenti indici, pipēris albi, casto-  
rij, myrrhæ, cuiusq; sextantē coquito, & foliorū ru-  
bi, seminis satyrj, cuiusq; quadrantē, picis quadran-  
tem, succi mandragoræ, cedriæ, cuiusq; unc. i. fel tau-  
ri, aut capræ integrū, uermes ex lignis putrefectibus  
& marcidis numero tres, addito. Hæc sanē omnia  
in uini dulcis sextarijs nouem simul coquito. Hoc  
iuramēto adstricti accepi, ne cuiuspiam reuelarem.  
Hic apparatus ad illiūnem in nouem dies sufficit,  
& eminentias ipsas exterit. Cæterum cum penna  
uuluris etiam illinatur. Aliud, ad elephāiasim,  
abscessus, cōdylomata, firmas, eminentias corpo-  
ris, tubercula, pingue quiddam in se collectum ha-  
bentia Græcis inde steatomata appellata, unguium  
abscessus paronychias uocatos, & gutturis tumores  
qui bronchocelæ appellantur: ad omnes item malig-  
nas eminentias quacunque corporis parte, multo  
experimento

experimēto cognitum. Vulturem uiuum accipito, eumq; in uini dulcis aut sapæ sextarijs nouem aut sex suffocato: aut uulturinum gallum eodem modo tractato, & a uespere usq; ad matutinū tempus ad uitis ligna coquito. Cæterum ægrū uenit uictu conuulso, sepe etiam inediū perferre iubero, & per subscritum purgatiuum medicamentū purgato, perq; dies septem ex marina aqua lauro. Postquam uero uultur coctus fuerit ac excolatus, ossa ipsius contrita cum ægri sudore, præsertim qui a sole prolectus est, cani edenda proijcto: massas uero septe inde formatas cani dato. Vulturem autē ipsū per triduum a uespere usque ad matutinum tempus, ne ab auro-ra conspiciatur, coquito, atq; id similiter tertia die facito, probeq; cōiectum omni die manē in domo tenebrosa reponito. Atq; ubi tandem ita percoctum ac excolatum habueris, ad iusculum in nocte, minime uero in die, sequentia addito. Salis fossilis, algæ siue fuci marini, in petris cōdensati trientem, alij unā ciam unā habent, galbani, opopanax, cuiusq; sextantem, colophoniz, picis, cuiusq; quadrantem, euphorbij, castorij, sanguinis capræ, cuiusq; trientem, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, glutinis aceto dissoluti, picis liquidæ, singulorum sex uncem, rutæ syluestris ramulos septem, catananzæ herbæ scrupulos tres, amfidi scrupulum unum, polypathij herbæ, quæ per contrariam affectionem luna desinente auxiliatur, lapidis gagatzæ, cedriæ, singulorū quadrantem, bituminis iudaici sextarium unum, artemisiæ herbæ, chamæleonis herbæ, cuiusq; sextantem. Hæc omnia cum iusculo ut dictū est apparato, probe trita committito & unito. Cæterū uulturem primum unā cum pennis usque ad pedes excoriatō, atque ita in sapam coiectum suffocato. Pellem autem ipsam cum pennis myrrha conditam, & in sumum suspensam exsiccati sinito. Pedes uero in oleo coquito, & cum oleo podagricos, per uuluris etiam pennam, illinito. Nerus uero ad pedes podagrici pro amuleto appendito, & ab affectione cum liberabis. Porro purgatiuum, cuius mentionem feci, hocce est. Aloës uncia dimidium, gari, acetī, parem mensuram unito, & octauam sextarij partem bibendam præbeto. Ad condylomata in facie elephantiasi affectorum. Thus cum uino austero tritum pinnulis illinito. Illitio alia optima ad elephantiasis laborantes: facit & ad pruritus. Gummi, gallarum, singulorū drachmas decem, pumidis drachmas uiginti: contundito & cribrato, ac utitur ut optimo. Aliud, etiā ad lepram. Veratri nigri, gūmi, cuiusq; quadrantem, spumæ pisanæ quantum sufficit: conijce in ollam, & coque donec succulenta fiant, ac tritis utere.

Dieta elephantiasi correptorum. Cap. cxxv.

Dieta elephantiorum talis sit. A somno membra eorum plurimum & leniter manibus cōtrecentur, deinde alius consueta recrementa deponat, & post hæc ipse æger sub diuo aut in porticu deambulet, molli- bus caldamentis subligatis, conficiatq; deambulando usq; ad stadia triginta. Deinde cataplasma ei imponatur primum ex pane, aut faba cocta, aut pisanā, aut aliquo consimili illinatur, uerum ad unum quodq; prædictorum citij acidi succus ammisceatur si haberi possit, aut si desit, peponū aqua, & post modicū interstitiū aqua pura large abluatur. Postea cerato rosaceo liquidiore facies superne leuiter illi-

natur. Deinde ubi gestationis genere aliquo fuerit uictus, rursus deambulet concitatore gressu. Postea uero portione aliqua ex prædictis accepta, quotidiana no allici & consuetio munerī uacet. Circa quartam autem horam concitatore gymnasio exerceatur, & detergo sudore, urfino aut uulpino adipe illinatur, qui si nō addit, caprinus aut taurinus, aut equinus, aut aliquis ex uolucrum genere, aut butyrum recens sumatur. Deinde cum fœni græci aut pisanæ succo, qui parū ammoniaci cum aceto liquefacti ammixtū habent, perfundatur, atq; ita lauacro quodam præscripto utatur. Noduum est enim affectioni, si quis non lauet. Per interualla autem psilothro, ut dictum est, defricetur, & quodam ex prædictis smegmate quotidie expurgetur. Commoda sunt etiā arida formata, & post sufficientem ex dictorum usu exudationem, nationes in mari, aut in sulphurentis & aluminosis aquis, non extreme frigidis, quales sunt aquæ Albulæ in Italia uocatæ. Quod si tales nō adfuerint, frigida lauacro alsidue utatur, raroq; balneum petat, nisi psilothri gratia, aut altera aliqua urgente necessitate cogatur. Si uero quis ad frigida lauacrū cunctantior sit, eum in balnei aëre plurima aqua frigida perfundi commodius erit. Præstat item solium ex decocto aliquo eorū quæ adstringunt apparare, plāginis præsertim, aut rumicis, aut perdicij, quam quā efficacius omnino censeatur betæ decoctū, cui fa- nē & ex aceto parū est affundendum. Extergatur etiā uelut prædictū est, in balneis cum quopiā prædictorum smegmatur, & cum myrobalano alsidue ex aceto. Quibus deinde ablutis, ad acrimoniz & mordacitatis curationem ex oleo liscino cum aceto & uino austero conuassato, aut ex oleo myrtæ & pari uino conuassatis illinatur. Licet etiam aliquādo parum ammoniaci, aut alumen rotundum in uino conterere. Optimum est & butyrum recens illitum. Post lotionem & extensionē per tenera linteola, ad horæ dimidium quiescat: deinde aqua tepida hausta sponte uomatur: si id facere nequeat, per immisio- nem digitorū. Postea modico intervallo temporis interposito, uinum absinthites aut organites bibat, non infra hemina mensuram, & paulo post cibis ei apponatur. A uino in posterū omnino abstineat, passioq; & uino mulso, ab omniq; cibo difficulter concoctili, & maxime a frigida potu. Cæterum ci- bi tempore purgationum qui facile fecerint queant, sumantur. Pans hordeaceus aut triticeus recens ca- lidus. Ex oleribus betæ, & porrum capitulum duas bus aquis edulcatum: lactucaq; & capparīs ex aceto mulso. Ex mari uero herinacē recētes, ofitea, pelorides, pectunulū, tellinæ cum betæ coctæ, & fassa- mentum uetus ex aceto mulso. Vbi uero post pur- gationes resocillare, & uires restaurare uelimus, acria auferenda sunt, præter condimenta, quorum ut urinam cientium, usus commodus est. Exhibendus est autem panis optime præparatus, oua forbilia, ha- licalora, & lac cum melle. Omnia tamen cum pa- ne. Ex oleribus, malua, rumex, sisarum, lactuca, se- ris, feniculus, ficus coctæ, a quorum acceptione pa- rum aquæ calidæ bibat, in qua decocta sint, quæ uri- nam moderate citat. De cætero uero abstineat, ne ne poter usque ad cenam. Bis enim cibum capere præ- stat, quā semel se eximplere: nam, ut dixi, etiam pran- dium ipsū simplicissime paretur: cenam magis

uariam concedo. In cœnam etiam duæ tertiæ panis partes referuntur. Præbeat item in ea piscis molli carne non graueolens, coctus, simplici iusculo apparatus, & ex auculis mœtanis, extremæ partes & uentres, ex pedestribus, hoc odorum carnes, & leporinæ & dorcadum. Pro condimento & embammate ad intinctus, acetum scilliticum, & sales scillidici commodi sunt. Ex leguminibus, pisana utilissima censetur. Danda tamen & per interualla oryza, porro in cocturam eius addito. Ex fructibus conueniunt, ficus electæ, uua arefacta, primum cocti in aqua multa, similiter & coroneatum quodq; certo pro confectione modo. A reliquis fructibus omnino abstineant. Ex dulciarijs mellidus, placet tamen dæ ex amygdalis modice tostis, & paucis pineis nucleis, & cni ei semine contuso & cribrato, ac modico pipere apparatus. Ex bellarijs, parum ex caricis aridis conceditur, & uuas passas pingues, amygdala tosta, pistacia, & terebinthos tostos, & cicer tostum, cnico cum eis torrefacto & muria adstillata. In potu aqua calida eis omnino conuenientior est: sed uiribus restaurandis, uinum album & tenue, ac non ualde uetus in cœna post cibos datur: quam minimū tamen potet, in suis tantum expletionē. Reliquæ poriones ex uino & melle coactæ, propomata Græce peculiariter appellatæ, uitandæ. Acetum autem mulsū non incommode exhibetur ut ieiuniis, tum inter cibos, si stomachus tolerare possit. Somnus porro diurnus nocuius elephantidis est: nocturnus autem aptissimus. Post longū a cœna interstitiū, deambulatio lenta ac sensim facta comoda est, quo cibi eo melius descendunt. Manutinarū uero excitationē sunt studiosi. Cōstitus affectioni infestissimus est. Etenim non reperias ullum aliquē temere, qui exectus ab elephantiasi apprehendatur, neq; etiā facie mulierem. Fortē ob id quod ab utilia cōbono humore feminis emissio prodeat, aut quod largior generatio ipsius in seminarijs locis ob materiæ spissitudinē contingat. Multo itaq; semine elephantiasii correpti abundant. Non tamen absurdū fuerit puerorū gignendorum gratia per rariora interualla coire, neq; enim in totū contagiosæ successiones ipsius affectionis in omnibus sūt. præsertim si quis optime dispositus, ad uenerem incitetur. Quod si succedat curatio, etiam ad quotidianam uisus munia obeunda demittantur, & longis peregrinationibus sanitati uberius cōsulant. Si uero non succedat, procul a mari & urbibus segregentur.

De pruritu, Archigenis.

Cap. cxxxvi.

In omnibus pruritibus uenæ sectione utendum est, si iuuenes sint, & multo sanguine redundet qui ex eo laborant, & nihil aliud impediatur eam admittere: particulatim autē & paulatim eum deasahere oportet, & quandoq; sequenti die sectione repetita rursus auferre; deinde restauratis uiribus, per purgatiuū phar macum alius subducatur. Lausdi sunt omnino quidē ieiuniū, quandoq; tamen ubi parum quiddā cibi acceperint, a concoctione autem secundario lauendi, ægre enim humectari potest malum. Radenda etiā pilis obfusa, & cum maluæ syluestris aut fatiue, aut betæ, aut fœni græci, aut felsami, aut fursurū decocto repurganda. Torum uero corpus ex farina fabacea, aut lupinorū, aut myrobalani conspergatur. Quod si diutius duret affectio, fomenta quidem & lotiones ex saluæ, myricæ, mercurialis, organī,

pulegij, baccarum lauri, radicū cucumeris agrestis decocto adhibeantur: ex lixiuio item & muria acida. Corpus uero nitro tenuissime trito conspergatur, uini fere uisita & arida adiecta. Aut cum hac mixtura: Spumæ nitri albæ, sulphuris uiui, alcyoni uisiti, singulorum æquales partes committe, & insperge. Si uero intensiorem uim eius facere uelis, etiā ueratum album adde. Ea q; simul citra pinguium amixtionem corpori insperge. Aliud, bonum & mitius. Spumæ nitri librā unam, thuris lib. i. cimoliz sexuncem. Aliud. Atramenti futuri, thuris, sulphuris uiui, nitri, æquales singulorum partes in uino terito, & in prima balnei domo illinito, deinde lauato, & cum uino & oleo inungito. Aliud, ad pruritus totius corporis. Plumbaginis, spumæ argenti, nitri, cimoliz, iridis, chamaeleonis nigri radicis, pumicis, aluminis, sulphuris uiui, samsculi, lapidis specularis uisiti, omnium æquales partes committo, ac uisitor in balneo. Aliud smegma ad pruritum. Nitri librā unam, pumicis uisiti librā unam, spumæ nitri sexticem, ostreorum uisitorum quadratē, baccarum lauri, costi, nardi celicæ, singulorum sextantem, cyperi unc. i. folij malabathri quantum uoles odoris conciliandi gratia: contusis & cribatis uatere in balneo. Aliud, faciens & ad psoras. Sulphuris, nitri, spumæ argenti, pumicis uisiti, cumini, omnium parem modū sume & utere. Inungedi sunt & aceto ac oleo in quibus staphis syluestris sit contrita, pulegij item ac thuris æquis partibus cū oleo & uino tritis. Frequētius uero cum cimolia in uino madefacta eos expurga, aut cochleas terrestres uisitas & tritas cū melle adfrica. Optimum autē est & hoc in balneo. Mellis partes duas, aluminis liquidi partem unā, Coquito ad permutationē aliquantulā, ac uisitor primū in sole, deinde in prima balnei domo: atq; ubi parum humectati fuerint, thus cū sulphure uiuo, & nitro, & gummi, æquali pōdere trita arida corporibus eorū inspergito. Critonis, ad pruritus uehementiores. Foliorū lauri uiridum fasciculum, salis pinguis cyamū unum, aceti sextarium unum, olei lib. iiii. Omnia simul coquito, atque ubi bis aut ter effuerint, ab igne aufero, & frigeferi sinito, deinde oleū segregatum inungito. Aliud, ad ægre tolerabiles pruritus. Fecis uini uisiti, nitri affati, cimoliz, cuiuscq; lib. i. staphidis syluestris quincuncē, iridis trientem, aceti sextarios quatuor, olei lentiscini sextarios duos, Arida contusa & cribata humidis expipito. Vfus eius est in sole, aut in balneo. Aliud, Critonis. Radicis rumicis, sceni græci, gummi, singulorum drach. duodecim, sulphuris uiui, aluminis liquidi, cuiuscq; drac. iiii. myrobalani, cimoliz, fecis uini uisiti, cuiuscq; drac. sedecim, aceti sextarios duos, olei sextariū unum. Committito ac utere ut dictum est. Efficax est & id quod ex rumicis radicibus ad elephantiasim est præscriptum. Probe facit etiam ad omnem pruritus, inquit, oleum in quo rhododaphne incocta sit illitum. Aliud, ad intolerabilem pruritus, & qui domari non potest. Cæterum quum neque uenæ sectio, neque desiccatio aliqua quicquam profuisset, quidam ex huius remedij usu malum exuperarūt. Testudo terrestris uia in oleo coquitur, & ex oleo corpus inungitur. Sed & pruritus ualde egregie, mori folia arida trita affricata, & portulaca trita per se, & perdicū, & apium cū sulphure

phure uiuo & sale. Quū uero caliditas multa affue-  
rit cum pruritu, pisanæ succus commodissimus est,  
tum per se, tum modico aceto ammixto. Quod si uehe-  
menter urgeat afflictio, quædā ex prædictis smegma-  
tis ad pisanæ succū ammisceat. Vitandæ autē sunt  
inflationes, præsertim in æstiuo sole. Aqua autem  
marina maxime frigida conuenientissima est pruri-  
tui. Quare tentandū est ut æger bis & ter in die pro-  
be perficiat in ea nates: bis quidē ante prædium, se-  
mel uero circa uesperam. Dieta boni succi & uentri  
commoda eligatur. Et si alius adstricta sit, catapotia  
ex aloë sex numero in crui magnitudinem formata  
post coenā præbe. Abstineat æger ab omni acriū cli-  
borum usu, & ab omni falso edulio, & à cunctis ole-  
ribus crudis. Ad scabiosos pruritus. Cæterum ad  
pruritus scabie perplexos, lac scissum assidue adhi-  
bitum cōmodum est, & smegmata omnia prædicta  
utiliter adhibeantur. Priuatim autē hæc. Myrrhā cum  
aceto & oleo tritam illinendam præbe donec exu-  
det. Sinapi item & myrobalanū cum aceto & oleo  
eodē modo. Aliud. Spumæ niri, alcyoniū usti,  
sulphuris, singulorū æquales partes tritas & linte-  
lo exceptas in oleo madefaciat, & deinde ex arido  
accipito, locosq; donec erodantur desiccato, atq; ita  
aqua abluito. Aliud. Ammoniaci salis, niri assati,  
sulphuris uiui, singulorū unciam unā, myrrī aridæ  
sextantem. Vtere siccō. Aliud celebre. Farina cicerū  
cū caprini stercore pari modo uitior. Aliud ad pso-  
ras, pruritus, uisiliginēs, & impetiginēs. Bituminis,  
sulphuris uiui, thuris, buccinorū ustorū, æquales par-  
tes cum aceto & melle tritas adhibe. Optime facit &  
pulegium cū mannæ puluisculo ex oleo & uino il-  
litum. Vnguentū ad psoas. Hederæ folia tenerris-  
ma & modicum salē cum uino & oleo trita illinito.

Aliud. Oleum amygdalinū uinumq; acbutyrum  
conquassata illinito. Aliud. Aloës, cerusæ, spumæ  
argenti, syrici, plūbaginis, glauci, recrementi argen-  
ti, saponis constitūti, singulorū æquales partes, aceti  
& rosacei, quantū satis est. Vtere in balneo. Aliud,  
ualde celebre. Nuces rancidas quindecim, sulphuris  
uiui quadratē, gari pontici quantū uisui opus fue-  
rit, tritis utere in balneo. Aliud. Perdicū herbam  
cum sale & sulphure affricato. Aliud, experimen-  
to constans. Nuces rancidas quinquaginta, salis ma-  
nus plenæ mensurā, sulphuris uiui unc. i. tritis utere  
in balneo ad desiccationē, oleo nō adhibito: atq; ubi  
exudarit, ægrū in solum calida expletū demittito,  
indeq; egressum rursus desiccato, & statim rursus in  
solum demittito. Aliud præsens remediū. Panis  
aridi, nucū iuglandium rancidarū, æquales partes,  
sulphuris uiui, paulo plus q̃ pro panis mensura, o-  
ptime terito uino austero affuso, donec ad strigmen-  
torū spissitudinē redigantur, & absq; oleo in balneo  
affricada præbeto. Aliud. Saponis gallici, niri, pu-  
mici, sulphuris uiui, perdicū herbæ, cuiusq; unc. i.,  
adipis porcini recētis unc. xiiii, carpopallami dra-  
chm. iiii. Vtere in balneo. Vnguentū optimū ad psoas.  
Picis sexuncē, ceræ quadratē, & unc. dimidiū, spu-  
mæ niri sextantē, sulphuris uiui sextantē, olei myr-  
tei quod satis est, ut ad strigmentū solidioris crassitu-  
dinem redigatur. Vtere in balneo. Aliud. Pyretri  
drachm. iiii, herbæ lanariæ drachm. iiii, sceni græ-  
ci drac. viii. contusā & cribrata reponito. Vsu uero  
expetēte quantū tribus digitis apprahēdi potest ac-

cipito, & cū aceto acerrimo conquassato: deinde ro-  
saceo sufficēti addito unā cū smegmatis illinito. A-  
liud. Aluminis scissilis, spumæ niri, sulphuris uiui,  
cuiusq; sextantē, staphidis syluestris sexuncē. Aceto  
& rosaceo diluta illinito. Aliud ad inueteratas pso-  
ras. Atramētū futorium cū lacte & rosaceo tritum  
illini, quidā uero cum adipe suillo utuntur. Aliud.  
Chalcididis, misyos, æquale pondus, tritis cū uino  
& rosaceo uitior. Aliud. Niri assati, sulphur uiuum,  
alumen ustū, æquis partibus cū oleo circūlinito. Fa-  
cit & centaurea arida trita adstricta, similiter & cha-  
mæpitys. Aliud. Raphani succū cum ouo in bala-  
neo diligēter illinito, & in paucis diebus curabit æ-  
grum, idē & rapī succus cū ouo probe facit. Aliud,  
ad psoas. Spumę argēti trientē, oua integra quinq;  
acetū lib. v. & dimidiā, olei myrtei sextariū unum:  
trita illini. Aliud, ad psoas sanie fluētēs & foetidās.  
Mali punicæ ramulos teneriores aut folia tusa teri-  
to, aqua aut posca prout melius iudicaueris affusa: il-  
line assidue, & miraberis. Aliud, ad psoas ægre co-  
rabiles, & principū elephantiasis. Serapiadis trite-  
sticularis manus plenæ mensurā, radicis alicæ tan-  
tundē, hyoscyami uiridis tantundē, myrrī uiridis tan-  
tundē, scillam unā mediocris magnitudinis aut par-  
uas duas, olei sextarios tres, acetū sextarios tres, spu-  
mæ argenti dodrantē, cerusæ trientē, croci sequiun-  
ciam, candidi ouorum decem. Spumę argēti, ceru-  
sam, & crocū cum aceto terito, herbas uero cū oleo  
& reliquo aceto coquito, percolato, ac tritis affu-  
dito & cādida ouorū addito, unito, uitior. Ego uero  
& perdicadem herbā adieci, & in magnis affectio-  
nibus etiā chamæleonem, & rosmarinum herbam.  
Aliud ad psoas, quo usus sum in elephantiasis prin-  
cipio. Niri, aluminis, sulphuris uiui, ceræ, cuiusq;  
sextantē, picis trientē, olei in quo rhododaphnæ co-  
ctæ sint lib. i. Cæterū ego sulphuris uiui sexuncē cō-  
ieci, & pro arida pice liquidā indidī: & corpore ex  
his illito usq; ad miraculum profecit. Verū ubi iam  
ad cicatricē perducta essent ulcera, sulphuris sextan-  
tem, & picem aridā infeci. Ceterū ad psoas, ualde  
celebre. Colophoniæ unc. i. ceræ unc. i. emplastrū ex  
succis sequiunā, myrrī quadrantem. Vsu expetēte,  
si quidē psoæ fuerint asperiores, ipsū ut habet adhi-  
be. In exulceratis uero rosaceo liquefacto, ac uitior.  
Aliud, quo in exulceratis psois per omnia utimur.  
Cerę sextantē, picis aridæ sextantē, emplastrū ex fue-  
cis quadratē, rosacei trientē: liquefacto, ac uitior  
ueluti eo quod præter opinionē auxilietur. Cæterū  
si diuturna sit affectio, subscriptis ueris: Epithema  
prædarū: facit & ad ulcera cicatricē difficulter reci-  
pientia. Acerginis unc. i. atramentū futorij unc. i. cer-  
æ uncā unam, adipis porcini recentis sextantē, li-  
quefacta aridis cōmixto & imposito, ac post tri-  
dium soluito. Facta uero exulceratione, uelut igne  
ambusta curato. Aliud epithema. Sandarachæ unc.  
i. ammoniaci unc. unam, terito, & terebinthina ex ci-  
pito, ut emplastrū accipiant formā, & præfrito lo-  
co, pellucilla excepta imposito, ac post dies quinque  
soluito. Vbi uero testorū ulceri fuerit inducū, eo-  
dem pharmaco donec testorū excedat, uitior. Ad  
exulceratū autē cū his quæ ambustis cōueniunt  
utendū est: & maxime emplastro ex hordeo appa-  
rato. Porro ubi in callū induruerit affectio, magisq;  
fuerit exacerbata, sequentibus utendum erit. Epi-  
thema



thema ad pſoras in callum obcuratas, & ad leproſas diſpoſitiones, pharmacum proſpere accommodatum. nam & callos coëret, & ex profundo extirpat, & ulcerationes ad cicatricē perducit, ſolū enim ea quæ præter naturā accreuerunt corpora cōtingit. Farinæ lupinorū tenuiſſime tritorum, ſylueſtrium quidem malim, ſi adſint, aut ſaduorum, ſi illi haberi nō poſſint, uncias quatuordecim, farinæ liliacæ ſeptuncē, nītri rubri ſexuncem, picis liquide italiç ſextarium unum, aceti acerrimi italiç ſextarium unum, terebinthinæ beſſem, picem, cū aceto coquito, & ubi unita fuerint terebinthinā adijcito, & ab igne ablata aliquo modo frigefieri ſinito, & inſperſis ac inſartis ſarinis, aſiſe duo agitato, deinde ad ignē leniſſimum ad motum coquito indeſciet & agitato donec pharmacū à teſta in qua coquitur, indipit ſeparari. Quo factō ipſum in moriariū trāſlatum & probe tritum reponito. Viſu uero exigente præſcripto ex nitro loco, linæolo exceptum nouo & denſo imponito, ac poſt tertium diē ſoluito, & alia noua ſplenia cōcinata imponito, atq; id uſq; ad perfectā ſanationē factō. Oportet autem nō modo hoc epithema, uerum etiam alia quæ ex aceto & pice cruda apparantur, in loco ſub diuo apparare. Facile enim deſicū & diſparātur. Heracides in æreo uaſe coquendū eſſe admonet, & terebinthinā poſtremā conſiçedam. Oribaſij, ad ulceratas & feruidas in ſuris eruptiones. In balneis quidē myrobalanū & ſulphur cum liquido cerato leuiter illinito; poſtquā uero frigidæ aquæ ſolium inſcenderit, ex oleo myrteo cū uīno inungito, aut ex roſaceo aut leniſſimo eodem modo. Potes & leniſſimo citra uīnū uti. Ad pſoram, Magiſtriani, ualde neceſſariū. Rhododaphnes ramulos in oleo coquito, deinde nuces rancidas & ſulphur uīum in mortario terito, in ſuſcep; ad ea oleo ſimulq; trito, locos in ſole illinito, & poſt horam lauato, & ſanabis. Aliud, præter opinionē ad pſoras faciens: Ceruſæ, ſpumæ argenti, ſulphuris uiui, ceræ, ſingulorū ſextantē, oua numero duo. Oua recēdia in aceto per tres dies ac noctes mācerato, deinde unā cū putaminibus trita, reliquis probe tritis aridis amiſſiceto, & cerā cum roſacē libris duabus & dimidiā liquefactam cum eis cōmitico, ac utitor in balneo pro unguēto. Aliud ex ochra, ad pſoras cōmodum. Spumæ argenti trientem, ceruſæ unc. i. ochræ ſextantem, cadmiæ unc. i. ceræ trientem, olei myrtei lib. ii. arida cum uīno terito, & liquefacta affundito, ac utitor.

Ad prurigoſas papularū eruptiones. Cap. cxxvii.

Diphyres cum aceto illinito, & mori radicem ex aceto, plumbaginem, rubiginem ferri, miſy, cyclamini radicem, omnia ex aceto: alumen omne melle coctum, rutam cum ſale & oleo, ceruſam & argēi ſpumam ex aceto, rutam cum cerato myrteo quadrupla parte. Aliud, ad pſoras, humentes lichenes, pinqueſ; & tumentes ac multo humore manantes, mirabile. Cadmiā uīno & oleo tritam illinito. Ad omnem pſoram ulceratam cum pruritu aut dolore, & ad ulcera capitis manantia, eryſipelata, & herpetas. Plumbi uſi, cadmiæ, plumbaginīs, cuiuſque unciam unā, ſcoriæ argēi quæ & helcyſina ſequundam, ſpumæ argenti ſequundā, uīni & olei omphacini aut roſacē quantum ſufficit. Vere ad omne ulcus aut papulam in toto corpore. Præter opinionem enim facit, præſertim in infantibus. Aliud, ad pſorā

aſperiorē & tuberculā, opūmū, Cadmiæ, ceruſæ, ſulphuris uiui, maſſiſches, cuiuſque unc. i. ceræ quincuncem, roſacē dextantem. Vere, locos ex eo integando. In balneo autem ex pharmaco unciam unam, & ſapone ſequundam miſceto, ac illinenda dato.

Ad puſulas pſydracas Græciſ appellatas, & ad papulas ex feruore aut ſudore obortas.

Cap. cxxviii.

Fiunt in toto corpore puſtulæ, dolorem inducentes citra ſancti collectionē. Eas eczematæ, ab ebulliēte feruore Græci uulgo appellat. In his plumbago conuenient cum uīno aut leniſſimo oleo trita, aut ceruſa cum uīno & oleo myrteo: aut miniū ſinopicum cum adipe ſuillo recēti, aut miſy aſſatum cū uīno & roſaceo. Ad exulceratas puſtulas. Vbi uero exulceratæ fueſint puſtulæ, ſubſcriptis utendum erit. Scoriam plumbi, & ſpumā argenti, pari pondere uīno & oleo myrteo exſcitilla. Aliud. Malicorij, ſpumæ argenti, aramentū ſutorij, ſingulorū æquas partes, cum uīno & roſaceo illine. Aliud. Baccharum myri nigrarum, malicorij, aramenti ſutorij, ſpumæ argenti lotæ, ſingulorū æquale pōdus, cum uīno & oleo myrteo illinito. Smegma, ad puſtularum eruptiones. Farinæ ſabarum, piſanæ mola trita, radiciſ polygoni contuſæ & cribratæ, terræ cimoliz toſtæ, ſingulorum drach. ii. ſpumæ nītri albiæ drachm. i. thuris tenuiſſime triti tantundem. Viſus eius in balneo eſt. Ex eo autem quātum ſufficere putaueris accipito, ac cum oui candido ſubigito: deinde corpus ex eo circumlitū exudare ſinito. A balneo autem ex roſaceo aut myrteo corpus illinito. Aliud ſmegma. Cimoliz drach. ii. farinæ erui drach. ii. quod ex myrobalano cōſuſa & expreſſa reliquū eſt tantundē, iridis tuſæ drach. ii. nītri drach. ii. myrtil ſiccæ tuſæ drachmæ dimidiū: tritis utere ut dictū eſt. Aliud. Radici� hyoſcyami contuſæ drac. i. farinæ lupinorum drach. i. cimoliz drachmæ dimidiū, iridis drachm. ii. & dimidiā: tritis utere ut dictū eſt.

Oribaſij, ad nigras cicatrices in albandas.

Cap. cxxix.

Spumæ argenti, mentæ, thuris, æquales omnium partes, cum melle utitor. Aliud. Stercoris crocodili drachmas decem, thuris drachmā unam, ceruſæ drachmas duas: aut ex aqua, aut cum cerato cyprino mixta illinuntur. Aliud. columbinum ſtercus ex aqua illinito, ipſumq; cito abluito, ne exulcerationē inducat. Aliud. Cimoliz, ſtercoris columbini, ſaponis, thuris, ſingulorum pares partes cum aceto illinito. Aliud. Hirundinis ſtercus ex aqua illinito. Aliud. Saponis, ſtercoris canini albi, ceræ, olei in albandis, æquales omnium partes cōmitte ac utere. Aliud. Nītri, ammoniaci thymiamadis, myrrhæ, ſulphuris uiui, ſingulorū æquas portiones in aceto albo terito, aut uīno & aqua trita modice illinito, ne exulceratio ſuccedat. De impetigine, præſcriptū eſt Sermone octauo. De herpete, & ſimilibus, in Sermone quarto decimo. De uerrucis, tum quæ myrmedæ, à formicis, tū quæ thymi, à ſimilitudine cacumini thymi appellantur, item in decimo quarto Sermone ſcribetur. Ad papulas autē infantium, in quarto Sermone tractata ſunt remedia.

Ad ulcerōſas papularū eruptiones, tum in tibijs, tum in toto crure obortas.

Cap. cxxx. In balneo ex myrobalano & ſulphure cerato liquido exceptis

exceptis leuiter illinantur, & in aquam leniter calidam demittantur: postquam uero frigida aqua solum infecerint, loci ex myrteo oleo cum uino, aut rosaceo, aut lentiscino cum uino inungantur. Lentiscino etiam per se utendum. Probe faciunt ad eas & mali punid putamina uino cocta & trita, ac cerato modico liquidiore ex myrteo aut rosaceo oleo apparatus excepta, & illita. Facit & myrsinatum dictum pharmacum, & emplastrum ex hordeo cum largo rosaceo aut myrteo dilutum & illitum. Aliud. Valde commodum & hoc est, quod in adolefcentulo quopiam sumus experti, qui ploram multam inueteratam iam ac asperriam circum crura habebat, quæque a genibus usque ad pedum digitos procedebat. Semen lini cum aqua cotusum quam crassissime illinito, & assidue tanquam uehementer approbato utitor. Aliud, ualde efficax. In quodam qui asperriam ploram circum crura habebat cognitum, in quo adeo affectio ipsa inualuerat, ut elephantorum corporibus non abissimilis esset: qui sane in paucis diebus sanatus est. Sulphur uiuum quam tenuissime tritum, amurca & oleo exceptum, in balneo ad defricationem exhibito, & post balneum ex eodem illinatur.

Ad cicatrices nigras ex ulceribus relictas,

Cap. cxxxi.

Quandoquidem uero in profundorum ulcerum curationibus, cicatrices nigrae constantur, etiam de his dicere operæ pretium fuerit. Differunt autem cicatrices à utiliginibus nigra, quæ alphas appellatur, in hoc quod leue corpus habent. Vitiligo enim tum ad speciem, tum tactui aspera subiacet. Ad nigras itaque cicatrices subscriptis utendum est. Plumbi uisui, spumæ argenti, æquales partes cum uino tritas, & in cerat crassitie redactas, reponito. Vbi uero usus expetit, uino & rosaceo liquefactas, & ad pinguis emplastri spissitudinem deductas, illinito. Aliud. Sulphuris uiui, & myrobalani, æquas partes cum aqua illine, aut terebinthina exceptas, & uestis detritæ panniculo infans imponere. Aliud. Myrobalani undam una, stercoreis columbini unciam unam, melanthii sextantem, tritis utere pro smegmate, poteris & cum aceto illinere. Aliud. Myrobalani, sulphur uiuum, alcyonium, cum aqua ad frigementorum spissitudinem redacta illinito. Aliud. Buccinorum ustorum sextantem, thuris unciam unam, illine cum aceto. Oris bafij, ad cicatrices nigras. Radicis cucumeris syluestris uiridis drachmas duodecim, adipis suilli recentis drachmas quindecim, aluminis scissi drachm. v. sulphuris uiui, nitri, cuiusque drachmas duas. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ, æquales partes lotas terito, & cum oui candido illinito. Smegma, cicatrices inalbans. Cimolix, stercoreis columbini, saponis, thuris, æquales omnium partes cum aceto adfricato, & rursum ex eodem illinito. Aliud. Veratri albi drachmas duas, thuris drachmas duas, spumæ nitri drachmam unam, cimolix drachmam unam. Vtere cum aceto. Aliud. Bryoniae radicem confisam, in oleo donec succulenta reddatur coquito, & oleum ipsum assidue illinito. Aliud. Erucæ semen cum selle bubulo, aut alio quod haberi possit, illinito. Aliud. Spumæ argenti sextantem, sulphuris uiui unc. i. erucæ succo trita illini, ubi uero exaruerint, lava. A balneo uero ex sola argenti spuma cum erucæ succo illine. Aliud. Talum ouillumustum cum uino terito, ac illi-

nito. Pastillus ad cicatrices nigras in quacunque corporis parte. Cornu ceruini uisti, buccinorum ustorum, spumæ argenti, cerusæ, thuris, alcyonij uisti, singulorum unc. i. piperis sesquunciam, sulphuris uiui sesquunciam, gummi unciam i. cum uino pastillos, quæ admodum nostri, formato. Alius pastillus, per experientiam concolores cicatrices faciens. Lapidis pyritæ, comæ absinthij, lupinorum amarorum, pompholygis, cimolix, stercoreis columbini, myrobalani, melanthij, æquales fingulorum partes in pastillos cum aceto cogito, similiterque utitor. Ad cubitorum & coxædum nigredines ex dictura abortas. Alcyonium usum, si quidem tenera cute præditus sit, cum aqua: si uero durior cutem habeat, cum aceto statim à balneo illinito. Smegma idemque illitio, ad nigras in toto corpore cicatrices. Faring fabarum italicam chœnicem unam, baccharum lauri drach. viii. ueratri albi drach. viii. myrobalani drach. iiii. spumæ nitri drach. iiii. contusa reponito. Visu uero exigente, cum aqua illinito. Vtere & pro smegmate in balneo. Aliud. Farinæ erui, spumæ nitri albæ, radicis bryoniae, alcyonij asperi, myrobalani, singulorum æquales partes committito, ac utitor, ut dictum est.

De utiliginibus, seu alphis.

Cap. cxxxi.

Vitiliginum, quæ alphi Græcis dicuntur, generatio eiusdem speciei est cum leuce & lepra, non tamen omnino in profundo caro in eis affecta est, sed summa tantum cutis, & uelut squamulæ quædam utiligines ipsæ affixæ inherent, albæ quidem ex pituita, nigre uero ex atræ bilis humore oborte. Dictus est autem Græcis alphas, ex eo quod colorem cutis immutet: immutare enim apud ueteres, ἀλφαιω dicebatur. Ad albas igitur utiligines & nigras communiter faciunt, folia fici, sulphur uiuum, alumen, æqualibus partibus cum aceto illita: quare eis ut præstantissimis utaris. Aliud, ad utraq. Calcem aqua multoties lotam in æstiuo sole deficcato: usus uero tempore cum aqua liquefactam dilutorem illinito. Ad nigras utiligines. Ad nigras uero utiligines priuatim subscriptis utendum est. Veratri nigri, terræ cimolix, æquales partes aceto aut aqua dilutas, & ad frigementum spissitudinem redactas in sole illinito, præfrecto antea loco. Aliud. Radicis narcissi, seminis urticæ, cuiusque sextantem, nitri rubri unc. i. cum aceto illine. Aliud. Veratri nigri, nitri, æquis partibus ex aceto utere. Aliud. Cochleas terrestres uistas & cum melle tritas, post modicum temporis interuallum affricato. Ad inueteratas nigras utiligines, & superficiei iam in callu indurata, subscriptis utendum est. Radicis chamæleonis nigri dodrantem, sulphuris uiui sextantem, spumæ nitri unciam i. Vtere in aceto dissolutis illinendo ad solem. Aliud. Alcyonij sextantem, nitri sextantem, staphidis syluestris unc. i. sulphuris uiui unciam i. hæc arida adseruato, primumque pilothro utitor, & in teriecta una die corpus in balneo humectum ex aridis conspersio, & sudor ab eo excludet. Aliud. Alcyonij uisti, spumæ nitri, sulphuris uiui, ueratri nigri, singulorum æquas partes cum aceto illinito, & cum eodem etiam in balneo defricando repurgato. Aliud odoratum efficacissimum. Veratri nigri drachmas viii. iridis, spumæ nitri, cuiusque drachmas quatuor, cum aceto illinito, & in balneo citra pingitudinis ammixturem affricato. Optime facit &

ad hæc, id quod ad albas uirilgines apparatur adia-  
proton, ex eo quod citra opem non dilabatur, inscri-  
pium. Smeagma ad nigras uirilgines. Radicem  
cucumeris syluestris contusam & cribratâ affrican-  
dam exhibeto. Aliud. Foliorum sic in umbra  
desiccatorum drach. vii. similaginis drach. iiii. nitri  
drachm. viiii. alcyonij. drach. viiii. contusa, cribrata,  
reponito. Ante usum autem ad solem exudare affec-  
tum oportet, deinde inspergere, & sicne excicari,  
deinde citra olei ammixtionem desiccare. Hoc in  
quinque diebus uirilgines curat. Aliud. Melan-  
thij, ueratri albi, costi, singulorum drachm. iiii. nitri  
drachmas xii. Vtere in balneo citra pinguium ada-  
mixtionem. Manifestum est autem, etiam si nullus  
oporteat, aut ex colocynthide & aloë catapotijs. De-  
inde uero subscriptis uti. Bulbos cum aceto tritos nig-  
linito. Poteris item purgatiuis ex ueratro nigro &  
epithymo uti. Ad uirilgines albas. Hos iidem  
prius cum Galeni hira purgare oportet, aut per ca-  
tapotia ex colocynthide & aloë formata, deinde se-  
quentibus uti. Dracunculi radicem, aut ari radicem,  
cum farina ordeacea ex aceto illinito. Aliud. Bul-  
bos tritos cum aceto illinito. Aliud. Altheæ semen  
cum aceto tritū illinito. Aliud. Bryonæ radicem  
concisam cum oleo decoquito, donec oleū inde suc-  
centrū reddatur, & assidue illinito. Aliud. Baccarum  
lauri, cimolæ, nitri, æqualibus partibus utere  
cum aceto. Illine autem ad solem, & post paruum  
interstitium aqua ablue. Aliud. Foeni græci trien-  
tem, spumæ nitri sextantem, alcyonij usi unc. i. cum  
aceto illinito. Eodem etiam pro smeagma in bal-  
neo uidetur. Aliud ualde efficac. Alcyonij usi, sul-  
phuris uiui, ueratri albi, spumæ nitri, æqualibus par-  
tibus in balneo ad desiccandū utere: cum aceto item  
in sole illine. Aliud ad iaproton, quod citra opem  
non dilabatur, appellatum. Radicis chamæleonis al-  
bi drach. viiii. alcyonij usi, sulphuris uiui, atramen-  
ti sutorij, spumæ nitri, cardamomi, pyretri, foliorū  
fici syluestris, aluminis liquidī, pulueris caldis uiuorū,  
sici parietibus adheret domus, in qua calx reposta  
est, singulorū drach. iiii. tere, & in sole cum aceto il-  
line, egro prius in balneo ex eo descripto. Facit & ad  
uirilgines nigras. Aliud ad nigras ac albas uiril-  
gines celeberrimum. Myrrhæ, sulphuris uiui, spu-  
mæ nitri, ueratri albi, cuiusque sextantem, alcyonij  
usi sexuncem. Vtere conuidenter pro smeagma in  
balneo: & in sole item cum aceto illinito.

De leuce uirilgine alius insidente, Galeni.

Cap. cxxxiii.

Pituitosus & lentus ac uiscosus sanguis, & affectorum  
locorū debilitas, causæ sunt ob quas leuce generatur.  
Quom enim ex pituitoso simulq; uiscoso sanguine  
caro per multum tempus conutritur, facillime leuce  
omnis per profundū ipsius pituitosa oboritur, neq;  
potest amplius delatum ad locum nutrimentum ad  
propriam naturā in rubedinem transmutare. Acces-  
dit his, quod & ipse qui ad locum in fluxu sanguis pi-  
tuitosus, ueluti prædictū est, existit. Qualem igitur  
locustas, aut cancer fluuialis, & ferē omnia exanguia  
ostrea ex natura sua carnem habent, talem habent &  
ex trāsmutatione, ac in aliā speciem degeneratione,  
hi qui leucis corripuntur. Etenim hanc carnis affec-  
tionē ita appellat ab albo colore nomine accepto.

Quom enim in pilo obstitis locis leuce oboritur, pi-  
lo locos ipsos non denudat, sed canos omnino facit.  
Si uero loci pilosi glabri & pilis nudi reddantur,  
incurabilis leuce censetur. Ad leucas igitur subscri-  
ptis remedijs utendum est. Fici syluestris nigræ uir-  
gultorum lib. i. rutæ sexuncem, misyos unc. i. caldis  
uiuæ unclā i. acetī acerrimī quantum satis est. Con-  
tere obnix & passillos informa, eosq; in umbra re-  
sicca. Vsu uero exigente illine in sole, loco prius con-  
fricto: & si bullæ oboriantur, eas acicula penetrato,  
& ceratum imposito. Aliud. Fici nigræ uirgulta  
in aceto macerato, & quā tenuissimè terito, eisq;  
spumæ nitri, sulphuris uiui, fructus myricæ, singu-  
lorū æquales partes ammisceto, & locum cum nitro  
prius desiccato, indeq; in sole illinito, diligenter oba-  
seruans ne ulceratio ex eis consequatur. Aliud. Fi-  
ci nigræ folia utridia in aceto macerato: sit autem  
acetī tantū ut ea superet & penitus contegat, deinde  
contusa & trita cum sufficiēte calce uiua misceito, &  
locis prius extensis in sole illinito, usquequo lēgiti-  
mū imaginem ipsa leuce induat, atq; deinde fici  
succum recentem supra istam illitionem inducito,  
ipsamq; leucen solam aliquandiu confricato, & ne  
uicinas partes exulceres obseruato. Egrege enim au-  
xilatur. Aliud, ad leucen diuinum donum: facit  
& ad lepram. Sandaracham terito, eisq; nucum iu-  
glandium uiridem testam adijcto, ac adfuso aceto,  
rursus simul probè terito, & loco prius deterfo, in  
sole illinito. Quod si acre ægro appareat, pauclū pa-  
nem ammiscito, & assidue lauato. Aliud, ex cuius  
usu sepiulc laudem adeptus sum, citra exulceratio-  
nem medetur. Vsus sum eo in muliercula quadam  
quæ in fronte leucen habebat, & ualde egregie uires  
suas declarauit. Seminīs cardamomi sesquiciāda,  
atramenti sutorij sex tate, sulphuris uiui drach. iiii.  
aluminis rotundi & scissi, cuiusq; drac. iiii. cū aceto  
diligenter terito, locoq; ex nitro & aceto præfrit-  
cto, in sole illinito. In quibusdam sanè bullam quo-  
tiescunq; illinitur productū, qua sublata leprā ipsam  
item tollit. Aliud, ad leucas & lepras. Nucum iu-  
gladium immaturarum & adhuc acerbarum exte-  
riorem corticem uiridē derahito, & fici nigræ syla-  
stris ramulos amputato, & ad hæc spumam argenti  
conijcto, ac cum aceto coquito, terito, & ad unguen-  
ti formā reducto, idq; ipsum in sole illinito. In deco-  
quendo etiam hordei grana septē addito. Hinc enim  
sufficiens decoctionis signum habebis, ubi uideli-  
cet hordei grana cocta uideris. Aliud, Archelai.  
Veratri nigri, radicis bryonæ, radicis chamæleo-  
nis nigri, sulphuris uiui, atramenti sutorij, misyos,  
alcyonij, foliorum sic nigræ syluestris, singulorum  
æquales partes contusas per angustissimū cribrum  
excuto, deinde in mortario conijcto, & aceto  
assuso diligenter terito, atque ubi ad liquidissimū ce-  
ratū spissitudinē fuerint redacta, in pyxidem pluma-  
beam recondito. Vsu autem expetente, loco prius  
cum nitro perfrecto, ad solem liquidius pharmacū  
illinito. Summè etiā ad lepras conduct. Ad leucas  
quantūuis crassæ existant. Ad acres, canchryos, sul-  
phuris uiui, æquales partes: unumquodque per se  
priuatim contundito & cribrato, deinde simul cum  
aceto ad multos dies sufficienter in sole terito, & lo-  
co prius cōfricto nō acuatim illinito, sed dilutus,  
obseruans etiam in principio ne cutis exulceretur.

In pro

In progressu uero temporis parū quid ex ueratro, tantundemq; ex gallis, ad tria prædicta ammisce-  
 Aliud. Olus est in Syria folia habens seridis an-  
 gusto folio prædictæ. Vocatur autem lepidium, &  
 cum lacte conditum, seruatur; cum radice uero eius  
 lanæ tinguntur, & nigrum induunt colorem. Hoc  
 ipsum olus tritum & impositum, cutem liuidā red-  
 dit; & attollit, ut excoctæ similis uideatur. Est autē  
 radix eius alba, crassitudine digitali: ex qua in sole  
 siccata corticem detrahare oportet, & per diem unū  
 in acerrimo aceto macerare, deinde mane probē &  
 cōstanter terere, affusio que aceto sufficiens ad frigi-  
 mentitiam crassitudinem redigere, atque ita reposi-  
 tum adseruare. Vbi uero usus exegerit, locum nitro  
 descriptum paulisper transpirare finito, atq; ita phar-  
 macum ipsum ad calentissimum solem illinito, &  
 quodammodo adfricato, deinde acetum paulatim  
 ad illitum instillat. Quum uero æger uellicationē  
 ac mōsum perceperit, eum ad tolerantiam inhorta-  
 to. Bullæ namque succedent, quas acicula penetratas  
 excoctare oportet. Vbi itaque excoctæ fuerint, si  
 quidem adfectus locus excoctus concolor appa-  
 reat, ipsum ut secundum naturam habentem & resti-  
 tutum finito, si uero non, rursus ad duos & tres dies  
 idem pharmacum illinito, donec omnino perfectē  
 uideris locum ipsum sanatum. Aliquibus uero ex hac  
 curatione bullæ non erumpunt, uerum locus ipse  
 excoctari, hos itaque uelut igne ambusta curare  
 oportet. Aliud. Floris mali puncti drachmas  
 viii, spumæ niri drachm. v, alcyonij drach. iiii, sul-  
 phuris uiui drachm. ii. Vere cum aceto. Est item Sic-  
 cū optimum ad leucas, & inspergiur postquam ex-  
 ciderint crustæ ex acribus pharmacs obortæ. Cete-  
 rum ad cicatricem obducendam, & cicatrices reliquo  
 corpori concolores reddendas, aceto excide, & loco  
 probē præfictio illine. Vbi uero bullæ emerferint,  
 pharmacum ipsum cum melle cataplasmatim modo  
 impone. Efficacius autem fit si pro sulphure, ueratrū  
 nigrum, consiciatur. Smegmatis porro ad leucen  
 itemq; lepram plurimis ex præscriptis illitionibus  
 uti oportet. Præclarissimè autem ad ipsos Sicci ma-  
 gnum facit, quod Indum inferuntur est, quo etiam  
 ad elephantiasim, & omnem cutis scabridem: ad ar-  
 ticularem item morbum, & membrorum resolutio-  
 nes, & ad hydropicos uti conuenit. Salis ammo-  
 niaci, salis communis, salis cappadocii, salis amari,  
 niri assati, farinæ fabacæ, pumidis usti, spumæ niri,  
 singulorum tritentem, ueratrū albi, ueratrū nigri, radi-  
 cis aruthi, radices bryoniæ, cyperorum, aluminis li-  
 quidi, aluminis scissi, floris funi odorati, gummi,  
 iridis, lapidis specularis usti, testarum sepiæ, seminis  
 lini, costi, baccharum lauri, farinæ lupinorū, pulegij,  
 thuris, seminis uiticis, singulorum sextantem, ostreo-  
 rum ustorum, radices dracunculi, fecis uini ustæ, py-  
 retri, radices chamæleonis nigri, sulphuris uiui, sta-  
 phididis syluestris, sinapis, radices pæoniæ, samscui, spi-  
 cæ nardi, comæ marrubij, foeni græci, grani cni-  
 dji, phylli, singulorū unc. i. radices cucumeris syluestris,  
 cimolix, gallarum, singulorum scrupulos xvi.

De lepra Archigenis.

Cap. c. cxxxiii.

Ex crasso ac uiscoso, & magis atræ bilis humore lepra  
 generatur. Differt autem lepra à leuce & alphi uiti-  
 liginis speciebus, in eo quod lepra aspera est ad con-  
 tactum, & prurium locorum inducit. Cutis enim

sola est quæ affecta est, unde & excoctæ cuti, caro  
 subiecta sana reperitur. In leuce uero, ueluti dictum  
 est, subiecta cuti caro tota per profundum transmuta-  
 ta est ad albidiorē colorē, & superficies affecti loci  
 leuissima est, & conficta citius rubescit, præsertim  
 in his qui faciliē curantur. At uero alphas in super-  
 ficie hæret, & uelut squamæ cuti affixus est. Cete-  
 rum à scabie differt lepra, quod in scabie quidē fur-  
 furacea quædam cuti inhærentia apparent. In lepra  
 uero quædam uelut magnorum piscium squamæ.  
 Differt autē lepra ab impetigine syluestri, eo quod  
 impetigo orbiculatus semper ad uicinos locos pro-  
 serpit. Lepra uero non ita eodem modo. Ad le-  
 pram igitur faciunt plurima ex his quæ præscripta  
 sunt ad leucē, peculiariter autē talia. Glutinis, saluig,  
 lacrymæ olæ syluestris, singulorū dra. viii. cordi-  
 cis radices capparidis, gummi, singulorū dra. x. Vte-  
 re cū aceto illinēs præfictis in sole. Aliud. Carda-  
 momi, atramēti futorij, aluminis rotundi, radices cha-  
 mæleonis nigri, niri assati, farinæ lolij, singulorum  
 æquales partes, loco ex nitro præparato, medicamē-  
 tū hoc in sole impone. Aliud. Atramēti futorij dra-  
 chmas duas, sulphuris uiui dra. ii, cardamomi dra.  
 iiii, farinæ lolij, drachmas viii, foliorum fici dra.  
 viii, carnis caricarum pinguium dra. viii. Aceto  
 trita impone, & alternis solue, ac rursus lotis impo-  
 ne. Aliud. Veratrū nigri, sulphuris uiui, radices  
 bryoniæ, niri, bituminis, foliorum fici, mylos, al-  
 cyonij usti, radices chamæleonis nigri, atramēti fu-  
 torij, singulorum æquales partes. Vere cum aceto  
 ad præfictos in sole. Aliud ad lepram experimē-  
 to cognitum, tollit eam per dies quinque. Aeruginis  
 dra. iiii, resinæ pinus liquidæ dra. iiii, thuris  
 recentis dra. ii. Arida cum aceto terito, & adiecta  
 resina liquata, præfictis imposito, & alternis solui-  
 to, & reperies lepram splenio adhærentem. Deinde  
 uero loco per postea detergo ac confictio, ut cruen-  
 tus fiat, rursus impone. At si exulceratio facta fuerit,  
 per muriam & lentulam cum melle depurga. Et  
 postea per ceratū ad ambusta paratū curationē pers-  
 fice. Aliud, ad lepras, ipsas excoctas. Radices cha-  
 mæleonis nigri partem unam, succi thapsiæ partem  
 unam, uentriū cantharidum, sulphuris, æquales sin-  
 gulorū partes picæ liquidæ excide, & loco illine, ubi  
 prius ipsum probē confeceris. Postquam uero bul-  
 læ ac pustule excitatæ fuerint, lentulam cum melle  
 impone. Archigenis ad lepram, Magistriani.

Arietis nigri adipem accipito, & locum ex eo  
 assidue inungito, & in paucis omnino diebus citra  
 exulcerationem, eam tollit. Aliud. Seminis tra-  
 phani drachmas quatuor, fandarachæ drachmas  
 xvi, lupinorum aridorum decorticatorum, sulphu-  
 ris uiui, singulorum drachmas xvi, gallarū ompha-  
 cinarum, ueratrū nigri, gummi, singulorum drach-  
 mas octo. Aceto excide, & præfictio ex fici nigre so-  
 liis loco, illine in sole. Cum eodem item in balneo ci-  
 tra olei ammixtionem siccio, per dies nouem desici-  
 tato. Critonis, ad lepram, ueluti Oribasius tradit.

Farinæ lolij choenice Italicanam unam, carda-  
 momi drachmas iiii, spumæ niri dra. iiii, atramē-  
 ti futorij drachmas octo, radices hastulæ regiæ  
 medias quatuor, terito omnia & misceto. Vsu ue-  
 ro experietur quantū satis uidetur accipito, acetoq;  
 acerrimo coquito, & ubi ad ceratū spissitudinem re-

degeris, crassius illinito, loco tamen prius ex nitro confrieto: superne uero linteolum obligato, idēq; terio quoque die soluto, frigidāq; abluito, ac rursus illinito. Aliud, ut Oribasius tradit, citra exulcerationem perferat. Radicis ruminis syluestris drachmas xxi. gummi drachmas xii. sulphuris uiui drachmas sex, myrrhæ drachmas iiii. gallarum drachmas iiii. Ruminis radices in aceto ad tertias deco-

quito, eisq; tritis reliqua ammisceto, ac simul terito, ad finē uero etiam gummi addito. Vnus autem tempore loco prius ex nitro confrieto, illinito: sequenti uero die lauato ac similiter curato. Vere eo & ad impetigines ac pforas asperas ac scabras. Oribasius, ad leprosos. Succus radicis hastulæ regiae sexuncem, sulphuris uiui drachmas quatuor, manne drachmas decem, nitri drachmas octo, illine cum aceto.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN DECIMO QVARTO SERMONE AETII CONTINENTVR.

**D**e affectionibus sedis. cap. I.  
De inflammationibus sedis. cap. II.

De fissuris sedis, & de tuberculis. cap. III.

De thymis in sede ac reliquo corpore nascentibus, sycosisque, ac uerrucis fornicarijs appellatis, item de clauis. caput IIII.

De hæmorrhoidibus sedis. cap. V.

De hæmorrhoidum chirurgia. cap. VI.

Ad anum aut sedē prociidēte. cap. VII.

De prolabantis sedis perustione. cap. VIII.

De abscessibus sedis. cap. IX.

De ulceribus sedis proserpentibus, ac depascentibus. cap. X.

De fistulis ani. cap. XI.

Ad intertrigines inter fœmora ex itinere obortas. cap. XII.

De thymis in pudendis. cap. XIII.

De rimis in pudendis. cap. XIII.

Medicamenta ad rimas ac reliqua pudendorum ulcera. cap. XV.

Ad inflammationes pudendorum. cap. XVI.

Ad nomas in pudendis. cap. XVII.

Ad carbūculos pudendorum. caput XVIII.

Ad interna in meatu urinae lœra. cap. XIX.

Ad scabiosum ac pruriginosum scrotum. cap. XX.

De testium ac scroti inflammatione. caput XXI.

De herina aquosa. cap. XXII.

De hernia intestinorum. cap. XXIII.

De hernia inguinis. cap. XXIII.

De emplastrorum præparatione ac coctura, & quæ in ea coniunguntur. cap. XXV.

De cruentorum uulnecum curatione. caput XXVI.

De sauciatis neruis. cap. XXVII.

Curatio neruorum denudatorū ac uul-

neratorū in ulceribus. cap. XXVIII.

De neruorum contusione. cap. XXIX.

De glandularum inguinis inflammatio-  
ne. cap. XXX.

De quacuncq; inflammatione. cap. XXXI.

De abscessibus. cap. XXXII.

De cavis ulceribus nō malignis, & ratio curandorū ulcerum. cap. XXXIII.

Medicamenta quæ per linamenta induntur, & ad suppurandum, repurgandum ac incarnandum. cap. XXXIII.

De siccis repurgantibus ac incarnantibus, cephalicis appellatis. cap. XXXV.

De ulceribus in quibus caro superex-  
crescit, & quæ de pressione opus ha-  
bent, & de medicamentis siccanti-  
bus. cap. XXXVI.

De ulceribus non malignis cicatrice in-  
dugentibus. cap. XXXVII.

Sicca ulceribus non malignis cicatrice in-  
ducentia. cap. XXXVIII.

Emplastra quæ non maligna ulcera ci-  
catrice includunt. cap. XXXIX.

De malignis & egrè recipientibus ci-  
catricem ulceribus. cap. XL.

Simplicia medicamenta quæ citra mor-  
daciā rem fessant ulcera maligna. cap. XLI.

De usu relatorum medicamentorum. cap. XLII.

De ligamentis & curationis ratione. cap. XLIII.

De emplastrorum compositione ad ma-  
ligna ulcera. cap. XLIII.

De ulceribus quæ post obductam cica-  
tricem rursus rumpuntur. cap. XLV.

Ad extremum ulcera. cap. XLVI.

Ad callos extremarum partium. caput XLVII.

Ad uermes in ulceribus. cap. XLVIII.

Ad nomas & putredines ulcerum. cap. XLIX.

Sicca crustam inducentia, inter quæ  
etiam pastilli multi usus. cap. L.

De sanguinis eruptione, & quæ crusta

inrunt. cap. LI.

Excedentia & urentia medicamenta. cap. LIII.

De sinibus. cap. LIII.

De sinibus attritam cutem habentibus. cap. LIII.

De fistulis. cap. LV.

De gangræna & sphacelo. cap. LVI.

De canceratis tumoribus. cap. LVII.

De carbunculis. cap. LVIII.

De erysipelate, hoc est, igne sacro. cap. LIX.

De herpete. cap. LX.

Ad epiphytidas, hoc est, pustulas noctu  
erumpentes. cap. LXI.

De termintho. cap. LXII.

De papulis siue pustulis. cap. LXIII.

Ad ambusta ab igne. cap. LXIII.

Ad flagellatos. cap. LXV.

Ad desquamatos. cap. LXVI.

Ad intertrigines. cap. LXVII.

Ad contusa & sugillata. cap. LXVIII.

De ruptione. cap. LXIX.

De uulsionē. cap. LXX.

Ad luxatos articulos. cap. LXXI.

Ad laxos articulos. cap. LXXII.

Ad permiones. cap. LXXIII.

Ad digitorum pterygia, siue redundias. caput LXXIII.

Ad paronychias, id est, unguium ab-  
scissus. cap. LXXV.

Ad contusos ungues. cap. LXXVI.

Ad suberuentos ungues. cap. LXXVII.

Ad motos ungues. cap. LXXVIII.

Ad scabros ac leprosos ungues. caput LXXIX.

Ad reparandos ungues. cap. LXXX.

De anulis digitis impactis. caput LXXXI.

Ad clauos. cap. LXXXII.

Ad plantarum rimas. cap. LXXXIII.

De crurum ac reliquarum partium uul-  
neribus. cap. LXXXIII.

De brachiorum ac crurum dracuncu-  
lis. cap. LXXXV.

# AETII MEDICI GRAE

## CI CONTRACTAE EX VETERIBVS MEDICINAE TETRA-

### BIBLI SIVE QVATERNIONIS

#### QVARTI SERMO SECVNDVS, ET EX ORDINE XIII.

*De sedis, pudendorum ac scroti affectionibus. & de simplicibus medicamentis quae in emplastra coniunguntur. Et de cruentis vulneribus & inflammationibus, abscessibusq; ac ulceribus veteribus.*

De affectionibus sedis, ex Galeno.

Cap. I.



**A**FFECTIONES circa sedē ob multas causas difficulter curantur. Nā & valde tenero sensu praedita pars est: saepe uero dictū est, tales partes facile ab acrioribus ac austerioribus medicamentis tritari. Et ipse superfusus alimentum transitus, tū per se mordax est, tū ob id maxime quod simul cū ipsis pertransit bilis, & aliquando quidā ferosi humores. Et ad haec accedit, quod neque praefinitum est Medicis certū tempus ad medicamenta imponenda: sed aliquando etiam tempore non convenienti, egri ad recrementorum excretionē progrediuntur. Quin & humiditas ac caliditas locorū, siccantibus simulque frigefacientibus opus habens, non parum efficit ut ulcera egre curabilia fiant. Mordente enim adstringentia, locus autē ferre non potest mortuum, quā subtili sensu praeditus existat. Quapropter conueniunt ipsis medicamenta, quae adstringunt citra asperitatem: qualia maxime sunt ex metallicis, ea quae neque acria, neque acerbata ualde sunt. Hec enim lota, citra mordacitatem faciūt id quo opus est. Horum igitur in summa memores, materia experimen- to cognitā consequenter scriptam habete.

De inflammationibus sedis.

Cap. II.

Ad inflammationes anī, siue ex fissuris, siue ex tuberculis, siue ex ulcere fuerint. Palmarum passarum sextā tempus, panis filiginei unciam unam, croci drachm. ii. palmis & micis panis sapa praemaceratas terito ac illinito. Quum autem inflammatio cessauerit, immixto pane, palmulas & crocum auge, donec curetur. Curata uero inflammatione, utere siccis hoc ad ulcus. Cerae & syriaci pares portiones siccas tritas in sperge. Facit hoc etiam ad tubercula condylomata appellata. Medicamentū optimū ad sedē, curat fissuras, & tubercula consumit, & dolorē confestim eximit. Sanat etiam ulcera depascentia, ac maligna, & egre cicatricem accipientia. Deprimat praeminentia, & replet caua. Facit etiam ad tibiarū ulcera, & ea quae dulcia appellantur sanat. Mastiches, cerussae, spumae argenti, succi hyoscyami, singulorū unciam i. olei myrti aut lenicini, quo strigementosum pharmacum fiat. Quod si etiam amplius quid de hyoscyami succo edieceris, prodest. Reponitur in plumbea pyxide. Medicamentum ad sedem, Oribasij. Olei myrti, libram unam, cerussae trientem, thuris sextantem. Cerussam cum oleo myrteo ad mellis compagem coctā, ad thus in mortario tritū affunde, & unis uteres. Phicotche Oribasij emplastrū probatū. Thuris drachmas decem, myrrhē drachmas vii. opij dra-

1111. butyri drach. 1111. aluminis scist drac. i. cadmiae usae ac lotae, pōpholygis, utriusq; drac. vi. ceræ Tyrrenicae drachmas 1111. uitellorum ouorum assatorum, numero quatuor, adipis anserini drac. xvi. rosae faciei drachmas xvi. medullae ceruinæ drac. x111. cerussae drachmas x111. plumbi usi & loti drachmas octo, lapidis haematitae drachmam unam, cespiti drach. 1111. & dimidiā. Arida teruntur cum uino. Ambrosia emplastrum Oribasij. Ceræ, mellis, rosae, spumae argenti, cerussae, adipis caprini, butyri recentis, singulorum quadrantem, thuris unciam unā.

Aliud emplastrum sedis dolorem mitigans ac adimens. Rosae argenti, cerussae, ceræ, singulorum uncia i. rosae sexuncem, croci dra. 1111. medullae ceruinæ dra. 1111. amyli dra. 1111. mellis unc. i. terebinthinae drachmas duas. Aliquando & ouorū assatorū uitellos duos aut tres. Spuma argenti & cerussa lotae siccatae miscentur, deinde teruntur passo cum melioto, croco & amylo. Emplastrum sedis ex cerebellis Andreae. Adipis Anserini curati, ceræ, thuris, medullae cerui, floris rosarum, pompholygis lotae, cadmiae tenerae lotae, plumbi usi loti, singulorum drac. 1111. cerussae drach. viii. cerebellorum gruum drach. ii. opij sesquidrachmam, cespiti drach. v. succi iutybi cochlearium i. rosae sexuncem, praepara & utere uelut dictum est. Ad inflammationem ignis sacri in fede. Emplastri ex fuccis lib. i. panis filiginei lib. i. croci unc. i. opij drachm. 1111. rosae lib. ii. Crocus & opium passo macerantur, panis uero in aqua, & ad ipsa trita affunduntur liquida. Facit etiam ad podagras, in calida Intemperie ac fluxione biliosa. Ad eminentias protuberantes. De ruminicis agrestis radice humida adhuc cortice detrahe, & ipsam radicem parum cōsumam ut ex proprio succo madescat, statim eminentia ipsi affrica post factam alui exonerationem, nimirum ubi aqua ablueris, & linteo deterleris humiditatem. Hoc decremente luna fiat. Aliud optimum ad omnem sedis inflammationem. Malcorij sesquiuunciam, mellis unc. i. foeni graeci cyathos ii. Vini dulcis ueteris heminas quinque. Coquito ad tertias, & abiectis herbis, tertio in uino cerussae lotae sextantem, pompholygis lotae unc. i. thuris trientem, plumbi usi unciam i. Et liquefacito ceræ Tyrrenicae sextantem, olei myrti quadrantē, rosae quadrantē, butyri recentis infusū sextantē, cespiti uncia i. medullae ceruinæ uncia unā, adipis anserini trientem: haec liquefacta, frigefacta ac erasa, ad trita adducto, & iutybi succum paulatim addittillato, & probe unctis utitor. Aliud Andromachi, quo utor inquit, Rosarum utridum, drachmas vii. capium papaueris drachmas 1111.



oua cruda integra duo, butyri recentis, œsypii, mali corij leuissimè triti, singul. drach. xvi. mellis dodrā tē, rosacei aut myrtici sexuncē, ceræ bestem. Aliud, quo uxor ait. Cerusæ drac. v. spumæ argenti lotæ drach. v. thuris drach. vi. aluminis drach. iiii. croci obolos tres, uini & rosacei quantum satis est.

*Defissuris sedis & de tuberculis.* Cap. iiii.

Tuberculum quod condyloma appellatur, in sede sit, ruga aliqua corporum in ano repulcratorum insurgente, ac præter naturam intumescente. Quum enim sinuosus sit anus, rugas coagmētatas habet. Vbi uero amplius intumuerit ruga, tunc sanè sit condyloma. Et aliquando quidem extra inflammationem sit, & molle est. Quandoque uero cum inflammatio ne, & durum est ac dolorosum. At uero fissuræ ac rimæ in sede sunt, quandoque in adstrictiori parte, siue musculo adstringente, quandoque uero in ano. Et aliquando ex influentium acrimonia consistunt. Aliquando autem propter condylomatum inflammationem ac distensionem, partes circumsitæ ruptam sustinent. Curationes autem primum quidem sunt per medicamenta. Dilata uero curatione, dum & indurantur & callosæ sunt affectiones, chirurgiā adhibere oportet, ita ut in condylomatis quidem æger cōmodo loctetur, & ipsum condyloma uolsella distentum funditus excidatur. In fissuris autem, ut callosa rimæ labia deradantur, quo supina ac recens ulceratio fiat ad facilem curationem. Post chirurgiā consequens curatio primum est suppuratoria, deinde repurgatoria, postea ad cicatricē perducens. Quæ uero in principio adhibetur ipsi auxiliā, talia sunt.

Ad condylomata pharmacum, quod contrahit ac consumit ipsa. Misy astatum terebinthina liquida excipit, ut emplastri compagem habeat, & adhibito prius per aquam fomento impone. Vtere uelut ad mirando. Aliud. Testas ouorum uistas ac tritas lauat, & siccitas inpergit. Aliud Lucij. Ad inflammationes sedis, & rimas, ac condylomata. Facit etiam ad rimas pudendorum inflammationes. Cerusæ quincuncem, spumæ argenti lotæ sextantem, & uncie dimidium, recrementi plumbi loti, aluminis scissi, thuris, singulorum sextantem. Hæc cum ui no albo ueteri trita, ad ceratum myrteum ac rosaceū ammisceto ac uitior. Facit ad sordida ulcera sedis, maximè uero circa coronam glandis & præputium consistentia, quæ neq; linamentis repurgantur, & à medicamentis ad depascētia ulcera destīnatis exacerbantur. In summa uero perfusiones in condylomatīs adstringentes esse oportet, & medicamenta ipsorum adstrictione quadam participare debent.

Aliud ad rimas in sede inflammationes, & ad condylomata. Cadmiæ teneræ ter usæ ac lotæ, cerusæ lotæ, spumæ argenti lotæ, singulorum sextantem, ceræ quadrantem, ouorum duorū assatorum uitellos, sapæ cyathi i, rosacei cyathi i. Vtere. Est ualde com modissimè ad antiquata. Ad rimas inflammationes, morsusq; ac seruoies, quo ego semper usus, nullo alio opus habui. Collyria atheris aut thuris, aut aliquod consimile, succo hyoscyami & sapa diluito, & rosaceo sufficienti addito, quo strigmentosum pharmacum fiat, ex hoc uano assidue illinere iubeto. Et primum quidem dolores sedat. Celerrimè uero etiā ulcera sanat. Potes & species collyrii accipere, & cū hyoscyami succo terere, ac pastillos efformare. Et

us tempore cum sapa ac rosaceo diluere. Aliud Andromachi, quo uxor, inquit, ad rimas sedis, & cō dylomata inflammationes. Lapidis hæmatitæ, ammoniaci thymamatis, thuris, aluminis rotundi, singulo rum drach. xii. In alio exemplari, sextantem, gallarum, croci, singulorum drach. i. terebinthinæ drach. iiii. ceræ tyrrhenicæ drachm. x. ii. rosacei drach. x. Vtere ad flem quidem cum rosaceo, ad uterum uero cum unguento Salca appellato. Aliud ad cōdylomata & rimas, quo melius non est. Aluminis scissi drach. iiii. croci drach. iiii. cerusæ drach. ii. opobalsami drachm. i. thuris drach. iiii. aloës drach. i. œsypii drachm. viii. ceræ drachm. viii. liquabilla liquefacto, & ad arida trita affundito, ac unitis uitior.

Ad rimas in ano ac pudendis. Resinam pinus siccam cum rosaceo terito, donec strigmentosa fiat, & oui assati utellū ammisceto ac illinito. Ad rimas sedis, inflammationesq; ac condylomata, pulvis siccus mitigans ac eximens dolorem. Rhoidarij, Syriaci, cerusæ, spumæ argenti, æquales portiones siccās insperge. Aliud. Foliorum hederæ siccorum cine rem cum uino & rosaceo in pila plumbea tere, ac utere. Aliud. Cineris rasuræ sinterum usæ, & amyli, æquales partes tere, & foliorum oleæ uiri dium succum misce, ac illine. Aliud Maig siue obstericis ad fissuras & condylomata. Gallæ dra. viii. plumbaginis drac. viii. myrrhæ drac. iiii. cerusæ drach. iiii. tritis utere. Prodest ad omnia. Pastillus Aretæ Andromachi, pharmacum accommodatum ad rimas & condylomata, in maximis doloribus, citò liberat. Stibij, acaciæ, plumbi uisti & loti, singulorum drachmas xvi. cineris siue spodij pompholygis lotæ, drachm. viii. Fructus ericæ, aluminis scissi, thuris, atramenti futuri, myrrhæ, opij, singulorum drachmas viii. Vino terito uelut collyrium, & excipe ac forma in pastillos, quos usus tempore passo diluito. Pastillus ad sedem & omnia ani ulcera, rimas ac condylomata. Pompholygis lotæ, terræ samie, amyli, terræ lemnie, aloës usæ & lotæ, thuris, sandicis, plumbi uisti & loti, radicis symphyti, cætauræ, singulorum sextantem, croci, squamæ æris, opij, tragacanthæ, singulorum sesquidiam. Excipe uino, & utere ut uoles. Pastillus ex solano halicacabo, uelut Hieras prodit, qui ad rimas parari solet in sede ac pudendo, & ad ulcera, condylomata, ad uerrucas, thymos ac fornicarias appellatas, & ad omnem eminentiam. Facit & ad pustulas nocturnas, papulas, reduuitas circa ungues & ignem sacrū. Et ad aures purulentas, & laborum ac plantarum fissuras. Spumæ argenti drachmas xiiii. cerusæ drachmas duodecim, corticis radicis halicacabi scici drachmas viii. atramenti futuri drachmas quatuor. Terito uelut collyrium cum aqua, & forma pastillos ac utere, ad ualde inflammationes cum lacte muliebri, ad ea quæ cicatrice opus habent cum uino. An dromachi uenit hūc pastillum sic præparat. Ce rusæ libram unā, spumæ argenti, corticis halicacabi, atramenti futuri, rubricæ sinopidis, singulorum sextantem in alio exemplari sexuncē terito cum aceto, ac formato pastillos. Medicamentum cicatricē inducēs ulceribus in sede. Cadmiæ usæ & uino extinctæ sextantem, cerusæ lotæ unc. i. plumbi uisti ac loti unc. i. ceræ unc. i. olei myrtici lib. i. Sica cum uino terito ad dies sufficientes, & ceratum liquefactum ac resit

ac refrigeratum adijcto ac utitor unitis. Aliud sic cum, ad rimas præputij ac sedis, inducit cicatricem.

Cadmia, cerusæ, thuris, æquales partes. Facti & ad alia ulcera mirabiliter. Aliud cicatricem inducens. Cadmia ter ustæ ac lotæ, plumbi usti ac loli, diphyrgis, singulorū unc. i. Vino trita excipe cerato habere ceræ quincuncem, terebinthinæ drach. x. olei myrtæ quincuncem. Et unita ac in massam coacta seruat. Vfus uero tempore, de pharmaco fixantem, ceræ trientem, olei myrtæ quantum satis est accipe. Aliud siccum rimas ac ulcera ad cicatricem perducens. Seminis spinæ Aegyptiæ sextantem, mastiches unc. i. Singula seorsim trita miscentur, & post sedatas in inflammationes insperfa cicatricem inducunt. Aliud. Lapidis phrygiæ ter usti ac uino extincti, cadmiæ ustæ lotæ, cerusæ lotæ, aloës, thuris, singulorum drachm. iiii. squamæ æris lotæ drach. ii. diphyrgis drachm. ii. diligenter ter ac utere. Aliud. Fructus ericæ, gallarum, thuris, acaciæ, pares portiones ficas insperge.

De thymis in sede ac reliquo corpore nascētibz, sy-cosiq; ac uerrucis formicarijs, itēq; clauis. Cap. iiii.

Thymi appellationis originatio transumpta est à cæminibus eiusdem nominis herbæ in montibus nascētis. Thymi enim in corpore tuberculosa sunt eminentia, asperæ, subrubræ, oblongæ, præter naturam autææ, sanguinem effundentes dum auferuntur amplius quam pro apparente magnitudine. Abundat autem hæc affectio circa sedem & pudenda ac media femora. Quandoq; etiam in facie consistit. Et quidam sanè parui sunt, & uocantur thymi; aliqui uero magnitudine excedunt, & appellatur ficus; & aliqui mansueti sunt, aliqui uero maligni. Mansueti igitur thymi, carunculae sunt parue quidem, uerum inæquales, obscuris eminentijs exasperatæ, albicans co-loris, aut subrubræ, & doloris expertes. Maligni uero thymi, duriores sunt & asperiores ac maiores, feculentis, ac liuidi coloris, dolorosiq; ac puncturatum dolorem inducentes, & exacerbantur maximè ad manuum contactum & medicamentorum adhibitionem. Sunt autem omnes mansueti facile curabiles, maligni uero incurabiles. Curantur autem alia quando hi, non locali exsectione, sed cum ablatione totius partis in quo sunt. Ad thymos. Salutem herbam siccam tussam cum pinguibus caricis præbe edendam, & disparescent. Verum in pecoribus oradeum rori exponito, & eandem herbam inspergito, & edere finito, ac miraberis. Ad eminentias, So-leas ueteramentarias humiditas urito ac terito, & uis-non præimbutas imponito. Aliud. Serpētis exu-lium tritū carne caricarū reiectis granis excipito, & emplastri modo imponito. Si uero intra sedem fuerint, glādulam inde factio, subdito, ac miraberis.

Aliud. Caninum stercus album ustum ac tritum & uino madafactum imponito. Cæterum uerrucæ acrochordon Græcis dicta, tuberculosa est eminentia. Nomen uero inde habet, quod similis est uertice suo reflectæ chordæ iuxta extremitatem. At uerruca formicaria, tuberculosa ac callosa est eminentia, nigri-eantis coloris fundamentum latum habens, & ad cutem resedens, ad contactum dolorem exhibens eiusmodi, qualis à morsu formicæ animalis contingit. Vnde etiam nomen habet. Verum in ablatione sanguinē fundit, non pro apparentis magnitudinis ra-

tione. Clauus autem callosa est eminentia, capiti clauis alsimilis, frequens autem est circa manuum extremitates, & circa calcaneum. Appellatur porrò etiam in facie orientes magnas eminentias, ficas; à magnitudine imposta appellatione. Proinde conandum est ut per pharmaca tum mansuetos, tum malignos thymos curemus, ita ut mansuetis quidem, ea quæ consumere ac contrahere possunt adhibeamus. Malignis autem, ea quæ ad cancerata ulcera describuntur, præsertim in mammis ac uero. At ubi ulcera fuerint pharmaca & curatio protrahatur, Thymos quidem qui sunt in musculo ani adstrictorio, uosella atractos radicibus excindere oportet, & siccum medicamentum sanguinem sistens inspergere, quale est quod flauum appellatur. Et post chirurgiam, pharmaca resiccantia adhibere, donec perfectè curentur. Nam unctio curatio affectionem refricat. Si uero in partibus magis expositis fuerint thymi, post exsectionem quum magni fuerint ac multi, uisione adhibere expedit ac sanguinē sistendum, & regenerationē in posterum prohibendam. Adhibita igitur uisione, curatio decernatur communis ad perusta, primum uide licet ea quæ crustas amouere potest, deinde repurgatoria, postea resicatoria. Crustas autem remouere possunt in talibus, lac & mel per linamenta adhibita. Quod si scalpello solum excisi fuerint thymi, post excisionem siccum sanguinem sistens adhibeat, & reliquus curationis ductus resiccans, uelut dictū est.

Pharmaca consumentia ac resiccantia thymos, & uerrucas formicarias atq; acrochordones. Medica-menta quæ consumunt ac resiccant thymos, sunt ea quæ cōmuniter curant etiam reliquas uerrucas: Quale est hoc quod facit ad thymos in sede ac pudendo, aut in alio corporis loco obortos. Aluminis scissi, aramenti futuri, usti, glutinis, singulorum unc. i. squamæ æris sextantē. Trita glutine excipito cū aceto prædissoluto, illinito. Ad thymos in sede, & dura non inflammata condylomata, & ficas. Squamæ æris drach. i. sandarachæ drach. i. auripigmenti drach. i. aluminis scissi drach. ii. Terto per se singula & cum rosaceo, & ad strigumentiam crassitudinem redacta largè illinito, & rasura lintoli imposito, atq; bis singulis diebus curato. At uero in alijs corporis partibus aceto diluta illinito. Mirabiliter autē contrahit ac deprimit thymos in sede ac condylomata, & inflammata lenit, pastillus superiore capite descriptus. Areæ appellatur. Heradidæ Tarēni ad uerrucas formicarias inueteratas. Sulphuris uiui, sandarachæ, aramenti futuri, singulorum æquales partes, terito cū aceto, & pastillos formato. Et usus tempore aceto dilutus illine. Nos autem appouimus his etiam elaterium pari portione, & ad formicarias atq; acutas uerrucas mirabiliter profuit. Verum in formicarijs primum scalpello circumscilpe re oportet, atque sic pharmacum illinere. Oribasij ad formicarias uerrucas & acrochordones. Chalcitidis drac. vi. sandarachæ drach. iiii. cadmiæ dra. x. cum aceto assidue illine, donec exciderint. Aliud melinum siccum, geminæ mixturæ, heliocæis, hoc est, sole ustum appellatur: caldis uisæ partes duas, auripigmenti partem unam. Auripigmentum aqua prius terito, & calcem adijcto, & in uase aqua repleto siccati finito. Hoc ubi tercio feceris, in uas fictile procul ab omni humiditate deponito. Facit ad uerrucas

rucas fornicarias & infiar chordæ apicis acutas, pterygia, callos, nomas, & epulidas. Aliud. Auripigmentū drachmas viii, sandarachæ drachmas sex, elaterij drachm. viii, sulphuris uiui drachmas vi, radidis chamæleonis nigri drachmas iiii. Aceto diluta cogito in pastillos, & utere cū aceto. Verū in fornicaria verruca basim prius circūscalpe, uelut dictū est. Aliud pharmacum accomodatum. Hoc uisus sanauit thymos malignos. Blaterij drachm. viii, auripigmenti tantundem, sulphuris uiui drach. vi, glutinis piscium drachm. iiii. trita excipe glutino aceto prædissoluto. Et utere in alijs quidem locis cū aceto dissolutis, ad sedem uero cum rosaceo. Quomodo uero gluten piscium dissoluere oporteat, dictum est in capite. De sanguinem spuentibus, in pastillo qui gluten piscium recipit, Sermone octauo. Ad Thymos ualde malignos, post excisionem & unctionem exorientes, uerrucas item fornicarias, & infiar apicis chordæ acutas. Pastillus Passionis. Squamæ aris drachmas xlii, aris uiti drachmas viii, salis ammoniaci drachmas viii, aluminis rotundi drach. viii, thuris drach. xvi. Omnia terito excepto thure, ad multos dies aceto affuso in sole. Deinde sunt adijce, acursus probe tere, & pastillos efforma, eosq; assidue cū aceto illine, donec penitus exciderint. Ad eos uerò qui in sede sunt, um passo diluito. Cæterum ficus ablatos, & thymos ac condylomata curat, & rursus generari non sinit, & iam extantes præclare tollit, cinis lignorum uitis cum aceto illitus, & cinis ex uinaceis uitis, cum aceto.

## De hæmorrhoidibus sedis.

Cap. v.

Hæmorrhoids appellatōis originatōnem habet a sanguinis fluxu. Est autem uelut dilatato localis in sede facta, uasis quibsdam usitæ apertis, & progressu temporis callosioribus factis. Hæmorrhoidum uero alia sunt cæcæ, alia apertæ. Cæcæ sunt quæ omni tempore inflatæ sunt, & nihil excurrunt. Apertæ uerò sunt, quæ per tempora sanguinem effundunt. Hæc affectio malorum plurimorū causa hominibus existit. Nam & deformitatem, & miseram uitam hæmorrhoides inducunt. Multos uero etiam uita priuauit. Et deformatæ quidem, propter coloris totius corporis uiciatōnem, ex euacuatiōne succedentem. Miseram uero uitam, propter corporis debilitatem. Quandoq; autem & de uita periclitantur sic affecti, quum ob exceedentem euacuatiōnem perfrigeratum hepar, aquā inter cutē operatur. Conuenit igitur recta diætā ac uenæ sectiōne præmissa, hæmorrhoidū extirpatōnem moliri, & nullam penitus relinquere, quemadmodum quibsdam uisum fuit: possibilet est enim incolumes euadere, optimūq; curatiōnis finis assequi, post hæmorrhoidum extirpatōnē, eos qui oportuno tempore uenæ sectiōne & conuenienti diætā semper utantur, quemadmodū Hippocrati placet. Inquit enim: Hæmorrhoidas sanati in ueteratas, si non adseruetur, periculum est hydropē aut tabem succedere. Non enim uelut quidam opinantur, dixit, si nō una fuerit seruata hæmorrhoids ad sanguinis excretiōnē: Sed dixit, si non adseruetur, hoc est, si nō conuenienti diætā utatur. Quod autē sic uelit Hippocrates, ipsa aphorismi distinctio ostēdit. At enim hic uir, Hæmorrhoidas in ueteratas sananti. Est autem Sanatio perfectā liberatio, & legitima curatiō. Quare iuxta Hippocratem non oportet aliquā

hæmorrhoidem relinquere, sed omnes excidere, & post perfectam ipsarum curatiōnem, per conuenientem, uelut dictum est, diætā, ad naturalem statum corpus curatum reducere, incidereq; cubiri uenam tempore oportuno, quo uidelicet coaceruatus in corpore sanguis euacuetur.

## De Hæmorrhoidum chirurgia.

Cap. vi.

Aggrū itaq; præparare oportet per modici cibi usum, & aquę potū, & ut plurimum etiam per clysteris in usum, tum prolestandi stercoreis gratia, tum ut fe-des irritata promptior ad euersionem fiat. Deinde adhibeatur Chirurgia, quemadmodum in tractatu De chirurgia ostensum est, ita ut singulæ hæmorrhoides undno discedant, & basis prius circūscalpatur, & per uncinū obtorqueantur. Deinde paruo interstitio factio obligentur, & recedant. ipsa enim obortio adstrictiōni correspondens, uasa contrahit ut cōstant, quo post excisionem sedes minus sanguinis effundat. Quapropter oportet unamquamq; hæmorrhoidem hamulo distendere, deinde fundamentum circūscalpere, postea per hamulū obtorquere, & porrigere hamum tenendum ministro. Postea uero etiam in alijs idem faciendum est. Postquam uero omnes hamulis distendimus, circūscalpamur sinu culis obligabimus, & ministro tenendas dabimus. Et tūc primum distentam primam excidimus, & reliquas consequenter ex ordine tollimus. Post excisionem uero, siccum sanguinem sistens apponimus, & spongiam lino obligatam adhibemus, & si li principium foris relinquimus. Postea decernimus consequentem curatiōnem, per linamentorum immisiōnem, spongiarum appositionem, obligatiōnem sedis conuenientem. Curatio uero postea cōmunis est. Securius itaq; & compendiarie curatio hæmorrhoidum est ipsa chirurgia. Quandoquidem uerò quidam melius esse putant assidue purgari per hæmorrhoidas, uelut mulieres. Quidā uero ob timiditatem, per medicamenta potius aliquas ex his aut omnes tolli cupiunt: cōsequenter subtingemus auxilia ad has conuenientia. Extractoria hæmorrhoidū.

Quandoquidem pleræq; hæmorrhoides opus habent extractiōne, ad facilitorem medicamentorum impositionem, necessarium est & talia pharmaca describere. Cyclamini succus illitus, & hæmorrhoidas irritat, & non sinit ipsas contrahi in chirurgia, & sedem extrahit ac euertit. Magni pharmacū accommodatū, ad hæmorrhoidas extrahendas. Piperis ac nitri utriusq; pares partes terito, & sedi adhibeto. Aliud. Succum cyclamini cum pari mellis mēsurā ad cōpagē mellis coquito. Probē facit. Aliud. Hoc uiu prolabentes hæmorrhoidas extrahit. Succū centaurij drach. ii, aluminis liquidū drachm. ii, mysos drach. i, staphidis agrestis drach. i. Excipe melle & illine sedem. Aut lanam pharmaco imbutam in sedem inde. Quum autem promptitudinem induxerit, & sedes prolapsa fuerit, & hæmorrhoides apparuerint, imposito ea quæ ad hæmorrhoidum curatiōnem describuntur. Quæ aperiant hæmorrhoidas. Aperitū autē has, in his quibus sanguinē per ipsas excerni uolumus, amaracnū unguentū illitū, perdicij herbae folia uiridia assidue affricta, mercurialis trita & uelut glans immissa, sel bubulū per lanæ tomentū inditū. Sifticia sanguinis hæmorrhoidum fluxum, Sanguinem qui ex hæmorrhoidibus

nihilum

nimum euacuatur, sistunt aloë imposita, squama ferri, plumbum usum cum posca. Aliud, sanguinem sistens confestim. Acaciæ fuluæ drach. iiii. plū baginis drach. iiii. tragacanthi drachm. ii. Singula seorsim terito, & misceto, & aqua subacta crassius imposito. Si uero penitiores fuerint, in massam coacta indito. Aliud delens hæmorrhoidas & omnē sanguinis eruptionem. Mororum crudissimorum siccorum sesquiuicem, chalcitidis sesquiuicem, lapidis molaris trientem, pennarū corui scrupulos xxi. Externitates pennarum torreto ac terito, deinde omnia uino subacta ad frigiditatem spissitudinē redigito. Et in hæmorrhoidibus quidem indito. In extrinsecis uero sanguinis eruptionibus illinito, ac obligato. Asclepiadæ prolutio hæmorrhoidum. Spinæ Aegyptiæ quincuncem, foliorum salicis, artemisiæ, sideritis herbæ, singulorum trientem, in quatuor aquæ sextariis coquito ad dimidias, & herbas quidem abijcto, ad aquam uero decocti siccum hoc ammisceto. Melantheriæ ad clauis drach. x. aluminis rotundi drach. viii. spumæ argenti dra. iiii. gal-larum dra. iiii. misyos dra. ii. foreos dra. ii. Siccum in decocto diluito, & cum eo septies in die perfundito, atq; hoc per tridui factio. Si uero reliquæ quædam hæmorrhoidum resisterint, eas quarta die ac cōpungito. Et si quidem senserint, aut cruentatæ fuerint, decoctum illud similiter prodest, de sicco uero dimidium partē misce. Proolutione uero facta, ipsum siccum pharmacū adhibe, ut exacte urantur, propter inflammationē aut forinsecus panem impone. Hoc dicto urit. Ex cataplasmate uero intra septimū diē excidunt crustæ. Mirabiliter quoq; hæmorrhoidas hoc tollit. Cicutæ siccæ dra. ii. succi hyoscyami dra. iiii. aluminis dra. ii. gris usti dra. ii. rubricæ dra. i. cerato rosaceo excipe & impone, faciūt & mali punici ad di cortices sicci cū aceto impositi. Si uero penitiores fuerint, uelut glādē supposititi indito. Aliud ual de præclarum. Sandarachæ dra. viii. auripigmenti dra. viii. cum lixiuo diluta impone. ægro antea probe collocato. Mortificatur enim hæmorrhoids, & decidit in semihora rescicata, & a fundamento deo luta. Verum circū hæmorrhoidas ceratum illinitur, & fit hoc in sole, aut apud ignem. Debet enim homo in eodem situ permanere, donec pharmacum ablueretur. Aliud, ad hæmorrhoidas, quod sedat etiam in inflammatione ani. Et illæ mortificatæ rescantur uelut uia passæ, & decidunt in septē diebus citra exulcerationem. Cæterum ad condylomatata ac fistulas conferat eaq; curat hoc, secis uini siccæ uisæ quadrantem, misyos sextantem, aut pro misy, foreos sextantem. Vtere uelut optimo, sex autē occultitur in prunas, & uritur, donec albefcat. Aliud. Stercus asini siccum accipito, & ex eo ollulam paruam impleto, & mannæ thuris dra. viii. & tithymalli sicci manipulum unū addito, & accenso stercore bubulo, ad carbonū speciem exurito, eaq; trita imposito, donec excidant. Septima enim die citra inflammationem mortificatæ decidunt. Aliud mirabiliter excindens hæmorrhoidas. Chalcitidis uisæ, misyos usti, aramenti sutorij usti, diphrygis, foreos, singulorū drachmas iiii. squamæ aris uisæ drachmas duas. Vtere ipso sicco, & instar testæ induratæ excident. Est hoc præclarū, & omnem carnis eminentiam cōtrahit. Aliud Hippocratis ad hæmorrhoidas ad-

mirandum. Gallarum sextantem, myrrhæ sextantē, aluminis scisti quadrantem, melantheriæ quadrantē, Contundito, cribrato, terito, ac utere sicco. Ego uero in penuria melantheriæ, fori adieci, & fecit mirabiliter. Nam intra paucos dies citra mordacitatem ac ulcerationem, hæmorrhoidas dissipat. Verum uino præluere oportet, atq; sic inspergere.

Ad anum aut sedem procidentem.

Cap. vii.

Nos per mariam, aut marinam aquam, prius anū fore soleum prolapsum, & sæpe nullo alio auxilio opus habuimus. Aliquādo uero salem tritum inspergimus, ægro commode ad hoc collocato, & sufficiens tempus expectamus, donec destillantates humiditates extrā processerint. Deinde abluta prolapsa recti intestini parte, illidionibus adstringentibus utimur, nimirum acaciæ, aut hypocythide cum uino. Deinde anum retrudimus, & sequenti die infestationem paramus, aut insufum adstrictoriæ uim habens, quale est uinum nigrum austerum, in quo decocta est myrtus, aut oleæ folia, aut malicorium. Cæterum in pueris adstringentiū usum remittere oportet, & mitiora adhibere. Si uero res urgeat, etiam lumbis adstringentia imponemus cataplasmata ex palmulis ac malis cotoneis & similibus. Item sedi similia adhibebimus. Victus autem sit boni succi, & lactis potus decernatur. Et pulvis ex lacte parētur, qualis est oryza cum lacte cocta, & similia. Vinum detur aquosius, pharmaca uero huic affectioni commoda sunt eiusmodi. Gallam coquito, & cum leuigata anum integito, & siquidē fortior auxilio opus habes, in uino cocturam factio, sin lentiore, in aqua. Aliud. Cortidis pinus drach. viii. pilularum cupressi, drach. ii. plumbaginis drach. ii. prælauato cum uino adstringentē & acerbo, & sicca trita inspergito. Aliud. Recremēti plumbi drach. viii. thuris drach. ii. præluæ, & trita insperge. Aliud. Balaustiorum drach. i. malicorij drach. ii. feminis hyoscyami drach. viii. cerusæ drachm. viii. myrrhæ drachm. ii. plumbi loti drach. ii. præluæ & insperge. Aliud nostrum ad procidentem anum. Fructus ericæ, gallarum, acaciæ, cerusæ, succi hypocythidis, corticis pini, myrrhæ, thuris, equalēs partes siccas insperge, ubi uino austero se dem prius laueris. Aliud. Lentis uisæ, panis usti, farinae erui, equalēs partes imposito cum aceto & sapia. Aliud. Sedem uino prælauato, & picem aridā tritam inspergito, aut ollulas uistas tritas. Aliud. Cupressi decocto perfundito, & stercus caninū siccū inspergito, picem uero siccā, bitumen, & cyperū suffulto. Aliud. Coriandri semē, & laser, trita cū uino illinito. Et torpedinem uiuā absidue apponito, & cōtrahet. Aliud. Bitumen & gallā equis portionibus tritis siccis sedi inspergito. Valde præclarum hoc est.

De prolapsis sedis perustione Leonide. Cap. viii.

Quum fluxus egre curabilis apparuerit, & dicta nihil profecerint, neq; medicamenta conuulerint, structura mali iā inueterata, ad ussionem peruenire oportet. Quum enim alia intestina inter partes principales connumerentur, externa extremitas intestini recti principalis non est: Sed & dum uritur & secatur, nullum periculum induci, uelut ipsa experientia testatur. Inurere autem conuenit per cauteria nucleosomia externam sedis partem extremam, ex moderatis interuallis. Sufficiens est enim usio ad fluxionem superandam. Cicatrix autem solida succedēs, anum

in ambitu constringit, post unctionem uero, lac cum melle unio, & linamenta ex eo imbuta indito, ac obligato. Postquam uero elapsa fuerint crustæ, lentem cum melle imponito. Repurgatis autem ulceribus, utere emplastro ex ordeo, aut alijs cicatricem inducentibus, supra ad sedis affectiones præscriptis.

De abscessibus sedis, Leonide.

Cap. ix.

Inflammatione prægressa aliquando circa anum abscessus oritur. Quod ubi contingit, plura corporacula putrescunt, propter locorum humiditatem ac largam caliditatem. Unde necessarium est in chirurgiam ablatione uti, & propterea facile in fistulam transire. Proinde in simplicioribus quidem abscessibus facilis est curatio. Verum in magnis affectionibus, ano orbiculatim amputato, plerumque dum cicatrix inducitur, podicis meatus constringitur, & obturatio contingit. Quapropter conducti inter curandum, primis curationis temporibus linamentum parare, id est in tetrapharmaco, aut alio quodam ad curationem commodo, dissoluto inditum in sedem. Tempore uero inducenda cicatrix, canalem stannum rotundum sedis meatui convenientem immittere. Qui foris profundo sit amplius, uerum apposita parte in profundo sita rotundus ac levis, habeatque in medio foramen, per quod status reddi possunt. Illinatur autem canalis ex medicamento cicatricem inducente, aut samia terra cum uino, aut cerula, forinsecus autem splenium aut lana incumbat, & commoda obliatio fiat. At uero canalis ipse usque ad perfectam curationem inditus sinatur.

De ulceribus sedis proserpentibus, ac depascentibus.

Cap. x.

Fiunt aliquando in sede ulcera proserpentia & depascentia. Si quidem igitur nome depasces in adstrictorio musculo fiat, conari oportet ut per sedulam medicationem ad nomas pertinentem affectio curetur. Nam interiores ani partes, ipse inquam adstrictorius musculus, neruosus quum sit, neque unctionem neque sectionem sustinet: exciso enim musculo illo, conuulsio sequitur, & nimirum etiam caruncula imminuitur ac decremetum: Id quod inde nobis cognoscere datur, quod sæpe etiam non adhibita chirurgia, ab ipso depascente ulcere musculus ille consumitur, & carunculae decrementum, Rheoada Græci uocant, consequitur. Utendum igitur est auxilijs ad nomas descriptis, ita ut myrretorum ac malicorij & rubi decocto, ac similibus, assidue irrigemus, & primum quidem corporibus à natura alienis crustam inuramus, per fastidium appellatum pastillum aut consimiles. Deinde utamur eo qui ex uista charta constat, postea istudem emplastrum cum multo rosaceo dissolutum per linamenta indamus, & sic reliqua deinceps consequentia faciamus. Cæterum phagedænicò ulcere proserpente exedente in ano existente, audere aliquid oportet, & aliena à sanis excindere. Deinde unctione adhibere. Quum enim carnosus sit podex, tales chirurgias facile sustinet, post chirurgiam autem, consequenter curatio, uelut aliorum ulcerum facienda. Si uero usio adhibita fuerit, curare conuenit, uelut in prolabente sede prædictum est.

De fistulis ani, Leonide.

Cap. xi.

Quandoquidem ex mala ulcerum curatione, & præcipue circa sedem, sæpe fistula succedit, consequenter etiam de his dicendum est. Proinde ægro in sella, aut

alio quodam plano loco collocato, artifex à dextris magis ipsius ægri desidens chirurgiam perficiat. Cò uenit autem specillum accipere, & caput eius in medium fistulæ immittere, ipsumque propellere, quousque per inanem meatum progredieret. Deinde medium sinistræ manus digitum in sedem immittens, per ipsum specilli caput arripas, postea reflectens specillum, & ambas fistulæ extremitates inter se ad equatas sinistræ manu distendat, atque sic omnia corporacula callosa per ambitum excindat, unico contentu, si id fieri potest. Si uero post sectionem apparuerit callus adhuc insidens circumscalpatur. Manifestus autem est callus, quum sit subalbidus ac renites. Si uero etiam rugæ propinquæ apparuerint, uolles la extenatæ referuntur ad ulcerum explanationem, & facilem deinceps curationem, post chirurgiam manna thuris sectionem implebimus, & linamentis inditis conuenienter deligabimus. Et consequenter communi aliorum ulcerum curatione utemur. Cætera uero in his qui ob mollescentiam aut timiditatem rogantur, ut per medicamenta curentur, primum conari oportet ut per pharmaca resiccantia ac fistulas claudere curemus. Quæ si nihil effecerint, ad ea quæ callosa corporacula erodere ac consumere possunt, transeundum est, quæ fistularia collyria appellantur: quorum præparationes in uniuersali de fistulis tractatu paulo post in hoc Sermone dicemus. At uero medicamenta quæ fistularum resiccationem promittunt, sunt emplastrum ex spuma argenti & aceto ac oleo paratum, & emplastrum sine cera, & sulum Galeni, & harmonia, & ex salicibus, & ex solio còstans, & consimilia: facit & hoc ad fistulas incipientes in sede, rimasque ac condylomata, præonice radicis usque quadranten, bituminis Iudaici sextantem, sulphuris uului unc. i. ceræ sextantem, olei myrtei quærum satis est. Aliud. Mala cotonea ad cinerem exurito, ac trita superne ad oculum fistulæ imponito, & linamento indito, emplastrum ex uino & oleo, aut simile quoddam adhibeto ac deligato, & alternis diebus soluito. Pastillum ad fistulas sedis. Chalciditis usque drach. viii. æris usque drachm. iiii. cadmiæ drachm. iiii. cretæ terræ drachm. iiii. pompholygis drachm. iiii. Lycij drachm. iiii. aloës drachm. ii. croci drachm. gummi drach. xvi. terito cum succo senecionis, aut rapidis testiculos habentis, & formato pastillis, & utitor siccis, & cum aceto & cum cerato. Utere etiam ad uniuersales fistulas describendis.

Ad intertrigines inter scæmora ex itinere obortas.

Cap. xii.

Chalciditis aqua trita ac illita prodest. Et plumbago cum aceto aut uino. Et spuma argenti per se, & cum myrto sicca trita. Aut alumen in testa usum tritum insperge. Aut sici folia usta ac trita cum oleo illine. Aut rosarum capita unâ cum flore trita insperge. Aliud quo utor ualde efficax, plumbaginis drac. viii. galularum dra. iiii. aluminis drac. i. myrrhæ dra. ii. siccum hoc insperge. Aliquando uero cum oleo myrteo illine. Ego uero uino semper prius lauo, & siccum inspergo. Aliud, facit & ad papulas feruidas in febribus ac sub alis, ex sudoribus obortas, præsertim in corpulentis hominibus. Syrici unc. i. succi tinctorij unc. i. testæ ex clibano antiquo sextantem, prælauato & inspergito, probe quidem facit, uerum lintea inspicit, facit & ad ambusta cum cerato.

De thymis in pudendis, Leonide.

Cap. XIII.

Huius affectionis proprietatem in loco de thymis in se de diximus, sunt autē & hic thymi, aut in sola glande, aut in cole, aut in præputio. Aliquando uero in omnibus relatis locis. Antea uero dictum est, quod malfuci facile curatur. Maligni difficulter, & per affectus partis ablationem sanatur. Quomodo autem cognoscere oporteat & malfucos, & malignos, etiā re latū est. Si quidē igitur malfuci fuerint thymi ac parui, per uiosellā distēti excindantur, & aliquo sanguine sistente ac crustā inducente sillinātur, quale est sic cū flauum appellatum, quo per crustā, simile quidā usioni efficiamus. Quū uero mulf fuerint & magni, tūc post excisionem ustio adhibetur ad sanguinem sistendū, & affectos locos ad aliū statū transmutandos, & thymorū regenerationē prohibendā. Quum autē totum præputiū thymis fuerit reſertū, tū iuxta internā, tū circa externā partē, difficile erit ipsum cōseruare. Itaq; necessariū erit, quātum eius fieri potest, ad cutis præputij sectionem progredi. Quum igitur ustio post excisionem adhibetur, curatio decernatur ad perustā, relata in tractatu de prolabate sede. Excisus autē thymis, & post excisionē siccō crustā iouente adhibito, post crustæ discessum reliqua curatio resiccatoria fiat. Vnduosa enim pharmaca affectionē resiccant. Cæterū in his qui chirurgiam reiiciunt, utendum est talibus medicamentis. Medicamentum resiccans thymos xeraphium appellatū. Chalcididis crudæ sesquiunciā, misyos crudi sesquiunciā, squamæ æris sextantē, aluminis scissi unc. i. Locū cū uino prius lauato, & siccū inſpergito. Aliud. Gallā & alumen trita inſpergito, & exareſcent. Vere etiā si in alio corporis loco thymi sunt. Aliud, egregie tollens thymos & carnē exareſcentem in pudendis. Origanum & rutę radicem, paribus partibus urito, terito ac inſpergito. Vere hoc uelut optimo.

De rimis in pudendis, Leonide.

Cap. XIII.

Rimæ ac fissurę in præputij summitate sunt, quādo angusta ea existens uiolēter reducitur. Ruptis autē corporibus, inflammationes succedūt & dolores intēti. In principijs igitur, omnis rima dū recēs est cruciatur, antequa uero callosa sit, & rursus quū uiolenter dissipatur, rupta rursus cruciatur, proinde ad curam festinare oportet. Vbi uero antiquatæ fuerint, & callosæ factæ curationem disſulerint, nihil proficiēdū medicamentis, cōfert cutem abducere, & callosa rima rum labia, supino scalpro quantum eius fieri potest, superficialia sectione diducere. Resupinata enim & recentes factæ rimæ ac fissuræ, celerrime sanantur.

Medicamenta ad rimas &amp; reliqua pudendorum ulcera.

Cap. xv.

Rimas medicamentis curare conandum est antea, circa chirurgiam, & utendum est plerisq; ad rimas sedis præscriptis, & præsertim eo quod Lucio inscribitur; facit enim & ad rimas in præputio, & ad ulcera for dida, & præcipue quū detrahi ac reduci non potest. Inijciatur autem cum oleo & uino per clysterium. Mirabiliter autem facit ad rimas in præputio & recentes, & inueteratas, urina quæ inter mingendum intra præputium ac glandem obiter suscipitur, & celerrime sanat, ut ne opus quidem sit alio auxilio. Aliud ad rimas præputij. Resinam frictam cum rosaceo terito donec strigmentitiā compagem accipiat, & ammixio oui assati uitello utere. Aliud,

ad rimas & reliqua ulcera. Colocynthidem siccam urito ac terito, & cū rosarum flore utere. Idem facit & anethum ustum. Aliud, ad præputij rimas, & glandis ulcera, repurgat, & cicatricem inducit. Lapidis phrygi ter usti & extincti, primum butyro aut rosaceo, deinde melle, postea uino, sextantem, florum rosarum unc. i, malicorij unc. i. utere. Aliud, ad rimas præputij & ani, & pudendi muliebris. Cerussæ, plumbaginis, gallarum, myrrhæ, æqualibus partibus utere siccis, aut cum uino & oleo. Aliud, rimas & ulcera ad cicatricem perducens, & acrimo nias obtundens. Cadmiæ teneræ ter uisæ sextantiem, rosarum recentium detractis unguibus sexuncem, Cadmiā mundito ac cribrato, & cum rosis terito donec exareſcat, & sicca inſpergito, ubi prælaue ris cum uino. Aliud ad pudenda & sedem, Lapidis phrygi ter usti ac extincti uelut dictum est, cerussæ loræ, cadmiæ, thuris, aloës, singulorum unc. i. squamæ æris drachm. ii, diphyrgis drach. iiii. utere sicco. Aliud siccum, ad pudendorum rimas & ulcera spontanea. Aloës unc. i. florum rosarum sextan tem, utere confidenter. Aliud ad eadem. Aloën so lam tritam inſpergito. Si uero adſtrinxerit, cadmiā ter uisā ammisco. Mirabiliter efficax est. Aliud. Pastillum ex halicacabo lacte dilutum exhibito. Ha betur eius preparatio capite tertio, ubi de fissuris & tuberculis sedis tractatur. Verū in his qui præputiū reducere non possunt, lacte eundem diluito & tepidum per clysterium inijcitur. Aliud, ad spontaneas pustulas in pudendis, & maxime in his qui præputium reducere non possunt. Glaucium cum uino terito, & ubi prælaue ris, per fistulam pus attrahentem, tepidum inijcitur. Aliud lene incarnans & cicatricem inducens. Amylum per se tritum inſpergi to. Aliud. Colophoniam tritam solam inſpergi to. Aliud. Colophoniam, thus, amyllum, paribus portionibus inſpergito. Aliud. Aloës prima riæ, cerussæ, rosarum siccarum, æqualibus partibus tritis utere. Aliud. Collyrium ex thure tritum sic cum inſperge, aut cum uino dilutum per linamenta indito, aut cum lacte inijcitur, facit & quod Aster appellatur, & quod Cleoni inscribitur, & similia. Ori bafij ad præputij ac ani rimas. Inducit cicatricē. Cad miæ loræ, cerussæ, thuris, æqualibus portionibus, ute res, facit & ad alia ulcera mirabiliter.

Ad inflammationes pudendorum.

Cap. xvi.

Inflāmata pudenda rosariū & meliloti decocto perfundito: Aut betæ folia sue fenum tritum, in aqua feru facito, & calido perfundito, facit ad eos qui præpu tium retrahere nō possunt. Cataplasma uero adhibe ex pane cū palmulis sapa præmaceratis, cū modico rosaceo. Aut malicorij in uino cōctū ac tritum cum pane ac modico rosaceo pro cataplasmate impone.

Ad nomas in pudendis.

Cap. xvii.

Si ulcus depaſcens, nomen Græcū uocat, aut erosio fiat, laxa forinsecus apparet pars erodenda. Et si circum præmatur, humorem tenuem subcrenatum excers nit, deinde seculentum. Conuenit itaq; persulfioni bus adstringentibus in his ur̄i ex decocto myrti, ru borum, olæ syluestris, rosarum, malicorij, plantagi nis, polygoni, pharmaca uero ad nomas commoda sunt, pastillus corax, id est cornus inscriptus. Habet autem sic, Gallarum sextantem, squamæ æris sesqui unciam, chalcididis crudæ unc. i. terito unc. i. terito



in aceto ad sufficientes dies, & ad finem mellis quincuncem addito. Et ex olei myrti lib. i. ac semisse, ad pincuncem recentis balle, ceræ triente, terebinthinæ unc. i. ceratum effice, & in linamentis utere, & per fistulâ super attrita toriam inijce, per rosaceum dissolutum. Et superne spōgiam ex uino expressam impone, aut ceratum habens malicorium aut gallas. Aliud ex charta ussa. Chartæ ussæ sesquifundam, squamæ aeris sesquifundam, auripigmētū dra. vi. sulphuris ui ui dra. vi. plumbi ussi dra. iiii. Insperge siccum, aut melle & rosaceo dilutum per linamētū inde. Si uero præputium reducere nō potest, plurimo rosaceo dilutum, & modico melle addito, inijce. Aliud siccū, quod sanauit quosdam iam secandos. Chartæ ussæ sextantem, gallarum sextantem. Vtere siccō.

Ad carbunculos pudendorum.

Cap. xviii.

Spuma argenti dra. iiii. cerusæ dra. ii. thuris dra. i. Trita insperge, & rasuras linteorū impone. Aliud. Adipem caprinum cum uuis pascis tritum impone uelut cataplasma. Hoc suppurat, & dolorem eximit, postea eundem adipem cum pice liquida unitū imposito. Aliud, pilulas stercoris caprini uistas cū melle imposito.

Ad interna in meatu urinae ulcera.

Cap. xix.

Lycij dra. ii. myrrhæ dra. ii. atrametū futuri dra. i. chalcididis dra. i. omnia simul trita cum pasci hemina una, & uini ueteris odorati cyathino uno, coquito do nec uniantur, & reposito in plumbo. Vfus uero tempore rosaceo diluta inijce: facit & ad ulcera inter anum & testes. Ego autem cygnaria colliria cum lacte diluta per clysteriolum inijcio, & bonum testimonium ipsis præbeo.

Ad scabiosum scrotum ex pruriginosum. Cap. xx.

Contingit etiam circa scrotum assidue scabies & pruritus, ex influxu humorum acrimum ulcerantium cūtem. Et ubi quidem plures fuerint & acriorēs alla ti humores, eūtem ipsam exulcerant. Si uero pauciores ac crassiores, squamas generant, & pruritus inducunt. Curatio horum sit per congruam uisum rationem, & per medicamenta. Aliquando & raro per chirurgiam. Itaque ab acrimum elu abstinentium est, & præsertim ab oleribus mali succi. Quæ uero exhibentur bono succo prædita sint. Qualis est lactis potus assiduus, pituitosa, halica, gallinarum oua, porcellorum extremitates & uentriculi. Vinum tenue dilutius & album. Ex localibus auxilijs, præsertim ubi squamæ ulcers adherent, & dolor adest, conuenit cataplasma ex fabæ lomento. nam & dolor mitigat, & ulcera repurgat. Sit autem ex faba Aegyptia lomentum. Idem facit sesamū crudum, & erui farina melle subacta & imposita. Repurgatione uero ulcerū facta, pruritusq; lenito, ad cicatricē inducendā pergemus: probe autē facit in his partibus, misy cum sulphure uiuo tritū, & cerato myrteo exceptū. Conducit & plumbi recrementū, & spuma argenti cū myrteo cerato. Et emplastrum ex cadmiā, & emplastrum ex hordeo. Preglare auxiliatur etiā scroto in superficie tumefacto, terra cimolia cum aqua diluta ac illita, quam illitā exarefcere sines, & aqua tepida loco ablucō, myrrum siccam tritam modica myrrha addita insperges. Inducta uero cicatrice, nullaq; molestia nec pruritu uexante, curatio transacta est. At si scabies sanata, pruritus restat, aut augeatur, aut scrotum humore destillat, Nitrum cū staphide agre-

sti & alumine liquido, rosaceo & aceto dilutum, in balneo illinere iubemus. Et ad balneo oui candidum cum melle imponere. Si uero uehementis & intolēabilis est serotū pruritus, sex aceti siccā cum uino madefacta adhibetur, eodem modo uelut præcedens medicamentum, illitū etiam postea oui albumine. Quod si adhuc amplius uisum eius augere uoles, ussā fecem accipies. Idem præstat alumen cum melle probe coctum, & reliqua quæ ad pruritus restitunt. De testium ac scroti inflammatione, Leonida. Cap. xxi. Quādoq; testes foli per se inflammantur, quādoq; testibus nihil affectis, serotū inflammatum est. Aliquando uero testes unā cum seroto inflammantur. Sicut autem in alijs corporis partibus, ita etiam in his, uel ex humorum influxu, uel ictu, uel collisione inflammationis contingit. Proinde solo testiculo inflammato, serotum colore naturali habet, ipse uero testis tumidior, duriorq; ac amplior tactui occurrit. Adest dolor pulsatus usque ad renes pertingēs. At si serotum inflammatum est, tumor rubicundus in superficie est, renitens ad tactum ac dolens. Vtriusq; uero inflammationis, testibus uidelicet & seroto, ex signorum augmento magnitudinem inflammationis iudicabimus. Proinde cibi parsimonia, & aquæ potu per totū curationis tēpus utendum est. Et si inflammatio uehementis fuerit, præsertim in iuvene sanguine multū habet, uena cubiti secada est, si id fieri potest, si minus, tali. Nā & hanc secare prodest, ubi sanguis non fuerit multus. At pro localibus auxilijs, si testes sunt inflamati, & maxime ubi nerui à quibus pendēt simul affecti fuerint: lanā oleo cōmuni aut anethino imbuta adhibebimus ac deligabimus, probe facit et uerbenaca recta in oleo cocta modico uino additō, & seroto imposita, atq; lana super illigata. Cataplasmatibus uero ad inflammationes soluēdas idoneis utemur. E quorū numero admirandū est, ad testium præsertim inflammationē, Cataplasma ex faba Aegyptia. Decoratur autē faba cocta, & cū modico melle trita illinitur, præstat etiam ad testium ac scroti inflammationes, cataplasma ex puro pane, quo ego assidue utor, quādoq; cum oleo & aqua, quādoq; cum mulsa. Egrege facit etiam id quod ex uuis pascis cū cinimo torrefacto ac trito, modico melle addito paratur, prodest & asphodeli radix cum polenta in uino cocta. Et lini semen in aqua mulsa coctum. Et senecio cum polenta. Et eupresii folia per se, uel cum panis mica. Ceratum ad testium inflammationes efficax. Ceræ, resinæ pinus, olei anethini & narcissini, singulorum dextantem, cumini sex uncem, finit asinini pilas tres, sinum arefactum terito & cribrato, & cinimo ammisceto, deinde cum cerato liquefacto committito ac imposito. Et lanam narcissino aut rosaceo oleo imbutam super illigato. Conferret etiam emplastrum ex succis rosaceo dilutū, duranti uero inflammatione, aqua marina calida affundenda est, & cerata adhibenda inflammationes discutientia: qualia sunt ad mamillas inflammatas descripta. Quod si non soluat inflammationem, sed transmutetur, suppurationem cum cataplasmatibus adiuvare oportet, per se tōq; iam abscessu chirurgia adhibenda est, & cōmuni curatione utendum. Si uero nome depascens accesserit, eadem curatione etiam hic utendum erit, quam superius ad sedis nomas tradidimus. Oribasij ad testium tumores laxos ac in

ac inflammationes. Olei lib. i. alij habent dextatē, plumbaginis, cumini, passularum sine uina acis, farinae fabarum, singulorum trientē, ceræ sextantē, plūbaginem cū oleo ad cōpagem coquito, deinde cerā cū colophonie dra. vi. adijcto & ad perfrigerata passulas ac farinā ammisco, ac utitor. Aliquando tamen farinā ad liquefactā iniicio inquit, postquam serueri ipsorum quieuit. Aliud eiusdem. Vuarū passarū sine uina acis drac. x. x. v. cumini acetabulū i. resine pinus quadratē, mellis quod satis est. Saguinis porro euacuato efficacissimū auxiliū est ad testes inflāmatos, inquit Oribasius. Ceterū ad testitū duritias, cucumeris syluestris radicē terito ac cribrato, & in aqua mulsā coctam cū liliacea farina imposito. Aurilij radicem uino coctā, & modico melle subactā imposito.

De Hernia aquosa, Leonide. Cap. xxi.  
Hernia aquosa quandoq; ex occulta, quandoq; ex manifesta causa contingit: Ex occulta quidem, quum aquosus humor circa partes corporis, quæ scrotum cōtinent ac implicant, sanguini ammixtus collectus fuerit. Ex manifesta uero, quum ex plaga collisis, aut fractis uasis, sanguis affluis ad aquosam substantiam transmutatur. Vbi igitur sponte cōstitit aquosus humor collectus, sublauius aut subpalidus is inuenitur. Vbi uero ex plaga, cruentam ac feculentam materiam reperies. Humor autem uel intra rubicundam testiculī pelliculam consistit, uel extra ipsam, inter eam & pelliculas adiacentes. Vel in propria pellicula uelut uesica quadā continetur, atq; hoc genus herniam in tunica superagnata uocamus. Aliquando uero duplex hernia oboritur, quum collectio & in rubicunda tunica, & in superagnata consistit. Si quidem igitur in pellicula rubicunda humor collectus fuerit, tumor unius coloris apparet sine dolore, in principio dum adhuc parua est collectio, ad cōtactum cedens. Postea uero aucta collectione, testiculū humore undique circumdatus occultatur. At tumor in ambitu extensus ac renitens ad tactum, herniæ carnosæ suspicionem Imperitis exhibet, post sunt tamen tactu discerni, nam hernia carnosā omniō non renititur, sed aquosa digitis cedit. Si uero in superagnata tunica humor colligatur, tumor ipse siue magnus siue paruus fuerit, omnino circumscribitur. At si simul quoq; in rubicunda tunica collectus fuerit, duo tumores depræhenduntur: alter in superagnata, alter in rubicunda pellicula. Quod si extra rubicundam pelliculā collectio fiat, testiculū tactui occurrit. Cæterū ab hernia aquosa differt hernia intestinorum. Quoniam in aquosa tumor eiusdem penitus magnitudinis semper, & in quolibet corporis situ persistit. Neque enim humores, uelut intestina transferuntur. Inguen præterea in hernia aquosa secundum naturam se habet, quia nota uel maxime aquosa, ab omenti hernia distinguitur. Nam in hernia omenti, semper in scroto omentum persistit, neque unquam transferitur, id quod etiam in aquosa contingit. Verum in omenti hernia inguen rarefactum depræheditur. Tutissima itaq; curatio herniarū chirurgica & uestione perficitur, si peritus artifex contingat. Potest tamen etiam medicamento scrotum inuri, & consumpto humore ac cicatrice indurata firmari. Ad hunc usum efficax hoc est. Radicis brasicæ ustæ cinerem, cum adipe suillo inueterato liquefacto ad emplastri formam adigito, & impo-

tum alligato, ægrumq; quiescere finito, & postried soluto medicamento fomentum adhibeto, & rursus apponito, idq; tamdiu repetito, donec uestio perfecta fuerit. Emplastrum autem angustum & oblongum esse oportet, neq; plus quam conuenit locus inuratur. Ita ut in magnis tumoribus quatuor digitorum longitudinem & pollicis latitudinem habeat. In paruis duorum digitorum longitudinem, & auricularis digiti latitudinē exequat. At uero ubi tunica per uestionē detecta est, scalpello eam diuides, excludoq; humore fistulæ collyrium fissuræ indes, quo uicinar partes erodantur. Deinde suppurante medicamento uteris, postea dilapsa crusta, repurgatoria ulcerum per linamenta immittes, postremo ad astrigentia progredieris, quale est emplastrum barbarū appellatum. Poteris etiam pro brasicæ radice, medicamenta erodentia, septicā Græcis appellata, adhibere. De quibus sequenti Sermone ageitur. Post humoris exclusionem, ne rursus collectio fiat, huiusmodi malagmatis uteris. Ceræ sesquilibram, picis dodrantem, ammoniac thymiamatis lib. i. & dodrantē, aluminis liquidi sesquidnam aut sextantem. Aliud Asclepiadæ, ad herniā aquosam accommodatū, quod perfecta erosione, & humoris exclusione adhibuit, per sanat & omnem duriciā resolut, picis adixē lib. iiii. ceræ terebinthinæ, ammoniac thymiamatis, galbani, thuris, singulorum lib. i. acetī sextarios iiii. olei cyprini quantū satis est. Picem etiā cū acetī sesquialtero coquito: Deinde ammoniacū cū modico aceto tritū adijcto, & parū seruere finito, postea cerā iniecto, eaq; liquefacta, galbanum ac thus aceto trita ammiscito, omniāq; unita & ab igne ablata ad residuum acetī in mortarium mittito, & cyprino ad stillato probe subigito, ac utitor. Prædare facit etiā emplastrum ex lolijs, quod Sermone decimo quinto inter Nigra habetur. Sunt etiā medicamenta quæ citra uestionem ac erosionem, humoris disculsionem promittunt. Quale est hoc quod habet. Spumæ argēti drach. vi. salis fossitij, atramenti suorum, singulorū drachm. x. cerusæ drachm. x. terebinthinæ drach. xi. olei libram unam. Spumam argentī, cerusam, sal cum oleo donec non inquinent coquito. Deinde atramentum sutorium cum aceto tritum addito, cauendo ne effluat, atque ubi parum ebullierit terebinthinam addito, & ab igne ablata in mortario subigito, & repositis utitor. Aliud, ad quæcunque sine scalpro curare uolueris. Ceræ, spumæ nitri, rubricæ sinopidis, nitri, singulorum sextantem, terebinthinæ, manne, thuris, mastiches, singulorum drachmas xviii. olei heminā i. aque marinæ siue murisæ sexuncem. Arida cum muria diluito, & liquefacta ammiscito, ac unitis utitor. Aliud. Nasturij drachmas x. x. nitri drachmas x. simi columbini drachmas vi. galbani, terebinthinæ singulorum drachmas x. liquefacta cum aridis committito, ac utitor cōfidenter. Confert & psittacium inscriptum, quod Sermone decimo quinto inter emplastra mollentia ac discutientia habetur. Hoc ego ad hernias aquosas usus sum, & primum tumorem emolliuit & ualde compescuit, ac post paucos dies exudantibus testiculis plurimam aquam extraxit. Aliud ad herniam aquosam, ualde efficax. Carnium uuarum passarū, ammij, terebinthinæ, singulorum drachm. viii. nitri rubri drachm. x. mellis optimi sextantem. Arida

seorsim terito ac cribrato. Inde uuas passas probe cō-  
rulas ammisceto ac unito, deinde mel cum terebinthi-  
na modice coctum addito, & ad emplastri formam  
adigito, & linteo excepta adhibeto, ac lata fasciola  
deligato, ægumq; quiescere iubero, & ad balneo ac  
uehementi motu abstinere. Solues autem hoc alter-  
nis diebus, & spongia locum fovebis, ac rursus im-  
pones. Vtere etiam emplastris discussorijs ac reficā-  
tibus ad hydriopicos suprà descriptis, & præcipue eo  
quod Vestæ nomine inscribitur.

De Herniâ intestinorum, ex eodem. Cap. xxiij.  
Hernia intestinorum est intestini aliquando ad inguē,  
aliquando ad scrotum delapsi, qui multarum mor-  
lestiarum autor est. Nam & deformitatem, & misē-  
rā uitā, & mortis periculum inducit, quando intesti-  
na duris recrementis distenta, ad scrotum delata con-  
densantur. Inde enim tormina uolulosa, ac sepe in-  
flammatōnes succedunt, ex quibus perniciēs consequi-  
tur. Generatur hoc malū aut peritonææ membrana  
alium ac intestina amplectente nimium extenta, aut  
eadem rupta. Si ab extensione fiat, primum quidem  
laxitas ad inguen procumbit, & pili pubis reuulsi  
cōspiciuntur. Verum postea tumore aucto scrotum  
violatur ac intumescit. Si uero rupta fuerit perito-  
nææ membrana, quæ ad inguen pertingit, intestinum  
per rupturam delatum rubicundæ tunicæ innititur,  
& hæc tandem temporis mora oppressa, etiam ipsa  
inferius prolabitur. Quod si plaga adeo uiolenta cō-  
tigerit, ut simul & peritonææ membrana, & rubicū-  
da tunica rumpantur, tunc intestina repente nudo te-  
sticulo occurrentia ad scrotum præcipiuntur. Cæte-  
rum nosse expedit, intestinorū herniā qualiscunque  
fuerit, semper aquosa esse deteriorē. Quæ uero pro-  
pter extensionē peritonææ membranæ sit intestinorū he-  
rnia, difficilior sanatur quàm quæ propter eiuldē ru-  
pturā. Et sanē intestinorū hernia extreme mala, so-  
la chirurgia curari potest, eaq; graui ac periculosa.

De Herniâ inguinis.

Cap. xxiiii.

Inguinis hernia propter peritonææ membranæ exten-  
sionem facta, in principio adstringētibz appositis,  
aliquando curari potest. Tutor tamen est uitio, si  
peritus artifex cōtingat. Nunc autem quo pacto hoc  
malum medicamentis adhibitis ac ligamentis sistā-  
mus, ut ne in peius procedat ostendemus, & simul  
quomodo succedentibus accidentibus sit occurren-  
dum. Proinde delapso ad scrotum intestino, & uol-  
uolosis torminibus diuexantibus, statim conabimur,  
dedisti locato ægro, diductis cruribus intestina  
sensim ad inguen reducere, ac reducēta commodis  
ligamentis retinere. At si partes scroto uicinæ uehe-  
mentibus doloribus unā cū inflammatōne uexentur,  
tormina itē ac flatūs ad sint, tādū differenda est redu-  
ctio, donec quiesuerint. Et interim partes uicinas al-  
ternis diebus, primū lana succida oleo ac uino imbu-  
ta, deinde etiam illitionibus rigabimus. Et dolentes  
partes circūcāriscauibz. Neglectæ enim sepe mor-  
tificantur. Dedicante malo emplastra adhibebimus,  
quale est Mnasæ inscriptum, & alia huiusmodi. Et  
ne recidat æger, asseruandi gratia perpetuis ligamen-  
tis utatur. Presbyteri Emplastrum ad herniā in-  
guinis. Thuris, myrrhæ, glauci, opoponacis, farco-  
collæ, tragacanthæ, gummi, glutinis taurini, glutinis  
pisciū, cinnabaris quo fabri ferrarij utuntur, carnis

cochlearū terrestriū, singulorum sexuncem, secūs ui-  
ni adstringētis ueteris quantū satis est. gluten utrūq;  
& quæ macerari possunt in uini fece macerato, acq;  
aridis tritis ammisceto, & ad emplastri formā redu-  
cito, imposito, alligato, & quiescere iubeto. ac sepe-  
tū die soluto. Ad intestina prolapsa. Symphy-  
ti libram unam, mannæ thuris quadrantem, candidi  
ouorū recentium unā cū uistello, numero sex. Sym-  
phytum tritum ac cribratū in scitile uas conficiamus,  
eiq; thuris mannā siue polsinem unā cū ouis sub-  
actū addimus. Deinde suillo adipē ueteri adfecto ac  
emplastri formā redigimus, acq; hoc intestino prius  
reducto adhibemus, & ligamento alligamus. Aliud.  
Folla & teneras cupressi pilulas impone & alliga.  
Et si sicca fuerint, in uino prius coque. Hoc auxiliū  
inquit Galenus, omnibus corporibus nimio humo-  
re flaccidis confert. reficac enim & corroborat. Decim-  
mo autē die id exoluere ac renouare oportet, ita ut  
ter repetatur, & puer interim per triginta hos dies in  
lecto decumbat, & cupressi decoctū bibat. Aliud ce-  
lebre. Aloës, malicorij in uino nigro cocti, succi hy-  
pocistidis, thuris, glutinis fabrilis, singulorū equa-  
les portiones. Gluten in passo donec dissoluatur, co-  
quito, ac probe terito, & reliqua minussime trita  
ammisceto, ac uitor uelut ita sepe dictū est. Aliud.  
Balauistiorum sexuncē, thuris, aloës, rhois coriarij,  
glutinis fabrilis, corallorū, singulorum quadrantē,  
malicorij, gallarum, singulorū lib. i. Gallas & malia  
coriū in uino nigro ē uinacis expressio coquito, &  
postea in mortario terito, & ad trita reliqua cū po-  
lygoni succo dissoluta addito, & omnia melle cocto  
excipito, ac uitor uelut dictū est. Emplastrum. Ca-  
tum cuidam adolecenti ob herniæ intestinalis turpi-  
tudine summe anxio, ex quo sanatus est. Resina sic-  
cæ, ammoniaci thymiamatis, bituminis, sulphuris ui-  
ui, æquales portiones. Liqueabilia liquato, eisq; ab-  
igne ablatis sulphur adjecto, & in mortario ad em-  
plastri formam redigito, adhibeto ac alligato. Opor-  
tet autē spleniū in quo adhibetur calfactū apponere,  
neq; frequenter amouere, sed sinere donec sponte de-  
cidat. Quidam pro ammoniaci picem, quidā alcyo-  
nium iniungunt. Aliud. Terebinthine sciquantiā, ce-  
ræ, thuris, myrrhæ, glutinis pisciū, carnis cochlearū,  
singulorum unc. i. Glutē per triduum aceto macera-  
tur. Deinde in mortario teritur, & ad prunas aliqua-  
tur, rursusq; teritur, & ad ipsum reliqua trita ammi-  
scentur. Vtere præterea lide inscripto emplastro,  
quod Sermonē x. v. inter emplastra multū uis habe-  
tur. Aliud Theodori, admiradum ad herniā inte-  
stinorum, quod nos experti sumus, & cum multo-  
rū admiratione sanauimus. Curat magnas & disten-  
sas affectiones. Chartā in aqua frigida ad tridū ma-  
defacto, & ubi humorē uelut spogia imbibit, ex  
ea pila factio, quam reducto prius intestino, inguinē  
adhibeto ac alligato, neq; ante tertium diē exsoluto.  
Tertio enim diē miscebis de efficacia ipsius. At ue-  
ro ægro minime indicabis quid sit id medicaminis,  
sed chartā uel pāniculo inuoluas, uel atro colore tina-  
ges. Neq; uero tu utilitatē rei despicias. Aliud, intesti-  
norū hernias agglutinans. Chrysocolle, glutinis pis-  
ciū, lapidis gagatæ, rhois coriarij, acacæ, symphyi,  
carnis cochlearū, singulorū sesquantiā, ammoniaci  
thymiamatis, lapidis pyritæ, lapidis magnæis, alu-  
minis scissilis, thuris, sulphuris uiui, alcyonij, picis  
brutæ

bruidē, nitrī, singulorum unc. i. Gluten pīdū in ui-  
no nigro austero macerato, postea in pila terito, &  
ad prunas cum eodem uino eliquato, & rursus teri-  
to, & ad ipsū reliqua trita ammisceto, quo solidū  
emplastrum fiat, quod inguinī adhibebis ac deliga-  
bis, ægroq; quiescere iussu septima die solues. Ve-  
rum ante adhibitionē locū aliquid ualde adstringē-  
tis decoctū rigato. Sunt qui prædicta myrto cerato  
excipiūt. Ego uero acaciā, thus, ammoniacum, seor-  
sim in uino macero ac tero, atq; ad gluten pīdū re-  
cte præparatum ammisceto. Deinde cochlearum car-  
nibus tritis adiectis, itemq; reliquis tritis, ad empla-  
stri cōpagem redigo, quod crassissime inguinī im-  
pono, & charta imposita deligo. Aliud Oribasij,  
pīcis liquidā, terebinthinę siccæ, singulorū lib. i. ut-  
scī sexuncem, propolis trientem. Quidam etiā colo-  
phoniæ sextantē, galbani sextantem, pīcis & colo-  
phoniæ liquatis terebinthinam, deinde galbanum  
& propolim in mortario prius trita ammisceto, sta-  
timq; ubi ab igne sustuleris, uiscum adijcito, & ru-  
bicula agitato donec frigeat, facit ad strumas, meli-  
ceridas ulcera, & inflātos sub alis tumores, & ad  
abcessus colli. Repurgat & agglutinat. Aliū porro  
Ætiten lapidem gestatū ut inguen cōingat, prohi-  
bere, ne intestinū alsidue delabatur. Idem etiā tritus  
recte medicamentis quæ imponuntur ammiscetur.

De Emplastrorum præparatione ac coctura, &  
quæ in ipsa consiciuntur, Galeni. Cap. xxv.

Emplastrorum cōpositionis multæ acuariæ particu-  
lares differentiæ sunt. Quædā enim ipsorū ad cruen-  
ta uulnera commoda sunt, itemq; uulnera aggluti-  
nant, atq; fracturis conueniunt, aliqua maturant, alia  
qua discutiūt, aliqua attrahunt, aliqua sinus explēt,  
alia resiccant, alia cicatricem inducunt, alia leniunt,  
alia pinguiā sunt. Quorū omnium uarietates uaria  
simplicium medicamentorū natura distinguit. Quæ  
propter prius simplicium uires cognoscere oportet.  
Ita enim etiā compositorū facultates & causas, pro-  
pter quas inter se differunt, dinoscemus, ut nō solum  
singulorum naturas intelligamus, sed componendi  
quoq; artē ediscamus; quo si forte liber in quo phar-  
macorum cōpositiones quibus utimur scriptas ha-  
bemus, intercidat, ipsi consimilia deperditis com-  
ponere possimus. Graue enim fuit id quod duobus  
medicis mihi notis contigit: Quorū alter ob huius-  
modi scriptorum amissionem morore contabuit,  
alter uero medicadi artē desuit. Adest autem exer-  
citatis, ad hoc quod pharmaca componere possunt,  
etiam iudicandi facultas de his quæ priores medici  
descripserunt, ut & his quæ ab illis scripta sunt com-  
mode uti possis, & his quæ ipse iuxta rectā metho-  
dum composuisti, præstat tamen his quæ longo ex-  
perimento probata sunt uti, quam noua usurpare.  
Sed uelut dixi necessitas aliquādō nos cogit in pere-  
grinationibus, ut noua quædā & experimento non  
cognita usurpemus. At uero si omnibus præter na-  
turam affectionibus simplicium medicina mederi pos-  
semus, compositis non opus haberemus. frequenter  
enim ad certum quendā modū corpus calfacere uo-  
lentes, nullum simplex quod id facere possit reperi-  
mus. Nam medicamentū curandæ affectioni corres-  
pondere oportet. Quin & aliqua simplicia citra al-  
terius mixturā in usum deduci non possunt. Velut  
quando medicamentum meatu obducentē adhibere

uolumus, nullum simplex ad hanc rem idoneum ha-  
bemus. Neq; enim bitumen, neque cera, neq; resina,  
neq; pix, neq; propolis, nec ladanū, nec ærugo, nec  
ceruīa, nec argēti spuma, nec alia metallica, talia sūt.  
Ideoq; qui primo medicamenta emplastica & mea-  
tus obducentia excogitauerunt, cū oleo metallica co-  
xerunt, & liquabilia eliquarunt. Deinde herbas sic-  
cas tritas ammiscuerunt. Cōtrā in aliquibus affectio-  
nibus, unico quidē simplici medicamento opus ha-  
bemus, sed alia quædā illi miscemus, uel ad uirium  
ipsius uehementiam obtundendam, uel ad saporis  
asperitatem mitigandam, uelut quum ad purgantiā  
medicamentā, quicquam ammiscemus ex his quæ sio  
macho grata sūt. Et ad dolorem sedantiā, quædam  
uim ipsorum lenientiā, uelut castoreū & cætera hui-  
usmodi, ad opium & mādragoram. Tunc autē ma-  
xima componendi pharmaca necessitas est, quum  
morbus contrarias facultates inter se requirit, uelut  
repellentes simul & extergentes, aut inspissantes &  
simul attenuātes, quale est quod ex papaueris capie-  
tibus ac melle paratur. papauer enim tenues destilla-  
tiones à capite inspissat. Mel autē humores ad pes-  
tus iā delapsos, relictu faciles facit. Necessariō præ-  
terea componitur medicamentū, ut idem medicamen-  
tum habere possimus ad plures morbos cōgruum,  
uelut ad uirus eticulantiū bestiarum ictus, & ad  
uenenosas potiones. De Antidotis ergo & epithe-  
matis satis supra tractatum est. Cæterum eorū quæ  
in emplastra inijciuntur, quædam terrea sunt, uelut  
metallica, & lapidum ac terræ species, fecesq; ac ci-  
neres & testæ, quædam oleosa, quædam lacrymā,  
quædā liquores, quædam succi, quædam liquabilia,  
quædam semina, quædā herbæ, quædam radices. Et  
rursus quædam qualitatē expertia, quædam acria,  
quædam adstringentiā, quædā calfacientiā, quædam  
exterforia, quædam maturantiā, aliqua diffundentiā,  
aliqua mollientiā, aliqua discussoria, & innumere  
aliæ differentiæ reperiuntur. Spuma igitur argenti  
exiccæ, extergit, calefacit ac refrigerat moderate, ad  
omnia æqualiter efficitur. Hæc aliquando in oleo so-  
lo, aliquando aqua aut uino, aut aceto ammixto co-  
quitur. Primo autē seorsim exactissime terenda est,  
deinde rursus cū oleo ad strigmentiam compagem  
redigenda, atq; ita alsidue agitata ad lentū ignem co-  
quenda. Intumescit primum ac bullas emittit, quum  
autem sufficiens cocturæ propinqua fuerit, colorem  
fecis induit. Mensuram uero cocturę iustam recipit,  
quum tumor cōtractus fuerit, neq; amplius inquisi-  
nat. Similes spumæ argenti uires plumbago ha-  
bet, ad frigiditatem ratum magis progressā, nec pa-  
riter extergens. Eodem etiā modo coquitur, nisi  
quod in eius coctura non solum queritur ut ne ina-  
quinet, sed ut colorē quoq; ex igneo rubore, ad ful-  
uum ac ualde floridum trāsmutet. Aes usum ad-  
strictionis & acrimonię particeps est, cōtrahit, cica-  
tricē inducit, & ab inflammatione tutatur. Quum au-  
tem coquitur, nō statim in principio immititur, sed  
emplastro iam semicocto. Mensurā cocturę, nisi ual-  
de modicū inijciatur, color indicat, ut uidelicet exu-  
beret, & suluū emplastrū faciat. Squama aeris carnē  
erodit, adstringit, & ualidius glutinat quā æs, sed  
minus discit. Coquitur sicut æs, & eodem tēpore  
inijciatur, eandēq; cocturæ rationē habet. Nisi enim  
color eius exuberauerit, & suluū emplastrū effecerit,

nondum ad iustā cocturam peruenit. Squama uero ferri, praesertim stomomatis, ampliori adfiratione participat, quapropter ad malefica ulcera illi praefertur. Eodem autē tempore inijciunt, & rustulū colorū inducit. Diphryges mixtas vires habet, adfirationem cum acrimonia. Quare ad putrida ac maligna ulcera utilis est. Et hoc medio cocturae tempore inijciunt, bullitq; donec color eius exuberet, neque amplius inquiner. Chalcidis adfiratione simul ac acrimonia participat, contrahit, attenuat, discutit, aperit, & amplius superioribus adstringit, ac minus mollit. Vt uero tenuior euadit, & adfirationem perdit. Coquitur sicut as, citius tamen liquefit. Men sura cocturae est, ut rubicundius, ac puniceo coloris emplastrum faciat. Misy similes chalcididi vires habet, tenuiorū tamen parū est, & ideo magis attenuat, discutit & aperit. Sed minus mollit ac adstringit. Ad finē uero cocturae inijciunt, neq; ullā mensurā exhibet. Sori quoq; similes chalcididi vires habet, nisi quod magis terrefū ac crassum est, atq; ideo magis adstringit. Inijciunt & ipsum medio cocturae tempore, & tardius liquefit, & nisi quid prohibuerit, atrum colorē reddit. Flos aeris tenuior est, ure auro & squama aeris, participat nonnihil absterforia ui, ideoq; attenuat & agglutinat. Coquitur uelut de aere diximus. Atramentū futurū ex mixtis facultatibus coctat. Valde enim adstringit, neq; ingeniose calefacit. Prae omnibus itaq; humidās carnes siccare, omnēq; humiditatē consumere cogereq; ac adstringere potest. Inijciunt medio cocturae tempore, & liuidiorem emplastrū colorē facit. Imō nisi alia obstituerint, atrum eius colorē facit. Auris pigmentum & sandaracha ambo urendi facultatem habent. Magis igitur praeditis discutunt, & uita tenuioris essentiae sunt. Inijciuntur autē ad cocturae finem. Plumbum usum ex his quae citra erosionem siccant, efficacissimum est ad maligna, chironiaq; ac cancerosa ulcera, habetq; per se, & cū alijs mixtum, facultatem inducendi cicatricem. Inijciunt medio cocturae tempore. Cersussa meatus obducit, & moderate frigida est. Cocta uero sicior seipsa euadit. Haec in emplastrā alba, ad finem cocturae inijciunt. Sic enim colorem conseruat, & magis inalbāt. In nigra uero, aut melina statim in principio inditur. Aerugo aeris acrimoniae participes est, discutienti incidendiq; ac consumendi omnē carnē uim habet, plurimū autem cerato ammixta extergit ac cicatricem inducit. Haec in emplastrā uiridia post cocturā inijciunt. In quibusdam uero ne inijciunt quidē in ollam, sed cum acetō in mortario teritur, & reliqua ad ipsam affunduntur. In melina uero emplastrā medio cocturae tempore inditur. At in ea quae geminā faciem ac colorem praese ferunt, statim ā principio inijciunt. Dū enim coquitur erugo primum melina, deinde bicolor, postremum fulua efficitur. Alumen omne uehementissimam habet adstringēdi facultatem resicatoriam & agglutinatoriam. Omnium autem tenuissimum est scissile. Inijciunt plerumq; post cocturam, neq; peculiare cocturae mensuram habet, color eius plerumq; ad uiriditatem mutatur. Rubrica adstringit, rescat, agglutinat, inijciunt in fine cocturae. Cadmia exterioriam uim habet, caliditate & adfiratione temperata. Vt lota sine erosionē extergit ac rescat, pompholyx quoq; lenissimum

pharmacum est, & malignis ac ulcerosis ulceribus congruum. Inijciunt ambo in cocturae principio. Sal mixtam facultatem habet extergendi ac adstringendi, magis tamen adstringit, & ualde rescat. Nitrum autem extergendi incidendiq; ac exsiccandi uim habet. In attractorijs emplastris sal ipsi misceri solet. Et ambo medio cocturae tempore induntur. Sulphur omne attractoriam uim habet, calidāque ac tenuis essentiae est. Inijciunt in fine cocturae. Nigrefacit enim emplastrā. Atque haec quidam metallica sunt quae in emplastrā inijciuntur. Terrae uero in ipsa induntur, samia, erethria, cimolia, ampelitis & lemnia. Ex lapidibus autem phrygius, alius, pyrites, haematites, magnes, achates, iaspis, gages, cos, Horum vires superius exposuimus. Inijciunt & pumex, extergendi attenuandiq; ac discutendi uim habens. Testae praeterea conchyliorum uita, ac crudae, tanquam attenuantes, extergentes, ac discutientes, & resicantes, ad sinus glutinandos ammiscuntur. Idem praestant & fistilium testae, extensoriae etiam ipsae ac resicantes facultatis. Inijciunt item calx tanquam praedare resicans, & ad cicatricem perducens. Cinis uero praesertim sarmentorum sinus agglutinat, callōsque extert ac rescat. Haec omnia terrea in fine cocturae inijciuntur. At uero in pinguiā emplastrā oleum recipienda, oleum statim ā principio cum metallicis iniungere oportet. Si uero cum resina quadam, aut pice lia quida emplastrum paretur, & oleum statim ab initio inleceperis, incoharens faciet medicamentum. Quapropter ut compages fiat, resinas liquidas primum indere oportet, deinde in fine oleum superaddere, atq; ita rursus ad bonam compagem coquere. Reliquae pinguedines, & praesertim adipēs recentes tenerrimi, medio cocturae tempore inijciuntur. Ex unguentis trinum quidem cocturam sustinet, cyprium uero & rosaceum, minus ferunt, cetera omnino non tolerant. Quapropter haec in fine cocturae inijciēs. Cera porro calefacit & moderate mollescit, minusq; glutinat uulnera cruenta. Nunquam coquitur per se, ita enim uratur. Neque cum resina aut pice liquida, ita enim incompacta maneret. Sed inijciuntur ad oleum purum, uel aliud cum metallicis coctum, aut ad resinam uel picem praecoctam. Resina omnis multo magis quam cera calefacit, discutit, mollit, extrahit & aperit, ac cruenta uulnera glutinat. Et arida quidem resina post ceram inijciuntur, liquida uero seorsim praeter ceteris omnibus coquitur, nisi admodum fuerit modica. Pix uires omnes resinae habet, sed ualidiores. Inijciunt praeter alijs omnibus. Mensura cocturae liquida est, ut cogatur. Siccae uero, praesertim si cum acetō coquitur, ut non amplius bullas emitat, neque intumescat. Bitumen cruenta uulnera glutinat, & praedare calfacit ac rescat, & sinus implet. Coquitur statim ab initio iniectum. Verum non minure tritum id inieccare oportet, habet enim asperitates ficuum granis similes. Quare crassius contundendum est, & in acetō coquendum citra agitationem, donec non amplius bullas emitat. Agitatur enim in grumos cogitur. At si absque acetō coquendum est, oleo simul additum facile liquefit. Propolis calfacit, discutit, maturat, extergit & attrahit. Hanc praemollire oportet, atq; ita coquere ab igne ablatis iniecta. Nulla enim

amplio

ampliore cocturam tolerat. Ammoniacum molle-  
lit, discutit, calfacit, putredinem educit, attrahit. In-  
ijciatur medio cocturæ tempore. Et si quidem cõteri  
ac cribari potest, leuissimum insperges. Sin minus,  
cum liquore quopiam leuigatū immittes. Cum ace-  
to quidē aut uino, si ad cruenta uulnera emplastrum  
paratur. Si uero ad fistulas aut frummas, penitus cū  
aceto. Si uero molle fuerit emplastrum, qualia sunt  
quæ ad sedem parantur, cum aqua; ita ut ad reliqua  
refrigerata infundas, ut ne effruescant, ac rursus co-  
quas. Ojopanax magis calfacit quàm ammoniacū,  
discutit & resicat. Inijciatur peracta coctura, qua  
penitus modica opus habet. Et hunc aceto aut uino  
prius terere oportet. Galbanum ualde calefacit, con-  
coquit ac discutit. Cocturam autē penitus non tole-  
rat. Itaque ablato ab igne medicamento probe mol-  
litam inijcere oportet. Aut cum aceto uel uino ad  
strigmentitiam compagem diluta reliquis ammisce-  
re. Sagapenum uires habet galbano similes, magis  
tamen discutit & attenuat. Inijciatur in fine aceto aut  
uino prius tritum, ita ut cum ablato ab igne empla-  
stro emollisatur. Bdellium calfacit, discutit, attrahit,  
molli. Inijciatur tritum post peractam cocturam. Si  
uero pingue fuerit, ac teri non possit, in mortario tu-  
sum cum emplastro emollisatur. Thus parum cal-  
facit, præclare maturat, modice attrahit, & sinus glu-  
tinar pollen eius, similes uires habet, magis tamē ad-  
stringit. Quare medicamentis ad cruenta uulnera cõ-  
mode misceatur. Inijciatur utranque in fine cocturæ.  
Myrrha calfacit, concoquit, attenuat, discutit, & ex-  
siccat, facit ad uulnera cruenta. Inijciatur in fine cocturæ  
cum aliquo liquore qui emplastris misceatur con-  
trita. Aloe ex uarijs facultatibus constat. Adstrin-  
git enim, calfacit, attenuat, discutit, sinus glutinat ac  
resicat. Additur post omnem cocturam. Succus pa-  
paueris strenuè perspergat, dolores ac inflammationes  
midgat, & cruenta uulnera glutinat. Hic pridie  
in aqua modica maceratur, & in mortario teritur,  
atque sic emplastrum ad ipsum diffunditur. Thapsia  
calefacit & rubificat cutem. Inijciatur postremā  
liquore quodam trita. At uero nulla herba, aut ra-  
dix, aut semē cocturam tolerat, celerissime enim tor-  
rescunt. Teruntur igitur a manent in mortario, &  
liquefacta reliqua ad ipsa diffunduntur. Aliquan-  
do tamen herbas aut radices præmaceras, in oleo  
coquimus, & expressas abijcimus, & oleum ad me-  
dicamenta assumimus.

De cruentorū uulnerū curatione, Galeni. Cap. xxv.  
Parua & superficialia uulnera, natura sua sponte nul-  
lius medicamenti indiga sanare solet: labia solum à  
nobis contrahantur, & ligamento circūdantur, ne  
pili, aut arena, aut tale quid illabatur, & ulcus pe-  
nitius coalescat. At si amplum fuerit uulnus, ut labia  
contrahi non possint, & sanies congregetur, aut ur-  
geat dolor, tale uulnus sola laborum contractione  
agglutinari non potest, sed per medicamentā resican-  
tia collectam saniem consumere, & assuetam pro-  
hibere oportet: ita uero sunt agglutinatoria phar-  
maca inflammationem arcēta. Si uero uulnus pro-  
fundius fuerit, & in superfice angustius, scalpello in-  
cidatur, ut æqualis amplitudo fiat, & insinuat huius-  
modi mores non putrescant, neque uicinas partes corrumpant:  
proinde qui cruenta uulnera glutinare uoluerit,  
hæc consideret, & præ omnibus grumos dili-

genter ex uulnere educat. Quantulacumque enim co-  
rum pars in cauitate relicta in pus cõuertitur, & car-  
nes subinde putrefactæ. Educemus autē grumos spō-  
giarum mollium assiduo foris, atque hæc nō in omni-  
bus ex aceto exprimantur. Sed si uulnera sine eru-  
ptione sanguinis fuerint, aqua solum foueantur, ita  
enim carnem nihil offendemus, quam adstringens  
acetum impedit ne cito coalescat. At uero profun-  
diora uulnera penitiores & difficulter extripabiles  
grumos in se habētia, aceto rigabimus, quod ex spō-  
gia usque ad fundum ipsorum exprimemus. Acetum  
enim ad dissoluendos grumos efficacē est, per adstric-  
toria facultatē aperta uasa occludens, allationemque  
sanguinis cohibens, quibus omnibus a principio in-  
tentum esse conuenit, etiam si aliās acetum obturan-  
do corpora, tardiores faciat uulneris unionem. Cæ-  
terum si in capite uulnus fuerit, supra relata mēbra  
na caluaria ambiens consideranda est, an illa sit aut  
simul pertusa sit: Si enim illa permanserit, labia lu-  
turis protinus contrahes, & agglutinatorijs uteris:  
Si uero perforatam aut cõrusam repereris, ad tutio-  
rem curationem membranam discicabis, & os dili-  
genter derades, linamenta que cõuulsa indēs, & forin-  
secus splentum inflammationem arcens impones, &  
supra id lanam succida seu spongiam mollissimam,  
uino aut aceto imbutam ac expressam, sine oleo ad-  
hibebis, præcipue si sanguinis eruptio præcessit,  
postea fasciolam lineam aceto rigatam ac expressam  
obligabis, uinculi capite in uulneris loco statuto,  
quemadmodum in artuum fracturis fieri solet. Stu-  
dio uero habendum est ut ligatura sursum uergat.  
Verum constrictionem eius moderatā esse conuenit.  
Nā uehementior dolorem excitat, laxior inutilis est,  
post tertiam diem uulnus fractura carens spongijæ fo-  
ueatur, deinde linamēta medicamentā suppuratorio  
illita indantur, & reliqua suppuratoria curatio ad-  
hibeatur, postea ad repurgandum ac incarnandum  
progressus fiat, quemadmodum paulō post de ulceri-  
bus indicabitur. Porro quoniā rupta caluariæ mem-  
brana, ubi uulnus negligitur, inflammatio cõsequi-  
tur, si in principio inflammationis uoceris, protinus  
siccare uulnus conare, & membranā diducere atque  
os caluæ deradere, uulnere enim diducto, inflama-  
tio antequam excandescat, supprimitur: facta dissec-  
tione linamēta indēs, & ad ea retinenda linteū uino  
& oleo imbutum, aut splentum inflammationē arcēs,  
forinsecus impones, & supra hoc lanā uino & oleo  
imbutā adhibebis. Et deinde ad suppuratorij ductū  
te conuerteres. Si uero inflammationem uehementē na-  
tus fueris, derasis capillis locum aqua moderate ca-  
lida rigabis, & medicamēta adhibebis inflammationē  
sedantia. Inflammatione uero sedata, mēbrana caluam  
ambiens suppuratur, & uicinas partes abscessum pas-  
cuntur. Quapropter expedit ut dissecetur uelut di-  
ctum est, & pus excernatur, ac caluariæ os derada-  
tur, & postea cõmunis ulcerum curatio fiat. Si uero  
fractura in capite aut alio loco unā cū uulnere fue-  
rit, emplastrum ad fracturas accommodatum im-  
ponatur. De eo uero partem quadrangularem resicare  
oportet, quo loco uulnus existit, aliudque paruū sple-  
nium uulneri imponere, quale diximus. Atque hoc  
paruum splentum quotidie tollendum est, & ulcus  
curandum, ac deligandum. Cæterum agglutinatio-  
ria medicamenta Sermonē xv. scripta habentur.

De fauce



De fauciatu nervi, Galeni.

Cap. xxviii.

Nervus vulneratus aut punctus, dolore & inflammationem vehementissimam habet, propter sensus subtilitatem. Quapropter cutis vulnus in agglutinationem servare oportet, quo per ipsum saniosi humores effluant. Vbi vero vulnus os latus fuerit, conari ut resiccantibus medicamentis labia ipsius committantur ac uniantur. At si per acum aut paxillum, aut tale quiddam, vulnus infistum fuerit, & in alium progressum, id saltem studio habendum est, ne inflammatio sequatur. Etsi quæ longè tutius ut cutis circa vulnus oculum dissecaretur, quo commodius in alium procederent vires medicamentorum. At vero si vires validæ fuerint, & nihil impediatur, universum corpus per venæ sectionem evacuetur. Servandæ est in evacuando locorum affinitas, ut dextra manu sauciata, dexter malleolus vice talus, sinistra sinister incidatur: Et vice versa dextro crure vulnerato, subalaris uena dextræ manus, sinistro sinistra, rectitudine servata secetur. Si vero subalaris non apparuerit, medii secabimus. Quod si corpus visiosis humoribus repletum fuerit, purgatione per idoneum pharmacum utemur. Cæterum aqua calida quæ reliquis inflammationibus commodissima est, his infestissima existit. Ab humectantibus enim & calfacientibus putrefactio inducitur: præstat igitur nervos sauciatos oleo moderate calido tenuitque ac nihil adstringente rigare, tale autem est dulcissimum, quod melius longe fuerit, si annos duos aut tres habuerit. Nervus enim sauciatus curatio medicamentis opus habet, quæ tepidam caliditatem habent, ualde vero siccat, atque contra molestiam, & quæ substantia tenuissima prædita sunt. Huiusmodi enim sola sine partium diffinitione ac mordacitate, saniem ex alto evocare possunt. Quapropter oleo in quo anethum & ruta decocta sunt, calido perfundimus. Sæpe etiam ceratum ex Euphorbio, aut emplastrum Anicetum, aut quoddam ex his quæ ad vulneratos nervos describuntur, modico oleo liquatum adhibemus. Deinde emplastro aliquo ex prædictis imposito, lanam oleo calido imbutam extrinsecus illigamus, & per singulos dies bis aut ter solvimus. Et si longiores fuerint noctes, noctu quoque, præsertim ubi mordacitas vulnus irriter, Quod si neque mordacitas, neque dolor percipiatur, bis tantum in die, & circa vespæram semel solvemus. Et præterea alas ac collum oleo calido large rigabimus. Si vero nervus in crure sauciatus fuerit, inguina ac rotam spinam & collum, oleo item calido uberius perfundimus. At vero si nervorum vulnera à principio male fuerint curata, maxima inflammatio ac putrefactio sequi solet. Itaque farinam ordeaceam, aut fabarum, aut erui in lixiuo cū aceto mulso coctam imponere oportet. Est enim hoc cataplasma efficax ad ea quæ iam putrescunt. Si vero vehemens inflammatio cum maximo dolore infestaverit, farinam erui aut fabarum cū optima sapa, modico aceto addito coctam imposito, calido oleo prius affuso. Ceratum vero ex euphorbio ad nervos vulneratos, cuius paulo antè mentionem fecimus, hoc modo præparatur. Ceræ, terebinthinae, olei, singulorum trientem, euphorbij recentis sextantem, aut biennalis quadrantem, aut prorsus antiqui trientem. Et si terebinthina defuerit, colophoniam pro ea accipito. Longe vero præstantius euadet medicamentum, si propolim

pinguem ac recentem acceperit, ut sit terebinthinae quadrans, propolis triens, ceræ uncia i. olei triens, euphorbij sextans. Desiciente vero euphorbio, sulphur, aut castorium, aut cõsimile quiddam calidum ac tenuius partium ammiscibus. Quod si omnino ab exacta & media pharmacorum ad sauciatos nervos compage aberrandum sit, præstat ad molliorem compagem declinare, etiam si ita paratum iniquet. Optimum præterea ad eundem usum pharmacum est ex brutia pice & oppopanace, quod etiam ad morsus canis rabidi facit, præcipue si corpora contigerint robustiora. Nam interioribus per ceram ex oleo aliquo discussorio vires eius mitigare potest, quale est strinum, aut amaradinum, aut opobalsamum, aut oleum uetus. Egrege facit & Anicetum, quod sermone xv. inter emollientia medicamenta habetur. Quin & ex metallicis cõstans pharmacum, efficax est ad nervorum punctiones. Habet id hoc modo. Chalcitidis crudæ drach. viii. misyos crudi drach. xvi. squamæ æris drach. xxiiii. ceræ drach. xvi. olei dulcis aut ueteris, æstate quidem drach. c. viii. hyeme vero centum xx. thuris drach. xiiii. terebinthinae drach. xvi. galbani drach. xii. aceti acerrimi & antiqui quantum satis est. Metallica ad solem æstivum pluribus diebus terito, indeque addito thure rursus conterito, & quæ liquari possunt liquata affundito ac subigito. Hoc medicamentum vulneri appositum inflammationem arceat, velut sæpe experti sumus. Admirandum præterea ad sauciatos nervos medicamentum est quod è senecione paratur, & habet senecionis succi uncias xxiiii. olei antiqui, olei cyprini, olei dulcis, apodymatis siue picis è naubibus erasæ, singul. trientem, galbani, æruginis, singulorum drachm. iiii. terebinthinae drach. vi. adipis ueteris drachm. xi. ceræ drachm. viii. resinæ pinus siccae drachm. vi. Succum cum oleis coquito donec promodum consumatur. A æruginem vero cum modico succo terito, & quæ liquari possunt liquato ac excolato, iniectaque terebinthina cum decoctis unito, postremumque omnia ad æruginem tritam affundito ac subigito: facit ad maximas musculorum in vulnibus inflammationes. Et duritias ac recites priuorum strumas dissolvit. Porro qui sauciatos nervos habent, urgente necessitate post septimam, vel ubi dolor penitus quiescit, lauari possunt. Verum lauandis medicamenta vulneri indimus, & forinsecus multiplicia lintea oleo imbuta imponimus, & factam ex lineo obligamus. Deinde ego in solium descensuro, ligamenta multo oleo rigamus. Et post balneum remotis omnibus quæ applicata fuerant, præscriptam curationem adhibemus. At si vulnus in manu fuerit, admoneatur æger, ne id calidæ siue frigida lauacro humectet. Oribasij ad priuatos sauciatum nervorum abscessus: priuatos autem vocat, quado in proximis puncturæ locis abscessus parui & multi per certa intervalla oriuntur. Cerg. colophonæ, butyri, singulorum lib. i. picis siccae, mellis singulorum sexuncæ, æruginis quadrantem, aceti quantum satis est ad æruginem conterendam ac dissolvendam.

Curatio nervorum denudatorum ac vulneratorum in ulceribus.

Cap. xxviii.

Quod si nervus non fuerit punctus, sed manifesta diffinitione incisus, ita ut etiam prius præposita sit diffinitio, & appareat nudus nervus, secūdum rectitudinem & non transversum

transuerſim diſſectus;relata ex euphorbio aut metal  
licis medicamēta, minime adhibēda ſunt. Abſtinen-  
dum etiā ab emplaſtro Anicero, & ceteris tanta acri-  
monia præditis. Nudus enim neruus uehementem  
ipſorum uiſum non ſerit, proinde calcem aſſumes lo-  
tam plurimo roſaceo dilutā. Sit autē calx in diebus  
canicularibus ad ſolem aqua dulciſſima ſæpe elota  
ac reſiccata. Bonū eſt & ex pompholyge medicamē-  
tum plurimo ac optimo roſaceo dilutum, pompho-  
lygem autē ſiſdem lauare uelut calcem oportet. Sed  
& cera in huiusmodi pharmaca recipienda lauanda  
eſt. Per omnē enim denudati nerui curationē, reſicca-  
re citra mordacitatem intendimus, quare niſil acre  
uulneri ad mouendū eſt. ſubtiliſſimo enim ſenſu præ-  
ditus eſt neruus, & tēperamento frigidiſſus, ac prin-  
cipaliſſimo principio coherēs ac conſunctus. Sed nec  
oleo tale ulcus rigandū eſt: fordidum enim inde eua-  
dit. Verum lana molli ſpedillo obuoluta ſanēs de-  
tergenda, & ne arida lana uulnus contingat, ſapa im-  
bui poteſt, & ea expreſſa uulnus detergi, præterea  
medicamēta quę adhibētur, tepida eſſe oportet. Quę  
enim frigida apponūtur conuulſionē inducunt. Ad  
neruos quoq; denudatos emplaſtrū Aegyptium ef-  
ficaciſſimū eſt, quod ē fuccida lana paratur, & ſulu-  
piſcatoris, ambo roſaceo diluta & linamentis indita.  
Omnium autem præſtantiſſimū eſt & nulli com-  
parandum emplaſtrū Iſis appellatū, optimo roſaceo  
diſſolutum, & cū linamento tepidum ulceri inditū.  
Sedat enim dolores & fordidā ulcerā cito repurgat,  
incarnat, & ad cicatricem perducit. At ubi linamēta  
ulceri immiſeris, forſinecus emplaſtrū ē ſenecione ſi  
haberi poteſt, ſin minus, anicerum adhibebis. Cæte-  
rum ſi uulnus nerui transuerſum fuerit, maximū  
cōuulſionis periculū imminet, inſlāmatione à diſſe-  
ctis fibris ad integras tranſeunte. Quod ſi integre fi-  
brę conuulſę fuerint, eadem curatio & hiſ, & ulceri  
adhibetur, parcius tamen hinc ægro ſanguis auferen-  
dus eſt, & diæta tenuis conſtituenda, & quies impe-  
randa, & ſtratum molliſſimum parandum, pluri-  
mum item oleum calidum inguinibus, ſpinę, axil-  
læ, collo, ac capiti aſſidendum eſt. Atq; hæc cura-  
tio communis ad omnia neruorum uulnera eſt.

*De neruorum contuſione.*

*Cap. xxxix.*

Contuſo neruo ſi cutis ſimul contuſa fuerit, & ulceratio  
ſiat, farinam fabaceam cum aceto mulſo, aut erui  
farinam cū ſapa & modico aceto impones. Ambæ  
enim ſunt efficaces. Quod ſi cum contuſione dolor  
adſit, picem liquidam ad fabacę farinę cataplaſma  
addes, & ſimul cocta calida adhibebis. Si uero maio-  
ri reſiccatione opus habueris, parem menſuram fa-  
rinę erui ammiſcebis, itemq; ſiſdem illyricā, ſi ad  
huc fortius reſiccare uolueris. Vniuerſi uero corpo-  
ris curatio eadem eſt cum ea quam paulo antea præ-  
ſcripſimus. At ſi neruus fuerit contuſus citra mani-  
feſtam cutis contuſionē, oleo calido diſcuſſorio, ane-  
thino aut rutaceo locus aſſidue perfundatur, & lana  
oleo imbuta adhibeatur. Reliqua uero curatio præ-  
dictis ſimilis fiat. Porro ſi totus neruus fuerit diſſe-  
ctus, nullū quidē periculū imminet. Verū pars mu-  
tila ſit, præſertim ſi diſſectus neruus magnus fuerit.  
Curatio uero eadē uelut ad alia ulcera adhibetur.

*De glandularū inguinis inſlāmatione, Galeni. Cap. x x x.*

Quū glandulę inguinis uniuerso corpore pleno, citra  
aliā maniſeſtā cauſam, inſlāmataz innumuerint, hu-

mores circa glandulas conſtipantur. Proinde niſi  
quid prohibear, cubiti uenam ſecabimus, tantumq;  
ſanguinis auferemus, quātum plenitudo oſtenderit.  
Loco uero inſlāmato & ante ſectiōnē uenę, & in  
ipſo ſectiōnis tempore, adſtringentiā ac repellentiā  
medicamentā apponemus. Verum poſtea euacuato  
corpore, diſcutientibus ea quę affluxerunt utemur.  
At ſi ulcus in crure fuerit, & per conſenſum glandu-  
las inguinis afflixerit, quemadmodū in digitorum  
pedis offenſa fieri ſolet, glandulā inſlāmari incipien-  
tem ſtatim à principio lana oleo calida imbuta miſi  
gabimus, non adſecto ſale, uelut aliqui faciunt. Sal  
enim tenuloſes humores cōſertim diſcutiēs, reliquū  
calloſum, ægre curabile, & ſæpe immedicabile re-  
linquit, poſtquā autē inſlāmationis feruor quieſ-  
uit, mitigatoriā relinquemus, & diſcuſſorijs utemur,  
quę ad cerati compagem redacta glandulis im-  
poni debent. Nam quę duriſſora fuerint, eas partes di-  
ſtendunt, & rursus inſlāmationes iritant. Atq; hoc  
quidē modo glandulę traſtentur, ipſum uero crus  
ſtatim à principio calſaciendū ac humectandum eſt,  
ita ut ulceri inſlāmationis cauſa cataplaſma mitiga-  
toriū, aut ceratū aliquod ad ſedis affectiōnes paratū  
imponas, totumq; membrum lana oleo calido im-  
buta fouas, & ægro quietem imperes. Sedato autē  
ulcere plerunq; etiā glandulę doloris exortes ſiunt.  
Egreſſe uero glandulis conſert pſyllium aqua cali-  
da madefactū, & panniculo aut braſſicę foliō exce-  
ptū & impoſitū. Item ceratū ex butyro paratum, &  
quod oſtea uſta redpit. Conſert & diſcuſſoriū em-  
plaſtrum Dionyſia appellatum, & quod ē buccinis  
præparatur, quorū omnium præparationes Sermo-  
ne x v. habētur. Vbi etiā ceratum ē pſyllio eſt, aut  
emplaſtrum, ſi ita appellare malueris.

*De quacūq; inſlāmatione, eiſdem. Cap. xxxi.*

Omnis inſlāmatio ob ſanguinis affluxum, uel à mani-  
feſta, uel ab occulta cauſa generatur. A maniſeſta,  
quādo ab offenſo pede glandulę inſlāmantur. Ab  
occulta, quādo aliqua parte delegante, aut toto cor-  
pore tranſmittente, & affecta parte ob debilitatē reci-  
piente, humorū copia aſſuxerit, uelut ſuprà de po-  
dagra oſtenſum eſt. Sæpe uero etiā pars quę inſlām-  
atur ob morboſam aliquā & præter naturā calidi-  
tatem, materiā ad ſe trahit. Erit itaq; inſlāmationis  
principiū, quum primū pars ſanguinea materia re-  
pletur. Augmentū uero, quādo affluxus aliuſde ceſ-  
ſat, & qui in parte cōtinetur putrefcere incipit. Atq;  
eo tempore caloris præter naturā incrementū, & hu-  
morū diffuſio, & partis diſtenſio longe maior eſt  
quā antea fuit. Vbi uero iam pus cōſtat, maxi-  
mūq; dolores adſunt, inſlāmatio in uigore eſt. Decla-  
nationem autē dicimus, quū allapſus humor diſcu-  
titur, & tumor ac diſtentionē minuitur, & dolores mi-  
tigātur. Inchoante itaq; inſlāmatione uictus ratio  
moderāda eſt, cibūq; contrahendus, & aquę potus  
imperādus. Et ſi inſlāmationis magnitudo ſanguinis  
detractiōnē poſtulat, & etas ac corporis habitus, &  
anni tēpus nō obſtat, præſertim in hominibus ſanguis  
ne abundantiſſus, poſt præſtitutā uictus rationē, uenā  
ſecabimus, tantūq; euacuabimus, quāntū plenitudo,  
& inſlāmationis magnitudo, & ægri uires indica-  
bunt. Verū in principio, & ante uenę ſectiōnē, & ipſo  
ſectiōnis tēpore, inſlāmāte parti cataplaſma repel-  
lēda adhibebimus. In augmento uero ex diſcuſſorijs  
aliqua

aliqua ad repellenda ammiscemus. At in uigore dū uehementissimi sunt dolores, & mitigatoria applicabimus, uelut in declinatione ea solū quæ discussoriam uim habent. Inchoantes itaq; inflamationes repellunt glauciū, perdicū, stratores in aquis nascens, plantago, polygonū & similia. Midgane autem & dolori in uigore inflamationis cōmoda sunt, malua per se, & cū modico pane ac rosaceo impōsta, præstat & mellisoriū passū coctum & cum pane impōsitum. Idē præstant palmulæ in passū coctæ, & cum pane ac rosaceo subactæ impōstæ. In declinatione uero agrestis malua pollet, & uuæ passæ, uinaceis exēptis, cū pane ac modico melle. Item ordei farina cum melle aut oleo adhibita. Quod si locus affectus nimia materia turgeat, nō mox ad chirurgiam prorumpere oportet, uelut quidā faciunt, sed conari ut materia collecta per pharmacā discussoria digeratur. Quale est quod ē buccinis utis cōstat Ariobarzanum appellatum, aut Oribasij fuluum, aut quod Dionysias appellatur ē misy paratū, & reliqua eius generis, quæ Sermonē x. v. habetur. At si residuū ex inflamatione callosum factum fuerit, uehementioribus medicamentis utendum erit, ita ut singulis diebus bis quantum ea proficiant inspectemus.

*De abscessibus.*

Cap. xxxii.

Si inflamationes producantur, & ad suppurationem conuertantur, adiuuare oportet ut quām celerrime transmutentur, proinde præ affectū althææ ac sicciū decocto rigabimus, & farina ordei aut panem cum aqua & oleo imponemus. Quod si egre suppuretur inflamatio, hordeum aut panem in pinguiū cartarum & althææ decocto coctū imponemus. At si adhuc diutius perstiterit, simū columbinū, & nitrū, & terebinthinā adijcietur, peracta uero transmutatōne in pus, locus aperiat̃ur qua parte maxime eminet. ibi enim tenuissima est cutis. Et si pars aliqua suppurati loci, putrida uidebitur, ea necessariū rescin dēda est. Resectio autē ad myrtē folij formam fiat, lōga uidelicet & angusta, quod sanē in axillis ac inguinum abscessibus faciendum est. In capite uero & huiusmodi locis simplici sectiōne utemur, qua facta thuris pollinem tenuissimum ulceris cauitati inspergemus, & linamenta cōuulsa indemus. Ad uero ubi duæ aut tres sectiōnes factæ fuerint, limniscos immittere oportet, & postea linamentis conuulsis ulcus replere. Ad tutandum uero locum simplex linamentum uino & oleo imbutum obligabimus. Tertia deinde die ad suppuratorium curationis ductum conuertemur, per tetracharmacum & similia rosacea diluta. Si uero post indita linamenta circumscissæ partes adhuc fuerint inflamatæ, cataplasmata adhibebimus, & si nihil amplius urgeat, splenium sedandis inflamationibus aptum imponemus. Cæterum suppuratione facta repurgantibus utendum est, ex quorum numero præstat emplastrum Aegyptium, quod recipit terebinthinæ liquidæ & mellis ac rosacei portiones æquales simul liquatas. Sed in robustioribus corporibus, ac impuriōribus ulceribus, terebinthinæ ac mellis par mensura absq; oleo liquatur, & mirifice repurgat. Verum ad ulcera quæ difficulter repurgantur, confert Aegyptiū quod coctum appellatur, colore fuluū, cum æruginē rafa ac melle coctum, donec fuluum colorē susceperit. Sunt & alia huc similia, quæ ad fistulas paulō post resec-

rentur. Repurgatis ulceribus ad incarnatiōem transeundum est, quæ paulō inferius ad caua ulcera describimus. facta uero incarnatione, rhodio emplastro aut plastro cōmittantur, & ubi explanata fuerint ad cicatricem perducantur, per sicca medicamēta quæ referentur ad ea quæ cicatrice opus habent. Suppuratorium abscessuū, experimēto confias. Maluæ agrestis trita ac coctæ, farinæ triuici, stercoreis suilli, æquales partes in sapa coquito, ac imposito, & celerrime suppurationi cōtinget. Philosophi. Ad omnes inflamationes discutiendū, facit priuatim ad mamillas & glandulas inflamatās. Adipis suilli sexuncem, albumina ouorū duorum, mel ad ouorū mensuram, nitrū sextantē, farinæ poltæ quantum satis est. Adipi liquefacto oua ammisceto & mel, deinde nitrū, postremum etiā polentæ farinam quantum ad emplastri compagem satis erit. Sunt qui ita præparent. Accipiunt ouā unā cum utellis undecim numero, faring polentæ libram unā, adipis suilli librā unam, mellis quantum sufficere putant. Nam discutere uolentes, uberiorē sedare intendētes, parcius ammiscunt. Quidam etiā nitrū addunt. Sed quod nitrū habet, magis discutit, quod nō habet, magis sedat. Vt re præterea eo quod ex psyllij succo paratur. Ruptoriū abscessuum. Nitrū & ammoniacū aceto liquata imponē, quām diu locū perumpi uolueris. Quidam pro ammoniacō thus adijcūt. Abscessus autē etiā permutatos discutiūt, Ariobarzanum ex buccinis constans, & quod Dionysias appellatur, ambo in sequētē Sermonē descripta. At quod ad Oribasii refertur sic habet, lapidis pyritæ drac. xii. ammoniaci thymiamatis tantundē, farinæ fabarum drac. vi. terito ac cribrato & resina excipito. Sitq; resina, si haberi potest terebinthina, sin minus, liquida, quo emplastri forma fiat. Hoc uel discutiet, uel dirumpet, euacuabit, ad cicatricem perducet, & sanabit. Nec uero diutius antea præparandū est hoc pharmacum, cl to enim exarefcit. In decimo quinto Sermonē etiā aliud discussorium, & aliqua ruptoria reperies. Oribasij Aegyptium repurgans. Mellis despumati libram unam, aceti libras duas, squamæ æris uncia. i. æruginis drach. iiii. Acetum & mel ad mellis compagem coquito, deinde reliqua ammisceto. Aliud, eiusdem, ulcera sordida probe repurgans. Amurcæ coctæ, mellis despumati, aluminis Phorinī appellati, æquales portiones. Aliud ad abscessus, discutiens aut rumpens, & sine dolore euacuans. Spumæ argenti, cerusæ, ammoniaci, singulorum librā unā, olei quantum satis est, resinæ pīnus, propolis, opopanax, singulorum sexuncem, castorei trientem, galbani, myrrhæ, thuris, singulorum sextantem. Aceti quantum sufficit. Spumam argenti & cerusam cum aceto coquito, & terenda cum aceto terito, & quæ liquari possunt liquefacto, & ad coctā ammisceto, & tritis adijcito, refrigerato, ac subigito.

*De cauis ulceribus non malignis. Et ratio curandorum ulcerum. Galeni.*

Cap. xxxiii.

Cauum ulcus humidum ac sordidū est, & ideo phar-macis moderate siccantibus ac extergentibus opus habet. Sepe uero à nobis dictū est, non omni naturæ eadē medicamenta cōuenire, sed debiliōri molliorūq; molliora, ualidiōri ualidiora esse adhibenda. Neque enim tolerat debilis natura potentiora, proinde quanto humidius fuerit corpus in quo est ulcus,

ulcus, tantum minus resiccat medicinas postulat. Quare duobus ulceribus aequali humiditate praeditis, alterū quod in siccorū temperatura est, maiorem resiccationē postulat; alterū quod in humidiorē est, minore resiccatione opus habet, quanto haec natura alia humidior existit. Carnem enim, quae ad ulceris nutritionē distribuitur, reliquo corpori similē esse oportet. Vbi igitur pristina caro siccor est, ibi noua quoque superueniens siccor fieri debet. Merito ergo resiccanda est, & quanto prior siccor fuerit, tanto amplius resiccandi facultatē medicamentū habere debet. Et uice uersa, tanto minus resiccantia medicamentā conueniūt, quāto minus sicca prior fuerit caro. Thuris itaque qualitas ad humani corporis naturā comparata cū temperatis & medijs naturis cōsentit, humidiores autē paulo amplius resiccant, quēadmodū facinē etiam extreme siccis, aliquādo humidius existit. Si igitur diligenter obseruaueris, comperies thus in humidioribus quidem naturis carnē producere. In siccoribus autem minime, sed potius suppurare. Thus ergo sicut moderate calidum est, ita ex omnibus incarnantibus appellatis minime siccant. At hordeacea & fabacea farina magis siccant quān thus, & nulla caliditate participat. Aristolochia uero & panax omnibus amplius in suo genere resiccant, & calidioris sunt naturae. Medii uero inter has obdinent, farina erui & iris. Et huiusmodi omnia in primo ordine resiccantia ac extergentia locantur, & minoris ac maioris discrimine tantū inter se differunt, & quod alia uitres quibus excellunt simplices habent, alia cōpositas. In libro uero De simplicibus medicamentis ostendimus pompholygem usā & loiam, & caetera huiusmodi, uelut cadmiā & ostreorum testas, ex eorū esse ordine quāe sine mordacitate siccant & incarnant. Praeterea ad ulcera caua incarnanda emplastrum uitridē cōducit, quale est quod Iphis appellatur, multo rosaceo dilutum. Qui ergo recta uia medicandi procedet, ubi aegri naturā considerauit, statim dinoscit, quo medicamento ulcus indiget. Quū autem medicamentum incarnans adhibuerit, & nihil profecerit, sic quodammodo ad aliud transire oportet. Nam si ampliores sordes fuerint, & humidius ulcus, nosse debet quod medicamentum minus quā oportuit resiccauit, quapropter mellis ammixtione uires eius intender. Si uero purum & humiditatis exors ulcus cōperit, plus quān debuit resiccauit, quare oleū ammiscabit, & ceratū liquidū adhibebit. Atque in his summa diligentia utendū est: condignit enim aliquādō, ut a fortiori medicamentū ulceris cauo colligatur, & sordidum ac humidū appareat ulcus, uelut ea quae minus quā oportuit sunt resiccata. Verū hoc à peritis facillē dinoscitur: ulcus enim eliquatū cavius seipso efficitur, & labia protuberantia habet, rubet itē & inflammationē habet, & aeger saepe manifestē mordacitatē percipit. Alterū autē ulcus, quod minus resiccatū est, tale nihil cōsequens habet.

Medicamenta quae per linamenta induūt, ad suppurandū, repurgandū ac incarnandū. Cap. x. xxi. Sunt & alla multa ad repurgandū idonea, uelut lens, iris, marrubium, singula cum melle cocta, herinacei marini testa usta, narsissi radix cū rosaceo & melle, Basilicum uero tetrapharmacū, & quod ad Azanien refertur, & Macedonicū, singula liquefacta suppurandi uim habet, & omnia Sermone x. v. descri-

bentur. Sed & hoc mirifice suppurat, omnē quoque duritiā citra dolorē emollit, & incarnat, & causis ulceribus eximicē prodest. Cerae, terebinthinae, medullae ceruinæ, adipis utulini, anserini, bubuli, butyri recentis, mellis atidi, olei rosacei, myrrhae, singulorū drac. vii. Myrrha cū melle trita ad prunas coquitur, & reliqua liquata affundūt ac unīuntur. Aliud Aegyptiū, ad ulcera repurganda mirādū. Mel cū parti terebinthinae mēsurā, aut rosaceo, aut si nersuosa fuerint partes affectae butyro ad prunas colligamur. Verū in robustioribus corporibus, & fordidioribus ulceribus, terebinthina cū melle adhibemus. Vere etiā eo quod ex melle, aceto, & liliorum succo constat, quod Galenus ualde approbauit, cuius praeparationē & utendū modum, in simplicium Sermone, capite Delilij habes. His omnibus efficacis est quod aliqui Aegyptium uocant, sic habens. Aeruginis drac. iiii. squamæ aeris unc. i. aceti trientem, mellis dodrantē. Arida cum aceto terito, & adiecto melle ad prunas ad fuluum colorem coquitur. Aliud aureū uocatur, antiqua & recentia uulnera repurgans & incarnans. Salis cōmunis, cerusae, atramenti sutorij, spumæ nitri albæ, singulorū quadrātem, aristolochiae longæ & rotundæ, aluminis idissi, singulorū unc. i. Arida cū aceto trita, ceræ sextante & olei dodrante excipito; deinde usu expectet cū plurimo rosaceo ad olei spissitudinē diluito, & admixtaberis. Idem capitū quoque ossibus denudatis per linamenta induitur. Aliud caua ulcera replens. Adipis utulini recentis, ceræ, terebinthinae, singulorum drac. iiii. rosacei drac. xvi. para & utere. Aliud Archigenis Nutrix appellatū, ad cauitates explendas. Rosacei, terebinthinae, mellis, singulorū sextante, cerusae, butyri, singul. unc. i. para & utere. Quidam & thuris unc. i. addunt. Aliud ad caua & pura ulcera explenda, experimento cōstans. Rosacei trientem, ceræ sextantē, terebinthinae, butyri, mellis, singulorū unc. i. Omnibus ad calidū cinerē colligatis ac simul unitis ad linamenta tingenda utere. Si uero sordida fuerint ulcera, repurgatis antea uelut dictū est, adhibeto. Aliud. Cerusae, spumæ argenti, pares portiones uino odorato & oleo excipe, & per linamenta usque ad cicatricē inducā inde. Aliud, ad sordida, cicatricē non recipientia, malignaque, ac callosa ulcera. Marrubij succū optimo melle exceptū inde. Aliud siccū, maligna & profundissima ulcera explēs. Farinae erui drachm. xxx. iridis drachm. xx. spumæ argenti drach. xv. aristolochiae longæ tantundem, mannæ thuris, terræ samiae, singulorū drac. x. squamæ aeris, cadmiæ, singul. drach. xv. Hoc in sordidis large, in puris parcissime linamentis illinito. Exaequatis uero ulceribus & iam cicatricē indigentibus, aridum specilli nucleo inspersum ulceri indito, & postea linamentum uino imbuto immittito.

De siccis repurgandū ac incarnantibus, cephalicis appellatis, Galeni. Cap. xxxv.

Sicca medicamentā quae cephalica, hoc est, capitalia appellantur, omnibus quidem totius corporis, maxime tamen capitū ulceribus incarnandis conueniūt, praefertim ubi ossa in quacunque parte fuerint denudata, Nam ad ossa denudata pinguium & eorum quae ad tingenda linamenta parantur, usum uitamus, & siccis statim uitimur. Quin & citra ossium denudationē, pinguiā non ita frequenter in ulcerum curatione

tionē adhibemus. Sunt autē sicca cephalica huiusce modi. Asclepiadis sicum cephalicū ad Xenocratem relatum, quo fistulas sanabat. Erui farinæ trientem, iridis illyricæ sextantem, aristolochiæ tenuis, squamæ æris, mannæ thuris, singulorū unc. i. Misce ac utere. Quidam etiam radicis panacæ unc. i. adiungunt. Et ex melle cocto oblongum quasi collyrium faciunt, quod in fistulā immittunt, & postea sicum inspergunt. Aliud sicum. Erui drach. x. aristolochiæ tenuis drach. x. squamæ æris, radicis uitis albae, singulorū drac. v. Vtere ad repurgandū cū melle, ad replendum sicco insperlo. Aliud sicū optimū, runculas ulcerum resicās consumens, callos rescindēs, fordida ulcera purgās, caua replens. Squamæ æris, resina pinus, singulorū drac. x. i. i. pumicis usti & uino extincti, iridis, aristolochiæ tenuis, silphij, singulorū drac. viii. thuris drach. iiii. Misce ac utere sicco, uel cū melle. Aliud sicum, omne profundū ulcus incarnans. Farinæ erui drach. x. x. thuris drac. x. i. i. fud. tinctorij, amyli, singul. drach. viii. misce & utere. Aliud, ad capitis ulcera replenda. Amyli, halicæ, thuris, lapidis specularis translucidi usti, singulorū unc. i. i. Aliud. Colophonias scorsim trita ulcus repleto, & citō sanabitur. Aliud. Colophonias, amyli, thuris, cerusæ, æquales portiones para & utere siccis. Aliud admirādū Seueri, ad ossa præcipuē capitis denudata, derafo ossi inspersum: celerimē enī incarnat, pollinis tritici, colophonias tenuissimē trite, pares portiones præpara ac utere, & linamēto indito, eius resinēdī grātia emplastrū quoddā molle cicatricem inducens impone. Aliud, ad ulcera contrahenda. Misfys dra. iiii. gallasarum, chalcitidis, atramenti sutorij, aluminis scissi, squamæ æris, singulorū unc. i. para & utere.

De ulceribus in quibus caro superexcrescit, & quæ de pressione opus habent, & de medicamentis resiccantibus, Galeni. Cap. xxxvi.

Carnem in ulceribus superexcresecētē consumit medicamenta fortiter resiccantia. Qualis est flos asæpæ, & testacea omnia usta, & uterq; herinaceus cū toto corpore exustus, & diphryges inspersum, & æris flos. Verū ergo omnia robore suo uincit. Siccum Herculis. Squamæ æris, misfys, chalcitidis usta, atramenti sutorij, aluminis scissi, æquas portiones præpara & utere. Aliud, Rhodium appellatū, refertur ad Hierā. Sistit itē sanguinē. Gallarū drach. i. x. squamæ æris drac. v. atramētū sutorij drach. iiii. aluminis scissi drac. ii. Gallas ex dimidio ufas uino austero extinguit, & reliquis tritis ammisceto. Quidā atramētū sutorij drac. v. squamæ dra. iiii. cōijciūt, & gallas omnes cōburunt. Rhodiū, inquit Heras, ad sanguinē sistēdū efficax est. Facit & ad sacros ignes, & ulcera profperando depascētia, ac nimio humore marcescētia contrahit, ac cicatrice inducit. Quidā hoc modo Rhodiū cōficiūt, & ualde laudāt. Chalcitidis crudæ, misfys crudī, singul. dra. x. squamæ ferri drac. xvi. gallarū dra. viii. Siccū Plarum appellatū. Hoc largē insperit contrahit ac deprimit, parē adhibiti, ad cicatricē duct. Chalcitidis crudæ lib. i. misfys crudī sexuncē, atramētū sutorij lib. i. æris usti sexuncē, squamæ æris sexuncē, præpara & utere. Aliud utilissimū, deprimendi uim habens. Squamæ æris drac. iiii. æruginis drach. i. Aliud. Squamæ æris, caldis uiuæ, mannæ thuris, æquales

partes præpara & utere. Facit ad ulcera maligna, & carnes fungis similes cū melle repurgat, & cum cerato replet. Aliud. Misfys drac. iiii. chalcitidis dra. ii. gallarū dra. iiii. atramenti sutorij, aluminis scissi, squamæ æris, singulorū drac. ii. terito, & aperto ulcere cum specillo inspergit. Vtere etiā ad maximas carnis superexcresecēcias, his quæ ad sedis thymos descripta sunt. Aliud. Lanæ succidæ uisæ ac tritæ inspersæ carnes marcidās ac flaccidās consumunt. Idem faciunt balaustia ubertim inspersa.

De ulceribus nō malignis cicatrice indigentibus, Galeni. Cap. xxxvii.

In ulceribus quæ cicatrice opus habet, caro quidē innato operimento munitur, sed cutis enasci non potest. Quapropter in summa carnis superficie simile quiddā cuti efficiendū est. Quoniam uero cutis carne sicior est ac densior, si carnē resiccabimus & adstringemus, cuti persimilem faciemus. Neq; uero satis est hoc docere, quod resiccātā & adstringētia adhibere oportet: nam & quæ cruenta uulnera agglutinant, resiccantia sunt & adstringentia. Verū in glutinandis uulneribus id tantū quod influit resiccare conamur, quod pars affecta superfluitatibus carcat: in cicatricibus uerō inducendis, non solū insuētiē, uerum etiā contentū in carnibus humorem consumere oportet. Itaq; medicamentū, quod cicatricem inducit, longē siccius esse oportet, eo quod glutinat, quo nō solum superflui consumat, sed naturalē quoq; humorem auingat. Hanc itaq; rem præstant galla omphacitis, malicorium, spinæ Aegyptiæ fructus, & quæ citra mordacitatē uehemētē adstringunt, qualis est myrtus. Testat etiā & cadmia, & plumbum, singula usta & lota, citra mordacitatē resiccant, & ad cicatricē perducūt. Sed his ualētiora sunt, chalcitidis, misfys, aluminē scissum. Et his adhuc potentius est æs usti. Omnium autē potētissima est squama æris, quæ uita lenē medicamentū efficitur ad antiqua ulcera cicatrice includenda. Illitio Titanica, ab extendēdo ac explanando appellata, consumens ac depressans. Adipis suilla, cere, singulorū unc. i. teribinthina semundā, nitri unc. i. fells taurini semundam, resina unc. i. Omnia simul decocta ac excolata ubi tepuerint, manibus subige ac utere. Quidam adiungunt atramenti sutorij drach. v. Et medicamentū ab igne remoto aceti & faenis singulorū unc. i. adiungit, ita ut hæc prius in alio uase simul sint cōtrita ac dissoluta. Obseruandū est ne pharmacū hoc in bulliēdo effuerescat, & assidue agitiandum, donec ad compagem perueniat.

Sicca ulceribus non malignis cicatricem inducentia. Cap. xxxviii.

Sicum quod cicatricē inducit. Ofiteorū ustorij drac. x. i. mannæ thuris dra. vi. cadmiæ dra. iiii. præpara & utere. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ singul. dra. viii. recemētū plumbi, myrti sicce, gallarū omphacitidum, singulorū dra. iiii. para & utere. Aliud siccū cicatricē inducēs, Cadmiæ, cerusæ, mannæ thuris, amyli, æquales partes unito ac uitior. Aliud admirādū. Cerusæ sextatē, amyli unc. i. spumæ argētī, thuris, rosacē, singul. sextariē, unito ac uitior. Incarnat enim & ad cicatricē duct. Aliud. Hoc etiā diuturna ad cicatricē perducit. Coricis pinus drac. vi. cornu cerui usti dra. iiii. cerusæ dra. iiii. æruginis dra. ii. cadmiæ dra. viii. mōnē thuris dra. vi. præpara & utere. Aliud. Aristolochiæ dra. vi. coricis pinus

pinus, pumicis usti & uino extincti, colophonæ, colophonæ, singul. drac. iiii. iridis dra. ii. unito ac utere ad incarnandū & cicatricē inducendā. Aliud. Pumicis usti & uino extincti drac. viii. mannæ thuris, squamæ æris, singul. dra. iiii. præpara & utere. Aliud mirabile. Aluminis fisci dra. iiii. in aqua dissoluito, & in eo diluto linteolū tenue, uetus ac detritū, purum, tingito, & in sole siccat, atq; hoc usus tēpore cōcissum ulceri indito. Verū ad sedis ulcera & diuturna alia, alumē in uino dissolues, & similiter facies; ad aurū uerō affectus, lanam pro linteis accipies. Aliud, plantaginē cum radicibus sicā terito & cribrato, ac utere cōfidenter. Aliud. Cerusæ drac. viii. gallarū, myrti, recemēti plumbi, singul. dra. iiii. para & utere. Aliud. Ostrea usta, cerusam, cadmiā, mannam thuris, paribus portionibus unito ac utitor. Aliud. fisci dra. x. x. iridis dra. x. x. spumę argēti dra. x. v. mannæ thuris drac. x. v. terræ famē dra. x. squamæ æris, aristolochiæ tenuis, cadmiæ, sing. dra. v. præpara & ad fordida ulcera largē, ad pura parcē adhibe, & hapsium lanæ cū uino expressum superimponē. Hoc & chironia ulcera appellata, ad cicatricē duct. Aliud, quod etiam callos exerit. Chalcitidis crudę, spumę argēti, ladanī, singul. dra. x. bituminis dra. viii. ceræ dra. ii. olei myrti lib. i. uini heminā i. Vlu expectēte splenitū ex eo imponent, & linamētū cōtinētā indito. Aliud Andromachi. Spumę argēti dra. x. x. iiii. atramenti fuorij drac. viii. aluminis fisci dra. x. ii. ceræ dra. c. squamæ æris dra. viii. bituminis, ladanī, singul. dra. x. x. ii. olei myrti lib. i. & quadrātē. Vini ueteris adstringētis quātum satis est: utere uelut prædicto. Aliud. Bituminis, ladanī, singul. dra. viii. squamæ æris, myrti, spumę argēti, singul. dra. iiii. ceræ dra. x. x. iiii. olei myrti dra. xxx. Et si hyems fuerit, drachm. x. x. vi. Vini quod satis est, præpara & utere uelut dictum est.

Emplastra quæ non maligna ulcera cicatrice inducunt.

Cap. x. x. x. x.

Emplastrū ē Cadmia preparatū, rosaceo dilutū reputat ulcera, incarnatq; & cicatrices cōcolores cuti efficit: per nōnibus tē ac fissuris, & ani affectionib. medetur: habet autē hoc modo: Chalcitidis ustæ lib. ii. cadmiæ ustæ & uino extinctæ lib. i. ceræ trientē, terebinthinæ lib. ii. olei myrti lib. ii. chalcitidem & cadmiā cū uino suffictū diluito ac conterito, & reliqua liquata ammisceto ac utitor. Aliud. Cadmiæ, chalcitidis ustę, sing. dra. xx. v. ceræ dra. x. lviii. terebinthinę dra. x. x. iiii. olei myrti lib. i. uini quod satis est, præpara & utere. Aliud, ad cicatrices inducēdas efficacissimū. Facit & ad igne ambusta mirificē. Cerusæ, spumę argēti, ordi usti, singul. unc. i. ceræ quadrātē, rosaci aut myrti olei helleb. cerusam & argēti spumā cum uino terito, cerā uerō cum oleo liquefacio, & ad medicamētum ab igne ablātū, hordecum ustu ritum ac cribratū inijciō atq; unito; & omnia frigefacta in mortariū coniecta subigito, ac utitor. Aliud ē ladanū, ulcera antiqua ad cicatricem perducens. Spumę argēti dra. c. picis dra. i. ladanī dra. x. v. æruginis dra. viii. grīs usti dra. viii. squamæ æris dra. ii. olei myrti lib. vi. Argēti spumā cū oleo coquito, & medio cōstūrā tēpore, æruginem, squamā, & es adjecto, & coquito donec nō amplius inquinēt. Et postea picē liquefactā ac excolatā cōctis

ammisceto. Hīs uero unitis & amplius nō inquinātib. ac ab igne amotis, depositio tam seruire, ladanum cū uino ritū addito, & perfrigerata in mortariū coniecta probē subigito, & ad maligna ulcera ac fistulas utitor. Aliud. Cadmiæ, chalcitidis, sing. trientē, ceræ, colophonæ, olei myrti, sing. unc. i. uini quātum satis est. Aliud. Aeris usti & crudi, sing. sextantē, cadmiæ sextuncē, chalcitidis ustę selquilibrā. ceræ lib. i. olei myrti lib. ii. uini quod satis est. Aliud emplastrū candidum, ad cicatricē perducēs, experimento constans, faciens ad tenera corpora, uelut sunt mulierū, eunuchorum, ac puerorum. Conuenit etiā ulceribus spōtancis. Spumę argēti lib. i. & trientē, cerusæ lib. i. c. erg lib. i. & trientē, thuris & mannę eius, singul. quincuncē, terebinthinæ unc. i. aquę lib. i. olei myrti lib. ii. cerusam & argēti spumam in aqua coquito, & consumpta aqua, ac medicamētū non amplius inquinante, ceram primum, deinde resinam addito, & ablato ab igne pharmaco, thus ac mannam siue pollinem eius ammisceto.

De malignis & egrē recipientibus, cicatricē ulceribus.

Cap. x. l.

Quædammodū antea diximus, duplex scopus propositus est in cura uione partiū, quibus nullus deprauatus habitus inest: alter, repellendi quod influit: alter, discutiendi quod in affecta parte impaētū est, atq; hæc ad cōtrariis qualitatibus sunt: nā quæcūq; adstringunt, repellere possunt quod influit: quæ uerō adtrahunt, discutiūt id quod in affecto loco cōtinetur. Adstringētia itaq; exasperat, & ob id dolorē inducunt, attrahētia uero & discutiētia quā acria sint, loca ulcerata mordent. Quare contingit ut ex his quæ exasperat, & mordent, superflua humiditas ad affectas partes illabatur, quam inflāmatio & erosio ulceris cōsequitur. Cæterum quod meminisse oportet, quod sæpe a nobis dictū est, quod corpora plena sanguine, aut uisiofis humoribus referat, & mollia ac subtili sensu prædita, ex mordacitate faciliē inflāmantur. Mulieres autē & pueri & eunuchi, iteq; uiri colore albi & multerosi uita degentes, inter molles naturas numerantur: proinde quātū eius fieri potest, medicamētōrū materia peruestiganda est, quæ circa mordacitatē ac dolorē ulcus resiccat, quā sanē nunq; inueniet medicus, nisi quid singula medicamēta adhibita pergerint, rectē expendierit. Itaq; cōsiderabit quāntū humiditatis primū pharmacū ab ulcere desiccauit, aut si fordidiū est, quātum sordium deterfit, idq; tertū ac quartū experietur, donec purū ac siccatū ulcus apparuerit: quod ubi deprahēder, ad aliud medicamētū, eiusdę qdē generis cū priore, sed debilius, se conuertet: fortiori enim repurgatis tā ulceribus morsum ac dolorē inferunt, & influxiones ac inflammations pariunt: italia igitur corpora exactē euacuare, & ad superfluitatibus afferuare oportet. Alijs itaq; sanguis si redundet, detrahēdus est, alijs purgatio uisiofis humoris, & simul uenę sectio cōuenit. Quibusdā uariem excidere ex ulcere oportet, alijs quibus secur aut splenem curandā assumimus. Necq; uerō malignis curium aut furarū ulceribus, ea curatio debetur; sed manū quoq; ac reliquarū corporis partium: nā cūda adolescentū diuturnum ulcus ad radicē manus habet, uenā ad ulcus supernē allatā excidi, atq; intra paucos dies hominē sanauit, qui per quinquennium ea affectione laborauerat. Sunt quibus



quibus loca ulceri vicina scarificare oportet. Quibusdā uero labia ulceris callosa circumcidere. Si uerō nihil ex his fecerimus, humiditatis ac fordium quantitate considerabimus, & inde ad congruum medicamentū transibimus, ita ut diligenter expēdamus, quæ siccādi quidem uim habent, non autē extergendi: in hoc etiā qualitatis singulorū gradus expēdendi. Medicamentū cicatricē inducens. Plumbi uisti sexuncē, cadmiæ trientē, aeris sextiā, colophoniæ, olei myrtē, sing. lib. ii. Vini ueteris odorati quantum satis est. Aliud. Cadmiæ, cerusæ, singul. trientē, ceræ, olei myrtē, singul. sexuncē. Aliud. Cadmiæ, spumæ argenti, cerusæ, singul. unæ. i. cere trientē, rosacei sexuncē. Aliud, & ladanu. Squamæ aeris un. i. bituminis, terebinthinæ sing. dra. i. i. ceræ, ladanū, singulorū quadrante, olei myrtē quadratē, ac si hyems fuerit, amplius de oleo accipies. Cerā cum oleo & bitumine liquefacto, & terebinthinā adjecto, & deinde omnia ad squamā ac ladanum prius trita ammisceto.

*Simplicia medicamenta quæ citra mordacitatem reasiccant ulcera maligna.*

Cap. xlii.

Simplicia porro medicamentā sine mordacitate & manifesta exasperatione resiccantia ulcera, hæc sunt: Lemnia terra, sigillū appellata, moderate resiccant. Cadmiā item suis canaliculis æstu cum uino trita ac siccata: ubi uero ulcera ualde sunt maligna, ex aceto terēda est. Vitrāq; superat chalcidis uisā, & uelut cadmiā trita ac resiccantia: nā cruda adeo efficax est, ut etiā crustas inurat. Huic similis est ærugo uisā: non uisā enim sicut & chalcidis nimis efficax est, nisi quod chalcidis simul adstringit. Atramētum futuriorū inter omnia metalla summē resiccant. Chalcedidi similia sunt misy & sori, maioris tātum ac minoris ratione differunt. Subiū magis quā sori siccant & adstringunt. Diphryges cōmode siccant, sed aliquantulū mordax est. Omnia aluminis genera exactē siccādi uim habent, uehemētēq; adstringunt: quapropter aluminē solum per se ad huiusmodi usus adhibetur. Chrysocolla naturalis & artificialis eandē uim habent. Plūbium uisum sori ac stibio præstat, plumbi recrementum, & squāmā ferri præferunt stomomatis, plurimum siccant. Aeris squāmā præter resiccandi uim, etiā extergit: quare ulcera per omnibus repurgat, omnia tamen metalla prius lauare oportet, deinde ulceribus admouere: ita enim mirificē siccare citra mordacitatem possunt. Siccant etiā buccinorum, purpurarū, ostreorumq; testæ usq; ac lotæ. Item traslucidus lapis specularis mollia corpora citra mordacitatem siccant. Idē facit niterum uisum, & quod in æneis lebetibus balnearum adhærescens ex aqua coctura reperitur: æquē enim siccant & adstringit. Præterea gallæ & malicorium uisā ac arida trita adhibita, ma-modissimā sunt. Quin & capparidis cortex tritus & siccus interspersus maligno ac purrido ulcere cōmodus est. Possum item tenue siccādi uim habere, & caries lignorum unā cum exterioria facultate. Item peucedani & pastinacæ, præsertim agrestis, radix & folia, scordium quoque ac centaurea, & alia huiuscemodii, uel priuāim per se, uel simul composita.

*De usu reparatorum medicamentorum.*

Cap. xliii.

Necessariū uerō talia ulcera uisioso humore repleta, fordilissima existunt. Quare ubi aliquod ex relatis

simplex aut compositum siccum adhibiturū sumus, lintheo prius molli puro ac siccato ulcus extergemus, deinde medicamentū cauitate explemus, & extrinsecus splenium ad ulcerum labia attenuada imponimus. Et lintheo supra splenium imposito ac ligato, spongiam ex frigida aut uino expressā adhibemus, conamurque ut per totum tempus spongia frigida permaneat, quod facili cōtinget, si assidue illi frigida infillitur, citra uinculi, lintheoli, siue fasciæ obligatæ solutionem.

*De ligamenti & curationis ratione.*

Cap. xliiii.

Ligamentū ulceri conuenit quod ad fracturas usurpamus. Quod si unū tātum fuerit ligamentū, principio ipsius ad superiorem ulceris partē locato obligabimus, siue sura, siue genu, siue talus, siue cubitus fuerit, pars ipsa affecta. At si duobus ligamentis uti malueris, uelut in fracturis fieri solet, primū ab ulcere ad superiorem regionē ducatur. Secundum uero initium sumat ab ulcere, & prius infra obligetur, & postea sursum desinat, & ad eundē terminum cū primo ducatur: nam ad alia cōmoda etiā hoc accedet, quod ulcera ob rotunditatē coalescere nequeunt obligā reddēt. Solutio autē non quotidie, sed alternis fiat, & a solutione aqua ulceri ne aspergatur, sed cū molli puro ac siccato lintheo sanies detergiatur. Quod si partes ulceri uiduæ inflammatæ appareant, splenio latiore facto liquidū medicamentū illines, quale est phoenicinū emplastrū, aut aliquod simile, ita ut hoc dissoluas uino adstringēte, sicut oleū quod adijctur melinū aut myrtē. At si duricies circa uicinas ulceri partes apparuerit emplastrū phoenicinū oleo antiquo aut cōcino dissolues. Tuiusq; fuerit superiorī regionī aliquod repellēdi ut prædictū adhibere, præsertim in crurū ulceribus, & his quæ eminentem uicinis habent: uenā uerō quæ amplior fuerit, & aræ bilis sanguinē habuerit, excidenda est, uelut diximus. Aliquādo tamen eiusmodi uenā excisa, ulcus quidē propterea coalescit ac sanū euadit. Sed quā parte uena recisa est, noui malignū succedit, quod cicatricē respuit. Præstat igitur in talibus uires ægri perperdere, & a uenæ sectione auspicari, deinde phar-maco aræ bilis ac pituitæ humorē educente purgare: nā & pituita aliquādo ad huiusmodi uarices confluatq; tunc uaricosam uenā resicare, multaq; sanguinis copia hinc educta, uaricis sectionē prius curare, quæ ubi exactē coaluit, tunc demū maligni ulceris curationē aggredi, eo quē retulimus modo. Alius porro lactis ferō in quo cinis coctus est, acceti multū modica mēsurā addita assidue emolliēda est. Dabis autē ex eo, ab hemina una usq; ad quinque mēsuram augens, si tamen ut æger per multos antea dies aquā biberit. Optimum itē est & lac recens multum per se, uel cum aqua calida aut modico passō, ante cibum sumptum. Nam & humores contemperat, & uentrem eluit. Confer etiā aloēs drach. i. per interualla deuorata. Balnea uero minime dulcia, sed sulphurea potius & bituminosa adhibenda sunt. Quod si æger illotus manere non possit citra totius corporis læsionem, laudus est ulcere nequaquā denudato. Postremum ab omnibus edulij ac potibus acribus & ægrē concoctilibus, ac uitiosis humoribus generantibus, penitus abstinere oportet.

*De emplastrorum compositione ad maligna ulcera.*

Cap. xliiii.

Quando

Quandoquidē in malignis ulceribus quæ difficulter cicatricē recipiunt, is scopus nobis propositus est, ut medicamēto nō mordaci rescicemus, & oleum ac aqua maximē omnīū humectāt, ab utriusq; penitus ca uere oportet, ipsaq; neq; per se adhibere, neq; cū resalutis siccis permiscere: cera igitur recēs pinguis & in sole subacta ac emollita, idonea est ad siccā medicamēta excipiēda. Quod si calor is ex sole copia non detur, cerā prope ignē mollissemus, uel in feruentem aquā infundemus; neq; enim illi omnino ammiscetur aqua: ac uerō proportio miscendi huiusmodi est, ut si moderatū pharmacū esse uolueris, metallicorum quartā partē ceræ miscas: si ualidius, tertīā. Neq; ue rō parua uarietas est pro corporū ratione, anne mol liores aut duriores habeat carnes: quare fieri nō po test, ut omnibus idē medicamētū cōueniat: itaq; his cōsideratis, ubi simpliciū facultates cognoueris, fa cile iudicare poteris uniuscuiusq; cōpositū medica menti facultatē, prout ab antiquis sunt descripta. Em plastrū admirandū ē fori, cicatricē inducens, de plo ratis ulceribus optūmū, quæ a multis frustra fuerūt tentatā, cui fidendū est, uelut multo experimēto co gnito. Soreos dra. x. xiii. gallarū drac. xxx. alum inis scissi, caldis uiuæ, malicorij, sing. dra. xvi. thus ris dra. xxx. ceræ dra. cxx. adipis uiuulini drach. c. lx. olei antiqui lib. i. & si utiulus adeps non as fuerit, porcini antiquus sine sale ammiscatur: nā taurinus calidior est. arida terito & cribrato: deins de liquata ab igne remota ammisceto: & omnibus probē unctis, alumē, thus, fori, calcē, cū uino adstrin gēte trita adijcto, ac uitōr. Ego, inquit Galenus, dū hoc medicamētū præparauit, oleū & adipē quadra ginta annorū adieci, & semper mihi præter spem suc celsit ad maligna ac diuturna ulcera. Sunt autē talia ulcera, a quibus pars affecta in deprauatū habitum perducta adeo est, ut efflūi probē coctus sit sanguis, qui ad ipsam alimētū grata affertur, ipsum transmu tēt ac corrumpat, & si uisitosus sit humor qui affluit, ab ipso solo erodatur, etiam si pars ipsa minime esset affecta. Aliud spleniū optimum. Plumbi uicti & lo ti tritē, eadē mēsa selquiuncā, aeris uicti uncti, thuris selquiuncā, aluminis scissi uncti. æruginis sextatē, ceræ sexuncē, olei myrti lib. i. Aliud Galeni, ad ma ligna & chironia. Ceræ, picis, bituminis, sing. lib. i. mannae thuris, cerussæ, æruginis, sing. sexuncē, ma licorij, gallarū, spinæ Egyptiæ fructus, iridis, aristolochiæ rotundæ, atramenti furorij, sing. uncti. i. aristo lochiæ lōgæ, aeris uicti, sing. sextantē. Olei antiqui aut cincti lib. i. arida in aceto pluribus diebus terito, & liquabilia liquata affundito ac uitōr. Aliud, Ori bafij, ad effrata ulcera deprimēda ac cōtrahenda. O chra atrata uicta, trita, sicca, utiliter adhibetur. Ego ue rō inquit, etiā cypria usus sum. Idē factū & chamæ leonis nigri radix, & malcorij usus sum. Et supernē haplus lanæ uino imbutus illigatur. Aliud Galeni, fuluū, Spumæ argenti lib. iii. olei cincti aut antiqui lib. iii. aceti acerrimi lib. i. Squamæ aeris, chalcididis, æruginis, singul. sextantē. Spumā argenti cū oleo co quito, medisoq; cocturæ tēpore metallica ad æstiuū solē multis diebus cū aceto trita adijcto, tādūq; ad ignē finito, donec non inquirat in. quū autē me tallica adijcis, lebes ab igne tollatur, ne effruescant & superfundatur. Sed & spumā argenti cū aceto & oleo decoquere licet, & mediso cocturæ tēpore me

tallica addere, & simul finire ut ebulliat, donec non amplius inquirat. Hoc pharmacū fistulas glutinat, & labia ulcerū callosa rescicās unit ac cōmittit, ita ut non amplius disparentur, si quic recta diæta utatur. Diuturna insuper ulcera & cicatricē respiciunt, chi ronīa appellata per se adhibēt, nullo antea puris ue stigio apparente, maturat, & suppurat: nō quoti diē, sed alternis hoc soluendū est. quod si stomoma tis ferri squamā addideris, lōgē præstātus pharma cum euadet. Ego dū hoc præparabā, aliquādo etiā diphrygis unc. i. adieci, aliquādo chrycollæ sextā tem. Sæpe etiā utrunq; ammiscui. Atq; ita præpara tum magna uulnera glutinat. Hactenus Galenus. Nunc uerō hoc modo cōficiat. Spumæ argenti lib. iii. olei antiqui lib. vi. aceti lib. ii. æruginis, squamæ aeris, chalcididis, sing. quadrantē, coquito sicut dictū est. Quidā diphrygis uncti. addidit, asserruntq; efficacis sime strumas discutere. Aliud Galeni, ad chironia ulcera in mollibus corporib. Ceræ lib. i. cerussæ bes sem, rosacei lib. i. salis ammoniaci tritē, squamæ aeris sextantē, thuris, aluminis, æruginis, malicorij, caldis uiuæ, sing. uncti. quæ liquari possunt liquata ac frigefacta ad siccā cum uino trita miscero. Aliud ad maligna & serpēdo depaſcētia ulcera, præsertim ti biarū. Spumæ argenti, mastiches, adipis caprini, ro sacei, singul. sexuncē, ouorū uitellos v. Argenti spu mā cum rosaceo & adipe coquito, deinde mastichen adijcto, & ad frigefacta ouorū uitellos ammisceto. Aliud, ad maligna tibiariū ulcera, experimēto cogni tum. Lupinos aridos uictos tritos largē inspergito, & hapsum lanæ ex uino expressū superligato. Hoc repurgat, incarnat, & ad cicatricē perducit.

De ulceribus quæ post obductam cicatricem rur sus rumpuntur.

Cap. xlv.

Quædā ulcera post receptā cicatricē non multo tēpore interposito inflāmantur ac refringuntur. Nā quam substratū os male sit affectū, uicina quidē caro cicatricem recipit, & exactē sana apparet. Verū postea sanie paulatim ex corrupto in alto osse affluente pu trefcit, & oboritur inflammatione cicatrix rumpitur. Quæ igitur horū curatio instituenda est? nimirū ut hactenus excicemus, quatenus squama affecti ossis excidat: faciliē uerō excident ossiū squamæ, si papa ueris syluestris & fici folia cum uino & polenta im posueris. Aut hyoscyami & atramenti fuorij prætes portiones adhibueris: sed & peucedani radix trita cū sissimē ossiū squamas dispartat. Vere etiā siccis ca pitalibus suprà descriptis, præsertim eo quod silphij recipit, Aliud siccū, ad chironia & cicatricē respuen tia ulcera mirificū. Squamæ aeris, thuris, singulorū sextatē, aluminis, salis ammoniaci, singul. arictēm, malicorij, cerussæ, singulorum unc. i. uere sicco, uel si malueris cum cerato. Aliud. Pumicis multiorij sexuncē, sulphuris uicti unc. i. terito & cribrato, ac uitōr. Facit & pumex per se aridus tritus inspersus. Aliud, ad cicatricem inducendā diuturnis tibiariū ac totius corporis ulceribus. Calcis uiuæ ac loræ in aqua & siccatae uncti. dimolte tanundē, ceræ, ter ebina thinae liquida, sing. sextantē, olei myrti aut rosacei quadrantē, poteris & ostreorū uictorū tritorū uncti. ad dere. Ad siccā in mortario cū uino trita quæ liquari possunt liquata ammisceto ac uictō. Hoc itemq; res liqua omnia relata, & præcipuē quod ē fori fit, chi ronij & malignis ulceribus modentur. Eisdē quoq; priuatim

privatim commodat capparis radix trita inaspera, cetaurea minor, scordium, caries lignorum ueterum, pastinacæ radix, peucedani radix, malicorij, oleum in quo scilla bulbis coctus est, absq; linamentis cum penna illitum. Malicorium in uino coctum & rosaceo cerato exceptum: omnium uero efficacissima est theriaca Andromachi è uiperis, rosaceo modico diluta, & emplastri modo adposita. Aliud, Sandaracham tenuissimè tritam urfino adipe exceptam imposito: aut ammoniacum salem eodem modo præparatum, uel per se adhibito.

*Ad extrematum ulcera.*

Cap. XLVI.

Myrti baccas cum uino coctas impone: uel peucedani radicem tritâ: uel lignorum ueterum cariem inaspera: aut brassicæ uel sabinae folia cum fœni graeci farina & aceto subacta impone: aut sideritidem melle exceptâ adhibe: aut oleû in quo scilla cocta est absq; linamentis cum penna illine: ita enim ne musca quidem ulceri appropinquabit.

*Ad callos extremarum partium.*

Cap. XLVII.

Brassicæ folia cum melle terito, & cerato ex sinopica rubrica præparato, excipito, & adhibito. Aliud, Clibani autem testam cum uino austero terito, & cum cerato ex ouis facto, aut cum medicamento ex pöphorio ad sedis affectiones parato, adhibito.

*Ad uermes in ulceribus.*

Cap. XLVIII.

Vermes in ulceribus generatos enecat, plantago sicca, ligni ficulni cinis, calaminthæ succus assidue instillatus. Cersua, inquit Theodorus, & polij pares portiones cû pice liquida adhibe. Quidâ pro cersua absinthium scribunt. Aliud, Linamentum ex salina hominis ieiuni illitum adhibito. Hoc etiam aurium uermes necat, & cicatrices concolores facit.

*Ad nomas & putredines ulcerum.*

Cap. XLIX.

Nomax, hoc est, proserpendo depauperata ac putrida ulcera, appellatur, quæ uicinas partes erodunt & putrefaciunt. Et sanè uehemētissimis medicamentis opus habet. Et sepius uisionibus requirunt. Siccū optimū, faciens ad nomas, putredines, polypos, uerucas, thymos & fornicatas appellatas, hæmorrhoidas, circa omne mordacitate. Misfos crudi, chalcididis crudæ, sing. dra. viii. ochræ dra. iiii. sandarachæ dra. iiii. calcis uiuæ dra. ii. squamæ æris, aluminis, sing. dra. ii. diphrygis dra. iiii. Vnito acutillo.

*Sicca crustam inducentia, inter quæ etiam pastilli multi usui.*

Cap. L.

Melinû, crustas inducens & callos exterens, inasperum, siue cum specilli nucleo adhibitu, & leuiter sale ulceris superficiei indutum, ut inde coloretur modo, ulcera cômmitit ac sanat, quæ ægrè curantur. Chalcididis crudæ dra. viii. cadmiæ dra. iiii. ieiuni hominis salina excipito ac subigito, & in mortario operata, mali cydonij colorem assumere finito, & cum pistillo leuiter trita in umbra assiccato. Alij tamen aliter præparât, & a colore quæ acquirit, fuscum appellant. Sumunt enim chalcididis dra. xii. cadmiæ dra. viii. & ad caniculæ æstum cû aceto terunt, atq; ita in umbra siccant. Aliud siccū, quod item ad solis feruorè paratur, & melinum colorem habet. Calcis uiuæ sextantem, auripigmenti unc. i. Auripigmentum cum aqua terito, & calcem addito, ac simul probe conterito, deinde in mortariû aqua plenum coniecto, ut subsideant, & ubi subsederint priore aqua diffusa, nouâ affundito, ac diu uersato, & rursus sub-

sidere finito, quo facto rursus priore aqua diffusa, nouam affundito, atq; idè tertio repetito. Postremû uas aqua repleto finito, ac singulis diebus uersato donec arefiat, & cômputra a qua aliâ affundito. Atq; hoc per dies x. sub caniculæ æstu facio, & tandem pharmacû siccatur in fictili uase in superiore parte domus nō humida seruato. Hoc citra mordacitatem crustas inducit, & ualde deprimit. Facit & ad gingiuas putridas, & epulidû eminenctias deprimit, dentes inalbât. Potest quoq; in mortario subactum in fictile transferri, atque insolari. Vtere Faustini quoq; pastillo, ac reliquis eiusmodi ad dynteriam descriptis. Aliud, ad totius corporis putredines & nomas. Calcis uiuæ, chalcididis, singulorû dra. ii. auripigmenti dra. i. Hoc ad reduuas digitorum, & ad putredines adhibetur, partibus putridis ex eo inspersis. Facit & ad carbunculos splenio resinato exceptum. Confert fistulis melle exceptû cocto, & uelut collyrium inditum. Oribasij, ad pudendorû nomas præsertim meliceridas dictas. Gallarum, floris mali punici, satui, itemq; syluestris, aristolochiæ rotundæ, squamæ æris, chalcididis crudæ, singul. dra. viii. atramenti futorij dra. vii. aluminis scissi dra. iiii. malicorij dra. i. Adhibetur pudendo cum melle, quemadmodum id quod ex charta præparatur. Facit ad nomas ualde profundas, sicut etiam pastillus Andronis. Cæterum medicamentum ex charta hoc est: Squamæ æris, chartæ usæ, singulorum drachmas x. iiii. auripigmenti, sulphuris uiui, singulorû dra. x. i. uel ut alij habet, x. iiii. plumbi usi dra. iiii. alij dra. vi. Charta primum teritur, deinde metallica leuissimè trita ammiscetur. Facit ad oris ac totius corporis putredines, ad humidores quidè siccum inasperum, ad sicciores rosaceo imbutum. Additur aliquando & mellis modicum. Ego uero plumbi dra. vi. adijcô. Siccum ad antiquas nomas, & ad gingiuas cruentas. Deprimit etiâ carnem excrecentē. Chalcididis usæ dra. x. i. misfos dra. xxx. æris usi dra. x. atramenti futorij dra. viii. sandarachæ dra. v. auripigmenti dra. i. unito ac utilitor. Aliud, experimento constans. Rhœi culinarij dra. x. squamæ æris, aloës, foliorum oleastri siccorum, singul. dra. viii. chalcididis dra. v. auripigmenti, sandarachæ, aluminis scissi, salis tostij, singul. dra. iiii. malicorij sicci dra. vi. chrysocolle facti usæ dra. iiii. rusci sicci dra. viii. tria, unito ac utilitor. Aliud ad nomas & putredines, Oribasij. Salis scissi dra. ii. aluminis in fictili usi unc. i. squamæ æris, pumicis usi, sing. unc. i. Aliud, eiusdem. Auripigmenti, squamæ æris, misfos, chalcididis, portiones æquas præpara & utere. Aliud Pasiphilum uocatum. Atramētū futorij, sandarachæ, misfos, chalcididis, pares portiones cômmitito. Siccum aureû appellatū. Aufert ossa, reprimat influxiones, fistularū callos exterit, & contrahit sinus. In fistularū autè & sinuum cœcuiatibus per specillū lana obuolutum inditur. Melantheriæ a uetustis clauis derafæ dra. v. malicorij dra. x. v. aluminis scissi dra. iiii. atramenti futorij, misfos, chalcididis, æris usi, sing. dra. viii. squamæ æris dra. x. vi. gallarû dra. x. v. Acei quatuor satis est. Oportet autè aceto in uas æneum coniecto clauos quotidie agitare, & deinde acetum excolare: Iogè uerò præstat quod in fundo residet. Aliud siccum, ad nomas, defluxus, gingiuas, columellas,

& pudēda. Ochra ſequillibrā, croci lib. i. putaminū ouorum uſtorū ſexuncē, gallarū ſexuncē, tritis ute re. Gallæ autē ſint omphacitides. Paſtillus ad nomas commodus. Sabine, myrrha, ſing. dra. iiii. ſo reos, miſyos, cyprii, atramenti ſutorij, thuris, aloēs, ſing. dra. ii. terito cum uino, & formato paſtillos.

Paſtillus ad nomas & putredines, quo uxor, inquit Oribasius, appellatur Aſclepius ſiue Aſculapius, & Cyriacus, hoc eſt dominicus. Gallarū dra. vii. florū mali punci, ariſtolochiæ rotundæ, chalcitidis crudæ, cadmiæ, ſing. dra. vi. iridis, ſquamæ æris, ſing. dra. iiii. miſyos crudi, atramenti ſutorij, aluminis ſciſi, thuris, niiri, ſing. dra. iiii. Terito cū aceto ad dies ſufficientes, & paſtillos x. formato. Eoſq; uſus tēpore aceto muſſo diſſolutos cerato excipito, hoc modo utens: Accipe paſtillorum trientem, cææ quadrantem, olei myrti ſexuncem, galbani trientē. Et paſtillis aceto diſſolutis ac tritis, liquata ammiſce to. Atq; hoc quidē modo præparatur ad ignem ſacrū, panos, & condylomata. Ad ozenas uerō, carbū culos, & carnis excrcēſcēdas, paſtilli ſicci inſpergun tur, uel aceto muſſo triti ac diſſoluti. Paſtillus Co rax, id eſt, Coruus appellatur. Ad putridorū ulcerū præſertim pudendorū nomas. Gallarū ſextantiē, ſqua mæ æris ſequifunciā, chalcitidis crudæ, thuris, ſingu lorū quadratē, cææ trientē, terebinthinæ unc. i. adipis taurini beſſem, olei myrti dextantē. Arida cū aceto in ſole ad ſufficientes dies terito, & mellis ſexuncem adhiçito. Deinde cerato exceptis uiſitor. Hic paſtil lus citra ammiſtionē per ſe adhibitus, omnibus no mis præſertim ſiccoribus coſert, & ubi nerui ſunt de nudati. Cū æquali uerō cerati portione, ſordida ul cēra exerget, cum ubertore cerato cicatricē inducit. Ego, inquit Aſclepiades, ſic præparauit: Squamæ lib. i. gallarū, adipis taurini, ſing. do drantē, chalcitidis, thuris, ſingulorū ſexuncē, cū aceto uelut coſſyria te ro, & paſtillos formo. Poſtea uerō ex paſtillis dra. x. ii. aceto tero, & mellis dra. x. addo, & cerato quod habet olei myrti, adipis taurini, ſingulorū do drantē, cææ ſextantiē, terebinthinæ trientē, excipio.

Paſtillus ē croco. Myrrhæ, malicorij, gruginis, alu minis ſciſi, ſingulorum ſextantiem, croci unc. i. aloēs, ſquamæ æris, thuris, ſing. unc. i. ſulphuris uiſi dra. i. ii. mellis lib. i. cū uino adſtringēte terito. Facit ad nomas, purēdines oris, & cuiuſcuq; loci, dētes mo tos ſirmat, ulcēra marcida & ſtaccida repurgat & adſtringit, purulentas aures, ſinus, fiſtulas, & carbū culos curat, ſquamæ oſiū reſoluit, & incarnat. Eſt enim ualde cōmodus ad oſſa carne ueſtiēda. Coſert etiā dyſentericis, & adhibetur uel aridus, uel hoc mo do coctus. Mellis lib. i. i. acci lib. i. paſtil ſextiās, ſimul ebulliant ad mellis cōpagem. Si uero partibus molli ſenſu præditis adhibendus eſt, uino tantum diluitur. Paſtillus ex plantis inſcriptus. Malico rij, ſoliorum myrti ſiccorū, teſtarum nucum iuglan dium ſiccarum, fru ctus ſpinæ, ſing. drachm. vii. gallarum dra. iiii. ſalis ſoſillilis dra. vii. omnia runduntur, & cribrata aceto ſubiguntur, & in uas ſicti le mittuntur, ac aſſantur. Deinde cū aceto teruntur, & adhiçuntur myrrhæ dra. iiii. thuris dra. ii. & forma tur paſtilli. Vſus horū eſt cū aceto. Paſtillus ex ſanis ſucciſis quem Leonidas ualde laudat. Lanç ſucci dæ, uſtæ, ramētorū plēbī, ſquamæ æris, bituminis, ſing. dra. x. aluminis ſciſi & rotundi, gallarū, malicorij,

miſyos, thuris, chalcitidis, ſingulorū dra. v. myrrhæ dra. ii. amurci ſequihemiā, terito cū aceto, & for mato paſtillos, ac uiſitor. Paſtillus Bithynus, ad nomas, fiſtulas, reuēdus edigitorū, carnē excrcēſcē tē citra mordacitatē deprimit. Cū cerato autē facit ad ignē ſacrū & alia huiuſmodi. Malicorij, gallarū, ari ſtolochiæ, chalcitidis, cadmiæ, ſing. dra. vi. iridis, ſquamæ æris, ſing. dra. iiii. miſyos, atramenti ſuto rij, aluminis ſciſi, ſing. dra. iiii. niiri, thuris, ſing. dra. ii. Sub canis æſtu cū aceto terito, & paſtillos forma to. Paſtillus Paſionis. Squamæ æris dra. x. ii. æris uſti, ſalis ammoniaci, aluminis, gruginis, thuris, ſing. dra. vii. Aeruginē cū ære, ſquama & alumine ſub ſole terito, & ad probē trita thus addito, ſimulq; teri to, ac paſtillos formato. Vſus eſt ex aceto. Polydus ſphragis ſue ſigillū, ut habet Aſclepiades. Aluminis ſciſi dra. ii. thuris dra. iiii. myrrhæ, aloēs, fellis tau rini, ſing. dra. vii. ſloris mali punci ſatui dra. x. ii. atramenti ſutorij dra. iiii. Excipe uino dulci & utere. Sigillū Coraciū. Facit ad tōſillarū inſtāmationes, luxatā columellā, & gingiuas humore ſtaccidas. Fa cit & ad nomas, & aſſectiones ſedis. Ariſtolochiæ rotundæ, ſlorū mali punci ſatui, chalcitidis toſtæ, thu ris, myrrhæ, atramenti ſutorij, crocomagmatiſ, aloēs, fellis taurini, æquales portiones paſſo excipe, uelut dictū eſt. Paſtillus Andronij. Ad ulcēra fluida, in ſtāmatas columellas, tonſillarū fluxiones, extrinſe cus ſub mētum illitus. Facit & ad pterygia oculorū, & glādularum circa inguina inſtāmationes incipiē tes, & ad ruptos inſteſtinorū abſceſſus, calloſq; fiſtu larum exterit. Florū mali punci ſatui dra. x. galla rum, ariſtolochiæ, ſing. dra. vii. aluminis ſciſi, ara menti ſutorij, ſingulorum dra. iiii. aliq; ii. aſtūm ha bent. myrrhæ, aloēs, thuris, croci, ſing. dra. i. ſingula ſeorū primū, deinde ſimul terito, & in paſtillos re digito. Inſunditur per clyſterē prout uultus tolerarint ad ruptos inſteſtinorum abſceſſus, ſi febris adſit, cum aquæ cyathiſ vii. ſi nō, cū uino. Paſtillus Antonij Muſæ. Aluminis ſciſi, aloēs, myrrhæ, ſlorum mali punci ſatui, ſing. dra. vi. atramenti ſutorij dra. iiii. croci, crocomagmatiſ ſingulorū dra. iiii. Terito ē ui no muſſo ex paſſo coſectō, & paſtillos formato, quos in umbra exicabis. Heras qdē & nos ita præ paramus. Aſclepiades autē hunc ad Ariſtarchū Tar ſenſem reſert. Et cætera quidē ſimili modo cōponit. Verū atramenti ſutorij dra. vi. accipit, & cum uino ſalerno paſtillos formare iubet. Facit ad ulcēra recentia ac uetera, putrida, marcida, efferata, phage denica, ac fiſtuloſa, & quæ priuatim ceria appellātur. Ad ozenas diluitur cū uino. Ad ſuppuratas aures cum ſapa & modico aceto. Ad condylomata item cum ſapa. Ad ulcēra genarum carbunculoloſa ac mali gna cū ſapa. Ad carnis excrcēſcēntias in naribus, ore, extremiſtaibus omnibus, uulſus, pudēdines, omnem eminentiā compellit, & digitorum reuēdus tollit, ulcēra caua replet, ſinus & fiſtulas melle dilutus ac cum lixiulo inſtillatus glutinat. Idē ad oris uulſa gar giſatur. Quod ſi ſemel in menſe fiat, neque dentes dolebunt, neq; aliquid incommodi ori accidet. Facit & ad teſtium ſacrum ignē, & articulorum inſtāmationes illitus. Et ad hæc omnia utitur eo Aſclepia des. Quod ſi mollire diſcutereq; uolueris, quadru plū ammoniaci miſcebis, & cū aceto ad mellis ſpiſſi tudinem conteres, illineſq; & alligabis. Si uerō em

plastris formā malueris, quadruplum terebinthinae ammisceris, adiecto etiam oleo si durius pharmacū apparebit, mollit enim & clariorē inducit, ac glutinat. Idē pastillus splenicis, hepaticis, ac dysentericis confert, & ulcerum ulcera sanat, & incipienti tabi auxiliatur. Dantur ex eo oboli tres cum familiari in singulis affectionibus portione. Per aliquot autē dies ducit urinas loturæ carnis similes. Itaq; ab eius uis desistendum non est ante sanitatem restitutam. Vis no quoq; mulso, & mali punici dulcis succo dilutus, & cum pēna illstris, anginis medetur. Verū interius dū illinitur, nauſeam excitat, & uomitum pro uocat. Ceterum crocomagma quod in pastillū recipitur, & quo ad capitis dolores utimur, ita preparatur: Croci dra. c. myrrhæ troglodyticæ, rosarū recentū reſectis unguibus, amyli recentis, singulorū draci. c. Cū uino ad collyrii formā terito, & pastillos formato. Porro pastillus ex solano haliacabo, superius ad fissuras ac tubercula sedis descriptus est.

De sanguinis eruptione, & quæ crustam inurunt,

Rusi.

Cap. II.

Quādoquidē pleraq; ex his, quæ ad sanguinis eruptio nē adhibemus, ad nomas quoq; usurpari solēt, anne ætemus etiā de sanguinis eruptione tractationē. Ex ea enim præsens aliquādo periculum incurrimus, exhibetq; ea res imperitis negotiū turbationemq; ac formidinē, ut ne medico quidē parua sollicitudo imā pēdet. Primum itaque nosse oportet, arterias ad sanguinis eruptionē magis q̃ uenas paratas esse. Perpetuū enim pulſant, amploresq; meatus ac solidiores tunicas habent, ut non facile cedant. Sanguis quoq; in ipsis cōtensus tenuior est, & plurimo spiritu abū dat. Quin & aliquādo obducta tunicæ cutis, & arteriarū fissura non obturatur, sanguis sub eum exit lit, & efficitur tumor, quem aneurysma, hoc est, arteriæ dilatationē Græci appellant. Ab arteria igitur aut uenā sanguis manat, uel oculus ipsarū aperitis, uel tunica diuisa, uel per transudationē, ut ita dicam. Porro tunica diuiditur, uel ex uulnere, uel ex contusione, uel rptione, uel erosione. Oscula uero apertū tur, aut ob multitudinē cōferim ad oculū uasis prorumpentē, aut propter acrē qualitātē extrinsecus alabentē, aut propter uasis imbedillitatē. Transudatio uero aut persulſatio fit, tunica quidem rarefacta, sanguine uerō attenuato. Potest tamen aliquādo etiā fieri paruarum uenularū osculis apertis. Si ergo ex uulnere, aut cōfusione, aut casu, aut clamore, ruptio cōtingit, causa iā præterijt. Si uerō ex multitudine, fieri potest ut adhuc nūc etiā uas amplius rumpatur, quum efficiens causa adhuc maneant. In huiusmodi itaque affectione, multitudo quā cūctissime euacuanda est. Deinde sanguis sistendus, postremō ulcus curandū. In quibus uerō iā cessauit causa efficiens, protinus sanguis sistendus est, & deinceps ulcus curandū. At quo modo sanguinē sistemus? Nimis ut ruptum adstringamus ac obturemus, & sanguinem aliō diuertamus. Obturabuntur autem labia uel digitis nostris, si in superficie ulcus fuerit, uel per deligationē, & per refrigerantium ac adstringentium pharmacorum adhibitionem. Nonnunquam & grumis concreuit sanguinis uasis oscula occluduntur. Cæterum ex his quæ imponuntur, aliqua adstringunt, aliqua meatūs obducunt, aliqua crustas inurunt. Quæ itaq; meatūs obstruunt, ad sanguinis eruptionem adhibe-

ta, citō occludūt. Quæ uerō crustas inurūt, crusta excidit uel uas cauum faciunt, & sæpiſſimē excidentibus crustis, sanguinis eruptio curauit difficilima sequitur. Quapropter eiusmodi medicamentis nō nisi cogēte necessitate utemur, uel uis iā putrida erosionē sanguis erūpat. Tunc enim omni putrido exciso, tutius est uel cauterijs mali radicē exurere, uel crustā inurētia adhibere, præsertim in pudendorum ac sedis affectionibus. Nā tales partes ob redundantem humiditatem, & acrium recrementorum transicum facillimē putrefcunt. Proinde in eligēdis medicamentis quæ crustam inducunt, non tātum caliditatem, sed etiam adstrictionem considerabimus. Talia uero sunt, misſy, chalcitis, atramentum sutorium. Quæ enim ex calce uiua & auripigmento sunt, uehementiora quidē his sunt, sed crustæ inde inductæ citō excidunt, eo quod nulla adest ipsis adstrictoria facultas. Quæ uerō ad adstringentibus inducunt crustas, diuini in corporibus persistunt; quæ res non modicā cōmoditatē afferit. Priusquā enim excidat, præuenit incarnatio, ut caro medijs partibus innata, itaqum operculum quoddā uasis fiat. Et hac de causa nō festinādum est, uel uis multi faciunt, ad crustarum ablationē, ubi eruptionis sanguinis periculum imminet. Sed in his tātum affectionibus, in quibus ob putredinem cauterium adhibere cōstitui uimus. Vocatur autē huiusmodi affectio Nomie, quoniam ab affectis partibus proſerpens, partes secundum naturā se habentes depascitur, & semper aliquā ipsarum ulterius inuadit. Medicus itaq; his cōsilijs instructus, ad sanguinis eruptiones curandas accedet, pro locorum natura, & uenarū magnitudine remedia adhibēdo. Et statim quidē diſſis oculum ulceris uasis apprehendat, leniter innitens ac cura dolorē comprimens. Simul enim & sanguinē sistet, & grumū uulneri infiget. Quod si uas, unde sanguis manat, in profundo etiā situm fuerit, exactius sanē hinc & sitū ipsius, & magnitudinē didicerit, & uis uena sit an arteria, cognoscat. Postea uerō immisso uicino extendat, ac moderatē ipsum obtorquet. Si uerō neq; sic sanguis sistatur, si quidē uena fuerit, cōnādum est ut citra uinculū sanguinem supprimat, per aliquod sanguinē sistens medicamentū. Optima autē ex his sunt quæ meatūs obstruūt, cōposita ex resina ſtriā, & ſarinæ tritici pollinē, ac gyppo, & alijs huius generis. Si uerō arteria fuerit, ex duobus alerū facies, aut uinculū circumdās, aut totū uas prædens ac dissectas, sanguinē sistas. Cogiuntur tamē aliquādo etiā magnis uenis uinculū obligare, atq; etiā aliquādo rotas ipsas dissecare, trasuerſas uidelicet: quæ necessitas incider in his, quæ rectæ ex alto sursum feruntur, & præsertim per angustiam illam quam aut principales partes. Sic enim utraq; pars utrinq; retrahitur, & ab incumbentibus corporibus uulnus tegitur & occultatur. His aut peractis, incarnādum uulnus est, priusquā uinculum uasis excidat. Nisi enim producta caro circumſitū dissectæ arteriæ locū præmuniuerit, sed uacuus locus inuentus fuerit, affectio sequetur quæ Aneurysma appellat. Quapropter in his potius suadeo, ut sanguinē sistētibz quæ meatūs obstruunt, utaris, quā his quæ crustas inurunt. Citius enim ac tutius post illa uulnus incarnatur. Optimū itaq; omniū quæ ego noui medica mētori est, quo etiā ad sanguinis & cerebri mēbris eruptionē tutius utemur, hoc est: Thuris partes.



aloës partē .i. cū oui cācido ad mellis cōpagē subige, & mollissimis leporis pilis excepta, uasi ac toti ulceri ubertim impone, & forinsecus fascia ex linteo deliga, ita ut primas quatuor aut quinq; eius obuolutiones super ipsum uas quod sanguine fundit facias, & hinc ad radicē eius procedas, deinde alternis diebus soluas, & si quidē adhuc tūto adhaeserit ulceri me dicamētum, rursus aliud ipsi circūfundas, & linamē tū prius ex pilis cōstans, uelut mādefacias, ac rursus uelut antea, deliges. Si uerō prius linamētū supra spō te exciderit, sensim per digitū uas radicē cōprimas, & hoc qdē leniter adimas, aliud autē apponas. Atq; eo curationis ductu ueris, donec uas carne impletū fuerit, egro in multa quiete seruato. At uerō hoc me dicamento uariē utimur, aliquando duplū thuris ad aloē addentes, aliquando ambo æquali pōdere misceātes. Sed & mannā quandoq; pro thure ammiscui, ut quē uehementius adstringat. Illud porrō constat, in durioribus corporibus ea quæ magis adstringūt, & plus aloës habent adhibēda esse. In mollibus, ea quæ plus thuris habent. Sed & ad sanguinis ē cerebri mēbranis eruptionē, & ad uulnera in collo, usq; ad ipsas iugulares uenas, medicamento utimur, quod plurimum thuris recipit. In his enim sanguinē circa uinculum sistit. Et quāuis multa sint quæ meatus obstruunt medicamēta, nullum tamen æque incarnat. Optimē etiā obstruunt meatus pharmaca ex pice tor resāta, & colophonīa, & puluere molendini parietibus adhærente, & gūmi, & tragacātha, ac similibus. Quandoq; etiam ex gypso præparata. Et symphyti quodq; radicē ad hāc præstāssima est. Maximē cōuenit, ut Medicus pharmaca sanguini sistendo idonea apud se præparata habeat, quō singulis oportundē opē ferat. Tale est siccū Philagrii ad sanguinē sistendū ex aloē & thure paratū. Primum autē digitis dissecātes partes cōmittantur ac cōprimantur donec cohæreant; tunc enim impactū medicamentum sanguinis impetū cohibet, qui amplius adhuc supprimitur, si leporis pilos molles sub uētre repertos ad impactū medicamentū apponemus, & ex eodē sicco superius spergemus. Atq; hoc ita sinēdū est, donec caro exere uerit uelut operculū sectioni obducta. Cōfert ad idē rhodiū suprà inter deprimentia ac cōtrahētia relati.

Cæterū quēdā ex sanguinem sistentibus, uelut diximus, crusta inducunt. Quædā cū siccitate adstringūt, quædā explent & glutināt; quorū aliqua magis parabilia referemus, quō ad singulas causas peculiare medicamentū in promptu habeatur. Ex his igitur quæ crustam inurūt, citra mordacitatē & efficaciter sanguinē sistit hoc. Sandarachæ, auripigmētū, chalcitidis, calcis, singul. drac. iiii. Hoc Ammonius chirurgus utebatur. Eo uero adhuc efficacius est quod habet chalcitidis dra. viii. aramentū sutorij drac. x. calcis uiuæ dra. vi. æris usti drac. vi. misyos, diphrygis singul. drac. v. Aliud celebre. Aluminis scissi, aramentū sutorij, gallarū, singul. dra. vi. misyos dra. viii. foreos dra. iiii. Hoc optimē facit & ad nomas.

Aliud ex erethria terra. Terræ erethriæ aut cimo lise, drac. viii. squamæ æris, aluminis scissi, resinæ aridæ, thuris, myrrhæ, singul. dra. viii. Aceti quātū satis est. Terito in sole ad cōpagem, & passilios formato. Aliud. Spongia nouā liquida pice imbuita bitumine trito inperfo, in olla exurito. Deinde eius sextātem accipito, chalcitidis, misyos, singul. un. i. At

si mitius facere uolueris; accepe spōgiæ ita uisæ sex tātē, plūbi usti & loti unc. i. stibij unc. i. Hoc crustā nō inducit. Aliud confestim sistens sanguinis eruptionē. Chalcitidis dra. viii. Thuris siue mānæ eius dra. xvi. resinæ aridæ, gypsi rectis, singul. dra. viii. Cætera, trita ac cribrata, in pyxide ærea seruato. Gypsum uerō quo tempore medicamento miscendum est, recens terito, & ammiscito. Aliud sanguinem sistens, citra crustæ inuentionē. Misyos, succi polygoni scissi, singul. dra. x. l. i. aluminis scissi dra. xxi. Aridum acetum rigatum spongia excide, & ulceri appositum deliga. Aliud Oribasij, facit ad pudendorū & rotius corporis nomas. Callos etiam exterit, & strumas sanas. Minij cū oleo rosaceo subacti, sulphuris uiui, auripigmētū, sandarachæ, calcis uiuæ, æquas portiones unito ac uitior. Aliud, optimum ad sanguinis eruptiones, Galeni. Gypsum & tritidū pollinem oui candido excide, & cum leporis pilis impone.

Aliud. Resinā pinus probē trita uel per se, uel cum thuris polline adhibe. Qui ergo plura medicamēta expetit, multa in simplicium medicamentorū libris, & in tractatione de singularum partium morbis inueniet. Sed & quæ nunc recensui, sufficere possunt. Omnia enim alia ex iisdē præparantur, & non longē uiribus inter se differunt, quædā fortiora, quædā debiliora sunt, ut cuiq; cōgruū eligi possit. Etenim quū Eunuchus quidā in summitate manus ulcus haberet, idē malignum euaderet, & citū circa eroderet, & sanguis ex ipso manaret, medicamētum ex thure & aloē apposuit albuginem oui exceptum, & hoc magis auxit sanguinis eruptionē. Detracta itaq; aloē, thus ipsum per se cum ouo imposuit, & neq; sic sanguis si sit potuit. Cognoui autē quōd ex multa sensus subtilitate hoc pateretur. Quapropter linamenta posca dilutissima imbura indidi, iustitq; itadē assidue super linamēta infillare, atq; ita statim sanguinis eruptionē suppressi, neq; ab eodē medicamento usq; ad exactā incarnationē destiti. Aliud, ad arteriā dissecāta. Sal cōmune & equi aut asini simū siccū, pari portione cū siliuio querdni cineris subactū impone. Aliud. Porrū cū acetum rufum impone. Aliud. Cochleas cum domib; suis, tū paruas tū magnas, uistas tritas impone.

Exedentia & uentia medicamenta.

Cap. iiii.

Erodenia & asitoria medicamēta ad columellas adhibemus assidue destillantes ac laxatas, & ad callosas carnis excrecentias, ulceraq; cancerata & strumas, quas erodere uolumus. Item ad coxendicū & articulare morbum, affectiones splenis, pro cauterio. Præterea ad fornicarias uerrucas, clauos, scifcos tu mores, & alia huiusmodi. Præcipua uero ipsorū uis est ad carbunculosa & maligna ulcera. Adhibita enim nomas compescunt, & crustas exterunt. Erosum citra mordacitatem. Squamæ æris drach. iiii. sandarachæ dra. i. uerarij nigri, auripigmētū, sing. drac. i. præstantius hoc euadet, si pro auripigmētū aluminis scissi par pondus adieceris. Aliud. Squamæ æris, sandarachæ, auripigmētū, uerarij nigri, seminis urticæ tosti, æquales portiones cum rosaceo terito ac uitior. Aliud, citra omnē mordacitatē crustas in altū inducēs. Squamæ æris, sandarachæ, sing. dra. i. uerarij nigri dra. i. Ad humida ulcera utere sicco: ad reliqua cū rosaceo. Oribasij erosuū efficacissimū, quo utor: Seminis urticæ, squamæ æris rubræ, sandarachæ, par pōdus cum rosaceo terito ac uitior. Aliud



Aliud. Sandarachæ, aluminis scissi, singul. drach. iiii. squamæ æris drach. ii. auripigmenti drach. i. Et si qui demque nome est, quæ adstringi debet, siccum adhibeto. Si uerò struma, aut canceratus tumor curandus est, rosaceo excipe, & quotidie bis impone. Ceratum ustorium, quo ad lippitudines utimur, temporibus adhibito donec rubescant, facit & ad coxendices, statim enim sedat dolorē. Cantharidū, atramenti sutorij, succi thapsiæ, allij, singul. unc. i. ceræ trientem, olei quinquē. Aridis ex aceto tritis liquabilia liquata, ammisceto. Et ubi locus rubicundus factus fuerit, illinito ea quæ ad ambusta ab igne præparatur. Aliud cauterium est uisco. Caldis uisæ, fecis uini ustæ, sing. drach. iiii. uisci drach. ii. nitri dra. i. Mitius hoc fiet, si caldis dra. iiii. solum acceperis, & saponis quantum satis est. At si desit sapo, lixiuij lib. i. ad tertias coquitor, atq; hoc modo præparato. Arida leuissimè trita, uisco ad ignē liquato excipies, & rudicula agiabis. Deinde ad frigēda lixiuij paulatim instillabis, & emolles, ut medicamentum strigementia spissitudi ne liquidius euadat. Quod in plumbea pyxide solidiore seruabis, & si resicceat, lixiuium subinde instillabis. Hoc ad menti impiegenes ad semihoræ spaciū illinito, & postea loco per spōgliam foto, albus men ois, aut emplastrū ex plumbagine, aut hordeo, paratum imponito. Hoc aliqui etiā ad coxendices, & splenis affectiones, ac articulare morbum utuntur, hoc modo applicantes. Linæolo cuidam detrito medicamentum aliquod glutinosum illinunt, & hoc rotundis foraminibus perforum adhibent, foramina uertētes eō ubi inuentionē facere uolunt; Atque istic medicamentū ustoriū ubertim imponunt, quo uidelicet pars requisita tantū inuratur. Tum brasicæ aut horæ folia superimponunt, & decē aut pluribus horis sinunt. Erablorum postea medicamentum, ad miti gatoria trāseunt, quæ ad ambusta prætur. Erosiuū incomparabile. Veratri nigri dra. iiii. squamæ æris rubræ drach. xii. sandarachæ, auripigmenti, singulorum drach. ii. atramenti sutorij drach. iiii. uenturium cantharidū dra. xii. Omnia lixiuiū excipito. Cauterium ad colymellas, Demosthenis. Caldis uisæ dra. iiii. fecis uini ustæ dra. ii. Sit autem fex nō uetusta, sed duorum mensium, nitri tosti drach. ii. minij drach. i. Cum lixiuiū ad mellis liquidioris spissitudinem terito, & bis aut ter ebullire finito, donec cogatur. Deinde in plumbea pyxide recensito, ne exareseat, & ea gratia subinde lixiuiū instillatur. Facit ad uerrucas cū alias, tū formicarias appellatas. reduuias digitorū, clauos pedū ac manuum, callos, & cicatrices eminentes, & carbunculos. At uerō post collumellæ utionē, oleum gargarisandū & in ore retinendū exhibeto. Tertia die transacta, ex aqua mulsā, aut lacte cū melle os eluatur, donec excidat crusta. Eodē modo etiā anthero, siue florido, aut phrygio medicamentū ueris. In alijs uero corporis partibus ad locum inuultū repurgadum, aluminis liquidū, amurcæ, melis cocti, æquales portiones misce & adhibe. Et post repurgata ulcera mitigatorijs medicamentis utere.

De sinibus, Galeni.

Cap. LIII.

Omnia sinuosa ulcera modo aqua mulsā, modo uino, modo uino mulsō, modo aceto mulsō eluimus. Ad extergendum enim saniem aqua mulsā præstat. Ad repurgandum uerō & roborandum uinum mulsū confert. Ad glutinationem, uisium. Ad cruen-

tum ac grauolentem humorem, acetum mulsū. At in diuturnis affectionibus incarnatione opus habentibus, medicamenta meatus obstruēda plurimoroseo diluta, per fistulam in directum perforatā, cui uelica alligata est, infundemus. In quem usum probe facit Machæronis emplastrum, & quod Ifig, & quod Harmonia appellatur, & pleracq; nigra. Sed & hoc quod subijdemus, probe facit. Primum enim sinus repurgat, deinde incarnat, postea glutinat. Corticem caprifici a teneris ramulis detractum in oleo coquitor, & oleo ex colato, ceræ quantum satis est ammisceto, ut liquidum & infusile fiat medicamentum. De quo quantum satis esse uidebitur, tepidum in sinum infundes, & parato ex eodem solidiore cerato, id ipsum impones ac deligabis. Pores & forinsecus imponere emplastrum barbarum, & quæ ex pice ac bitumine præparantur, & quod ex salicibus conficitur, & quod est uino mulsō, & quod ex spuma argenti, & Harmonia, & emplastrum Pissicatoris, & mellinū Pasionis. Ad eorū tamē qui uicinas partes teneriores habēt, magis cōueniunt emplastrā ex sale parata. Super emplastrū uerō spōgia acetomulsō, aut posca, aut uino imbuta imponatur. Deligatio uerō a fundo sinus incipiat, & ad osculū ulceris desinat. Et linteorū obuoluntiones circa dolorem quidem fundum sinus adstringunt, sed inde paulatim remittantur, ac laxius ad osculū ulceris cōnectantur: ita ut emplastrū quod forinsecus sinui adhibitu est, iuxta osculū forpice præcidatur, quo sanies excerni possit, & aliud paruum recti loco imponatur ex eodē medicamēto, si aut laxius propter eādē saniei excretionē, & alternis diebus auferatur, reliāto illo totū sinū ambiente. Deinde ubi sinū agglutinatū cognouerimus, ad cicatricem inducentia perge mus. An autē probe glutinatus sit sinus in profundo, ex pure effluente cognoscemus, si modicū effluxerit, & cōcoctū: Et si in ipso sinu neq; dolor, neq; tumor prædiatur, sed cōtractus fuerit locus siccusq; ac doloris expers. Illitudo ad sinus anticus. Gallas emphacitidas ad duas horas oleo macerato, & in fictile siue æneum lebetē cōiectas cum oleo coquitor ad prunas, donec nigrescant & uelut torresiant. Deinde ex oleo eximito, ac frigesactarum un. i. accipito, & aluminis scissi, aloës, singul. un. i. addito, & radicem altheæ siccatam, arthemisiæ unicula sicce, samplichi, sing. sextantem adijcitor, & singula seorsim terito, ac cribrato, & postea mista simul seruato, & usu expectante, uel luteo excepta illinito. At uero in ipso ulceris osculo paruum emplastrū impones ex passillo, qui ad Iudæum refertur. Idem medicamentum facit ad fistulas, herniam aquosam, & podagram.

De sinibus attritam cutē habentibus, eiusdē. Cap. LIIII. Inflammationibus ad abscessum mutatis si serius incisio fiat, cōtingit aliquādo ut cutis sinui incūbens tenuis, uelut derrium uestimentū reddatur, & propterea huiusmodi ulcera derrita appellantur, quæ difficulter coalescunt ac glutinantur, & præsertim si quis compage siccum medicamentum imponat. Ab his enim magis adhuc cutis deceretur, & exarefceret uelut pelles aride. Ad ea igitur glutinanda utendum est medicamento, compage quidem liquido, facultate uero siccō. Quale est phœnicinum emplastrum Galeni, quod nos ad huiusmodi affectiones præstare cognouimus, si ita paratum fuerit, ut neq; ualde durū, neq;

sic neq;

fit, neq; adhuc inquinare desierit, ita enim præparatum & cruenta vulnera glutinat, & omnibus ulceribus cicatricem inducit. Ad sinus autem detritos efficacissimū est, quod tenerū est & cōpagem mollē habet, & cum oleo ueteri ac uino moderate antequo resolutum est. Nam sicut duriciam ad hos usus improbamus: ita molliciem nimis fluidā reijcimus. Lique enim calido corpori incumbēs diffiuit, & linteolum siccum relinquit, quod nō solum nihil prodest, sed etiam glutinandæ cuti obest. Sed & mel modera te coctū ad hanc sinuum affectionem mirifice conducit. Cui myrrhā, uel aloē, uel thus probe trita, seorsim singula, uel simul omnia inspergere prodest, præferā si linteolo illitū mel liquidius appareat. Experientia sum & ceterarum tenue mirādum pharmacū ad hos usus: Deinde symphytū, & plantaginīs folia cū radicibus siccata. Conuenit & rumicis radix, oleastri folia: Verbenaca supina cū radicibus, uitis alba, iris, dictamnū, saluisa, polliū, sabina, cupressi folia, salicis succus. Et in teneris carnibus erit farina. Quæ omnia prius tūdine ac cribrāda sunt. Et ex eis tunc mellis ammiscendum est quum coctū ab igne auferatur, ita ut probe cum eis agitur mel donec tepidū fiat, imponatur linteolo inductum.

## De fistulis.

## Cap. LV.

Quandoquidem sinus male curati in fistulas mutari solēt, de his quoq; ex ordine dicendum est. Appellatur autē fistulæ per trāslationē a fistulis harundinū, aut ex alia materia coactis. Nā in ipsis cautus quædam est harundinum cavitatibus similis, & sinus callosus inest, qui circa chirurgiam aut fortius pharmacum rescindi nō potest. Fistulis itaq; obliquis sub cute extensis specilli nūdeū immittimus, & eleuata cute totā longitudinē in sectione incidimus. Deinde callos uelut fistularum causas, si in superficie fuerint, specillo deradimus: sin in profundum penetrauerint, capello rescindimus. Nisi enim rescindatur, neq; caro produci, neq; ulcus coalescere poterit. At si fistula non fuerit obliqua, sed decliuis & ad profundū uergens, fistulæ ambitū refecimus, tantū de carne circūstita auferētes, quo calli cōmode refecari possint. Si uero fistula in os desinat, ab ossē denudato, squamā deradimus. Cæterū fistulæ in os desinentes ampliores quidē nucleo specilli immisso ex renitentia deprehēduntur. In angustioribus uero apice specilli pertentamus, & durū ac ossē corpus occurrens cōtingimus, ac sonū quendā percipimus, uelut assis ere percussū, qua arte nō solū fistulā ossē cōtinguā esse, sed etiam corruptū aut illesum sit, dinoscimus. Inducto enim undiqueq; specillo, si tanquam a leui corpore ipsum semper lapsare percipimus, os incurruimus: si uero specilli alicuius partibus inhaerit, inæqualitates ac asperitates subesse indicū est, & ex eo os corruptū esse coniectamus. At in fistulis quæ amplissimā habent oscula, sæpe uisū os deprehēdimus, ut cōiectura nō sit opus. Si uero obliquæ fuerint, flexūq; aliquem uel plures habuerint, ut specilli apex progredi nō possit, utrigula plumbæ aut stannæ parabimus, qua iter pertentemus. Quū enim flexilis ualde sit, ad fistulæ figurā facile se accommodabit. Si uero propier nimis obliquitatē, fistula nihil tale admerit, ex humoris allati natura fistulæ terminū cognoscemus. Quod si fistula neruū attingerit, ex dolore indicabitur, punctiōnis enim sensum exhibe-

bit, aut stuporis. Deinde motus q ab illo neruo perfici soler, deerior apparebit. Sed & in specilli cōtactu molestus sensus perceptus, indicationem faciet. Humor autem inde allatus tenuior est, similis ei qui ab ossibus desluit, nō quidē oleosus aut pinguis, sed saniosus & glutinosus. Eadē uero accidentia cōmittuntur fistulas ad musculos penetrātes. In his autē quoq; earnes tantū penetrat, crassiorē ac humectiorē sanie reperiēs. Quæ uero uenas occupat, eadē accidētia habent q ad neruos sunt relata, sed imbecilliora, dolores itē ac pūcturas. Verū nullus motus impeditur. Idē uero etiā de his dicēdū est q ad arteriā pertingūt. At uero si fistula locū erodente uena suberit, plurimus ac crassus sanguis effunditur: Si uero arteria, tenuis & flauus cū multo spiritu ac fridore exilit. Atq; hæc nūc de fistularū signis ac differētijs, deinceps autē de medicamētis ad easdē cōferentibus tractādū est. Post callosarū igitur partiū resectionē, carnosius quidē partibus suppurādū du ctū adhibebimus, & desquamata ossa siccare conabimur. Basilicū itaq; emplastrū & reliqua huiusmodi inter suppuriatā medicamēta habentur, sicut etiā quæ capitalia appellātur desiccādū uim habēt. Linamenta quoq; melle illita cōmode induntur. Ad fistulas uerō inchoātes, nec adeo profundas, quarū chirurgiā ægri penitus reculant, medicamēta callos exterētia adhibebimus. Deinde remoto callo, curatone reliquis ulceribus cōmuni utemur.

Collyriū fistulare, ab antiquis fistulis callos extensens. Aramentū sutorij, mysyos, chalcitidis crudæ, æruginis, aluminis scissi, rubricæ sinopiceæ, gummi equales portiones aceto excipito. Quod si pro gummi mithus adieceris, & duodecuplū mellis ammiscueris, callosus sinus repurgat. At si uni eiusdem parti, octuplū mellis adieceris, incarnat & ad cicatricē perducit. Aliud, faciens ad fistulas antiquas. Mysyos, aramētū sutorij, aluminis scissi, ammoniaci thymiamatis, equales portiones excipe aceto. Aliud siccū, callos fistularū extensens. Cadmiæ, chalcitidis crudæ, sandarachæ, gummi, singulorū quadrante, æris uisi, mysyos crudi, singulorum sequilunciam. Aliud xyraphium, hoc est, callos deradens, ad capitū ac mēti scifosas papulas faciens. Mysyos, chalcitidis crudæ, singulorum drac. ii. aluminis scissi drac. i. præpara, & eloto prius loco, medicamentū uberitū insperge, & postriedu rursus eloto loco & calli ramentū spōgia deterfo, nouū medicamētū adhibeto, tamdiu hoc repetēs donec totus callus fuerit derasus. Et cauē dū interim est, ne olei cōtactu pars curanda inquinetur. Quod si ita uisum fuerit, poteris ammoniaci thymiamatis drac. i. aceto resolutam ad sepiē huius medicamēti drachmas ammiscere, & collyria efformare. Aliud Collyriū fistulare. Chalcitidis crudæ, mysyos crudi, æruginis, foreos, aramētū sutorij, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones aceto excipito. Aliud philosophi. Brasicę radicē, cucurbitā siccā, os canini capitis, cerui cornū, simul exurito, & ad cinerē ipsorum origanū, & sterus gallinacū, utrūq; siccum ac tritū ammiscito, & arida seruato. Vsu uero expetēte fistulæ osculū uino humectato, & siccum large inspergito, & linteolo imposto deligato. Hoc abscissus rūpit, & sanat fistulas chirurgiā nō dū attactas. Aliud elarne. Cōchas cūtestis, exustas & tritas adhibe: Vel carnes cochlearum cū myrrhā, thure & aloē in fistulam inde, externisq; impone. Aliud

Aliud, fistulas mirificè resiccans. Facit & ad seminis fluxum, capitis defillationem, aures contusas, ac dysenterias. Consumit omnem humiditatem. Idem pubi & lumbis impositus, muliebrem fluxum & hæmorrhoidas sistit. Cochlearum carnes cum domibus suis, bulbum paruum, bitumen, aloë, thus, cum aceto terito ac utitor. Aliud ad fistulas optimum. Polygoni folia à ieiuno commansa apponito, & uvas passas unâ cum uinaceis tritas superligato. Et ne cōtē pteris medicamentū usitaret. Aliud siccum Magistrianum, fistulas incarnans. Chamæleonis nigri radicem, corticem pinus, thus masculum, aristolochiam longā, singula paribus portionibus terito, & fistulæ aqua mulsa elotæ siccā inspergito. Aliud. Aloës sextantē, radicis anchusæ unciam i. Replet & incarnat. Aliud. Scillam in olla usitam ac tritam indito.

Aliud presentaneum, quod Hercules appellatur. Idē etiā ægilopas radicem tollit. Pridiæ uero papyrus in fistulam indatur, deinde collyrium ad fistulæ siue papyri mensuram immittatur, & per triduum sinatur, & in quarta fistulam prorsus sanatum comperies. Cadmiæ ostracitidis drachmas vi. æris usti drachmas v. misyos tostos drachmas ix. chalcitidis crudæ drach. vii. cantharidas numero septem, libanoridis fæcæ drac. i. hermodactyli radicem integrā, gummi drach. x. excipe aceto & collyria formato. Sunt qui aramentis furoris & æruginis singul. drac. vi. adiungunt. Aliud ad fistulas usq; ad os pertingentes. Squamæ æris, æruginis, ammoniac thymiamatis, singulorum æquas partes aceto subige, & pastillos efforma. Vsu expetente quantum satis est accipito, & ad ignem emollito, & collyria formato fistulæ æqualia, eaq; indito. Aliud Oribasij, ad fistulas & uibices, à Dionysio acceptum. Forsolorum lepidij herbę in umbra ficatorum, floris cinici, mellis depumati, terebinthinæ, æquales portiones. Arida cum aceto terito, & adiecto modico rosaceo, omnia simul ad emplastri formam subigito. Postea fistulæ ex aceto præfrictæ, lepidij folia sic trita inspergito, & splenium ex medicamento illi tum superimponito. Aliud, experimento cōstans.

Radicum liliorum ustorum cinere fistulam expleto, & callus exeretur, quo sublato simlacem herbā arundinibus se implicantem, herba cædido, folijs hortensii phaseli similibus accipito, eam quæ siccam usitam trita fistulæ indito, & incarnabitur. Aliud. Oleastri radicem usitam terito, & siccam fistulæ uino calido austero elotæ inspergito, & callus excidat. Aliud fistulas incarnans. Lapidem translucidum specularem appellatum urito, ac tritum fistulæ inspergito. Cæterum post usum eorum quæ callos exerunt, collyrijs repurgantibus utendū est ex erugine & melle cocto. Medicamentum sinus repurgans & incarnans. Myrrhæ, croci, aristolochiæ, rubricæ sinopice, singul. unc. i. Fel taurinum integrū, mellis quadrans. Fel cū melle coquito, deinde reliqua tenuissimè trita ammisceto, & rursus cogito, & collyria formato. Aliud. Muscij herbæ quā & dorcadadiæ uocant, misyos torrefacti, singul. drac. vii. i. salis communis, aluminis fæsi, æruginis, singul. drac. ii. chalcitidis drac. x. nitri, terebinthinæ, sing. dra. ii. i. mellis lib. ii. i. aceri libr. i. Quæ teri possunt terito, & omnia melle excepta coquito, & collyria formato, quæ in sinus ac cautates indes. Emplastrum Oribasij ad sinus & fistulas, & cædria præparatū. discitur enim stru-

mas: & ad elephantiæ tumores prodest. Cære, picis sicce, singul. lib. i. colophonij bessem, cædriæ sexuncæ, propolis trientē, uel ut alij habent, sexuncæ. Reliqua omnia donec non inquinēt coquito, deinde pro polim adiecto, unito ac utitor. Aliud. Picis, cære, singul. lib. i. colophonie, cædriæ, singulorū sexuncæ, coquito simul donec non amplius inquinēt, & pro polis sexuncem adiecto, & sublatis ab igne thuris, aloës, & aliquando myrrhæ, singul. unc. i. ammisceto. Emplastrum magus uel Hephæstius nuncupatur. Glutinat sinus & fistulas, & alia huiusmodi. Spumę argenti lib. i. scoriz argenti, quæ helcyfma Græcis appellatur, lib. ii. testæ cibani antiqui, cære, singul. lib. ii. i. olei lib. vi. succi coriadrī sextar. i. Simul coquito donec non amplius inquinēt, deinde cæra adiecto, unito ac utitor. Idem hydropicis confert. Quidā cæra nihil, quidā quadrantem saltē iniungunt. Alij uero ita præparant. Testæ scitilli lib. ii. plūbaginis lib. ii. olei sextar. i. Sed hoc modo compagem nō acquirit. Commodū est fistulis etiā nigrū ē lolio preparatum, & reliqua eius generis. Tuō etiam adhibetur quod ex argenti spuma paratur, & quod ex aceto & oleo. Virumq; in proximo sermone habetur. Cōmodat quoq; solum Galeni, quod ad maligna ulcera paulo antè descriptum est.

De Gangrenæ & sphacelo, Galeni. Cap. lvi. Gangrænā appellant, quādo ob inflammationis magnitudinē, mortificatio partis imminet. & nisi celerimē succuratur, pars ita affecta facile mortificatur, & malū ad contiguas partes proserpēs, singulis perniciē imperit. At ubi iam pars mortificata penitus sensum amisit, nō amplius Gangrænā, sed sphacelū, id est, caries, malū appellatur. Accidit autē hæc affectio etiam ossibus, quū circumscisa caro uitiosos humores generans, per hos illa perrigauerit ac putrefecerit. Proinde partem mortificatam celerimē rescicare oportet, quatenus contingit uicinam sanam, ita ut nihil prorsus putridi ac cariosi relinquatur: Deinde locum inurere, & postea scilicet cum melle, uel siccum capitale item cum melle adhibere, deinde panē exteriori, uel farinā ordeaceam aqua & oleo subactā imponere: Sed & iris & panadis radix, & aristolochia ac eruum crustas tollunt, singula cum melle. Ite Machæritonis emplastrum, & Iliis, cum rosaceo & melle diluta. Vbi uero crustæ exciderint, curationē reliquis ulceribus communem adhibeto. Cæterū priusquā pars mortificatur, & affectio adhuc gangrænā appellatur, sanguinem in loco affecto impactum, quātum eius fieri potest, plurimum euacuari mus: propter quod sanē mortificatio contingit, quum arteriæ ob locorum angustiam distendi non possint: atque sic reliquo perspirationem exhibebimus. Aut igitur si uena magna fuerit in loco affecto, hac dissecta corruptū sanguinē euacuare oportet, & sepe uel uariacē uel sella correptum excindere: Aut totā cutem affectā partis profundis sectionibus diuidere, aut uulnibus alioribus incusis scarificare, & sanguinem effluere sinere, & postea imponere phar-macum ad putrescentia commodum. Talia uero sunt, farina erui aut lolij cum aceto mulso, uel si hæc non sunt, fabacea. Quarum uires si intendere uolumus, salē adijcimus, aut aliquē pastillum leuissimè tritū, ad nomas suprā descriptū, qualis est Andronis, Passionis, & Musæ, & noster Alectepus appellatus, quibus omnibus pro ægroti corporis habitu ueris.

Rusticana enim & duriora natura, fortioribus medicamentis opus habent, molliora debilibus. Pro sunt etiam gangrænis nuces ueteres, farina lolij cum raphano & sale, & aliquando aceto. Vnae palasæ depis uinae cum raphani cortice, urticae folia, raphani semen cum aceto, quæ etiam crustas tollunt. Item lupinorum amarorum decoctum affusum. Aliud ad Gangrenas, Sordes maculæ adherentes illinito, & postea urina abluto. Nonnulli cedriam sordibus ammiscent. Aliud. Plurimas lacus ex emptis fibris cum loliacea farina imposito. Aliqui tridis farinam accipiunt. Aliud, hoc & utiliginis & alia huiusmodi sanat, & inflammationes mitigat. Herbam caranancem urito, eiusque drachm. viii. cum gummi drach. xvi. cum aceto terito & imposito. Aliud. Aeruginem, rubricam, alumen fessile, paribus portionibus ex aceto trita adhibito.

De canceratis tumoribus, eiusdem. Cap. LVII. Cancerati tumores ex atra bile crassiore efferuente generantur, quæ si etiam acrior fuerit, ulceratos tumores efficit. Quapropter huiusmodi tumores inflammationibus aciores sunt, citra tantam caliditatem habentque uenas plenas & circum circa extensas, ad similitudinem pedum canceri animalis. Quandoquidem uero è profundo inutilis sanguinis multitudo attrahitur, ideo uariolose redduntur uenæ, & insanabilis morbus efficitur, quum ob nimiam crassitudinem humor neque repellitur, neque discutitur, neque per totius corporis purgationem leuari possit. & leniora quidam medicamenta adhibita contemnit, ab acrioribus autem irritatur. Plerumque tamen potest ut incipientes cancros, prius quam in affecta parte confirmetur, augeri prohibeamus, atræ bilis humore euacuato. Primum itaque mitioribus ad hoc utemur, quale est Epithymum cum fero lactis, deinde Hiera Rustica, quæ ueratrum pro uilrino robore ammixtum habet. Ad solani succus fornicatus illitus, ulceratum cæcum mirifice mitigat. Ex eo autem linteolum molle duplicatum madefactum imponendum est, & supra ipsum quoque lina tenera imponenda eodem succo imbuta, sed & ipse succus assidue his superfundendus est, ut ne hæc exarescant. Utendum est & medicamento è pompholyge ad cæcos ulceratos. Sed & hoc quod subiungam, ad cæcra ac maligna pudædorum, scroti, sedis, mamillarumque affectiones, & ad ani ac muliebrium locorum rursus & tubercula efficax est. Oleum rosaceum & hyoscyami, aut solani, aut semperuiuæ, aut umbilici ueneris, aut psyllij, aut uinæ acerbe succum, in plumbeo mortario, cum plumbeo pistillo ad frigiditatem copagem terito. Conferat & cancri uisti cinis cum cadmia lora inspersus, uel cum cerato adhibitus. Idem etiam gangrænis conductum. Aliud. Irionis semen cum melle ad emplastrum formam terendo redactum adhibeto, & maligna ulcera in quacunque corporis parte dicto ad cicatricem perducet. Idem facit & malicorium uisum tritum inspersum. Aliud, ad cæcra & maligna. Testudinæ terrestrem donec inalbescat urito, & cinerem ad aliam cum butyro, ad cancos uero ulceratos cum oleo dulci ad emplastrum formam subactum, splenio illinito ac imposito. Repurgat enim, costringit, & ad cicatricem perducit. Et prohibet ne malum reuertatur. Adhibetur idem utiliter & gangrænis. Nec incommoda est Theriaca Andromachi cum modico rosaceo diluta. Aeger porro pisanæ succo

uberissime alatur, & lactis fero. Et ex oleis, malua, atriplice, bitito, & acurbita. Piscibus uero petrosus, & uolucris omnibus præterquam palustribus.

De carbunculis, ex eodem.

Cap. LVIII.

Carbunculi à sanguine atrabiliario effructu, & ad partem aliquam irruente generantur, & sunt sanè ulcerata crustosa, plerumque à pustula incipientia, aliquando etiam citra hanc. Pruritus ceterum in principio in parte affecta adest, deinde modo una pustula, modo plures tenues, uelut milij grana, insurgunt, quibus rumpis similiter crustosum ulcus succedit. Quid si etiam crusta pustulas cutis excoriatur, semper tamen crustosum apparet ulcus, uelut ea quæ à cauterijs sunt, crusta iam cinereum, iam nigrum colorem habente, & fundo adherente, & uelut clauo affixa, comitante etiam noma depascente. At reliqua caro circumfusa uehementer inflammatur, & nigra fit ac splendida, instar bituminis & picis. Talis autem est exquisita atra bilis. Febris autem ægrotos longe uehemetior quam igne facro correptos inuadit. At uero carbunculi qui iuxta carnem consistunt, cito abolentur. Qui uero in membranis aut nervis sunt, diutius permanent, & subiectos locos per consensum afficiunt. Nā qui caput occupat, ad collum aut ceruicem, aut pectus, aut brachia, aut sub alas, consensum distribuunt. Qui uero pudenda inuadunt, crura & inguina simul afficiunt. Alique uero partes etiam ad suppurationem ueniunt, quæ uidelicet magis expositæ sunt iniuriæ. Dolores insuper accedunt longe maiores quæ pro paruitalis radicis. Sepe etiam in re purgato ulcere, membrana aut nervus putrefactus, medullæ speciem præ se ferens eximitur. Carbunculum igitur ubi primum eruperit, statim curare oportet, sanguine usque ad animi deliquium euacuato. Nisi enim uicinas sectiones quod prohibeat, nullo auxilio maius emolumentum consequitur. Post factam uenæ non incoueniens est locum scarificare, uulnusculis profundioribus impactis, ob humoris crassitudinem. Deinde alius eluenda est, tenuissimamque uictus ratio cum quiete & tranquillitate imperanda. Ad locum uero nihil uehementer repellens aut refrigerans adhibendum est. hinc enim malus dispendium, quam copendium sequetur. Nō tam affluxus negligendus est, sed medicamenta adhibenda quæ cum moderata repulsiue etiam discutiunt. Tale autem est ex plātagine & lenticula cocta castaplasmā, cui addita est panis cibano cocti, neque nimis puri, neque fordidæ medulla. In ipso uero carbunculi ambitu emplastra imponantur ad ambusta descripta. Super ipsum uero ulcus fortiora pharmaca imponemus, quale est Andronis, aut Pasonis, aut Polyidæ pastillus, & reliqui huiusmodi ad nomas parati, cum passo ad mellis copagē diluti. Carbunculo rursus autem crustas mirifice eximit, & fluxionē ad locum sistunt, uerberacæ resæ folia cum adipē uritæ & appō sita. Idem faciunt & cupressi folia ac tenera germinia, & pilulæ teneræ cum polenta. Aliud. Gallinaceus sterco succum cum axungia subactum ipsi solum carbunculo imposito, & bene sperato. Aliud. Nitri & rutæ pares portiones cum aceto adhibeto. Aliud. Fimi columbini, & seminis lini, æquales portiones cum melle imposito. Aliud. Silphij, rutæ & nitri, æquis portionibus cum melle soli carbunculo imposito. Sepe etiam erodenda aliqua supra descripta ulceri imponimus, & per linamētā indimus. In ambitu uero carbunculi lenticulæ coctæ discutiuntur. Aliud

ad carbūculos mirabile. Liliſorum radicē recentē & humidā ad emplāſtri formā tritā imponito, & braſſicæ foliū ne exareſcat ſuperimponito, & admiraberis. Circūſcariſcat enim & cruſtas eximit, repurgat, replet, ad cicatricē perducit, ut ne veſtigij quidē eius appareat. Aliud Oriſaſij, minimē contemendū. Saponis partē unā, axungīæ ſātundem, ſalis, cineris ſarmentōrū uitis, aut lignorū ſici, ſingulorū dimidiā partē, præpara & adhibe, & forinſecus panē illine.

Aliud ſiccū, ad carbūculos & nomas. Chalcitidis crudę, miſſyos crudī, atramētū ſutorij, æris uſi, æqua les portiones ſub ſole in aceto terito donec ſiccetur, & utere ſiccō. Miſy uerō nō uratur, ſed ſātum torreatur. Siccū Oriſaſij, ad carbunculos, nomas, gāgræ nas, ulcera antiqua & chironia, & ad ſtrumas ac po dagras. Spumæ argenti librā i. olei antiqui ſeq̃ui librā, auripigmentū unc. i. Spumā argenti cū oleo coquito donec non inſuinet, & ablatis ab igne, auripigmentū adſicco, ac ruſſus coq̃to, donec nigreſcat. De inde manibus refrigeratū ſubigito, & uitōr, ad ſtrumas quidē, tali quale eſt, ad alia uerō cum oleo diluto, quo linamentis illini poſſit. Aliud Maſſilēſis, quod ſuæ ciuitati cōpoſuit, quum in ipſa carbunculi ſæuient, & multos occiderent. Bouis armētarij ſimum ſiccum ac tritum ſeruato, uſu uerō expente aqua madefactū ſoli carbūculo imponito, & linētū aqua humectum, aut caſapiſma c lentuſcula ſuperponito. Aliud. Chryſocollæ, niri toſti, lapidis aſij, auripigmentū, ſandarachæ, miſyos torrefacti, chalcitidis, aluminis ſciſſi, diphyrgis, ſingul. drach. iiii. terito, & in aëro uale ſeruato. Viſy uerō tempore, cū ſpectilli nucleo in ipſum carbunculi ulcus indito, & uiride ſubſcriptū ſuperimponito. Emplāſtrū uiri de. Thuris, æruginis, ſingu. drachm. i. ſquamæ æris, aluminis ſciſſi, ſalis ammoniaci, ſingulorum obol. iiii. ceræ drac. viii. reſinæ pinus ſiccæ dra. xvi. olei lib. i. Arida ad ſolē in aceto terito, & reliqua liquata adſicco, ac uitōr. Aliud Aſclepiadæ. Niri torrefacti, ſucci cyrenenſis, ſingul. drac. iiii. ſaſeris drac. iiii. ſ. cerę, colophoniæ, olei, ſingulorum ſeq̃ui ſundam, præpara & adhibe. Carbunculi humorem ſeciſcat, & circūſitas partes ſcariſcat. His autē ſcariſcatis, ute re hoc quod mox deſcribā: Nā poſt ſcariſcationem carbunculos à uicinis partibus raditūſ euellit. Mali punici acidi recētis ac maturi corticē, exemptis interioribus in aceto coquito, & ſclacidum factum tritū & ſuper lineolum ad emplāſtri formā exteſum adhibeto, aſidueq̃ acetum ſuperſtillato, ne exareſcat. Idē etiā in paſtillis formari poſſet, & in umbra ſicari, qui deinde uſu expēte aceto diluti adhibētur. Hoc ego frequēter in principio uſus ſanitate reſtitui. Cæterū pudendorum carbunculos eodē modo turabis, quē in oculorū carbunculis retulimus. Conſert & mel ammixta ſapa coctū, & cum ſpectilli nucleo ſæpe præputio impoſitum. Aliud Oriſaſij, ad carbūculos. Chalcitidis, atramētū ſutorij, ſingu. drac. viii. ſpumæ niri drac. i. cū aqua tere & utere. Probē facti & ouillū ſtercus torrefactū cum melle. Aliud, ad carbunculos, nomas, putredines oris, ſuppuratas aures, & digitorum reduuias. Aluminis ſciſſi drac. viii. chalcitidis drach. vi. ſandarachæ drach. iiii. maſſicorij, miſyos, atramētū ſutorij, niri, omphaci ſici, ſingul. drac. ii. præpara & utere arido, uel cum melle, & leniſculam coctam cum pane ſuperimponere.

De eryſipelate, hoc eſt, igne ſacro, Galeni. Cap. lxx. Flaua bilis tenuior & acrior facta, unā cū ſanguine ad aliquam corporis partem irruens, eryſipelas efficit, quod aut exulceratur, aut ſine ulcere exiſtit. Si itaq̃ ſanguis dominūſ habuerit, inſlāmatio ad eryſipelatē naturā uergens exoritur. Si cōtrā, bilis dominatur, eryſipelas ad inſlāmationē tendēs appellatur. Quod ſi neuter humor exceſſerit, affectio inter eryſipelas & inſlāmationem media uocatur. At uerō eryſipelatis tumor ſeruientior ac ſlauior quā inſlāmationis percipitur, non tamen dolorem, neq̃ puſſum, neq̃ preſionem, neque tenſionē inſlāmationi æqualem inducit. Sæpe enim per cutem tantum diſſunditur, carnē nulla inuria aſſiciēs, atq̃ hoc eſt quod exa dē Eryſipelas nominatur. Grauiora uerō ſunt eryſipelata circa caput, quare niſi efficaciſſibus auxilijs opē feramus, partes tonſillarum per cōſenſum aſſidunt, inſlāmantēſ ac ſuffocant. Ea igitur uenæ ſectiōne curabimus, ſi ſanguis redūdarit: Sin bilis, per medicamentū hīc flauā expurgās. Venitur & infulus efficaciſſioribus. Et quod inſuſit repellemus, & ſeruorē reſiſ gerabimus, per ea quę humectāt: ſimulq̃ frigefaciūt. Sit autē terminus refrigeradi, mutatio coloris. At uerō id quod nō exactē eryſipelas eſt, led quodāmodoq̃ ad inſlāmationis naturam uergit, liuidum cutem facit, ſi plus æquo refrigeretur. Et niſi medicus deſiſ terit & refrigerado, etiā denigrabit, præſertim ſi ſenile fuerit corpus quod curatur, ita ut eryſipelata ſic refrigerata, ne diſcuſſorij quidē medicamenis diſcuti poſſint, ſed induratum quendā tumorē in parte relinquās, proinde præſtat ab humectantibus ac refrigerantibus ad diſcuſſoria progredi, poſtquam mutatus fuerit color, antē quā niger aut liuidus appareat. Sunt autē humectanda ac refrigeranda, citra manifeſtā adſcriptionē eryſipelatis cōmoda, ſolanum, ſemperuium, portulaca, umbilicus ueneris, pſyllium, lenicula paluſtris, hyoſcyamus, & glaudum, et cetera ex frigida aqua præparata. Cera enim cū oleo optimo, præſertim roſaceo uel omphacino liquatur, & ceratum liuidum fit, quod frigefactum in mortario aqua frigida paulatim inſtillata, quātum imbibere poſeſt, cū piſtillo teritur. Sit autē oleum duplū, aut quadruplū, ceræ reſpectu. Si uerō tenuis & albi ac pellucidī aceti modicū aſuſerit, medicamentum refrigeratorium magis efficiēs poſeſt & ſuccus aliquis herbarum relatarum ammiſceri: paſtilli quoq̃ ad eryſipelata præparati, nō affectūs modō paritibus, ſed ſanis quoq̃ uicinis adhibēdi ſunt, & aſidue permuatādi, cuiuſſimē enim reſiccantur ac uires amittunt, prioribus itaq̃ per ſpongiās ex tepida aqua expreſſas elotis, rectes adhibeātur. Paſtillus Andromachi. Quo uor, inquit, ad eryſipelata. Spumæ argēti lib. ii. ceruſſæ lib. i. opij, ſulphuris uiui, croci, ſingulorū quadratē. Excipe paſſo & utere cum paſſo. Oriſaſius autē paſtillus, inquit, ad eryſipelata admirandus ita præparatur. Spumę argēti, ceruſſę, croci, ſulphuris uiui, opij, ſingulorum quadrantem, paſſo excipito. Alius. Acacię dra. viii. miſyos dra. iiii. thuris dra. iiii. opij dra. ii. præpara & utere, uel ut diſci eſt. Ad ignes autem ſacros aceto dilue. Quidā etiā aloēs dra. ii. adſciunt. Cæterum ad eryſipelata faciē præſertim, hīrundinis nidum iritum ac cribratum melle excipito, & cum penna illinito: citō enim diſcuties: ac ſcdata inſlāmationē, priuſquam pars liueſcat,

scat, discussoria adhibenda sunt, & aqua calida affundenda, itēq; marina ac muria. Cataplasmaticis etiā eadē ammikeatur, cōfert & brasiica per se uel cū po-  
lenta adhibita, aut mādragoræ radix cū pane & ace-  
to. Aut terra singularis cū coriandrī succo. Aut ceratū  
rosaceū paulo antē descriptum cum calce. Quod si li-  
uor aut durities partē affectā præoccuparit, scarifi-  
catum profundior fiat, & marina aqua aut muria  
affundatur, deinde uerō cataplasmata adhibeantur.

De Herpete, ex eodem.

Cap. lxx.

Si fluxa bilis citra alterius humoris mixturam secreta,  
iuxta partem aliquam cōstitit, Herpes appellatur  
affectio. Si quidem igitur crassa fuerit cōpage, & ma-  
gis acris, omnem cutem usq; ad subiectam carnem  
exulcerat, & uocatur Herpes exedens. Si uerō te-  
nuior fuerit, & minus acris, superficem solum uelut  
inurit. Atq; hæc species generis appellationem tulit,  
simpliciterq; ac citra appositionē, Herpes uocatur.  
Est enim adhuc tertia herpetis species quæ Miliaris  
appellatur, uel quod pustulas paruas & multas in su-  
perficie cutis ex citat, milio similis. Oritur autē etiā  
ipsæ à bile, uerū minus acris & calida quā priores.  
Aliq; uerō hunc pituitæ ad bilem fluxum ammixture-  
nem fieri putant, proinde herpetem curabimus rectē, si  
præuacuatō uni uerso corpore, localia deinde medi-  
camenta adhibuerimus. Qui uerō cui solidandæ sta-  
tīm à principio intentus est, hanc curam fanabit, ue-  
rum humorem affluentem non prohibebit, sed sem-  
per prioribus ulceribus solidatis, contigua cutis rursus  
uelut prior in superficie erodetur. Itaq; in herpeti-  
bus erodentibus, sero laetis cum scammonia exhibi-  
to, totum corpus euacuabimus. In miliaribus uerō  
pharmacum exhibebimus, quod bilem simul ac pi-  
tuitam educat. At uerō partibus affectis non eadem  
quæ erysipelatis adhibetur. Tameñ enim refrigerati-  
one uelut erysipelata opus habent, nō tamen item  
humectatione indigent. His itaq; medicamenta refri-  
gerata ac simul resiccantia cū adstrictione cōueniūt,  
ita ut erodentibus quidē, & in superficie hærentibus,  
mitissima adhibeamus: miliaribus uerō magis dis-  
cussoria. Quare neq; lactū, neq; semperuiui, neq;  
quicquā aliud refrigeras ac humectas adhibebimus.  
Sed in principio facta purgatione, pampinos uitis,  
rubig; aut polygoni, aut plantaginis folia impone-  
mus, postea uerō his etiā lenticulā, & mel, & polentā  
mistebeimus. Illudines uerō ad herpetas commodæ  
sunt, acacia cū aceto, plātagnis succus, glauciū passū  
dilutū. Ad pustulosum uerō herpetē, plūbi recemē  
cum uino austero tritū illinitur, & folia betæ in ui-  
no cocta imponuntur. Aliud. Olei myrtē sexū, &  
cremētū plūbi tritēt, cere tritēt. Recremētū dilue cū  
uino, & liquata cera excipe, & illine. Aliud, ad her-  
petas uhemētē erodētē. Lanæ succidæ mollis tēde  
obuolutæ & usæ dra. iiii. malicorij & punico malo  
dulci, spumæ argētī, singulorū drac. x. ceræ, & adipis  
caprini, singulorū sesquiundā, olei myrtē trientem  
aut quincuncē. Præpara & uere. Ad herpetem uerō  
sub cute extātem, plumbi recemētū cum succo po-  
lygoni tritū illine. Aliud ad herpetas. Lanæ mol-  
lis succidæ tēdæ obuolutæ & usæ dra. x. i. s. recre-  
mētū plūbi sesquiundā, ceræ dra. x. v. adipis caprini  
depurati, & frigida loti dra. x. v. olei myrtē quincū-  
cē, præpara & uere. Aliud, ad herpetas pustulasq;  
superficialias insignē medicamentum. Cornu capri-

num usum cum aceto tritum illinito. Cornu uerō  
urendum super flāma deineto, exurgentesq; bullas  
excusito, & postea in mortario terito. Idem præstat  
etiā cornu ouillum & præcipue aricum. Possēt  
idē cinis edam cerato excipi. Pastillus ad herpetas.

Terræ cimoliz, rubricæ sinopicæ, singulorū dra.  
iii. misyos torrefacti, aluminis rotundi, corticis thu-  
ris, singulorū dra. vi. terito ex aqua, & formato pas-  
tillis: Vtere uerō cū aceto aut uino myrtē. Alius  
pastillus. Misyos drach. vii. salis fossilis drach. iiii.  
gummi drach. ii. Terito cum uino & formato pastil-  
los, & utior cum uino. Alius. Aluminis scissatæ  
menti futori, salis fossilij, singulorum drach. ii. exci-  
pe aceto, & utere cū passū. Alius prædurus. Alumi-  
nis rotundi, chalcididis, melastæ, foreos, singulorū  
drachmas duas, misyos, malicorij, acaciæ, singulo-  
rum drachm. iiii. calcis uiuæ dra. x. vi. aceti sextar. i.  
tere & forma pastillos, & utere cum aqua. Ego uerō  
his omnibus fortioribus, & Andronio ac Muscæ  
pastillo, & reliquis huiusmodi, ad affectiones dis-  
turnas utor. Quum enim fortissimī sint, ualde resic-  
cant, quapropter in principio lenioribus utendū est.  
Est & hoc medicamentum ad diuturnas affectiones  
mirabile. Nitri, chalcididis, aramēni futori, mi-  
syos, calcis, acaciæ, partes æquales aceto excipe, &  
utere cum aqua. Ceratum ad herpetas excoriatos.  
Ceruleæ, spumæ argētī, radicis anchusæ usæ, singu-  
lorum drachm. ii. pollinis thuris, aluminis scissi, sin-  
gulorum drach. i. ceræ drach. x. vi. adipis uituli dra-  
chmas centum, olei sexuncem, ouorum candidum  
duorum. Arida cum uino tere, & liquatis reliquis,  
ammike. Aliud ad excoriatos herpetas. Ceruleæ,  
spumæ argētī, radicis anchusæ crematæ, singulorū  
dra. iiii. aluminis scissi, misyos torrefacti, singulorū  
dra. i. resinæ pinus dra. vi. ceræ trientē, olei myrtē  
lib. i. & trientē, uini heminam unā. Arida cum uino  
tere, donec fuerit cōsumptū, deinde cum liquatis cō-  
mitte, & paratū medicamentum linteolo inductum  
adhibe. Cōuenit quoq; emplastrū ex hordeo, oleo  
dilutum ad eosdē herpetas, foueat ut cū rigetur lo-  
cus assidue per spōgiā ex uino, uel si id nō liceat, ex  
aqua expressā. Et humiditas tenui linteo exterga-  
tur, & postea relata medicamēta adhibeantur. Neq;  
interim squamæ ab ulceribus deirahantur, donec spōte  
excidat aut discendant, neque splenium durum impos-  
natur. Si uerō depascendo prosperentia fuerint ulce-  
ra, cataplasma ex lenticula cum melle adhibe. At si  
pura & nuda fuerint, & nome sedata, spumā argen-  
ti aut plumbaginem, cum uino tritam impone.

Ad Epiphytidias, hoc est, pustulas nostri erym-  
pentes.

Cap. lxxi.

Epiphytides ulcusculæ sunt spontē erumpētæ, pustulo-  
sæ, subrubra, quibus ruptis sanies subcruenta effluit.  
Hæc interdiu non ualde infestant, noctu uerō ma-  
iorem dolorem excitāt, quā pro ulceris magnitudi-  
ne. His itaq; medentur brasiica, uel solani, uel hyo-  
scyami, uel rhamni folia, cum melle imposita, &  
plantago trita, & centaurium uiride, & uua passa cū  
ruta, & cucumeris satui folia, cum aqua, & semitū  
cum aceto tritum. Egregiē facit & calx cum oleo ad  
mellis compagem subacta, imposita, & lafer cum  
aqua, desiccat enim abque mordacitate. Aut sulphu-  
ris uiui, & spumæ argenti pares portiones, cum ace-  
to & oleo myrtē ad strigmentium formam tritas



adhibe. Ego uerò, inquit Oribasius, oleum nō admittō, & pro aceto potius cum uino tero. Lenticula itē cōcta, & emplastrū ex polline tritici, utiliter imponitur, postquam uero epynchitis exortita fuerit, ac plastris liquidis utere, & caue ne acria, & acida, ac falsa adhibeas. Vitāda sunt itē fomēta, balnea, & sol.

De termintho.

Cap. LXII.

Terminthus tuberculi species est. Incumbit autē ipsius pustula nigra superne ac inferne, qua rupta inferne desquamato similis apparet, hoc autem dissecto, pus insinuitur. At uerò curatio huius similis medelae pustularum nocturnarum iam relatæ.

De papulis siue pustulis.

Cap. LXIII.

Papulae quibusdam exoriantur similes his quæ à ferulā aqua ambustis emergunt, non tamen multum do- lorem inducētes. Quibus ruptis subfluit humoris copia paulatim effluit, ad bīdium aliquando ac trīdium durans. Hæ seminis quibus menstrua deſce- runt, aut aliis non rectē profluunt, sæpe in cruribus oriri solent. Infantibus uerò aliquando in toto cor- pore. Verum utris rarissimē accidit. Quomodo uerò infantum ulcera curare oporteat, iam antea sermone quarto, ostensum est. In seminis autem mē- ses oportune cedere oportet. Virorum uerò corpora congruo medicamento purgare. Vtrisque uerò alia- menta alium emollientia exhibebimus, & urinas proliciemus. Acriaq; ac falsa prohibebimus. Ipsas autem pustulas acu perforare oportet, & humorem excludere, & emplastrum tritici polline adhibere. Euacuatio uerò humore, & non amplius effluente, id quod ex hordeo præparatur, apponendum est.

Ad ambusta ab igne.

Cap. LXIII.

Corpora ab igne aut ferula aqua ambusta, moderatē extergentibus pharmacis opus habent, citra manife- stam calfactionem aut refrigerationē. protinus itaq; ad pustularum bullas prohibendas, terra quæcūq; occurrerit, modō levis sit, in teneris carnibus cum aqua, in durioribus cum posca illinatur, præstat ta- men terra dimolia, si haberi potest. Ouum item crus- dum molli lana exceptum, refrigerat & siccit citra mordacitatem, & thus cum aqua tritum, & betæ so- lia contusa & cōcta ac cum uino imposita. Et alumē omne cum aqua et oui candido. Facti & hoc mirifica- cē. Aeruginis & spumæ argenti pares portiones cū uino & oleo tritas, cum pēna illine. A manu enī cōtractu prorsus abstinere oportet, & tenuē linteolū superimponere. Quod si bullæ emerſerint, eas in prin- cipio ne rumpas, si uerò durauerint, rumpe & cera- tum impone, potest aut pastillum præparari, ac in hūc usum feruari. Aluminis drac. iiii. thuris drach. ii. cū aqua terito, & pastillis formato, ac utitor cū posca.

Alius. Cimoliz sextantem, cortidis thuris, misyos uſti singulorū drac. vi. rubricæ dra. iiii. cū aqua forma- to pastillis, & utere cum posca. Ceterum cūcta- ri non oportet, sed statim terram quæcūq; ad ma- num fuerit cum aqua illine, eamq; postea tepida posca abluere, & quæ relata sunt adhibere, porro ad ambusta iam pustulosa, rhōem & potentam aceto trita impone, aut iel pordi cōctum, aut hyoscyami uſridis succū asiducū illine, & bullæ marcescēt. Ex so- lijs quoque hyoscyami uſridibus pastillos forma- & in umbra exicca, & in hyemē referua, quos usu expetente aqua dilue. Aut calcem uiuam cerato li- quido exceptam, & linteō inductam impone. Aut

myrrham uino tritam adhibe. Excoriatis uerò & ul- ceratis, betæ folia in uino cōcta ac trita illine. Aut ad ceratum rosaceum liquidum, betæ succum paulatim insilla, quantum imbibere potest. Sint autem olei partes tres, ceræ una, succi quantum satis est. Vtere, & miraberis. Aliud. Fimū columbinum panni- culo linteo illigatum exurito, cineremq; cū uino trī- tum, aut cerato exceptum adhibeto. Aliud. Lupi- norum madaſactorum & cōctorum, quales quoti- die comeduntur, cortices in mortario tritos, uncia pondere accipito, & cum ceræ sextante, ac olei quin- cunce colliquitis, commiscito ac utitor. Sed & hoc ambusta citō ad cicatricem perducit. Cersuſæ, spu- mæ argenti, hordei uſti ac triti, singulorum unc. i. ce- ræ quadrantem, rosacel aut myrti dodrantem. Hor- deum ad ceratum liquidum ammiſce, & postea spu- mam argenti ac ceruſam in mortario cum uino tri- tas adſice.

Ad flagellatos.

Cap. LXV.

Pellem ouillam recens detraſtam & adhuc calentem flagellatis dīcūda, omninoq; intra unius diei ac no- ctis spatium ſanabit. Cōfert & brasicaſ fuccus affu- sus. Est & hæc irrigatio inflammationi accendē cō- modissima. Olei partes iiii. aceti partem i. furculorū anethi fasciculū i. Acetum & oleum asiducū per- anethi fasciculū agitata coquuntur, ad aceti cōsum- ptionem. Deinde adiſcitur cera, quanta satis est ad- ſirgimentitiam compagem. potest autem ex hæc irri- gatione, etiam solidius ceratum præparari. Sed & Sphærium ad irrigationem efficax est, & reliqua quæ sequenti Sermone habentur emplastra, diluta uel utibi ostendimus. At uerò aurigæ ad- ſictus fla- grorum utuntur calce trita cum ouis crudis soluta, adſecto rosaceo cerato. Accipiunt autem calcis qua- drantem, ceræ quadrantem, rosacel sextantem, oua cruda tria. Hoc medicamentum illinunt, & asiducū renouant. Ad uibices uerò flagellorum facti hoc, ceræ, terebinthinæ, spumæ argenti, buyri, thuris, mellis, æuales portiones, loco prius ſoto impone, & quotidie permuta. Aliud. Calcis uiuæ lotæ, succi solani, olei rosacel, pares portiones cōmitte, il- line, & linteolum superimponere.

Ad desquamata.

Cap. LXVI.

Desquamata appellantur, quando ex lapsu aut uolē- ta aliqua offensa cutis auulsa est. Hæc ab inflamma- tione curatur. Ruris ruber cum melle illitus, sifideriti- dis folia trita, stratiotes herba in aquis ſacens, cum aceto. Vere & cerato ad intertrigines subſcripto, & cæteris huiusmodi.

Ad intertrigines.

Cap. LXVII.

Intertrigines ex calcamentorum attritu oboriat, dum- dolorem excitant, pulmone ſuſſilo aut agnino calido appposito mitigantur, & ab inflammatione aſſeruan- tur. Item calcamento ueteri uſto trito inſperſo. Aut ſuccida lana, aut mali punici ſatui flore, ſingulis uſtis trids inſperſis. Aut acacia cum aceto illia. His uerò qui teneras carnes habent, emplaſtrum ex hor- deo ad ambusta deſcriptum, & alia huiusmodi adhi- beto. Sed & ad papularū eruptiones, intertriginesq; ac ambusta, efficacissimum est hoc. Recremēt plumbi quadrantem, ceræ trientem, adipis ſuilli re- centis unc. i. olei myrti lib. i. Ad cicatricē uerò in- ducendam abſc; adipe præpara. Vere etiam empla- ſtro p; pſyllij ſucco, quod ſequenti Sermone habetur, ex ſpu

ex spuma argenti, cerusa, & amylo paratum.

Ad contusa & sugillata.

Cap. LXVIII.

Carne ab aliquo graui illapso contusa, & paruis in ea uenulis disparatis, sanguis per perussationem profunditur, qui sub cute collectus sugillationem appellatam efficit. Scopus igitur est curationis, ut sanguis sub cute cōtētus discutatur, & hoc citò antequam locus nigrescat. In principio autē aliquid ex adstringentibus ad discussoria ammiscēdū est, quēadmodū Ser-mone octauo ad faciei sugillationes docuimus. Tunicā enim uenarum conuulse, opus habent ut densentur ac firmētur, ne noua materia atracta ad locū allabatur, postea uerò solis discussorij utemur. Sed & in principio scarificamus sugillata, atq; sic reliquam curationem facimus. Optime autem facit ad contusā, citrij mali pars interna cum oleo illita: aut lintēū oleo citrino imbutum imposito, & miraberis.

De ruptione.

Cap. LXIX.

Ruptio non in fibrosis, sed carnosiss muscutorum partibus solita cōtinuitas existit, nunquam citra sanguinis effusione contingens. Quæ à sinu differt, eod quodd nullum osculum ad humorum effluxum uelut sinus habet, proinde. & in hac discussorij utemur, ad ea quæ in rupto corpore continentur discutienda. Ad hoc autē idonea sunt medicamēta lasiuorū, diē eximētia. Acopa Græcis appellata. Tale autē est quod ex populo nigra paratur, itemq; quod ex abiete, ac reliqua huiusmodi. Omnino uerò ubi in profundioribus partibus ruptiones fuerint, actōra ac magis incidentia pharmaca adhibere oportet. Atq; ea de causa cucurbitæ quoq; adhiberi debent. Si quidem igitur statim totus sanguis effusus, fuerit discussus, facile caro coalescit. Si uerò diutius perseuerauerit, & sordes subnutrita fuerit, ruptio de cætero coalescere nō potest, labia solū inter se cōponuntur, ut ex leui occasione facile disparētur, & intermedius locus humore quodā repleatur, fiatq; quodam modo assidue sanguinis effusio, similis ei quæ ab initio contingit.

De uulsiōne.

Cap. LXX.

Vulsiō fit fibris quibuscūq; distractis, quæ in mēbris ac musculis cōtinentur. Et sola mitigatione opus habet, ut doloris exors maneat. Neq; enim fieri potest ut huiusmodi fibræ glutinentur, quæ in sinu genere sint, uelut etiā ruptiones. Est & huius affectiōis similis uelut ruptionum prædictarū curatio, ex discussorij & citra molestiā siccantibus constant. Verū ad ruptiones ac uulsiōnes in profundo factas, in pectore uidelicet aut intestinis, aristolochia rotunda utiliter potatur, & si quicquam aliud, commoda existit. Similiter etiā centaureæ magnæ radix & succus. Ictheon, costus, bdellij, singula cū aceto mullio pota.

Ad laxatos articulos.

Cap. LXXI.

Luxationes ex lubrica præsertim emotione factas, mitigat lana succida, aut spōgia noua aceto & oleo imbuta ac imposita, ita ut quies impereur, & deligationes fiant ad osium fracturas fieri solitæ, facti etiā ad easdem bulbus coctus cum melle, aut cerato liquido exceptus, & solia uiticis, & sal, ac nitrū assatū cū cerato, aut symphytū cū cerato, & urticæ folia cū sale, & heliotropij, scorpiū appellatum, & cinis sarmentorū cum axungia ueteri. Sed nihil præstantius est quā emplastrū quoddam apponere ex his, quæ ad osiū fracturas paratur, si eius copia deur.

Ad laxos articulos.

Cap. LXXII.

Laxos articulos contrahit ac firmat acaciæ succus aqua dilutus ac affusus. Et spinæ Aegyptiæ fructus, rubi item ac myrti, & malicorij, ac solorum quercus decoctū, & myrteum ac leniscinum oleum assidue illitum. Et malicorium coctum & cerato myrteo exceptum, aut per se uino coctum tritū ac impositum.

Ad perniōnes.

Cap. LXXIII.

A perniōnibus præferat sal cū melle tritum, manibus ac pedibus assidue inde perficitis. Aliud, non modo præseruans, sed genitos etiā perniōnes curans. Citriorum magnorū internā partem acidam, relectis se minibus diligenter terito, & cum adipē suillo uetusto ad cerati compagem redigito, & ad hyemis initium quotidie illinēs ex eo digitos, uitior. Aliud. Oriba sij. Sulphur uiuū cū melle cocto imposito. Aliud, facit etiā ad omnes feruidas eruptiones. Myrrhæ trientē, aluminis liquidi sextantē, acetū quantū satis est, præpara & perniōnibus nō ulceratis, ac pruriginosis feruidis eruptionibus imposito. Aliud. Succu uæ acerbæ lib. i. thuris dra. iiii. ceræ dra. xvi. coquito simul ad succi ferme cōsumptio nē, deinde in mortario subige ac utere. Aliud, ualde insignē, ad res quas quoq; inflammationes commodum. Cerussæ, spumæ argenti, aluminis liquidi, singulorum lib. i. myrrhæ, thuris, singulorum quadratē, ouorū assatorum utellos xvi. adipis suilli ueteris lib. i. Arida cum aceto terito, in quo malicorij decoctum est, & ubi strigentidam compagem habuerint, adipē adijcito, ac simul probe subigito, & in plūbeo uale seruato. Vsu uerò postulante, rosaceo aut myrteo oleo diluito ac illinito. Aliud. Hyoscyami succus assidue illitus, eodē die inflammationē ac dolorem sedat. Aliud. Alliu in oleo torreto, eoq; abietō, & cera ad oleū addita, ceratum facito ac imposito. probe facit etiā amurca illita, & rhus coriarij. Ceterū irrigationes circū perniōnes cōueniunt. Radicis cyclamini decoctū, item rhois coriarij, betæ, ac lupinorū amarorū, marina aqua calida per se. Verū rapī decoctū resl quis omnibus præstat. Aliud, ad ulceratos perniōnes efficacissimū. Ceratū rosacū in magno rapo ad ollæ similitudine excavato, ad seruēntē cinerē liquefacto, & adhabeto. Idē ceratū etiā in raphani radice liquefieri potest, facitū & cæci fluuitalis uel melle aut cerato excepti. Aliud. Vmbilicum ueneris & malicorium in uino coquito, & cerato rosaceo excipito. Aliud. Rurē, medullæ taurinæ, rosaciæ, æquas portiones unito. Hoc etiā ad ulcera antiqua facit, & articularū ossa denudata. Aliud, perniōnes immittentes arcens. Atramētū sutorij, florum mali punicifolij, singulorum drach. iiii. aluminis scissi drach. iiii. myrrhæ, thuris, singulorum drachm. ii. ceræ drachm. iiii. adipis suilli drachm. viiii. olei myrti quantum satis est. Aliud. Aluminis scissi drachm. x. spumæ argēti drach. iiii. myrrhæ drach. i. ouorū albumina duo. Vino & oleo myrteo excipe ac utere. Aliud. Aluminis rotundi drach. iiii. calcis uiuæ drach. ii. ceræ unci. rosaciæ aut myrti olei trientē, præpara ac utere. Idem & ad attritus facit. Aliud. Spumæ argenti drachm. x. cerussæ drachm. iiii. ceræ drachm. xii. adipis suilli recentis drachm. xx. ouorū assatorum utellos duos, polissinis thuris drach. i. Spumam argenti, cerussam, & oua cum aceto terito, deinde ceratum adijcito, ac præparatum seruato.

Vfus autem tempore cum rosaceo dilutus adhibe-  
to.

Aliud, perionias ac cicatricem duces. Cōfert etiā ad papularum eruptiones, excoriatas intertrigines, & desquamata. Ceræ, adipis fuilli, singulorum drach. viii. spumæ argenti, corticis pinus, singulorum drach. xvi. mannæ thuris drach. viii. rosacei quantum satis est. Quidam plumbaginem pro argenti spuma sumunt. Oribasij Hexapharmacum. Ad perionias ulceratos, olei omphacini, taurini adipis, succi hyoscyami, singulorum lib. i. spumæ argenti sexuncens, colophoniz trientem, mellis sexuncem.

Ad digitum pterygia sue reduciis. Cap. lxxiiii.

Ferruginem cum aceto illine. Aut aluminis, sandarachæ, calcis uiuæ, diphrygis, æquales portiones impone, & linteolum uino imbutum ac mollem spongiam superimponere. Aliud. Squamæ æris, malicorij, caricarum leniter assaiarum, æquales partes melle excipe, & loco prius ex spissamentorum astrigentium decocto rigato impone. Et quod de pterygio exarscit depurga. Aliud cito resicans ac curans. Sorcos usti, thuris, singulorum drachm. ii. æruginis rasæ drach. i. cum melle tere, & super ipsum pterygium impone, facit & ad reliqua horum locorum ulcera maligna, nigredines & putredines. Oribasij zopyrius ad pterygia. Aluminis rotundi acetabuli in fictili exurito, & ad ritum acetii cyathum, hoc est, sextantem ammisco, & mellis quodratæ, & hæc simul pterygiis imponito. Aliud bonum, cimoliz tostæ drach. viii. pumicis usti drach. iiii. æris usti, gallarum, singulorum drach. ii. præpara & utere. Aliud ad pterygia putrefacta, & ulcera putendorum. Thuris drachmas quatuor, squamæ æris drachm. ii. æruginis rasæ drachmas iiii. Mellis quodratem, terito ad solē donec flauescant, & loco ex uino prærigato impone, & linteolum ex aqua expressum, ac spongiâ superimponere. Ex huius usu magni successum habui. Aliud. Hoc per triduum citra mordacitatem sanat. Caricarum pingulum tostatur, ut probe teri possint, drachmas duas, misyos cyprij drachmas duas, squamæ æris drachmas duas, mellis quantum satis est, præpara & utere, ac miraberis. Ego uero squamam æris per se tritam adhibui, & linteolum è uino expressum superimposui. Oribasij ad pterygia. Gallarum, auripigmenti, atramenti sutorij, æquales portiones unito ac uitore. Aliud. Aeruginis dra. iiii. mannæ siue pollinis thuris, sulphuris uiui, sing. dra. ii. Vere etiâ pastillo Musæ uelut admirado, linteum è uino expressum superimponere. Aliud ad pterygia experimento constans. Gallam non perforatam cum carne ligni quercini tritam insperge.

Ad paronychias, id est, unguis abscessus. Cap. lxxv.

Ad paronychias indiciæ priusquâ suppuratur, siue manus siue pedis digitus fuerint, sanā ex aqua frigida iburā imponito, aut p linteolū ex aqua expressū assidue refrigerato. Aliud. thus & galli cū melle trita, simul aut seorsim imponito. Aliud. folia myrti trita inspergitur, aut ceramum myrtē imponito. Aut sordes aurii assidue illinito, & sanabis. At si fuerint inflammate, panē aqua madefactū cū rosaceo adhibeto. Aliud. Oliuæ folia tenera imponito. Aliud. Cadinam tritam inspergit. Oportet autem carnem undiquaque ab ungue disparare, linamentis conuulsis, & linteo interpositis, & probe adhibita

medicamenta alligare. potest etiam Spodium simili modo inspergi. Aliud, ad paronychias exulceratas. Aeruginis, spumæ argenti, sing. drach. iiii. scarcolle drach. i. terito & large inspergitur. Aut farinam erui adhibeto. Carnem item eodem modo uelut dictum est disparato, & linteum ex uino expressum, itemq; spongiam uino imbutā superimponito. Hoc ego sæpe uti soleo. Aliud, quo uitor. Nitri, squame grise, pumicis usti, sing. unc. i. cimoliz quadrantem. Omnia cū aceto & modico melle terito, & pastillos formato. Vfus aut tempore aqua diluto, & adhibeto linteo exceptum. Vitor etiam pastillo insigni, quē Iridem uocat, cum uino diluto, qui sic præparatur. Aluminis liquidi drach. centū, croci, myrrhæ, singulorum dra. viii. Quidā etiam aloës drach. viii. adijciunt. Subigito ac formato pastillos, ac uitor cum uino, & linteum ex uino superliga, prodest & Musæ pastillus, ac reliqui eius generis. At uerò depascendo iam proserpentes sistes, auripigmento usto trito uberim inspergo, & linteo è uino expresso superimposito. Ego uerò sandaracham & auripigmentum, æquis portionibus simul trita adhibeo. Et si cicatricem inducere oportet, eadem terebinthina liquida excipio ac adhibeo. Quod si suppurata fuerint paronychie, primum ipsas perforabis, & humorem exprimes, & deinde lenticulam cū melle impones. Aut rosas uirides, aut siccas aqua madefactas, tritas adhibebis, ac contritos ungues.

Cap. lxxvi.

Myrti & mali puniceæ folia tenera impone. Aut selle tauri euacuato, in ipsam sellis uesicā unguem indito, ac finito donec perficitur sanetur. Aliud. Sal fossile cū aqua & oleo teritū illinito. Est enim efficacissimū.

Ad subuerntos ungues. Cap. lxxvii.

Picem siccam liquefacto, & cum farina mixtam apponito, præstat tamen subuerntatum unguem in medio perforare, ac cruore subterlapsū exprimere. Si enim persistiterit, putrescet, & ulceris difficulter curabilis causam exhibebit.

Ad motos ungues.

Cap. lxxviii.

Vngues ex aliqua offensa motos, & pignituo dolore affectos, caricæ cū melle tritæ mitigant. Quod si dimidium unguis exciderit, nitru aut salem cum pari sellis uulnini mensura misce, adhibe, & sanabis.

Ad scabros ac leprosos ungues. Cap. lxxix.

Adipem ouillum emollitum, & super linteū extensum adhibeto, ac tercia die soluito, & si mollem unguem repereris, ac tercia, & eundē rursus imponito, & tercia die solum similiter deradito. Atq; hoc tandiu facio, donec integra sanitas accedat. Aliud. thus tritum adipe ouillo excipe, ac utere uelut dictum est. Aliud ualde bonū. Alumē scissum asferino adipe excipe ac utere uelut dictū est. Aliud, ex cuius usu successum sentio. Mastichen chiam in aquam seruātem coniectam ac emollitam, ungui impone ac obliga, & tercia die solue, & derafo ungue rursus imponere, atque hoc facito usque ad perfectam restitutionem. Aliud. Hordei farinam cum picē ad emplastrum formam coquito ac imponito, uelut dictum est.

Aliud. Gummi drachmas sex, lacrymæ oleastr drachmas quatuor, atramenti sutorij drachmas tres: Gummi & lacrymam aceto diluito, & adiecto atramento sutorio in olla ad prunas ad compagem coquito, & derafis unguibus apponito, & alligato, ac tercia die soluito, & ungue derafo rursus imponito.

ponito, idque tandiu facito donec unguis excidat. Aliud. Auripigmentū colore aureo, & sandarachā, æquis portionibus probè terito, & terebinthina ad emplastrī formā excipito, & imponito, ubi prius per unū atq; alterum diē, farinam ordeacē cum aceto & sylvæstris cucumeris radice tritam adhibueris. Tertia uerò die similiter facito, ac tandiu repetito, donec unguis excidat. Cauendum est autē ne locus oleo attingatur. Aliud. Sandarachæ, auripigmenti, chalcididis, myrrhæ, thuris, singul. drac. ii. farinæ lo lii dra. vi. terebinthina excipito & adhibeto. Aliud, auferens ungues circa exulcerationē. Bituminis dra. ii. sulphuris uiui, sandarachæ, auripigmenti, singul. dra. i. Excipe terebinthina & utere, ac per septimum diem solue, derafoq; ungue, rursus nouum impone, atq; ubi unguis exciderit, ceratū myrteum, cui aliquid eiusdē medicamenti admixtum est, applica. Aliud. Calcem uiuā cum oleo, aut mastichen cū opo balsamo imponito. Postquam autē morbus occalsuit, & præscripta medicamenta nihil proficiunt, exco riatoria nunc referenda statim adhibeantur. Exco riatorium leprosi unguis, callos, uerrucas & clausos auferens. Cantharidis numero x v. sulphuris uiui, chalcididis, singulorū drac. i. aliij depurgati nucleos i x. omnia probè trita terebinthina excipito. Vfus autē tempore partes ungui uicinas mid aliquo me dicamento munito, & ex coriorū sū hoc pelliculæ ue sicæ bubulæ illiū adhibeto, & postridie soluto, bul lasq; exortas rūpito, & si subiacentibus siles fordes inhæserint, panē cum aqua mullā, aut lenticulā cum melle illinito. Et deinde ulcera repurgata, cerato ex anserino adipe, thureq; ac cerato parato, curato. Aliud ex coriorū. Nasturtij, snapis, sulphuris uiui, nigellæ, cātharidū, atramentū furorij, æquales portio nes ex aceto probè tritas terebinthina excipito, & ue lut diximus utitor. Aliud, Orisabij leprosis ungues exterēs. Propolis, ceræ, bituminis, sing. dra. ii. sulphu ris uiui dra. i. præpara, & oleo, ne inquinaetur. Vsu autē expetere, calefactū unguibus imponitur. Aliud eiusdē. Atramentū furorij & sulphur uiuū sufficien te uisco excipe, & corio inductū adhibe. Aliud. Pi cem liquidā, ceram, colophonīā, ammoniacum thy smiam æqualiter misce to ac imponito. Aliud. Cera, colophonīæ, terebinthina, sulphuris uiui, staphi didi agrestis, nitri, singul. dra. ii. sandarachæ, cāthari dum, singulorum drach. i. cedriæ quantum satis est.

Ad reparandos ungues.

Cap. lxx.

Myrrhæ drach. viii. aluminis salsi drach. iiii. panis hordeacē siccī drach. i. excipe melle & impone. Aliud, ad ungues ægre orientes. Berae agrestis semen cum aceto tritū imponito. Aliud, polliū cum adipe uitulino & terebinthina tritum adhibeo.

De anulis, digitis impaditis.

Cap. lxxxi.

Anuli aliquando digitis impinguntur, quum circulus ipsorū angustior, uolenter illorū partibus cras sioribus fuerit adactus, atq; hoc tum maxime continē git, quum homo cibo ac potu distēsus, prona ac pen dula manu sopitus decubuerit. Ita enim manuū extremitates longē magis intumescunt, quā si erigā tur. Aqua igitur & oleo, aut malū decoctū, manus largē perfundatur. Nam parca persusio tumore magis auget. Deinde anulus leuiter uersatus detraha tur. Quod si persusio nihil effecerit, filum crassius cōtortum accipito, & alterū eius caput sub anulum

ponito, & reliquum totum digito laxè circumliga to, & postea caput fili anulo suppositum sursum tra hito: filo enim attracto, anulus deorsum proce det. Quod si neq; sic successerit, specilli pariem latiore m sub anulū submitto, & anulū utrinq; prope sigi lum per spatium incidito, & filo lineo utrinq; cir cundato anulū attrahito. Et consequenter Ianam ul no & oleo imbutam mitigandi gratia adhibeo.

Ad clauos.

Cap. lxxxi.

Clausus rotundū est tuberculum, album, clauī capiti si misse, plerunq; in calcaneis ac plantis pedū enascens, & in gradiendo dolorē inducens, ad durioris alicuius rei occursum. Sed & in summis manuū digitis fæpsissime oriri solet. Huius itaq; tollendi gratia fectiōnem & uisionē reculamur, quoniam hæ partes ner uosæ sunt ac subtili sensu præditæ. Vitium autem uisoriū medicamentis huiusmodi. Cantharidum pe ctuscula x v. sulphuris uiui, chalcididis crudæ, ammij, sing. obolos. iiii. Singula seorsim terito, & pice li quida siue terebinthina ad emplastrī formā excipito, atq; utitor hoc modo. Caput clauī & circūsitum eius ambitū deraديو, & splenū infiammatiōni arcē dæ idoneū, glutinosum, in medio excisum, quatum clauī totius ambitus patet, adhibeto, & tūc splenium ex relato medicamēto sup ipsū clauū, ad glutinosū splenij casurū imponito, & forinsecus charta integri to, ac rursus aliud linteolū custodię gratia superliga to, atq; ita per biduū aut triduū, ægrū quietū dimit tito, idēq; læpe repetito, donec clausus a subiecta car ne prorsū disscilerit. Clauo uerò sublato deraديو plāta, & rursus adhibetur emplastrum, donec ulcus fuerit explanatū. Aliud. Derafo prius ac repurgato loco, sicut diximus, succū cyrenaicū, uel si is desit, la ser cū nitro ficus pinguisimè carne, uel terebinthina excipito ac imponito. Aliud. Lupinos crudos uisfos melle excipe, & circūsafo ac depurgato clauo impo ne. Aut gallinacē stercus uisū melle exceptū, aut nigellā cū aceto tritā, eodē modo adhibe. Aliud. Cla uum circumdextra repurgato, & succum cyrenaicum probe tritum, aut lafer uerberim adhibeto, & deinde splenium ē melle eodemq; succo illitum apponito. Hoc etiā ad strumas facit. Aliud. Rpurato clauo fabam fresam, aut lomentum sabacē coctum coctum apponito. Idem ad cicatricem perducit. Aliud. Cla uo repurgato atramentum furorium leuissimè tri tum inspergito, & linteo alligato. Aliud, clausos ē manibus ac pedibus tollēs. sinum columbinum in acerrimo aceto ad cerati compagem coquito, & cla uo repurgato imponito. Et per biduū aut triduum funditus tollet, aut circumsafo ac repurgato clauo, ex erodentibus medicamentis suprà relatis aliquod adhibeto. Aliud, clausos digitorum citra mole stiam auferens. Mastichen nigram Aegyptiam in aceto coquito, atque ita calidam adhibeto.

Ad plantarum rimas.

Cap. lxxxiii.

In plantis quoque rimæ oriuntur, gradientes magis insistantes. Planta igitur assidue scalpi debet, & hæc medicamenta adhiberi, picem liquidā ammixta cera, ita ut ceræ pars una sit, picis uerò liquidæ duæ, illinito. Aliud. Scillæ medullam in oleo coquito, & cum terebinthina tritam imponito, aut etiam ad lecta scilla, terebinthinam in oleo liquato, ac utitor. Aliud. Cancrorum fluuiatiliū uisforum cinerem cum melle subactum impone, uel oleo dissolutum

rimis præcalpis instilla. Aliud. Malicorium aceto coctum per dies quinque imponitur, indeque purgatis calcem cum oleo adhibero. Aliud. Cornu caprini usti cinerem liquida pice aut terebinthina excipito ac utitor. Aliud. Amurcæ in æneo uase ad mellis compagem coctæ cyathum unum, aceti cyathum unum, squamæ æris, pollinis thuris, singulorum drachm. duas, lanæ fuscidæ teneræ manipulum unum. Lanam tædæ obuolutam urito, ac reliquis aridis ammisceto. Amurcam uerò cum aceto ad mellis compagem coquito, & illis adjicito. Vter hoc ad uulnera quidè cum uino dissoluto, ad plantarum uerò ac pudendorum affectiones cum passo. Aliud ad pedum rimas, porcinum adipem fali inuaceratum calidum assidue instilla. Aliud. Spumam argenti, colophoniam, mel, oleum, æquis portionibus præparato. Hoc etiam ad reliqua caua ulcera facit. Aliud, ad pedum rimas, quod labiorum quoque duritiam emollit. Cerussæ drachm. ii. spumæ argenti drachm. x. myrrhæ drachm. i. ouorum cædida ii. Vino odorato paulatim instillatò terito ac utitor. Mihi uerò etiam oleum adijciendum uidetur, ut pinguis compages fiat. Et ualde probo commune illud quod è melle paratur, & mellis, ceræ, olei, spumæ argenti, æquales portiones recipit. Nam hoc ad omnes pedum ac manuum exulcerationes facit, siue in uola, siue intra digitos fuerint, & præsertim si prope ungues existerint. Ad calcaneorum præterea intertrigines ex calcamentorum attritu obortas, & ad auritis ex longo decubitu factas, quales sæpe in cutibus ac coxis uisuntur eorum qui diutino morbo laborauerunt. Hoc medicamento sæpe prospere usus sum. Neque enim simile habet, præsertim ad os sacrum & femora ex longo decubitu attrita ac ulcerata. Aliud floridum, ad rimas. Calicis uiuæ drachm. x. cerussæ drachm. xx. ceræ drachm. xxx. adipis suilli recentis septuncem, colophoniam dodrantem, succi seminis lini cyathum unum, olei dulcis quincuncem. Cerussam & calcem cum succo terito, & ad ceratum frigidum ammisceto, & loco prius repurgato adhibero. Hoc præ omnibus teneram plantam efficit. Ad reliqua uerò ulcera ob scærorem improbanur. Aliud. Amurcæ, mellis depurati, singulorum drachm. ii. aluminis phorimi drachm. i. Hoc etiam gingiuas purgat ac firmat.

De crurum ac reliquarum partium uaricibus.

Cap. LXXXIII.

Varices appellatur uenæ dilatatae, quæ aliquando circa testes, aliquando circa crura ampliatur. Sed qui in testibus sunt, chirurgiâ difficulter admittunt. Qui uerò alibi consistunt, hoc modo curari solent: primum simplex sectio fit cutis uasi adiacentis, deinde uas ab ambigebus corpusculis separatum cæco uncino attrahitur, ac lineo funiculo supernè deligatur, & non aliter quàm in uenæ sectione fieri solet uas inciditur, & euacuato sanguine quantum opus esse uidetur, super pars cõstringitur, & postea totum quod ampliatum fuerat amputatur, peractò opere sectio pos-

line thuris impletur, & splenio ac linteo imposito deligatur. Ager autem quicquid iubetur, seruato acclui partis situ, ne si decius iaceat, humores ad ipsam confluant, postea curationis ductus ad puris generatione diriguntur, & reliqua cura ulceribus communis adhibetur. Atque hæc compendiaria ac securâ curatio est. Quidam uerò uisionem malunt, & per latè digiti spatium cautèria uasis adhibent. Et ubi crusta exciderit, ulcusque incarnatum ac cicatrix inducitur fuerit, locum roborant. Alij varices incipientes talibus medicamentis prohibere conantur. Emplastrum dura molestiam resicant, etiam si ulcera manantia in ipso uarice fuerint. Bituminis iudaici sesquialbra, olei uetustissimi bessem, terebinthin liquidæ septuncem, sulphuris uiui trientem. Bitumen ad ceterum magnitudinem crassius contusum, in oleo donec liqueat, coquito, deinde adiecta terebinthina simul coquito, donec non amplius inqueant, & sublato ab igne medicamentum sulphur tritum inspergito, atque simul omnia in mortariu frigida aqua plenum inijecto, & probe subactis utitor.

De brachiorum ac crurum dracunculis, Leonide.

Cap. LXXXV.

Qui appellantur dracunculi, lumbricis similes sunt, & aliquando magni, aliquod parui reperiuntur, frequentius quidem in cruribus, quandoque uerò & in musculosis brachiorum partibus consistentes. Nascuntur autè hi in Aethiopia ac India in pueris præcipue, estque ipsorum generatio non dissimilis lumbricis laetis uentris. Sub cute enim mouentur nihil molestiæ afferentes, uerum temporis progressu circa dracunculi extremitatem locus suppuratur, & cutis aperitur, ac dracunculi caput exeritur. Quod si dracunculus attrahatur, uehementem dolorem inducit, præsertim si nimia tractus uolentia fuerit ruptus. Nam quod relinquatur, molestissimos dolores infert, proinde ut ne recurat animal, ualido filo brachium cõstringere oportet, & quotidie hoc molliri, ut dracunculus paulatim progrediens constrictione quidam interdudatur, nequaquam autem abruptatur. Locus item aqua mulla, & oleo in quo abinthium aut abrotonum coctum est, aut alio quodam ex his quæ ad alui lumbricos descripsimus, irrigandus est. Omnia tamen acria uitanda, propter periculum inflammationis. Cataplasmata quoque laxatoria ac suppuratoria è farinis cum aqua mulla & oleo præparata adhibeantur. Quod si dracunculus sponte progrediens facile extrahi poterit, nihil amplius faciendum est. Sin ad suppurationem uertetur, à cataplasmatibus, & aquæ mullæ ac olei ratione non est discendum. Nos uerò emplastrum è baccis lauri, post cataplasmatum ablationem, imponere solemus: facta uerò suppuratione, cutis per longitudinem dissecitur, & dracunculus denudatus auferatur, & cutis linamentis inditis disparetur, & reliqua curatio suppuratoria adhibeatur, ita ut animali suppurato & extracto, ulcus incarnetur & ad cicatricem perducat.

# INDEX EORVM QVAE IN

DECIMO QVINTO SERMONE AETII

CONTINENTVR.

De tumoribus laxis.	cap. I.	De emplastro Aniceto.	cap. xvi.	caput xxxii.
De inflatione.	cap. ii.	Emplastrum ruptoria.	cap. xvii.	Emplastrum Phycorche appellatum. ca-
De tumoribus induratis.	cap. iii.	Emplastrum discussoria & attractoria.		put xxxiii.
Tendinum ac ligamentorum induratio-		caput xviii.		Emplastrum Sphaerium appellatum. ca-
rum curatio.	cap. iiii.	Emplastrum Nechepsonis è cupresso.		put xxxiiii.
De strumis.	cap. v.	caput xix.		Emplastrum pentatheton. cap. xxxv.
De bronchocela, hoc est, gutturis tu-		Apochymatis preparatio. cap. xx.		Emplastrum ex Ochra. cap. xxxvi.
more.	cap. vi.	Cerata utilissima.	cap. xxi.	Emplastrum Telamonium. caput
De pulacei ac mellei humoris tumo-		Heptapharmacum laxans, suppurans,		xxxvii.
ribus.	cap. vii.	incarnans. cap. xxii.		Pilarium ex recremento argenti. caput
De steatomatibus, hoc est, tumoribus		Enneapharmacum, Hori mendesij. ca-		xxxviii.
adiposis.	cap. viii.	put xxiii.		Emplastrum ex pompholyge. caput
De ganglio.	cap. ix.	Emplastrum philosophi. cap. xxiiii.		xxxix.
De uasorum dilatatione.	cap. x.	Oesypii preparatio. cap. xxv.		Emplastrum rutaceum. cap. xl.
De cerijs, hoc est, fauis.	cap. xi.	Emplastrum Manus appellatum. ca-		Ceratum è perdicio. cap. xli.
Emplastrum ad cruenta uulnera glutinanda, & ad multos usus commoda.		put xxvi.		Ceratum è succo betæ. cap. xlii.
cap. xii.		Emplastrum Bromii appellatum. ca-		Ceratum ex sandyce, Homo appellatum.
		put xxvii.		caput xliii.
Emplastrum cephalica, & ad fracturas,		Emplastrum ex ouis. cap. xxviii.		Emplastrum ex allijs. cap. xliiii.
& ad multa commoda. Et de iusto		Parhygyrum Galeni. cap. xxix.		Emplastrum è scilla. cap. xlv.
eorum usu.	cap. xiii.	Emplastrum ex ouis, Oribasij. ca-		Emplastrum ex pompholyge, Hieræ Cap-
Emplastrum emollientia ac discussoria,		put xxx.		padocis. cap. xlv.
ad multa commoda. cap. xiiii.		Parhygyrum Oribasij. cap. xxxi.		Emplastrum nigrum, essentia appella-
De emplastro ex aspidibus. cap. xv.		Emplastrum Rosaceum inscriptum.		tum. cap. xlvii.

## AETII MEDICI GRAE CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE TETRA-

BIBLI SIVE QVATERNIONIS

QVARTI SERMO TERTIVS, ET

EX ORDINE XV.

De tumoribus laxis itemq; dauis, & de strumis, & emplastrorum multi usus compositione.

De tumoribus laxis.

Cap. I.



VE MADMODVM ab influ xu bilioso erysipelas, hoc est, ignis facer, ita à pituitoso tumor laxus, què oedema Græci uocâr, generatur. Est aut tumor hic clatra dolorè, flatuoso spiritû conetines, uelut à uaporoso humore

re pgnatus. Solèr etiã aliter tumores laxi fieri, circa pedes præcipuè, in hydrope, ac tabe, & malo corporis habitu, q si digitis premâr, cauus locus sit. Et hi in gbulâ etiã facie occupâr. Verû hi tumores accescio sunt aliarû affectionû, & nullâ ppiâ ac præcipuâ curâ requir. Sufficit em ipsi frictio, aliquando p acetu ac oleû rosaceû pmixta, aliquando p oleû & salè, potest etiã sal ad acetu oleo rosaceo permixtu adijci. At si ob pituitosi humoris influxu in parte aliqua laxus tumor cõsistit, spõgia posita imbuta ac imposita, & leui adstrictio cõ alligara, q ex infernis partib. initiû sumat, & in supnas desinat, affectionè quâdoq; sedauit. Oportet autè spongiâ esse nouâ, si uerò talis non adsit, expurgada est nitro uel spuma nitri, & lixulio. Quòd si neq; sic tumor deprimitur, parû aluminis ad poscâ adijcies. Aprum est & Tarficu ellychniû, aut aliud mollicissimû, eodè humore imbutu ac impositu. Cõfert & glauciû, & colliriû ex eo pa-

ratum. Sordes itè lucernarum aqua mulsa dilutæ utiliter adhibetur. Cæterû diuturnos tumores laxos oleo præillitos, & spõgia noua ex lixiulo superimposita uiolētius cõstrictos sanabis. Discutit itè ac cõpescit laxos tumores terra omnis illita, & præsentim quæ in leuibz reperitur ad salè adhibita, uelut Seromone secundo reutilimus. Itè isatis hortēsis ac satiuua.

De inflatione.

Cap. II.

Flatuosus spiritus aliquando sub cute, aliquando sub pelliculis ossa aut musculos ambiētibz, colligitur, & inflationè parit. Aliquando etiã circa uiscera uentremq; ac intestina coaceruatur. Si itaq; uiscera inflata fuerint, fauis cõstâr, ex uitioso uisû malû esse obortum. In musculis aut cõtingit præcedere plerûq; contusione. Suntq; huiusmodi musculorû affectiones curatu difficiles, quoniã in omnes sermè musculi partes flatuosus spiritus dispergitur, constringiturq; ac intercluditur ab ambientibus pelliculis, & plurimis alijs corpusculis usque ad cutem prætensis. Ad uentris ergo ac intestinorû & uiscerum inflationem, oleum tenue efficac est, in quo ruia aut cymnion, aut apij semen, & alia attenuantia ac calefacientia cõsum est, si aut irriguer, aut per clysterem infundatur. Magna etiam cucurbita circa umbilicum absque scarificatione apposita, tam citò hominem à molestia liberat, ut admirabilis sit ea celeritas, &



& incantationi similis. At uerò musculis ex conu-  
sione inflatis, ex calidioris & aeris usu partes exacer-  
batur, & auctis inde inflammationibus musculi ma-  
gis læduntur, ac dolores intèduntur. Mixtas itaq; fa-  
cultates habere oportet ea, quæ inflatis musculis ad-  
hibeantur, præsertim si cõsultò fuerit aliquantulū infla-  
mata. Quapropter in principio mitigatoria augēda  
sunt. In declinatione uerò discussoria. Neq; repente  
ab alteris ad altera trāsundū est. Sed paulatim miti-  
gatorijs depraetis, discussoria augebimus. Mitigato-  
ria uerò in huiusmodi affectionibus, sunt, sapa, & cely-  
pus, modico oleo adiecto. Discussoria autē aeris, ni-  
trum, spuma niri, & lixiuū. Et in principio quidē  
solā sapa cū modico oleo, & aliquādo uino adhi-  
bemus, ut ne omnino repellendi uī careat, & hæc om-  
nia succida lana excepta. Quæ si nō adsit, celypū re-  
liquis quacunq; lana exceptis ammiscimus, præ o-  
mnibus uerò curādum est, ut hæc calida permaneāt,  
neq; sinātur donec frigeat, forinsecus itaq; calida la-  
na adhibeatur, & ubi calorē eius æger amplius non  
percipit, noua statim applicetur. Mitigatio autem æ-  
groto, aceti cū nitrū ammiscibimus, copia ipsorum  
paulatim aucta. At uerò neglectas & antiquatas in-  
flamationes, primū lixiulo fouebimus, deinde empla-  
strum quoddam molliens ac discutiens imponemus.  
Quale est hoc. Strigmēta seruē facta excolato ut pu-  
ra fiant, & rursus in ollam mitito, & calcem uitam  
uelut farinam trita infarcto, ut lutosā cõpagēs me-  
dicamentū euadat, & uisior. Hoc uerò adhuc effica-  
cius est pharvacum ex fycomorīs compositum.

De tumoribus induratis.

Cap. III.

Indurati tumores laxis opponuntur. Laxorū enim no-  
ta est, ut appressis digitis cedant & cauus locus fiat.  
Durores uerò tumor punax est, & ad tactū renitēs,  
& ad sensus difficultatē inclināt, ut tandem hi loci in  
quib. est, sensus exortes fiat, & ad osis duritiā perue-  
niant, & nullā oīno curationē admittant. Sed & plū  
in ipsis oriri soliti, minimè nutritiur, & exactē gla-  
bri fiūt. Duri itaq; tumores aliquādo statim ab in-  
silio cōsistūt ac augētur. Aliquādo uerò à medicis in-  
ducuntur, q̄ inflammationes ac erysipelata uehementē  
psfrigerarūt ac adstrinxerūt, quā tamen trāsactō prin-  
cipio discussoria adhiberi debeāt. At uerò q̄ ex ery-  
sipelatis fiunt, cutis duritiā saltē præ se ferūt. Qui uerò  
ex inflammationib. succedunt, subiectas etiā carnes  
inuadūt, tanto pfundius quāto inflammationes erysi-  
pelatis sunt profundiores. Inchoātib. ergo duritijs,  
& debile aliq̄ sensum adhuc habentibus, medica-  
menta emollētia adhibebimus, quæ simul modera-  
tē etiā discutunt, & talia sanē sunt quæ & molliēti  
ac diffundēdi uim habēt. Nā quæ uehementē discus-  
tunt, & sine mollitione statim euacuant, manifestē  
quidē tumorē imminuūt, reliquias uerò affectionis  
incurabiles efficiūt. Discussis enim tenuiorib. humo-  
rib. quod exactē terret ac solidū est, pinaciter re-  
sistit, quapropter in hūc usum medicamēta adhibē-  
da sunt, quæ molliēti simulq; discutēdi uires habēt.  
Primū igitur molliētib. utemur, deinde ad discusso-  
ria, pcedem⁹, eaq; molliētib. paulatim miscēbimus.  
Cōsiderādus tamē est & curādī corporis habit⁹, & af-  
fectionis status quantū processerit. Hęc uerò si rectē  
cōsideraueris, cōsuetudinē qdē, non tamē penitus ar-  
te carētem, peritū acquires, prima enī die statū mol-  
liencia adhibebis, altera deinde aut tertia trāsa cū, fa-  
cilē intelliges an augere aut remittere medicamentū

uim oporteat, præstat autē tum ad hos usus, tū ad re-  
liquos, si rectā curationē peragere uelimus, opposi-  
ta medicamenta, ualidissima uidelicet ac mitissima,  
preparata adseruare, quō pro affectionū diuersitate,  
diuersæ mixturæ fieri possint. Ad duros itaq; tumo-  
res molliēdos caprinus bubulusq; adeps cōmodus  
est. Ac sicut uirinus achirdinus ualidiores sunt, ita  
hocidinus ac uitulinus imbecilliores, & suillis debi-  
lissimos. Sed his omnibus præstat ad discutiendum,  
non autē molliēdi, leoninus, pātherinus, hyænaq;  
ac anseris. Gallinaceus autē inter suillū ac anserinum  
medius est. At inter medullas prima est ceruina, de-  
inde uitulina. Cæterū resine odoris nō acris, his me-  
dicamētis ammixtæ uiscositatē exhibent, nec tamen  
molliēdi uim auferunt. Cōmodissima uerò omniū  
resinarū est terebinthina, quæ chīa appellatur, & la-  
ricis resina, liquoris compage nihil ab illa differens.  
Deinceps uerò pinea & abietina. Verum siciores,  
qualis est resina pinus arida, physema priuatim ap-  
pellata, nimis sicant. Et propterea ad emolliētiū  
medicamētōrū cōpositionē inutiles sunt, sed terebin-  
thina ac lardina eligendæ. Itaq; quocq; Brutia quūm  
eiuldē facultatis sit, in eisdē usus recipi potest, sed ari-  
diorē reprobamus, sicut etiā bitumen. Habet & mas-  
tiche chīa uim emolliēdi, Aegyptia uerò mastiche  
nigra emollit qdē, sed magis siccac ac discutit. Thus  
insuper nō expers est facultatis molliēdi, itemq; soe-  
ni grad semē, hoc enim cōtū molliēre potest, quan-  
quā thus quocq; in molliorib. medicamētis paulu-  
lum est coquēdū. Eiusdē ordinis sunt & balneorū  
strigmēta, butyrū, althææ decoctū. Media uerò inter  
lenia & ualidissima propolis est. Validissima autē  
appello, ammoniacū thymīam, bdelliū, præsertim  
Scythicū resinofum, & colore nigricās: styracē ma-  
ximè pallidū, qui calamites uocatur, flauum item ac  
pinguem. Galbanum enim & popanax supra uim  
discussoriam, etiam molliunt. Verum galbanū mol-  
liendo, popanax discutiendo præstat. Atque huius-  
modi sanē molliētiū medicamentorum mate-  
ria est. Tu uerò libros adeps medicamentarios, sin-  
gulorum compositorum uires ex simplicibus ex-  
pendes, quō uarias pro maioris ac minoris ratione  
ipsorum differentias cognoscas, & corporum simul  
ac affectionum differentias consideres, atq; ita for-  
tita fortibus, & mita debilibus adhibeas. Inter cu-  
randum autem affecta pars oleo calido foueatur, &  
glutinosa medicamenta apposta antequam sponte  
decidant, ne remoueantur: imō etiāq; lauandus sic  
æger, omnino permittēda sunt. A balneis tamē me-  
dicatis abstinentia cōsulo, præsertim quæ aluminis,  
aut sulphuris, aut aeris qualitātē ammixtam habēt.  
Hæc enim huiusmodi affectib. aduerfantur. Et hæc  
profectō sufficere possent ingeniosis, & in artis ope-  
ribus aliquatenus exercitatis uiris. Verūm quum  
non omnes tales sint, medicamēta quocq; usu & ex-  
perimentis cognita explicare oportet, initio sumpto  
ab his quæ summā molliēdi uim obtinent, & pa-  
uis etiā inflammationibus commoda sunt, quæ aliqua  
duritiā participāt. Horum autem simplicissimū est  
parhygrum appellatum, ex cerē, butyrū, & colopho-  
niæ æquis porcionibus cōstans. Deinde quod Mnæ-  
sææ inscribitur, & reliqua eiusmodi. Item helladicū  
molliorū, & quod ex perna præparatur, & quod  
Lucio inscribitur, ad anchilopas & reliqua quæ pau-  
lō inferius in hoc Sermone habentur.

Tendinum

*Tendinū ac ligamētōrū induratorū curatio. Cap. IIII.*  
 Tumorū equidē induratorū emollitio ac discussio prædictis medicamentis perficitur, quæ emollientia appellatur. Quū uerō partes quædā natura rariiores, quædā densiores sint, consequens est ut singula proprijs medicamētis priuatim opus habeat. Quapropter ad tendines ac ligamenta præstabilius esse iudico, ut molliētibus medicamētis aliquid adiungatur, quod incidendi vires habeat, inter quæ præcipuū est acetum. Affecta itaq; parte cōmodis medicamentis præmolliata, huiusmodi fomentū sepe habuit successum. Acerimo aceto ignitum lapidē pyritē, si haberi potest, aut molarem, ex quo molas faciunt, restitit quo. Deinde ad excipiēdum substrati lapidis calidū uaporē ab asperso aceto emergentē, ligamētum siue tendinem induratum adhibere iubeo ac cōmouere. Hinc enim mirificē opē sentit. Et postea rursus medicamētum molliōrū impono, & paucis interpositis diebus, idē fōmētum rursus repeto. Sæpe enim in hac ligamēti aut tendinis admoitione ac cōmodo ne, ita ab eleuato uapore duritiā resoluta est, ut res incitationi similis uideretur. In principio tamen affectam partem nō aqua, sed oleo plurimo quotidie largē perfundo. accipio autē oleum dulcissimū ad strictionē penitus carens, in quo interdū foenū græcum, & altheæ ac cucumeris syluestris radicē, uel aliscus confamilis coquo. Vt præterea aceto etiam ad alias partes, quæ iam diu medicamēta alia experitæ sunt. Scio enim esse quædā medicamēta ex aceto parata, quæ post molliētū usum per integrū diem imponere soleo, deinde rursus mollientia adhibere, & paucis interpositis diebus, rursus ex aceto preparata imponere. uis enim aceti per interualla locis iā præmolliatis admoda, crasios ac uiscosos humores incidit ac dissoluit, & hinc tales affectiones nō leuiter auuat. Verū si quis adde fortiter discutientibus plus æquo uisus fuerit, præsertim in principio, tenuiores quidē humores discutiet, residuū uerō ad lapideam naturā mutatum, loco impactū persistet, supra hoc quoddā nimius etiā eorū pharmacorū usus, nervorū essētiā lædit. Quapropter nec frequēter, neq; ab initio, neq; duobus cōsequēter diebus, medicamētis cū aceto preparatis, ad ligamētōrū ac tendinū duritiā, utēdū est. Lienis tamen partibus induratis, tutius & cōmodus ipsorum usus est. Et multi sanē indurato lienis tumori, ammoniacū thymiamā cū aceto subactum adhibēt, & hoc solū sæpe ad splenis indurati curationē sufficit. Ego uerō etiā carnosarū partium musculis induratis, inter molliētia medicamēta, ammoniacū cū aceto adhibere soleo, & summū eius cōmoditatem deprehendo. At hoc etiā hic una tantum aut altera die adhibēdum est, & deinde ad molliētia reuertendū: et pluribus diebus interiectis rursus ad medicamentū ex aceto trahendū, siue ammoniacum id sit, siue aliud quoddā emolliens cū aceto preparatū. Molliēs autē esse oportet, quod cū aceto paratur: siccatia enim primū quidē prodesse uidetur, sed residuum postea incurabile efficiunt. Proinde inter emollientia frequēter hoc cataplasmate uti soleo. Altheæ radicem tritā ac angustissimū cribro excreatā, adipe excipio ac appono, est enim imedicamētum ad huiusmodi affectiones efficax. Si autem adeps asnerinus, si haberi poterit: sin minus, gallinaceus. At si hic quoq; defuerit, suillo utemur. Sed

& maluæ agrestis ubique nascentes folia aliquo relato adipe subacta utiliter apponuntur, quæ si moderatē fuerint cocta, crudis erunt præstantiora. Talia enim pharmaca locis iam præmolliatis adhibita, citra mordacitatem ac tutō discutiunt.

*De strumis, Leonide.*

*Cap. v.*

Strumas appellant Græci choeradas, à porcis, in quorū gurgure adenosī quidam tumores reperiri, & strumis similes. Alij à multiplici partu porcorū nomen desumptum putant. Sunt autem strumæ carnes subcandidæ, faciliē augetescentes, in membrana contentæ, & in summa, glandulæ induratae, quæ in collo, sub alis, ac inguinibus oriuntur, ubi glandulæ uasis substratae sunt. Aliquando etiam, sed tamen rarō, ex carne eorundem locorum sunt, quæ affinitate quadam ad strumarum naturam uertitur, & materiæ accessione augetur. Differunt strumæ inter se, magnitudine, natura, loco, ortu, multitudine, & uasorū complicatione. Magnitudine, quia aliæ paruæ, aliæ mediæ, aliæ magnæ, aliæ ingentes sunt. Natura, quoniam aliquid māsuetæ, aliquid malignæ cōpōnuntur. Māsuetæ citra inflammationem, citra dolorem, moderatam duritiā habent. Neq; enim molles sunt uelut tubercula adiposa, steatomata appellata, neq; dura, sicut tumores indurati, sed mediā quandam tactus proprietatē habēt, & tumorē circumscriptum, rotundum ac æqualem. Malignæ uerō strumæ inflammationes ac dolores pulsantes inducunt, & tumorem in æqualem præ se ferunt, in quo uasa prominent, & ad manuum cō tactum ac medicamentorum impositionē efferantur. Loco autem differunt, quoniam quædam in anteriore colli parte, quædam ab altera ipsius parte, quædam ab utraq; oriuntur. Quædam item statim sub cute superficiem habent, quædam circa magna ac nobilissā uasa penitus insident. Ortu, quod quædam uelut eleuatæ, quædā insertæ oriuntur. Et eleuatæ quidem faciliē huc & illuc mouentur: insertæ uerō ad contactum renitiuntur. Multitudine, quia & una, & plures generantur. Vasorum complicatione, quædam enim uenas ac arterias implicatas habent, quædam omnino non habent: paruæ igitur strumæ facilius curantur quàm magnæ, & māsuetæ citius quam inflammationatæ. At uerō malignæ incurabiles sunt. Quum enim omnes huiusmodi strumæ canceratæ ac uasis refertæ sint, si eas per chirurgiam aggrediāris, sanguinis eruptionis periculum imminet supra hoc quod penitus insidentes, rescindi nō possunt. Vasa enim nobilissā, uenas, uidelicet iugulares & arterias carotidas appellatas, maligna struma uelut radices habet. Verū pro loci ratione superficiali facilius curantur quàm profundæ, deinde & quæ in collo oritur facilius curantur quàm reliquæ. Vocales tamen nervos in his dissimili generare uitare oportet. Multi enī strumas circa asperā arteriam secantes, uocalibus neruis simul rescissas, hominem de cætero uoce priuant. Nā supra nerui rescissionē, uocalia instrumenta denudata, & inter curandū perfrigerata, uocis actionē amiserunt: pro multitudine uerō, certū est unā facilius quam plures curari posse. Sicut quātū ad ortū attinet, lōgē citius curantur eleuatæ, q̃ insertæ. Optima porro ac cōpōdiō sissima sanabiliū strumarū curatio fit per chirurgiā. Aegrū igitur prostratū decumbere oportet. Sedens enim faciliē animi deliquium incurret. postq; igitur decubuerit,

decubuerit, cruribus inter se cōpositis caputā minis-  
tro detineatur. Deinde cutis tumori incūbens, recta  
uel obliqua sectione incidatur. Sectio enim trāsuer-  
sa collo incōmoda est, quā uasa & nerui recta por-  
rigantur. Neq; uno impetu tota cutis crassitudo dis-  
secetur. nihil enim uiolente fieri debet. Et in paruis  
quidē tumoribus simplex sectio fiat, in maioribus  
autē ad myrtē folij figurā cutim rescindens, tum uasa  
paulatim denudata sepones, quae quā naturalis carne  
sint cādidiora, faciliē discernes, postea sectionis labia  
hamulis distendes, & pelliculas de summa tui manu,  
tum scalpello detrahes. Quod si incerta fuerit, atterē  
res peragenda est, ne per incuriam sanguinis eruptio  
fiat, atq; ea gratia unū tantum sectionis labiū hamu-  
lis distendatur, & ita sensim à connexis corporibus  
per scalpellū separetur. Et ubi ex una parte connexa  
fuerint disparata, in altera idē fiat. Deinde tota basis  
diligēter, propter neruos & uasa substrata rescetur.  
At in frumis circa alas ac inguina ortis, sectio trāsa  
uersa fit ob cutis reduplicationem, peractio opere fit  
sanguis erumpat, medicamēta sanguinē sistētia su-  
prā relata adhibeantur; Sin minus, sectio thuris pol-  
line expletur, & linamenta indantur, & lana uino  
imbuta adalligetur, postmodum permixtis ligamentis,  
locus uino, & oleo profūdatur, & hoc usq; ad tertīā  
aut quartā diem fiat. Deinde soluitur, & suppuratio  
procuretur, & curatio reliquis ulceribus communis  
fiat. Ad repurgādum autē, & incarnandū, ac cicatri-  
cem inducendā, theriaca efficacissima est. Cāterum  
inchoantes frumas, tum in pueris, tū his qui chirur-  
giā nō admittunt, medicamētis dissoluere ac discu-  
tere conabimur, & sanē curatio ipsarum similis est  
ei, quā ad induratos tumores paulō antē reuolimus.  
Primū enim molire, postea discutere oportet. Em-  
plastrum ad frumas, Strigmēta à palāstrae parietis  
bus derafa ac probē subacta, super lincolo extendi-  
to ac imposito. Aliud. Lasei aut calcei uiam cera-  
to cyprino aut irino exceptā imposito. Aliud. Sul-  
phuris & galbanī aequales portiones resina exci-  
pito. Aut dibani testā cum aceto terito, & uelut ce-  
ratum efficit. Aut corticem radicis subdragorē cy-  
prino aut irino cerato excipito. Hoc equeidē effica-  
cissimum est. Aliud, Strumas crodens. Sandarachā  
cum adipe caprino aut bubulo, aut calce cū eodem  
imposito, aut nasturtiū cū cerato. Aliud. Succum  
cyrenaticū, aut si haberi non potest, laser cū melle at-  
tico ad ceratū cōpagem illinito. Aliud, rumpēs stru-  
mas. Pumex cū aceto tritus strumas rumpit ac resse-  
cat. Aliud. Semē nasturtij & lomentū aqua subigi-  
to, & quotidie bis imposito. Et post eruptionē eo-  
dem usq; ad exactā sanitatē utor. Aliud. Vrticē se-  
men cum uino tritū, rūpit, repurgat, incarnat, & ci-  
catricē inducit. Aliud. Grossos praefertim caprificū  
cū axungia imposito. Omnē enim tumorē discutit.  
Aliud. Recremētū ferri cum oleo, aut bdelliū cū mel-  
le, lincolo inducto, ac adhibito. Et quinq; diebus  
transactis soluto, & spongij locū foueto, cauens ne  
oleo inqueatur. Oportet autē bdelliū ad prunas cū  
melle subactū optimē distēdi, atq; ita applicari. A-  
liud. Pysyllij, lomētū, seminis urticae, pares portiones,  
pice liquida excipie ac utere. Aliud. Ofiroturē testas  
ustas ac minutissimē tritas inspergito, loco prius ui-  
no ex ore consputo. Atq; hoc frequēter facito, Em-  
plastra etiā adhibeantur, quae paulō inferius descri-

bētur. At quod ex achate lapide praeparatur, ad sup-  
purandū, rumpendū, ac persanandū cōmodissimū  
est. Itē quod pardalis appellatur, superius ad hydro-  
picos relatu. Strumis insuper laborātes uiperarū esu  
magnopere iuuantur, quādamodū de elephantiāciis di-  
ximus. Itē si laser quoridie ieiunij ceteris magnitudi-  
ne uorauerint. Aluum etiā faciliē solubilem habere  
oportet, & tenui uisū uti, uomitūq; frequenter cie-  
re, & pituitā per os detrahere, ac caput resficare. Ca-  
taplasmata quoq; sincipiti adhibenda sunt, quae me-  
diocres pustulas excitare possunt, uelut est capparis  
radix cum polenta, ac reliqua huiusmodi. Smegma-  
tis item ac puluillis eiusdem facultatis utendum est.

De Bronchocele, hoc est, gutturis tumore. Cap. vi.  
Brōchocele appellatur tumor in gutture oriēs. Omnis  
enim tumor apud antiquos, cele nūcupatur. Nomē  
igitur cōmune est, sed species tumorū differūt. Qui-  
dam enim meliceris à melleo humore, quidā adipo-  
sus, quidā pultaceus, quidam canceratus appellatur.  
Aliquando etiā propter locale uasorum dilatationē  
oritur, quomodo frequentissimē ex partu cōtingit,  
quum in uehementissimis doloribus puerpera spi-  
ritū uiolenter deduxerit, cōstatq; uasorū huius loci  
dilatationē incurabilem esse, quādamodum etiā tu-  
morem in scirrhū induratum, malignumq; ac ma-  
gnitudine ingentē. Verū reliqui omnes chirurgie  
ac medicamētis cedentes facile sanātur. Chirurgia ue-  
rō praesenti tumori cōueniens sit, siue meliceris, siue  
adiposus, siue pultaceus tumor fuerit. At uerō quae  
gutturis tumores discutiunt, sunt bellium cū melle  
tritum, calx cum axungia, laser cum sulphure, lixi-  
uium cum melle, stercus caninū cum aceto. Aliud.  
Calcem uiuā, ammoniacū, bdellium, testam dibani  
ustam, æruginē, sulphur uiuū, paribus portioni-  
bus cū aceto terito, & axungia aut terebinthina exa-  
cipito ac imposito. Aliud, Adamathiij, Gallarij un-  
i. lapidis pyritae drac. iiii. pyrethri drac. ii. nitri dra-  
i. silphij selquidrachmā, sandarachae dra. iij. terebin-  
thinae dra. ii. cerae, picis, singul. drach. tres, axungiae  
ueteris drach. ii. aluminis liquidi unc. i. Arida cū  
uino ac fapa terito, & liquabilla liquefacta ammisce-  
to, ac uiuor. Aliud. Spumae argentis, aris usti, singu-  
lorum drac. vii. olei antiqui drac. centū, resinae pi-  
nus drac. x. galbanī, ammoniaci thymiamatis, sin-  
gulorū unc. i. aluminis scissilis, mannae thuris, sing-  
drac. iiii. oleum cum spuma argenti coquito, & me-  
dio cōstare tempore as tritum inspergito, & bul-  
lire finito donec non amplius inqueant. Deinde li-  
quabilla liquata adijcto, & ab igne sublaris pollinē  
thuris ac alumen ammisceito, ac uiuor. Aliud. Sil-  
phij, similaginis, singulorum drac. vii. caldis uiuāe  
drach. xvi. sandarachae dra. xii. mellis quantū satis  
est, praeparare ac utere. Ad laxos autē tumores qui sub  
mēto oriuntur, tridem illyricum cum aqua tritam,  
adfecta modica rubrica, ter singulis diebus illinito.  
Est enim medicamentum insigne.

De pultacei ac mellei humoris tumoribus, Leonide.

Atheroma est tumor cōcolor, citra dolorem, in tunica  
neruosa, humorē pulticulē similē, quae ex farina co-  
cta sit, & athera Graecis appellatur, cōtinēs. Aliquā-  
do autē unā cum pultaceo humore, lapidosa quaedā  
duraq; corpuscula, & alia tanquā sulphuris ramēta  
reperiuntur. Aliquādo uelut mās gallinarū ostēta

Inuenimus etiā aliquādo uelut pilos crassissimo humori cōplicatos. Philoxenus autē dicit se aliquando reperisse animalia in humore, culicibus aut muscis paruis similia. Est autē atheromatis tumor specie & figura oblongus, sublarisue, & ad compressionem digitorū, ob humoris crassitudinē, tardē cedens, & amotis digitis tardē reuertēs. Meliceris autē est pellicula neruosa tenui humore insar mellis repleta, si militer citra dolorē consistens, differens ab Atheromate figura, & humoris essentia. Nā & figura rotundior est, & humoris essentia tenuior. Et huius tumor magis extrēditur, & ad digitorū cōpressionē celerius cedit, & amotis digitis pari celeritate reuertitur. Ceterū p. chirurgiæ ratione nihil refert, siue pulaceus, siue melleus, siue feculentus humor, aut cuiuscunque essentia fuerit cōtētus. Vnus enim scopus propositus est, ut tunica siue pellicula humorē continens auferatur. Sed id considerandū est, quod tumores quidam sunt eleuari, & ad motum ac contactū expositi, facileque curabiles. Quidā contrā inseri, & ad motū nō expositi, & in chirurgiæ aggressionē summā diligentia expectentes, propter imminentes sanguinis eruptiones ac neruorū puncturas. Plerique enim chirurgi ob imperitiā etiam neruos substratos cum huiusmodi tumoribus reddūt. Chirurgiam itaque aggressuri, ægrum in sella locabimus. Et si paruus fuerit tumor, simplicem sectionem faciemus, uelut in strumis diximus. Si uerō maior, ad myrtili folij figurā pro tumoris ratione, cutē incumbētē rescindemus. Sed neque hic uno impetu tota sectio fiat, ne pellicula humorē cōtēns diffecerit, & humor euacuetur. Si enim euacuatus fuerit, & tumor cōciderit, tunica difficulter excoriari ac curari poterit. Sūma itaque diligentia pellicula paulatim excorlanda est, nihilq. de ipsa circa basim relinquendū, ne malū regeratur. Post ablata pelliculā, labia sectionis cōmitamur, & si plus æquo laxa fuerint, redundantē cutē rem secalemus, deinde futuris labia cōnectimus. Illud porro animaduersione dignū est, ut si in capite huiusmodi tumor fuerit, post ablata pelliculā, membranam os ambiētē secalemus, & caluariam diligenter deradamus. Peractō opere in paruis tumoribus, quū paruam sectionē fecerimus, nulla difficultas imminet, & statim post futurā, splenium glutinatoriū inflammationibus accēdis idoneum adhibemus. Qui uerō adhuc cruenti sunt, & glutinari non possunt, in his ex maioribus interuallis futuras fieri oportet, ut oblonga sectionis figura facienda linamēta indere, & puri generationi studere, quemadmodū superius de abcessibus docuimus. At uerō ad eos qui chirurgiā recusant, medicamētis tumorē discutientibus utemur. Emplastrū ad Meliceridas, passurū uariū uinaceis exēptis lib. i. cumini leuissime triti sexcēm, nistri quadrāem. Omnia simul in mortario subacta adhibere, ac adalligato. At si resiones ex cōstructione remittere oportet, cerato ex triplo, ex oleo sicyoniso & pauca mastiche præparato. Aliud ad meliceridas, & cerā, id est, fauos appellatos tumores, cōmmodū. Squāmā aris & pollinē paribus portionib. ad malagmatis formā subigito ac adhibere. Aliud, ad meliceridas & steatomata. Ceræ, terebinthinæ, squāmæ aris, sing. sextiā, sulphuris uiui, nistri, sing. unc. i. radiū siccatū cannabis syluestris dra. xxv. Et si defuerint, Aristolochiæ rannundē, olei antiqui

lib. i. Radices per triduum aqua madesctas & conutas in oleo coquito, donec torrescant. Deinde ipsis abiectis, cetera quæ liquari debēt liquata ammisceto, & arida ex aceto trita adfictio, ac uisitor. Aliud discussoriū ad Meliceridas. Salis ammoniaci, spumæ argēi, cerullæ, sing. lib. i. ceræ, terebinthinæ, galbanī, opoponacis, sing. unc. i. rubricæ sinopice læuiscem, acetū heminā, olei antiqui lib. iiii. Spumā argenti, cerullā, & sal leuissime trita in oleo coquito, deinde rubricā acetū trita adfictio, & liquabilia liquata affundito, omnibusq. simul subactis ac perfrigeratis opoponacē ac galbanū aceto dissoluta ammisceto ac uisitor. Aliud ex asellis paratū, ad strumas, & meliceridas, quod etiā cicatricē inducit. Asellos subhydris stabulātes dūctos, ostreorum uisitorū drac. iiii. rubricæ sinopice drac. viiii. terebinthinæ lib. i. ostrea & rubricā primum seorsim, deinde simul terito, & tū asellos adhuc uiuos adfictio, ac simul terito, & postea cum terebinthina ad calidū cinerē lente coquito, donec non amplius inquiner. Sublaricē ab igne medicamētum in mortario subigito, ac adhibeto, & quinta die exsoluto, potest tamen locus subinde proli ac rigari aceto.

De steatomatibus, hoc est, tumoribus adiposis.

#### Cap. viii.

Steatoma est tumor præter naturā, adipē in se cōtēns, mole cōcolor, & tactu lenis, & in principio quidem pusillus, sed tēporis progressū ampliatur, pleracq. uerō steatomata basim habēt ampliorē, raroq. contingit, ut basis angustior, & apex amplior reperiat. Differt a struma, tactus mollitudine, quia nota etiā ad meliceridē & atheromate discernitur. Curatur & hic p. chirurgiā, sectione p. tumoris magnitudine scite, simplici aut ad myrtili folij similitudinē, atq. hic habere cutim incidimus. Nō enim sicut in atheromate ac meliceride tunica sectionē formidamus. Nā pinguedo adiposa etiā secetur, non effluet. Verū illud neglegendū non est, quod in strumis quoq. prædiximus: si steatoma eleuatū fuerit, in circuitu & subter excoriari oportere. In circuitu per scalpelli, subter uerō, digiti. Inserit uerō in ambitu & subter incidendū esse, peractō opere uulneris labia futuris cōstringantur, ut melius glutinētur. Aut linamēta profunda indantur, & curato ad puris generationē adhibeatur. At uerō si steatomata apicem amplum, & basim angustam habuerint, missis superuacuis, tota a basi rescindemus. Hic enim chirurgiæ modus expeditissimus est, & ulcus parū ac planum fiet, & curatio cōpendio transigetur. Cæterum steatomata discutiūt, floribus bupthalmi, cerā & oleo antiquo exceptis. Idem facit & cydamini radix axungia ueteri excepta, possunt & emplastra ad meliceridas præferri adhiberi, præferim quod ex sulphure & nitro paratur, & similia inferius referēda.

De ganglio, Philagrij.

Gangliū est nerui nodosa coactio ac tumor, ex plaga aut labore oboritur, raroq. sponte prouenit, manuū iuncturas, ac talos frequētius occupans, rarius cubitū & caput. Fit & in alijs partibus. Quantū ad notas attinet, tumor est inæqualis, paruus, dū cōprimitur, stupidum sensum exhibēs. Differtq. ad meliceridē & atheromate tumoris inæqualitate & renisu, & quod nō orbiculatim uelut illa trāseretur, sed dextrorsum solū ac sinistrorsum pro nerui situ flectitur. Ceterū

Quæstio gangliorum

gangliorum chirurgiā abstinemus, praesertim si in manibus fuerint ac pedibus, & medicamentis tātum curamus. Ad hanc rē ammoniacū iuxta ignē ad emplastrū copagē emollitū imponitur, & lamina plūbea tumori aequalis supponitur, & ne hinc & inde labet, arctis uinculis mediā cōstringitur. Transactis aliquot diebus ubi gangliū fuerit emollitū, nulla rei mentione ad agrū factā, statim dum adhuc calet locus, uincula tollimus, & pollicem dextrae manus gāglione immitimus, ac reliquos quatuor digitos ipsi parti infectos cōprimimus, & gangliū cōfestim dissolvitur. Vere etiā mollitioris emplastris, praesertim eo quod ex psyllis, pice, masticha nigra, stercore columbino, & malua sylvestri praeparatur. Vere & Lucij malagmaris ad cōtractos articulos descriptis. Commodum est etiā hoc. Cerussē, olei antiqui, resinae pinus, sing. lib. i. cerā sextantē, ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. unc. i. Cerussam cū oleo coquit, donec non amplius inquit: deinde ammoniacum tritum, postea resinam & cerā. Postremum galbanum praemollitum adijctio. Alij resinae quincuncem, cerā autem trientem coniungunt.

#### De uasorum dilatatione.

Cap. x.

Vasorum dilatatio, quam aneurysma Graeci uocāt, in qualibet corporis parte fit, sed in gutture frequentius, ubi tumorē branchocēla appellatum producit. Accidit saepissime mulieribus in partu, propter uio lentā spiritus detentionē. Sed & in capite circa arteriarū locos, & in reliquo corpore, ubi arteriae uulnerantur. Sicut quādo imperitū medicū uenā cubiti secūri, simul subiectā arteriā dissecant. Oritur autē cōminio uasorum dilatatio, aut dū sanguis & spiritus ex arterijs persultant, aut dū oscula ipsarum aperiuntur, aut dū rumpuntur. Sanguis autē & spiritus paulatim excreti sub cute colliguntur. Notae aneurysmatis sunt, tumor parvus, aut magnus, concolor, citra dolorē, ad tactū mollis, spongiosam laxitatē praeseferens. Et ita ad digitōrū cōpressionē decens, ut prope modū euanelcere uideatur, uerū amotis digitis dū tūmē reuertens, id quod in menti aneurysmate, & reliquis quā sine uulnere sunt, praecipue uidere datur. At ubi arteriae uulnus praecessit, & deinde coalescente cute uasorū dilatatio accessit, tumor non similiter mollis occurrit. Sanguis enim copiosior spāriū est, qui in grumos coit, & tumor exēdit. Atq; hae quidē sunt notae. Quātum uerō ad curationē attinet, sciendū deplorata esse aneurysmata apud chirurgos, quae gutturi aut capiti accidunt. Simul enim cum aneurysmatis sectione, abundāntissima sanguinis eruptio cōtingit, cū quā etiā uitalis spiritus simul eripit, ut homo saepe in medicorū manibus deficiat. Ac uerō quod in cubiti cauitate sit aneurysma, hoc modo per chirurgiā aggredimur. Primū arteriā superne, ab ala ad cubitū, per internā brachij partē delatā signamus: Deinde in eadē internā brachij parte simplici sectionem, tribus aut quatuor digitis infra alam, per longitudinē facimus, ubi maxime ad tactū arteria occurrit, atque eā paulatim denudat, deinceps incubens, corpusculā sensim excoarctamus ac separamus, & ipsam arteriā ceco uncino attractam, duobus sili uinculis probe adstringimus, mediamq; inter duō uincula dissecamus, & sectionem polline thuris explemus, ac linamentis inditis cōgruas deligationes adhibemus. Postea uerō tumorē in cubiti cauitate siue flexura, securi secamus, nihil amplius ue-

rentes sanguinis eruptionē. Tunc grumis euacuat, arteriā uero sanguis prodij perquirimus, & reperiātam uncino attractam sicut priore cōstringimus ac dissecamus, rursusq; thuris polline sectione expleta, puris generationē procuramus. Ceterū ad gutturis aneurysmata, emplastrū e cupressi inferius inter diffusoria medicamentā describēdū cōmode adhibetur.

De cerijs, hoc est, fauis.

Cap. xi.

Cerūm tumor est ulceratus, incumbētē cutē perrodēs, ita ut ex foraminibus melleus humor excernatur: quapropter tū ob foraminū figurā, tum propter excreti humoris speciem, ceriū, hoc est, fauus appellatur, frequētē autē in musculosis locis, in articulis, & plātis pedū oritur. Saepē etiā textā colli uertebrā occupat, & aliquādo etiā costas inuadit. Si uerō in capite generatur, primum reliquis paribus, deinde caluē etiā putredinē transmittit. Proinde in principio subscriptis medicamentis curationē tentabimus. Quibus superatis partes corruptas praesertim in capite rescicare oportet, deinde mēbrana caluē ambiente dissecata, os caluē deradere, tum ferreis cauterijs, labia sectionis excurrere, ita ut caluē ne attingamus, id quod etiā in alijs diuturnis affectionib; fieri debet. Postea medicamenta ad nomas descripta adhibenda sunt. Quale est siccū ex charta usta praeparatū, & passillus lana succida, ac reliqua huiusmodi. Lēuicula quoq; coctā, cum malicorio aut oliuē folijs imponemus. Sedata autē noma, curatio reliquis ulceribus cōmunis fiat. At uerō incipitibus fauis cōmoda hęc sunt. Sulphur & ordet farinā aqua mulsa coctā imponito: aut adipis suilli, terebinthine, & mellis partes portiones ad cōgruā compagē coctas adhibeto. At ubi aperti fuerint, sulphure uiuō cū pice liquida uitio. Aut trui farinā cū melle impone. Aut squamę aeris, pollinis thuris, passilū uuarū, partes portiones similitritas adhibe. Ad ampliōres autē fauos sicut fauolitas apponito. Ego uerō leniculā coctā, cum malicorio, ac melle subactā imponere soleo, & si infiamatio addit, modicum panis adijcto. Sedata uerō inflammatione, malagma Helladicum, aut emplastrum melinum Serapionis, aut Pasionis, aut Venus appellatū, adhibeo. Molliora autē adhibēda medicamentā esse oportet, propter molestias ex duris obortientes. Si itaq; durius fuerit, cū oleo emollitūm erit.

Emplastrā ad oriēta uulnera glutinanda, &c.

Cap. xii.

Ata-stylis, quā aliqui Androsamem uocant, herba est aculeata, humorē sanguineū reddēs, si folia eius cōprimantur. Hāc radicis euallam & in umbra siccatā trito, & angustissimo cribro excernito, & de ea accipito trientē, colophoniam sesquialbrā, olei dulcis trientē, aeruginis sextatē, cerā bellē. Oleū, cerā, & colophoniam liquisfacto & excolato, deinde aeruginē, & postea herbā trita ac cribratā adijcto, ut omnia simul in frigida aquā coctā manibus subigito, & in eadē frigida per totā noctē finito, ac deinceps ad crustā uulnerā in quacūq; corporis parte reponito, siue in infantib; siue in adultis fuerint. Facit & ad ulcēra antiqua, sectiones, scissuras, fugillata, & ex frigore dolores. Exterit crustas & cetera quae in ulceribus, difficulter repurgantur. Lepras itē ac utiligines curat. Etenim semur cuiusdā enīse dissolutum, ita ut uulnus usq; ad inguē penitus sitimē progrediretur, quum per quatuor menses aeger decubisset, neq; glutinationis initium appareret, hoc ego medicamentū aglutina

glutinaui. Tibiam prætereā alterius ad poplite usque ad calum vulnerei, inflammatione prius mitigata, cū cataplasmate ex lomento passo, uino mulso elotos, ad uires uidelicet excitandas, feliciter curauit. Illud uerò constat, fistularū sinuumq; ligamēta, & superioribus partibus ad inferiores moderata cōstructione ducenda esse, quò humores in cauitatibus delitescētes, ad osculum ulceris exprimantur. Viride Andromachi hecatō drachmō uocatū. Ammoniaci thymiamatis drac. viii. squamæ æris drac. xii. pollinis thuris drac. xvi. resinæ pinus drac. xii. adipis uituli drac. xiiii. terebinthinæ drach. viii. ceræ drac. xxx. olei drac. viii. acetī quātum satis est. Hoc magna uulnera glutinat, sordida ulcera extergit, crassaq; ipsorū labia detegit, sinus contrahit, disculsiōis ac repulsiōis uisum habet. Et cū cerato linamentis illitū ac inarditū caua ulcera incarnat. Viride quod Iſis appellatur, à quibusdam Hermoni sacerdoti inscriptum. Hoc ad multos usus cōmodat, & ad omnia uulnera, præcipue capitis uñ cum osibus dissēctis. Sanat enim cūra destructionē ac perforationē: facit etiā ad puncturas, aculeos infixos, hominū ac canum morus. Ad uiperæ itē ac scorpionis, draconisq; marini ac pastinacæ uenena. Et ad artuū fracturas cum uulnere, citius enim ac securius callū obducit, facit ad fistulas omnes recentes, & antiquos ipsarū recessus, sinus, tubercula, parotidas, mammarumq; ac alarū abscessus, aut ut ne fiant, aut ut facti curentur, cōmodum sanie effluxum nobis procurantibus. Idē strumas auferit cum tunicis celerrimè suppurrans: frontē uerò impositum fluxiones oculorum sistit. Liuiore delect, gangrænas obliterat, putredines repurgat. Et in summa efficax est medicamentū ad omnia. Ceræ drach. centū, colophoniæ drac. ducentas, alii centum, squamæ æris rubri, æruginis rasæ, aristolochiæ rotundæ, thuris, salis ammoniaci, thymiamatis, æris uisti, singul. drac. viii. aluminis uisti dra. vi. aloës, myrrhæ, galbani, singul. drach. xii. olei antiqui lib. i. uel sexuncē, acetī quātum satis est. Atq; hoc quiddē emplastrum absolute Iſis appellatur. Verūm Iſis quæ Epigono inscribitur, etiā radicis dracūculi dra. viii. recipit: quæ Galenus se uti dicit. Sola enim dracūculi radix per se tusa ac probe trita ad puluilli formam, maligna ulcera curat. Metallica igitur cum acetum in mortario terito, & deinde reliqua trita ac cribrata adijcto, & liquabilia liquata ad ipsa in mortario affundito, subigito, ac unito, & uitior aliquando purior, aliquando mixto ac dissoluto. Ad ulcera enim sordida adhibetur medicamenti pars una, cerati uerò rosacei liquidi partes duæ. Verūm ad ea quæ modica extersione opus habent, medicamenti pars una, cerati partibus tribus ammiscetur. Emplastrum Machæionis celebre, & ad multa cōmodum. Congruit ad relata omnia. Sed & recēta uulnera glutinat, & ab inflammatione tutatur, & præsertim quæ cōiuncta sunt, facit & ad canis rabidi morsum spatiores loco impositum, & asidue permutatū, facit ad omne nomen ac ulcera depulsa, & ad aurū ac puendorū ulcera. In osibus autē denuclatis carnē auget. Cōpetit & nariū ulceribus. Diluitur autē rosaceo. Aristolochiæ rotundæ, galbani, æruginis rasæ,

opopanax, iridis illyricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, singul. drac. viii. terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorū septuicē, & uncia dimidiū. Olei dimidiū cū ærugine terito, & reliquū cū cera ac terebinthina coquito, opopanax autē cum aceto dissoluit, & simul subigito omnia, ac unito. Emplastrū Cephalicū ex herbis, sine perforatione: quāmas disparat, & ossa corrupta educit. Verū osibus præralis adhibere oportet. Idē ad recēta uulnera facit, & nomas linamētis indita repurgat. Cū rosaceo uerò cerato replet, una eius pars, ad duas cerati ammixta, facit & ad carcinomata ac putrida ulcera. Exterit lepras, furunculos dissoluit, strumas suppurat, & expurgat, cōuenit podagricis, & tephaceis ipsorum duritias dissoluit. Anagallidis cæruleum florē habētis, papaueris corniculati, foliorū tenerorū hyoscyami, marrubij uiridis, singulorum drachm. i. vi. squamæ æris rubri drach. x. v. mannæ thuris drac. x. resinæ pinus sicæ drach. x. vi. aloës drachm. vi. aluminis scissi, & rotundi, ammoniaci thymiamatis, salis ammoniaci, singulorum drachm. iiii. ceræ drachm. centum, olei ueteris heminas duas, siue uncias x. acetī quantum satis est. Herbarum folia in pila leuiter tundito, ut succus nō exprimatur, deinde in mortario coniecta minutissime terito. Et in alio mortario, squamā, pollinē thuris, resinam pinus, alumen, aloē, salem, & ammoniacum thymiamata, ad solē ad frigiditiam spissitudinē cum aceto terito, & ammixtis herbis, omnia simul terito. I. liquabilia deinde liquata frige facta, ac erasa adijcto, subigitoq; simul ac uitior. Emplastrum Hæstia, id est, Vesta appellatur, quod etiā ex Græci nominis literarum calculo, drachmarū x. vi. inscribitur, & ad Nechepsonē regē refertur. Conducit ad omne uulnerū genus. Ad neruorū puncturas per se sufficit, omnē oculorum destillationē pro glutinamento appositi reprimat. Venenū uirus ei aculantū bestiarū exugit, ita ut emplastro adhærens cōperiat. Nomas itē & fistulas ac ulcera maligna repurgat, & ad cicatricē perducit. Nariū ozænas sanat cū aceto, facit & ad strumas, & tumores induratos. Aut enim discuit ipsos, aut rūpi, ut admireris. Varies sanat, sagittas & aculeos extrahit. Spumæ argenti, ceræ, singulorū drach. lx. x. terebinthinæ dra. x. vi. Aristolochiæ, propolis, galbani, singulorū dra. x. x. æruginis dra. x. gallarū, radicis chamæleonis nigri, singul. dra. x. x. olei sextar. iiii. adipis uitulini dra. x. lvi. acetī dra. x. x. succi brasicæ dra. viii. serapiadis tritescularis dra. x. vi. succi medullæ arundinis dra. x. i. olei, spumæ argenti, & adipis simul coquito, donec probe uniat. Deinde cerā, resinā, galbanū, propolim prius cū modica cera in mortario tusam adijcto, & ab igne ablatis, aristolochiā, gallā, radicem chamæleonis addito. Aeruginē uerò cū succis & aceto tria reliquis, ubi ita puerint, postremum ammiscito, omniaq; simul in mortariū cōiecta subigito ac manibus emollito. Et utere tanq; admirādo. Aliud ad cruciā uulnera glutināda, purpura inscriptū. Spumæ argenti, olei dulcis, sing. lib. ii. picis, ceræ, colophonæ, sing. unc. x. vi. radicis symphyti minutissime tritæ ac cribratæ sextantem, sanguinis draconis sextantem, aquæ marinæ unc. xx. oleum, spumā argenti, & aquam marinā simul coquito, donec nō amplius inquinēt. Deinde liqua-



bilis liquefacta adijcitur, & ab igne ablatis draconis sanguine ac symphytum addito, & perfrigerata manibus subigito, ac in massas efformato. Ceterum sanguis draconis in India ex herba dracunculo appellata colligitur. Phoenicium, Galeni. Spuma argenti leuissimæ tres libras tres, adipis suilli insulsi, antiqui, libras duas, olei antiquissimi libras tres, chalcididis crudæ trientem. Spumæ argenti tritam, ac cribratam, rursus cum chalcidide in mortario exquisitissime conteres. Deinde oleum in sole ammisceris, ut liquidum medicamentum permaneat. Tum adipem exoptis fibris in mortario rursus, quo facile liquefaciat, ad ignem liquefacto, & excolato, donec purissimus euadat. Atque eius ita preparati lib. ii. in mortario diligenter cum cæteris permiscito. Deinde omnia simul in cacabum transfusa coquito, ac palmæ ligno agitato. Sufficiet autem tibi ramus unus magnus, ut crassiore eius parte ad agitationem spatulæ uice utaris. Adherentes autem crassæ eius parti ramulos utrinque exortos resecabis, & corticem detrahes, & in tenues partes cōcisos in medicamentum cōijces, ut ibi succus ipsorum excoquatur. Hæc uero segmēta palmæ, cum demum inijces, ubi medicamentum cerato simile cōpagē habueris. Si enim a principio incideris, succus per decoctionē cōsumetur, quæ ob uisum adstrictioria permanere uolumus. Sed & ipsius spatulæ qua pharmacum uersatur pars infima in coctura arefacta, ressecada, ac abijcenda est, ac residua uedēs, atque hoc facie pacifacitū est, ubi fuerit ressecata. Vbi uero pharmacum non amplius inquisnarit, priusquam exarefacta, ab igne tollatur, & exemptis omnibus rami segmētis agitur, donec frigeat. Deinde in mortariū trāslatum, ac manibus subactū, in massam redigatur. Hoc ad cruenta uulnera, & ulcera ægre cicatricē accipientia utimur, & oleo dilutū in sinus fundimus. Cōuenit paribus omnibus inflāmatīs, & podagris, quo tempore dolores nō uehementer urgent, & irrigationibus ac fomentis mitigantibus opus est: facit ad inguinū tumores, tubercula, ambusta, perniones, cōtusa, fracta, & omnes fluidas affectiones. At uero si chalcididis sexuncē incideris, longē efficacius fiet ad ampla uulnera glutinanda, & ad cicatricem inducendam. Sed non ita inflāmatīs conuenient. In dissoluendū uero pharmacum, hanc proportionem seruabis, ut medicamentum paululum olei quantitatem excedat, præsertim ætatis tempore, ut sit medicamentum quidem dextans, olei uero dodrans. Emplastrū duplicis coloris. Aeris uisti quadratē, aluminis scissi unc. i. colophoniæ, adipis suilli recentis, ceræ, singulorum lib. i. lactei quantum satis est. Emplastrū ex aqua & oleo. Spumæ argenti, olei sinceri, aquæ puræ, singulorum lib. ii. Argenti spumæ cum oleo, & aqua in mortario exquisitissime terito, deinde ad prunas assidue uersata coquito, donec non amplius inquinent. Hoc moderate refrigerat, & ideo paribus ulceratis nihil insulere sinit, & quod iam insulit, repellit. Desiccatur etiā ac discutit, & ulcera ad cicatricē perducit. Utimur eo ad mulierū, infantium, eunuchorum, ac cætera corpora, quæ molles ac albas carnes habent. Efficitur autem adeo glutinosum, ut ne ablutū quidē detergi possit. Sed ulceribus cicatricē includendis præcipue cōmodum est, ut adhibitis multis diebus adhareat. Cuius facultas est, & parhygrum appellatum, & reliqua huiusmodi. Emplastrum ex uino & oleo.

Spumæ argenti lib. i. uini & olei, singulorum lib. iii. Spumam argenti in mortario sub caniculæ ardore per dies quindecim cum uino antiquo dulci terito, tantum uini infunditū, quantum exsicari potest, & post prædictos dies oleū ac uinum affundito, & coquito simul assidue agitando, donec nō amplius inquinēt, & uitior. Hoc ego medicamentum oleo dilutum ad ulceratas affectiones adhibui, & sinus glutinaui. Et semper diu induratum persanaui, & optimum etiam ad uulnera cruciata cognoui. Ad sinus uero & duritias solidū, prout habet, imposui. Emplastrum ex aceto & oleo. Spumæ argenti libram i. olei antiquissimi libras tres, aceti albi acerrimi libras tres, Ad lentum ignem assidue uersatur coquito, obseruas ne in grumos cōant, & per integrum diē ebullire sinito, donec nigrescat, ac splendeat medicamentum. Enitendum est autē ut reuera non inquinē, facile enim imperitis imponit. Nam in frigida aquam diffusum, durissimū statim euadit. Sed postea digitis diutius subactum remollescit, laqueusque ac rursus inquinat: proinde nō prius ab igne remouebis, donec cōpertum habueris, nō amplius inquinaturum. Habet hoc summas exiccandi uires, & ideo cruenta uulnera glutinat. Ulcera curauit difficilia, & fistulas incipientes sanat. Ego enim cū eo fistula pueri a parotide exortam sanauit, quæ semestris existeret usque ad mandibulæ articulationē progressa fuerat. Sed & mulieres & adolecentulos eodē curauit, & induratos musculos emolliuit. Tribus autem diebus trāscatis soluere hoc oportet, & nouum adhibere, idque rursus post triduum exolueret. Emplastrum Galentis, Harmonia appellatum, supra ad maligna ulcera descripsimus. Emplastrū solum Piscatoris, ad cruenta uulnera, sinus glutinat, inflammationes sedat, duritias ac strumas discutit, plurimum rosaceo dilutum caua ulcera replet, sordida extergit, & ad cicatricē perducit. Spumæ argenti sesquialib. ceræ lib. ii. galbani, cæsypi, terebinthinæ, propolis, pollinis thuris, rubricæ, singul. sextantē, olei lib. ii. aceti lib. iii. Spumæ argenti ad aestiuum solē cum aceto terito, quātum imbibere potest. Deinde oleo ac reliquo aceto affusus simul coquito, donec nō amplius inquinent, tum liquabilia liquata & excolata inijcitur, & postea ab igne ablatis pollinē thuris, rubricæ, ac galbanū ex aceto tritum adijcitur, omniacū simul subigito. Et demū liquefacta ac crassa manibus mollior, ac uitior. Hoc ad sinus glutinosos efficacissimū est, ita ut spōgia ex uino expressa superimponatur. Aliud solum piscatoris, facit ad cruciata uulnera, & cōcisos neruos. Ite ad antiqua ægre redpientia cicatricem ac fluida ulcera, probē etiā emollit, præsertim duritias circa mamas exortas. Utimur eo & ad hominū & canum morsus. Egregiē facit & ad pastinacarum marinarū, & draconū, & aliorum horrendorum piscium plagas. Et in summa est cōpositio admiranda. Spumæ argenti, ceræ, singul. dra. cētum, terebinthinæ, mannæ thuris, galbani, rubricæ sinopice, abscq; tamen aceto. Aliud piscatoris celebre. Spumæ argenti, ceræ, sing. dra. c. terebinthinæ, myrrhæ, minij sinopici, æruginis rasæ, squamæ æris, sing. dra. vii. aristolochiæ dra. vii. thuris dra. x. x. v. diphyrgis dra. v. i. ammoniac thymiamatis, galbani, sing. dra. xii. olei lib. ii. Aliud Tyrium. Ad ampla uulnera & qua

& quadrupedū morsus, surūculos discutit aut rum-  
pit, humorē ex crustis inductis extrahit, & ad dica-  
tricē ducit, frōnē imposuit oculorū fluxiones reprimi-  
t. Hoc post cocturā purpuræ tyriæ colorē habet,  
atq; hinc appellatōne traxit. Spumæ argētī, libr. v.  
aeris usq; squamæ aeris, æruginis, galbanī, sing. trien-  
tē, ceræ lib. ii. resinæ pinus pinguis lib. iiii. olei lib.  
vi. Spumæ argētī, & oleū in mortario simul probē  
trita, in ollā coniecta coquito, & assidue uersato, do-  
nec mellis cōpagem acquirat. Deinde adiecta ærugi-  
nē, & squama ebullire finito, & postea usq; usq; ad-  
dito, & simul coquito, donec bonus color euadat,  
& nō amplius inquinēt: tunc cerā, ac resinā excolata  
adijcto, ac rursus coquito donec non inquinēt, &  
postremū ab igne ablatis galbanū ammisceto, ma-  
nibusq; probē subigito, ac uxor. Emplastri ex ane-  
mona: Colophoniz drac. lx. xliii. resinæ pinus li-  
quidæ, ceræ singul. trientē, olei dodrantē, florū ane-  
mones recētum, exēpto nigro quod in eis reperit-  
ur, & rectis ungulibus bescem. Colophoniam cum  
oleo ad lignorū pini ignē coquito, & redacta spa-  
thula usq; ad solidā compagē agitato, deinde resinā  
adijcto ac rursus coquito, donec nō amplius inquā-  
nent, & postea cerā addito, qua liquefacta medica-  
mentū ab igne tollito, & ad flores in mortario tri-  
tas diffundito, manibusq; oleo illius subigito: est e-  
nim glutinosum. Aquā autē uitare oportet, facit ad  
crusta uulnera, & carnes conuulsas, ad maligna anti-  
qua exuberantia ac ægre cicatricē admittentia ulcera.  
Ad uenitū elaculātū bestiarū ictus. Ad tumidos, in-  
flāmatos, dolētes ac egre mobiles articulos. Ad stru-  
mas, fistulas, gāglia, iteatmata, surūculos, sinus, no-  
mas, abscessus rū aliarum partiū, cum maxime tho-  
races: Ad eruptionē sanguinis nāriū, spleniū ex codē  
stomacho imponitur, potest & ad frontē imponi. Et  
in summa, mollit, discutit, contrahit, siccit, ac dolorē  
mitigat. Quod si cū aceto præparare malueris hoc  
medicamentū, ita facito, flores anemones rectis un-  
gulibus purgatos, & ad solē siccatos, in uitreo uase  
seruato, & eorū postea bescem sumito, & acetū albi  
acerrimi heminas atticæ tres affundito, ac per diē  
non ostēni macerato, deinde manibus subigito, paula-  
timq; omnē succū exprimito. Et colophoniz lucida-  
sime drac. v. resinæ pinus liquidæ, ceræ, olei,  
singul. trientē, succi anemonis heminas Atticæ duas,  
& dimidiā accipito. Et colophoniz cum oleo ad tæ-  
dæ lignorū ignē siccū coquito, redacta q; spathu-  
la assidue agitato, donec solidū pharmacum eua-  
serit. Deinde resinā paulatim adijecto, ne ebulliens  
extra ollā redundet, & rursus bullire finito, & ubi  
planē solidū uideris, cerā addito, ea q; liquata me-  
dicamentū ab igne ablātū spathula uersato, atq; ubi  
is deferbuit, succū paulatim infillato, diligēter ob-  
seruato ne effuerat. Facile enim ebullit, ut pericu-  
lū sit, ne superfundatur. Postq; autē ita paulatim am-  
mixtus fuerit, uariū purpureū ac suauē colorē phar-  
maco affricat. Omni igitur succo infecto ac unito,  
medicamentū in mortariū transferat, atq; frigefa-  
ctū manibus subigatur, donec totus succus secedat.  
Hoc ad eadē cōmodū est, ad quæ illud prius recētū  
florū pharmacū cōducit. Nisi q; leuius est, ac magis  
tēperatū, & ad canū morsus, ac uenenatorū ictus cō-  
modū. Idē rosaceo dilutū ad ani ac pudēdorū ulce-  
ra cōducit, ubi remissiore medicamēto opus habet,

Emplastrum Cephalica, & ad fracturas, & ad mul-  
ta comoda. Et de iusto eorum usu. Cap. xlii.

Cephalica, hoc est, capitalia, emplastra dici solent, quæ  
uulneribus capitibus adhibita, uim penetrandi in alium  
habent, squamasq; ac ramenta ossiū disparata, nō so-  
lum in capite, sed etiā reliquo corpore educit, ac ex-  
trahit. Itaq; acrimonia quandā ipsis insita esse opor-  
tet, per quā ex profundo extrahūt ad superficiē ex-  
ternā, non solū ossa, sed multo magis crassum uisco-  
sum, aut omnino uitiosum humorem. Quæ uerō ad  
fracturas fiunt, exterioriā ac discussoriā uim habent.  
Quidā uerō etiā adstringentia ipsis ammiscuerunt,  
ut quod ad affectas partes influit repellatur, & exter-  
rioriū uis usq; ad profundū deducatur. Verū hoc  
nosse expedit, quod si adstringentia nō ad lanuginē  
minutissimā trita fuerint, atq; hoc cū aceto, damniū  
magis quā utilitatē afferent, si attractorijs fuerint  
ammixta. Sed & hoc scire oportet, quod inter em-  
plastra ad fracturas præstantiora sunt, quæ capita-  
lia inscribuntur. Et propterea cū cerato præsertim ro-  
saceo, incarnare solēt, linamentis excepta, ac indita.  
Eiusdē porrō generis cū cephalicis est. Iis quoq; su-  
perius descriptū emplastrum, & quod Machæroni  
inscribitur, & Barbarū Hierę Cappadocis, quod a-  
liqui Aphrū appellāt, hoc Emplastrū nigrū, ad insi-  
gniores præsertim capitis dissectiones, fistulas, sinus,  
fracturas citra inflammationē glutinandas, ad neruos,  
charitragines, ac ossa cōcisa. Facit & ad ulcera profū-  
da, sinusq; magnos glutinat. Adhibetur etiā cōmo-  
dē abscessibus dissecatis ad sanietē educationē. Spleni-  
tis etiā, ac hepaticis cōducit. Et est ad cruenta effica-  
cissimū uulnera. Ad sanguinē reijciētes uobus co-  
rijs inducitur, quorū alterū pectori, ac costis impo-  
nitur, alterū dorso. Sanguinē em supra opinionē si-  
stīt. Facit & ad hominū, ac canū morsus. Et omnino  
inflammationes arceat. Ceræ, picis, bituminis, resinæ  
pinus, singul. lib. i. mannæ thuris sexcū, cerusæ, atra-  
mentī futuri, sing. trientē, opopanax sextatē, olei, a-  
ceri, singul. lib. i. Cerā, bitumen, oleū, acetū, modico  
ex eo relicto, omnia simul in ollā nouā indito, ac li-  
quefacto, deinde picē, & resinā probē cōiula adij-  
cito, & omnibus semicoctis, & ab igne remotis, ac  
excolatis, atramentū futuriū modico aceto residuo  
tritū inspergito, & ne effuerat cauetō, atq; iterū le-  
uiter coquito, ac uersato. Vbi uerō nō amplius in-  
quinat pharmacū, opopanax residuo aceto macera-  
tū ac dissolutū affundito. Et postea cerussam ac mā-  
nā probē trita inspergito, & paululū repescato, ut  
unitantur, cauens ne opopanax aut manna cōbura-  
tur. Atq; ita medicamētū in mortariū diffundito, & ubi  
frigefieri finito, emollito, reposito, ac uitior. Hoc  
omnia uulneraria medicamēta superat, uelut experi-  
mento cōstat. Est autē hyeme per septē dies, æstate per  
quinq; aut re ita urgere, per tres exoluēdū. Nigrum  
insigne ad multa cōmodū, Panalethes appellatū. O-  
lei dulcis dodrantē, bituminis, ceræ, resinæ pinus sic-  
cæ, picis, singul. lib. i. spumæ argētī, cerusæ, ærugi-  
nis, singul. drac. x. ammoniaci thymifamatis, thuris,  
aloës, myrrhæ, singul. drac. vii. opij, succi malorū  
mādragoræ, sing. drach. vi. aluminis scissi, atramentī  
futuri, chalciditis, croci, singul. dr. iiii. acetū quātū  
satis est. Omnia spuma argenti usq; ad crocū, probē  
ad strigementitā spissitudinē terito. Deinde oleum,  
& bitumē ad labarum magnitudinem cōiulum, &

ceram simul liquefacito, & sic liquatis picē, ac resina adijcito. Et hæc liquata, ac excolata rursus coquito, & trita adijcito, subigito ac utitor, facit hoc ad vulnera recentia, ad ensum, sagittarū, lancearū puncturas, ad fracturas item, ac contusiones, siue cū vulnerē, siue sine vulnerē fuerint. Vtere & ad nequos vulneratos, ad canum, luporum, urforū, leonū, aprorum morsus, facit & ad venenum ciculacium, & præsertim ulperarum ictus, loco prius scarificato, & inde medicamentum impositio. Idem apponitur ad abscessus simpliciter sectione diductos, & sanie exalbris. Vulnē, ac ulcera repurgat. Et quosdā uertebris, ac talis fauciatos perlanauit. Ego uerō manum alicuius ense inter ulnā, & radium vulneratā, eo curauit. Cōfert & ad ferotum cōfissum, & ad hepatis, ac splenis inflammationes ex febris obortas. Duobus item corijs illitum, ut alterum pectori, alterū dorso imponatur, sanguinis refectionem sistit. Ad inflammationes autem irrigationis uice adhiberi potest, ita ut accipiat de eo quadrās, ceræ uerō, & resinæ frictę, ac picis, singul. sextans, & olei lib. i. Hæc liquentur, ac colatur, & cum medicamēto, ac farina ordecæ quadratē, cum aceto trito imponatur. Sic etiam flagellatis conducit. Aegyptiū Andromachi celebre, ad sinus maximos glutinandos, ad ossa carne nudata, ac cōfisa, ad detortos, ac luxatos articulos, ad abscessus, ad hominū, quadrupedum, ac reptilium bestiarum morsus, fronti impositum oculorū fluxiones sistit, maximas ac profundissimas ensum cæsuras triduo sanat. Eximiam discutiendū uim habet, ut etiam pus, nisi ualde multum fuerit, sine cutis perforatione discutiat. Membra quomodocunq; indurata emollit, & maligna ulcera, ad cacatricem perducit. Ceræ, spumę argenti, singulorū drach. c. xliiii. ammoniaci thymiamatis drachm. lxxii. terebinthinæ drachmas xxxii. lanæ succidæ uisæ drachmas xviii. aristolochiæ, thuris, squamę æris, singulorū drachmas viii. squamę ferri romaniatis drachm. viii. myrrhæ drachmas iii. opopanax drachm. ii. olei cicini aut scyoniū, uel antiqui lib. iii. Spumam argenti, cum oleo ad copagē coquito. Deinde addita squama rursus bullire sinito, donec non inquinaet. Tunc cerā primū, deinde ammoniacū tritū adijcito, & his liquatis terebinthinā addito. Et ab igne ablatis, thus tritum, & lanæ cinerem inspergito. Et frigescentium pharmacū manibus subigito, ac utitor aliquando puro, aliquando diluto. Panacę emplastrū, quod aliqui Trilum fratrum uocant: Hieras Hygieam, id est, sanitatē appellat, facit ad nomas, & omnia ulcera maligna. Cōfert enim nomas, neq; crustam inducēs, neq; circumfusa corpora indurans, sed omne corruptum rumpēs, ac tabefaciēs, ut nihil differat ab uuis patis humidit. Sanguinis fluxū superprimō, tū alibi, tum ex hæmorrhoidibus erumpentē, sed & ipsas hæmorrhoidas tabefacit, ac consumit, præterea fistulas sanat, & carbunculos, & æglosopas, & ulcera chironia appellata, & in summa totū ægre curabiliū ac diuturnorū genū, priuatim uerō ad mārurū duritias, earundēq; cæcos, ac nomas cōducit, facit & ad hydropicos, splenicosq; ac articulorū affectiones. Et ad uterū qdē affectiones oleo cyprino dilutum, ac liquidum inijcitur. Externis autem præstat ita, ut est, imponere, uelut singula alia. Omni uerō ulceri impositum, etiam si ferū fuerit, statim ipsum

mitius efficit, & dolores iidem, ac uigilias mitigat. At uerō rosaceo dilutum, sinus magnos, & fistulas glutinat, prius dotos: recentes autē sinus aqua multa eluere oportet, deinde exterius medicamentum adhibere, & debitam ligationē facere. Ad fauos etiam inflammationes efficacissimum est. Verum Democritus etiam ad canis rabiosi morsum, & venenum ciculacium bestiarum ictus, sam liuescentes ac denigratos, & ad medicatas sagittas facere asserit. Spumę argenti, bituminis Iudaci, terrę ampellicidis, singulorum drachmas ducentas, thuris, propolis, singul. drac. l. aloës, polij, centaury, galbani, aluminis scissi, singulorum drac. xxv. chalcitidis uisæ drac. xvi. chamæpityos, symphyti, radicis chamæleonis nigri, marrubij, helenij, aristolochiæ, singulorū drac. xvi. gallarum, myrrhæ, iridis, singul. drach. xii. terebinthinæ drac. x xv. mellis Attici unc. xxv. olei noui lib. viii. Spumę argenti, terram ampellicidem, bitumen conustum, ad lenium ignē coquito, assidueq; uersato, citissimē enim exurit. Et ad strigenti spissitudinē redactis, chalcitidē inspergito, bullireq; sinito. Deinde alumen adijcito, ac rursus coquito, donec non amplius inquinaet, in alio uerō uase galbanū, propolim, & terebinthinā cum melle liquefacta habeto, & medicamēto ab igne amoto, hæc ammisceto, & his probe uisitis, arida trita adijcito, omniq; simul subigito, & in uase pelle cooperto reponito, ac utitor tanquam admirādo. Poteris etiā Archigenis nigro emplastro uti, quod inter orthopnoica medicamenta sermone octauo habetur. Nigrum Iesij, ad omne ulcus recens ac uetus, ad contusa, luxata, fracta, ad inflammationē, & omnem dolorem. Statim enim ad dolorem liberat, facit ad canum, ac hominum morsus, ad furunculos, & duritias, præsertim mammarū, ad tubercula sedis, ad hydropē, & quæ discuti oportet. Est enim atra storū, ac glutinatorium. Vlcera maligna, strumas, parotidas, perniones, panos, clauos, nigredines, impetigines, fistulas, & hamorrhoidas inflammationes sanas, aculeos & infixas extrahit, facit & ad uenenatorū ictus, & quadrupedū morsus. Spumę argenti, bituminis, terrę ampellicidis, singulorū dra. ducentas, propolis, ceræ, singul. drac. l. terebinthinæ, galbani, aluminis scissi, singulorū dra. xxv. chalcitidis drac. viii. myrrhæ, iridis, gallarum, singulorū drac. xii. Mellis lib. ii. olei omphacini recentis libr. viii. coquitur uelut panacæa, & spathula tædacea assidue agitatur, ne subsideat, facit limē enim comburit. Nigrum Asclepiadæ, ad ossium fracturas optimū. Hoc usus sum ad ossium fracturas, in quibus ossa disparata uelut innatabat, quæ cum cæteri auferenda fudicarent, ita præter opinionem detinuit, ut instat alii coalerunt. Spumę argenti drachm. ccc. bituminis drach. ccc. ceræ, picis, singulorum drach. c. resinæ pinus drachm. l. aluminis liquidi, propolis, singulorum drachm. xxx. ammoniaci thymiamatis drachm. xxiiii. æruginis drach. x. olei drach. xlv. Spumam argenti cum oleo coquito, donec non inquinaet. Deinde ceram, & bitumē priuatim liquato, & picem adijcito, & omnia colata ad spumę argenti ammisceto, postea ammoniacū tritū addito, & rursus ad bonā compagē coquito. Deinde propolim ac resinā plius adijcito, & ab igne ablatis alumē & ærugine minutissimē trita ammisceto, postremum medicamētum, in aqua acce-

to permixtā diffundito, manibus subigito, ac utitor. Emplastrū Athena inscriptum. Cadmiæ dra. xx. æris usti, malicorij, gallarū aristolochiæ lōgæ ac rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, nitri, aluminis scissi, aluminis rotundi, iridis, misyos, atramētū suori, chalcitidis, æruginis, aloës, myrrhæ, thuris, ammoniaci thymiamatis, galbani, sing. dra. xx. ceræ, pids, sing. dra. c. uelut aliq habet cc. colophonij dra. ccc. olei sexuic. Hoc quidē modo apud Oribasium habetur. Asclepiades autē habet aloës drac. x. myrrhæ drac. x. & ammoniaci thymiamatis dra. x. Arida ad solē æstiuum sufficiētibz diebus terito, & ad ea postea liquabilia liquefacta adjecto ac unito, facit ad sinus, & maxima capitis uulnera citra inflammationē glutinat. Cerato ligdo dilutū per linamētā inditur, ad punctos ac uulneratos nervos, ad musculos cōcisos, ad capitis ulcera, ad fistulas & ulcerū cuniculosos recessus. Ossā corrupta citra perforationē educti, facit ad nomas, putredines, cæceratas affectiōnes, inguinum, alarū, ac colli nigredines, & ad ulcera ægre recipiētia cicatricē. Et omnino uires siccatū habet, quas laudes Asclepiades ipsi adscripsit. Nigrū ex falicibus, celebre & ad multa commodū, facit ad cruentā uulnera, ad resolutos articulos, ad fistulas, madēte flaccidas carnes cōstringit, erysipelata & alias affectiōnes citra ossū fracturā obortas sanat, pectoris ac dorso adhibitū sanguinis refectionē, tabidosq; ac pectoris suppuratos curat. Misyos, chalcitidis, æruginis, cerussæ, gallarū, aluminis scissi & rotundi, melæriæ sing. sex uncæ, malicorij sex uncæ, atramentū suoriq; sex uncæ, ceræ, resinæ pinus, pids, bituminis, foliorū salicis uiriditū, olei sing. lib. ii. olei rosacei trientē, acetū sextarij dimidiū, uel quantum satis est, folia salicis cū aceto ad tertias decoquito, deinde folijs cōcisis ac humore expresso, primū eruginem, cerussam, & melantheriā leuissime trita, & deinde etiā reliqua tria ammisceto. Et postremū liquabilia liquata affundito, frigate citro, subigito, eradio, & ac utitor. Aliud ex falicibus, à Oritone ad Herodotū relātū. Melæriæ, gallarum, aluminis scissi & rotundi, singu. sex uncæ, ceræ, bituminis, picis siccæ, resinæ pinus, foliorū salicis, singul. lib. ii. olei lib. ii. acetū sextarij dimidiū, præpara uelut dictū est. Aliud ex succo falicis, ex Oribasio. Hoc Magnus, inquit, inuenit ad destillationes. Salicis folia uiridia ad solem terito, postea in ollā nouā cum sufficiente uino mitito, & apposito operculo, ad lēuē ignē coqto, & excolato, abiectisq; folijs expressis succū adseruato, postea uerū sumito colophonij unc. xxi. olei sextarij, succi lib. i. Et colophonij percolatū cū oleo, ad lēuē ignē coquito, donec in aquam diffusū, & manibus subactū, nō amplius inquit. Deinde cerę unc. xxi. ammisceto, eaq; liquata, ollaq; ab igne amota succū salicis adjecto. Vinū uidelicet in quo folia cocta sunt, paulatim instillando urne effusetat, & rufus ad mississimum ignē decoquito donec medicamētū relederit. Et deinde in mortarium trāsusum eodē succo infuso, manibus diligētissimē subigito. Emplastrū Cyzicenum appellatū, facit ad recētia ac uetera uulnera & ulcera cuniculosa. Duritias præsertim māmārū diffundit, attrahit, purgat, replet, glutinat, cicatricē inducit, & ad cæceratas duritias ac fistulas, & ubi scapellū admoueri non potest, uelut in collo, collisrū ex hoc medicamēto inditur. Idē mināres fieri abscessus mīti-

gar, tubercula diffundit, gāglia & collectiōnes fastigiāt ac rumpit. Sagittas, & ossa, & aculeos, & infixa extrahit, crustas citra molestiā exterit. Verū in ulceribus cuniculosis, magnis splenij utendum est. Id scuit etiā strumas, & ad uisceris affectiōnes egregie facit, pectū inpositū sanguinis eruptionē, uel ut aliq habent, hæmorrhoidas, supprimit, thoracē & dorso adhibutum, tabidīs cōfert. Thuris, myrrhæ, croci, iridis, bdellij, atramētū suori, propolis, aloës, chalcitidis, misyos crudī, aluminis scissi & rotundi, radicis panacis, malicorij, ammoniaci thymiamatis, uiscis, opopanacis, æruginis, acacis, florū rosarū, sing. dra. viii. gris usti dra. xxi. Alij pro ære, squamę cristantundem adijciunt, aristolochiæ, gallarū, sing. dra. xvi. terebinthiñę drach. cxi. ceræ unc. xxi. adipis uisulini unc. xxxii. acetū aut uisū antiqui sextarium. Si itaq; pharmacū ære & diffusorij habere malueris, acetum eligito: sin adstringēs ac repulforium, uisum accipito. Arida & quæ ad succorum naturā accedunt, cum uino aut aceto terito. Deinde ad cerā cum adipē liquatā, ac excolatā, terebinthiñā adijcito, simulq; ad cōpagem coquito, postea propolim ac uiscum addito, & spatula uersato, & ad hæc dissoluta, arida antea trita paulatim adijcito, ac fortiter agitato. Et postremū in mortarium trāsata manibus subigito, ac unito. Ego uerū neq; acetū, neq; uisū adhibeo, sed arida omnia solū cōtero & adijcio. Nā si uisū aut acetū aut aqua ammixta fuerit, ad cōpagē non peruenit. Emplastrū Moschionis, ad uulnera recētia ac cōcisos nervos, & dissectiōnes cum cōtusione, facit & ad fracturas cum uulnere. Nā & uulnera sanat, & ossibus callum obducit, cū debita deligatione inpositum, facit & ad inchoatē hydropē, & testes cōtufos. Arefacit etiā emētiās sedis. Curæ rimas butyro dilutū, & gutturis tumores sanat: dissoluit omnē duritiē, facit ad articulos luxatos ac distortos. Callosas manu ac pedū emētiās, quas clauos appellamus, auferit citra exulcerationem. Est omnino pharmacū ad multa commodum, præparatur sic. Spumæ argēti, picis siccæ, adipis uisulini, sing. unc. x. terebinthina, mānæ thuris, singulorū dextarē, ceræ quincuncē, æruginis, opopanacis, galbani, singulorum unc. i. picis liquidę sesibram, acetū, succi fycomororum, olei cicini, uel sycidni, uel andiqui, singulorum hemina unā, id est, librā i. Spumam argēti cū oleo coquito, & ubi ebullierit, adipē adijcito, & assidue agitato, & ubi cōpagē acceperint, cerā, picem, ac resinam adijcito, & coquito donec non amplius inquit. Deinde succum fycomororū, & picem liquidā seorsim cocta, & ad cōpagem redacta ammisceto, & galbanum, ac æruginem, & manā thuris inspergito, postremū opopanacem aceto dissolutum addito. Et ad ignem admota rursus coquito, donec nō amplius inquit. Atq; ita præparatum medicamentum in uinum transferito, & per triiduum sitito, postea uerū manibus emollito, ac utitū. Oportet autē post inpositum medicamētum, factā uino imbutā exprimere, & circumdare. Cæterū quod statim subijciā, succum fycomororū nō habet. Est autē medicamētū ad ossium fracturas commo- di. Ad cruentā uulnera ad sinus glutinados, & præsertim capiti aptum. Spumę argēti, adipis taurini, picis siccæ, sing. unc. xx. uelut aliq habent xvi. olei cicini aut sycidni, aut antiqui, dextantem, pollinis thuris,

terebinthinæ, sing. beſſem, ceræ trientē, opopanacis, æruginis, galbani, ſing. unc. i. uſci ſexuncē. Spumā argenti cū oleo & adipe ad bonā compagem coquitur. Deinde cerā, picem, ac reſinā adiſcitur, & mox ab igne tollitur, atq; ubi paululū frigefacta fuerint, reliqua cū aceto trita paulatim adiſcitur, ne efferueſcant, & rursus ad prunas admodū ſenſim coquito, donec non amplius inquinent. Et denuo manibus emollitur, ac uſitur. Emplaſtrum inſigne, ingentes ſinus, ac fiſtulas ſanās, aculeos & ſagittas extrahens, inflammationes ac duritias diſſoluens. Coxendicum item ac renum affectionibus cōmodū eſt. Spumæ argenti dextantem, olei unc. xv. picis ſiccæ, colophonix, ſing. unc. xvi. adipis taurini tantundem, miſſos, iridis, calcis uiuæ, ſingul. quadrantem, atramentū ſutorij reſequendam. Spumam argenti cum oleo ad bonam compagem coquito. Deinde liquabilibus liquis ac excolatis adiectis, rursus paulatim coquito, donec non inquinent. Et poſtea paululum frigefacta ad reliqua in mortario cū aceto trita ammiſcitur. Emplaſtrum theriaca appellatū, ex centaury, quod laudat Oribaliſius, facit ad neruorū ac muſculorum uulnera & puncturas. Ad feratū canis rabioſi ſorſus. Glutinat ſinus antiquos, & ad cicatricem perducit, præcipue uerò ad reſipiſſimū ſinus facit. Genuum ulcera fluida & ægre curabilia ſanāt. Spumæ argenti ſexuncē, olei antiqui trientem, reſinæ pinus ſiccæ drach. xxxii. ammoniaci thymiatis, propolis, thuris, ſingul. drach. x. ceruſſæ drach. viii. eruginis, ſquamæ æris, galbani, ariſtolochiæ rotundæ, centaury, ſingulorum drach. iiii. thuris, aloës, iridis, gallarum, chalcididis, ſingulorum drach. iiii. Spumam argenti cum oleo ad moderatā compagem coquito. Deinde ſquamā, ærugine, ceruſſam, & chalcididem adiſcitur, & ubi non amplius inquinant, propoliſ, ammoniacum ac galbanum in mortario prius diſſoluta, additur. Et ab igne ablatis ac aliquāulum frigefactis, reliqua arida miniuſiſſime trita ammiſcitur. Et ſam planè frigefacta manibus emollitur. Aliud ex diſſatmno, cuius admiranda uis eſt. Ad neruos, muſculos ac chariſſagines cōſiſas. Vlcera quoq; antiqua ac ægre curabilia ſanāt, oſſa corrupta, aculeos, & inſixa extrahit. Habet utim diſcuſſoriam, facit ad capitis dolores. Reprimi oculorū fluxiones. Eſt & malagma pleuritidis cōmodū, & hepaticis, cum emplaſtro ex ſiccis parato, facit ad omniū uenenum eiaſculatū repulſum plagas. Spumæ argenti drach. c. colophonix drachm. l. ceræ drachmas xxv. ammoniaci thymiatis, ariſtolochiæ, ſingulorū drachmas xvi. mannæ thuris, galbani, ſingulorum drachmas xii. æris uſci, eruginis, diſſatmni, aloës, propolis, ſingulorū drachmas viii. diphyrgis, ſquamæ æris, radicis gentianæ, ſingulorum drachmas vi. olei antiqui lib. ii. Hieras autē diſſatmni & ariſtolochiæ, ſingulo uno drachmas x. conſiſcit, ammoniaci uerò ſolum drachmas xvi. In reliquis conſenſit. Hoc præparatur uelut emplaſtrum Piſcatoris, aut Tyrium, quæ ſuprà retulimus. Verum eius meminiffe conuenit, herbas non niſi ablato ab igne pharmaco, miniuſiſſime tritas immiſcendas eſſe. Sed & Democrates in cæteris ſimilis, diſſatmni drachmas x. diphyrgis uerò viii. recipit, & ad mammarum, colli ac ſpinæ ulcera conuenire aſſerit, quantumuis fuerint diuergna.

Emplaſtra emollientia ac diſcuſſoria, ad multa

commoda.

Cap. xiiii.

Emplaſtrum Nigrum Aſclepiadis, Achillæ inſcriptū. Mammarum duritias, & teſtium inflammationes diſcutit. Hoc medicamentum diſcuſſoria uel omnia, uel alijs præſtat, & ad multa commodum eſt. Locutus autem prius abluendus eſt, deinde medicamentum adhibendum. Spumæ argenti libras ſex, picis brutiſe libras quatuor, bituminis, reſinæ pinus ſiccæ, ſingulorum libras vi. terræ ampeletidis lib. ii. ceræ lib. iiii. thuris ſequilibræ, aluminis ſaiſi, aloës, myrrhæ, ſingul. trientem, olei emphacini antiquiſſimi lib. viii. ſucci ſerapiadis lib. vi. acetū quantum ſatis eſt, præpara uelut panacæam. Nigrum eſt Iolion Hieræ, facit ad fiſtulas, alarumq; ac inguinū abſceſſus, ut nihil abſcindere opus ſit per chirurgiam, ſed tantum perforatione facta ac ſanie excluſa, medicamentum imponere. Illinendum eſt autem duobus corpiſ, altero iuxta alterum locato, neque humor de ſplenis deurgendus eſt. Imbibitur enim & ſortius ſit medicamentum, picis libras duas, reſinæ pinus ſiccæ dodrantem, ceræ tyrrhenicæ, ceræ ponticæ, ſingulorum quadrantem, olei antiqui quincuncem, liquabilibus liquariſ ac excolatis loliacæ farinam inſpergit, & bitumen in acetū triente dilutum aſſundit, omniaq; ſimul in mortario ſubigito manibus frigida humectatis. Sit autem bituminis ſequiuncia, farinæ loliacæ unc. xiiii. facit ad malignas mammarū duritias, parotidas ac perniones. Emplaſtrum Eſſentia appellatū, deſiccandi uim & mitigandi dolores præ omnibus habet, facit ad ſanguinis reſectationē, ad articulorum ac coſtarum duritias, ad gægræ nas, ſinus, ſtrumas, ulcera chironia, fiſtulas, egilopas. Splenula extrahit, hydropticos intra ſeptimum diem curat. Hepati ac ſpleni magnopere conducit, pluribus diebus impoſitum, ſplenē penitus conſumit, facit ad podagricos, & coxendicum affectiones. Spumæ argenti drachm. xx. ceruſſæ, æruginis, ſingulorum drachm. xx. ſquamæ æris, thuris, ſingulorum unc. i. bituminis beſſem, reſinæ pinus dextantem, & undæ dimidium, ceræ undas xvi. picis undas xxii. In alio exemplari habetur, ammoniaci thymiatis drach. vi. galbani drach. vi. Spumam argenti & ceruſſam ad bonam cōpagem coquito. Aliqui etiam bitumē in principio cū his inſiſcunt, utiturq; eo ubi magis ſiccare propoſuerunt, deinde reliqua ex ordine imponito, uelut ſæpe diximus, ac ſi plus iuſto coxeris, duritias non molliſ. Emplaſtrum Ebrietas uocatum. Vim habet diſcutiendi ac rarefaciendi, duritias inflammatas diſſundit, facit ad oſium fracturas, ad uulnera cruenta, cōuulſa, rupta, uulſiones, coxendices, calculos. Ad omnes capitis affectiones utiliter adhibetur, aliquando fronti & temporibus, aliquando uertici deraliſ pilis impoſitum. Spumæ argenti dodrantem, olei antiqui ſexuncē, olei roſacæ, ceræ, ſingulorum ſextantem, adipis taurini, terebinthinæ, thuris, ſingulorum trientem, picis dodrantem, galbani, opopanacis, æruginis, ſingulorum quincuncem, acetū ſextarium i. præpara, uelut ſæpe dictum eſt. Emplaſtrum ex ſuccis. Vulnera neruorum ab inflammatione tutatur, ſectiōes glutinat, ulcera inflammata, & muſculos uulneratos, circa aliud cataplaſma aut fomentū ſanāt, facit ad podagricos quocūq; tēpore adhibitur. Ad uteri inflammationes ueteres ac

recentes

recentes in pēsis siue talorum formis subditur. Rosaceo, aut myrteo oleo dilutum caua ulcera replet, et totū persanat. Et in summa, omnia reliqua cataplasmata ac medicamenta exterius adhiberi ulceribus solita, superuacua sunt, hoc præsente. Durities quoque mollit ac discutit, cæteris ad hunc usum commodis ammixtum. Spumæ argenti lib. vi. olei recēsis æstæte quidem libras vii. hyeme uerō libras ix. succi libras iiii. oleum cū succo ad prunas coquito, & ubi feruere & bullas emittere desierint, spumam argenti inijcō, & ad lentum ignem donec non amplius inqueunt coquito, & ubi flauum ac bonum colorem acceperit, nondum fuluum arigerit, ab igne tollito, frige facio, manibus subigito, ac in massam cogito. Vsu uerō expectente sumuntur medicamēti partes duæ, olei & ceræ, singulorum pars una, aut plus, prout res postularit. Succus porrō ita præparatur. Aquæ sextarij xx accipiuntur, radicis althææ recentis lib. iiii. seminis lini scēnigræci, singul. sextarij dimidiū. Radices lotas & cōtulas aqua madesfacio, & postridie fœnugræcum purgatur & lotū adijcō, ac madesfieri sinio, & tertia die semen lini similiter lotū addico. Et quarta die ad bonā spissitudinē coquito, & percolatū succū ad medicamēti præparationem accipito. Ego uerō, inquit Orisabasi, duodecim aquæ sextarij althææ lib. iiii. scēnigræci ac lini seminis, sing. sextarij inijcō. Aliud emplastrū ē succis, Orisabasi. Spumæ argēti, olei sing. lib. ii. ceræ bessem, scēnigræci, seminis lini, radicū althææ, pīsanæ, sing. equalēs portiones prius madesfactas coqto, donec transisissimus succus euadat. Et huius ex colati lib. ii. postea coquito, uelut dictum est. Emplastrum ex pīsanæ, scēnigræci, seminis lini, pīsanæ, singulorum unc. i. meli loti, radicis althææ, singulorum sextantiē. Hęc probe mundata ac lota per bīdium in aqua madesfacto accoquito, donec succū reddiderint. Et eius excolati lib. ii. sumito, & olei antiqui lib. iiii. ac simul coquito, donec oleum solum reſerit, & hūc postea taurini adipis sexuncem ammiscito, colophonæ tantundē, galbani unc. i. ceræ lib. i. Hoc ungēto quopiam dissolutum, eū laxādū uim habet. Emplastrum ex psyllio. Spumæ argēti lib. iiii. olei dulcis lib. vii. ceræ lib. i. resinæ pīnus lib. vi. succi psyllij lib. iiii. Succum uerō ita parabis, psyllij quadrātem in aquæ sextarijs quinq. madesfacte, deinde coques, & excolatum succum rursus cum oleo & spuma argēti ad bonam compagē decoques, & liquabilia liquata adijcēs. Hoc ad omnes induratas inflammationes utiliter adhibetur. Aliud ē psyllio simplicius, inflammationibus, intertriginibus, popularū eruptionibus, tuberculis ac podagris cōmodū. Spumæ argēti, cerussæ, sing. sextantem, ceræ sexuncem, olei rosacei lib. i. succi psyllij lib. iiii. præpara & utere crudo. Nō enim coquitur. Aliud ē psyllio simplicius, ad inflammationes podagricas in ipsa præſentim exacerbatione cōmodum. psyllij trīscē in duobus aquæ sextarijs madesfacto, ac coquito, & ex colato succū, eijꝰ ceræ sexuncē, olei lib. i. ammiscito. Emplastrum ex Serapiade, ad tubercula, papulas, & intertrigines. Spumæ argēti lib. i. olei lib. ii. succi serapiadis trīscē scularis lib. iiii. Spumæ argēti cum oleo & succo ad bonā compagem decoque ac utere. Pīttacium, solum hyoscyami uiridum, colophonæ, ceræ, ad pīs porcīni, singul. sexuncem, ad folia trita affundit

to liquefacta, ac uitior. Emplastrum ex Althæa, Polleis. Corticem radicis althææ herba uigente in pila contundito, deinde in æneum aut fictile uas translatum, uino albo ueteri odorato ac adstringente respergit, ut solum humectetur. Deinde tegito, ac per triiduum sinio. Quarta die rursus in pila tundito, & succum fortiter exprimito. Et accipito colophonæ undas xx iiii. ceræ trīcentem, olei, æruginis, singulorum sex tantem. Succū heminas Atticas ii. præparatur autem hoc modo, colophoniam oleo liquaui ac colaram, ad lentum lignorum pīni ignem coquito, & tædacia spatula agitato, donec in aquam instillata solidior euadat, deinde ceram adijcō, eaq. liquefacta ollam ab igne tollito, & ubi frige facta fuerint, succum paulatim affundito, ac caueto ne effuerit, sciat facile enim bullit ut super effundatur, postquā autem confiterit, rursus igni adhibeto, & ubi incaluerint, æruginem inijcō, & ablata ab igne frigefacito, ac manibus subigito, ut probe uniantur, facit hoc ad noua & antiqua ulcera, ad ferarum ac canum morsus. Virus enim ab ulcere extrahit, panos & strumas aut discutit, aut suppurat, aut rūpit, aut materiam ad superficiē euocat, uelut in fugillatis, ac in uaporē diffundit. Sedat dolores, scabiem ac scabros ungues, lepramq. ac utiligines extert, nec soluendū est in his ante septimū diem. Aculeos & infixos extrahit, podagricas inflammationes in ipsa exacerbatione mitigat, tumores articularum ac ganglia dissoluit, fauos ac ficus curat, hydrocephalum in infantū, aquofam capitis affectionem sanat. Splenis duritiā mollit, cancos non ulceratos lenit, imminenterq. erosionē cōpescit, pello exceptum ac subditū mēse ducti, pectini impositū calculos pellit, urinæ difficultatē corrigit. Aluū suppressam laxat. Rosaceo dilutū, plātarū rimas sanat, ulcera testū ac pudendorū repurgat & incarnat. Et si absq. æruginē pparetur, serapiæ ulcera sistit. Osiū fracturis prodest, irrigatōis uice adhibetū. Dolores em sedat, sit etiā ex floribus althææ rosaceis similibus efficacissimum pharmacū, hoc modo. flores illi reſectis unguibus tundūtū, & ad puluillum rediguntur: & eius sumuntur partes x ii. colophonæ partes xxx vi. ceræ partes vi. olei partes ii. Omnia simul uelut dixi præparata manibus probe subigito ac uitior, priore cōmodius est, & dolores amplius mitigat. Emplastrum ex semine lini. Polleis. facit ad pectoris affectiones. Neruofarū partium inflammationes discutit, ac dolorē mitigat, facit ad exacerbationes podagricas, & contractos articulos relaxat. Seminis lini partes ii. farinæ ordeæ ceræ partes iiii. colophonæ partes iiii. ceræ partes iiii. resinæ pīnus liquida, uel cupressi, si haberi potest, partes ii. seminis thlaspios partē unā, florum chamemeli, pilularum cupressi clausuram, singulorum partē unā, olei partes duas. Cerā & colophonā cum oleo ad prunas liquefacito, & assiduē uersato, & ab igne ablatis cupressi pilulas tritas & cribratas adijcō, ac caueto ne effuerescant. Deinde farinā, semen lini, resinam liquidam addico, & rursus ad ignem adhibeto, & paulatim donec uniantur coquito, postea procul ab igne chamæmelum & thlaspm inspergito. Et tandem medicamentum in mortarium frigidum semiplenum coniectum diligenter manibus subigito. Emplastrum Elephantinum. De Elephantino Polles libro secundo. Id ego inquit, prius inuenieram,



neram, sed postea longo usu ductus immutauit, & quum facilius meliusq; ac fortius cognouerim, in hunc secundum librum reuolui. Dorycnij siue solani uesicarij dextatē, radicis mādragoræ besselē, radicis panacis sexuncem, colophonix sextantem, resine pinus liquidæ trientē, opopanax sextantem, ceræ, cerebinthinæ, singul. lib. i. bdellij unc. x. x. acet. lib. i. uel amplius. Quidā etiam potamogitonis unc. x. x. adiijunt. Verum descriptio non habet. Aliud Elephātinum, facit ad contrāctos articulos, mollit ac discedit podagricorum callosos concreciones, & in ossium fracturis inductos callos dissoluit, panos, strumas, & quamlibet duriciam emollit. Quodd si expectorati liberit, eboris aut cornu segmentum ex eo illinito, & ad dies triginta aut quadraginta alligatū sinito, & deinde soluto: Et nō reperis eboris aut cornu naturā, sed aliud quid, quod commodē flecti possit, paratur autē sic. Corticis radicis dorycnij aut solani uesicarij uirentis, siue in umbra siccari, corticis radicis mandragoræ, singulorum besselē, radicis panacis sexuncem, opopanax besselē, potamogitonis uiridis, bdellij, resinæ pinus liquidæ, singulorū uncias x. x. cerebinthinæ lib. i. ceræ sextantē, acet. albi besselē. Mandragoræ ac solani corticis uirentes quidē, in pista tundito, & postea in mortario terito: siccos uerō cum panacis radice terito ac cribrato, similiter etiam bdellium terito, ac potamogitonem, omniaq; simul in mortario mixta terito, aceto paulatim insillato. Et liquefactis quæ liquari debēt, excolatisq; ac ad probā cōpagem coctis, & ad trita ammixtis, medicamentū frigateū manibus subigito, & in fictili uase aceto affuso seruato, & ne trāspiret probe cooperto. Emplastū ex herba sacra siue uerbenacā, Polletis. Verbenacæ rectæ in uigore cū radice euulsæ ac exiccatae, tuseq; ac cribratae sexuncem, colophonix lib. ii. ceræ trientē, olei sextantē. Liquabilia liquefacta, colato, & ad bonā compagem coquito, & adiecta uerbenacā subigito ac utitor, facit ad omnē capitis dolorē, ad hemicanes, ad oculorū fluxiones, ad dentū dolores extrā adhibiti. Ad scorpionū ictus, Ad neruolarū paritū inflāmationes, & omnino impositū partes ad fluxione tutatur. Emplastū Gerauii, Polletis. facit ad laxatos ac crassos neruos resolutionis periculū expeditates. Ad oēs fluxiones, tumiditē ac inflāmatos articulos, ad gāglia, steatomata, atheromata, strumas, panos, & quicūq; molliri, attenuari, rūpi, ac extergi debēt. Ramēta statū ærē, ex assidua olei illusione sordidæ ac æruginosæ lib. ii. ceræ lib. ii. sandycis, sandarachæ, cerebinthinæ, singulorū lib. i. Quodd si statua ramenta sicciora fuerint, cerebinthinæ lib. ii. accipito, & cum his omnibus gruis pennas unito. Hoc modo. Gruis pēnas omnes in ollam nouam cōiijcto ac operito, argillaq; oblinito, & in fornacē mittito. Eamq; ubi totā exterius ignitā uideris, extrahito, ac frigefieri sinito. Ea deinde aperta pēnas usas eximito ac terito, & longo tempore antea paratos asseruato, & medicamentum postea sic præparato. Ceræ ac resinæ liquatis ac excolatis, sandicem & sandaracham minutissime tritas adiijcto, & uersato donec omnia fuerint probe mixta, & postea ab igne ablatis pennarum cinerem ammixcto, ac simul subigito, frigatefacta autē aliquatenus medicamento statua æruginem cum modico aceto trita adiijcto, atque in mortario probe unito, subigi-

to, ac utitor. Emplastum ex buglosso, Polletis. Buglossum herbā cum radice euulsam, & in umbra siccata, terito ac cribrato, & sumito eius pates iiii. colophonix, resine pinus liquidæ, ceræ, singulorum partes viii. olei partes v. Colophoniam cum oleo ad lentum ignem coquito, ac spathula agitato: ubi uerō durior apparuerit, resinam liquidā adiijcto, ac rursum coquito, donec non amplius inquinet, & postea ceram adiijcto. At ubi ab igne amoueris, cribratam herbā addito, & medicamentum in mortarium aqua semiplenum infundito, ac manibus subigito. Facit ad oēs inflāmationes, strumas, parotidas, panos, plagas, collisiones. Ad antiqua & maligna ulcera, ad ulceratos neruos, sinus, nomas, fistulas. Recipias, purgam, mollit, cōtrahit, attenuat, & quædā discurit, quædā rumpit, replet, & ad cicatricē perducit. Dolores ulcerum ueterum ac recentium statim sedat, & liuida abolit. Ego uerō in buglosse defectū nycteridæ herbam, ab aliquibus unguentum Helenes appellatam, ad coxendicum affusionem adhibui, & bene successit. Emplastum ex achate lapide, Polletis. Lapidēs achates appellatos, leoninæ pellicoli colore similes, in fornacem fabrilē mittito, & aggestis carbonibus ualde sufflato, & ubi ignitos lapides uideris, forcipe extrahito, refrigeratosq; terito ac arctissimo cribro excutito. Deinde accipito colophonix drachmas xlviii. resinæ pinus, ceræ, singulorum besselē, olei trientem, achatum lapidum ustorum quincuncem. Colophoniam cum oleo liquatam coquito donec non amplius inquinet, deinde ceram ac resinam prius liquata & excolata adiijcto, & his unitis lapidum cinerem addito, ac rursum ad moderatam compagem coquito: postea medicamentum in frigidam aquam missum frigefieri sinito, & manibus subactum in massam cogito. Vt hoc ad scorpionum, uiperarum, & uenenum eiaculantium bestiarum ictus, facit ad tumores ægre concoctiles ac sanabiles, ad induratos tumores, ad liuida. Velocem suppurandi uim habet: Strumas aut discurit, aut concoquit & rumpit. Erit autem efficacius ad strumas, si capparitis folia uiridia, aut corticem eiusdem probe tritum, ad emplastum calefactum ac remollitum ammixueris. Emplastum parhygrū, facit ad inflāmationes ad duriciam quādam inclīnantes. Ad ipsas porcinā a fibris depurati uncias xlviii. ceræ uncias xlviii. spumæ argenti, cerussæ, singulorum sexuncem. Liquidā cum aridis permisceto. Manebit quidē hoc pharmacum aliquandiu liquidius, sed postea ad bonam compagem perueniet. Emplastum e buccinis. Hoc Xenocrates malleoli abscellum suppuratum iam discussit. Inflāmationes autem induratas, præsertim parotidas, priusquā in pus transmutentur, misceat dissoluit. Spumæ argenti dra. cc. ceræ dra. lvi. olei antiqui lib. iiii. cerussæ dra. viii. cerebinthinæ dra. lvi. buccinorum ustorum dra. x. thuris dra. xix. aquæ sextarium. Spumam argenti & cerussam minutissime trita, rursum cum aqua terito, & iterum cum oleo, & ex mortario in ollam translata, lēto igne coquito, assidueq; uersato ne subsideant, deinde cerā, & mox thus ac cerebinthinam adiijcto, & ad bonā compagem, non tamen multam duritiā coquito. Postremum cinerem buccinorum addito, & paululum feruere sinito, & medicamentū ab igne tollito, & in mortariū aqua humectū effundito,

dito, & diu manibus subigito, ut glutinosum euadat: nam temporis progressu durius propter buccina efficitur. Emplastrū Dionysia appellatum. Inflammationes & abscessus mammarum præsertim, discutit: omnē enim humorē per cæcos meatus diffundit. Sed & duritias ac parotidas dissoluit. Ceræ, terebinthinae, spumæ niri, olei antiqui, singulorū sexuncæ, misyos crudi un. i. aquæ coactiliariorū quantum sufficit. Spumā niri & misy cum aqua terito, & cū oleo coquito, deinde cerā, mox terebinthinā adijcto, & ebullire sinito, donec nō amplius inquinēt, nō tamē nimis solida euadat, & sublatum ab igne medicamētū in mortariū aqua humectū diffundit, manibus subigito, ac uitior. Hęc Dionysia inter atraçhortia emplastrā rectē descripta habetur, eaq; utaris uelut istic descripta est. Emplastrū ē saponē, discussorij præcipuū ad furunculos. Adipis porcini, picis, ceræ, saponis nigri, æquales portiones liquatas excolato ac uti fordidiscuit etiā hydropas. Aliud, ad furunculos, parotidas & panos. olei antiqui, ceræ, saponis, niri, lixiuū, æquales portiones. Cerā cū oleo liquefacto, nitrum uerō cum lixiuio in mortario terito, & deinde saponē simul cōterito, & in ollā cōiecta paulatim coquito ad moderatā compagem, & uitior. Emplastrū ex Heliotropio. Facit ad percussā, collisā, luxatā, uulsiā, ruptā, stilorū ac fissilium rerū pūcturas, ad dolores in profundo. Nerusus ab icū aut frigore erasificatus, aut aliter affectos curat, firmat, & dolore liberat. Vlceribus antiquis, & uulneribus recentibus confert. Aduersus medicatas sagittas loco affecto imponitur. Ad digitos contusos, etiam si ossiculum collisum sit, ab inflammatione tutatur, & dolore eximit. Maturat, suppurat, discuit, contrahit, glutinā, repurgat, incarnat, cauitates replet, & ad cicatricem perducit. Heliotropij herbā tria grana habētē, in autumnō totā cum radice euulsā & in umbra siccā terito, ac cribrato, & eius accepto trientē, colophoniam splendidissimē unc. x. viii. resine pinus, aut cupressi liquidæ bessēm, cerę bessēm, olei trientē. Resinā, oleum, cerā, simul liquefacto: deinde herbā adiectā ad lentū ignē coqto, & tædacea spatula agitato, donec bonā cōpagē acquisierit medicamētum, & in frigidā diffusum subigito ac uitior. Strumas & duritias suppurat, rumpit, siccāt, incarnat, ad cicatricē ducit, & dolore sedat. Emplastrum Mnafeæ, seu eundē mollitiū ordinis. Spumæ argēti, adipis porcini, olei, æquales partes simul decoque, donec non amplius inquinant, & si fortius medicamētū efficere uolueris, adipē & oleū utrunq; uetus accipito: uelut ista enim efficacius reddūt medicamētū. Quod si magis emolliens esse uolueris, oleū minues, & adipē augebis. Si uerō magis discussorij, adipi detrahe, & oleo adde. Quidā cū oleo & adipe radicitus altheæ cōtusa selsquiliabrā coquunt, donec torrefiat, eaq; abfecta, in oleo ac adipe colatis spumā argēti coquito, sicut diximus. Atq; sic quidē Galenus. Mnafeas autē sit. Spumæ argēti, ceræ, pasci, colophoniam, olei, axungia, sing. lib. i. oleū & spumā argēti coquito, donec nō inquinant, & cerā, colophoniam, axungia, liquatas & excolatas adijcto, ac rursus ad bonā cōpagē coquito: deinde passum affundito, ac fortiter agitato. Et sublatum ab igne pharmactū sub canis æstu insolato, & quouidie cū spatula uersato, donec ad debita soliditatem perueniat. Emplastrum Heliadicum

mollitorium. Ammoniā thymiamatis, spumæ argēti, cerusæ, olei antiqui, resinæ pinus, ceræ, sing. lib. i. thuris sexuncæ, galbani sextantē, castorei lib. ii. propolis, opopanax, sing. lib. i. acceti quantum satis est. Oleum, spumā argēti & cerussam simul coquito, & medio cocturæ tēpore ammoniacū tritū adijcito, & ebullire sinito, donec nō amplius inquinent, deinde liquabilibus additis ac probē ammixtis, thus & castorei minutissimē trita addito. Et postremum opopanax aceto dissolutū affundito, & perfrigeratum pharmactū manibus subigito, ac uitior. Discutit abscessus etiā in pus transmutatos. Aliud, emolliens ac discutiēs abscessus. Spumę argēti sexuncæ, cerusæ selsquiliaci, ceræ trientē, ammoniaci thymiamatis sextantē, galbani, myrrhæ, thuris, singulorū trientem, olei lib. i. oleū, spumam argēti, & cerussam coquito, donec nō amplius inquinent, deinde ammoniacū, mox cerā & thus ac galbanum adijcto, & ab igne ablatis myrrham addito, subigito ac uitior. Aliud, discutiēs abscessus, & ita ruptos expurgans ac sanās. Facit & ad capitis lendes. Colophoniam sexuncem, ammoniaci thymiamatis sextantē, mastiches un. i. ceræ unc. i. galbani scrup. iiii. opopanax scrup. iiii. axunginis scrup. iiii. resinæ pinus lignosæ, olei, singulorum trientem. Aliud ē tritici polline. Facit ad abscessus & furculos, ad herniā aquosam & intestinorum, post chirurgiam inflammationibus sedatis. Ceræ, pollinis tritici, resinæ liquidæ, singulorū sexuncem, ammoniaci thymiamatis quadratē, olei trientem, aceti aut uini quātum satis est. Pollinē pridē in aceto aut uino subiges. Sequēti die liquatis his quæ liquari debēt, fermentatū pollinē probē subactū in mortario ammiscbis, & uteris. Aliud ē fermento. Saponis, sandarachæ, singulorū sextantē, feni græci un. i. resinæ pinus lib. i. colophoniam, cerę, sing. sexuncæ, fermenti sexuncem. Fermentum aqua dilutum cū liquabilibus liquefactis miscbis, & terēda trita adijcies, omniaq; simul subiges, ac uteris. Hoc discutiēdū ac rumpendū uim habet. Aliud ē Masticha. Colophoniam lib. i. ceræ sexuncē, ammoniaci thymiamatis trientē, mastiches, galbani, terebinthinæ, singulorū sextantē, omnia liquefacto ac excolato, & in frigidā cōiecta emollito ac uitior. Aliud tritium spederum appellatū. Cerā, colophoniam, terebinthinā liquidam, partibus porcionibus simul liquefacto, & in frigidā mitito, subigito ac uitior. Hoc sicut etiā quod proxime præcedit, ossa capitis denudata incarnat, & squāmas citra molestiā disparat, & solum absq; alterius usu ad cicatricē perducit. Quod si mastichē pari portione adijcias, ad ossiū fracturas admirandū euadet.

Emplastrū Iudæi. Colophoniam lib. i. mastiches un. i. olei trientē, omnia simul liquefacta in frigidā mitito, & post ruptos abscessus uitior, ita ut nihil reseces, neq; linamentum indas, sed solum medicamētum to cauitatē expleas. Ex eodem etiā emplastrum adhibeto, cuiusimodē repurgat, ac præ cæteris incarnat. Postquā autem ulcus explanatum fuerit, ad cicatricem inducendā alio medicamento opus est. Nā hoc superuacua carnem efficeret. Emplastrū reipublicæ præsidis. Resinæ quæ in uasculis ac lagunculis ligneis affertur, excolare lib. i. ceræ quadratē, mastiches tritandem, olei à Martyreo uel aliunde allati, selsquiliaci oleum cum resina liquefacto, ceterauiq; utridis, si haberi potest, sin minus, arido fasciculo agitato,

agitato, & his excolatis reliqua ammisceto, ac mani-  
bus subigito. Quidam centaurii sicci unc. i. adjiciunt:  
inter liquadū uerō & dū agitis, hæc uerba insulsurra-  
to. Deus Abrahā, deus Isaac, deus Iacob, huic phar-  
maco uires largatur. Hoc sinus & fistulas glutinat,  
ægilopas siccit. Et si centaurium repperit, duritias  
ac strumas inchoantes emollit. Emplastrum Mu-  
cum appellatum. Ammoniaci thymiamatis, gal-  
bani, opopanis, singulorum unc. i. mastiches, ceræ,  
colophonie, singulorum sexuncem, & aquæ marinæ  
quantum satis est. Aliud. Hoc ad osium fracturas  
inflammationibus sedatis facit. Optimè cicatriscem  
inducit. Colophonie, resinæ pinus, singulorum lib.  
i. ceræ sexuncem. Omnia in ollam frigida æque missa  
liquo ac excolato, deinde in frigidam transfusa  
emollito, & in massam cogito, ac utitor. Aliud, mi-  
riscit molliens. Facit ad stomachi duritiam ac frigi-  
dos affectus. Colophonie puræ sextantem, ceræ al-  
bæ tridentem, mastiches puræ unc. i. olei cyathum i.  
Omnia simul liquata ad probam compagem coqui-  
to. Emplastrum Pyxis inscriptum. Confert ad  
omnes inflammationes, præsertim pedum, egregiè  
enim emollit. Ceræ, colophonie, singul. sexuncem,  
succis seminis lini tridentem, adipis porcini sextantem,  
terebinthinæ quadrantem, & uncæ dimidium, olei  
omphacini dextantem, ammoniaci thymiamatis unc.  
i. thuris quadrantem, lactis bubuli tridentem, & uncæ di-  
midium, ouorū candida nouæ. Ammoniacū & thus  
cū lacte, succo, & ouis terito, & reliquis liquefactis  
ammiscito. Aliud è melle, molliat ac discutit. Spu-  
mæ argenti, olei, singul. lib. ii. colophonie, ceræ, axū-  
giæ, mellis, sing. unc. xx. spumā argenti cum oleo &  
axungia coquito, donec non amplius inquinant; de-  
inde reliqua liquata adjicito, & ab igne ablatis mel  
affundito, & frige factum medicamentum manibus  
emollito. Melinum Serapionis uulnerarium, ad  
multa cōmodum. Omnes duritias dissoluit, abscē-  
sus discutit, humores per oculos meatūs diffundit.  
Sinus glutinat, spicula, ossa corrupta & aculeos ex-  
strahit. Rosaceo dilutum caua ulcera replet. Sedat  
etiam inflammata. Hoc præceptor Lucius utebatur,  
atq; ipsum dupliciter præparabat, modò glutinos-  
sum, modò solidius efficiens; collyria enim ex foli-  
dore formabat, & filum innecebat, & sic ad usum  
paratos habebat, ac in sinus fistulosos indebat, filo  
foras propedente ad cōmodiorem extractionē; quæ  
enim sine filo induntur, quum duriora sint, sæpe  
fraguntur, & priuatim abscēsus efficiūt. Spumæ ar-  
genti drac. c. iiii. colophonie dra. x. iiii. ceræ drach.  
x. vii. ammoniaci thymiamatis dra. x. iiii. æru-  
ginis, myrrhæ, galbani, sing. dra. xx. olei æstatis unc.  
xv. hyeme x. viii. spumā argenti cū oleo ad lentum  
ignē coquito, & ab igne ablatis ærugine inijcitur, ac  
ne effruescat caueto, & rursus coquito donec nō in-  
quinant, & ad coinei mali colorē perueniant. De in-  
de cerā ac resinam liquefactas ac excolatas addito, &  
ubi parū ebullierint, ammoniacū leuissimè tritū, &  
aqua aut aceto dilutū ammiscito, & mox galbanū  
tritum addito, & tandem ab igne amoris myrrhā in-  
spergito. Melinū Pasionis Athanasia inscriptū, ad  
ueteres sinus, etiā si usq; ad uacua perforati fuerint.  
Idem puerorū strumas recentes discutit. Facit & ad  
articulos distortos ac lacinatos, sicut Hieras & Gale-  
nus testantur. Spumæ argenti, resinæ pinus sicce, sin-

gulum drach. c. ceræ drac. x. i. s. olei, uini ueteris  
odorati adstringētis, singulorum hemina dimidiū  
Spumam argenti cum uino ad solem æstiuum plu-  
ribus diebus terito, donec fuerit exsiccata, & postea  
cum oleo ad lentum ignem coquito, donec non am-  
plius inquinet. Postea ceram ac resinam adjicito, præ-  
parato, ac utitor. Emplastrum Venus appellatum,  
ad multa cōmodum. Omnem duritiā dissoluit, stru-  
mas discutit, spicula & aculeos extrahit. Ad uenenū  
eiaculantū bestiarū morsus miriscit cōmodum. Fi-  
stulas & sinus glutinat. Podagricis per exacerbatio-  
nū interualla uuliter imponitur, & coxæ dicitur diutur-  
næ medetur, spumæ argenti unc. x. v. ammoniaci thy-  
miamatis dextantem, colophonie unc. x. vi. æruginis,  
galbani, sing. sextantem, bdellii, opopanis, sing. qua-  
drantem, myrrhæ, aristolochiæ, sin. un. i. olei antiqui  
lib. ii. Oleum cum spuma argenti coquito, & in me-  
dio cocturæ tempore ærugine adjicito, & donec nō  
inquinent bullire sinito, deinde colophoniam liquatā  
& excolatā addito, & ab igne ablatis, aristolochiam  
ac myrrhā aceto trita, cū galbano, bdellio, ac opopa-  
nace ammiscito, & in mortariū transfusa subigito,  
unito, ac utitor. Aliud emplastrum Venus appella-  
tū. Facit ad eadē uelut præcedens, & est ad podagras  
per exacerbationū interualla ualde insignē. Olei an-  
ticipi lib. iiii. spumæ argenti lib. ii. ammoniaci thy-  
miamatis lib. i. ceræ unc. x. x. i. colophonie dodran-  
tē, galbani, æruginis, singul. quadrantem, resinæ pinus  
unc. x. vi. myrrhæ tridentem, præpara, uelut dictum est.  
Emplastrū Panacæa, emolliens ac diffusoriū. Ceræ  
bessē, colophonie, terebinthinæ, sing. lib. i. ammo-  
niaci thymiamatis sextantē, galbani, opopanis, pol-  
linis thuris, olei, sing. un. i. uini quantum satis est. Em-  
plastrum è rumice, ad multa cōmodum, abscēsus  
discutit ac rūpit, strumas molliat. Ceræ, resinæ, adipis  
porcini, soltorū rumicis uiridium probe cōfusiū,  
spumæ nitri, ammoniaci thymiamatis, sin. lib. i. præ-  
para, & usus tempore cum oleo antiquo emolli, ac  
utere. Emplastrū è perna, omnē duritiā, strumas, gā-  
glia, meliceridas, & reliqua huiusmodi dissoluit, si-  
nus glutinat. Facit ad furunculos, abscēsus, neruorū  
per cōsensum affectiones, confert pleuriticis, coxē-  
ditiq; ac articulorū affectionibus. Pinguedinis suilla  
læ è perna antiquissima, spumæ argenti, sin. lib. iiii.  
resinæ pinus lib. i. ammoniaci thymiamatis quadrā-  
tē, galbani, thuris, euphorbiæ, sin. un. i. pinguedo uer-  
rō de perna sic parāda est. Pernā suis antiquā in olla  
siccili cū aqua præferit marina coquito, & eius iū-  
sculi excolatice refrigerat pinguedinē cōcretā, tū su-  
perstantē, tum subsidentē accipio, & expurgatā ad  
medicamentū præparationē asseruato. Cum hac itaq;  
liquata spumā argenti ab lentū ignē coquito, donec  
nō amplius inquinet, deinde ammoniacū adjicito tri-  
tū, & postea resinā excolatā, & thus minutissimè tri-  
tū: his uerō unitis galbanū præmolitū addito, & sub  
lato ab igne medicamentū, euphorbiū ammiscito, ac  
utitor. Emplastrū è perna, Galeni. Callosas instar io-  
phorum concretiones dissoluit. Pinguedinis pernæ  
suillæ præparat, uelut dictū est, lib. i. ammoniaci thy-  
miamatis, casei bubuli aut caprini uetustissimi, ad-  
pis taurini, apochymatis, hoc est, resing est ceræ ex na-  
uigis derasæ, sing. lib. i. medullæ ceruine bessē, cesty-  
pi quadrantē, opopanis unc. i. olei cyprini sexuncē,  
uini quantum suis est: cætera liquato ac excolato  
Calcem

Cafeu uerò cū uino terito ac liquefactis adijcitur, præparato, & in mortario manibus emollito. Emplastrum mollitorium Lucij præceptoris, ad distortos articulos inscriptum. Facit ad abscessus profundos, nervos & articulos contractos. Prodest opisthotoni cis neruorum per consensum affectionibus, eximit lalsitudinē oleo cyprino aut irino, aut laurino dilu-  
turo. Item ad duritias diuturnas ac ægrè curabiles. Bdellij, adipis uitulini, ammoniaci thymiamatis, iri dis Illyrice, sin. dra. x. vi. opoponacis dra. i. galbani, candryos, styracis, thuris, sing. dra. viii. piperis grana cl. x. ceræ, terebinthinæ, singul. sexuncem, olei iri ni æstare quidem sextantē, hyeme uerò quadrantē, ut ni quantū satis est. Ceram cum oleo liquefacto, & ammoniacū, bdellium, ac thus trita ammisceto. Et si thus ægrè teri possit, uino madafactū conteratur: & his omnibus probe unitis, terebinthinā ac styracem addito, deinde ab igne ablatis, iridē, cāchry, & piper minutissimè trita adijcitur, & postremū opoponacē uino dissolutū affunditur, & probè subigito. Hoc me dicamentū supremi ordinis est emollientiū: nec facile reperias quod magis induratas partes molliat, ac duritiā discutiat. Emplastrum è psyllio, experimen-  
to cōstans. Strumas resiccat ac discutit, furiculos dis-  
solvit, inguinū ac alarū abscessus etiā in pus transmu-  
tatos discutit, sinus glutinat, ganglia diffundit, cla-  
uos in manibus ac pedibus exterit, carbūculos sanat, uulgis ignis emēdat. Radicis althææ tritæ cribratæ un-  
i. psyllij triti cribrati sextantem, stercoreis columbini minutissimè triti, axungie ueteris purgatæ, singu-  
lorum quadrantē. Picis siccæ lib. i. mastiches nigræ  
Æthiopice quadrantē, aut si haberi nō potest, Chie  
tantundem, quæ liquari possunt liquato, & ab igne  
amotis arida ammisceto, & frigatefactū medicamentū  
probè manibus subigito, atq; uisus tēpore, charre aut  
corio inducto. Mollitorium ex ruta. Articulos ma-  
nuum contractos mirifice emollit. Ceræ trientē, te-  
rebinthinæ sextantem, galbani, opoponacis, cespji,  
castorij, singul. unc. i. euphorbij trientem, rutæ sex-  
tantem. Liquabilia liquefacto, & euphorbium,  
castorium, singula seorsim trita, cum opoponace  
acrutæ folijs in mortario contritis simul subigito,  
& ad liquefacta ammisceto. Aliud emolliens.

Strumas, parotidas, furunculos, pānos ac melice-  
ridas dissolvit. Ladani mollis, bdellij Scythidi resi-  
nosi, propolis recētis ac mollis, ammoniaci thymia-  
matis, terebinthinæ, æquales portiones præpara &  
utere. Aliud mollis ac discutiens. Facit ad strumas,  
parotidas, meliceridas, itemq; atheromata. Vimur  
eo etiā ad uasorum dilatationē. Spumæ argenti dra-  
c. colophoniæ, adipis caprini, singul. drach. i. x. x. ce-  
ræ, rubricæ, uisci, singul. drachm. x. i. lapidis pyritæ  
drachm. xvi. picis drac. x. x. iiii. calcis uiuæ marmo-  
racæ drach. x. x. ii. galbani, ammoniaci thymiamatis,  
bdellij, singul. drach. xvi. cerullæ, aloës, myrrhæ,  
bituminis, mannæ thuris, dictamni, singulorum  
drach. xii. olei antiqui lib. iiii. spumæ argenti, olei,  
cerullæ, adipem, simul ad bonam compagem co-  
quisto: deinde ammoniacum & bdellium trita adijci-  
to, & his liquatis primum uiscum, deinde lapidē py-  
ritæ, ac calcem, & cætera sicca trita addito, & omnia  
unita, frigatefacta, manibus subigito, ac uictor.  
Aliud, abscessus ac strumas discutiens. Candidum  
canis sinum terebinthina excipe, ac utere. Aliud. Se

dat inflammata, strumas, hernias carnosas, & omnē  
duritiā emollit. Caricarū pinguum, nitri tostī, se-  
minis nasturij, singulorū æquales partes cum melle  
emplastri forma excipito, ac emollito. Emplastrum  
è buglosso. Duritias dissolvit. Buglosi bellem, spu-  
mæ argēti quadrantē, ammoniaci thymiamatis sex-  
tantē, adipis porcini sexuncem. Olei antiqui tantun-  
dem. Emplastri Perfarum è lapidibus, Tyrrhenicū  
& Pampathes appellatū. Vesicæ & rhenum calcu-  
los cōstringit impositum. Callos in manibus ac pedi-  
bus dissolvit: citra molestiā enim eos suppurat, & est  
post septimā eādem diem exoluendum: idem etiam  
in fteatoribus, strumis, gutturis tumore, gāglijs, &  
similibus facit. Ad egilopas & fistulas antiquas, præ-  
sertim sedis, sub alis inguinum ac mammarū, uelut  
mysteriū diuinum habetur, in his autem quinta ex o-  
luendū est, & callus fistulæ derasus apparebit, nec de-  
sistendū est ab eius usu, donec callus penitus fuerit  
excisus. Facit & ad ulcera maligna, & ad ungues ma-  
nuum ac pedum moios, ut à Deo missum putes. Ad  
herniā aquosam, hydropem, splenis tumorem, co-  
rio pro tumoris magnitudine inducū imponitur.  
In hydropē sanè antierius ab alis usq; ad inguina, po-  
sterius à ceruice usq; ad lumbos: omne enim aqua ui-  
debis diuino quodā mysterio efferri, eoq; ueteris do-  
nec res melius habere uidebitur. Ad anhelosis in-  
super ac erectæ ceruicæ spirantes, tabidos, & deplora-  
tos intus delitescētes abscessus, pilulas cum modico  
melle ex eius pastillis feci, easq; uiris, mulieribus,  
pueris, senibus, exhibui, & deploratos reuiciscere ui-  
di. Idem & in pestilentibus constitutionibus feci, &  
plures à peste liberaui. Verum desino plures aliās  
eiusdē uirēs recensere, ne tantum Dei munus aliquis  
fabulā putet. Spumæ argēti lib. i. ceræ un. x. vii. am-  
moniaci thymiamatis quadrantē & semunciam, pro-  
polis unc. x. vi. s. galbani sesquiuincia, squamæ æris  
unc. i. lapidis phrygij unc. x. viii. resinæ pinus siccæ  
lib. i. diphyrgis sextantē & scrup. xviii. æris usti un.  
i. thuris sextantem, & obo. iiii. radicis aristolochiæ  
rotundæ un. x. i. & scrup. x. vi. lapidis magnētis uiuen-  
tis ac trahētis un. i. aloës sextantē & semunciam, dictā-  
ni quadrantē, Cinnabaris cōmunis scrup. x. viii. ad-  
pis struthocamelæ lib. ii. lapidis pyritæ sextantem,  
lapidis uisti scythidi scrup. x. viii. lapidis hæmatitæ  
unc. i. cadmiæ uisti trientem, gentianæ, aristolochiæ  
longæ, lapidis parciaci, aut pro eo gagaræ, singul.  
unc. i. betonice, radicis chamæleonis nigri, singul.  
unc. i. in alio exemplari, scrup. x. viii. ærugini-  
nis un. i. olei antiqui lib. i. in alio lib. ii. floris salis,  
acetī scillitidi, singulorū quantū satis est. Spumæ argē-  
ti & lapidis omnes primū seorsim, deinde simul tri-  
tos, ad salis florē ammisceto, & ad fecis compagē si-  
mul cōterito. Deinde æruginem & æs trita adijcito,  
postea thus, aloē, ammoniacū, singula seorsim trita  
addito, & mox galbanū, & semper florē salis adden-  
do cōterito. Postremū herbas minutissimè tritas ac  
cribratas immittito, & rursus flore salis addito cōte-  
rito ac subigito, & cum aceto scillitico pastillos &  
massas formato. Quæ uerò liquari debent, priuatim  
liquefacta seruat, & ubi medicamentum in usum  
assumere uoles, ammisceto. Cæterū locus cui adhībē-  
dum est medicamentū, oleo ne inquinetur. Aliud,  
strumas discutiens. Spumæ argēti lib. i. olei anti-  
qui sesquialteram, auripigmentū unc. i. spumæ argen-  
ti cum

ti cum oleo coquito, donec non amplius inquinat. deinde auripigmentū prius cum olei sextate tritum adijcto. Vere cōfidenter, & ne contempneris uilitatem. Aliud ad strumas. Spumæ argenti sexuncæ, æruginis ferri sextatē, ammoniac thymiamatis, olei antiqui, singulorū bessēm. Spumæ argenti, ærugine, & ammoniacū, singula seorsim trita coquito, ita ut æruginem & spumæ argenti cū oleo primū coquas, & ad semicocta ammoniacū adijcias, sinasq̃ ebullire donec non amplius inquinent. Aliud ē sale. De moratis, omnē duritiā discutit. Salis triti, cerussæ, singul. lib. i. galbanī, propolis, aristolochiæ, singulo rum sextatē, olei ueteris libras ii. & si crassius fuerit pharmacum, aliā adhuc olei librā adijcto. Cerussam & sal cum oleo coquito, donec nō inquinet. Deinde galbanum & propolim, postremum aristolochiā, singula trita addito, ac preparato. Aliud eiusdem. Discutit strumas, omnem frigidum humorem absorbet, hepatis ac splenis aquosas affectiones sanat, urinā prolecat, coxendices ueteres curat. Cereæ, resinæ pinus, colophonix, sing. lib. i. calcis uiuæ, aluminis fisti, auripigmenti, sing. unc. i. liquabilla cum modico oleo liquato ac excolato, deinde ad arida cū modico aceto trita ammiscero, ac uitior. Possē hoc diuturnas uiscerum duritiās dissoluere constat, ita ut multā humiditatem extrahat. Ceter quoq; mēses diu suppressos. Ego uerō ablata calce, duplum aluminis adijcto, & medicamentū longē præstatius cholerio: neq; enim pustulas excitat. Emplastrum Philagrii disculforiū. Curat gutturis tumores, & duritiās discutit. Spumæ argenti dra. i. resinæ pinus dra. x. l. olei antiqui dra. lxx x. æris usti, ammoniaci thymiamatis, sing. dra. viii. aluminis fisti, mānæ thuris, sing. dra. iiii. cereæ dra. l. spumæ argenti cū oleo coquito, & ad semicocta æs adijcto, & bullire finito donec nō amplius inquinēt: deinde ammoniacū tritū addito, eodē liquato resinā & cerā liquatas ac excolatas affundito, ac rursus ad cōpagem nō inquinatē coquito, ac mox galbanū præmolitum addito, & ab igne ablatis, thuris mannā inspergito, unito, & frige factū medicamentū manibus subigito. Emplastrū disculforiū abscessuū admirādum: nulla enim rptione abscessus facta, pus crassissimum in emplastro inueniatur, idq; detergēdū est, ac medicamentū reparatum, rursus imponendū. Colophonix lib. i. cereæ sesquili brā, olei hyeme cyathū i. ætate uerō dimidiū. Nitri berenicarij sulut aut albi & friabilis sexuncæ. Cetera liquefacto ac excolato, nitrū uerō minutissimē tritum inspergito, & probē uersato, perfrigeratāq; manibus emollito, & in massam cogito. Obseruandum est ne medicamentum in aqua transfundamus: alias enim nitrū abolebitur. Aliud. Picis siccæ, cereæ no uæ, sing. lib. ii. olei lib. iiii. ad lentum ignē coquito, subigito, ac uitior. Facit ad abscessus, strumas, fistulas, & alia huiusmodi. Aliud Oribasij, ad strumas, & alarū ac inguinum & colli tumores duos. Papaueris corniculati folia cum axungia & propoli pinagui terito, & imposito. Aliud ad strumas & omnē duritiā. Verbenacæ rectæ foliorum uiridum dra. x. l. hyoscyami uiridis dra. cx l. iiii. adipis porcini, resinæ pinus siccæ drachm. x lvi. picis drach. x xiiii. Liquabilla liquata ac excolata cū herbis tritis committito. Aliud ē rumice. Foliorū rumicis, perdicij, senecionis, resinæ pinus, singu. dra. x lvi.

foliorum hyoscyami, axungie antiquæ, singu. dra. xcvi. galbani dra. viii. liquabilla liquefacto, ac cū herbis cōmittito. Aliud ē rumice. Ad strumam & omnem duritiā, ad alarum ac inguinum abscessus, ad ulcera maligna & fistulas, ad uteri stragulas. Facit & ad splenē indurati. Alij nucleos xv. cereæ dra. xcvi. olei dra. xcvi. nitri Alexandrini dra. x lvi. æris usti, cerebinthinæ sing. dra. x xiiii. thuris dra. viii. foliorum rumicis in olla uel chara sub calicē cinere refectoriū dra. xlvi. Liquida cū aridis tritis cōmittito, & in morario subigito. Alia uerō in oleo fricta terantur. Aliud ē scolopendrii, philosophi. Discutit abscessus, furunculos, & ad multa cōmodat. Colophonix lib. i. cereæ, axungie rectis, sing. lib. i. resinæ pinus bessēm, olei sexuncem, scolopendrij sextatē. Vini antiqui sextarios ii. pollinis tritici un. xiiii. tritici pollinem cum uino coquito, deinde liquida affundito ac unito, & postremū scolopendrium addito, ac uitior. Quod si oleū reprobas, pro eo axungie sexuncem accipito, & magis emolliet: si oleum receperit, magis discutiet.

De emplastro ex aspidibus.

Cap. xv.

Emplastrum ex aspidibus, strumas & alias duritiās discutit. Facit & ad podagras per exacerbationē interualla adhibetur. Terebinthinæ, lapidis asij, bituminis, sing. dra. ccc x. spumæ nitri, adipis uiculi, cereæ, baccharum lauri, ammoniaci thymiamatis, sing. dra. ccc x l. lapidis pyritæ, calcis uius, sing. dra. cxx. dneris aspidum uiuarū ustarū dra. cxx. olei antiqui lib. ii. Olēū & cerā primā, deinde bitumen tritum liquefacto, & ad hæc adipē, mox ammoniacū, & terebinthinā adijcto. Et his ab igne ablatis, calcem, & lapidē asium ammiscito, deinde baccas lauri & nitri spumā. Postremum autē aspidum cinerē frige facto medicamentū inspergito, ut ne pereat, omniatq; simul subige ac utere. Ceterū ad aspidū exustionem, ollā totā forinsecus argilla crassius oblinito, & ad solem siccato. Et infectis aspidibus ollā operito, & probē munito, duobus aut tribus foraminibus relictis, ex quibus cognoscas ubi uapor purus exhalet. Hoc emplastrū oleo glucino dilutum & illitum articolorū affectiones ac coxendicum resolutiones curat, & cū laurino oleo illitum utilissimes albas exerit.

De emplastro Aniceto, Critonis.

Cap. xvi.

Emplastrum Aniceto, id est, insuperabile appellatū, in multo nobis usu est. Aurabit, rumpit, expurgat, glutinat, pus per splenem educit. Collyrium ex eo in sinus inditur. Diffundit duritiās, & cōtractis neruis opitulatur impositū citra irrigationē, ut ne perfrigerentur. Vngenti uicē explet dissolutū uel ut ingenū ad lasitudines extimēdas paratum: sedat enim lasitudines in principijs morborum, & ex obscura causā obortas. Est & extremarū partiū mollitiorū, in magnis splenis impositum. Glutinat etiā cruenta uulnera, post futurā, aut hamulos impositos, ita ut linteam cōplicatum solo aceto imbutū splenio superponatur, ætate frigido, hyeme calido. Facit & ad platurū offensas, purēdinesq; ac digitorum affectiones, & ad fracturas cum uulneribus, & neq; incarnāte, neq; cicatrice inductæ alio utendū est, sed ipsi soli fidendū. Facit etiā ad hominum, canum, & ferarum morbos. Maxima uerō eius promissio est, quod nō sinat fieri abscessus oculis in colo & membrana aluū ac intestina ambiente, si sanē non fuerint suppurati, aut si

aut si fuerint facti, quod eos attenuet, & ad intestina eorū ruptionē diuertat. Oportet autem splenū ad locū imponere, & hapsū lanæ aut lineum superponere, aceto & oleo calido imbutū, & irrigare bis per diē. Ne solueris autē, nisi per tres aut quatuor dies. Deinde fomento ad vaporem adhibito, rursus impone. Appellationem accepit, ab admirandis ac multis operibus. Squamæ æris drac.  $\text{viii}$ , pyrethri, staphidis sylvestris, grani cnidii, seminis sinapis, cāchrysos, stercoris columbini, aristolochiæ tenuis, æruginis, myrissos cyprii, seminis erucæ, cumini, sing. dra.  $\text{xvi}$ . nitri, salis ammoniaci, sin. dra.  $\text{xxxi}$ , mænæ thuris, baccarū lauri, iridis, singul. drac.  $\text{cxxx}$ . acetici acerrimi sextarios  $\text{xvi}$ . caricarū decoctū cyathos  $\text{v}$ . Decoctū porro caricarū sic paratur. Caricarū pinguis li.  $\text{v}$ . in aquæ sextarijs  $\text{vi}$ . coquantur ad tertias. Omnia itaq; cōfusa ac cribrata simul cū aceto terito sub caniculæ feruore. Vbi uerō ficitū & uiride euasis medicamentū, affundito caricarū decoctū ac cōmollito, & ablātū in æris rubri pyxide seruato. Vt autē postulatē, medicamentū partem unā cum aceto ad strigmentitiā spissitudinē dilutā, cum ceræ ac colophonis modico oleo liquefactarū partibus sex cōmittito, quod si durius efficere uolueris, ceræ & colophonis quatuor partes sumito. Sin mollius & magis dilutū, octo ammisceto. Idem & ad impetigines feras conuenire dicitur, si meracius adhibeatur. Aliud, discutiens abscessus. Ceræ, terebinthinae, nitri, butyri, æquales portiones committo. Aliud ad abscessus. Verbenacā rectā cum nitro, sulphure, & resina liquida committo, ac uitior.

#### Emplastrū ruptoria.

Cap.  $\text{xviii}$ .

Emplastrū scalpelli usum explens. Nitri lib.  $\text{iii}$ . propolis, simi colubini, salis ammoniaci, æruginis, sing. sex unciam, aquæ marinæ aut muræ selquis lib. olei aut qui lib.  $\text{iii}$ . arida seorsim primū terito, deinde eruginem, nitrū, & sal, simul in mortario leuissimē cōterito, & mox affusa aqua rursus probē terito, & mox oleū quocūq; ammisceto, ut strigmentitiā cōpages fiat, postea simul omnia in fistilē ollā cōiecta lento igne ad aquæ cōsumptionē coquito, postremū propolim premollitiā adijcio, & ablato ab igne medicamento ac tepescēto, simū columbinū inspergito, ac cōmisceto, & hoc lineo illitū, fastigiato ac molliori abscessus loco imposito: sic autē splenū ex eo illitū minuitū, & aliud amplū ipsi superponatur, cui emplastrū ē fucis, aut melle, aut melinū Serapionis, aut Mnasegæ, aut aliud mollitiorū sit inductū. Aliud perforās.

Ceræ unc.  $\text{xvi}$ , salis cōmunis, cerussæ, sin. dra.  $\text{xli}$ , cineris farmetoriū uitis, harundinū Græcorū usatarū, eruginis, nitri rubri, sing. dra.  $\text{x}$ . Singulis seorsim tritis, deinde permixtis aquā affundito, & ad strigmentitiā spissitudinē cōterito. Postea cerussam cum olei quincuncē aliquatenus coquito, & dein de cerā additā, simulq; bullire finito, donec non amplius inquinant, & ad reliqua crita ammisceto ac uitior. Aliud, perforās arundines & aculeos, & quēcūq; infixa, ac in profundo herētia extrahēs, & ulcera glutinās. Bituminis, nitri, sing. dra.  $\text{xxv}$ , aristolochiæ drach.  $\text{xxi}$ . baccarū lauri dra.  $\text{xx}$ . præpara & utere. Aliud. Fimi columbini, nitri, sing. drach.  $\text{iii}$ , caricæ numero  $\text{vii}$ , nitri & simum simul terito, & postea cū caricis cōfusus subigito, & lineo inducto, & si durius uidebitur, mel & axungia depurata addito. Hoc eadē die

disipat ac rūpit. Oribasij ruptoriū. Picis liquidæ, picis siccæ, propolis, portiones æquales unito, & adhuc beato: rūpit & ad cicatricē perducit. Aliud eiusdē, extrahit, rūpit, & glutinat. Ammoniaci thymiamatis, propolis, aluminis, sing. sextariē, thuris sesquidrachmā, galbanī, auripigmētū, sing. dra.  $\text{i}$ . Emplastrū ruptoriū. Succī ranunculī, auripigmētū, chalcididis, la thyrididis, squamæ æris rubri, uentriū cācharidū, sing. un.  $\text{i}$ , calcis uiuæ dra.  $\text{ii}$ , excipe cedria. Vtus tempore splenū dimidij digiti latitudine, & longitudine quāta uidebitur, ex eo illinito ac imposito, & emplastrū ex fucis emollitū superimposito. Sinatur autē ad horas  $\text{iii}$  uel  $\text{v}$ , & caueatur ne neruus, aut uena, aut arteria attingatur, nēue prius adhibeatur quā matus fuerit abscessus: hoc etiā strumas rumpit.

Aliud, Oxyritrū appellatum. Cerussæ un.  $\text{xxx}$ , salis fossilis dra.  $\text{vi}$ , nitri quadrantē & semunciā, olei ueteris trientē, acetici heminā  $\text{i}$ . omnia simul coquito donec nō amplius inquinant. Aliud sine molestia rum pens. Cere, nitri, sing. dodrātem & semunciā, fecis uini usq; un.  $\text{xiii}$ , auripigmētū dra.  $\text{vii}$ , olei antiqui lib.  $\text{ii}$ . liquabilia liquefacto, & ad arida trita ammisceto. Aliud ad strumas, ac omnē duritiā: aut enim discutit, aut mollit, & rūpit, purgatq; ac sanat. Succī potamogitonis, straiotæ, ceparū acerrimarū, ceræ, propolis, pollinis tritici, sing. un.  $\text{xvi}$ . fermētū acidū, serapiadis triesticularis, sing. sexuncē, tragacanthæ, resinæ pinus, sing. quadrātem. Aliqui etiā horū sexuncem adijciunt, galbanī, opopanax, olei antiqui, sing. dodrātem. Tragacanthā in parte aliqua succorū madesfacto, similiter opopanax, & galbanum seorsim madesfacto ac terito, & his postea fermentū cum succis subactum ammisceto: postea oleo & resinæ liquatis & excolatis, propolim emollitam adijcunt, & ad hæc triticū pollinē inspergito & unito: postremū omnia in mortariū trāsata manibus probē subigito. Aliud, abscessus disipās, uel rūpens. Vitri, specularis præsertim lapidis minutissimē tritum, & thus, æquis partibus cū aceto probē trita, pēna illinito. Ruptoriū efficac. Bulbū Aphricanū, nasturtiū, nitri, fimi colubini, ficus aceto præmercatas, axungia depurata, æquis portionibus oīa cū melle ad emplastrū formā subigito, ac imposito pro partis ratione, quā rūpi uoles. Aliud, discutitiā ac extrahendi uires habēs. Ad strumas & gutturis tumorē mirū in modū cōmodū: olei ueteris lib.  $\text{iii}$ , plūbi lib.  $\text{ii}$ . coquito simul donec nō amplius inquinēt, deinde terebinthi nē, galbanī, sing. sexticem, ammoniaci thymiamatis sextariē ammisceto, ac uitior. Aliud Oribasij. Candidum canis stercus terebinthina excipe, & impone.

#### Emplastrū discussoria & attractoria. Cap. $\text{xviii}$ .

Qui cōpositorū pharmacorū facultates descripserunt, quædā emplastrā attractoria appellauerūt, sicut quædā discussoria: aliquibus uerō testimonium præbuerunt utriusq; facultatis: sunt em̄ uicinæ inter se facultates, attractoria ex profundo, & discussoria attractorū. Nam quæ attrahūt, omnino etiā discutiunt, & quæ discutiūt, etiā attrahunt. Et prædominatur in discussorijs quidē medicamentis facultas discussoria. In attractorijs uerō attractoria: attractoria porro ē simplicibus cōposita sunt, quæ uim habent humorū superfluitates ex profundo ad cutem attrahendi. Discussoria autē ex his quæ uim habēt discutiendi attracta. Quō itaque emplastrū forma fiat, alijs spuma ar-



gēti miscetur, aliq resina, aliq oleum, aliq cera, aliq pix: quum talia neq discullosiorā memorabilē, neque attractoria vim habeat, quemadmodum propolis, galbanū, calx, medullae, asiae perae flos, spuma nitri, acetum, piper, sinapis, herba lanaria, sal cibarius & ammoniacus, & multa huiusmodi quae in superioribus Sermonibus de simplicibus commemorauimus. Ceterū aliqui adstringentia medicamēta attractorij ammiscuerunt, uerūt id quod fieri solet, in his quibus superflui sunt humores: attractū enim aliquid plus quam cōuenit, ut ne solū ex parte quae curatur à profundo attractionē faciās, sed etiā ex omnibus circumstis eliciāt. Eius uerō meminisse oportet, quod suprà de incarnatibus medicamētis relatum est, attractoria & discullosia, & quae magis quam oportet detergerē, omnia fieri incarnatū per ceram ammixtionē, ita ut his quae sortia sunt, amplius, quae uerō debilia, minus de cerato ammiscetur. Atq; hac ratione distutur na ulcera cicatricē respuētā, purida & serpētia, per emplastra ex sale, ac reliqua huiusmodi, cerato ammixto repurgāt, & cicatrice induntur. At si medicamento attractorio aut discullosio ammixtū fuerit aliquid adstringens, eo pharmaco nō est utendū ad incarnandum, eō quod faculas adstringendū, ad uulnera quidem glutinanda, & sinus, & ad ulcera cicatrice includenda utilis est, uerum inutilis ad incarnandum: ceterum emplastra attractoria ac discullosia faciunt ad omnes panos, ac inflammationes induratas, ad furunculos, strumas, atheromata, hominum ferarumq; morsus glutinant etiā sinus, quibus asperit aut flacidi ac marcidī calli insunt. Podagricis itē ac arthriticis in declinatione auxiliantur. Frigidis enim & crassis humores ab articulis exungunt. Et si discullosia ac attractoria medicamenta in memoria reuocaueris, tum suprà relata, tum descriptēda, facili fuerit eorum utilitatem ac usum comperire. Emplastrum, ad omne panorū genus discutiendū & attractendū, quod ab abscessu etiā in pus trāsmutato, cicatrē cutis celsurā, pus uelut per colum exugit. Desiccāt etiā sinus forissecus impositū efficacissimē. Radicē siccatum hyoscyami, & cucumeris syluestris, farinæ ordeī, singulorū quincuncem, terito & cribrato, ac hyoscyami succo aspergit, & in passillos cogito, eosq; in umbra quotidie uersando siccato, & usus tēpore aqua diluito, ac crassius illinito. Ego uerō inquit, etiā corticum radicē capparis dra. ii. & succi lycamini dra. i. habere posui, adici. Emplastrū attractorij album. Ad strumas ac parotidas & partulares abscessus. Facit & ad fistulas ac agilopas, ut clara sectionē liberet. Facit & ad fluida ac aegrē curabilia, & ad hydropicos. Spumae argenti, cerussae, salis, singulorum drach. lxx. olei ueteris libras duas, singula seorsim trita cū oleo in mortario subigito, tum in ollā confecta, assidue agitādo coquito, donec nō amplius inquant, & in mortarium trās lata frige facta q̄ probē tundito, mollito, ac utitor. Aliud, occultos abscessus discutiens, rosaceo dilutum duritias dissoluens, uetera ac putrida ulcera repurgans ac incarnans. Cerussae, ceræ, singulorum lib. ii. olei ueteris libras iii. atramenti futorij, salis cōmuns, singulorum sexuncem, nitri lib. i. acetū quantum satis est, cerussam cum oleo ad bonā compagē coquito, deinde ceram adijcito, & hac liquata ad arida trita in mortarium diffundito, & omnia probē subigito,

unito, ac utitor. Aliud, attrahens, rumpens, ac cicatricem inducēs. Picis siccae, picis liquidæ, propolis, æquales portiones cōmittito ac utitor. Aliud attractorium, huic Philagrus testimonium præbet. Iradis, mānæ thuris, spumae nitri, pumicis, singul. drach. vii. ammoniaci thymiamatis drach. xxxv. galbani drach. vi. cāchrys drach. xii. ceræ dra. c. olei lib. ii. ætate uerō unc. x. v. ceræ cum oleo liquatae ac excolatae, ammoniacū tritum adijcito, & eo liquato galbanum præmollitū addito, & ab igne ablata aridis minutissimē tritis ammisceto, ac simul commollito. Andromachi Melinum, abscessus profundos refober, & habet eadēdam ponderum proportionē. Facit ad strumas, ganglia, meliceridas, atheromata, panos, parotidas, furunculos. Perforat abscessus, fistula rum callos atheris, sinus glutinat. Cerussae, salis fossilis, olei antiqui, sing. lib. i. ceræ, colophonæ, singulorum quincuncem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, opopanax, galbani singul. unciam i. Sal tritum, & cribratum, ad minutissimum puluissum redigito: deinde cum aqua marina præsertim probē subigito, & cerussam simul terito: deinde oleum affundito, & omnia probē unita ad bonam compagem coquito, & adiecto ammoniaco bullire finito, donec non amplius inquant. Postresum liquabilia liquata cum galbano & opopanax ce madefactis ac præmollitis ammisceto. Aliud, ad strumas, gangrænas, antiqua, & chironia ulcera.

Spumae argenti, olei antiqui, auripigmenti, sing. lib. i. Spumae argenti cum oleo coquito, donec non inquant, & ab igne ablatis, auripigmentum cum olei sextiæ tritum adijcito, & bullire finito, donec medicamentū nigrescat, & postea in mortariū trās latum primū pistillo, deinde manibus diligētē subigito ac utitor, ad strumas quidē ac duritias sincero & meracot ad podagras uerō & ulcera, cum oleo diluato. Facit & ad carbunculos. Aliud attractorij, Orisbasi, Spumae argenti, cerussae, nitri, ceræ colophonæ, ammoniaci thymiamatis, singulorū trientē, olei ueteris lib. iii. spumae argenti, cerussam, nitrū, oleū, cum lixiuij ē cinere ficulneo libris duabus coquito, donec nō amplius inquant, deinde ammoniacum tritū, postea cerā, mox colophonā adijcito. Præstat tamē pro nitro, spumam nitri injicere. Aliud, ad strumas, ganglia, parotidas, mammarum abscessus, nitri ēd efficacit: tumores enim dissoluit, & impactum humorem per occultos meatus educit, sinus agglutinat, fistulas & agilopas citra sectionem curat. Ceterē teritū tenuissimē terito per se, & mox cū aqua, ut penitus diluatur, & postea in fistulā coquito, & cooperitū per interualla uersato, & post sedatū feruorē, liquabilia liquefacta affundito, assidue agitādo donec nō amplius inquant, & in mortariū trās lata, frige facta probē emollito. Aliud, quo Menecrates utebatur. Ad strumas ac mammarū duritias, peculiare auxilium: tumores em discuit, & serē non rumpit, sed tenuissimas riumulas inferit, per quas uelut per colum impactus humor excernitur. Sinus etiā glutinatus, & ad cicatricē perducit. Ceræ, terēbinthinæ, spumae nitri, galbani, resinę pinus, olei antiqui, sing. lib. i. cineris quercini ac ficulnei, singulorum sextarium unū. Pēder autē cineris sextarius unc. x. i. liquabilia liquata

ita ac excolata coquito, deinde galbanum præmolli-  
tū adjicito, & ab igne ablatis cineres ammisceto, &  
probe subigito, & uitor, ita ut primum quinta die,  
postea tertia excolas, donec tumor perforetur. Dein  
de uerò quotidie soluas ac cures. Aliud atrachoriū  
ac discussoriū efficax. Abcessuū humores citra ru-  
ptionē per cæcos meatus uelut excolat, ac diffundit.

Olei antiqui unc. x x i i i. ceræ albæ uncias x v. aphro-  
nitri albi quadratē, terebinthinæ librā i. lixiuū ē ci-  
nere quærneo aut scilicet sextariū i. spumā nitri, si-  
ue aphronitrum cū lixiuo per pistillum ad frigimē-  
tiū compagem terito. Cerā uerò cum oleo liquefa-  
cito, & terebinthinā ammisceto, & ab igne ablatis,  
alsidue uersatis ac frigefactis, spumam nitri ammi-  
sceto, subigito, ac residuū lixiuū paulatim adstilla-  
to. Aliud, Dionysia inscriptum. Hierē Cappadociis  
conferat ad relatas affectiones, & ad mammarum ac  
aliarum partium induratas inflammationes præci-  
puum est. Ceræ, terebinthinæ, mānæ thuris, spumæ  
nitri albi, sing. lib. i. olei antiqui lib. ii. aquæ siue lixi-  
ui coactiliariorum sextariū i. misyos crudi sextatē.  
Misy & spumam nitri cum dimidia lixiuū parte teri-  
to. Ceræ uerò cum oleo liquatæ terebinthinā adjic-  
ito, ac paulatim ad compagem coquito. Et ablatis  
ab igne, mannā thuris inspergito, & alsidue agitā-  
do frigefacito, & ad reliquā prius trita ammisceto,  
residuū lixiuū paulatim instillādo, donec totum fue-  
rit absorbptum. At ubi inflāmatione discussa, & do-  
lore sublato, durities aliqua restiterit, hoc medicamē-  
tum remouebis, & pro eo melinū, aut Venus inscri-  
ptum, aut aliud emolliens ac discutiens adhibebis.

Aliud atrachoriū ac discussoriū, longo usu cogni-  
tum. Colophoniz lib. i. ceræ sesquiunciam, nitri sexun-  
ciem. Olei hyeme quidem cyathū i. æstate uerò dimi-  
diū. Nitrum cum aqua, uel posca, uel aceto tritum,  
proūt res postulat, cum liquabilibus liquatis cōmi-  
sceto, ac manibus subigito, obseruando ne nimia  
aquæ copia ad nitruū affundatur, & in pastillum cogi-  
to. Facit hoc ad carbunculos, furunculos, strumas,  
abcessus, fistulas, egilopas. Humore per cæcos mea-  
tus citra ruptionē exugit, ut emplastro impactus ui-  
deatur. Emplastrū Piscatoriū inscriptū. Nitri unc.  
i. salis cōmunis, cerussæ, singulorum drac. viii. pro-  
polis drac. x x i i i i. galbani drac. viii. medullæ ceru-  
inæ lib. i. olei uteris lib. ii. aristolochiæ unc. i. Erit au-  
tē medicamentum præstātus, si pro oleo medulla su-  
matur, ut sine medullā lib. i. i. Aliud Piscatoriū, sō-  
go usu constans. Nitri dra. x x i i i. stercoris columbi-  
ni, salis cōmunis, cerussæ singulorū dra. viii. Aristo-  
lochiæ rotundæ drach. x x i i i. propolis dra. x x i i i i.  
galbani dra. x x v i i i. medullæ taurinæ, olei antiqui,  
singulorum lib. i. i. Cerussam, sal, nitrum, singula  
seorsim trita, ad emplastri compagem simul coqui-  
to, & postea propolim ac galbanum adjicito, & ab-  
latis ab igne, stercus columbinum & aristolochiam  
ammisceto. Aliud, ad strumas, & reliqua huius-  
modi usu cognitum. Ceræ libr. i. colophoniz dextā  
tem, auripigmenti, galbanī, opopanacis, myrrhæ,  
halcyonij, sing. unc. i. adarcæ sextantem, floris salis,  
misyos, singul. sesquiunciam, atramenti futuri, alu-  
minis fssis, singul. sextantem, & scrup. vii. aluminis  
rotundi, aluminis liquidi, singul. unc. i. & scrup. iiii.  
sulphuris uiui sextantem, & scrup. vi. nitri drachm.  
x x i i i. salis communis drachm. x l i i. terebinthinæ

quadrantem, olei lib. i. aquæ marinæ lib. i. & sextan-  
tem. Colophoniam cum oleo dissoluito, deinde ce-  
ram, mox terebinthinam adjicito, & simul ebullire  
finito, & ab igne ablata, ad arida prius seorsim, &  
postea simul cū aqua marina trita ammisceto, subia-  
gito ac uitor. At uerò ubi superficiem ignitā, & lo-  
cum ruptura uideris, infra scriptum emplastrum ad-  
hibeto. Spumæ argenti, plumbaginis, singulorum  
lib. i. picis fssæ, galbani, chalcidis crudæ, æruginis,  
squamæ æris rubri, mannæ thuris, singulorū drac.  
x x i i. salis assati, uiscī, singulorum drachm. l x x i i.  
olei lib. ii. Spumam argenti, plumbaginē, chalci-  
tidem, squamam, cum oleo coquito donec nō inqui-  
nent, & ad compagem redacta fuerint. Deinde liqua-  
bilia ammisceto, simulq; paulatim bullire finito. Po-  
stea uiscum adjicito, & demum arida addito, ac fri-  
gēfactum medicamentum manibus subigito, ac uti-  
tor, usque ad sanationem.

Emplastrum Nechepponis, ē cupressō. Cap. x i x.  
Facit ad strumas, tumorem gutturis, parotidas, omnē  
duritiā, & totum laxorum tumorum genus. Cu-  
pressi folia uirentia in uigore minutissimē terito, ui-  
no insperso quod ā uinacels post primi uini colle-  
ctionē exprimitur, efficitq; solidi frigimentī crassius  
dinē, ac locis affectis imposito; omnem enim tumo-  
rem discuit, & si strumis impoueris, tertia die solut-  
to, strumasq; cōtractas, & uicinas ac incipientes par-  
tes desquamatas cōperies. eas itaq; digitis exprimito  
ac dissoluito, & medicamētū rursus adhibeto, ac ter-  
tia die rursus soluito, iterūq; ualidissimē exprimito,  
& tertio medicamentū adhibeto, ac similiter exsolu-  
to. Intra septē enim aut summū nouem dies, strumæ  
abolebuntur. Viere hoc auxilio uelut admirādo, &  
tanquā naturalē quandā proprietatē habente, aduer-  
sus hanc affectionem. Nā si aliquid ammiscere, aut  
aliquo modo ipsum permutare uolueris, magis offi-  
des quā proficies. Facit & ad gutturis tumorē ex-  
tra fauces prominentē, & est eodem penitus modo  
adhibedū cum digitorum pressione, uelut diximus;  
contrahit enim ac discuit, siccatq; ac tumorem extir-  
pat, & uasa materiā ad affectum locum afferentia cō-  
stringit. Confidenter igitur eo uaris; promissioni-  
bus enim nostris experimentum testimoniū dabit.  
Emplastrū ē Cappari, Oribasij. Plumbaginis, olei  
antiqui, sing. lib. i. salis communis lib. i. ceræ sexun-  
ciem, resinæ pinus trientem, squamæ æris, corticum  
radicis capparis, singulorū quadratē, Aristolochiæ  
rotundæ sextatē, propolis tātundem, galbani unc.  
i. Squamam & plumbaginē tufas ac cribratas, & sal  
primum seorsim, deinde simul cum his tritum, cū  
oleo in mortario probē subigito, & in ollam cōiecta  
coquito, donec nō amplius inquent. Deinde ce-  
rā, resinā, propolim, liquatas ac excolatas, & mox  
galbanum adjicito, & ablatis ab igne aristolochiam  
ac cortices capparis tritas inspergito, unito, frigefac-  
to, emollito, ac uitor. Facit ad duritas, coxendicū  
affectiones, hemigraneas, ac hydrocephalum in pue-  
ris aquosam capitis affectionē; abrais enim capillis  
capiti impostum, humorem exugit. Glutinat etiam  
sinus; aliqui etiam sine cera præparant. Empla-  
strum ex Agarico, oculotus abcessus & omnem hu-  
miditatem resorbens. Ceræ, colophoniz, picis, spu-  
mæ nitri, thuris, agarici, singulorū lib. i. terebinthi-  
næ, uiscī quercini, singulorum sexuncem, medullæ

ceruinæ trientem, ægypti quadrantem, granî cniðij, pyrethri, galbani, singulorum sextantem. Liquabilia liquo & excolato, & ab igne amotis uscum adijcto, eoq; liquefacto, arida ammisceto, subigito, ac utitor.

tidis folia recentia, æquis portionibus conterito, & panem siliquinem tulum ac cribratum, unius herbæ portione adijcto, omnia simul cum æxungia subigito, & ad emplastri formam redigito, & utitor uelut admirando.

*Apochymatis præparatio, Oribasij. Cap. xx.*

Picta aride lib. i. pictis liquidæ, ceræ, singulorū trientē, resinæ pinus sexuncem. Omnia liquata & excolata in peluim aquæ marinæ siue communis plenā mititō, & manibus uelut pastillū subigito ac utitor. Emplastrum eiusdem, ad collisā, miſiganda, irrigaſionis uſcem ſupplens. Spumæ argenti lib. ii. ſtirgimentorū balnei excolatorum lib. vii. aquæ marinæ ēpe lago hauſtæ ſextarios ii. colophoniæ unc. xvi. ceræ ſextantem, ſquamæ æris quincuncem. Spumam argenti, ſquamam, ſtirgimenta, aquam marinam ſimul coquito, & arundinibus uiuentibus agitato, donec non amplius inſequunt. Deinde cerā ac reſinā adijcto, & ruriſus ad bonam compagem coquito, & ſtirgationis loco utitor. Ego uerō etiam olei lib. ii. adijcto. uerum inter emolliētia emplāſtra Oribasij, hac ſerie reperitur. ſtirgimentorū lib. iii. s. aque marine, olei aniqui, ſpumę argenti, colophoniæ, ſing. lib. ii. ceræ lib. i. æris uſti, ammoniac thymiamatis, ſingulorum ſextantem. Facit inquit, ad duritias, & præparatur uelut dictum eſt.

*Cerata utiliſſima.*

*Cap. xxi.*

Baſilicū tetrapharmacū. Cerę, colophonis, pictis, adipis taurini, æquales portiones. Macedoniū. Cerę, colophonis, pictis, adipis taurini, thuris, æquales portiones. Liquabilibus liquatis & ab igne amotis, thus in ſpergito ac inſarcito. Macedoniū Azanitæ, ad multā commodum & inſigne. Pictis ſiccæ unciam unā, ceræ quadrantem, adipis ſuilli antiqui & expurgati ſexuncem, adipis taurini, ægypti, ſingulorum quadrātem, resinæ pinus ſiue pictæ quincuncem. Liquefacto ac utitor. Facit ad omnia maligna, ad gægrænas, fiſtulas, uulnera recentia, ambuſta, perfrigeſacta, uelut acopon ſaſtitudinē eximendæ deſtinatum. Eſt & peſſus mollitorius. Conuenit etiam ad uteri ulcera, panos, paroddas. Eſt ubi caua fuerint ulcera, maiori eius copia utendum eſt. Vbi uerō propē cicatrix inducā fuerit, pauciore. Aduerſatur huic pharmaco oleum, quare hoc uitabis. Maximè autē facit in hiſ quibus plaga circa neruos aut muſculos eſt.

*Heptapharmacum laxans, ſuppurans, incarnans.*

*Cap. xxii.*

Ceruſſæ beſſem, ſpumæ argenti trientem, ceræ, pictis, colophonis, adipis taurini, thuris, ſingulorum ſextantē. Liquabilia liquata cum aridis unito, atq; uſus tēpore medicamentū quidem ac ceræ ſingul. unc. i. olei uerō roſacei trientem accipito ac utitor. Quod ſi laxandi uſum intendere uolueris, oleum irinū aut ſicyonium, aut glucinum ſit, & maiore copia ſumatur. *Emneapharmacum, Hori Mendefij. Cap. xxiij.* Hoc ſuppurat & laxat, præcipuè neruis per cōſenſum affectis. Ex eodē ſit & peſſus, ſiue peſſarium ad ſedis affectiones cōmodum. Adipis anſerini, uſtuliſi, butyri, medullæ ceruinæ, ceræ, terebinthinæ, olei roſacei, cicini, mellis, ſingulorum portiones æquas liquefacto, unito ac utitor.

*Emplastrum Philoſophi. Cap. xxiiii.*

Facit ad calcitratus, uulneraq; tumida. Rūpiti, pus educit, cicatricem inducit. Hyoſcyami perdicij, & ſideri

*Oeſyji præparatio.*

*Cap. xxv.*

Huius quidem optimam præparationē in ſecundo libro deſcripſimus: ex lanis enim ſuccidis paratur, uerum ubi illud haberi non poteſt, accipe hoc quod ita parari ſolet. Meliloti trientē, cardamomi, hyſſopi herbæ, ſingulorū ſextantem, lanæ ſuccidæ ex alis ouī ſumptæ trientem, colophonis, ceræ, resinæ pinus, ſingulorum dextantem. Olei dulcis lib. ii. aquæ ſextarios iii. melilotū, cardamomum, lanam, & hyſſopum, per triduum aqua macerato, deinde ad teritias coquito, & excolato. Poſtea liquabilia liquo ac excolato, & ſuccum ac oleum ammisceto, & omnia ſimul ad ſucci conſumptionem ebullire ſinito.

*Emplastrum Manu appellatum. Cap. xxvi.*

Hoc emplastrum à quinque rerum ſpeciebus quas recitpit, Manu appellatur. Colophonis lib. v. ceræ lib. iiii. resinæ pinus lib. iiii. adipis taurini lib. ii. butyri lib. i. liquefacto ac utitor.

*Emplastrum Bromium appellatum. Cap. xxvii.*

Fœni græci, ſeminis lini, ſucci althææ, ſingulo. lib. i. ſimul ad ſucci conſumptionem coquito. Et colophonis, resinæ pinus, ſingulorum quadrantem, cerę ſexuncem, galbani trientem, liquefacto & ammisceto ac utitor. Aliud optimū. Seminis lini, althææ, fœni græci, ſingulorū trientē, in duobus aquæ ſextariis macerato, & de expreſſo ſucco ſumito lib. i. cerę lib. i. resinæ pinus, colophonis, ſingulorū ſexuncem, galbani ſextantem, opoponacis unc. i. præpara & utere.

*Emplastrum ex ouis.*

*Cap. xxviii.*

Spumæ argenti, ceruſſæ, ſingulorum trientem, cadmię ſextantem, ceræ libram i. roſacei lib. ii. ouorum candida x. metallica cum aqua ac uino terito, deinde cū ouorum candidis ſubigito, & liquabilibus liquatis ammisceto, unito, ac utitor.

*Parhygrum Galeni.*

*Cap. xxix.*

Spumæ argenti, ceruſſæ, ſingulor. lib. i. olei puriſſimi, aquæ, ſingul. lib. ii. Ego uerō, inquit, ſæpe olei quidem lib. i. adipis uerō anſerini ſexuncem ammisceto, aut ſi ſis deſit gallinacæ, aut hoc quoq; deſiciente, ſuillum recentem accipio. Omnia ſimul ad prunas ſuum non edentes citra ſolidam compagem coquuntur, & in cocturæ ſine, aliquādo etiam amyli ſexuncem adijcto. Si itaque adipem receperit hoc medicamentum, maiorem miſigandi uſum acquirit, & dolores ex uulnere inflammato obortos ſedat. Sed ad cicatricem inducendam inuſite eſt. At uerō aquam addere frigiditatem ſatis conſtat.

*Emplastrum ex ouis, Oribasij.*

*Cap. xxx.*

Ceræ unc. i. ſpumæ argenti, ceruſſæ, amyli, ſingulorū ſextantem, oua numero iiii. roſacei lib. i. oua in præparatione poſtremum addantur.

*Parhygrum Oribasij.*

*Cap. xxxi.*

Facit hoc ad ſpontanea ulcera in corporibus delicatioris. Adipis ſuilli recentis deuncem, cerę ſexuncem, ceruſſæ, ſpumæ argenti, ſingul. unc. x. liquata cum aridis committito. Facit & ad ulcera ſerpentina. Et cum roſaceo dilutum uulnorum ac ſedis affectionibus medetur, & malignas faciē puſtulas curat.

*Emplastrum*

*Emplastrum Rosaceum inscriptum.* Cap. xxxii.  
Hoc mammarum durities discuit, & est ad sedis affectiones efficacissimum, si cum rosaceo, aut myrteo oleo diluatur. Spumæ argenti, cerussæ, adipis suilli recentis, singulorum sexuncem, olei ueteris sesquialibram, myrrhæ drach. iiii. ouorum crudorum uitellos duos. Reliquis ad bonam compagem coctis, ac frige factis, oua cum uino albo trita ammisceto, & utitor hoc medicamento aliquando sincero, aliquando diluto.

*Emplastrum Phycotype appellatū.* Cap. xxxiii.  
Ad omnia ulcera, & præcipue in sede commodum est hoc emplastrū. Crod unc. i. cerussæ, spumæ argenti, medullæ ceruinæ, adipis asnerini, ceræ, singulorum sexuncem, rosacei uncias xxxvi. ouorum candida xxx. uini quantum satis est.

*Emplastrum Sphærium appellatū.* Cap. xxxiiii.  
Hoc irrigationis uicem supplet. Facit ad desquamata, excoxiata, intertrigines, ambusta, ad flagellatos, ad tibias collisas. Spumæ argenti, cerussæ, calcis uiuæ, singulorum quadrantem, ceræ sesquiquintæ, nitri unc. i. olei rosacei unc. i. Aridis minutissimè tritis si quida ammisceto, & sphæria, hoc est, pilulas formato. Vsu uerò expetente olei sexuncem, rosacei quadrantem, ceræ sextantem, ad prunas liquefacto, & medicamenti sextantem adijcto, spatulâque agitato, & ubi frige factum fuerit medicamentum, cum aquæ dobrante contundito.

*Emplastrum pentatheton.* Cap. xxxv.  
Ceræ, picis, colophoniz, adipis taurini, calcis uiuæ, æquales portiones. Liquabilia liquato, & calcem adijcto. Vfus autem tempore olei sexuncem, ceræ sextantem, olei sicyonii quadrantem, liquefacto uelut proxime dictum est, & medicamenti sextantem adijcto. Facit ad uibices flagellorum, ad cutem excoxiatam, & ad collisa, ac cætera huiusmodi.

*Emplastrum ex Ochra.* Cap. xxxvi.  
Eisdem cum prædictis uires habet etiam hoc. Ochraz lib. ii. cretæ, ceræ, singulorū libr. i. colophoniz, picis, resinæ pinus, singulorum libr. i. spumæ argenti, terebinthinæ, singulorū besslem, olei libr. ii. arida cū uino terito, & liquabilia liquata ammisceto, & in massas efformato. Vsu uerò postulare, ceræ lib. i. olei ueteris lib. iii. liquefacto, & excolato, & medica mēti lib. i. ammisceto, & uino adstillato cōtundito.

*Emplastrum Telamonium.* Cap. xxxvii.  
Hoc carbunculis medetur. Dilutū sinus siccatur, & cicatricem inducit. Spumæ argenti, calcis uiuæ, ceræ, resinæ pinus, singulorū dodrantē, cerussæ unc. xxxv. olei sesquialibrā. Spumæ argenti cum oleo ad compagem coquito; deinde ceram, ac resinā adijcto. Postea calcem, & cerussam minutissimè trita ammisceto, ac utitor. Et ad carbunculos quidē linteum inductum imponitur. Ad reliqua uerò, rosaceo aut myrteo oleo ad frigementitiā compagem dilutum adhibetur.

*Pilarium excremento argenti.* Cap. xxxviii.  
Recrementi argenti sexuncē, ceræ, adipis taurini, singulorū quincunem, colophoniz tridentē, picis, olei, singulorum sextantē. Argenti recrementū uino, aut sœni græci succo teritur. Quod si non possit haberi argenti recrementū, plumbaginem pro eo accipimus. Facit ad desquamata, ac excoxiata, & his similia.

*Emplastrum ex pompholyge.* Cap. xxxix.  
Hoc longo usu constat eunuchorum, mulierum, pue-

rorum, ac aliorū mollium corporum ulceribus cōuenire, ad cicatricem citra dolorē inducendam, & ad cancerata ulcera tutō adhibetur. Cerussæ, spumæ argenti, pompholygis, singulorū sextantem, cadmiæ tridentē, medullæ ceruinæ quadrantē, ceræ, olei rosacei, singul. libr. i. olei myrtei sexuncē. Metallica trita, ac cribrata, & cū uino subacta, liquabilibus liquidis ammisceto, ac utitor. Aliud Archigenis, & Oribasij. Pompholygis, cerussæ, spumæ argenti, singulorum unc. i. ladanī sextantē, acaciæ tridentē, ceræ quadrantem, olei myrtei besslem, ouorū assatorum uitellos ix. uini quod satis est. Aliud Oribasij. Spumæ argenti, cerussæ, singul. sextantē, pompholygis unc. i. crod unc. i. ceræ unc. i. adipis asnerini quad. æ. ouorū assatorū uitellos iiii. Rosacei, uini, quod satis est.

*Emplastrum rutaceum.* Cap. xl.  
Hoc ad fistulas scabras facit. Cadmiæ, spumæ argenti, recrementi argenti, sulphuris uiui, singulorum sextantē, aluminis scissi, rutæ uiridis, singulorū unc. i. ceræ besslem, olei myrtei lib. ii. uini quantum satis est.

*Ceratū ē perdictio.* Cap. xli.  
Facit ad sinus. Foliorum perdictij libr. ii. ceræ, colophoniz, olei, singulorū libr. i. Herbæ exactissimè terito, & liquida ammisceto, & in mortario unito. Hoc in aliquibus ob nimiam uim repellendi, uicinos locos inflamat, & materiam eō colligit. Quod ubi contigerit, ad locum quidem inflammatum, idem medicamentum imponito: uerū ad sinus osculum emplastrum ē solio, aut quod Venus inscribitur, aut quoddam attractorium adhibito.

*Ceratū ē succo betæ.* Cap. xlii.  
Facit ad uulnera inflāmata, ad achoras capitis ulcuscusla, & ad ambusta. Ceræ libram unam, olei sesquialibram, liquato, ac excolato, & ab igne ablatis, betæ succum quantum imbibere possunt affundito, & in mortario subigito. Præstat autem paulatim succum cerato instillare. Aliud ē succo plantaginis, ad inflammationes, & sinus. Ceræ lib. i. olei lib. ii. s. succi plantaginis quantū satis est. Ceratū liquefactum & in frigida aquam diffusum, aqua sæpe permutata probe lauatur, & postea in mortario pistillatur, ac subinde plantaginis succus paulatim instillatur, quantū eius imbibi potest. Ceratū Myrteum, ad oculorum inflammationem, & cicatricem inducendam, ad intertrigines, ac scabiosas affectiones commodum. Ceræ lib. i. olei myrtei lib. ii. plumbi usti sexuncem, cerussæ, spumæ argenti, syriaci, singulorum unc. i. uini quantum satis est ad conterendū. Melinum cicatricem inducens. Chalchidiz crudæ sexuncem, cadmiæ quadrantem, ceræ lib. i. olei myrtei lib. i. uini quod satis est.

*Ceratū ex sandyce.* Homo appellatū. Cap. xliii.  
Hoc ulcera diuturna, ac maligna, & in tibijs oborta, solum perse adhibuit ad cicatricem perducit. Sandycis lib. i. olei dulcis lib. ii. coquito, donec non amplius inqueant, & utere confidenter.

*Emplastrum ex allijs.* Cap. xliiii.  
Hoc uim attractoriā habet. Facit ad omnē duritiā, abscessus, furunculos, strumas, inguinū tumores, fistulas, impetigines humidas, mammas induratas. Ceræ lib. i. colophoniz sexuncem, medullæ ceruinæ ætundē, nitri albi besslem, allia uiginti, olei lib. iiii. Allia depurgata in oleo coqto, donec torrefiat, deinde ad oleū excolato liquabilia adijcto, & postea

nitrū tritū adijcitur, ac utitur. Nos uerò ita præparamus: Ceræ, colophoniæ, olei, singulorum quincuncem, nitri sexuncem, medullæ ceruinæ sextantē, aliorum nucleos xxx. præpara & utere, præsertim ad fistulas: humorem enim attrahit, quem quotidie crebro detergere oportet. Hoc solū citra alterius opem extrahit, incarnat, & cicatricem inducit. Aliud Orisibij, ad pustulas, intertrigines, ambusta ab igne, perñiones non exulceratos, ad bullas nondum apertas, ad cutis tibiæ excoitationem, ad ulcera antiqua, & proserpentia sub cure. Recrementi plumbei trientem, aut quadrantem ad ceratū ammisceto, quod habet ceræ bessē, aut dextantem, adipis suilli recentis, olei myrti, singulorum sextantem, aut quadrantem. Quod si cicatrix inducenda est, absque adipe præparetur.

Emplastrum ē Scilla, Asclepiade.

Cap. xlv.

Hoc ad fistulas, sinus, nomas, & putredines facit. Viscerum emittens contrahit, ad fistulas angusta oscula habentes collirij ex eo formatū inditur. Si uerò lata ac ampla fuerint oscula, rosaceo dilutū adhibetur, eloro prius sinu siue fistula cum poka, aut uino mulso, iniectum, locusq; emplastro munitur, ac deligatur; hoc enim modo incarnat, ac replet fistulosa capitis ulcera. Cōuenit & nomis, si membrana non fuerit denudata. Idē sincerū ad capitis fracturas adhibetur, & ad anhelosos ac orthopnoicos amplis splenis inductum pectori imponitur; cōuenitq; omnino ubi ad superficem materias attrahere uolumus. Scillæ repurgatæ quincuncē, squamæ æris, irisdis, singulorū quadrantē, myrrhæ drach. x viii. ammoniaci thymiamatis drach. xi. galbani, picis liquidæ, styracis, æruginis, resinæ pinus siccæ, aristolochiæ, singul. sexuncem, ceræ unc. x. terebinthinæ tritæ, olei ueteris lib. ii. aceti acerrimi sextarios ix. aut quod satis est. Scillā ad solem æstiuū tundito, & aceti paulatim infillato, quantum satis ad exacte terendam. In alio autē mortario squamæ æris, & fruginem cū aceto diutissime terito, & arida trita, ac cribrata adijcitur. Postea ammoniacū, styracem, myrrham, galbanū addito, & infillato aceto simul probe cōterito, deinde liquabilia liquefacta, iride ac aristolochia inspersis, frigidato, & ad reliqua ammisceto, subigito, ac utitur. Ad fistulas quidem & ossa corrupta, colliria ex eo formata indens, uerū ad ulcera repurganda sumito medicamētū trientem, ceræ sextantē, rosacē quadrantem, & pro repurgationis

ratione aliquid de medicamēto detrahito, & cerato adijcitur, donec cicatrix inducatur, ita ut possiremur quū iā absolūda est cicatrix, medicamētū un. i. olei rosacē, aut myrti dodrātē, & cerę tritæ cōmiscas.

Emplastrum ex pompholyge, Hieræ Cappadocis.

Cap. xlvii.

Hoc ad sedandos dolores, ac inflamationes facit, præcipuē ad ulcera maligna, ac cancerata, antiquaq; ac cicatricem non recipientia. Facit & ad ambusta ab igne. Rosaceo, aut myrteo oleo dilutū cicatricem inducit, & butyro dilutū incarnat. At cum rosaceo ad omnes sedis affectiones cōmodum est. Cadmiæ bostrygidis lotæ dra. viii. pompholygis lotæ dra. vii. plumbi uisū, & lodr. drach. ix. thuris drach. iiii. cerusæ lotæ drach. ix. spumæ argenti lotæ drach. viii. ceræ albæ drach. c. terebinthinæ chæ drach. vii. olei myrti drach. c. lx. Arida trita & cribrata, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, cū uisū sextarijs iiii. terito: cæterū in uino hoc, infra scripta polentæ modo contusa, per diem ac noctem præmaduisse oportet. Iridis, melliloti, aristolochiæ, capitulorū papaueris, seminis hyoscyami albi, singulorū drach. viii. cum hoc itaq; uino excolato, metallis sicut diximus sunt conterenda, usq; ad mellis compagem, & deinde oleum myrteum adijcendum, quo illitionis spissitudo fiat. Postea uerò omnia in ollam nouam coniecta lento igne ad emplastri formam, & terebinthina adiecta medicamentum ab igne tollito, ac frigidato, subigito, & utitur.

Emplastrū nigrū, Essentia appellatū. Cap. xlviii.

Facit hoc ad duritias, ad articulos, & costas fractas, gæglia, strumas, & tumores dissoluit. Tibiarū ulcera chironia & fistulas curat. Facit ad morfus ferarum. Aquæ inter cutem molem delet. Clauos sanat, aculeos extrahit. Splenis, podagricis, hepaticis prodest. Spumæ argenti, cerussæ, æruginis rasæ, singulorum quadrantem, squamæ æris sextantem, thuris masculi sex tantem, & semūdā, bituminis Iudaici bessē, terebinthinæ quadrantem, ceræ flauæ, picis aridæ, singulorum lib. iiii. olei antiqui lib. i. lapidis gagatæ, lapidis asij, aluminis scissi, magnetis uisui, myrobalanorum, singulorum quadrantem. Spumam argenti, cerussam, squamam, æruginem, bitumen, & thus, omniatq; arida tundito, & in mortario aceto paulatim infillato, ad stringentiā spissitudinem terito, deinde ceram, picem, oleum, ac reliqua liquabilia liquata ammisceto, unito, ac utitur.

FINIS.

## INDEX EORVM QVAE IN

DECIMOSEXTO SERMONE AETII

CONTINENTVR.

DE uteri situ, magnitudine, ac forma. cap. i.

Que intra prægnātis uterum nascuntur. cap. ii.

De secundæ generatione. cap. iiii.

Menstruæ mulierum purgationis ratio. cap. iiii.

Note futura uirginum purgationis. caput v.

Quando semen appareat, & conce-

pitus tempus adueniat. cap. vi.

Fecundarum mulierū dinotio, Sorani. caput vii.

Quomodo cognoscantur que cōcepterunt. cap. viii.

Note foetus masculi ac femine. cap. ix.

De pica. cap. x.

De tumoribus pedum in prægnatibus. caput xi.

Cura prægnatib. adhibenda. cap. xii.

Note partus secundum naturam futurū. cap. xiii.

Parientibus facienda. cap. xiiii.

Cura circa ægrę parientes adhibenda. caput xv.

Quomodo opem ferre oportet his que non tutò concipiunt. cap. xvi.

Pestis sterilitatē inducentes. cap. xvii.

Fœtum corruptentia. cap. xviii.

Signa

- Signa futurum abortum præceden-  
tia. cap. xix.  
Quomodo abrupti fetus eiectioni opi-  
tulemur. cap. xx.  
De his quæ bimestres aut trimestres fo-  
tus abortiunt. cap. xxi.  
Paritidis difficultatis causæ. cap. xxii.  
De fetus extractione, ac exsectione.  
cap. xxiii.  
De secundæ eductione. cap. xxiiii.  
Cura post fetus exsectione. cap. xxv.  
Causæ sterilitatis, itemq; curatio in ui-  
ro, ac muliere. Notæ item conce-  
ptionis. cap. xxvi.  
Frigidioris uteri signa, ac curatio. ca-  
put xxvii.  
Calidioris uteri signa, ac curatio. cap.  
xxviii.  
Humidioris uteri curatio. cap. xxix.  
Siccioris uteri curatio. cap. xxx.  
Diuersarum affectionum, ob quas mu-  
lieres non concipiunt, curatio. cap.  
xxxi.  
Potiones, pessi, & suffitus ad conce-  
ptionem. cap. xxxii.  
De lactis defectu. cap. xxxiii.  
Ne lac in mammis coeat in grumos. ca-  
put xxxiiii.  
De coagulato in mammis lacte, & iisdē  
turgentibus ob lactis redundantiam.  
caput xxxv.  
De uitiatō lacte mammæ ledente. ca-  
put xxxvi.  
Ad mammæ inflāmatas. cap. xxxvii.  
Ad induratas mammarum inflāma-  
tiones. cap. xxxviii.  
De mammarū abscessu. cap. xxxix.  
De mammarum fistulis. cap. xl.  
De mammarum nomis. cap. xli.  
De exedentibus mammarum ulceribus.  
cap. xlii.  
De canceris mammarum. cap. xliii.  
Qui canceri curati faciles, & qui diffi-  
ciles. cap. xliiii.  
Canceri chirurgia. cap. xlv.  
Canceri curatio post amputationem, &  
insectionem. cap. xlvi.  
Cancrorum curatio citra chirurgiam.  
cap. xlvii.  
Cancrorum tumorum non ulcera-  
torum curatio. cap. xlviii.  
Canceri ulcerati curatio. cap. xlix.  
De mammis induratis. cap. l.  
De mensibus suppressis. cap. li.  
Mulieribus quæ non purgantur acci-  
dentia. cap. lii.  
Curatio earum quæ ob nimia calidita-  
tem non purgantur. cap. liii.  
Frigidæ temperaturæ ditotio, ac cura-  
tio. cap. liiii.  
Pessimenses educentes. cap. lv.  
Curatio earum quæ præpinguedine nō  
conciipiunt. cap. lvi.  
Curatio earum quæ ob plenitudinem  
non purgantur. cap. lvii.  
Curatio earum quæ ob maciem nō pur-  
gantur. cap. lviii.  
Curatio earum quæ ob uitiosos humo-  
res non purgantur. cap. lix.  
Curatio earum quibus sanguis ad na-  
res, uel sedem defertur. cap. lx.  
Curatio earum quæ ob nimium ocium  
non purgantur. cap. lxi.  
Curatio earum quæ ob aliquam uteri  
affectionem non purgantur. ca-  
put lxii.  
De mensium stillicidio. cap. lxiii.  
De nimia mensium purgatione. caput  
lxiiii.  
De fluxu muliebri. cap. lxv.  
Curatio rubri uteri fluxus. cap. lxvi.  
Albi fluxus curatio. cap. lxvii.  
De uteri strangulatione. cap. lxviii.  
Pessi ad uteri strangulationem idonei.  
caput lxix.  
Vnctiones ad uteri suffocationem. ca-  
put lxx.  
Varia auxilia ad uteri strangulatio-  
nem. cap. lxxi.  
De seminis fluxu. cap. lxxii.  
De uteri debilitate. cap. lxxiii.  
De furore uterino. cap. lxxiiii.  
De uteri resolutione. cap. lxxv.  
De uteri prolapsu. cap. lxxvi.  
De reclamatione, auersione ac recurso  
uteri. cap. lxxvii.  
De uteri inflatione. cap. lxxviii.  
De uteri hydropē. cap. lxxix.  
De mola uteri. cap. lxxx.  
De tumore uteri laxo. cap. lxxxi.  
De satyriasi. cap. lxxxii.  
De uteri inflammatione. cap. lxxxiii.  
De utero in scirrhi tumorem indurato.  
caput lxxxiiii.  
De uteri abscessu. cap. lxxxv.  
Abscessus uteri chirurgiæ. caput  
lxxxvi.  
Abscessus uteri inter intestina, & pe-  
ritonæum membranæ ruptæ cura-  
tio. cap. lxxxvii.  
De uteri exulceratione. caput  
lxxxviii.  
Vlcerum uteri carbunculorum cura-  
tio. cap. lxxxix.  
Ad sordida uteri ulcera. cap. xc.  
Ad humorem à muliebri pudendo pro-  
fluentem. cap. xc i.  
Ad utero nomas. cap. xc ii.  
Quæ ad cicatricem ducunt. caput  
xc iii.  
De canceris uteri. cap. xc iiiii.  
De uteri obturatione. cap. xc v.  
De utero non perforato. cap. xc vi.  
De hemorrhoidibus uteri. caput  
xc vii.  
De calculo uteri. cap. xc viii.  
De calculo uesciæ muliebris. caput  
xc ix.  
De hernia aquosa mulierum. cap. c.  
De hernia in inguinis mulierum. cap. ci.  
De hernia varicosa. cap. cii.  
De nymphæ sectione. cap. ciii.  
De cauda. cap. ci iii.  
De thymis, & uerrucis tum alijs, tum  
fornicarijs uteri. cap. cv.  
De condylomatibus. cap. cvi.  
De rimis, ac fissuris uteri. cap. cvii.  
De tuberculis uteri miliaribus. caput  
cviii.  
De scabris uteri pustulis. cap. cix.  
De alarum pudendi muliebris absces-  
su. cap. cx.  
Ad umbilicum prolapsum. cap. cx i.  
Ad rugas uentris, rimasq; ac nigredina-  
nes à partu exortas. cap. cx ii.  
Preparationes unguentorum, scicorum,  
moschatorum. Item conditorum, &  
œnanthariorum, ac suffumigiorum  
uaniorum. cap. cx iii.  
Olei salicæ preparatio preciosa. ca-  
put cxiiii.  
Olei siue unguenti foliati, ac spicati  
preparatio. cap. cx v.  
œnanthariorum preparationes. ca-  
put cxvi.  
Abstintati siue rodabstintati præpa-  
ratio salubris. cap. cxvii.  
Conditi purgatorii preparatio. caput  
cxviii.  
Rhodomeli preparatio. cap. cxix.  
Mustati preparatio. cap. cxx.  
Gari preparatio pro abstemijs. ca-  
put cxxi.  
Suffumigij moschati preparatio. ca-  
put cxxii.  
Morrhatio ad cadaueris conseruatio-  
nem. cap. cxxiii.  
AETII



# AETII MEDICI GRAE CI CONTRACTAE EX VE-

TERIBVS MEDICINAE, TETRA=

BIBLI SIVE QUATERNIONIS

QUARTI, SERMO QUARTVS, ET

EX ORDINE XVI.

*De conceptus, ac partus ratione, & de affectionibus muliebribus uteri praesertim & mammarum.*

*Item de unguentorum pretiosorum, & potionum, ac fuffumigiorum preparatione.*

*De uteri situ, magnitudine, ac forma.*

Cap. I.



**V**TERVS Graecis Metra, hoc est, Matrix appellatur, quod ex ipso omnia animantia, uelut à matre oriatur. Vocatur eisdem hystera, quod posterior situ sit omnibus uisceribus. Situs est enim uterus intra peritonaeum membranā, aluum, & intestina omnia circūfeca amplectentem, inter uesicā ac rectum intestinum. Atq; huic quidē fermē toti incūbit: uesicā uerō iuxta umbilicum, ubi fundū habet, ut plurimū supereminet. Iuxta partē autem ad pudendū tendentem ipsa uesica uterū excedit collo. Magnitudo eius nō in omnibus eadē est. Multo enim minor est uirgines eius quae praegnant nō est: maior autē praegnantis. Eius uerō quae nunquam praegnant fuit, longē adhuc minor uterus existit. Et iuxta aetate minimus est his quae ad uenērem experiendā tempus nondū attigerunt. Nam & aliās semper minor est his quae uenere non utuntur. Longitudo itaq; in moderatē se habēdus mulieribus, à fundo circa umbilicū, usq; ad pudēdū, est pleurūq; undecim digitorū, latitudine uerō ad utrūq; latus per cornua sua extenditur. Quantū uerō ad figurā attinet, totum quidē reliquum corpus, & maximē fundū uesicā simile est. In quantū uerō exoritur papillares ad lūbos nutrices habet ab utroq; fundū latere productos, uesicā similis nō est: appellatur autē hi exortus cornua, & primum sursum uergūt, postea deorsum tendunt, & paulatim angustiores fiunt, ut postremā partes uenis similes sint. Hae itaq; angustae cornuū partes sinuosis flexibus ad testes inferuntur, qui à lateribus uteri siti sūt, singuli ab utraq; fundū parte propē cornua: & per hos sinuosos cornuū flexus, in cōgressu uiri uterus semen à testibus attrahit. Sunt autē testes mulierū parui, neq; sicut in uiris rotundi, & oblongi, ac tenera carne praediti, sed lati, ac glandulosi, & pelliculosi. Appendet porro uterus uesicā, & intestino recto, per fibrosā quaedam interstitia. Appendet & osi sacro, per robusta quēdam ligamenta neruosa, ac musculosa. Sunt & ligamenta, ac appendices quae in ipsum uterū inferuntur, partim quidem texentia & perpelliciana ipsum uteri corpus, quorū non exigua pars sunt nerui à spinali medulla orientes. Partim uerō incrementi, ac nutrimenti ipsius uteri, itēmq; foetus graua facta, uelut sunt arteriē & uenā. A uena enim caua quae per spinā à gibba hepatis parte fertur, & ab arteria magna quae illi incumbens simul deferunt, duae uenae, & duae arteriae exoriantur, utrinque sanē uena & arteria: atq; haec quatuor uasā ad uterum delata, antequam in ipsum inferuntur, ramulos ad testes extendū, & postea in ipsum uteri corpus deferuntur, ipsūq; intertexūt, & per ea mēstruus sanguis in ues-

rū deriuatur. Sūt autē & alię uenę, ac arteriae utrinq; utero inferat, partim ad testes, partim ad ceruicē tendentes. At uerō ipsum uteri corpus ex duabus tunicis cōstat, & externa qdē neruosiore est, interna uerō uenosiore. Et externa quidē simplex & una est, interna uerō duplex, ut si excoriare uolueris, duo tibi uteri esse uidebuntur, sub una & eadē tunica siti. Cae terū collū uteri musculosum, ex dura, ac charitilaginosa carne factū est, & semper durius seipso euadit, & progressu tēporis charitilaginosum, adeo ut quae sepius pepererūt, aut ita ancilū sunt, his multū durū, ac charitilaginosum collū sit, ut gutturi sūmo simile existat. Est & in collo uteri foramē, p quod & menses deferūtur, & mulier masculi semē suscipit, exitq; per ipsum etiā foetus: incredibile enim dictū est, quātū hic meatus pro tēpore amplitudinē euariat. Nā reliquo tēpore toto specilli extremū, aut paulo crassius quiddā suscipit. Praegnatē uerō muliere ita clauditur, ut nihil suscipere possit. At ubi foetus ab utero exoluitur, dolores partus ipsum quā plurimū extendūt, & quod mirū auditu est, animal totum per ipsum trāsit. Finit autē collū, ac desinit in muliebrem sinū siue pudendū. Longitudo porro pudendī in mulieribus aetate perfectis sex sere digitorū mēsurā est. In partu tamē & cōcubitu breuius efficitur, collo nō mirū uteri se extendēte. Est & in puellari aetate pudendū delicatius, ac mollius. In ancillis uerō & his quae sepius pepererūt, callosius euadit, & charitilagini simile: ex crebro enim cōgressus aurium, & partiū exantū collisione callescit. Sed & mēsum delatione indurefcit, nō aliter quā ob plurimū, & acrem humorem influentē ulcera callosa, ac fistulosa fiūt. At uerō imminētē mēstruū tēpore, uterus crassescit, ac nitu mēstrui, aliās tenuior, ac cōractor existens. Crassior item est, in his quae sepius pepererunt. Tenuior autem in his quae nondū praegnatēs fuerunt. Idem etiā primis à conceptu diebus crassescit. Vbi uerō foetus adoleuit, ac iam pariendi tempus adest, tenuissimus euadit. Attenuatur autem uelut uesicā statu repletæ solent, crassitudine in longitudinē abeunt. Atq; haec tenus de situ, figura, ac magnitudine uteri dictū sit.

*Quae intra praegnantis uterum nascuntur.* Cap. II. Impraegnationis tempore primū Secūda utero adnascens, & totū fecū ambiens generatur. deinde aliā duae pelliculae, altera fardiminalis, à fardiminis similitudine appellata, emineñtibus foetus partibus duplicata incumbens. Altera agnina, à teneritudine uocata, quae totum fecum ambiat, ac completūtur.

*De secundae generatione.*

Cap. III. Secūda hoc modo generatur. Singula uenarū, ac arteriarū oscula, quae intra uterū pueniūt, in extremitatibus suis nodosas quasdam emineñtias haemorrhoidibus similiēs habet, quas aliqui coyledonas, hoc est, acetabula appellāt. Atq; hę in mulieribus sunt minores, quā

res, quàm quæ in uaccis, capris, ac ceruis, atq; alijs talibus animalibus reperitur. Sed & in brutis flacci- diores, ac mucosiores sunt, figura cotyledoni herbe, id est, umbilico ueneris similes. Tales igitur eminen- tiae in uteri sinu ubi mulier cœceptura est aperitur. Contingit autem hoc tempus, in incipientibus fluere menstruis purgationibus, aut desinētibz. Et quan- quā etiam reliquo toto purgationis tēpore apertæ sint, tamen nō cōcipit mulier. Nō enim potest semē in utero manere, quū influentis sanguinis multitu- dine eluatur. Quando uerō cessant mēses, & quum incipiunt, aperta sunt uasa, & purgatio lunaris neq; multa neq; coaceruatim effunditur, ut semē ob uteri asperitatem faciliē adhaereat, & ab allabentis sanguinis paucitate abundē alatur: priusquam enim fluere cœ- perint mēses, mulier non cœperit, quod & semen careat alimento, & unde adhærere possit nō habeat: leuis enim tunc uterus est ob uasorū conclusionem, ut inde semen tanquā color à leui pariete elabatur. Nā qui parietes illituri sunt, eos primū exasperant, deinde colores inducunt. Proinde semē uirī iniectū, & in utero detētum, acetabulis dextrī uel sinistrī si- nus impingitur, cōtrahitq; seipsum uterus, ac semen undiq; complectitur. Secunda itaq; generatio ab oculis in uterū apertis initium sumit, ita ut ab uno- quoq; osculo uas generetur, ab osculo arteriæ arte- ria, à uenæ osculo uena, atq; hæc uasa distinguit ac cōnectit mēbrana. Et hoc modo Secunda generatur. At uerō hæc uasa per Secūdā dispersa rursus inter se cōeunt, & in duos ueluti fipites desinūt, binasq; ue- nas ac binas arterias perscunt, quæ ad ipsum fœtū se ingerūt circa umbilicū. Nihil enim aliud est umbi- licus quàm quatuor hæc uasa, in medio sui uragum, hoc est, locū ductorē appellatū habēda. Hic uerō est principium pelliculæ fœrciminalis, perforaturq; est ad fundum uesticæ ipsius fœtus, ut per ipsum locum fœtus excurratur, & in pellicula fœrciminali colliga- tur. Tum uerō ex duabus uenis una tantū efficitur, quæ per umbilicum delata, siue pars hepatis ipsius fœtus inseritur, uenæq; caua appellatur. Et per hanc ad fœtum alimentū sanguis ab utero deriuatur. Post- quam enim hepar ipsius fœtus sanguinem allatum suscepit, in omnes corporis partes distribuit. Similit- er etiam duæ arteriæ in unam coalescunt, quæ circa uesticam firmatur, & magnæ arteriæ inseritur, quæ spinæ eiusdem fœtus adhæret. Et per hanc uitalis spi- ritus ex uteri arterijs ad fœtum distribuitur. Porro partus tempore instante, quum magnus perfectusq; infans uterum undiquaque discederet, Secunda po- infantis mole angusta efficitur, neque iam sanguis ab utero allatus alimentum sufficiens exhibet. Quæ propter concitatus infans exilit, & ambientes pelliculas dirumpit: atque ita arcana quadam ratione u- teri hostium aperitur, ac fœtus progreditur. Et hæc quidem de fœtus generatione breuiter, & quàm lu- cidissimè id fieri potuit explicauimus. At si quis di- ligētius speculari hæc uoluerit, capram aut uaccam, uel ceruam dissectare poterit, ossa pubis removendo, & cutem apertē rescedendo. Et uterū cum uicinis parti- bus unonem apertē uidēbit.

*Menstruæ mulierum purgationis ratio. Cap. IIII.*  
Circa quartumdecimū annum menses in foeminis ap- parere incipiunt, quo tēpore, & pubescunt, & mam- mæ ipsi intumescunt. Non tamen omnibus eodem tempore, eademq; mēsurā, & per totidem dies pro-

deunt. Sed pleriq; plus minus duarum heminarum mēsurā, quatuor dierum spatio, interpositis uiginti duobz diebus, aut summū triginta, singulis men- sibus deferuntur. Nec ante trigēsimū quintū, nec se- rius quàm quinquagesimo anno desinunt. Rarissim- e enim ad sexagesimū annum mēstruæ purgatio- nes perueniūt. Cidissimè uerō in pinguius corpori- bus deficiūt. Cæterū sanguinis qui profluit copia pau- latim usq; ad ætatis uigorē augetur. Deinde aliquā diu æqualitate seruās, paululum penitus crescit, aut minuitur. At ubi ad finē tendis, paulatim rursus mi- nuatur, donec in totum desinat. Vt autē ordinem ser- uent, aut excedat, & ut multitudine uel paucitate de- linquāt, in ætate situm est, ac anni tēpore, itemq; ui- ctus ratione, & peculiaribus mulierum studijs. Huc faciunt & ciborum qualitates, & morbi accidentes.

*Note futura uirginum purgationis. Cap. v.*

Virginitas futurā purgationē præfagiunt mammarū pruritus, lumborū, pectinis, & capitis dolor, bilis, aut pituitæ uomitus. Quum hæc circa decimū quar- tum annū apparuerint, Medicū coniectare oportet, quomodo purgationē mauret, & per leniores de- coctiones sanguinis delationem adiuuet.

*Quādo semē appareat, et cœceptus tēpus adueniat. vi.*

Semen quoque circa decimū quartum annum, & ple- risq; in ipso pubertatis tempore apparet: uerum ad generationem aptum efficitur, anno plerūq; de- cimo octauo, aut uigesimo. Et statim sanè ubi semen comparuerit, cōeundi desiderio flagrare incipiunt.

*Fœcundarum mulierū dinotio, Sorani. Cap. vii.*

A decimoquinto ætatis anno ferè usq; ad quadrage- simum, mulieres ad cōcipiendum idoneæ sunt, quæ neq; uiragines, neq; corporis habitu densa, aut du- ro præditæ sunt, neque contrā humectæ, ac langui- do, neque alui fluxione assiduā laborant: sed & rea- cta ratione, ac læta mente funguntur, & lumbos ha- bent latos, & uentrem amplum. Et quibus menses non impediuntur, & quæ uteri affectionibus non infestantur. Cæterum conceptura sit an non mulier, hoc modo deprehendi aiunt. Inernas partes uesti- mentis cōtectās resina sufflūt, ita ut intra pudendum uapor recipiatur. Et si quid odor per corpus ad os, & nares transeat, fœcunditatis signum iudicant: sin minus, sterilitatis. Alia itē decorticata, & lanæ in- uoluta, mulier dormiētī tempore sibi ipsi uelut pel- lum, siue tali formā subdat. Et ex odore an ad os per uenerit aut non, fœcunditatem aut sterilitatē iudicat.

*Quomodo cognoscantur quæ cœceperunt. Cap. viii.*

Mulierem conceptisse argumento primum est, si ab obstetricæ interrogata respondeat, se post concubitu- rum uirī semen non effudisse, & in ipso coitus ope- re horrorem quandam percipisse, & moderato do- lore circa pudendum, ac umbilicum uexari. Et ad hæc si pudendi sinus & os arida sint. Et uteri oscu- lum non durum, nec inflammatum, sed interius ac exterius occlusum fuerit, & aliquantulum sursum progreßum. Et si Veneris appetentia languerit, & menses cōsuetō tēpore non apparuerint. Si uenæ pe- ctoris uirere, & mammæ intumescere inceperint, & progressu tēporis lac habuerint. Si cauitates oculi- lorū subpallidæ fiant. Si nigræ maculæ in facie, & aliquibus lētigines oriātur. Si colli pars anterior ca- lidior, ceruix uerō frigidior appareat. Si circa fecun- dū mensem præter cōsuetudinem salua, aut acida ap- petat. Quibusdā etiam os nimio humore madescit, & ad

& ad agendum torpor adest, & aspectus languidus ac plane effœminatus efficitur, & color ad albedinē, ac pallorem mutatur, prægresso plerunq; rubore si fœminæ uiriliores fuerint. Circa consuetā, item purgationis menstruæ tempora aggrauantur prægnantes, & mammae intumescunt, lumbi difficulter mouentur, uesica rubens, ac ignitum lotium cum dolore excernitur, & suppressorum mensium calor si- num, ac ceruicem uteri accendit.

*Note factus masculi ac fœminæ.*

*Cap. ix.*

Hippocrates, & alij quidā maris notam esse dixerunt, si prægnans sit bene colorata, & ad motum facilis, & si dextra mamma amplior, & præsertim papilla sit. Contrā uerò pallidus color, sinistræq; mamma, ac papilla tumidior, fœmellæ inditum est. Sed & in masculi conceptu dextræ partis uasa, uenæ, ac arteriæ, magis intumescunt, præsertim sub lingua. At in fœmellæ conceptu contrarium apparet. A iunioribus papillas in fœminæ conceptu deorsum nutare, in masculi uerò sursum tendere. Sed & lac prægnantis aquæ instillatum, si fœtus fœmella sit, diuelli, ac detrahi: si uerò masculus, in superficie persistere. Certissimum uerò minime fallax masculi fœtus signum est, si prægnans dextræ manus pulsus ualidior, uelocior, maioremq; ac duriorē hābuerit: Et uice uersa in fœmella.

*De pica, Galeni.*

*Cap. x.*

Circa secundum mensem affectio quædam prægnantibus accidit, quæ a pica auricula nomen accepit. Alij tamen ab hederæ similitudine, quæ citos Græcis uocatur, hanc affectionem citam Græcis appellatam esse sentiunt, nam sicut illa uarijs plantis prout occurrunt se implicare solet, ita mulieres ex pica laborantes, uaria edulia appetunt, atq; ea contraria, quæ tum uoluptatē, tum insauitatem gustatū exhibent. Accidit autē ferē circa quadragesimum diem à conceptu. Et est stomachi languor cum nausea, & auersione ciborū, bilis ac pituitæ uomitū inducens. Cōsequitur assiduæ expulsiōnes oris, uētris morbus, ac anxietates. Atq; hæc omnia ob humoris sanguinei præsertim redundantiæ sunt, quæ enim per uteri uasa sin- gulis mēsis excerni solebat, à foetu suppressus, sursum uergit, & stomachū præcipue, uelut subiliore sensu præditū infestat: pro uarietate autē uitio si humoris, uaria ac peregrina edulia appetit, quæda sal- sa, alique acida, alique terræ, aut testas, aut extinctos carbonēs. Et sæpe usq; ad quartū mensem hæc affectio durat: in principio enim modicus sanguis ad fœtus alimoniam distribuitur. Postea uerò crescente foetu, plus alimentū attrahitur. Itaq; tum demum uitio- so humore partim per uomitum euacuato, partim ad uterū alendi fœtus gratia delato, relata acci- dentia remittunt. In quibus igitur multus sanguis col- lectus uidetur, his modicus cibus competit, & exerce- cta mulieribus cōueniētia, quæ redundatē discuti- tere possunt. Profunt & fatigationes, ac peregrina- tiones: quæ uerò citra laborem uiuere consequerūt, hæc prægnantes ægrè ferunt repentinos aut laborio- siores motus. Quarum uerò stomachus ab acri, ac- cidoue aut falso humore mordetur, hæc ad exciditum uomitum tepidam aquam commodè bibent, ut hu- mor affligēs reuomat. Abstineant autē à dulcibus obsonijs, & uinum solum, odoratum, antiquum, & subastringens bibā. Sit autē potus moderatus ne

alimenta uentriculo innatent. Confert etiam ante cibum oliuus muria conditas cum pane molli exhibere. Aut quinq; uel septē amygdalas amaras. Aut potentā succo cotoneorum, aut puniceorū malorum respersam. Aut seridem siue inuubum. Aut asparagū palustrem, aut silarum. Ex auiibus deligendæ sunt, quæ neq; pingues, neq; uirosæ sunt. Cōueniunt etiā pedes, ac rostra, & uentriculi porcorum, & herina- ceo marini recentes. Post cibum uerò uas passæ, ma- la punica, ac pira exhibeantur. Sint tamen omnia quantitate moderata. At quæ cibos auersantur, ob- soniorum uarietate, ac succunditate illecentur. His autē quæ terrā comedunt, nihil ita prodest, uelut a- mylum recens pro terra oblatum. Cæterum medica- menta cōtra picam cōmoda sunt, portulacæ cremor, & ipsa in cibo sumpta, cucumeris semē decorticatū, & ex aqua potum. Polygoni decoctū potum, simi- liter etiā anethi. Et rhei potū, ac spicē nardi cremor. Itē intubi fucus, uel ipsa herba cruda, aut cocta assiduè comesta. At si crassius est quod uomunt, & ob uiscositatem difficulter excernitur, salisamenta & ra- phanos ex aceto multo edant, omni studio adhibito, ut infestus humor citra molestiam ac consulsio- nem educatur. Forinsecus autē adhibita lāgido sto- macho cōferunt hæc, cenanthe, balaustii, rosæ, dry- ni, myrris, smyrnii coma, fœniculi semen, cū uino cataplasmatīs modo adhibita, addita etiā galla, aut cumino, aut abstinio. Palmularū item carnes uino coctas, aut maceratas, sritas pro emplastro impone- re prodest. Aut mala coronea cum posca trita, & rosa- ceo uel nardino cerato excepta, addito croco. Aut la- nam succidā, aut linteolum uino, & oleo, aut aceto & oleo, uel rosaceo, & aceto, aut nardino & uino imbuta, & stomacho adhibeto. Morfus enim, & stomachi puncturas mitigant. Præterea calidā aquā, non tamen feruidam assidue abforbere, & sensim assiduè obambulare, & præcordia molli lana integē- re, loquere ac inungere, & ante cibum infernas partes pro uiribus exercere, hæc omnia ad sanitatem asse- quendam mirifice faciunt.

*De tumoribus pedum in prægnantibus. Cap. xi.*

Pedū tumores in prægnantibus, rosaceo & aceto, & sa- le aliquando addito, perfricato. Prodest & terræ ci- mollia cum aceto illinere, aut alumē scissum cum ui- no. Bonum est, & citriorum malorū decocto pedes lauare. Et anthyllim aceto maceratum obligare, & brassicæ folia per laū disticta imponere ac obligare.

*Cura prægnantibus adhibenda. Aphasia. Cap. xii.*

Prægnates quæ recens conceperunt, à timore, tristitia, ac omni fortī mentis perturbatione asserruadæ sunt. Prohibendæ etiam gestationes in curribus, & uiro- lenta exercitia, ac spiritus detensiones, & coxendici ictus. Neque uerò permittendum est, ut graue onus eleuet, aut salter, aut duris sellis insideat. Sed nec a- cria edulia, nec flatuosa, nec clysteres acutos, nec cibi aut potus inopiam, aut superfluitatem concedemus. Sanguinis etiam effluxio, siue è naribus, siue ab hæ- morrhoidibus, aut alio quocunq; loco, prægnanti- bus periculū inducit. Quapropter alimētis utendum est moderatis, & stomacho cōmodis, leuicæ gesta- tione, leni deambulatione, molli fricatione, & lanifi- cii exercitio. At circa octauū mensem qui omnium molestissimus est, alimentū contrahendū est, & mo- tus uehementiores præscribendi. Et si alius suppressa fuerit,

fuert, ob intestini recti angustias ab utero illatas, e-  
dulia exhibeantur uteri subducendo apta, uelut est  
pisanæ succus, rumex coctus, malua, lactuca. Cæte-  
rum mensi nono relaxandi corporis gratia, balneo  
frequenter utendū est, & omni modo prospiciendū, ut  
paritura futuros partus dolores foriter ferre possit.

*Note partus secundum naturā futuri. Cap. XIII.*

Parituris pectinis, ac superioris uentris grauitas, pu-  
dendiq; ardor adest. Et uterus ad pudendū procum-  
bit, ut obstetrici facile sit per contactum tentare. Os  
quoq; uteri disparatum, ac dilatatū est, & ad tactū  
leue, ac humectum percipitur. Partu autem instante,  
superior uenter cōtrahitur, & inguina, ac pubes in-  
tumescent, & assiduā mingendi cupiditas adest. De-  
inde plurimus humor prodit, plerisque etiam san-  
guis tenuioribus secundæ uasis ruptis.

*Parientibus faciendā. Cap. XIII.*

Quæ præparare oportet, & quomodo secundū natu-  
ram parientibus cōsulendum sit, superuacuū fuerit  
scripto prodere, quā ex longo usu nō modo obste-  
trices, sed reliquæ quoq; mulieres ista sciāt. De hoc  
tamen uelut necessariō admonebimus; quod parien-  
tes spiritum detinere oportet, & ad inferiores partes  
propulsare, nō uelut imperitæ aliquæ facit in gure  
congregare. Inde enim plerisque gutturis tu-  
mor, & uasorum eius loci dilatatō contingit, quæ  
affectio penitus incurabilis existit.

*Cura circa agrē parientes adhibenda, Apsasie.*

*Cap. xv.*

Quum partus difficultas instat, & loci præclusi manēt,  
prægnans in balneum ducatur, & in calidæ sabrum  
desceat, sæpeq; perfundatur. Utaturq; infelioni-  
bus, ac illitionibus lubricitatem inducentibus. Quæ-  
le est oleum tepidū, ouorum candida tusa, malug,  
foeni greci, seminis lini decoctum. Aut cerato liqui-  
do ex oleo cyprino præparato loci, ac inguina illi-  
nātur. Sed & hirsutini nidus oleo dissolutus, & lū-  
bis iuxta spinam assulus, partum accelerat. Ferunt  
etiam ictyomalli maioris radicem lincoo illigatam  
femori uulter alligari, & similiter styracem, cortan-  
drum uiride, polygoni radicem, halcyonium, cucu-  
meris lyulæstris semen, atq; hæc omnia statim a par-  
tu amouenda esse. Cæterum si post partum secunda  
nō sequatur, uolenter ne extrahatur, sed ster nuta-  
tio excietur. & spiritus detineatur, & os, ac nares  
obturentur. Et si adhuc remanserit, extractio fiat ue-  
lut postea docebimus.

*Quomodo opem ferre oportet his quæ non tuto  
conciunt. Cap. xvi.*

Quædam mulieres etiam si concipiant, in partu tamen  
periclitantur, siue ob uteri paruitatem, ut ob id fœ-  
cem perficere non possint, siue ob colli eiusdem angu-  
stiam, siue quod tuberculi, aut tale quiddā in eius-  
dē ostio exoritur est, quod partū impedit. Atq; hæc sa-  
ne optime fecerint, si a partu omnino cauerint. At si  
cōceperint, satius est fœtū corrūpere, quā excide-  
re, quare ex ordine de corrūptibus fœtū, & de in-  
ducētibz sterilitatē agemus. Quod enim sterilitatē  
inducit, differt ab eo quod fœtū corrūpit. Illud enim  
conceptū fœti prohibet, hoc factū corrūpit & ex-  
pellit. Proinde, ut ne mulier cōcipiat, primū caueat,  
ne temporibus conceptui idoneis cum uiro cōeat, in  
cipientibus uidelicet, aut desinentibus mensibus. In  
ipso uerō concubitus tempore, quum uir semen cie-

aturus est, spiritum detineat, ne in uteri cauitatem se-  
men feratur, statimque exurgat, ac genibus innixa  
sternutamenta cieat, & pudendum probè detergeat.  
Ad prohibendum etiam conceptum os uteri cum  
melle illinere oportet, aut cum opobalsamo, aut ce-  
dria per se, uel cum cerussa. Item cum cerato myrteo  
liquido cerussa ammixta: aut alumine liquido, aut  
galbano cum uiuo. Talia enim frigida, meatus ob-  
ducunt, ac adstringunt, ante coitum os uteri clau-  
dunt, & semen in eius cauitate penetrare nō sinūt.  
Calida uerō proritantia, non solum uiri semen ab  
utero pellunt, sed reliquos etiam eius humores ar-  
trahunt, ac exagunt. Sed & ea quæ sequuntur con-  
ceptionem prohibent, ac sterilitatem inducunt.

*Pesi sterilitatem inducentes. Cap. XVII.*

Corticum pinus, rhois coriarij, singulorum æquales  
portiones cum uiuo & uinaceis expresso terito, & in  
lana ante concubitus adhibeto. Et hoc ablato post  
duas horas mulier cum uiro cōeat. Aliud. Mali-  
corij recens cum aqua triū subdito. Aliud. Ma-  
licorij partes duas, gallarum partem unam, terito,  
& glandulas paruas efformato, easq; ubi menses de-  
suerint subdito. Aliud. Gallarum drach. iij. myr-  
rhæ drach. ii. cum uiuo uelut erui grana efformato,  
& in umbra siccatō, atque ante coitum pro pesis  
subdito. Aliud. Caricarum carnes cum uiuo sub-  
actas adhibeto. Aliud. Florum mali punci sati  
ut drachm. ii. gallarum tantundem, absinthij drach.  
i. cum cedria uelut ordeī grana formato, & duobus  
diebus & sedatis mensibus subdito, totoq; die sumā-  
tur, & his amotis tādē uenere mulier utatur. Hoc  
non fallit, & longo usu cognitum est. Potio ad  
idem. Succus cyrenais ciceris magnitudine cum  
duobus uini diluti cyathis potus, cōceptum prohi-  
bet, & menses ducit. Aliud. Succū cyrenais, so-  
liorum rutæ, opopanacis, æquales portiones terito  
& cera obducto, & sabæ magnitudinē exhibeto, de-  
inde uinum dilutum propinat. Et hoc menses pro-  
lecat. Aliud. Aloës drach. i. seminis uolarum  
albarum obolos iij. myrrhæ drach. iij. piperis gra-  
na ii. Hæc in tres partes diuiditō, & tribus uicibus  
exhibeto, statim ubi menses cessarint. Quin & fabro-  
rum aqua in qua ferrum extinguitur, asiducē pota,  
maximē statim ubi menses cessarint, sterilitatem in-  
ducit. Idem facit & populū albæ drachma, ex aqua  
singulis mensibus semel pota. Aliud. Mustelæ he-  
par sinistro pedi alligetur. Aut testes eiusdē anima-  
lis circa umbilicum gestentur. Aliud. Adeps siue  
pinguedo uulvæ leonæ in uase eburneo gestetur.  
Est hoc efficacissimum. Aliud. Cerussa cum o-  
leo uelut pessus subdatur. Aliud. Florum ma-  
li punci satiui, malicorij, gallarum, succi uivæ acer-  
bæ singulorum drachmas duas, absinthij drachm. i.  
cedria excipe, & uelut ordeī grana efforma. Et mu-  
lieri quæ per biduum à uiro secubuit subde. A-  
liud. Postquā mulier à uiro secubuit, tot hederæ  
grana nigra è uiuo propinato, quot diebus fœminā  
concipere noluertis. Aliud. Hyoscyami semen  
antequā in terram exciderit, ab ipsa herba decer-  
pito, & cum lacte asinino terito, & modica myr-  
rhæ, ac hederæ nigro grano, aut corymbo ammixto,  
leporis aut muli, aut cerui corio inuolutum, gestan-  
dum exhibeto. Obseruandū est autē ne hoc amuletu  
terrā contingat: aut fabrorum aqua frigida telonæ  
S propinato

propinato: aut salicis decoctum cum melle, propter  
eximendam amaritudinē, potandum dato. Ferunt etiā  
dentem infanti elapsum, si terrā nō attigerit, in anu-  
lo à muliere efficaciter gescit. Item lumbrici lapi-  
dicinæ pro amuleto efficaciter appēdi. Aliud. Hyo-  
scyami semen cū aque pulli alentis lacte subactū, &  
ceruino corio illigatū, sinistro brachio appendito,  
& ne terram contingat cauetur. Aliud. Coriandri  
semē toto anno potū, sterilitatē inducit. Aliud. Vir  
aliquo ad stringēdi linatur, quale est alumen, ma-  
licorū, galla ex aceto trita, & ante coitū muria ab-  
luat, & non generabit. Omnia porrò medicamenta  
spleni conferentia, maxima ex parte conceptionem  
impediunt. Idem faciunt, & mulorum castratorum  
testes usi, & cum salicis decocto poti.

*Factum corruptentia, ex Apsista. Cap. xviii.*

Si mulier ad gignendum foetum inepta, per negligē-  
tiam coceperit, primū usq; ad trigessimū diem con-  
traria stāt his quæ suprā de cura prægnaūbus adbi-  
benda diximus, ita ut uehementissimis motibus ui  
iubeatur, & ut saliat, ac grauissima onera leuet. Et ut  
decoctionibus urinā, ac menses prolestantibus atq;  
aluum subducentibus assidue utatur, & acrioribus  
infusis uentrem eluat. In balneo item superiorē uena-  
trem, pubē, ac lumbos quotidie defricet, & in aquæ  
tepidæ labro diu moretur, infelsūq; pariet ex foeni  
græci, althææq;, ac artemisæ decocto, & cum oleo  
antiquo per se, uel cum rutæ succo, ac melle perfun-  
datur: & si adhuc persistit conceptus, præcordia  
& lumbos ex lupinorum farina taurino selle sub-  
acta integat, & epithemata huiusmodi imponat. Cy-  
claminī, elaterij, artemisæ, singul. drac. v. absinthij,  
grani cnidij, singul. drach. x. nitri drach. viii. radicis  
cucumeris syluestris drach. v. opopanax drac. x. lu-  
pinorum amarorū, radicis chelidonij, feminis aut ra-  
dicis uiolæ albæ, singulorum drach. vi. olei cyprini  
quantū satis est ad emplastri formā. Hoc post perfu-  
sionem cum artemisæ decocto, superiori uentri im-  
ponere oportet, deinde caricas cum nitro, aut simile  
quiddā in pudendi sinum subdere, aut cum oleo tri-  
ta illinere. Hoc autem simplex insigne est. Cupressi  
folia cocta trita, post balneum cubitum itura uentri  
imponat, & tota nocte sinat, & supina iaceat. Præ-  
stat & colliriū ex opopanax subdere, & allij corti-  
ces, ac pilos muliebres fuisse. Quod si hec nihil pro-  
fecerint, ad ualidiora auxilia pergendum erit, neque  
tamen temerē hoc faciendum est. Omnis enim foetus  
corruptio periculosa est, præsertim in muliere ro-  
busta, uerumq; duriorē, ac densiorem habente.  
Quare diligenti animaduersione opus est. Et secun-  
dus maxime, ac quartus mensis uitandus: est enim  
in utroq; naturalis quædam difficultas ac mora, &  
impares menses aptiores sunt ad aggressiōem, ac fir-  
mitatem. Vnicū itaq; terij mensis tempus deligen-  
dum est: neque enim prius, neq; posterius cōuenit.  
Mulier autem à qua foetus expellendus est, per ali-  
quot dies antea tenuissimo uictu, & assiduis bal-  
neis, ac pelsis emollientibus subditis utatur, & à ui-  
no abstineat. Deinde uena secetur, & sanguis copio-  
se deurgatur: sanguis enim à muliere prægnaēte euac-  
uatus abortū facit, inquit Hippocrates. Tum post  
biduum, aut triduum, ubi interim à cœna euomue-  
rit, foliorum mercurialis fœminæ decoctum, cum  
oleo, & garo conditum, ieiuna absorbeat. Auraga-

ricum cum aqua mulsa bibat. Aut feminis uiolæ al-  
bæ drac. i. aut artemisæ, aut dictamnī, aut gentianæ,  
aut castorij, singulorū drac. i. aut ammoniacum thy-  
mama, aut myrrham, aut lauri baccas cum aqua  
mulsa. Aut cacumina thymi, au fel tauri cōgelatum  
nucis auellanae magnitudine ex uino odorato dilu-  
tum bibat: hæc enim omnia etiam mortuos foetus  
expellunt. Atque hæc quidem conceptum foetum  
corrumpunt. si tamen non profecerint, oportet ante  
poriones, & epithemata quæ adhibentur, sternuta-  
menta ciere cum his quæ ad hoc efficacissima habentur.  
Pessus corruptum foetum. Iridis, galbani, gra-  
ni cnidij, terebinthinæ, singul. drac. i. cum sulfuro, cy-  
prino, ac rosaceo oleo æquis portionibus efformia-  
to, & mulieri prius lotæ subdito, ac per totam noc-  
tem finito. Mane uero in foeni græci, & artemisæ  
decocto sedeat, & si non successerit, idem rursus post  
balneum fiat. Alius. Seminīs uiolæ albæ, nitri, ab-  
sinthij, myrrhæ, pares poriones cum uino subactas  
in lana subdito. Alius. Foliorum rutæ, baccarum  
lauri, myrrhæ, singulorū drac. ii. cum uino subacta  
subdito. Collyrium citra molestia trimestrem foetus  
expellens. Seminīs nasturtij, feminis uiolæ al-  
bæ, myrrhæ, absinthij, singul. drach. i. cum aqua csa  
formato, & mulieri prius lotæ subdito, & interim  
pulegij decoctū bibendū dato. Aliud insigne. Ab-  
rotonium quantū uoles in aqua ad totius aquæ cō-  
sumptionē coquito, & exprimito, eumq; liquorem  
exceptū lana subdendū exhibeto. uere etiā auxilij,  
ac epithematis, quæ ad reuocandos menses describimus.  
Traditū etiā stercus columbinum suffitum foetū ex-  
pellere. Et cucumeris syluestris grana spōte ex ciden-  
tia, panno excipere antequam terrā attingant, ad illi-  
gata magnā uim habere ad foetum corrumpendum.

*Signa futurum abortum præcedentia. Cap. xix.*  
Futurum abortū aquosa primum euacuatio, deinde sa-  
niosa aut cruenta, & uelut carniū lotura præcedit.  
Vbi uerò planē exolutio aduenerit, purus sanguis,  
deinde grumi, ac demū foetus ipse formatus, aut in-  
formis egreditur, plerisq; etiā lumborum, ac coxa-  
rum grauitas adest, & superioris uentris, capitisq;  
ac oculorū dolor, stomachi morsus, extrinsecarū par-  
tū frigiditas, animi deliquiū, horror febrilis: quæ-  
dā etiā conuulsionēs retrorsum, & uelut à comitiali  
morbo habēt. Atq; hec præcipue accidūt his quæ per  
medicamentorū uolentiam abortū procurant. Nam  
in his quæ citra medicamēta abortum faciunt, præ-  
cedit, uelut Hippocrates testatur, mammarū gracili-  
tas præter rationem abortu, femorū frigiditas, &  
grauitas, etiā lumbos occupans. At uerò ex abor-  
tu minus læduntur, quæ saniores sunt, & aluum na-  
tura laxiorem, ac uerū partes humidiores habent.  
Et quæ frequenter magnos infantes sine molestia pe-  
perunt, & ætate prouectiores, paucumq; sangui-  
nem habentes, & non pingues.

*Quomodo abrupti facti eiectioni opitulemur.*

*Cap. xx.*

Si foetus abruptus fuerit, & in uteri collo detineatur,  
oleo cyprino, terebinthina ammixta totū corpus, &  
præcipue partes utero uicino perfundantur. Eodem  
etiā electio tā foetu loci assidue rigetur, & si sic nō suc-  
cedat, mulier aromatiū decocto infideat, ac sternuta-  
menta adhibeat. Et ex resina sicca, bitumine, propo-  
li, & cancri squialibus, ac galbano suffitus fiat. Hec  
& alia

& alia huiusmodi facienda sunt, si inflammatio non obstitit: nam ea præsentē, intra infessus laxandi, ac mitigandi vires habētes non continebimus. ac si foetus detineatur ex eo, quod uterus citra inflammationē conclusus est, papyrū & spongas aridas, primū tenuiores, deinde crassiores, insit peris subdemus, & extrema opopanax, uel panacis radice, cum melle, ac cerebintina trita illinemus. Porro electo foetu, si secunda non fuerit sequuta, uiolente extrahenda nō est. Sed neq; umbilicus incidendus, & secunda relinquenda est. Strangulatus enim, & certa perniciēs ex hoc consequeretur. Verū si res diutius protrahatur, umbilicus incisus foemori mulieris alligetur, & si tum studiū adhibeatur, ut secunda eximatur, quē admodum inferius de foetus exectione referemus.

De his quæ bimēstres aut trimēstres foetus abortiunt.

Cap. xxi.

Quæcūq; moderate corpus habentes, bimēstres, aut trimēstres abortus faciūt, citra manifestam causam, his accebuta siue coryledones mucro plena sunt, & non possunt prægrauitate foeti cōtinere, sed abrumpitur, inquit Hippocrates. Hæc igitur curare oportet per medicamenta pituita ducentia, totū corpus euacuādo: qui enim ante totius corporis purgationem, & ante prohibitum humorum influxum, statim à principio locos euacuare nititur, simile facit, uelut si quis perennē putei aquā exhaurire uelit, dū interim in exhaustis locis assidue riuuli scaruntur. Toto uero corpore euacuato, tandē cum his quæ pituita ducent, etiam uterū purgabimus. Quales sunt pelsi ex colocynthide præparati, qui cōtra sterilitatē ex humorum redundantia contingentem inferius describētur. Optima autē è loio purgatoria pituitam ex utero educēs, sic fit. Colocynthidem magnā supernē incidito, & seminibus eiectis, ac dimissa medulla oleum irinū infundito, & cum defecta particula colocynthide operito, & per diem, ac noctem maderescere sinito, deinde seruēt cinere coquito, ac oleū excolato, & hoc tepidum in uulua inijcito. Hoc multas steriles fecundas fecit, educta ex alto pituita, quæ conceptum impediēbat. Victus autē ratio adhibēda est calefaciens, ac siccas, moderata item exercitia, ac frictiones, & omnis perfrigeratio uitanda. At uero his quæ ob naturalē facultatis retentiā debilitatem abortum faciūt, herinacel terrestris pellis usta, ex aqua, aut uino pota, ex naturali quadā proprietate auxiliatur. Idem facit & pudendi osculo ilita. Idem potest & marinus herinaceus, ac condas uisita. Itē myrti bacca cum uino, aut oleo leniscino siue susino illiq;. Rubi quoq; ac myrti & similibus decoctis, loci uulster irrigantur. Aërites etiam lapis ciura uentrem gesserat, & prægnantes, & foetus cōseruat, nec finit uterū flaccescere. Idē facit triuidi granū intra panem repetum, sinistro brachio alligatum. Sardonius quoque lapis prodest superiori uentri appensus, do nec dolores partus instant, & tunc ablatus. Lapis itē in uulua, aut corde, aut intestinis ceruarum reperit pro amulato gesserat, est enim ad retinendos foetus efficacissimus. Idem utriusq; præditus est lapis qui trunco arboris pro cunei more impingi solet.

Pariendi difficultatis causa.

Cap. xxii.

Pariendi difficultas uarijs de causis cōtingit: aut enim eo quod puerpera animo, aut corpore, aut utrisque simul imbecilla est, aut ob uteri paruitatē, aut pro-

pter meatus angustiam. Quæcūq; autē propter ætatem staturæ breuioris sunt, hæc ferē uterū reliquis corporis partibus correspondētē habent. Potest & difficultas pariendi cōtingere: aut ob ceruicis uteri obliquitatē: aut ob carnē eidem ceruici, uel osculo eius adnatam: aut ob eiusdē loci inflammationem, uel abscessum, uel duritiā: aut quod tunica ambiētē foetū lidiorē foetus perrumpere nō potest: aut quod humor in utero collectus ante debuit tempus excretus est, & iuxta partus tēpus sine humore, ac siccū manēt loci, quādo maxime opus est hoc humore, ut qui facilem transitū foeti exhibeat: aut quod puerpera uel sicæ calculo laborat, qui dū uteri collū comprimit, difficultatē pariedi inducit: aut ob prægnatis carnositatē, siue pinguitudinē. Sed & ossa pubis nimium cōserata, pariendi difficultatē faciunt, dū in partu dilatari nō possunt: neq; enim uelut in uiris, ita in mulieribus ossa pubis alternatim cōseruntur, sed forti compula cōnectuntur. Contingit itē pariendi difficultas ob nimia lumborum cavitatē iterum comprimētē: aut ob excrementorū copiā, in intestino recto, aut uesica detentā. Aliquæ etiā prouecta ætate debilitate ægrē pariunt. Aliæ quod primū parere incipiunt, anguntur, & propter imperitiā corpus apte præparare ignorāt, aut quod per ætatē nondū uiriles sunt, nec uires uigores adeptæ sunt, sed adhuc puellæ pueriliter agūt. Difficilis præterea fit partus, quū foetus totus, aut pars magnitudinem excellit: sæpe enim caput, uel thorax, uel uenter, plus equo aufert: aut quum debilis est foetus, & salubus, ac motibus suis matrē adiuuare nō potest: aut quū biceps est, aut tripes: aut quū gemini prodeunt, & repente uterq; simul collo uteri illabitur: aut quū foetus interiit, & parturienti nihil auxilij præberat: aut quū mortuus in utero sit, & præter naturā iacet: situs enim prodestis foetus naturalis est, ut rectā in caput, manibus ad utrumq; femur extēris prodeat. Præter naturā uero caput in dextrā, uel sinistrā uteri partem declinat: aut altera, aut utraq; manus exeritur, & crura intus inter se diducuntur. Reliquis tamē figuris minus suspecta est ea quæ in pedes cōtingit, præcipue si manibus super utroq; femore ex tensis partus. Foetus uero qui altero pede prodeunt, altero intus detēto, aut duplicat alicui uulua parti innituntur, directionē indigent, sicut & qui manus expallas habēt. Cæterū qui obliqui prodeunt, minus improbandi sunt, & hoc tripliciter cōtingere potest: aut enim in alterutro lateris, aut in uterū prodeunt. Sed uisus est in latus progredi: ita enim obstetricis manus locus datur, ut in caput, aut pedes nascentem dirigat. At qui duplicat prodeunt, in pessimā figurā illapsi sunt, maxime si in coxarū uentrebras deferatur. Tripliciter autē duplicari solent: nā uel capite & cruribus, uel uentre, uel coxarū uentrebris, osculo uteri incumbūt. uterū præstat uentrē incubere, eo enim à nobis dissecto, & interaneis exēptis, confidēte corpusculo, facilis est figuræ transmutatio. Difficilis item fit partus, si secunda, aut propter crassitudinē nō abrumpitur, aut propter tenuitatem antequam oportet diuellitur. Porro ab externis causis pariedi difficultas oboritur, uelut si anni tēpus frigidum, & hyemale meatus cōstringerit, aut calidū & æstiuū exoluerit. Hæc omnia de muliere ægrē pariete medicum periclitari ex obstetrice oportet, nec temere ad chirurgiam progredi. Neque



uerò obsterid permittendum est, ut uterum diutius dulaniet. Si ergo ob lumborū cavitatē pariendi diffi-  
cultas conigerit, puerpera in sella, prona flexis geni-  
bus collocetur, ut uulua delabens ceruicē rectā ex-  
tendat: eodē modo sistantur etiā pingues, ac carnosæ.  
si uerò proper aliquā angustiam, aut stuporē, aut  
coarctationē, opem ferre oportet laxationi per in-  
fessum calidos, & suffusiones, ita ut eū aēr domus ca-  
lescat, & per infusiones oleorum, tum actū, tum po-  
tentia calidorū, itemq; per illitiones, ac cataplasma-  
ta eiusdē generis. Adhibēda quoq; sunt laxamenta à  
balneis, si non febris, aut aliud quid prohibuerit, &  
ex gestatione leuicā in loco calidiore. Quidā etiam  
concusiones fortes in his adhibuerūt. At uerò eam  
quæ ob exolutionē imbecilla est, ad partū corrobo-  
rare oportet cōdenantibus, ac maximē cōstringen-  
tibus, & firmitatē inducētib;: qualia sunt respersio-  
nes, ac infusiones ex myrto, aut pampinis uitis, aut  
malis pūteis, aut rosis. Et odoramēta cum aceto, &  
ungēta ex uino & oleo rosaceo frigidis: si uerò pro-  
pter figurā præter naturā ipsius foetus, parius diffi-  
cultas adest, ad naturālē sitū reducendum est, quācum  
eius fieri potest. Et si pedē, aut manū protrusit, ne at-  
trahatur per membrū: magis enim impingitur, aut  
luxatur, aut etiā abruptitur. Verū per digitos hu-  
mero aut coxæ foetus ad motos, promissā pars ad cō-  
ueniētē locū introducatur. Si uerò unā cū coarctā-  
tione, totius foetus figura mala fuerit, prius ab oscu-  
lo uteri in sublimē eleuetur, & postea rursus ab oscu-  
lum rectā dirigatur, sicutq; omnia placidē, leniter,  
ac citra compressiōē, oleo absidū locis affuso: hoc  
enim ex salute cū foetus, tū parientis fuerit, & uteris  
ita quoq; illæsus manet. At si uteri osculū clausum  
permanerit, pinguibus medicamētis emolliatur, ac  
relaxetur. Quòd si uerò calculus affuerit, eum extra  
uelficæ collū per catheterē propellemus. & si uelfica  
locio plena fuerit, eodē catheteris instrumento lociū  
educemus. si uerò intestinū rectū excrementis plenū  
fuerit, per clysterē eluemus. At si ob inflāmationē,  
abscessum, ulcus, tumorē laxū, aut duriciā, aut simile  
quiddā mulier parere nequeat, singulis pro affectio-  
num ratione succurremus. Si uerò ob carnem collo-  
uteri adnatā, aut ob tunicā aliquā innatā solidiorē,  
parturiciū difficultas eueniat, uelut in nō perforatis  
mulieribus accidit, quicquid impedimētū fuerit, re-  
secetur. Et si solidior fuerit, membrāna fecū ambiē-  
s quā uel abrumpi possit, discindatur. Quibus uerò  
humor in tunicis cōtenuis ante debitū tempus efflu-  
xit, ita ut loci sint resiccati, eis albumina ouorū cum  
maluā, aut scēni græci decocto excolato, aut cū pti-  
sanæ cremore tepido infundantur. At si uteri parui-  
tas in causa fuerit, loca pinguedine aliqua inungan-  
tur, ac foueantur, & os uteri digitis dilataetur, & so-  
tus uisolēter extrahatur. Si uerò nō successerit, disse-  
cetur. Quod tum maximē faciendum est, ubi foetus  
fuerit magnus, aut mortuus. Mortuū autem cognos-  
cemus, ex eo quòd ad tactum frigidus occurrat, &  
motu caret. At si geminū, aut tergemini fuerint, ac  
collum uteri obdeserint, reliqui ad fundū uteri re-  
pellantur, & is qui magis paratus uidetur, prius  
educatur. Si uerò ob capitis, aut thoracis, aut uentris  
magnitudinē, partus difficilis fiat, omnino necessā-  
riū est foetū secare. Porro tēpus collocandi puerperā  
in sellam, est quum uteri osculo aperto, digitis ope-

currerit, ac prominuerit id quod prærumpti solet.

De foetus extrahitione, ac exfectione, Philumeni. x. xii.  
Medicū ante exectionis aggressiōē spectare oportet,  
resoluta sitne mulier aut nō. Et an seruari possit, uel  
sit deplorata. Et seruari quidem potentem aggredie-  
tur, deploratā uerò relinquet. Quæ igitur letaliter  
affectæ sunt, lethargico sopore premuntur, & reso-  
lutæ sunt, ac difficulter reuocari possunt. Et ad ma-  
ximas indamationes reuocata, debiliter responden-  
tes rursus deferuntur in soporem. Quædam etiā per  
conuulsionē contrahuntur, aut neruis tremulæ fiūt.  
Et pulsus fortiter timidus, uerum obscurus, ac de-  
bilis depræhenditur. At uerò seruandæ, nihil tale pa-  
tiuntur. Mulier itaque supina in lecto decumbat ca-  
pite declinū, eleuatis cruribus, teneaturq; utriusq; pe-  
ritis, ac robustis mulieribus. Ac primum duæ, aut  
tres buccellæ panis uino imbutæ offerantur, ad ara-  
cendum animi deliquium. Et in ipso opere assiduē  
facies uino respergatur. Chirurgus autem difficul-  
tatis causam per instrumentum pudendum diducens  
conspicitur, thymūse sit, an callosa eminentia, aut  
aliquid ex his quæ retulimus, quicquid id fuerit, uol-  
fella arreptum scalpro amputabit, uelut postea do-  
cebimus. Si uerò tunica uteri os obstruxerit, eam  
quoq; rescat, sicut inferius de non perforatis mu-  
lieribus tradimus. Si uerò pelliculæ forium ambien-  
tis soliditas obstitit, eam uolfella extirpam cultro  
aculeato incidemus, & incisam digitis dilatabimus,  
& locum idoneum ad foetus egressionē parabimus.  
At si caput foetus locum obstruxerit, in pedes uerta-  
tur, atq; ita educatur. Quòd si ita impactum fuerit,  
ut nullo modo retrudi possit, uncinus atractorius  
oculo, aut ori, aut mento infigatur, & ita infans ex-  
trahatur, hoc modo, ut instrumentum tractorium  
in dextra manu teneatur, uncinus uerò ipse digitis  
occulatur, per sinistram manum leniter cōintrodu-  
catur, & in aliquo ex dictis locis figatur, & deinde  
alterum instrumentum ex altera parte oppositum  
similiter immittatur, ac infigatur, ut æqualis, & ad  
neutram pariem declinans attractio fiat, eaq; tutior,  
ne forte unum instrumentum in attrahendo elaba-  
tur, ac foetum dimittat. Atque ita æqualiter non so-  
lum in directum, sed etiam ad obliqua trahatur, &  
digitus pinguedine aliqua illius, intra uteri os, &  
impactum corpus immittatur, & circum circa ducatur.  
Dimidio autē fecū extracto, atractorium in-  
strumentum ad superiores partes transferatur, ac in-  
figatur. At uerò si caput, uel natura, uel hydroce-  
phala affectiōe aquosa, magis timidū impactum  
fuerit, scalpro incidendum est, atque ita euacuatum,  
ac contractum extrahendum. Quòd si nec sic pro-  
derit, caluam contundere oportet, & ossa digitis  
eximere: si uerò ossa eminerint, per forcipem de-  
stariū, aut ossarium auferre, ac tum demum instru-  
mentum atractorium infigere, ac foetum extrahere.  
at si capite progresso, circa thoracem coarctatio fiat,  
itidem scalpro loci circa clauiculas dissecetur usq;  
ad uacuū, ut humore euacuato, moles thoracis con-  
sidat, si uerò nimis uenter inflatus fuerit, mortuo  
foetu, aut hydropico existente, eadem methodo uen-  
tes uētrē dissecabimus, ac infestina eximemus:  
si uerò manus protensa fuerit, ab humero refecerit:  
oportet autem linteo obuolutum, ut ne elabatur, as-  
tiquantulum extrahere, quo sic humeri articulus  
exeratur,

exeratur, & tunc diductis pudendi labijs refectionē facere, & postea sinistram manum immittere, ac caput dirigere, & ita forcum educere: idem faciendum est etiam ubi ambæ manus fuerint protensas. Similiter etiam pedes protensos reliquo corpore non consequēte, ab inguinibus rescāre oportet. At si duplicatus focus occurrerit, & dirigi nō poterit, si caput magis expositum fuerit, ossa eius conteremus quāte non dissecta, deinde alicui eius parti atra & coriū instrumentum infingemus, ac atra huius, & cruribus distrahētes educemus. Sed si crura magis exposita fuerint, coxæ articulum rescābimus, & ita coxas transgrediemur, ut caput fiat contritioni facili paratū. Si uero duplicatio pertinacior fuerit pedibus magis expositis, caput circa coarticulationē ad uertebra m amputetur, deinde transgresso thorace pedes attrahantur. Si uero reliquis partibus ablatis, caput recurres detineatur, sinistra manus oleo illita in uteri profunditatem immittatur, & caput requiratur, & per digitos ad uteri os deuoluatur, & unū, aut duo atra & coria instrumenta infingantur. Cæterum loci ad infingendū instrumentū idonei, in capite sunt oculi, auris interior, os, mēti pars inferna. In thorace axillæ, clauiculæ, præcordia, pectus, uertebra arithæ, iugula. In cruribus ossa pubis, foemineū pudendum, ac uero si osculū uteri ob inflammationē fuerit conclusum, nihil uisolenter agendū est, sed infusionibus pinguius large utendū, infusionsibusq; ac irritationibus, & cataplasmatibus, quō inflammationē aliquid tenus sedata, & osculo dilatato, focus uelut dictū est educatur. Vbi uero integrā focus sectionē fecerimus, omnes eius partes componantur, diligenterq; obseruemus ne aliqua desit, aut interius elam nobis relinquatur. Deinde Secunda protinus educatur.

De secunda educatione, Philomeni. Cap. xxiij.

Si Secunda, quæ etiam loculus appellatur, & Secunda quidem dicitur, quodā uelut secundū domicilium, ac receptaculū sit ab utero, & uelut focus indumentū. Si Secunda inquam detineatur, interdū uteri os clausum, interdum apertū reperitur, & aliquando inflammatum, aliquando citra inflammationē. Et modo uterū fundo coniuncta secunda reperitur, modo seiuncta. Si ergo os uulvæ apertū, & secunda seiuncta reperitur, circa aliquā uteri partem instat pilæ conuoluta, facillima est educitio. Sinistra enim manū calidam & pinguefactā in profundū immittere oportet, & arripitā secunda extrahere. Si uero uteri fundo coniuncta fuerit, similiter quidem manum immittimus, uterum apprehensam secundam non statim rectā attrahemus, propter prolapsus uulvæ timorem, sed sensim nulla uisolentia adhibita, primum in obliquum placidē ducemus, hac & illac obuertes. Deinde aliquando ualidius attrahemus. Sic enim obedit, & à concretionē exoluitur. At si uteri os clausum fuerit, perfusionibus pinguius utemur, & per sinistram manū digitos leniter aperire, ac paulatim dilatare conabimur. Et si non successerit, superiorē uentrē ex cruda ordeacea farina aqua calida, ac oleo subacta integere oportet, rursusq; locos perfundere, pinguiusq; fomenta adhibere. Et si uires non fuerint debiles, etiam sternutatorijs utendum est, ex castorio, ac pipere præparatis, & potuionibus mēses cietibus, de quibus postea agemus. Atq; hæc omnia prima, ac secunda die faciēda sunt. Suffusibus insuper utemur

per aromata ex ossa, qualia sunt castia, nardus, iunci odorati flos, artemisia, iris, sabina, dictamnū, pulegium, & huiusmodi, ita ut ossa selle supponatur, cui mulier insideat undiq; uestimentis coniecta. Postea uero tentabimus, & si uteri osculum apertū inuenimus, manum immittimus, & sicut dictū est, secundā educere conabimur. Si uero neq; sic educitā fuerit, perturbari non oportet: intra paucos enim dies putrefacta, & in sanem dissoluta excidet. Quandoquidē uero ob graueolentiam caput replet & obstruat, ac stomachū subuerit, odora menta alsi dūcē susceantur cōuenientia: & ad hunc usum probata sunt, cardamomum, carica, bdelliū, sabina, thus, styrax, lapis gagates, onyx aromaticus, ladanum. Eisdem quoq; castori, ac pulegij singul. drac. i. ex aqua mulsa bibenda detur. Conueniunt etiam leniora mēses ducentia, artemisia decoctū, & baccarum lauri, cum uino mulso. Pelsi etiā subditū ad hoc faciunt, myrrha & cyclaminus ungento excepta. Facit item ouis & capræ secunda arefacta, trita, & uino pota. Aut cū unguēto subdita, aut pro amuleto gestata. Alius pelsus. Carnium uuarū passurum, cumini, resinæ, teres bithinæ, spumæ nitri, singul. drac. x. excipe melle, ac subde. Idē possunt & infusions in artemisia, baccarum lauri, anethi, ac chamæmeli decoctis.

Cura post factus exsectionem, Aspasie. Cap. xxv. Postquā secunda siue statim ab educito foru, siue postea educitā fuerit, neq; quicquā superuacuum in utero relicum, crura componantur ut partes distractæ cōueniant. Et si loci satis purgatū uidebuntur, malua, aut foeni græci decoctio eluatur, & oleo calido perfundantur. Eodemq; lumbi, ac pubes perfundantur, molliq; lana oleo calido imbuta integantur. Et alimenta forbilia offerantur, & aqua potus uiuetur. At si purgationes non succederint, infusions ex foeni græci, artemisia, althææ, pulegij decoctis adhibebimus. Pulegij itē, ac foeni græci decoctū propinabimus. Si uero purgationes nimis processerint, irrigationes moderate adstringentes, ac infusions confusiles adhibeantur, & uenter lōga fascia uindictur, & cibi adstringentes offerantur. Si uero inflammatio superuenerit, inflammationi succurrendum est. Et si copiosa sanguinis eruptio, etiam ipsi medendū est, cum his quæ postea referemus. Si nihil horum acciderit, uteri collum, ac osculum, & pudendum pinguitudine aliqua inungantur, ac foueantur.

Causæ sterilitatis, itemq; curatio in uiro, ac muliere. Note item conceptionis. Cap. xxvi. Sterilitas aut uiri, aut mulieris, aut utriusque ratione contingit. Et ex uiro quidem est, quum semen eius uel seruidum, & uelut torrefactum, uel frigidum, tenue, aquosum, languidumq; fuerit, quale est decrepitorum. Vel crassius quā oportet emititur. Aut quum uiri semipadones sunt, & penem breuissimū habent, ut semen in uulvæ profunditatem eiaculari non possint. Quod etiam aliquando ob nimiam obesitatem contingit: tales enim præ nimia aqualculi mole, semen ad uteri recessus non eiacularunt. At uero mulier non concipit, si uterum habet uel calidum & igneum, uel frigidum & humidum, uel squalidū ac siccum, uel carnosum & pinguem, uel exarnem ac gracilem, aut debilem, aut angustū, aut breuem. Aut quod uasa eius clausa sunt & obstruita, aut per cicatricem inductā excæcata. Aut quod membranae

osculum uteri obturantes, nullum foramen relinquit. Aut quod uteri cervix obliqua est. Aut quod osculum nimis angustum, ut amplum. Aut quod alia aliqua affectio ex inferius recensendis uulvam impedit. Sed & inuiti coitus inanes, ac steriles sunt. Amor enim genituram condilat, & propterea foeminae amantes crebro parunt. Aetas etiam, uel iunior, uel prouectior conceptionem impedit. Quapropter primum pubescentes à uenere prohibendae sunt, ita ut uir quidem trigessimum annum, mulier uero decimum octauum attingat. maxime uero incepta mulieris forma sterilitatis occasio est: secunda enim mulier habere debet proceritatem corporis moderatam, lumbos & superiorem uentrem largos, nates eminentes, pectus angustum, mammas amplas: tales enim mulieres fecundae, his autem oppositae steriliores sunt. Potest & praeter enumeratas causas, aliqua magis recedita esse. Verum tot ferme sunt quae noscuntur. Virilitasque qui ob deprauatam uisum rationem semen corrumpunt, ad magis compositum, ac salubriorem uisum conuersi, feminis fecunditatem acquirunt. At qui alienis foeminis delectati propriis uxoris non concuunt, seruata temperantia generabunt. Qui uero seminis profluoio laborant, curati, fecundi sunt. At qui geniturus meatus occaecatos habent, uelut quidam quibus calculi exorti sunt, eos pro deploratis habebimus. Sed neque semispadones, ac nimis angustis meatibus praediti, semen excernunt. At uero ubi uir, & mulier bene se habent, neque aetas, neque corporis habitus, neque aliqua uteri affectio obstat, tali uictus ratione utemur, ut neque nimio labore, tum utrumque, tum mulierem defatigemus, neque prorsus odosos esse sinamus. Hoc enim superfluitatis corpus replet. Illud sanguinem licet, & purgationes consumit. Balneis utantur neque assiduis, neque copiosis. Cibos ac potus concoctus faciles, & quos uenter superare potest sumant. Hoc uero uelut maximū negligendum non est, ut nec uir, nec mulier pinguem habitum acquirat. Tales enim inepti sunt ad pueros gignendos: nam neque pudenda inter se adaptare possunt, & uiri parū feminis emittunt, & mulieribus menses pauci feruntur, quā maxima alimentī pars in pinguedine transeat. Ceterū quomodo pingues se gerere debeant, Sermone quarto de carnium subuersione diximus. Cōuenit & cibos, ac potus uenerē sit mulantes, ac semē generātes assumere, atque tales sunt qui calidius & inflāt. Vinū igitur aquae preferendū est. Et ex oleribus prodest hominum, eruca, & irio, ac similia. A ruta uero menta, ac calaminta penitus abstinentū est: mēta enim semen quidē multum, sed debile, ac languidū gignit: ruta uerō corrumpit. Illud autē obseruandū est, lunari purgatione appetere oportuniū sēmi concipiendū tempus esse. Tunc ergo mulieri ex uberiore alimēto aliquid detrahendū est, & cibis moderatus, attenuans, ac boni succi exhibendus. Omnibus tamen alimētis ammiscēda sunt quae purgationes irritare possunt, uelut sunt olera odorata & acris, scandix, crethmon, sceniculū, gingidū, apū, smyrniū, asparagus palustris, & similia: spes est enim probe purgata priusquā uteris refrigeretur cōceptura esse: quod si a cōcubitu cōceptionis nōg aperuerint, spes rata erit. Cōceptionis notae sunt, si uteri os clauduit, ac siccū est, & à pudēdo recedit. Imo peritiores foeminae post semē immis-

sum, uterū moueri percipiunt: mouetur enim ad generationis complexū. Quibusdā praecordia exiliunt, alijs oris uteris dolor, ac exolutio cū uoluptate quadā accidit. Est & hoc non exiguū indicium, si mulier urinae stillicidio uexatur, quod praecipue patiuntur, quae primū concipiūt, & quae mēstruas purgationes integrē nō exegerunt, quanquā idem etiam alijs usque ad septimū diem aliquatenus accidit. Post septimum autē obscura quaedā picea signa oboriuntur, acidorum, ac salorum & siderum, ueridigies, pallores, somni longiores. Eodem etiam tempore menses citra molestiam derinentur. Mas autem uehementius, ac uolucios in dextera parte magis mouetur: foemella debilius & tardius, atque in sinistra. Atque haec uisus de praeservatione dictum sit. Nunc quomodo singulae actiones conceptionem impediētes curandae sint, dicetur.

*Frigidioris uteri signa, ac curatio. Cap. xxvii.*  
Si mulier ob uteri frigiditatem nō concipit, exercitijs, omnique fomentorū genere calorē reuocet: neque incoquum fuerit castoriorū, cumini, anisum, pulegium, & alia huiusmodi bibere, & singulis pipere ammiscere. Vilius tamen hoc medicamentum purgabitur. Epithymi, euphorbij, pipēris, dauci, petroselinī, singulorum aequales portiones bibat, si autē totū drachmā hoc & aliquo ducto, & uuluum calefaciat, ut multis prius non purgatis hinc menses eruperint. Quod si purgatio per inferna nō succerit, uomitus quoque prouocetur origani, aut thymi decocto, ante & post cibum, omni studio adhibito, ut piuita euacuetur. A uomitu uero castorium & praedicta semina bibat. Vteri uerō fomēta sūt per fuisseis & uapores, arundine ollae operculo perforato inserta, ita ut uapor intra pudendū excipiat. sunt etiā per affusiones aquae calidae, in qua decocta est artemisia, salvia, ruta, cumini, pulegium, cyperus, acorū. Possunt & haec singula pectini imponi cataplasmatibus modo. Cōfert & polyarchiū epithema, & quod Amybaoni inscribitur, & reliqua huiusmodi. Pecten item, ac corax irino & amaracino, ac cyprino oleo perficitur. Et pessus ex myrrha, ruta, galbano & castorio paratus uulū subdatur. Possunt etiā aliquando ualido ora ammisceri, uelut est pipere, sal, sel bubulū. Validū est elaterium, sed minime molestum. Fia quocque ex aqua multa, aut marina per se, uel aceto, ammixto fomenta. Praedicta tamen medicamenta molli lana excepta adhibeantur, ut ne corpus mordeant, & exulcerationem faciant: neque difficile est ipsum quantitatem metiri: pro affectionū enim magnitudine, ac diuturnitate, medicamēta sunt augenda, aut minuenda, mora item longioris, aut breuioris temporis trahenda in ipsum usum. Ceterum uterorum frigiditatem ex mēstruis suppressis coniectamus. Neque enim praenimia crassitudine cōmode deferuntur. Sed & stupidus sensus circa pectinem, lumbos, ac crura percipitur. Aliquae etiā penitus crurum impotentes sunt. Quod si prorsus perfrigeratae fuerint, ne uenere quidem appetūt, & uteri osculum contractum habent. Atque haec de uteri frigiditate sufficiunt.

*Calidioris uteri signa, ac curatio. Cap. xxviii.*  
Vterorum caliditas ex reliqui corporis caliditate coniectatur, & ex mēstruis paucitate cū dolore prodeuntium, ita ut pudenda mulieris exulceret. Sed & quae prodeunt nigritia sunt, & ob nimia punctura nullū ordinem

ordinē seruant. Sequitur etiā ad hanc temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas. His itaq; cōueniunt humectantia ac frigefaciētia, qualia sunt ex oleibz quidem lactuca, malua, blitum, cucumis, cucurbita, pepo, arisplex, & portulaca. Itē alij cōsueiunt cibi. Vinum uerō tenuē est, & album, ac aquosius. Somnus autem longior, & aquarum dulcium balnea. Ad uesticā uerō, & summum uentrem ac lumbos, frigefaciētia adhibenda sunt, uelut est solanū aut umbilici ueneris succus rosaceo ammixto laudat. Idem & in pudendum commodē subditur. Mercurialis itē in lumbis ac pectini impōita, utero calidiori prodest. Spūma quoque argēi & cellula cum aqua trita. Horum autem omnū quantitatem recte metieris, si semper singula multum possē arbitraturs, perfrigerationis excessum cauēris.

*Humidioris uteri curatio. Cap. xxx.*

Quæ ob uteri humiditatem non cōcipiunt, eas siccitate dicta uti conuenit, multumq; exerceri ac fricari, & euacuatiōis ac auersionis gratia aliquando post cibum, aliquando ieiunio uomere, & moderato cibū usū resicari, & carnes assatas potius uigendum atq; tēte animalū, ac pisces duriores comedere, & uinū potius meracum quidē, sed parcius bibere. Siccā etiā fomētā crebro; balnea uerō rarō adhibenda sunt. Ceterū qui statim a principio resicantia ac adstringentia utero adhibēt, non parū lædunt; cohibita enim materia ad principales partes decurrit; utrum ubi totum corpus purgātū fuerit, tūc deinde utero adstringentia corroborantia adhibētur. Quale est lentiscī decoctum, & myrti, ac rosarum, & rubi tenerorum uirgultorum, & polygōni fœminæ decoctū; mas enim graminū magis similis est, flore puniceo, folijs rutæ similibus, semine intra folia pusillo. Poterit tamen etiā huius decoctū ieiunā cōmodē in potū dari. Ad nimia quoq; uteri humiditatē huiusmodi potiones cōueniunt. Myrti bacca, aut malicorū puncti dulces, cū uino terito ac exhibito; aut ællanas nuces istas cū uino tritas propinatō. Hoc autē epithemate utēdū est. Psylliū tritum, & palmarum carne cū aqua mulla trita exceptum apponito. Aut mala cotonea similiter palmulis excepta adhibito.

*Siccioris uteri curatio. Cap. xxx.*

Mulier quæ ob uteri siccitatem nō concipit, humidiora alimenta exhibenda sunt, & reliqua usus ratio humidior constituenda. Toto enim corpore humectato, uterus quoq; eadem qualitate partid pabiet.

*Diuersarum affectionum, ob quas mulieres non concipiunt, curatio. Cap. xxxi.*

Si propter humorum crassitudinem mulier non concipit, humorē cōsiderare oportet, & mordentem sero lactis purgare, heminis quinq; paulatim exhibitis. Cibos item boni succi offerre, & uomitū per interualla dare. Pituitosos autē & aquosos humores, lahoribus & exudationibus ac uomitibus crebris cura oportet. Quādoquidē uerō etiā status in utero existētes, cōceptionē impediunt, & status ab imperfecta cōcoctione sunt, primum quidē parciōribz exhibēdus est, deinde danda quæ status expellūt, uelut est ruta, cumini, anethū, ac reliqua familiaria semina; & pleraq; aromata, quæ etiā subdi possunt, præsertim ruta cum melle ac modico nitro. Possunt ex iisdem etiā fomētā parari, & cataplasma ac cerata, ad pubē imponēda. A leguminibus autē & eduljis

dulcibus ac flatuosis omnibus abstinendū est. Si uerō cōcūsi fuerint uteri, odoratis perfusionibus, & mollitoribus ac adipē aspersio paratis aperiēdi sunt. A mollioribus tamen infestationibus ac perfusionibus incipiēdū est, ex malua, semine lini, ac feno grecico, & oleo, & aliquādō melle paratis. Deinde ad ualidiora trāsundū, artemisiā, conyzam, calaminthā, pulegium, amara cū & chamæmelum. Atq; his adijciendū est irinum ac cyprinum oleum, ac mel, myrrha uerō troglodytica, terebinthina, nitru, calia, caricaru carnes, ugentū amaracnū, & huiusmodi subdantur. At uerō his quæ ob uteri os nimium hians non cōcipiunt, conueniunt uictus, & fomenta, ac medicamenta sicciora ac adstringentia. Talia sunt gallarum decoctum, cyrini, lentiscus, rubi radix, myrtus, & eiusmodi. Vterus uerō distorto mollitibus formentis dirigere ac corrigere oportet; fomenta enim ad hoc maximē faciunt, & pessos mollitorios subdere. Quin & specillo & digito correctio eorum faciēda est. Maximē uerō pulegiū & artemisiā decoctū, & castorium ē postea portū, utero distorto cōferunt, & tota curatio ad uteri declinationē postea referenda. At si per aliquorū pharmacorū adhibitiōē, quæ conceptionem prohibent, mulier non concipiat, eius pharmaci facultas cōsideretur, nunquid humoris attractione semen eluerit, aut statum multitudine idem eiecerit, aut per adstrictionem os uteri obturauerit, ac seminis accessum interceperit. Et deinde singulis affectionibus succurratur, perfusionibus ac infestationibus cōgruis. Hæ uerō maximē utiles fuerint, si osculum & acetabula uteri fuerint adstricta. Pinguis etiam cuncta ac fomēta adhibenda sunt, & quæ humiditates attrahere possunt. Cæterum medicamentā sterilitatē inducentia, quum uasa uteri excecēnt, incurabilem plerunq; affectionem faciunt. Et tamen non statim omnes uires adiunget; quædam enim potiones cæcitatem curabilem inducunt, cui si protinus subuenias, mederi possis. Quemadmodū enim lethalia uenena uomitu, aut clysteri, aut medicamento cōgruo exoluntur, temporis uerō progressu nullo modo corrigi possunt, sic & quæ ualidam sterilitatē inducunt, aliquando depellere datur, si statim opem feras; si uerō diutius perseverauerint, incurabilia euadunt. Porro ulcera & inflammationes uteri quomodo curare oporteat, cæ carnis excrecētias, thymosq; ac tunicas auferre, singula suis locis ex ordine dicentur. Superuacuum est enim cæ sæpe dicere. At uerō si nulla res infesta, nec in utero, nec in reliquo corpore apparente, incertum fuerit cur mulier non concipiat, asinino lacte ipsam purgabimus, dabisq; boni succi aleum, & fomentis suffusionibusq; odoratis, & pesis subditis, uteri os aperientibus, & sanguinem attrahentibus utemur, ueneremq; per duos aut tres menses prohibebimus.

*Potiones, pessi, & suffusio ad cōceptionē. Cap. xxxii.*  
Mercurialis cum castorio, item absinthium, tribus aut quatuor diebus consueto mensium tempore in potu exhibito. Est & hæc potio ad concepum efficac. Salis ammoniaci drac. ii. saluæ, cumini, sing. dra. i. omnia simul per tridui mensuris desinentibus cum uino præbero. Alia. Nigellæ, salis ammoniaci, singul. drac. i. cyperi dra. vi. simul terito, & in quatuor partes diuidito, & unam singulis diebus cū uino bibendā dato, mēstruis desinentibus, & postea cū uino

congregiatur. Sed & uirum strenuā operam nauare oportet, inierimq; à uenere abstinuisse, & boni succi cibis nutritū esse. Pesi uerò subscripti cōueniunt, p̄sertim si ex humorū mucositate infocundā fuerint, poterisq; ex his, cōgruū singulis affectiōibus medicamentum eligere. Pessus Asclepiadæ, uterū purgādo idoneus. Cyperi, nitri, aluminis falsi, myrrhæ, thuris, croci, spumę nitri, mellis, æquales portiones cum modico pipere tritas melle excipe, & pessum in de tenui linteo aut lana pura inuolutum ac rosaceo imbutum, mulieri prius cloræ subde. Vtere etiā elotione purgatoria admirāda suprā ad bimestrem aut trimestrem sc̄otum abortientes descripta, ex colocythidē & oleo irino. Alius pessus purgatorius. Succī cyclamini, medullæ colocythidis, nitri rubri, mercurialis, singul. drachm. iiii. myrrhæ drach. ii. omnia feminis lini decoctū excipe, & utere post menses purgatos uelut dictū est. Alius. Medullæ colocythidis, myrrhæ, nitri, cuminī Aethiopici, singulo. unc. i. excipe carne caricarum, & utere post menstrū purgationem. Alius. Anisi, cardamomi, nitri, aristolochiæ, pulegij, fœni græci, carnis caricarum pinguium, singul. drach. ii. arida terito & cribrato. Carnes autē caricarū passo subfigito, eisq; arida excipito, & in cornea pyxide seruat. Deinde usu experiente columbini oul magnitudine accipito, & irino oleo madefactum ad uteri osculum subdito. Huiusmodi p̄si mucosus humores educunt. Sufficiente uerò purgatione facta, infesiones adhibeantur. At uerò quoniam nō est solum quæ uterum purgant, conceptionē nonē, sed alia etiā medicamenta ad parādā fecunditatē descripta sunt, ea itidem iuxta ueterum traditiōē subiungemus. Pessus ad conceptionē idoneus. Coaguli leporis partes ii. aluminis falsi partem i. melle excipito, & pessum formato, ac uisitor ubi prius uterus per prædicta fuerit purgatus. Alius. Seminis satyrj, mellis, singulorum sexuncem in pessum efformato; aut uescam felis dorcadis aut hirci euacuato, & ex uiscoso intus reposito pessum formato, & paululū ante congressum subdito, aut penem ex eo illinito. Aut purpuram ueram hircino felle imbutam, mulieris umbilico per se præ dies imposito, & deinde crescente luna uiro congregiatur. Alius. Dorcadis, hœdi, leporis coaguli, & fel, cum sanguine & adipe agnino, & medulla ceruinā, post purgationem subdito. Nardini etiā ac rosacei olei aliquid addito. Alius, quo Asclepiades in nobilibus foeminis utebatur. Myrrhæ drach. iiii. iridis, stercoris leporis, singul. drachm. ii. cum aqua in collyria efformato, ac subdito mensibus desinentibus. Et postea cum uiro miscetur. Alius. Aluminis falsi, rhois rubri, singul. drach. ii. myrrhæ drach. i. croci obol. ii. terito, ac melle excipito. Vt uero autem postulate, medicamentū gallæ parue quantitatē accipito, & hoc molli lana exceptū ac rosaceo imbutū, post mensium destinationē subdito, & per tridui finito, donec purgatiō fuerit peracta. Tertia uerò die mulier lauet, & locis rosaceo illitis cum uiro concumbat. Alius. Leonis, aut uris, aut hyænæ, aut taurini fellis uescam euacuato, & in ipsam olei rosacei, nardini, irini, mellis, æquales portiones indito, omniaq; simul ad calidū cinerū unita seruato, ac uisitor post mēsum purgationē ante cōcubitū. Alius. Fel piscis per se uel cū melle subdaur. Aut uerbenæ

cæ rectæ succus cū butyro, desinēte lunari purgatione supponatur. Alius lenissimus. Radicis althæe purgatæ ac lotæ quadrante cōtundito, & in olei sextario torreto, Deinde abiectis radicibus, ad ipsas coturnicis sexuncem, ceræ sextātem ammisceto. Ego uerò trientem ceræ ammisceto, & similiter in pello subdo.

Amuletum naturale. Oīa quæ in corde cerui reperuntur, sinistro brachio adalligata, arcana quadā naturæ uel cōceptionem iuuare creduntur. Suffimigium ad cōceptionem efficac. Binumen, pilos leporis, rutam aridā, simul terito, & cū cera præmolliata in pastillos formato, & super stercore bubulo suffusio. Aliud obstericis, Sādara chā tritā cum eupresij ramētis, sufficiēt cera in pastillos cogito, eosq; super bubulo stercore statim post mensium purgationem quatuor diebus suffio. Aliud eludē. Caprini cornu ramēta oleo cōspersa peractis mēlibus suffio, & locis adhuc calētibus mulier cum uiro cōgreditur. Ad mares generādos. Si uir dextro pede fasciā cā dida uincto cū muliere cōeat, marem ui ferunt, generabit. Si uerò sinistro pedē colorata fasciā ligarit, fœmellam. Tradunt etiā satyrj ac leriapiadis radicē solidiorem salaces facere, & masculis generādis prodesse, flaccidiorem uerò contrarium efficere.

De lactis defectu. *Cap. xxxiii.* Hæc affectio infantibus magis quam mulieribus grauis est. Quapropter Sermone quarto ubi de pueris tractauimus, conuenientem curationem tradidimus. facit autem naturaliter lapis galactites pro amuleto adalligatus, & aqua dissolutus, ac potatus.

Nelac in mammis cōeat in grumos. *Cap. xxxiiii.* Vnelac in mammis puerperarum in grumos cōeat, ab adultis ac peritis mulieribus leniter exugatur, & mammæ cyprino oleo, cum ouo & croco illinātur. Aut fœni græci succum, aut cuminī decoctum cum medico croco oblinto. Aliud. Ceræ unc. i. portus lacæ sēsquiundā, cum oleo sesamino illine, ac utere uelut probato. Lac etiā instar casei coagulari in mammis prohibet. Cera alba in pilulis redacta, & quotidie magnitudine trium erui granorū exhibita. Cæterū Soranus mammas asidue dolentes, neq; à mulieribus, neq; ab infantibus exugari oportere affirmat, & suctione plus materiæ auarhi assilire.

Probe etiā facit uera cimolia cū aceto aut aqua, & oleo rosaceo imposita. Et cādidū marmoris aut cādidorum lapidū ramenta similiter adhibita. At si amplior fuerit plenitudo, & ob id mulier grauetur, ac doleat: lenes aqua marinā aut muria coquito, & cū decocto quidem mammas abluito, ipsas uenientes contusas imponito. Conferi item apium & mentam, & fel bubulū præsertim illinere aut imponere.

Aliud. Fucum tinctorium terito, & cerato excipito, & adhibeto, ac singulis diebus bis permutato. Sit autem fucus triens, ceræ quadrās, olei myrti dextans. Aliud. Pollinis thuris drach. x. ceræ dextātem, pumicis unc. x. olei rosacei unc. xx. utere cōdemodo. Aliud. Lapidis asij, ceræ, singulorū sextātem, olei rosacei, aut cāidi bessel, præpara ac utere bis in die permutando. Lac enim aboler, & inflammationes sedat. Quod si asius lapis defuerit, pyris succedat pro ipso. Prgstat & aqua marina aut muria asidue fouere.

De coagulato in mammis lacte, & ipsē turgentibus ob lactis redundantiam.

*Cap. xxxv.*  
Ad hæc

Ad hæc uicia in principio leniter reprimentibus utendum est, uelut est spongia pura posita imbuta, & pal mulg cum pane & posita trita, deinde uindere, ac moderate cōstringere oportet. quod si lac restinguere malueris, alumē & psyllium cum aceto & coriandri succo: aut lapidē pyriten cū rosaceo & aceto adhibeto. Ad coagulationem uerō lactis priuatim sursum in aceto coctos cum rutē decocto imposito, quē primum lac gignere incipiunt. Idem facit menta po lentæ ammixta, & iuglans cum ruta ac melle, & rici nī folia trita. & cuminum priuatim, uel cum polenta. & capita papaueris cocta cum melle, & crocus cū lacte, & muria fomentum, & apium uiride impositum, quod etiam grumos lactis dissoluit. Utendum & ceratis ad grumos descriptis.

De uitiatō lacte mammæ ledente. Cap. xxxvi.  
Lac uitiatū aliquando māmārū uafa exulcerat: quædam modū itaq; in reliquis paribus uitiatū humoris peculiare destillationes efficiunt: falsa enim lacryma oculum mordet, & acres excrementitæ superfluitates intestina erodūt. Ita & lac in mammis uitiatum, scabiem, panos, & papularum eruptiones producit. Vlcerā ergo hic enata, simili modo hīdemq; remedijs, quibus cætera totius corporis ulcera curantur. Ipsi tamē lactis uitiatōni primū succurrendū est. cuius improbos colores, subalbidū, nigricantē, flauū, subfuluū, aut uiridē, hac arte deprehēdemus. Tenuia ac cādidissima linteorū frusta eo lacte imbuta, in umbra siccabimus, & in his postea quātum lac à natuo colore discēssit, speculabimur. Ac uerō uirosū ne sit, aut aliās fortidū: ex olfactu cognoscemus, sicut sal sedine, amaritudinē, acorem, insipiditatem, gustu dignoscimus: tenuitatē uerō ac crassitiem, lubricitatē item ac lentorē ex ungue probabimus: si enim gutta eius unguī instillata non decurrat, nec uelut mel aut gluten adharebit, lac bonum esse iudicamus. Aliqui pilo probitatē lactis expeririūt. nā si pilus lacte madens suspēdatur, & lac delabatur, aut uini parū guttur lac adheret, lac reprobandū est. Si uerō totum pilum circumlūdet, optimū esse consistunt. Alij lac per coagulū concretū digitis exprimunt: deinde seri ac cae mensuras expendant. Postquā igitur cūlq; lactis uitium cognouerimus, recta uictus ratione id corrigemus, purgationesq; prorsus recusabimus, præsertim si nutrices semper eo uitio laborare nouerimus, quādiu lactauerint. Priuatim itaq; eas quæ falso humore abundant, balneis & uini diluti potione curamus. Deinde copiam lactis uino mulso, & aceto mulso reuocamus, & in cibo exhibemus lac ex alijs animalibus probatissimū, quod forma & similitudine humani lactis specie refert. Est autē omnino rectæ diætæ eō amplius innitendum, quod scimus hoc uitium solo alimēto bono non diffcultur curari posse. Neq; negligenda est hæc curandi ratio. Sæpe enim infantes eiusmodi lacte corrupti, ad ultimam perniciem deueniunt. Ad panos & scabiem mammarum, myrrham cum oleo sampsuchino tritam, uelut maximū remedium illinito. Ad cōercēdas autem uirginum ac reliquarum mammās, æruginem ferri cum oleo omphacino aut uino subactam adhibeto, aut dcutæ semen cum folijs tritum illinito.

Ad mammās inflammatas, Philumeni. Cap. xxxvii.  
Sesamum tritū butyro ammixto moderatē tepēfactū, quotidie bis imposito. At si inflammatio persequa

uerit, medullæ panis aqua madefactæ ac tritæ partes i. perdicij herbæ seorsim tustæ partem i. cerati liquidi partem unā & dimidiā simul subigito, & bis in die adhibeto. Idem etiam post eruptionē abscessus usq; ad perfectā sanitatē conuenit. Vere etiam hoc, uelut probatissimū. Foliorum hyoscyami recentū, ceræ, colophonæ, adipis porcini recens, olei, æquales portiones, liquabilia liquefacto, & folijs tritis ammisceto. Pharmacum Iuniatæ, ad omnes inflammationes, præsertim mammarum. Olei antiqui lib. iiii. ceræ quadrantē, colophonæ, adipis suilli, singulorū seculiubrā, spumæ argenti lib. i. pollinis tritici, seminis lini, cerussæ, singulorū sex uncem, thuris sesquicūciā. Aliud eiusdē. Spumæ argenti, cerussæ, singulorū sex uncem, ceræ, colophonæ, singulorum sex uncem, adipis gallinacii lib. i. pollinis ordeacei seculiunciam, succi seminis lini sextantem, olei communis trientē. Spumam argenti, cerussam, & thus cum modico succo terito, deinde cū residuo succo pollinem ordeacum subigito, & ita per duas aut tres horas finito, postea omnia ammisceto, & cerato excipito. Aliud, ad inflammationes plurimū prurientes, ac rubicundas. Cerussæ, spumæ argenti, mellis, butyri, ceræ, adipis gallinacii, singulorū sex uncem, thuris sextantem, rosacē uinc. i. Spumam argenti & cerussam cum rosaceo coquito, & reliquo liquefacta adijcito, & unitis mel addito, & ab igne amotis thus ammisceto, ac utitor. Aliud ad inflammationes, quo utor. Tenerorum solani foliorum quantum satis esse uidebitur coquito & terito, & mellis sexuncem ammisceto. Postea uerō emplastri parhygri, ceræ, singulorum sexuncem accipito, olei unc. i. omnia simul unita reliquis ammisceto, & lo copius eloto apponito. Hoc mammarum inflammationes per exudationes plurimas discutit. Vere & medicamento ex feride ad sedis affectiones præparato, & alijs huiusmodi. Facit hoc & ad ignes māmārū inflammationes. Ceræ, colophonæ, olei, sing. lib. i. foliorū papaueris comui quadrantē, liquata folijs tritis ammisceto. T radunt & leporis coagulū cum aqua tritū ac illitū, omnibus tumoribus māmārū, & affectionibus ob lactis redūdantiā obortis, prodesse. Ad profundas mammarū duricias. Spōdyliū herbā, & asphodeli radices uino coctas imponito: aut terræ intestina cū malis cononeis: aut cæcros fluuiales cum ouo adhibeto, hoc & lac extinguit.

Ad induratas mammarum inflammationes, Philumeni. Cap. xxxviii.

Semen lini, aut foenigræci, aceto mulso coctum imposito: aut sesamum illorum modicē tostum cum melle terito, & calidum apponito: aut sterus caninum album terebinthina exceptū adhibeto. Aliud optimū. Spumæ argenti lib. i. frigatorum balnei in quo uiri solum lauantur lib. iiii. colophonæ, ceræ, singulorum bēsem, squamæ æris sextantē & semunciam. Aquæ marinæ aut muria lib. i. squamam aqua marina sufficientibus diebus terito, & adiecta argenti spuma ac strigētis, ad probam cōpagem coquito, deinde cerā & colophonā liquefactas adijcto, & ablaturū ab igne medicamentum frigesfacto, manibus subigito, ac utitor, inter coquendū autē cū arūdinis radice uersaro, donec nō amplius inquitet. Facit & ad collisā, fractā, ulcerā antiquā, cōdy loma ea oleo dilutū & adhibiti. Vtere etiā emplastro dionysia,



nylia, superiori Sermone descripto, quod habet tere binthinā, mannam thuris, spumam niri, oleum anti quum, cerā, singula ponderibus istis adscriptis. Nec minus conuenit piscatorum.

De mammarum abscessu.

Cap. xxxix.

Inflammatione & duritia perseverantibus, & ad abscessum progredientibus, spe discutiendi sublata, maturantibus auxiliabimur, nos tamen mammarum inflammationes ita in pus transmutatas, per dionysiam emplastrū supra relatu frequenter disculsimus: totus enim humor ab ipso per occultos meatus transpirat, & durities euanescit. Probē facit & fuluum piscatoris, citra acetum paratū. Et nigrum Asclepiadē. Quę omnia si parum profecerint, chirurgia opus erit. Reliquę igitur mammarū partes tunc inciduntur, si putrida corpora reperiuntur, uerum locus circa papillam lunari sectione exactē incidendus est, ut perfectio nem quidem abscessus profunditas denudet, sed papilla conseruetur, in maribus quidē formę gratia, in foeminis uerō præter formam, ut ne lactandi facultas intercipiatur. Peraçta chirurgia linamentis sectioni indātur, & omni modo obseruetur, ne plaga linamentis nimium obturetur, huic enim sæpe fistula inducitur. Postea tertia die suppurationi studendum est, deinde his quę repurgare possunt, postea resiccantibus ac glutinantibus. Bene autem facit ad hæc emplastrum fuluum piscatoris, citra acetum paratū. Et fuluum Galeni, ad maligna ulcera supra præscriptum. Est autem his spongia ex uino expressa superponenda. Prodest etiam nigrum de lolio præparatū. Euacuat enim & glutinat. Magistriani ad mamma rum abscessus. Intestina terrę cum polenta terito, & imponito.

De mammarum fistulis, Leonide.

Cap. xli.

Aliquando rupto abscessu si mamma non fuerit rectē curata, fistula consequitur, & sanē fistulę istic obor tae plerumq; in carnem desinunt, rarissime ad os, nisi diutius durauerint. Has itaq; congruis primū medicamentis curare conabimur, quale est quod ex lolio præparatur. Sed & hoc emplastrum peculiariter prodest, quod & in mammarum abscessibus atq; omni tuberculorū genere, pus per occultos meatus educit, & probē incidendo abscessus discuit, & foris impositū fistulas efficacissime desiccant. papillā tamē semper ab eo medicamento adseruare oportet. Spumę argēti, olei, sing. lib. i. aquę sexuncę, ammoniac thymiamatis, pyrethri, singulorū sexuncem, resinę pinus trientem, colophonię unc. i. spumam argēti, oleum, & aquā simul ad prunas coquito, donec non amplius iniquent. Deinde ammoniacum cri bratum inspergito, eoq; soluto resinas adjecto, & ab lato ab igne pharmaco pyrethrum addito, subigito, ac emollito, & imponito, lana sicca superposita, ita ut papillam uelut diximus non contingat. At si per seuerari fistula, nucleo specilli auollatur ac incidatur, quatenus in profundum specillum fuerit pro gressum, & quicquid duri ac callosi inest amputetur. Et facta incisione emplastrum adhibeatur repurgans, deinde resiccans, & ad cicatricem perducens.

De mammarum nomis.

Cap. xlii.

Nomę mamarū per fusionibus ac cataplasmatibus curantur ad reliquas nomas descriptis. uerū ad muliebriū mammariū ac pudendorum nomas ac putredines, & alia huiusmodi facit hoc medicamentum. Rhois co

riarij lib. i. pilularum cupressi recentium tantundē, gallę ōmphacoidis sesquilibram, uini austeri libr. xx. Hęc solida per triduum macerato, deinde cum uino ad dimidias coquito, & cupressi ramo uersato. Postea ad horā quiescere finito, ac deinde excolato, & rursus ad mellis cōpagē coquito. Atq; ita paratū pharmacum in uase uirore seruato. Vsu uerō expe tentie, si extersione opus fuerit, mellis ammisceto, si uerō uim obducendi meatus augere uolueris, lac adijceto.

De exedentibus mammarum ulceribus. Cap. xliii.

Phagedænicum & exedens ulcus a cancro differt, quod circumfinitas partes non ita duras, neque uenas uaricosas habet, neque ita ad fundum perrepat. Sed & omnis phagedæna medicamentis cedit. Maligna uerō & effrata ulcera medicamentis magis exacer bantur. Ad exedentia itaq; ulcera compendiarium curam adhibere oportet, callosorum uidelicet labio rum excisionem, ita ut eadem labia ignitis cauterijs inurantur. Nam sic & sanguinis eruptionem cōtra cebimus, & tutiorem medicationem peragemus. Postea uerō medicamenta ad mammarum putrefactiones comoda adhibeantur, infra ad caneros descripta.

De cancris mammarum, Archigenis & Leonide.

Cap. xliiii.

Cancerati tumores circa mammas frequentissime generantur, & mulieres magis quam uiros inuadunt, & ex illis eas quę amplas ac carnosas mammas habent. Veteres autem ulcus canceratū, malignū ac ferum appellabant, & cancerati sanē appellatio a cancro animante transmissa est: sunt enim ea animalia aspera & dura, & si quid forcipibus suis ceperint, haud facile auelluntur. his itaq; canceratus tumor si missis est, Nam & prominet, & ad tactū renititur, & difficitur tractabilis est. Maleficum autem & ferū ulcus a feris ac malignis animalibus cognominatur. Est enim proteruum, & curadone effratum, & manuum tractatione exacerbatum. Duæ uerō sunt suprema cancrorum differentię. Quidam enim sine ulcere, quidam cum ulcere consistunt. Qui sine ulcere sunt, ab omnibus ferme ueteribus Oculi appellan tur. Philoxenus tamē cancrum oculū priuatum no minauit, qui in utero ac intestinis esset. Cancro itaq; non ulcerato in mamma existente, tumor apparere in gens, ad tactū renitens, inæqualis, instar ferę sæuis, penitissime pertinaciter insertus, radices longē lateq; extendens, & uenis circumfusus uelut illigatus, quas circa uaricosas habet, colore cinericius ad ruborem uergens, & aliquando subliuidus, & uidentibus quidem mollis apparet, tangentibus autem durissimus est, ut uisui hac parte non sit credendum: do lorem autem inducit pungentem late se extendentē, ut sæpe per cōsensum glandularū malignas inflama tiones sub alis excitet. Pertingunt etiam dolores usq; ad clauiculā & scapulas. At uerō exulceratus cancer assidue erodit, & ubi ad profundum perfodit, nec si sit potest, & saniem emittit omni ferarū ueneno detiorem, copia & odore abominabilem. Ad sunt & huic dolores pungentes. Atque hic præcipue medicamentis ac manuum tractatione exacer batur.

Qui cæci curatu faciles, & qui difficiles. Cap. xliiii.

Cæcos in pectore abortos oino deploratos esse scito, quemad-

quemadmodum & eos qui in capite, collo, humeris, sub alis, & in inguinibus generantur: sunt enim & hi incurabiles. Nam præterquam quoddam perfectè tolli non possunt, sanguinis eruptionis timor incutitur, ne ex ea æger inter manus pereat. Eos uero qui papillæ summmitatem occupant, affectu partis amputatione facile curaueris.

*Canceri chirurgia, Leonida.*

*Cap. XLV.*

Ego quidem in cæcis in pectore obortis chirurgia ut soleo, quæ sic fit. Aegram supinam decumbere facio. Deinde supra cancerum partem mammæ sanam incido, & incisam cauterijs inuro, donec crusta inducta sanguinis eruptio sistatur. Mox iterum incido & profundum mammæ dissecō, ac rursus partes incisas uro, sæpeq; idem repeto, & secans, & sistendi sanguinis gratia inurens. Ita enim sanguinis eruptionis periculum euitatur: post amputationem uero integrè peractam, rursus partes omnes ad ressecationem usq; inuro: et primæ quidē inuisiones sistendi sanguinis grata sunt. Postremæ uero ad omnes morbi reliquias abolendas. Sæpe uero etiam circa inuisionem opus perfeci, ubi induratus tumor canceri generationem minas in mamma fuit: ita enim affectioni amputatio usq; ad sanam partem sufficit, quum nullum hic periculum eruptionis sanguinis imminet.

*Canceri curatio post amputationem, et inuisionem.*

*Cap. XLVI.*

Post amputationem si inuistio facta non est, linamenta ulceri indemus, deinde suppurationi studebimus, & deinceps ad reliquā curationē ressecatoriam progrediemur. Si uero post chirurgiam locos inuissimus, aliquādo solo cataplasmate ex plantagine, aut polygono, aut sesamo trito utimur. Aliquādo etiā panis medullam alicui ex prædictis ammiscemus, & supra cataplasma linteum aqua madesfactum adhibemus. Circa dolorē uero crustas aufert lac mellis ammixturæ ac illitū. Continendæ autē sunt ægrotæ in domo calida, omnis enim frigiditas ipsis infesta est, præcipue quo tempore ulcera repurgantur: tunc enim maxime conuulsionis periculi imminet. Secunda uero aut tertia die ex oluto medicamēto, tepida aqua locū perfundimus, & lenticula coctā cum modico melle imponimus: mellis enim uim exacerbantī formidamus, deinde folijs uitæ aut lactuce foris impositis, deligamentū adhibemus. Neque ab horū usu discedimus, donec crustę excederint, postea linamēta indimus, atq; in his tum acria, tum pinguia medicamēta uitamus. Vtraque enim malum renouant. Quapropter soleo muliebri aut asinino lacti rosaceū ammiscere, & ex eo madesfacta linamenta indere, & pro linamenti conseruatione linteum lene ac simplex eodem lacte imbutum forissecus obligare. Nam plurimum linteorum onus graue est in hac affectione. Et suppurationis quidem tempore rosarum amplius sitidum uero repurgamus, lac excellere debet. Quodd si res urgeat, mellilotum cum rosaceo & aqua aut lacte muliebri cataplasmati exterius adhibebō ammiscatur. Cerata enim & nimis elaborata cataplasmata, huiusmodi affectionibus sunt aduersa. At si arido aliquo opus fuerit, spodium pompholygis probè lotum ac siccatur, aut cadmiæ ter uitam & rosaceo extincta, & postea probè lotam ac ressecatam inspergit. Toto uero curationis tempore à uino & cibis ægrè concoctilibus, & frigide potu abstinendum est. At

dū ulcus ad cicatricem ducitur, diligenter studebimus ut totius corporis firmus reddatur habitus, & ut bono succo impleatur, id quod bonis alimentis, exercitijs, gestationibus, ac reliquis eiusmodi corpus reficiendis, facere oportet.

*Cancerum curatio circa chirurgiam.*

*Cap. XLVII.*

Primum, uelut sæpe diximus, ante cuiusque maligni ulceris curationē, totū corpus curare oportet, deinde loca auxilia adhibere. Alius itaq; cōueniētiū alimētis, & aloē uel picra ex aloē præparato pharmaco soluat, & quæ uenenis resistūt asiduè exhibetur, uelut est theriaca, mithridatū cum antidotum, & quod ex sanguinibus constat. Ex simplicioribus autem anferis aut anatis recens iugulata sanguis calidus in potu detur. Aut trifolij bitumen olentis co-chleare. Aut 11. cum aquæ cyathis 11. aut seminis rutæ unc. 1. aut pulegijs ueteris drachmam 1. cum maluæ decocto. Prodest etiam cancerorum fluuiatilium decoctum cum lacte asinino per dies quinque exhibitum, ita ut per totidem dies etiam ipsi canceri comedantur: talis enim peridus septeno circuitu peracta, mammarum cancores placidissimos efficit, ut deinceps per simplicium epithematū usum pristina sanitas restituitur.

*Canceratorum tumorum non ulceratorum curatio.*

*Cap. XLVIII.*

Tumoribus canceratis non ulceratis panem cum modico symphyto imponito, exigua quantitate, ut ne grauet. In exacerbationibus autē rosas, mellilotum, semen papaueris, omnia cum passo paululū trita coquito, & cū utellis ouorum subacta imponito: aut althææ folia cocta per se, uel panis ammixta imponito. Est & hoc in exacerbationibus efficax, plantaginis, capiti papaueris unā cū seminibus, psyllijs: aquales portiones accipito, & reliqua quidē terito ac cribrato. Psyllium uero passo cretico maceratum, cum palmulis pinguibus subactum, aridus ammisceto, & parum adipsi asinerini adijcto. Hoc medicamentū se curē adhibetur calefactum. Si uero frigidum potius malum posulauerit, omnia prædicta palmularum carne & modico pane madesfacto excipito, ac frigidam imponito. Prodest & irionis semen cum oesypo & aqua mulla calidum impostum. Fraxini siem arboris folia mollia, aqua cocta, & trita, per se calidam imposta, malignorum ulcerū dolores mitigant, & asiduum ipsorum usus mirifice ipsa discutiet. Ego uero eorūdem foliorū decocto huiusmodi locos fo uere soleo. Arbor ipsa sterilis est, & ad materiā idonea. Postea uero cataplasma è plantagine rursus imponatur. Item Icesij emplastrum, aut nigri panacea in scriptum, ad contactū mollissimum, aut aliud quoddam huiusmodi adhibeatur, nisi obstitit ulcus.

*Cancerulcerati curatio.*

*Cap. XLIX.*

Vlceratis canceris lenissima epithemata imponantur, quorum uelut fundamentum, inquit Archigenes, hoc est: Spumæ argenti, adipis porcini recentis, cere alba, sing. lib. 1. olei bunc. xvi. utellos ouorum assatorum xii. Spumam argenti cum pauca terito, deinde olei parum affundito, & utellos ammisceto. Adipem uero exemptis in mortario terito, & cum cera liquefacto ac excolato. Et his frigate factis residuum olei paulatim affundito, & omnia simul in mortario probè subigito, postremumq; reliqua trita ammisceto. Hoc medicamentum uis tempore rosaceo dissoluit,

dissoluit, & molli lana excepto, pro linamento uti-  
tor. Et si dolor aberit ab ulcere, etiā iris, myrrhae,  
aristolochiae, singul. drach. i. i. i. adjicito. Idem etiam  
non ulceratis canceris adhibuit utile comperies.

Aliud, ulceratis canceris blandē hoc medetur, &  
non ulceratis egregiē mitigat. Ceruē tyrrhenicē, re-  
rebintinā, adipis taurini, medullā ceruē, aut utiulī  
recentis, olei cici nī, & rosacei recentis, adipis anserini  
recentis, mellis optimi, thuris, diphrygi, singulo-  
rum partem unam, cōsypti triplum. Sine thure tamē  
mitius est, & ulceribus commodius. Verum cū thure  
magis discit ac maturat, & non ulceratis magis  
eocommodat. Et si absque thure praeprabitis, diphry-  
ges cum uino teres. Si cum thure, utrunque diphry-  
ges tidelicet ac thus aridum, liquidis reliquis ad-  
ijciēs, & deinde addito melle secū adhibebis.

Aliud Theodori ad maligna. Spodij cyprij loti &  
resiccati, plumbi usti & loti, succi rosarum, singulo-  
rum drachmas quatuor, praepra & utere cum rosa  
ceo. Hoc quidē magis mitigatorium est. At si uerō  
multa & depascens putrefactio fuerit, ultra quā  
credas efficacē est hoc ad totum malum extirpandū.  
Rhois corarij sextariis duodecim, pilularum cu-  
presis libram unam, gallarum omphacitidum, cal-  
siae, singulorum sexuncem. Omnia simul confusa in  
uini Adriani, id est, adstringentis, odorati & amiqui  
sextariis uiginti, per tridū macerato, & deinde ad  
tertas coquito, ac cupressi spatula uersato. Postea  
que omnibus probē expressis ac reiectis, succū rursus  
ad mellis compagem coquito, ac uitreo uase ser-  
uato. Hoc medicamento ad nomas sincero utendum  
est, modico uino aliquādo addito, si crassius uisum  
fuerit; uerum si affectio in muliebri pudendo fuerit,  
exacte diluendum est. Sed & asinus aut muliebri la-  
cte dilutum, mitigatorium est; & reliquis item nomas  
circa inflammationē curat. Aures diu puru-  
lentas, gingiuasque madore flaccidas resecat. Ulcera  
turanū diffilia, & aegrē cicatricem admittentia sa-  
nat, si moderatē adhibeatur, ac pro ratione diluatur:  
quomodo enim ipsi mita resisterint, cui fera & agre-  
stia cedunt. Ceterum hoc animaduersione dignum  
est, ut ne ulcera ad cicatricem perdantur, priusquā  
omnis duritia fuerit resoluta, modo linamentis matu-  
rantibus, modō splenis adhibitis, quale est Icesij me-  
lium, aut Serapionis, aut panaceae. Ego uerō dedi-  
nationis tempore saepe usus sum theriaca, lacte & ro-  
saceo diluta, & in molli lana ulcri indita. Eandem  
etiā ex panno bibendam praebeo. Ad huiusmodi  
enim affectiōes efficacissima est, sicut quoque reliqua  
antidota ad reptilium ictus, & uenenosas poriones  
parata, his itaque cōsideratē utere, ac trisores contem-  
ne, qui mali naturam minimē intelligunt.

De mammis induratis, Leonida.

Cap. I.

In alijs eequidem corporis partibus prius ostendimus,  
induratum tumorem sine dolore esse. At in mam-  
mis non ex affectionis natura, sed detractae papillae  
grauitate dolore inducit. Si itaque tota mamma  
indurata fuerit, atque ita scirrhi tumor induratus  
thoracē annexus, ut circa periculum a sanis partibus  
amputari non possit, chirurgiam nequaquam atten-  
tabimus. Si uerō summitas mammae solum indura-  
ta fuerit, aut ultra dimidium affectio non occupauit,  
summitas amputanda est circa affectionē; neque enim  
in scirrhi tumore indurato, uelut in cancro, sangui-

niseruptionem uereri oportet. Post amputationem  
uerō linamenta indemus, & reliquam ulcerum cura-  
tionem adhibebimus.

De mensibus suppressis, Rufi & Aspasie. Cap. LI.  
Mulieres aliquas mensitrua purgatione omnino care-  
re, uel naturale est, uel praeter naturam. Naturale est,  
si mulier nulla inde molestia uel iocis corporis, uel  
uteri afficitur. Proinde quantum ad aetatem attinet,  
infra decimum quartum annum, aut ultra quinquā-  
gesimum purgationes mensitruae non sunt. Sed &  
steriles, & praegnantēs, cantrices item ac salatrices  
naturaliter non purgantur. Quicquid enim in eis su-  
perfluum est, nimia exercitij uehementia consumit.  
Et in summa: Mulieres calidioris tēperature, & for-  
tibus exercitijs uentēs, & agrestes, parum purgan-  
tur. Quādo igitur mulier plus iusto calida fuerit, si-  
ue ob naturalem tēperaturam, siue ob exercitiorū  
excessum, mensitruis purgationibus carebit. Ex mul-  
to enim calore corpora sicca euadunt, & calida tē-  
peratura cibos optimē cōcoquens, nihil superflui in  
toto corpore relinquit. Est autem talis mulier omni-  
no uirilīs, coloris fuscus, corporis probē compacti,  
neruis robustis, uenosa, lumbos & nates ampliores  
habens, pectore ac humeris latioribus, mammis soli-  
dis, uoce graui, fortior item ac hisidior. Talis enim  
aut omnino non, aut modicē purgatur. Aliquando  
uerō etiā menses uel ob nimiam pinguedinem, uel  
ob gracilitatē suppressi solent. Pingues enim magis  
exangues reliquis sunt, minimasque uenulas habent,  
& sanguis qui in ipsis est paucissimus, ferē in pin-  
guedinē transit. Atque huius rei ex eo iudicium est,  
quod tales minimē omnium cōcipiunt. Et si ali-  
quando conceperint, foetus graciles ac ualde imbecil-  
les pariūt. Quomodo ergo purgabuntur, neque  
sanguinem, neque uenas amplas habent? At uerō  
graciliores ob diuturnam aliquam egritudinem at-  
tenuatae, nihil penitus superflui sanguinis habent. Si-  
stunt praeterea menses eis quibus sanguis crassus aut  
uiscosus est, & quibus ad alios locos deferitur, uelut  
per nares aut sedē. Quin & ex thorace sanguinē reie-  
ctantibus, & quibus ex uenae sectione multus san-  
guis euacuatus est, menses supprimuntur. Sed & re-  
liqua excretionum genera saepe faciunt ut menses  
intercipiantur. Velut est multus sudor, assidui uomitus,  
alui profluuiū, saniei copia alicubi prodicens, pus-  
tularum omne genus per cutem erumpens. Sistunt  
item menses morbi acuti ac magni, & alimenta uel  
infra uel supra modum ingesta: modicum enim ali-  
mentum solum transpirat: multum uerō menses ob-  
turat, & excretionem intercipit. Ad hos itaque sco-  
pos etiā curandi ratio dīgerēda est. Quae enim ob  
plenitudinem non purgantur, uenae sectione curan-  
tur. Cibi porro crassi ac pituitosi purgationibus  
aduersantur, uerum acres sanguinem fluidum effi-  
ciunt. Quapropter una crassa & noua, aquas frigi-  
das & crudas, labores nimios, ocium item sublestitū  
uitare oportet. Atque haec uictus ratio ad totum cor-  
pus pertinet. Quantum uero ad ipsum uterum, con-  
clusiones, ceruicis eiusdem distortionēs, durities, in-  
flammationes, mades, resolutiones, perfrigeratio-  
nes, distentiones, atque aliae huiusmodi affectiones cō-  
siderandae sunt. Et insuper attendendum, an aliquid  
uteri ob obstruens, sanguinis exitum impediatur. Cal-  
lositates enim istae exorta, aut carnis excrecentiae,  
aut pin-

aut pinguedinis copia, sæpe purgationē prohibent. Aliquisbus etiā statim à principio pellicula quedam circa collum aut osculū uterī adnascitur, quæmadmodū his accidit, quæ imperforatæ appellantur. Et tales curari non possunt, nisi pellicula illa locum obturans perforetur, aut rescetur. Aliquisbus etiā ulcerū cicatrices, oscula uasorū in utero excecant, quæ penitus incurabiles sunt. Quibusdam post abortum uterū exulceratur, ac deinceps ad cicatricē perducitur, atq; sic obturatio superuenit, quæ tum alias uulvæ transpirationes impedit, tum sanguinis excretionem prohibet. Quin & curæ assiduæ, & immodicus timor, ac moror ingens, menses supprimit.

*Mulieribus quæ nō purgantur accidentia. Cap. LII.*

Mulieribus quæ non purgantur cōsuetō more, sanguinis refectionis ac syderationis periculū imminet. Nam suppressis mensibus molestia accidentia consequuntur. Totius corporis grauitas, nausæ, fastidia, horridi quidā discursus uelut in his quæ cōceperunt. Non tamen ita sicut his quæ conceperunt uterī osculum clauditur: illis enim occlusio adest cum quadam duritia. Dolores insuper circa lumbos, scœmora, colulum, sindput, & oculorum radices adfunt. Febres itē assidue cōcomitantur, & urinæ nigrae sunt cum rubicundo quodā seroso ac sanioso humore. Difficultatē item ac stitilicidium urinæ patiuntur. Et quædam in melancholicum atræ bilis morbum, aut insaniam delabuntur. Cutis superficiem dolens, & inflammationes ac ignes sacros diuersimodē sustinent.

*Curatio earum quæ ob nimiam caliditatem non purgantur. Cap. LIII.*

Præstaret equidem ad integram sanitatis conseruationē, uisus rationē præscribere, à qua mulieris corpus ita rescicaretur, ut mensura purgatione non haberet opus. Verum hoc conceptioni penitus aduersatur. Non enim concipiunt quæ non purgantur. Proinde cōceptus gratia, & eò quod omnes ferè mulieres temere uisitant, purgationes sunt necessariæ. Et propterea curationē conscribere cōuenit, per quam menses suppressi euocantur. calidiores itaq; mulieres & quæ plurimum exercētur, quàm maximè humectare oportet, aquarū dulciū balneis, uberiore humidiorēq; cibo ac potu, quales sunt piscinæ ac alicę fontiones, & quæ ex lacte præparantur. Et ex oleribus lactuca, cucurbita, & eiusmodi. E' carnibus agni, hoc di, ac porcelli recentes, dicursus præferunt & foemelæ. E' piscibus qui teneras carnes habent. Ex auiibus teneriores. Ex fructibus ficus recentes, uuæ maturæ, pepones, cucumeres. E' potibus uinum tenue, albu, dilutum, non uetus.

*Frigidæ temperaturæ dinotio ac curatio.*

*Cap. LIIII.*

Frigidioris temperaturæ scœminas, tum ex his quæ dicta sunt cognoscemus, tum quod somnolentiores & ad motum pigriores sunt, & coloris albi siue plumbei, uenis subnigris, urina aquosa, pisiuitam etiā assidue excreant, & aliquando pituitosos humores euomunt. Harum itaq; curationem oppositā esse oportet ei, quam ad calidiores retulimus. Plurimam enim labores imperabimus, & edulia calidiora exhibebimus. Vinum item solum, odoratum, uetus, ac minime dulce. Confert etiā uinū aqua marina dilutum. Medicamenta uerò eligenda sunt, quæ calorem suo sanguinē dissoluant. Velut est thymī, pulegij,

calaminthes, dictamnī, abrotoni, iridis, radicū asphodeli, cordum radicis mori, mercurialis, calicæ, carpesij, floris iundi odorati, spicæ nardi ac celticæ, acori, mei, phu, fabinæ, asari, ac similitum decoctum. Hæc enim singula in uino albo ueteri coquuntur, & uinū ipsum merum excolatū calidum à balneo ieiunæ bibendum datur. Atq; ita menses cidentur his quæ frigidam temperaturam habent. Probe facit & succus cyrenaisicus erui quantitate potus. Aut opopanax unc. 1. Aut sagapeni tantundem. Aut myrrha magnitudine fabæ. Aut castorij dracm. 1. Aut nigella pota, & sublita. Idem possunt etiā seminum nobis familiarium decocta, uelut cumini, feniculi, petroselinī, laueris, daudi, ammij, cicero. Est & hoc efficacissimū atq; acerrimum. Pulegij, artemisiæ, rutæ, saluie, anethi, singulorum manipulum unum, piperis grana uiginī, aquæ sextarios duos, piper contusum & herbis ammixtū per noctem aqua maceratur. Mane uerò ad dimidias coquitur, & ad excolatū mellis quantū satis est adijcitur, indeq; cyathi duo ieiunæ exhibentur. Ipsa uerò sensim inambulare iubeatur, & leuistica gesterur. Tempora autem ad talia medicamenta accipienda commoda sunt: alterum appropinquante iam purgationis tempore: alterum ut post unctiōnem fomentaculi ac balneum statim bibat, ita ut in calidum adhuc & solutum corpus illabens medicamentū, uires suas efficacius declaret. At uerò si quis omnia auxilia in hunc usum commoda recensere uelit, ei multo otio opus fuerit. Sufficere tamē possunt relata. Si uerò nullum ex his menses euocauerit, alius modus potentior exquiretur. Ego etenim cum hæc medicamenta frustra adhibuissim, mulierem solutuum pharmacum bibere iussi, atq; ea accepto euphorbio cum petroselino, per alium purgata, & deinde menstruorum excretio successit. Quod si redundans humor atræ bilis magis fuerit, epithymi drachm. v. exhibito, cum aceti mulsi diluti hemina, pauco sale adiecto. Fece enim sanguinis educta, pars subtilior deinceps facilius sequetur. Plersiq; etiā uomitus profuit. Vomit autem accepto prius thymi aut origani, aut hyssopi decocto. Deinde post uomitum cœturiū aut absinthij cremorē potant. Quin & pesis subdititius uterus irritandus est, ut per uicū quidē, sanguis calidus ac tenuis reddatur: per pessos uerò, exalesit prouocetur. Fortiores tamen euitabimus, quales sunt qui ex elaterio, cātharidibus, cydamino, felle bubulo, & uerato sunt. Periculū enim est, ne ex eiusmodi medicamentorum uehementia, inflammationes, ulcera, ac febres exoriantur.

*Pesis menses educentes.*

*Cap. LV.*

Mitiora proinde in pesis adhibere oportet, uelut est ruta, bacce lauri, artemisiæ, conyzæ tenuia folia habens, pulegium, mercurialis. Hæc singula cum oleo trino subdantur. Quod si ualidioribus opus erit, myrrhæ drachmam unā, aluminis fissilis drachmas duas, cum uino terito, & rosaceo ammixto subdito. Aut terebinthinam cum myrrha, melle, & croco efformato. Hoc autem ualidius est, peledini semen cum myrrha & melle. Aut bdellium, uel galbanum, uel styracem, cum absinthio & lupinorum decocto. Aut caricæ pingues granulis exemptis, cum thure & nitro, singulis fabæ magnitudine subdito.

Vterus item calido quodā oleo siue ungento perfundatur, uelut est fusinum, cyprinum, irinum, sam-

T

psuchinum,

psichinum, laurinum, amaracinū, narcissinum. Asidui etiam suffitus per styracem, galbanum, ac thus fiant. Probe facit etiam lapis gagates. Suffumigium probatissimum. Radicis aristolochiae, radicis asphodeli, resinae siccae, sandarachae, atractylidis agrestis, stercoris uulturnis, bdellij, sabinæ, cardamomi, artemisij, singulorum drach. unam, olisum piscium salis forum minutissime tritorum drachmas tres, nigelle, styracis, singulorum drachmas quatuor, pastillos cum aqua formato, & usus tempore super bubulo stercore, bis in die, mane ac uesperis suffuso. Præcipue uero odoratis fomentis uterum fouebimus, amaraco uidelicet, serpillio, pulegio, calamintis, cypero, iride, chamæmelo, costo, aniso, ac similibus in aqua coctis. Sic autem fomenti usus talis. Olla operculo perforato operatur, arundine quæ foraminis inferatur, & undique oblinatur. Et mulier sedes excepta intra pendendum arundine forum admittat. Alius uero fomentis modus est, ut mulier in aliquo ex relatis decocto usque ad umbilicum insideat, & deinde calida aqua dulci ablatur, & postea pellos prædictos subdat. Pellos optimus menses educens. Carpopalsami, caryophyllorum, olei amaracini aut fusini, singulorum drachmas octo, passilum uuarum pinguium exemptis uinaceis libram unam, carnes palmularum duodecim, salis communis drachmas sedecim, mellis cochlearia tria, efforma ac utere post balneum, aut fomentum. Cataplasmata insuper adhibebimus ex cruda ordeacea farina, artemisia, amaraco, iride, aut alio quodam ex relatis ammixto. Liquor autem cataplasmati ammiscendus sit, uinum odoratum, mel, amaracinum, sirinum, anethinum olei. Postea laminam quoque oleo aliquo ex prædictis imbutam superponemus. Bonum est etiam bdellium cum styrae ac thure tritum, cum uino & unguento quodam relato, imo uentri ac lumbis illinere. Epithema ad sanguinem menstruum euocandum. Elaterij, myrrhæ, galbani, farinae ordeaceae, singulorum drach. quatuor, foliorum rutæ recetum drach. ii. sellis taurini quantum satis est. Reliquis omnibus minutissimè tritis & uinctis fel ammisceto, & lumbis ac imo uentri imposito. Ducti hoc menses, & sedis hæmorrhoidas prouocat. Vtere etiam alijs epithematis Sermo tertio conscriptis. Philosophi ad menses educendos. Cancrum fluuiale in uulnum coniectum suffocato. Deinde uinum id meracum, calefacto, ac totum bibendum dato, & ubi satis sanguinis purgatum uidebitur, cancerum suffocatum comedendum dato. Glans subditissima menses educens, facit ad uteri frangulam diuturnos. Felis taurini, succi abstinij, & comæ eiusdem, radicis struthij, myrrhæ, singulorum drachmas quatuor, castoreij, opobalsami, singulorum drachmam unam, succi cydamini drachmas decem. Omnia artemisij succo excipito, & glandes paruas subditissimas formato, probe facit & sex uini antiqui apij succo excepta ac subdita. Aut illij radix tosta subdita. Aut nigella, aut scellum, aut rutæ semen & foenum græcum butyro ac melle exceptit ac subdita. Pellos eadem die plerumque sanguinem ducens. Folia artemisij & nitrum pari portione oleo irino aut rosaceo excipito, & post balneum subdita.

Curatio earum quæ præ pinguedine non concipiunt.

Cap. LVI.

Pinguiores mulieres uisum attenuant curabimus. Dis-

cutum est autem in secundo ac quarto sermone de his alimentorum facultatibus, & quomodo macies sit reparanda. Non tamen interim fomenta & potiones prætermittantur. Si enim materia infra declinabit, haud ægre euacuabitur, & corpus gracilius reddetur. & quanquam purgatio per inferiorem alium non sit ualde tuta, ut quæ corpus tabefaciat, mulieri tamē ita habendi hæc quoque adhibenda est. Sæpe enim sola purgatis medicamentis potio ad menses educendos sufficit. Ex purgatorijs itaque acerrima & pinguius maxime idonea sunt, granum cridum, scammonia, & cortex radicis uithymalli myrrinitæ. Singulis autem perosolentibus, aut daucum, aut apium, aut anisum, iucunditatis gratia, & ad sanguinem attenuandum, ammiscere oportet. Pellos quoque ualidiores his adhibebimus, uelut pulpam colocynthidis, nigellæ, myrrhæ, simul cum uino dulci trita ac subdita. Aut nitrum cum cydamino, selle bubulo, ac melle. Aut caricarum carnes cum nitro, melle, & ruta. Fomenta itæ ac epithemata ad frigidiore temperatures relata huc transferantur.

Curatio earum quæ ob plenitudinem non purgantur.

Cap. LVII.

Quæ propter plenitudinem non purgantur, congruo menstruatorum tempore magis grauatur, dolores circa lumbos ac imum uentre percipiunt, flatuque replentur, ad quæ diffinitiones ac horrores totius corporis cōsequuntur. Sed præcipue insigni uenarum tumore distinguitur. Atque hæc quidē copiosa sanguinis missio ne sanantur. Cubiti itaque ac tali uenas secare oportet. Deinde euacuato sanguine cetera facere supra relata, potiones uidelicet ac fomenta adhibere. Postquam autem menses fluere inceperint, mulieri quies imperanda est, & in lecto eadem destinanda. Ac prima die ad balneis ac cibis abstinendum, proxima uero purgationis succus cum aceto præparatus in cibo exhibetur. Deinde olera ad hunc usum idonea. Tertia autem die lauanda est, & coëcta uisus ratio repetenda.

Curatio earum quæ ob maciem non purgantur.

Cap. LVIII.

Quæcumque ob maciem gracilitatemque non purgantur, siue id ex morbo, siue alia ratione contigerit, eas primum reficere oportet, & corpori carnem congruo exercitio, moderatoque labore ac uberiores exercitij reparare. Vbi enim carnosæ factæ fuerint, maxime apes est menses sponte erupturos esse. Ac si hoc non contigerit, potionibus ac pelis prouocentur.

Curatio earum quæ ob uitiatos humores non purgantur.

Cap. LIX.

Biliosos ac pituitosos humores, & quicunque alij sanguini ammixti mensium purgationem impediunt, totius habitus uitatione cognoscemus, ac reliquis notis sæpe a nobis relatis, & aliquando ex his quæ circa uerum contingere solent. Pauci enim menses qui deferuntur, si biliosi fuerint, uuluum mordent ac rodunt, & coloris sunt abunde fului. Si uero pituitosi, signis prouident, crassi sunt, albi, ac subfrigidi, & stuporem inducunt. Quum igitur huiusmodi signa apparuerint, præstatissumum est totum corpus congruis medicamentis purgare. Deinde muliebres locos colluere ac fouere. Cibus autem dulces ac boni succi exhibere, & in potu uinum mulsum dare. Exhibeatur etiam iacalinum cum melle. Et aqua in qua pulegium ebullit cum uino dulci propinetur. Hæc

tur. Hæc & menses prouocat, & nullam superfluitatem in sanguine relinquit. Cibis insuper ac potibus semper aliquid odoratum ammiscetur. Ex oleibus Crethmū, gingidiū, & daucū, singula ad flacciditate cocta, & foeniculū eligemus. Neq; interim pessi negligat, qui quales esse debent, partim relatu est, partim proxime dicitur. Si enim biliosa ducere uolueris, elateriū cū carica pingui, aut cydaminiū cū uino subdes. Pituitā uerò subdita trahit solia anemulones, iris cū melle, loliacea farina lolio prius paululū tostio, cū modico pipere & melle, colocynthidis cū carisaca. Aquositate autem euocat porrum cum melle. Post pessos uerò mulier in aqua calida desidet, & unguento rosaceo aut cerato, aut adipe gallinaceo, uteri os inungat.

*Curatio earum quibus sanguis ad nares, uel sedem defertur.* Cap. LX.

In his à quacūq; parte fluxerit sanguis, reprimendus est, & ad uterum congruis auxilijs reuocandus; ne forte inde propulsus ad principalem ac nobilem aliquam partem uertatur. Itaque & sudoribus, & uomitu, & alijs excretionibus corpus euacuetur. Verum hoc sciendum est, non multū melle affici eas que ob tales causas nō purgantur: sicut neq; quæ ob maciem, aut laborum excessum. Concipere tamen nequeunt, quum uteri purgationes defecerunt.

*Curatio earum quæ ob nimium ocium non purgantur.* Cap. LXI.

Certum est eas quæ ob nimium ocium non purgantur, laboribus destinandas esse. Labores aut mulieribus congruè cōbulationes sunt, & gestationes aliquanto uehemētiores. De cetero uerò uelut frigida ac pituitosa curētur, & omnino cōtraria iuxta Hippocratem, dētur his quæ sanguinis delationē impediūt. Et si ex aqua frigida cruda pora sit offensa, aliā optimā perquiremus, quā uino albo ac tenui pmiscebimus. Cibus itē p frigidis calidos, p calidis attenuātes, p siccis humidos exhibebimus, & reliqua iuxta rationē.

*Curatio earum quæ ob aliquam uteri affectionem non purgantur.* Cap. LXII.

Si corpus bene se habuerit, uictusq; ratio purgationi congrua fuerit, & tamē mulier nō purgatur, considerandum est an uterus aliqua affectione laboret. Id quod si fuerit, nullū medicamentū omnino adhibeatur, neque aliqua potio menses ducens detur, ut attrahat ad uterū sanguine, dū loci laxari non possunt, dolores molesti uelut in paru ingruāt. Primū itaq; affectio curetur, quæ suppressorū mēsum causa est. Deinde sanguis prouocetur. Quomodo uerò uteri affectiones curandæ sint, postea ex ordine referemus.

*De mensium stillicidio.* Cap. LXIII.

Mēsum stillicidiū uocatur, quū grauissimō dolore in timas partes uexatē sanguis stillatim prodit. Aliqui enim morbi uteri affectionibus uelut similes sunt. Nā & in illa aliquādo urina supprimitur, aliquādo stillatim prodit, & quandoq; difficulter mingitur. Quinq; uerò sunt stillicidij causæ specie diuersæ: meas tū angustia diuersimode cōtingens, uisū debilitas, sanguinis multitudo, sanguis pituitosus, & sanguis feculentus. His singulis quoties impedimento fuerint, succurrendū est: ita ut multitudinē, euacuemus, crassitudinē attenuemus, uires firmemus, & meatus dilatemus. Angustia tamen causam inquirere oportet, eamq; auferre. Causis enim subtilis libera purga-

tio consequitur. Quomodo uerò singulis causis occurrēdū sit, partim de mensibus suppressis diximus, partim deinceps referetur, ubi de uteri morbis agemus. Nūc autē explicare institutus, quomodo graues dolores lenire oportet. Exacerbatione itaq; instante mulier in domicilio locetur, moderate tepido, nō tamen obscuro. Et manū ac pedū extremitates fascijs deligatur, neq; ullus pessus irritatorius intermis adhibeatur. Aquæ potus uideatur, & omnino ab acerbis potionibus ac cibis, præcipuè flatuosis, abstinentiū est. Imus autē uenter & femora uarijs calefactorijs foueātur, ita ut aliquādo lana succida uino & rosaceo calido imbuta imponatur, aliquādo uelut ca oleo calido semiplena adhibeatur, aliquādo uas uaporatoria lentculata admoveātur. Quod si dolor persistit, & uires ferre poterint, cubiti uena secetur, & sanguis pro uisū ratione auferatur, & deinde de rursus eadē fomenta repetantur. Et si neque sic fecerit, caraplasma ē semine lini, pane, & aqua mulsā paratū adhibebimus, cui aliquādo terebinthinā lī quatā ammiscimus. Vtemur & infusionibus ex altheæ, seminis lini, foeni græci, anethi, rutæ, ac Artemisijs decoctis, & spōgij ex ipsēdem expressis pudendū fouebimus. Rutā item triā ac melle exceptā & pāno lineo inductā ubi ac pectini imponemus. Aliquādo eodem caraplasmate etiam pudendum integemus. Prodest & per uteri supiorum instrumentū infra scriptū liquorem infundere. Rutā & foenum græcū in oleo coquito, & ad hoc ex colarum buryri, terebinthinæ, ocsypij, quantū ad ceratū liquidioris formā factū est ammisceto. Idem etiā in sedem ad trium uel quatuor cyathorum mensurā inijci potest. Aliud consimile infusum. Ocsypij drach. iiii. cerebella anserum duortū, adipis anserini, phasiani, gallinacē, singulorū unc. i. ceræ quadrantem. Misce ac utere uelut priore. Pessi præterea Libanus & enneapharmacus ac alijs cōsimiles subdatur, qui inferius ad uteri infestationes & induratos tumores describentur. Adhibenda sunt & epithemata, primū tetrapharmacum, bromium, & quod ex succis constat. Deinde polyarchium, & quod ex meliloto, & quod ē seminis paratur, prout usus postulauerit. Si uerò adhuc malum nō quiescerit, sed aut per ceros circuitus, aut incerto ordine uexauerit, ad ualidiora pergendū est auxilia. Et cucurbitæ pectini ac inguinibus apponendæ. Primum quidem trīs aut quatuor circa scarificationē. Deinde si affectio durauerit, etiam scarificabimus, & moderatā sanguinis quantitātē euacuabimus. Cōferūt & hirudines post cucurbitas admotæ, nihil mēnus quā cucurbitæ attrahētes. Deinde epithemata ac dropaces adhibeātur, & cutim rubificata, & loci molliter assidue cū oleo ac sale cōfricetur. Exercitiū præterea teperau imperabimus, ac gestationē deablationi præferemus. Postremū balnea naturalia adhibebimus, & marina aqua frigida iugiter abluemus.

*De nimia mensium purgatione.* Cap. LXIIII.

Nimix mensū purgationes mulieribus sunt, aliquādo sanguine copiosiore & per plures dies prodēte, id quod rarius, & in uehemētioribus moribus fieri solet. Aliquādo post partū, plurimo sanguine foetu insequeute. Sæpe uerò post abortus cōtingunt, & repectū quādoq; periculū inducūt. Primū itaq; cōsideranda est erūpentis sanguinis multitudo, & delationis modus. Amplioribus enim uasis ruptis aut aperitis,



magna sanguinis copia cōfertim profluit, à minoribus uerò uite uersa. Ab erosione uerò paulatim & cū maximo dolore prodit. Sequitur autē ad redundes sanguinis eruptiones decoloratio, ac coloris uisatio, aliquādo cū febre, quādoq; citra febrē, appetitus p̄teritus, diffidilis cōcōctio. Sæpe etiā pedū ac totius corporis tumores, & omnia quæ ad nimium hæmorrhoidū fluxū consequi diximus. Artus ergo & extremas partes primū cōstringere oportet, ab alis & inguinibus exordio factō, & poscā nō frigidā, sed tepidā propinare, & eadē poscā locos perfundere, & multam lanā uisō & oleo rosaceo, aut melino, aut myrteo imbutā imponere. Nā spongix ex poscā expressē uterum ac uescicā perfrigerat, & damnum amplius quā cōmoditatem afferunt. Imperādū est autem unius aut alterius diei iesuniū. Quod si tolerare nequeat, panis micas ē poscā exhibebimus, aut alicā lotiam, aut oryzam ex poscā, aut ouum forbile molle frigatectū. Dabimus item in potu balaustium ex poscā, aut hypocythidīs aut acacix succum. Aut lyciū, aut terrā samiam stellam appellatā, aut uix acerbæ succum siccū. Prodest & sesamum poscā macerare, atq; ita molle factū edendum præbere. Potest idē etiā cōteri, ac in potu dari. Exhibebimus & rhei ponit decoctū, aut idem tritum posioni inspergemus. Aut loti ramenta, & eorundem decoctū. Aut coralorum drach. ii. Aut pæoniæ grana rubra xii. At uerò spongia noua liquida pice imbuta, & in olla exusta, cum aceto aut poscā subdita, mirifice auxilia tur. Nā & his quæ in uterū subijciuntur ac induntur, uti debemus. Noui inquit Galenus, per quatuor aliquādo dies sanguinem ab utero manasse, & ad nullū auxilium celsisse, & tandem à nobis plantaginis succo suppressum esse. Quātitas autē eius iniñdendi, sit cyathi mensura. Hoc itaq; optimum est medicamentū ad sanguinis eruptionem ex erosione abortam, cui aliquando fortius aliquod ammiscere solet, alis aliud, pro affectionis respectu. Si igitur uis unde sanguis profluit, magnū & amplū fuerit, austeris medicamentis opus erit, balaustio, acacā, hypocythide, succo uix acerbæ, gallis, malicorio, & similibus. Si uerò paruum, id quod facile cognoscemus ex modico sanguine citra dolorem prodeunte, cōferent aloē, māna thuris, cortex pinus, terra lœmia sigillata, spinæ ægyptiæ fructus, crocus, lapis hæmatites, & reliqua huiusmodi cū succo plantaginis, aut uino nigro austero, aut senecionis succo subdita & iniecta. At si ab erosione sanguis proflexerit, plerumq; uelut diximus nō cōferim, sed modicus ac paulatim defertur. Et propterea Andrōnis, aut Pasionis, aut Polyidæ, aut Musæ pastillo, aut eo qui ex charta paratur, utēdū est. Omnes enim tales quum nomen sistant, erosionem curā, ac sanguinis eruptionē reprimūt. Sunt autem quodā liquore ex relatis diluendi. Pesi uerò ad sanguinis ab utero eruptionē faciunt huiusmodi. Aluminis fessī, acaciæ, medullæ gallarū, pollinis thuris, singulorū drach. iij. Hæc plantaginis succo teruntur, & uticelli ouorū afiatorum quatuor ipsīs ammiscētur. Vix autē tempore pessō lanæ excipiatur, qui rosaceo sinctus subditur. Sunt quæ pesi omnes penitus usq; ad uterū ad immittendi. Est autē pessus lana carpta ac cōuoluta ad digitū figurā, qua medicamenta excipiuntur. Alius. Medullæ gallarū, & thuris, pares portiones aqua subactas subdito. Aut ē polygono trito pes-

sum formato. Ipsas præterea in hoc decocto assidudē insidere tubero. Capiculorū iunci acuti, soliorū myrti, rosarū, rharni, utrigultorū rubi, æquales portiones in aqua coquito pro infessu. Alius Pessus, Cydoniorum, soliorū cupressi, oleæ, rubi, singulorū æquas partes efformato. Forinsecus autē imposita prorsus epithemata ac cataplasmata ex palmulis ac malis cotoneis, quæ adsumunt balaustium, acaciā, hypocythidem, alumen, & similia. Conferunt & emplastrā glutinatoria, quale est suluum Galeni, & Icesij, & quod ē salicibus paratur. Et Harmonia, & Pallas situe Athenæ inscriptum, si lumbis ac pectini imponantur. Tauri itē glutinū aceto maceratur donec dissoluatur, deinde ualido panniculo inductū sibi agglutinatur, & efficaciter prodest. Sed & cucurbitæ leues ac magnæ ad mammas utilissimæ affiguntur.

De fluxu muliebri, Archigenis.

Cap. lxxv.

Fluxus muliebris est uteri destillatio diuturna, à menstrui sanguinis eruptione differēs, ed quod in illa sincerus sanguis prodit. Hic uerò fluxus corruptus apparet, & aliquando ruber est, uelut sanguinis faniestaliquando albus, uelut pitæ fucus, à pituitoso uidelicet sanguine. Interdū pallidus, ubi bilis amara redūdarit; interdum aquosus, à serosorū humorū superfluitate. Qui itaq; exquisitè color ē præ se fert ali quē, is redundantē humorē facile indicat. Si uerò obscurū colorē habet, causam eius percrutabimur. Lin teū eo inquinatū arefactū simplicī aqua cluemus, & inde à maculæ colore redundantis humoris notionē capiemus. Hic uerò fluxus plerūq; citra dolorē prodit. Aliquando tamē ulcere exulcerato etiā cū dolore promanar. Si itaq; aliqua pars doluerit, & humor profluens planē cruentus fuerit, paritis alicuius in utero ruptioē aut erosionē indicat, id quod maxime in collo uteri contingere solet, & potest hoc digiti immisione percipi. Inferre uerò solet hic fluxus debilitatē, coloris uitiationē, appetitus subuersionē, inenarrabilē tristitiā, pedum tumorē. Et in aliquibus perpetua destillatio perseuerat. In aliquibus per interualla quēdā reddit. Et ætate quidē uigētes, rubra ferē fluxio infestat. Declinatē uerò ætate, alba. Et utraq; sanē fluxio si suæ ætati acciderit, facile curatur; si alienē, difficulter. In oī uerò defluxu os aperitur ipsius uteri, & uelut relaxatur. Quibusdā etiā uterus ipse pedit, ut usque ad muliebrem pudēdū progrediatur.

Curatio rubri uteri fluxus.

Cap. lxxvi.

Mulierī rubro fluxu uexatæ primū sanguinē euacuabimus per uenę sectionem. Hæc enim nō solum materiā ad uterū confluentem diuerit, sed detentionem etiā cōstrictionem turā efficit. Multa enim sequeretur in cōmoda, si sanguinis uel cuiuscūq; defluxus lationem localibus auxilijs reprimeremus. Nam aliquæ inde in hydropem, aliquæ in neruorū affectiones, aut oris uentris, aut capitis uexationes collapsæ sunt. Proinde si nihil obsterit, hoc est, si non ualde magna fuerint obstacula, sanguis misatur, præsertim si ætas uenę sectionē nō prohibet, & sanē paulo antequam est, iuniores ferē rubro fluxu uexari. Derectio uerò sanguinis uelut in his qui sanguinē reijciēti partiaur, ut paulatim reuulsio fiat. Et dilata uenę cuti sectione, à frōre, aut naribus, aut capulis sanguinem auferemus. At uerò lumbis ac femoribus deriecta ac mollia lintea imponantur, frigidis succis imbuta. Locetur autē mulier, coxis adcliuibus, cruraq;

racq; extendat ac inter se complicit ac uteri partes cōtrahendas. Quod si copiose sanguis feratur, coxæ, pectus, & lumbi spōgijs posita madefactis integantur. Si uerò modice defilleret, lana fuccida uino & rosaceo imbuta adhibeatur. Et extreme partes deligantur, arque hæc non solum in principio fiant, sed etiā post circuitus ante exacerbationem, & in ipsa exacerbatione. Viatur ægra etiā infestationibus, ex myrris, rubi, malicorij, & similium decoctis, in quibus sepe aceto affuso usque ad umbilicum immergatur. Adhibeat & infusiones adstringentes ac moderate frige facientes, uelut est plantaginis succus, polygoni, stratiotæ, malorum cotoneorū, ac mespilorum. Sed & sideritidis herbe aut parthenij succus eximie cōfert.

Hæc autem singula cum rosaceo aut myrteo oleo infundantur. Vinum item dulce in mali punici cortice calsactum, utilissime tepidum infunditur. Efficacissime uerò fluxum compescit spōgiæ pice liquida imbutæ ac usque cinis subditis, itemque leporis pilli usui. Solemus & linteum alumine madefactum ac re siccātū similiter adhibere. A sinuū autem lac, si eius copia fuerit, præsertim asinæ per pascua pratorū nutritæ, omnibus succis præstat, ubi fluxus cū dolore defertur. Confert & stercoreis eiusdem asinæ succus, & alicæ aut prisanæ succus: & rosaceum uel per se, uel cū lacte infusum. Cæterū pelsi ad rubrū fluxū ijde faciunt, qui ad sanguinis eruptiones sunt relati: sunt autem in aliquo ex prædictis succis madefaciendi. Facit & lycium, acacia, hypocisthidis succus, singula lacte bubulo aut fapa diluta. Aut galla cum thure & rosaceo. Aut spodiū pōpholygis cū rosis & passo. Aut oui testa usta cū myrro sicca & passo. Aut cinere sarmentorū linteolo illigatū, & aliquo prædicto succo tinctū subdito. Aut fenecionē herbā tritā subdito, & bibēdā dato. Gallā itē usta, & modo uino, modo aceto extincta, ac in pessum efformata subiiciatur. Ablatis autē his, pedes adstringentibus decoctis moderate frigidis aut tepidis abluantur. Et ex relatis succis aliqui utero infundatur. In debilibus tamē ac delicatioribus foeminis miora adhibebimus. Aliis quibus enim occultū uteri meatus a uehementioribus medicamentis adeo cōstringitur, ut ulcus aut duritia oboriat, & concipiendi facultas tollatur. Ventri quoque ac lūibis refrigerata ac adstringētia adhibeantur, uelut est portulaca, perdicū, solanum, hyoscyamus; per se & cū poltea acetoq; ac palmulis. Aut ordeacea farina cū palmulis, malis cotoneis, ac mespilis. Cerata itē ex ijdem præparata pectini ac lumbis imponantur. Cōferunt & cucurbitæ dorso & sub alis affixæ. Et quęcūq; portiones sanguinē reiectantibus cōgruunt, his quoque cōmode sunt. Velut est ex simplicibus rheon pōtūcū, terra samia stella siue aster appellata, terra lemnia sigillū uocata, cū plāginis aut polygoni succo; & reliqua tum simplicia, tū cōposita, suo loco relata. Sit porro & uniuersa uictus ratio ad strictoria, quæ aliquatenus crassesciat, & porus aqua. Quod si uires collabātur, uinum crassius exhibeatur. Ac si fluxus multū tūdo reprimatur, paucus autē adhuc feratur, pro refrigeratibus ac adstringētib; media inter hæc adhibeatur, ut ne fluxu repente suppresso, inflammatio aliqua oboriat. Veniendum est & emplastris ad cruenta uulnera idoneis, uelut est quod est salice paratur, & quod Icesū appellatur, & alia huiusmodi.

## Albi fluxus curatio.

## Cap. LXVII.

Si fluxus albus, aut serosus, ac saniosus, aut liuidus infestat, in principio quidem resistendum non est, ut aliena à corpore excernantur. Post principium uerò oleo sulfino totū corpus large illinatur. Gestationes autē & uocis exercitationes, frictiones item ac deambulationes, non in hac solum fluxus specie, sed etiam in alijs conueniunt. Ipsi uerò locis moderate adstringentia adhibeantur, quæ simul extergendi uires habent. Et sanies profluens assidue calida aqua eluatur, & lana detergeatur, ne ab humore transeunte ulcus excidetur. Rosaceum item aut myrteum, aut melinum oleum illinatur. Aqua etiam pura nihil adstringens habens ammixtum, in principio præsertim adhibatur ob influētis humoris acrimoniā: Et ob eandem causam etiam alicæ ac oryzzæ succus infundatur. Facit & fœni græci decoctum plurimo oleo sulfino ammixtum. Sulfini enim oleum tū huic, tum alijs succis utiliter ammiscetur. Atq; hi quidem succi efficaiores erunt, si quid acidi, aut hypocythi dis, aut de alio quopiam ad rubrum fluxum relato, fuerit ammixtum. Possumus etiā pro sulfino oleo leuiscinum aut cenanthinum adhibere. Stercus insuper caprinū cum myrrha, thure, & aloë, rosaceo & aceto addito cōmode subditur, ita ut his ablaui loci uino nigro austero abluantur. Vbi uerò quæ profluunt fœtida sunt, post relatorum usum tetrapharmacū rosaceo dilutum adhibebimus, & per ceria interualla uicissim tum prædicta auxilia, tum tetrapharmacū applicabimus. Si uerò fluxus sordidus fuerit, & dolore insulerit, uitellos ouorū assatos cū modico croco & rosaceo subdemus. Aut malū cotoneum assatū eodē modo. Et leuculē decoctū cum plāginis succo infundemus. At si quæ profluunt sordida quidē fuerint, & feci similia, dolore tamē nō insulerint, insula ad dysenteria idonea immitemus. Vbi autē loci purgati fuerint, adstringētib; elorionib; cōfiderate utimur. Locis uerò induratis asininū lac cū rosaceo aut sulfino oleo infundemus, & in pello subdemus. Et si asininū defuerit, caprinū succedat. Lac uerò præstat quod ab animali per prata pascente emulgetur. Aliquando etiā amyli ad crassitudinē comparandā, lacti amiscemus. Pelsi insuper ijdem, cataplasmataq; ac emplastra eadē quæ ad rubrū fluxū retulimus, huc transferantur. Præcipuā uerò fiduciā in recta uictus ratione habere oportet. Nec quantitatē solū, sed etiam qualitatis eduliorum ratio habenda est. Sitq; alimentū talis, quæ & crassesciat ac uires corroboret. Quales sunt sorbitiones est tritico ac lacte paratæ, nō aquosæ ac dilutæ, sed probe cōpactæ, quæ pro occasione et ex passo cretico parentur. Carnes uerò eligendæ sint fixadū ut præditæ, uelut aues mōtane, & ferarū animantū. Cæterū ubi fluxus cessauerit, a uelocibus ambulatione, a multis pectinis ac liborib; frictionibus, ab acriū esu, a calsacientibus, a flatuosis, & ab his quæ urinā proleat, diu abstinendū est, & balneis raro utendū, neq; ueter mouēdus est, neq; spiritus reuolūdus. Hęc em omnia malū reuocant. Partes autē superiores sensim ac leniter exerceantur, ac perfricentur. Infestationes si in aqua nō adeo frigida. Et pelsi aut subditijs elaboratioris ac medicamentorū uictus. Verū post infestationes rosaceū lana exceptū subdat, & in ipso curationis tēpore ægrota bibā ea quæ ad sanguinis pro spūū reiectionē retulimus. Faciunt

& pæoniæ grana pallida xv. assiduè pota. Aut coral-  
lorû dra. i. c. uino nigro. Aut uinacea trita cû uino.  
Aut leporis siue hædi coagulum erui magnitudine  
in posita dilutum. Aut corticis lori arboris decoctû.  
Aliud Aspalæ, ad mulieres quæ sinû pudendi ual-  
de humectû habet, ut ex eo nō cōcipiant. Gallas per  
octo dies aqua macerato, deinde lanā purā ac mollē  
in aqua illa siue cremore gallarû tingito, & nō expri-  
mito, sed siccari sinito, & lanā ita subdendā dato. Ex  
hoc mulier uelut uirgo reddetur, & hoc fæpe repe-  
tat. Aliud. Semē ruminis acuti cû pauca aqua sub-  
gito. Aut si utridē fuerit, per se terito, & subdēdū ex  
hibero, & fiet pudendum uelut uirginis adfrictum.

De uteri strangulatione.

Cap. LXVIII.

Vteri stragulatione ab utero quidē inferne oritur. Ve-  
rū supernæ partes & principales præsertim, per con-  
sensum afficiuntur. Nam ad cor per arterias ad cere-  
brum per spinæ mēbranas ac neruos: ad hepar per  
uenas affectio trāsīt, uideturq; uterus uelut ad super-  
nas partes accessisse. Cōsequitur affectas accedere exa-  
cerbatione, mētis lāguor, pigritia ad agendū, debilitas  
crurum, pallor faciei, tristis aspectus. Infiatē uerō  
stragulationē, sopor grauis ac pfundus, mētis ac sen-  
sū apprehēssio, cū uocis interceptio. Pulsus autē par-  
ui ac debiles sūt, & aliquādo penitus intercipiuntur.  
Quibusdā autē neq; respiratio sensibilibs pmanet. Ali-  
quæ uerō alijs actionibus integris manentibus, ma-  
gnā respirationē ex hac affectione habet. Et hinc ma-  
nifestū est, quōd nō circa cor & stomachū cōpressio,  
aut mortus, aut perfrigeratio, à partis ascensu fit, sed  
circa partes respirationis, & pulmonē hoc cōtingit.  
Quapropter neq; animi deliquium his uehemē est,  
quī cor affectionis exors permañerit. Neq; enim sic-  
ri potest ut animi deliquiū citra cordis cōsensum in-  
gruat. Ceterū affectiōis differentiæ, pro causæ efficiē-  
tis differentiā ac magnitudinē sunt. Et sanē quidā expe-  
riri uolētes an aliqua adhuc supersit respiratio, lanā  
carpiā naribus admoūcāt, atq; inde ex lanæ motu col-  
ligant, an aliqua inspiratio aut expiratio restet. Alij  
poculū aqua plenū ad os uentris ponūt, & cōsiderāt  
an aliquo motu aqua agitur. Et profectō utriq;  
ignorāt, aliquādo sublata penitus oris ac nariū respi-  
ratione, superesse adhuc eam quē in toto corpore ab  
arterijs perficitur. Id quod etiā in reptilibus uenenatis  
cōtingere uidemus. Hęc em̄ per totā hyemē mor-  
tuis similitima in cauernis latitant, per arterias tantū  
totius corporis respiratiō. Siccetiam in uteri stragula-  
tione fieri potest, ut toto corpore frigeat, oris ac  
nariū respiratio intercīdat, supersit autē ea quæ ab ar-  
terijs fit. Sed & oris ac nariū respiratio adeo parua  
esse potest, ut sensum lateat. Profundissimo itaq; sop-  
ore corripitū huiusmodi mulieres, uoce, sensu, ac  
motu interceptis. Stomachi etiā dolore uexantur, &  
faluū uomūt, si in stomacho aut capite humiditas si-  
ta est. Deinde uerō exolutis causis corpus firmari in-  
cipit, & male rubescit, & oculi post multā grauitatē  
atolluntur. Et ubi itā malū agrā relictū est, humiditas  
quedā ex locis muliebribus excurrēt, ita ut perci-  
piatur, & intestina murmurant, & ipse uterus paulu-  
lū laxatur. Atq; sic exurgens egra intellectū ac sen-  
sum recipit. Accidit hęc affectio omni quidē tēpore,  
sed hyeme p̄cipue ac autūno, iunioribus p̄sertim,  
falacibus, ac sterilibus, maxime si per medicamenta  
steriles fuerint. Oritur autē uel utero perfrigeratō, cū

in fies prodeūt, uel propter abortū, uel sanguinis eru-  
ptione ab utero, ab aliquo repente suppressa. Atque  
hic morbus ubi inuadere assueuerit, comitalis mo-  
do diuturnus, & p̄ circuitū repetēs efficitur, & tutus  
quidē apparet, singulis tamē accessionibus præceptis  
periculum affert, ut nō eadem solū die, sed intra pau-  
cas horas incrimet. Et pulsus quidem primum den-  
siores sunt, & inordinate mouentur, deinde etiā pe-  
nitius intercipiuntur, & exigua quædā humiditas cu-  
tis superficiem irrorat. Similiter & respiratio pri-  
mū obscuratur, postea penitus intercīdit. Est autē hic  
morbus statuosa perfrigeratio, nō inflāmatiō, uelut  
Soranus putat. Semē enim in utero paulatim coacer-  
uat, aut alia quædā materia in sita ac putrefacta,  
perfrigeratur: & ad cerebrum ac cor frigiditatē trā-  
smittit, atque hæc partes principales frige factæ relata  
accidentia inferunt. Et ego sanē mulierē uidī in hūc  
morbum collapsam, dum ab obstetricē laxantia ac  
odorata auxilia adhiberentur, & pudendi sinus digi-  
tis penitus confricaretur, tum ex auxiliorum admo-  
torum caliditate, tum ex digitorum contrāctione,  
se contraxisse cum dolore quodā uoluptate permix-  
to, deinde excreto multo crasso, uiscosoq; semine,  
proinus à molestis ac afflictionibus liberatam esse.  
Neque mirum uideri debet, uel ex minima humorū  
mole tanta accidentia consequi. Si enim paucissima  
ueneni quātitas, & ita exiguum uirū reptilium per  
angustissimum foramen eiectū, mala longe fauora  
inducit, non absurdum dīctū est, semen corruptū aut  
menstruum sanguinem suppressum ac detentum, ita-  
lia inuadere accidentia. Sed & ex canum rabie facilis  
hulus rei cōiectura est. Tāta enim inde humorum sit  
alteratio, ut si eorum canum salua solum corpus hu-  
manum cōtingit, cōfessim rabiem inducat. At uerō  
scire opere præcium est, hunc morbum nō solum ob  
uteri ascensum fieri, uisitofo humore uelut diximus  
in eo collecto: sed fæpe etiam ex uentris repletionē  
utero affectionem transmittit. Et aliquando hepatitis  
aut splenis causa, uasa ex quibus uterus dependet, re-  
trahit. Quum ergo uterus ex seipso laborat, pro se-  
minis uel menstrui sanguinis coacervati quantitate,  
ac qualitate, alia aliās accidentia cōsequuntur. Si enim  
causa efficiens frigefaciendi uires habuerit, ita uniuersum  
corpus perfrigerabitur, ut respirationis ac pul-  
sum sensus penitus aboleatur. Si uerō humores as-  
siliētes crassi aut acres fuerint, conuulsio subseque-  
tur, quemadmodū acerbis humores animi tristitia  
comitatur. At animi deliquia exacerbationum ue-  
hemētia, & maxima p̄frigeratio, & oris uentris afflic-  
tō inducit. Aegra itaq; ceruicē ac scapulis accliusus  
collocetur, femoribus ac inguinibus declinibus. Et  
in ipsis exacerbationibus ex treme partes deliquit,  
& pedes ac crura fricentur. Naribus autē odorata ad-  
moūcātur, uelut est galbanū, aut castorium, aut faga-  
penū, singula ex aceto trita, ac naribus illita. Aut ace-  
tum acerrimum, in quo pulegium, calaminthe, thyme-  
mus, origanum, conyza tenuis, & alia huiusmodi  
acria decocta sunt, calefactum naribus adhibeatur.  
Hæc enim crassos uapores cerebri incidere & atte-  
nuare possunt, ac simul frigiditatem depellere, & in-  
spirata thoracem ac pulmonem expurgāt, & stom-  
achum corroborāt. Excidentur etiā sternutationes, ca-  
storia, pipere, struthio, naribus per specillum admo-  
ro. Os autem agræ aperiat, ac medijs digitus  
ad uomi

ad uomitum prolificandū intromittatur. Nares item castorio, bitumine, galbano, sulphure suffiantur, aut funiculo lucernario rectis extincto, aut pennis utitis, aut soleis antiquis, aut ceparū, aut aliorum cordicibus, aut capillis ipsius proprijs exutis. Aut cornu caprino incenso, aut pice ad prunas liquecente, cedriaç, ac ueratro: aut pane recens incenso, & similibus. Quidā etiam marulā urinariam inueneratā, & pannos sulphuratos incensos naribus admovent. Sinapi item tritum cū aceto, & gagates lapis aqua tinctus & incensus, ac oleo extinctus, naribus adhibeatur. Aut rutam uiridē manibus cōritam suffuso. Vterū uerō inferne per pudendū odoratis fuffito, storrace uidelicet, ac fandalis, & aloē ac similibus. Illūnat etiam intra pudendū ea quæ laxādi, calfaciendi, ac flatus dissoluēdi uires habet, qualis est pelsus Enneapharmacus appellatus, & ceteri eiusmodi ad uteri duritias inferius descripti, amaracino, gleucino, irino, cyprino, aut capnisto oleo dilut, adiecta etiā rutæ aut cuminī portione. Atq; hæc digitis excepta obsterrix usq; ad uteri os immitter, ac leniter & diu confricabit, ut hinc frictus calessit humor qui in utero hæret, prouocetur, ac effactus excernatur. In ipsum quoq; uterum per uteri fusorium clysterem, amaracinum, aut gleucinū, aut follatū unguetum iniiciatur. Et in sedem glandes indantur, ex ruta, cumino, nitro & melle cum aliquo ex relatis ungentis & butyro præparatæ. Est & cucurbita primū in gūinibus, ac femoribus, deinde utrinq; circa umbilicū, cum plurima flāma citra scarificationem affigenda. Et super hæc omnia mulier magnis uociferationibus excutetur, ac uocetur. Infectiones quoq; parentur in decoctis baccharum, ac foliorū lauri, pulegij, calamīthes, marrubij, artemisiæ, conyzæ, sablænæ, centaureæ, dictamnī, samphuchi, fœni græci, altheæ, chamæmeli, aristolochiæ, iridis, serpylli. Infectionē uerō tempore cerebri cura nō relinquatur, sed rosaceo & aceto caput irrigetur, & in aceto prius serpyllum, sphondyliū, ruta, bacce lauri, interdum & castorium coquatur. Et naribus prædicta odoramenta assiduē adhibeantur, præsertim castoriū cum aceto. Præcordia item fascijs uincantur, & distentis manibus os uteri comprimatur. Ar ubi exacerbatio instat, ægra ad uomitū cogatur. Omnes enim uomitu leuantur, sed præcipuē quæ cibo grauatur. Tertia uerō die cucurbitæ cum scarificatione pectinī, ac lūbis affigantur, deinde loci scarificati sale cōspargantur. Et ubi ab huiusmodi auxilijs discesserimus, ad castorij potione transibimus, quod assiduē potū sæpe penitus ab hoc morbo liberat. Dandū est quotidie drachmæ pōdere, aliquando cum aqua mulla, aliquodū cum artemisiæ decocto, bituminis quoq; scrupulus utiliter ei ammiscetur. Nec parum hīdem confert æcerum scillinum assiduē potum. Atq; hæc curatio in morbi exacerbationibus adhibetur. Vbi uerō diuturnus factus fuerit, plerunq; à uenę sectione initū facimus, præsertim si menstruæ purgationes fuerint detente. Deinde ad alui euacuationē progredimur. Achiera quidē ex colocynthide omnīū efficacissima est. Mulieribus tamen & uteri affectionibus magis conuenit hiera ex aloē pīra, hoc est, amara, appellata, quæ habet aloē drachmas centum, asari, croci, cinamomi, mastiches, spicæ nardi, xylobalsami, singulorū dra. vi. Hoc medicamentū ariqū

seruari debet. Vfus uerō tempore ad integram alui ductionem, drach. iiii. ex eo cum aquæ mullæ cyathis sex propinetur. At si paritiam purgationē maluerimus, drac. ii. rāum ex tribus aquæ mullæ cyathis exhibebimus. Ita enim stomachū firmat, uires reparat, ac morbum depellit. Neq; post adeptam sanitatem medicamenti usus statim deferendus est, sed quantitas solum paulatim imminuetā. Peracta euacuatione, cucurbitæ inanes quidē, sed cum plurima flāma affigendæ sunt, & uiolenter detrahendæ. Aliquando etiā scarificatio fit, & scarifici loci sale cōsparguntur, deinde cū cyprino cerato ad cicatricem perducuntur. Deinde emplastrū siue epithema emolliens pectinī adhibeatur, quod è seminibus præparatur, suprā inter splenis auxilia descriptū, primum cum cerato dilutum, postea cerato paulatim detracto, ipsum solū per se imponatur, donec pustulæ uelut uari, in cutis superficie excidentur: quæ postquā emplastro albo, aut alio quopiam ad ambusta destituto, fuerint sanatæ, iam locus est sinapismis & dro pacinīs acopisq; appellatis, ex euphorbio, pyrethro, adarce, ac pipertis paratis. Multū uerō conferet ad medicamenta etiā recta uiuendi ratio, per deambulationes matutinas, gestationesq; in curru, uel nauī, uel iumento. A motu uerō gestationis prodest uociferatio, & lectio dara, modulata ac condigna. Item unctio, frictio, & exercitatio per congrua interualla repetita. Balneum autē raro, & non nisi fordis detergenda gratia adhibetur, & tamen bis, aut ter per totā curationem, ad morbū expellendum admitti potest. Postremum uerō confugij est ad balnea naturalia, tum calida, tum frigida. Recuperata tandem sanitate mulier non omnino negligatur, sed præseruationis gratia per certa interualla, suspectis præsertim temporibus, infectiones suprā relatæ adhibeantur, & saluæ, pulegij, mercurialis, fœni græci decoctis, loci eluantur. Et pelsi calefacientes & emollientes post elotiones subdantur. Philosophus uerō inquit: ad mulierem ex uteri strangulatu colapsam, plurimis remedijs frustra tentatis, duos statim glomos in oleum anethinum feruens coniectus: Et alterum probè expressum calidissimum loco adhibuimus, & antequam frigeret, alterum pro eo subiecit, hocq; uicissim tam diu repetimus, donec mulier citra dolorem exurgeret. Sed & ceratum ex araneis interdum umbilico imposuimus. Aliud, ad uteri strangulatus, ac dolores. Teastudinis terrestris hepar tritum in pesto subdito.

Pelsi ad uteri strangulationem idonei. Cap. lxxix. Pelsi ad strangulatum uteri idonei tales sunt. Adipis asnerini sexuncem, mastiches, adipis phasiani, styracis, singulorum quadrantem, ceræ quadratē. Vnguenti nardini, spicæ nardi, croci, singulorum unciam unam, crocus cum uino odorato ueteri teratur, siq; uini ad strictionis omnis exors. Alius. Ceræ sexuncem, ammoniaci, mastiches, singulorum unciam unam, opobalsami, olei irini, singulorum quadrantem. Alius. Styracis sextantē, ceræ albæ dodrantē, cassiæ, spicæ nardi, amomi, croci, mastiches, singulorū drach. i. adipis porcini, terebinthinæ, singulorū sexuncē, thuris sesquinciā, adipis asneris & phasiani, singulorum quadrantē, opobalsami, olei liliorum, amaracini, cyprini, nardini, irini, singulorū unc. i. Quodd si ualidiorem facere malueris, cardamomi

drachm. quatuor adijce, & seminis rutæ tantundem. Oportet autem aëris constitutionis respectu, ea quæ calefaciunt detrahere, uel addere.

Vnctiões ad uteri suffocationē, Philagrij. Cap. lxx.  
Vnctiões post balnea præseruationis gratia tales adhibeantur. Olei dulcis lib. i. seminis uticis, rutæ, cōsulorum singulorū quadrans, casiaë tritis quadrans. Omnia simul misceto, & sub canis gētu per dies quadraginta insolato. Quod si pro temporis, anni, aut regionis, aut temperaturæ calidioris siue frigidioris ratione, unctiōnis uim intēdere, uel minuere uolueris, addito ac detracto uti medicamentis quantum ex re esse iudicaueris. At si unctio præparata non fuerit, irino ungento rutæ, aut casiam, aut amomum, aut quicquam ex his quæ suprā dicta sunt ammisceto, ac uitōr. Possunt & citra balneum hæ vnctiões pectini, ac lūbis illini. Efficaciores autē euadent, si adarcen uisum, uel crudum, aut pyrethrum, aut piper tritum, aut oleū laurinum, aut cicinum, & reliqua eiusmodi addideris, ita ut unctio crassior fiat. Alia unctio ad eandē uteri strangulationē. Terbinthinæ, olei laurini, singulorum sex uncem, olei irini, anethini, singulorū lib. i. seminis cānabis, adarcæ, singulorū sextantē, piperis, saluæ, calamint hæ, singulorū unc. i. Pyrethri sextantē, nigellæ, casiaë, singulorum unc. i. Arida tenuissimē trita liquabilibus liquatis ammisceto, unito, ac adseruato. Vtus autē tempore aliquo oleo calido diluito, pectini, & ac lumbis illinito. Suffumigium uteri. Stercoris canini albi, & sabinae, æquales porciones suffico. Et si torsiones successerint, morbi uexationes quiescent.

Varia auxilia ad uteri frangulationē, Philagrij.

Cap. lxxi.

Mulieres ad uteri frangulationē proclives, diospolitico pharmaco assidue ui debēt, & eo quod ex tribus peris generibus cōstat, & quod ex calaminta appellationem habet. Singulis autē ammifenda sunt quæ semen minuunt, ac abolent, qualia sunt uticis, rutæ, cannabis semina, nymphaeæ radix, ac reliqua huiusmodi, quæ in uenerorum tractatu retulimus. Castorij quoq; drac. i. assidue potēt, modico aniso adiecto. At uerō si prægnantis respiratio intercepta fuerit, foris quidē ad corporis temperiem emendam, auxilia adhibenda sunt, uerū porciōnes, & quæ in uterum funduntur, aut subduntur, penitus uitare oportet, sicut etiā clysteres & sanguinis missionem. Ex omnibus enim his abortus periculum imminet. Cæterum meminisse oportet, ut his quæ neq; cōtractionem, neq; declinationem uteri patiuntur, pro humilitatis, aut siccitatis ratione medicamenta idonea exhibeantur, & ualidiora: sicut his quæ rarum, ac molle corpus habent imbecilliora, & rursus oppositis fortiora. Idemq; junioribus simpliciora, ætate prouectioribus efficaciora. Et his quidē quæ totius corporis distentionem à statu uetulo percipiunt, flatus leuantia exhibenda sunt. Quæ uerō grauitatem percipiunt, incidentia ac attenuanda. His autem quæ humorum acrimonia uexantur, laxanda, ac pinguia. At si declinatio, aut contractio, aut inflammatio circa uterum fuerit, omnia imbecilliora offerantur. Fortiora enim morbum exacerbant, & seminis excretionem prohibent. Et contrā quæ pro curandi corporis ratione moderata sunt, cum ipsi affectioni mendantur, tum seminis excretionem adiuant.

De seminis fluxu, Sorani.

Cap. lxxii.

Mulieres non aliter quā uiri ē seminis fluxu laborant. Est autē hæc affectio seminis citra cōditaōnē ac tensionem unereā profluuium, ad quod uteri laxatio, ac debilitas, & totius corporis tabefactio consequitur. A toto enim corpore materia paulatim ad uterum cōfluit, atq; isthic modicē uelut in oculis lacryma mutatur. Et sæpe contingit ut affectio hæc diuturna fiat. Quapropter recentē adhuc reprimere, ac sedare conabimur, per ea quæ sensum adstringūt, uelut resola, myrtus, rubus, leniscus, & huiusmodi. Pectini, & ac inguinibus acaciā, hypocythidem, & similia cū uino austro imponemus. Cerata item ac cataplasmata ē palmulis, malis cotoneis, ac myrti bacis adhibebimus. Laminam quoq; plumbicā laminam, ac tenuem lumbis alligare oportet, & stratum nō sit delicatū, sed potius asperum. Vomitus à ieiunio firmamentum fiat, à cibo tamen admitti quocq; potest. Præterea partes superne exerceantur, ac diu cōfricentur. Et cauendū ne affectus partes inungatur, aut calescat. In potu detur solani radix arefacta, aut uticis, aut rutæ, aut cannabis semē ex aqua, singula drachmæ pondere. Cibi uitandi sunt exolud, ac forbiles, & ad seminis generationē, ac uenerem excitandū idonei. Vescatur autē solidioribus eduljis, & auiulis assatus utatur, ac uinū solum bibat. Et omnia uitet quæ ad uenerem irritare possunt, ita ut neq; picturas, neq; signa formosa spectet, neq; de cōcubitu uerba faciat. Sed terlica uiuēdi rationē, lectionibus, ac colloquijs seueris utatur. Perseueratē uerō affectiōne, excidia, sudorū prolestationes, frictiōnes, & frigida balnea adhibeantur. Et rosacē assidue pectini, ac lūbis illinatur. Si uerō aliquādo ob acriorē cōstitutionem, ac qualitatē irritās, ac quodāmodo mordens sensum, semen ipsis prodit, contrarijs cibis, ac potibus utatur, balneis item, ac lactis potu, & fructibus, & aquæ potu, ac similibus. Transferantur etiam huc quæ ad seminis profluuium in uiris, & ad seminis in fomno effusionem suprā relata sunt.

De uteri debilitate, Sorani.

Cap. lxxiii.

Quodāmodū aliæ corporis partes, ita etiā uterus aliāquādo debilitatur. Cōsequitur ad hanc affectiōnē, fistidius ueneris, flatus uetoli ex cernuntur, menses exuberant, & singulis mensibus bis, aut ter inordinatē deferuntur, nigri & aquosi. Neq; semen uiri in cōcubitu diutius detinetur, sed à cōcubitu defluit, aliquibus statim, quibusdā post aliquot dies. Quedā abortū faciunt, alique nō abortientes gracilē, ac imbecillē fetum generāt. Menstruorū uerō tēpore pectinis, lumborum, ac crurū grauitas adeit, & stomachus male habet, & hinc uaporibus ad caput eleuatis aliquādo deliria succedūt, similesq; sunt harū uexationes his, quæ ab utero sirāgulantur. Quādoq; etiā uelut attrahibile periclitē desipiunt, ac furore aguntur. Oritur hoc malū ex assiduō partu, ac uteri distictione, præsertim ubi fœt? insignis fuerit magnitudinis. Curatio earū facienda est, per ea quæ firmadi, ac debiles partes corroboradi uires habēt. Infectiones itaq; adstringētes ad tactū tepidæ, & uteri elotiones conueniunt. Et rosaceum oleū tepidum, aut narcisīnū, aut mēlinū, aut sulinum, & huiusmodi, pectini ac lumbis illinatur. Et mulier per congruos motus assidue exerceatur, & alimentis utatur paucis quidē, sed quæ cum leui quadam adstrictione carnis copiam generant. Vinum autem

autem fuluū adstringens parcissimè potest. Est enim sitis huic affectioni commoda. Omnem uerò lactis esum, & obsonia è caelo parata uitare oportet, uniuerfas itē purgationes, atq; alui ductiones recusare.

De furore uterino, eiusdem.

Cap. lxxiiii.

Furor uterinus est uteri intemperies, ad affectionis cōsensum cerebrū trahēs, ad quā rabiosum delirijū consecutur. Differt ab uteri strangulatione primū causa, neq; em hic uterus fursum tractus principalē aliquā partē ad affectionis cōsensum ducit, aut cōpressionē, aut morsum, aut uaporem, sed eodē loco permanēs: per medullā spinālē, aut alias sibi insertas propagines, uti doliā qualitātē quācūq; tandē ad cerebrū mittit. Deinde etiā signis ab uteri stranguatione differt. Aegrotæ em minimè in hac sicut in illa affectione mutæ, ac sine sensu decubunt, sed potius garrulæ, iracundæ, ac iniquitæ fiunt. Differt etiā à furore nō per cōsensum, sed primario cerebrū impetente. Harū enim amētia tota in uenere uersatur, & nihil aliud imaginantur, aut loquuntur, q̄ de colu, pruriēsq; pudendū habēt, eiusq; tactu mīrū in modū delectātur. Accidit hæc affectio tēperatura calidis, ætate uigentibus, uirginibusq; ac castitatē seruātibus, & quē optimis delitijs uescitur, & in delicijs ac animi uoluptate uersantur, p̄cipue si aliās libidini, ac ueneri aduersæ fuerint. Nihil em aliud est hæc affectio q̄ ardor, & feruor uteri, ad cerebrū & totū corpus distributū. Proinde q̄ suprà ad calidā uteri intemperie relatā sūt utero adhibēda, huc transferantur. Irrigationes autē capitis, & alia auxilia furori cōgrua; Sermone sextro retulim⁹. Peculiariter autē huc facit passillus Trigonus, cū æquis portionib; crocomagmatis, ac cyphæos aromatici. Facit & hydrorofati potus. Et hoc medicamētū, Smyrni, croci, spicē nardi, sing. unc. i. excipe dicam⁹, aut hydrorofato, & dra. ii. pōdus ieiunis exhibe cū coriandri decocto. Quodd si ob corrupti seminis redūdantiā affectio contigerit, nitrū & cardamomū cerato excipito, ac pudēs subdito. Saliuē em simile qd̄ dicitur, & affectio sedatur. Ruta uerò cū castorio in myrto cerato supposita, genituram siue semē cōtrahit, & furorē mitigat. Sed & diacodium aceto aut solani succo ammixto subditū ardorē extinguit.

De uteri resolutione, eiusdem.

Cap. lxxv.

Verus sæpe etiā ob alias causas, sed maxime ppter frequentes abortus resolutioni. Cōsequitur ueneris odoris uteri frigefactio, eiusdēq; plenus, pinguis, & uel infartus habitus, ceruicis itē laxitas ac stupidas. Sæpe etiā mēses supprimuntur, aut ægre prodeunt. In cōgressu uiri, uel nihil omnino seminis in uterū immittitur, uel iniectū uelut ex inanimato loco statim effluit. Aliquādo etiā uirina & steruus importune prodit. Curatio autē similis est ei quā de mēstruorū stillididio dixim⁹; facit & aspidiū castorij potus, & peforū calefactiētiū, elotionūq; ac unctionū adhibito.

De uteri prolapsu, eiusdem.

Cap. lxxvi.

Prolabi uterum dicimus, quum ita eueritur, ut foras promineat. Neq; enim totus à suis appendicibus exolutus, uel totus imperitū putat, excidit. Nā si ita procideret, restitui nō posset. Quodd autē procidit strutho camelæ ouo simile est, iuxta maioris, ac minoris distēctiōē, prout uiolēta euerfio cōtingit. Sunt autē prolapsus causæ multæ. Ab alto enim delapsa mulier, & in coxas delata, dirupis pelliculis, ac ligamentis, quæ uterū continent, ac uicinis partibus cōnectunt,

hoc malo corripitur. Corripitur & ob uiolētā secundæ extractionē, quod præcipue in abortibus cōtingit. Præterea inarūscibila focus extractio, aut nimia spiritus detectio, aut immēsi oneris eleuatio, aut plaga, uteri prolapsum inducit. Sæpe etiā ob humoris plurimi, ac lentī defluxu, & ob partuū frequentia, appendices ex quibus uterus dependet, laxantur, ac soluantur. Quin & ob uehementis animi affectus, uelut si liberorū amissio, aut hostium incurfus nunciatur, aut ob periculosa nauigationē, aut eiusmodi quandā causam, mulieres toto corpore exolui solēt, ita ut uterus simul prolabatur. Aliquādo etiā citra ullā eiusmodi causam partes debilitantur, ut propter pellicularū, ac musculorū uterū sustinētiū resolutionē, hæc affectio cōtingat, qd̄ inclinata ætate maxime fieri solet. In principio itaq; plurimus sanguis erūpit, deinde cōsequitur dolor p̄cordiorū, lūborū, imi uētris, ac pudendorū, & periculū est ne frigoris locis cōuulsi inferatur. Vbi uerò tēporis p̄gressu affectio inualefcit, & loci callosi facti fuerint, neq; conuulsionis periculū imminet, neq; dolor infestat. Quē ergo adhuc recēs est affectio, conari oportet, ut uulua ipsa cōtrahatur. In principio em facile dirigitur, & recte locata pmanet, præcipue in uigoris ætate. Nā ætate prouectiorib; cōtrahitur qd̄, sed ex leui occasione rursus plabatur. Si itaq; durū fuerit in recto intestino esse suspicaberis, per dysterē euacuaabis. Similiterq; si in uesica lotiū collectū fuerit, p̄ fistulā uesicæ adaptatā euocabis. Cōtingit em plerūq; ut illarū superfuitatū detractione, uterus inter utrūq; rectū in quā intestinū, ac uesicā situs, cōprimatur ac coarctetur, & impediatur, ne repellat, & ad priuū sitū reduci possit. His aut peractis ægrā supinā collocauius, coxis alioribus, reflexis poplitibus, ac cruribus disparatis. Deinde plasmam uteri partē oleo tepido, aut butyro, uel betæ, maluæ, althææ, fœni græci, seminis lini, aut similī decocto fovebimus; & la nā cōuolutā figurā ac crassitudine muliebri pudēdo correspondētē accipiem⁹, eaq; linteolo inuoluemus, & acaciæ, aut hypocistidis succo uino diluto intrin gemus, ac utero apponemus, & citra uiolētā totum quod prolapsum est reprimemus, donec tota moles intra sinū recipiatur. Postea lanā in pudendū subdemus, & aliū lanę hapsum uino adstringente imbutū supponemus, atq; totū pectinē spōgij ex posca expressis integemus, & mulierem reclinabimus crura extēsa, ac coaptata habentē, ita ut alterū alteri incumbat. Tutius tamē fuerit p̄ fasciā ad genua usq; cōstringere. Aliqui uterū recens prolapsum cucurbitæ do mesticæ, ac betæ decocto, cum urina graueolēti, aut acri aceto, aut re aliqua scitida proluunt. At uerō si prolapsus uterus tēporis progressu intumuerit, plurimòq; humorē referus fuerit, ut præ tumore reduci nō possit, betarū decocto ipsū rigamus, deinde aceti affundimus, & salē tenuissimū inpergimus, & postea sedato tumore, eodē decocto p̄fusi retru dimus. Deinde cucurbitas umbilico, & utriq; lateri cum plurima flamma affigimus, & odorata asidū ē naribus ad mouemus. Tertiā uerò diē lana adhuc intra pudendū sinum existente, mulier in uino nigro aut ferō aliquatenus tepescit, aut in myrri, lenitici, rubi, ac malicorij decocto insideat. Et post infessionem rursus supina coxis alioribus locetur, & sublata ex pudendo priore lana, alia rursus eo dem



dem medicamento imbuta subdatur. Cataplasmata uerò forinsecus imponantur ad imū uentrem, ex palmulis, polenta, lēticula, ac malicorio, cū aceto mulso. Atq; hæc rursus tertia die fiat, usq; ad perfectā curationem. Porro uteri crebro prolabētis posca abluantur, in eademq; mulier diutius insideat. Deinde omnia relata fiant. Sæpe uerò ob locorū sensus subtilitatē, reiecto aceto terram nigrā quā in lenibus reperimus aqua diluimus, & ex ea partē affectam plurimum fouemus, ac postea eadē medendi forma utimur. At uerò si uterus ob humorū lentorem difficulter repellitur, uini fecem utatur, aut nitrū lixiuio permixtum obluimus, & cū decocto adstrin gente, aut cum prædicta terra aqua diluta fouemus. Deinde plumbi cremorem oleo myrteo, aut melino ammixto, parti prolapsæ illinimus, ac in sinum pudendū retrudemus. Locī insuper interni, ægra undiq; circumiecta rebus forēdis sufficiantur. Naribus autē odoratissima quæq; admoveantur. Et cibibosni succi, & uina odorata tenuia offerantur. Ferūt torpedinis coriū recēs deactū, parti prolapsæ obuolūtū, ipsam repellere: atq; idē posse pastinacæ marinæ aculeis cū hyofcyami succo illitū. Illud autē obseruandū est, ne alius nimis subducatur. Exoluuntur em la xaturq; uicinas partes, & uterus recidit. Si uerò pars prolapsa teporis gressu p negligentiā cōpuruerit, & ex assidua urinæ irrigatione & adherētibus forētib; exulcerata fuerit, auferatur citra ullius periculi formidīnē. Narrat em torū uterū putrefactū aliquādo ablātū esse, & mulierē nihilominus superuixisse.

De reclinatōe, auersione, ac recurſu uteri,

Aspasie,

Cap. LXXVII.

Suppresis mēstribus necesse est uenas, & arterias ad uterum tendētes repleri. Nā sanguis usq; ad uasorum oscula accurrit quidem, uerū intra uterum prodire non potest, aut eō quōdā nimio crassitudine oscula impingitur, & grumofus fit: aut quōd ipsa oscula clausa sunt, & transitū impediūt, ita ut uenæ humores referre extendantur, & uicinos uteri appendices humectent, quorū extēsiōne uterus retrahitur. Si itaq; ex utraq; parte æqualis retractio fiat, reclinatio, aut reuulsio, siue recurſus uteri æqualis cōtingit. Si uerò in alteram partem maior retractio fiat, alterum ē uisceribus his in causa est, splen uidelicet aut hepar, quorū uenæ superfluo sanguine extētae a suis partibus uterū retrahunt, hepaticæ uenæ ē dextris, splenicæ ē sinistris, prout alteræ magis fuerint repletæ. In utram uerò partē uterus declinauerit, digitorum admotione, & signis insequētibus cognoscemus. Si enim in obliquum declinauerit, propinquū femoris distēdo, dolor, perfrigeratio, impedimentū, & torpor indicio erit. Aliquando uerò etiā eiusdem affectio, & ad innitendum, ac ambulandū impotentia consequitur. Si uerò retro, aut infra inclināt, torpor ac difficilis urtiusq; cruris motus sequitur, sæpe etiā motus penitus intercipitur, & ingens uexat dolor. Alius etiā supprimitur, necq; clysterem admittit, nisi genibus sonitatur ægra. Flatus item retinentur, & dolores inter sedendū acuntur, præsertim si uersus anum reclinatio contigerit. Ac si ad pubem uergit, imus uenter, ac pectē extēditur, & dolores ibidem percipiuntur, aliquando etiam urina supprimitur. Quomodo docēq; igitur uterus retractus, ac inclinatus fuerit, eodē modo uelut inflāmationes in exacer

bationibus curare oportet. In remissionibus autem & declinationibus, magis emollientibus utendū est, Perseuerante uerò affectione, his quæ ex alto attractæ, & corporis habitum mutare possunt. At uerò auersionem uersus anum ita curabimus. Primū obstricti imperabimus, ut digito in anum immisso uterum propellat. Deinde glādem ano subdat quatuor digitorū longitudine, ex galbano & cera paratam, culoris extremitatē filum extractionis gratia sit annexum. Aut castoriū aqua dilutum, & lana excēptum similiter subdatur. Aut bitumen aridum, aut pix liquida. Postridie uerò irinū, aut susinū oleum tepidū, in uterum & intestina infundatur. Et loci aromatum, aut marrubij, aut conyzæ decocto foueantur, & ex eodē uterus eluatur. Postea ceratū rosaceum adhibeatur. Si uerò in obliquū retractio inclināt, primū eadem fomenta adhibeantur. Deinde obstricti specillo cum digito subimmissio, uteri colli dirigat. A ægra uerò in cōtrarium partē affectæ latus, aut supina decumbat. Pēsis insuper mollicētibus aperitibusq; utemur, & ex prædictis oleis aliquid infundemus, & pectini lanā uinō, & rosaceo imbutam, aut succum seminis lini cerato exceptum imponemus. Et castorium cum aniso, aut cumino, aut nigella, aut pæoniæ radice, aut smyrnij, aut dauci semine, aut aristolochia, aut gentiana, aut helenio, ex aceto mulso propinabimus. Eadem etiā ad repentinos uteri dolores faciunt, nō singula solū per se, sed etiā simul cōfusa. Mulier autē acclui capite decubabat, & si cōpositus rectē uterus rursus retrahatur, scetida statim naribus admoveantur, & sternutationes prouocentur. Et si urina supprimatur, fistula uesicæ ad hoc destinata prolidatur. Et si ab his exacerbatio fuerit exoluta, quiescendum est. Cæterum pro afflictionis magnitudine, si ægram adolēscētem & sanguineam nati fuerimus, considerabimus an cubiti uena sit secanda. Deinde menses prouocantia propinabimus, & pēsis mitioribus utemur.

De uteri inflatione.

Cap. LXXVIII.

Vterus aliquando ex partu perfrigeratus statu impletur, osculo ipsius concluso, aut grumo sanguinis in ipso impacto. Flatus autē ipse quandoq; in uteri cauitate cōcluditur, quandoq; in corporis ipsius uteri angustijs cōtinetur. Cōsequitur pectinis, ac imi uentris tumor, uelut in hydrope tympanite, cum dolore pungitū, perungēte usq; ad septum transuersum, & stomachum, & nihilominus utrinq; in lateribus extēto, & sæpe ad alterū, sæpe ad utruq; inguen se extēdente. Umbilicum item lumbosq; ac pectinem idem infestat, & caput quoq; per consensum afficit. Quandoq; uerò flatus per muliebrem pudendū erumpit, ut ægre id percipiat. Si itaq; flatus in uteri cauitate fuerit conclusus, strepitus, ac sonitus quidam in corporis flexu auditur, qualis in intestinis cōtingit, quæ torminibus uexantur, & ad digitorū pulsationem sonus tympani redditur. Si uerò intra uteri angustias cōtinetur, dolores uchemētiōres, ac curatu difficiliores infestant. Huiusmodi autē affectiones fame, ac olei dulcis calidi irrigatione, in quo ruia & anethū decoctū sit, curantur. Et nisi ætas, regio, & anni tēpus obstituerit, uena secetur. Infectionesq; in rutē, pulegij, calaminthes, marrubij, thymij, artemisiæ, althææ, ac caricarū decoctis fiant. Et corpus per hies rā Rufi, & Archigenis ex colocynthide euacuetur.

In exacer

In exacerbationibus autem uulua his colluatur, quæ laxandi, ac flatus discutendi vires habet, quale est oleum gleucini, & pessum eiusdem facultatis plurimo oleo dilutus, & per uteri sulcorum clysterem immittitur. Cataplasinata etiam leuia ex caricis, hyssopo, ruta, ac nigro imponantur. At uerò si flatus ob impactos grumos fuerit cõclusus, postquam ægra in aliqua ex relatis infestationibus diutius cõsederit, obstetricis digitum illiutium in pudendi sinum immittat, & grumum sensim dissoluat, ac educat. Perseuerate uerò inflatione, in exacerbatione efficaciora adhibeantur. Interpositio quoque temporis spatio, illstationibus calidioribus, crurumque, ac affectuorū locorum frictionibus utemur. Et lumbis ac pectini dropacem adhibebimus. Aut rubefactoriū ē sinapi & caricis. Aut farinā ordeaceam cum caricis, ruta, hyssopo, & melle coctā. Aut epithema ex seminibus, aut ex bacis lauri. Aut post yarchitū cerato cyprino exceptū. Aut postea etiam per se solum. Pessū quoque eiusdem facultatis subdātur, ex terebinthina, galbano, fride, ruta, & celypo. Et qui ex pulegij, niri, mellis, fellis taurini, & æquis portionibus paratur. Maxime autē cõuenit hic. Caricarum pinguis probē cõsumatur, ut granula non percipiatur, drachmā unam, cumini drachm. duas, spumæ niri albæ drachmam unam. Verum ad acrimoniam obtundendā, pessum hunc in lac prius immergere oportet. Cucurbitæ quoque affigatur, & uolenter detrahantur. Aliquādo etiam scarificatio fiat. Utendumque est omnibus quæ ex alio materiam attrahere possunt, & balnearū naturalium aquis prius calidis, deinde frigidis ut corpus ad tolerandā frigiditatem sensim alliciatur, & affectæ partes paulatim firmetur. Alimētā quoque attenuatā, ac flatus discutientia exhibeatur. Et medicamentū dispositiōis, ac calamintina cõstans aliquādo exhibeatur. At uerò auxilia amplius medicata, & aromati fuisse, itaq̃ capitū noxios reprobamus. Sed & epithemata adstringētā, qualia sūt quæ ex palmulis, ac malis coroneis parantur, & similia, ad hāc affectionē inopia sūt.

De uteri hydrope.

Cap. lxxix.

Quum mentes longo tempore fuerint suppressæ, & impregnatio impedita, sæpe humoris copia in uterum confluat, & aliquādo corpufcula quædā uiscæ felis similita in ipso generantur, in quibus humor colligitur. Sequitur affectionem hanc, tumor circa imū uentrem amplus, laxus, flatusosus, & murmura uentris in intestinis, in ambulando grauitas, & spirandi difficultas, alut recemētā grauelēda sunt, & menses ac cõceptus impediuntur, & quæ prodeit nullo ordine seruato deferuntur. Vbi uerò uoluerit excernitur, rupis aliquādo paruis illis corpufculis, quæ uiscis similia diximus, uiscosa quædā, ac aquofa erumpunt. In quibus itaq̃ humorē in utero collectum ex proprijs signis cognoueris, deubitu quieto, mōx uomitu, ac ualidis elotionibus utēdum est. Proinde coricis radicis thymalli myrei sicci dra. ii. per se, uel cū radicis panacæ obolo propinabis. Et in uterum infundes quæ mucosos humores attrahūt, qualia sunt, granti nidi grana decem, cum oleo irino & modico melle. Aut uerati nigri drach. ii. cum irino aut cyprino, aut nardisino oleo, cum modico melle per uteri sulcorum clysterem infundito. Verū ante has elotiones, cardamomū cū sale, aceto mulso, thymo, pulegio, calamintina, aut similibus quopā bibendū da-

bimus. Deinde humorum copia per alium excreta, prædictæ elotiones infundantur. Aut pessū eiusdem facultatis subdatur. Et postea sinus pudēdi aqua marina proluatur, primū sola, deinde addito aceto; & aliquo ex prædictis in ipsa cocto. Elotione peracta, ac locis probē deterfis, pudēdo ac femoribus oleum cyprinum illinatur. Medicamēta uerò ipsēdē cõuenientia hæc sunt. Pulegij drachmā unā, cum modico pipere, Aut gentianæ uel origani drachmas duas, cum semine dauci, uel symij, cum uino mulso, aut aqua mulsa in potu dentur. Salis præterea cõmunis loco alimentis inspergatur hoc. Hyssopi trientē, pulegij quadrantem, origani, cumini, singulorū sextantem, seminis amij, spicē nardi, singulorū unc. unā, salis tostij quadrantē. Trita misce, ac utere. Sed & pudēdi sinus resina, myrrha, & amomo suffragatur. Pessū autē huiusmodi utendū est. Nitri, colocynthidis, singulorū quadratē. Melle excipe, & pessum inde paratū oleo cyprino cōsum subde. Alius. Cumsani & niri quales portiones melle excipe. Potest & uiolæ albæ semen addi. Alius. Colocynthidis quadrantē, salis unc. i. pingui caritarū carne excipe, ut sit suglādīs magnitudo, & inde pessum paratū subde. Humore enim scitidum attrahit, ac misce prodest. Idem sed inditus, stercoreis & humoris, ac flatusum copia elici, & uterum leuat. Alius. Cômæ abstinij, ammoniaci thymamatis, singulorū dra. i. æris usti, niri, singulorū dra. i. i. melle excepta subdito. Hoc autē placidissime & citra omnē dolorem attrahit. Cicutæ semen, aristolochiæ, cumini, sale, carni caritarū excipe & subde. Cæterū ad aquæ receptacula, eas uidelicet uescas quas in utero generatū diximus, formētis utemur ex aromatis, quæ menses eliciūt, & pessis sanguinē trahētib. Ex quorum numero hic est. Cneori, quod est granti nidi radix, aut illo nō præfente, chamelæ, elaterij, casia, singulorū dra. i. i. aluminis scisti, misyos, sādarahe, myrrhæ, costi, croci, singulorū dra. i. i. melle excipito, ac aluo pridē euacuata per clysterē, pessum inde paratū subdito, integratūque diē, ac noctem sisto. Et si semel parum eduxerit, rursus subdito. Si uerò mōrdacitatem induxerit, cœturij decocto tepido sinus pudēdi foueatur, ac eluatur. Et mitigadi grātia pessum miositoris subdatur. Aut dicuræ semē cū aristolochiā, cū mino, sale, ac caricis, uelut paulo ante diximus subijciatur. Mitissimū uerò omnium ad huiusmodi pessimæas & aqua referas uescas, est mercurialis masculæ semē, cū modica myrrha, sale, ac melle, lana exceptū, & multis diebus subdito. Post harū autē educationē, exercitijs, sudoris puocationē, & ualidis totius corporis, & præcipue imi uetris frictionibus utēdū est.

De mola uteri.

Cap. lxxx.

Quæ mola appellatur, tumor est uteri induratus, aliquādo prægræta inflammatione succedēs, aliquādo post locale ulcus, cui caro superexcreuit. A morus autem difficultate, & grauitate, molæ nomē accepit. Cõsequitur hūc tumor, detractio partū superficubentij, gracilitas, coloris uiscido, & appetitus frustratus. Et primū lenē cõceptus suspitionē de se præbet. Nā & manifeste supprimuntur, & māmæ inuēscunt, & stomachus subuertitur, & lumbi grauantur, uetereq̃ anollitur, uerū tēporis pgressu discernitur. Mola em̄ dolor pūctionis sensu inseris subsecquitur. Nec in ea morus ullus, uelut in utero cõceptu percipitur.

capitur. Quin & postea toto corpore imminuto, ac uentre ampliato, hydrops imaginē prae se fert. Discernitur tamen ab illo per tumoris duritiā, & quod tumor hic ad digitorum appressione, ac pulsatione non cedit, neq; tympani sonū, uelut in hydropse edit. Et quod neq; ad manus contactum ulla fluctuatio percipitur. Aliquando tamen temporis progressu hepar refrigeratur, & hydrops superuenit. Quidā uerō tradunt in quibusdā mulieribus carunculas ad iuglandis nucis magnitudine per pendendum excreta esse, aliquando singulis mensibus, aliquando bimestres, aut trimestres. Hanc affectionem alij uelut incurabilem penitus reliquerunt. Alij indipientem tantū curari posse credunt, negligenda tamen non est, sed omnia quae cōuenire uidebuntur, facienda. Cataplasmata igitur laxandi uiribus praedita, somenta, elouones mitigatorias, pessos mollitorios, ad duritias infra descituros, inflexiones eiusdē facultatis, & cerata ex althea & oleo cyprino parata adhibebimus. Et malagma ex succis, & quod Mnaseae inscribitur imponemus. Deinde cucurbitas cū scarificatione apponemus, & alimenta boni succi offeremus. Atq; haec quidē in ipsis exacerbationibus adhibere oportet. In interuallis autem corpus reficiendum est per ea quae id praestant, gestationē uidelicet, deambulationē, balnea, & cibos conuenientes, ac uiuiporum. Partibus item affectis dropaces adhibebimus, & nitro ac sale inspersis easdē insolabimus. Et per medicamentū ex sinapi, & caricis rubificabimus. Epithematis insuper mollitioris ex feminibus, ex baccis lauri, & polyarchio, ac similibus utemur. Suffitum etiā uaporis aquae marinae, aut murrinae adhibebimus, aut decoctū soliorum, & ac baccarū lauri, pulegij, thymi, hysopij, saluiae, marrubij, artemisiae, centaureae, dictamnij, scordij, polij, olla autem operculo perforato arundine inserta sellē supponatur, atq; inde per arundinem uapor intra pudendum recipiatur. Pessī item subdantur ex cypso, butyro, adipe asinerino, medulla, aut cerebro ceruino, melle, caricis pinguibus, uuis pallsis, cum oleo antiquo cyprino, irino, sampuchino, amaradno, fusino. Perseuerante uerō malo, acrimia eduliorum efus assumatur, & innatales aquarum calidarum, & aquae marinae. Et ab acceptis raphanis uomendū. Pessos tamē & inflexiones acrioris uitare oportet, ne loci ex assiduorum usu exulcerentur. His autem transactis, sepe plurima auri ac grumosi sanguinis copia repente excernitur, & affectio dissoluitur. Philosophus uerō de tenetis inquit uxoris amici cuiusdā mensibus, arbitrabar primū ipsam concepisse. Postea autē cito amplius tumore, hydropē suspectū habui, quia totū corpus, ac pedes tumescere uidebā. At ubi tandem id affectionis genus esse deprehēdi, quod alij laetrem, alij molā uocāt, rutā & anethū in uino ueteri suluo odorato coxi, & abiectis herbis, uinū calidū bibendū dedi, & feruē aquae loco exhibui, statimq; mulier excreta sanguinis copia salutem adepta est.

De tumore uteri laxo, Sorani.

Cap. lxxxii.

Vteri tumor laxus pallidus, ac albus est, ad tactū molliis, & digitorū cōpressioni cedēs, seq; rursus paulatim autollēs, & cuius uētris manu appressā facile attrahitur. Locū itaq; oleo cōmuni calido, aut irino, aut cyprino rigetur, & pessī subdantur, ac reliqua auxilia adhibeantur, quae supra de uteri inflatione retulimus.

De Satyriasis, eiusdem.

Cap. lxxxiii.

Mulieribus quoq; satyriasis, & tēgio accidit, qualē uiris fieri supra retulimus. Cōsequitur ad hanc ingens pudēdōrū pruritus cū dolore, ita ut mulier locis assidue manus amoueāt. Atq; ideo intolerabili ueneris desiderio cōturbetur, & salū humoris effluuio acrimonia, ac mordacitate percipit. Et loci uero uiciā nī inflāmitur. Illud uerō ardens cōiundi desiderij seuiorē reddit affectionē. Quom enim partes affectae distēte sint, & semē externi nō possit, quoniā meatus per inflāmadonem obturatur; maior materij copia frustra ad locū attrahitur. Statim igitur a principio uena ipsis secāda est, & alimentū cōtrahendum; Et pubi, ac lumbis illinēda quae leniter refrigerāt, ac cōtrahūt. Caput aceto & rosaceo irrigetur. Et in potu aqua tepida exhibeatur. Cibi uerō sint forbiles, omnis prorsus flatus, ac uenerae cōcitationis exortēs. Duobus uerō ā uenę sectione diebus, cucurbitae cū scarificatione affigantur. Reliqua uerō curatio eadē sit cū ea quā ad inflāmadonē uteri mox referem.

De uteri inflāmadone, Philumeni. Cap. lxxxiiii.

Vteri inflāmadō ob multas causas cōingit. Nā & ex plaga, & mensū suppressione, & abortu, ulceratione, nimio coitu, sellē durioris infessu, longa ac intentā ambulatione, frigidioreq; ac flauositate oboritur. Indicāt hanc muliebriū locorū, pubis, imi uentris, ac lumborū dolores ardentēs. Et si digitus in os uteri sumbitur, occurrit ad contactum durū, clausum, seruēs, ac retradum, praesertim si in ipso, aut in collo fuerit inflāmadō. Nā ubi cauitas, aut fundū uteri inflāmadum, imi uētris dolor ostendit, ut ne cōtactū quidē foris admittat. Et plerunq; uterus ad inflāmadū locū retrahitur, atq; hāc ob causam os, & collū eius auertitur. Dissert autē ab ea quā supra uteri retractionē appellauimus, quia in inflāmadione febris est acuta, & ardor intensus. Si uerō posterior ipsius pars inflāmata fuerit, dolor circa spinā magis haeret, & cōpresso intestino recto stercora detinentur. Anteriorē autē parte inflāmata, urināe difficultas, aut stillicidium cōsequitur ex cōpressa uesica, praesertim si dolor pedine affligit. At ubi obliquos laterū locos inflāmadō occuparit, inguina distēduntur, & crura grauātur, ac egre mouentur. Inualescēt uerō inflāmadione, febres accedunt, dolor capitis, stomachi afflictio per cōsensum, imi uētris tumor, ardor, distēctio, grauitas coxarū, lumborum, praecordiorum, inguinum, femorū, horrores discurrentes, ac pungenes, pedum corporis, genuū refrigeratio, extremarū partū exudatio, pulsus parui, ac densi, animi deliquit, exolutio. In augmento uerō etiam singulorum dolor tenetis, collī, maxillarū, incipit, oculorū praesertim in fundo. Vrinaq; ac stercorum crementa supprimentur. Et inflāmadione adhuc magis aucta, febres augetur, delirant, dentibus siccant. In principio itaq; curationē aggressi, aegrotam in domicilio obscuro, & moderate tepido collocabimus, quietem imperātes, & omni crurum motu interdcentes. Deinde artus manuum cōtractione demulcebimus, & pedum, ac manū iūcturas fouebimus, irrigabimusq; ac lana pura integremus. Aluum autem eluimus, & molli infuso euacuabimus. Aluum autem eluimus, & ad oris collutionē, aquam calidā, & pisanā succum dabimus. At si uehementior inflāmadō fuerit, & neq; etas, neq; habitus, neq; anni tēpus obstitit, neq;

neq; inflammatio post abortū, aut nimiam sanguinis euacuationē superuenit. Cubiti uena secetur, & sanguis pro uiriū ratione detrahatur, licetq; in secunda die uenam incidere, in tertia uerō detractionē repperere. Deinde alica ex aqua mullā, aut pane loto, aut ouo sorbili, ægra alternis alatur, omnibus his moderatē exhibitis, seruēt inflammationē lana succida uino & oleo, aut aceto & rosaceo imbuta, imo utri, ac pubi imponatur. Aut palmulæ uino coctæ. Aut mala cydonia in posca cocta, cerato melino, aut rosaceo ammixta. Cataplasma uerō imponatur sic paratū. Melilotū in passo coquito, ac terito, & uitellos ouorum assatorū addito, & cum rosaceo, aut melino, aut crocino imposito. Aut palmulas uino diluto seruē factas, cum polentæ farina, & aliquo ex prædictis unguentis terito, ac imposito. Cæterū ad inflammationes erysipelas igneo ardore cognobilis, utendū est cataplasmatibus ex polenta, & intubo, perdidō, umbilico ueneris, sedo, polygono, pampinatis uitis, portulaca, plantagine, & similibus præparatis. Et lana aliquo harū herbarū succo, cū rosaceo, aut melino oleo imbuta, in pudēdū subdatur. Quod si cataplasmatū onus loci nō tolerent, aqua rosaceo ammixto ex modicis intervalis affundatur. In exacerbationis declinatione totū corpus inungatur, & ægra in aqua tepida usq; ad lumbos insidere iubeatur. Deinde pelsi subdatur ex aliquo unguento leniter adstringēte parati, rosaceo uidelicet, melino, lenticiano, ac cœnanthino, adiectis ouorū uitelis crudis siue assatis, & croco. Potest & ex prædictis succis aliquis ammisceri. Caput præterea rosaceo cū modico aceto irrigetur. Mitigata uerō inflammatione, mulier in aqua oleo ammixto insideat, & pessos ex narcissino, aut fusino unguento paratos subdat. Et lanā oleo calido imbutā pectini, ac lūbis adhibeat. Interdum & cucurbitæ lumbis affigantur, & tumore magno existente, etiā scarificatio fiat. Postquam autē inflammationis declinare incœperit, ad ea deueniemus quæ laxare, ac discutere possunt. Proinde in foeni græci, althæe, seminis lini, interdum etiā pulegiæ, marrubij, saluæ, artemisiæ decoctis, ægra insideat. Et ad imum ueneris, ac pubem, farinā ordeacæ cum foeno græco & lini semine, in aqua mullā coctā, imponat. Aut caricarū decoctū adhibeat. Quæ uerō cataplasmatum grauitatem, ac calorē ferre nō possunt, in aqua tepida insideant, & rosaceo locos illinant, ac pessos subdant moderatē refrigerantes, ex adipe gallinaceo, rosaceo, ac uino præparatos. At his quæ calorē ferunt, ceratum nardinū adhibeatur, & infusiones insinuantur, ac pelsi subdantur, ex cœlypo, butyro, medulla ceruinā, adipe anserino, unguento fusino, & cera tyrhænica, ubi uerō curatio processerit, tenuis uictus & ciborū parsimonia tollatur, & manifesta iā facta declinatione, balneū ac uainū concedi possunt, & cibi resiccentes exhiberi, malagmataq; adhiberi, uel ut quod ex meliloto paratur, & quod ad Mnaeam, & quod ad Serapionē refertur. Pelsi porro ad sedatos inflammationū dolores uteri, tales sunt. Foeni græci madesfacto, & prima ac secunda aqua diffusa, cū tertia pura, ac dulci coquito, ac excolato, & ad decoctū adipe anserinū, uel gallinacē recerem addito, & ad prunas liquari sinito. Et ubi frige facta fuerint, cōretū adipē tollito, ac seruato, atq; usus tēpore spatula in manu subactū pello excipito, ac subdito. Alius

dolores sedans. Papaueris capita passo coquito, & flaccida facta exprimito, & ad decoctū excolatum medullā ceruinam liquatā ammisceto, ac uitior: si ceruinā medullā defuerit, uitulīnā accipito. Alius. Foeni græci aridi trid, ac cribrati drach. iiii. in passo cretico, aut sapa coquito. Et terebinthinæ, adips anaseris, singul. drach. iiii. rosacē lesequitū accipito, & omnia simul liquefacito, & foeni græci decoctō ammixta pello excipito, ac subdēda dato. Alius pessus soporifer, dolorē mitigās, & oēm duritiā molliens. Tria papaueris capita magnitudine mediocri in quatuor pelsi cyathis p biduū macerato. Deinde coquito, donec capita flaccescāt, & passum ad tertias redigatur, postea expressis & reiectis capitibus passū excolato, & galbanī, myrrhæ troglodytiæ, thuris, opij, singul. lesequidrachmā, casæ drach. iiii. accipito, & singula seorsim primū, deinde simul probē terito, & capitulorū papaueris decoctū paulatim addit lato, donec omnia ad mellis cōpagē redigātur. Tum cœlypi, medullæ ceruinæ, adips anserini, singul. dra. iiii. oia simul colligata ammisceto, ac adseruato. Vfus autē tempore medicamētū hoc rosaceo dilutū pello excipe, ac subde. Oēm enī dolorē & uehementes inflammationes statim mitigat, utri stragulationi medetur, duritiās molliet, & somnū conciliat. Alius pessus somnū inducēs, ualēs ad inflammationes. Musci quē etiā hypnō dicūt, in aqua seruē facti, expressi ac utri, panis aqua mulla macerati, ac cocti, emplastrū basilici, emplastrū ex succis, ugenti nardini, adips gallinacē, equales partes liquefacito, ac uitior. Factū ad urinariū meatū ac uterū inflāmatū, & ad uteri declinationes. Ego uerō pro pane fermentū purissimū nō omnino acidū sine sale, in aqua mullā macero, ac utior. Pessus aureus appellatur. Ad inflammationes & uteri retractiōes siue declinationes. Ouoū assatorū uitellos sex, medullæ ceruinæ dra. iiii. croci dra. ii. cœlypi dra. ii. ceræ albæ, terebinthinæ, adips anserini, sing. dra. i. Crocū cum modico uino dulci terito, & oua trita addito, & liquabilia liquefacta ammisceto ac adseruato. Vfus autē tempore medicamentum oleo nardino dilutū pello excipito, ac subdito. Alius pessus. Ceræ tyrhænicæ drach. x. xiiii. adips anserini, porcini, terebinthinæ, singulorum dra. sex, decoctū capitū papaueris dra. quatuor, rosacē quantū satis est, aut trini, si calcactione ac discussione opus est. Alius. Adips anserini trientē, ceratū rosacē aut fusinū sextantē, uittelorum ouorū assatorū, croci, singulorū unc. i. myrrhæ drach. iiii. opij obolos duos, aut pro opio, capitū papaueris decoctū. Alius. Ceræ tyrhænicæ, medullæ ceruinæ, singulorū drach. c. adips anserini, terebinthinæ, singul. trientē, croci obolos quatuor, opij obolos duos, uel assati uittelū unum, olei fusini, aut telini ex foeno græco parati, quantū satis est. Pessus Enneapharmacus appellatus, ad inflammationes. Adipe anserinū, & bubulum, cerā albā, terebinthinā, butyrū, medullam ceruinā, mel, oleū rosaceum, & cicinū. Omnia recentia æquis portionibus liquefacito. Pessus ad seruentiores inflammationes. Emplastrū ex succis cū rosaceo liquatū succo plātaginis ammisceto, & pessum formatū. Si uerō plātago defuerit, leuonidion aut inuibi succū accipito. At si plurimū exaduerit, & ad erysipelatis naturā cēderit inflammatio, solani folia tenera cū lacte mulieris trita supponito. Alius pessus ad

inflammationes. Lilij flores tritos cerato rosaceo li-  
quido excipito, & medullâ ceruinâ, ac adipem anse-  
rinum adjicito. Alius. Ex semine lini, foeno græco  
& althea, succû crassissimû parato, & crocû illi am-  
misceto. Deinde adipem anserinû liquefactû addito,  
unito, ac uisor. Cæterû butyrû, medullâ, & adipē,  
omnia recetia ad pessos deligenda sunt. Antiqua em  
dum liquatur nidorosa fiunt, ac calidiora euadūt, &  
inflammationes exacuant. At uerò nec in diffentioni-  
bus, neq; in inflammationibus uteri, menses prouocadi  
sunt. Loca enim magis diffidentur, & quò ob infla-  
mationē cōclusi sint, sanguinis transitû impediunt.  
Quin & tetrapharmacû ad uteri inflammationes com-  
modè subditur, aut infunditur rosaceo dilutû. At si  
inflammationis ulcus cōiunctû fuerit, ceratû rosaceum  
ex cera alba cû tertia adipis anserini parte pparatû,  
albumine oui quatû ei? capere potest ammixto, in-  
fundito. Sedata demû inflammationē, menses puocetur.

De utero in scirrhi tumorem indurato, Sorani.

Cap. LXXIII.

Induratur uterus aliquândo derepente nullo præiudicio  
facto, plerûq; uerò inflammatione progressa, quæ neq;  
soluta est, neq; inabcessum trāsmutata. Est aut̃ huius  
indurationis in scirrhi tumorē species, ea duritia quæ  
in uteri ceruice ut plurimû consistit, & tumorē qui-  
dem similiter habet, sed minus renitente, & cû mo-  
derato dolore. At uerò ubi in scirrhi induratus tu-  
mor uteri fundum occupat, tumor uehementis, & ta-  
ctui renitēs occurrūt, cû grauitate, ac ægro motu, nō  
solum crurû, sed totius corporis: & segnities ad o-  
mnes uitæ functiones. Quod si nō recto ductu tra-  
ctetur, cōsequitur uitarius corporis habitus, deco-  
lor, & ad similitudinē hydropsis. Duritiæ itaq; circa  
os & collû uteri cōsistentes facile curantur, circa fun-  
dum uerò difficulter. In principio itaq; si nihil ob-  
stiterit, neq; ætas, aut uires prohibuerint, sanguinis  
mediocrē copiâ à cubiti uena secta detrahemus: aut  
per Hierâ Archigenis purgabimus. Infectionibus q̃  
utemur ex foeni græci, seminis lini, pulegij, artemi-  
sij, foliorû sambuci, radicis & foliorû cucumeris syl-  
uestris, decoctis. Et aromatum uapore somēta facie-  
mus. Et uterû oleo sulino, narcissino, irino, gleuc-  
no, adipe anserino, gallinaceo, uisillo recenti, aliquo  
ungento ammixto. Itē lactebubulo, aut caprino cû  
adipe anserino colluimus. Cataplasma quoq; imo  
uentri apponemus, e caridis, hyssopo, nitro, & absin-  
thio. Et cucurbitas q̃ scarificatione affigimus. Ma-  
lagmate item polyarchito utemur, eo quod ē semi-  
nibus cōstat, & quod ex baccis lauri paratur, de qui-  
bus paulo post agemus. Pesti uerò mitigatorij & æ-  
perientes subdantur. Facti & is quæ infra ad uteri con-  
dylomata describemus, ē lycio, ac cœpyo paratus, &  
quæ supra retulimus ē tribus papaueris capitibus cō-  
stans. Cui similis est hic. Duo papaueris capita pas-  
so per tridû macerato, deinde ad tertias coquito, &  
expressis capitibus, ad decoctû excolatum adjicito,  
galbani drac. i. casia, succi mādragoræ, singul. drac.  
tres, myrrhæ, thuris, singul. drac. i. Et postea medul-  
læ ceruinæ, cœpyi, adipis anserini, sing. simul lique-  
factorû dra. i. i. ammisceto, ac in plûbeo uasē serua-  
to. Vsu uerò postulatē ex hoc medicamentū colluere  
magnitudinē rosaceo diluito, & his aut̃ ter quotidie  
tepidû subdito. Bene facit & tetrapharmacû, hepta-  
pharmacû, enneapharmacum, emplastrû Azanitæ,

& emplastrum ex succis. Omnia oleo sulino, aut cy-  
prino diluta. Pessus Libanus appellat? mollitorius.  
Cerae albæ quadrante, olei nardini, gleucini, sulini,  
medullæ ceruinæ, adipis anserini, singulorû sextan-  
tem, cœpyi, butyri, nitri, singulorum drach. i. i. i. A-  
liqui oui assati utillum addūt. Alius pessus Tida-  
nus uocatus. Cerae sexuncem, colophonæ sesquium-  
ciâ, adipis taurini triente, picis, terebinthinæ, singul.  
quadrante, medullæ ceruinæ, ammoniaci thymiamatis,  
singul. unc. i. Ammoniacû aqua dissoluatur. A-  
lius pessus mollitorius. Cerae albæ, ungenti nardini,  
singul. quadrante, olei irini, gleucini, cyprini, adipis  
urfi, pinguedinis porci, singulorû sextantem, butyri,  
medullæ ceruinæ, cœpyi, terebinthinæ, singul. trien-  
tem. Alius pessus ad duritias. Cerae albæ, terebin-  
thinæ, medullæ ceruinæ, adipis gallinacæ, anserini,  
butyri, ungenti nardini, sulini, myrrhæ, æquales por-  
tiones excipe melle, ac utere. Si sufinum oleû siue un-  
gentum nō fuerit ad manû, telinum pro ipso succe-  
dat. Pessus aureus uocatus, mollitorius. Cerae trien-  
tem, medullæ ceruinæ, adipis anserini, singulorû un-  
ciam unâ, cœpyi drac. i. i. i. croci drac. i. myrrhæ, gal-  
bani, singulorum drac. i. olei sulini quantû satis est.  
Alius, ad omnes diuturnas uteri affectiōes. Myr-  
rhæ drach. i. bellij drac. i. i. spicæ nardi, croci, singul.  
drac. i. i. casia, ladani, singul. drac. i. i. melliloti drach.  
viii. carniū palmularû decem, uini dulcis cyathû,  
olei sulini, rosacei, cyprini, singulorû triente. Aridis  
cum uino dulci tritis olea ammisceto, & molli igne  
coctis uitior. Ad imum uerò uentrē epithemata ue-  
lut diximus imponatur, polyarchicum, ē seminibus,  
ex baccis lauri, ex melliloto. Bene facit ad duritias,  
ac uteri inflationes & hoc. Resinæ pinus lib. i. i. i. ce-  
ræ unc. x. x. apochymatis, fermenti acidi, singulorum  
lib. i. galbani quadrante, ammoniaci thymiamatis,  
opopaneas, singul. sextantem, muræ acerrimæ quā-  
tum satis est. Opopanacē & ammoniacum in muria  
eoquito, & fermentû adjicito, ac aliquatenus dissol-  
uito. Deinde liquabilia liquata ammisceto, & spa-  
thula donec frigeat agitato. Et in mortariû transla-  
ta probè subigito ac uitior. Aliud Epithema ē mī-  
cis panis, laxadî ac diffundendi uim habens, faciens  
ad omnes duritias quocunq; loco fuerint, & infla-  
mationes duriores discutens. Radicis altheæ, carniû  
palmularû quæ Nicolai appellantur, singul. lib. ii.  
foeni græci, seminis lini, singulorû lib. i. i. chamgelli,  
melliloti, singul. sexuncē, uini antiqui adstringentis  
sextar. vi. i. i. spumæ argētî, cerussæ, colophonæ, sin-  
gul. lib. i. i. ceræ, terebinthinæ, singul. lib. i. olei anti-  
qui lib. v. panis siliginei sicci contusi ac cribrati lib.  
v. Herbae in uino maceratae coquantur, & succus ex-  
primatur. Et in hoc succo panis madescat. postridie  
uerò spuma argenti, & cerussa conteruntur, & oleo  
assufo coquantur, donec nō amplius inquant. Et ad  
hæc liquabilia liquata adjiciuntur. Et sublatò ab igne  
medicamentò panis, præmadefactus commollitur, ac  
paulatim reliquis ammiscetur, & per spatulâ agi-  
tado unitur. Hoc itaq; modo ad duritias stomachi,  
alui profluuiû, ac dysenterię principij, præparari so-  
let, ad quas omnes affectiōes secure adhibetur. Verû  
ad uteri, ac cæterorû locorû duritias, uisceribus ex-  
ceptis, ad prædicta hæc addimus. Aeruginis, floris  
salis, thuris, singul. sexuncē, iridis, aristolochiæ, sin-  
gulorû quadratē, terebinthinæ lib. i. Et terebinthina  
quidem

quidem reliquis liquabilibus ammiscetur. Arida uero trita, ac cribrata insperguntur, medicamento ab igne ablato. Et postremum panis madefactus adijcitur, & omnia probe per spatulā agitata uniantur, frigesacta uero in mortario primū pistillo, deinde manibus subiguntur. Pessus ad uteri duritias, Cere, resinæ pinus, picis, terebinthinæ, butyri, olei rosacei, irini, nardini, mellis, singul. lib. i. nitri sextiartē, & semunciam. Alius pessus, molliendo effiac. Cere, olei fusini, rosacei, adipis anserini, singul. lib. i. iridis, terebinthinæ, adipis leonini, urisni, singul. sexuncē, medullæ ceruinæ trientē. Habet hic pessus ex toto libr. vi. & trientē. Pessus ex Archigenis scriptis, facti ad duritiā, debilitatē, maciēq; uteri, præ omnibus quos ego noui efficacissimē, & ad omnes fermē uteri affectiones, & ad neruos affectos cōmodissimus est. Et est acopon quoq; insigne. Olei irini, fusini, cyprini, cere, singul. lib. i. mellis Attici quincuncē, ungētū foliatū, nardini, singul. trientē, adipis anserini quadrantem, medullæ ceruinæ, cœlypi, sing. sextantē, terebinthinæ sesquifundā. Oesypum & medullā cum melle subigito. Deinde cerā cū oleis liquefacio, & postea terebinthinā, & adipē, & cōsequēter preciosā uingentā, nardiniq; ac foliatū addito. Et in mortariū translata probe unito. Hoc si usq; ad exactā curationem ueteris, magnā laudē consequeris. Sed & post adeptā sanitatē aliquantū tēpore postea maioris securitatis gratia adhiberi potest. Ego uerō etiā pro malagmate forinsecus impono, & ad prædicta ammisceto thuris, cere, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, floris iū cū odorati sing. dra. vii. picis dra. xvi. galbanū, opopanax sing. dra. iii. thus, galbanū, opopanax, uino odorato adstringente terito, & ad cœlypū & medullā, ac mel adijcto, & omnia simul rursus terito, deinde cerā cū preciosis uenientis liquo, & ammoniacū tritū resnamq; ac reliqua ammisceto. Et ablato ab igne medicamēto ac frigesacto, myrrhā & florem iū cū odorati inspergito, unito ac utitor. Epithima Oribasij ē baccis lauri, facit ad duritias. Cere, resinæ pinus, picis, nitri, baccarū lauri, adipis taurini, ammoniaci thymiamatis, æquales portiones. Ammoniacū & nistrum & baccas lauri, sing. scōrim terito, ac cribrato, & reliquis liquatis ammisceto. Ego uerō, inquit Oribasius, dimidium nitri accipio.

De uteri abcessu, Archigenis. Cap. lxxxv.

Abcessus in utero uelut in cæteris corporis partibus, præcedēte inflammatione generatur, primū igitur inflammationis dolorē apparebūt; Deinde circa puris generationem dolores augētur, febresq; cum horrore, plerūq; ad uesperam ingruunt, tumor attollitur, dolor punctior adest, aliquando urina, et aliquando stercoreis recrementa supprimuntur, ut utraque simul. Dolor autem localis affectum locum indicabit; proinde si discuti nō potest, citius suppurationi auxilium ferendum est. Itaq; semen lini, foenum græcū, farinā ordei, caricas coctas, althææ radicē, terebinthinā, in cataplasmate imponemus. Aliquando etiam columbinū stercus cū oleo, & melle adhibebimus. Hæc autē cataplasmata imo uteri, ac lumbis imponantur. Et pudendi sinus per spongiā assidue foueatur, & uapores per arūdinē operculo ollæ perforato inserta intra pudendū recipiantur. Infectionesq; frequentes siant, decoctis in aqua his quæ uim attractoriam habent, uelut est pulegiū, marrubium, laurus, salua,

artemisia, dictamus, cētaurea. Quod si dolor uehe-mēdus infestauerit, papaueris capita in aqua coquantur, & contusa cataplasmati ammiscuntur. Caricæ item crudæ in mortario cū resina pinus, terebinthinæ, ac modico nitro tritæ imponantur, pēsis autem utemur ex terebinthinā, myrrhā, cœlypo, ac butyro paratis. Verū optimus ad uteri abcessus hic præparatur. Carnis caricarū pinguium, adipis anserini, olei irini, singul. drac. ii. terebinthinę drac. i. rutæ dra. iii. myrrhæ, iridis, nitri, singul. obol. ii. possunt etiā pro caridis uuæ passæ ammisceri. Excipiuntur lana in pessum, quī oleo irino, aut cyprino tepido tinctus subditur. Est & ad hūcufum efficacissima cōpositio, Cyphoides appellata, & suprà ad hepatis abcessum descripta. Itemq; Enneapharmacū ad duritias paratum. Et Malagma polyarchiū, & alia huiusmodi, oleo fusino aut telino diluta, & pēso in uterū subdita. Imus item uenter, ac pēctē assidue prædictis decoctis foueatur. At uerō rupto abcessu, si pus ad uehicam fuerit delatū, & cū urina excernitur, lactis potu utendū est, & cucumeris semē propinandū. Et cataplasmata prædicta adhibenda, ceratāq; emollientia, ac odorata. Si uerō ad intestinū rectum progreditur, & cū stercore, uel per se egerit, lentius & malicorij decoctū per clysterē infundemus. Si uerō in pudendi sinu erumpit, & purū est pus, rosaceum, aut tetrapharmacū cum butyro recetū, ac rosaceo infundatur. Et loci rosarū aut lentū decocto, aut pēsanæ succo eluatur. Sin tenuis & foetida destillat sanguis, uelut a noma, & ulcere depascēte, magis adstringens sit quod infunditur, uelut est baccarum myrti, palmularū, lentium, & malicorij decoctū. Quod si post humorū excretionē inflammatio perseverauerit, perseverandū quoq; est in cataplasmatibus & infusionibus suprà relatis. At si inæqualia fuerint quæ prodeunt, fomenta & infusiones ex aqua multa siant, in qua absinthiū, marrubiū, eruum, cētauriū, aut lentes sunt decoctæ. Locū uerō pēsanæ succo eluantur, addito melle & rosaceo. Vteri uerō os & anus cerato rosaceo, aut butyro inungatur, cui spodiū, aut stibij, aut plūbaginis, aut spumæ argenti aliquid, cū muliebri lacte sit ammixtum, facit & plumbi succus. Si uerō profluus humor foetidissimus fuerit, uino multo pudendi sinus eluatur, & in eo usque ad exactam curationem perseverandum est.

Abcessus oris uteri chirurgia. Cap. lxxxvi.

Si circa osculum uteri abcessus cōstituerit, ut sub chirurgiam oculi possit, nō prompte ad sectionē festinandum est, sed perfecta affectione, & inflammatione plurimum aucta, & partibus puri incumbētib; attenuatus. Atq; tū mulier locetur in sella supina, ut crura habeat ad uentrē contracta, & femora inter se dissparata. Et cubiti ipsius poplitibus subijciantur, & idoneis uinculis ad ceruicem relinquantur. Et hoc ad clarā lucē fiat; assideatq; dextris chirurgus & per dioptram instrumentū, pro etate cōmodum, ad pudendi diductionē speculetur, & per specillum sinus muliebri profunditatē dimetiatur, ut ne maior dioptræ tibia uterū comprimat. Et si reperia fuerit tibia eius sinu maior, lanæ conuolutæ labij siue alis pudendi imponantur, ut in ipsis dioptra firmetur; oportet autem tibiam immittere, cochleā ad supernā partem uergente, & dioptram quidē a chirurgo teneri, cochleam uerō per ministrum circūuerti, ut diductis



tiblae plicis sinus distendatur, postquam autē occur-  
rerit abscessus ad tactum lenis, & tenuis, apex eius  
scalpello uel acula dissecetur, & excreto pure li-  
mniscus linamentum tenerimū rosaceo tinctum in  
sectionem indatur, aut potius extra sectionē in mu-  
liebrem sinum citra impulsione. Extra uerō pu-  
dendi labia ad pectinem, & lumbos lanæ fuscidae,  
aut puræ oleo imbutæ imponantur, tertia deinde die  
ægra in aqua & oleo calidis infideat, aut in maluæ  
decocto. Et detersione facta, limniscus tetrapharma-  
co per se, aut cum melle illitus, in sectionis fissuram  
leniter indatur. Sit autem tetrapharmacum butyro,  
aut rosaceo dilutum. Cataplasmata autē forinsecus  
imponantur, donec abscessus ab inflammatione li-  
beri, ac puri fiant. Si uerō difficulter repurgetur, per  
auricularem clysterē iridis decocto eluantur. Et per  
emplastrum ex cadmia, aut ex ladano paratum, aut  
id quod ex ordeo usto constat, singulis rosaceo di-  
luto, ad cicatrice perducantur. Quod si intra uteri  
os abscessus fuerit, chirurgiam reprobamus, & cu-  
rationem paulō antē relata adhibemus.

*Abscessus uteri inter intestina, & peritonæum  
membranam, rupti curatio. Cap. lxxviii.*

Eruptionē inter intestina, & peritonæum membranā al-  
uium, ac intestina ambientē, indicat tumor circa illas  
partes magis hærens. Si uerō intra uterū ruptus  
abscessus, dolor quiescit, & os uteri ad tactū lenius  
occurrit. Eruptio itaq; ad superficiē tendens adiutā  
da est, & cuius postquam satis fuerit attenuata specu-  
lo in summo apice dissecanda, qua parte effluxū cō-  
modiorem fore speramus. At si languinis eruptio-  
nis tumor est, pro specillo siue scalpello, cauterium  
eminētiore loco adhibebimus, & ita pus educemus:  
plurimū enim ad totā curationē cauterium confert,  
post excrement autē & probē expressum humorem:  
ægra collocetur ut residuū cōmode excerni possit,  
& sectio aqua multa eluatur, & postea bis quotidie  
ac semel in nocte spongiis foueatur. Interdū & in a-  
qua calida ægra infideat, & uterus oleo cyprino ca-  
lido eluatur. Reliqua uerō curatio cæteris ulceribus  
similis fiat. Alimēta autē exhibeantur boni succi, &  
quæ nō facile dissiliant, uelut est lac cū amylo, alica,  
oryza, pedes porcini in alica, aut psilana ad flaccidi-  
tate cocti, aliculæ & pisces boni succi. Et nisi febris  
obstiterit, uini etiā dulce antiquū cōcedet. Balnea  
autē & alimēta quæ exulcerationes exacerbant, uitentur.

*De uteri exulceratione, Archigenis. Cap. lxxviii.*

Vlceratur uterus sepe ex fluxione erodētē, aut ab acris  
bus medicamentis, aut ex abscessibus ruptis, aut ob  
parum difficultatē, aut fortis extractionē, aut eiusdē  
corruptionē. Aegrotæ uerō in affecta parte dolorē  
punctoriū perceperant, & ex interuallis foetidi, ac fa-  
nuosi humores ab ulcere fordido prodeunt, & cōse-  
quuntur etiā alia uero affecto peculiaria accidentia,  
uelut est capitis, ac præsertim scindipitis dolor. Liga-  
mentorū item ac radicis oculorū dolor, qui ad ma-  
nus usq; ac digitos se extendit, & reliqua suprà de in-  
flammatione relata. Vlceris itaq; expositū, per dioptrae  
usum depræheditur. In profundo uerō reconditum,  
humores qui excernuntur indicant. Non autē aliter  
huiusmodi ulcera curantur, quā in infectionibus, in-  
rigationibus, cataplasmatibus, ac pelsis suprà relatis,  
priuatim tamen cōmodum est hoc medicamentum.  
Crocus optimus cū muliebri lacte teritur, & cerato

excipitur, ex cera tyrrhenica, & rosaceo, aut fusino  
oleo, cum anserino adipē parato, & in pello subdi-  
tur. Hoc autē adhuc efficacius est, & ad dolores ma-  
gis congruū, quod sequitur, papaueris capita decem  
in passo diluto, per triduū macerātur, deinde donec  
flaccida fiant coquuntur, & postea exprella teruntur,  
cum seminis, aut foliorū rosarū drac. v. croci drach.  
iii. ammixto etiā inter terendū ipso decocto. Deinde  
ceratum ex cera sextariē, & rosacei aut narcissini  
olci sextante ad ea affunditur, & medicamentum in  
stannea pyxide seruat. Vbi uerō expetente, rosā-  
ceo, aut narcissino oleo dilutum, & in pessum exce-  
ptum subditur: facit & pessus suprà relatus, ex cro-  
co, rosaceo, adipē anserino, & medulla ceruina para-  
tus. talia enim dolores mitigat, & ulcera sanant. Phi-  
losophi medicamentū. Ad mulieris pudendū exulce-  
ratum, & ob acrimie humorum influxum pruri-  
ginosum, plumbaginis sextariē, glaucij unc. i. cum  
succo hyoscyami terito, & olei myrti, & aut rosacei  
quantum satis est ammisceto, utereq; uel manu illi-  
nens, uel in passo subdens.

*Vlcerū uteri carbiculosorū curatio. Cap. lxxix.*  
Carbunculosi uteri ulceribus priuatim profundi lētes,  
& olæe folia, sine melle. Lupini in uino austero co-  
cti. Infectiones in eorundem lupinorum decocto.

*Ad fordida uteri ulcera, Archigenis. Cap. xc.*  
Ad fordida uteri ulcera emplastro Aegyptio utēdum  
est, circa ærugine preparato. omnia enim mordacia,  
quemadmodū & crustas induentia, utero aduersa  
sunt. Viemur etiā eo quod ex melle, terebinthina, ro-  
saceo aut fusino oleo & butyro constat, quibus ali-  
qui etiā crocū addunt. Ad ulcera repurgāda efficax  
est & iris illyrica cum melle imposta, & aristolo-  
chie decoctū per se, uel cum melle infusum. Pessus  
optimus ad fordida ulcera repurgāda. terebinthine  
drach. iiii. adipis anserini drach. vii. myrrhæ drach.  
i. croci drach. iiii. medullæ bubulæ, & cypi, singulorū  
drach. ii. mellis, olci cyprini, aut irini, singulorum  
drachm. xvi. thuris, radicis panacæ, iridis, singu-  
lorum drachmas duas, cyperi drachm. iiii.

*Ad humorē a muliebri pudendo profluētē. Cap. xc.*  
Ordei uisti, amyli, thuris, singul. unc. i. aluminis scissi  
drac. iiii. Minutissimē terito, ac cribrato, & asino  
lacte diluito, ac in pudendi sinū per uteri fusiōrū cly-  
sterem infundito. Quod si ulcus dolorē intulerit, ta-  
le medicamentū adhibeatur. Rosarū siccatū tritarū, ca-  
pitū papaueris paululū torrefactorū, sing. drach. iiii.  
eroci, styracis, sing. dra. ii. faring sceni græci, cenan-  
thes, sing. dra. iiii. thuris dra. iiii. oia cū passo cretico,  
ac oleo rosaceo paulatī affusis, ad mellis cōpagē con-  
terendo redigito, & in pessū excepta calida subdito.

*Ad uteri nomas, Aspasia.*

*Cap. xcii.*  
Nomæ uerō & ulcera depascētia, ac efferata, equino  
aut asinino lacte recēs multo eluatur. Et in utriusq;  
penuria, quodcūq; haberi potest recens, coctū acci-  
piatur. Duabus autem lactis heminis mellis hemina  
dimidia addenda est, & quatuor iridis drachmæ  
inspergenda, & tale infusum calidū saepe singulis die-  
bus infundēdum. Idem facit aqua multa, in qua ba-  
sinthium, aut calamus aromaticus, aut leucanthemū  
uel chamæmelum, aut euphthalmū decoctū est. Et  
ubi quod infusum est excrement fuerit, loci protinus  
maluæ decocto eluatur. Deinde pessus subdatur ex  
farinæ erui, iridis, singulorū dra. duabus, cum melle  
subactis,

subactis, & pello exceptis. Alius pessus. Mellitorum in uino aquæ marinæ experie coctū terito, & melle ammixto subdito. Alius. Farinā lentum cum melle subdito. Alius. Oleæ folia cum uino trita, & melle ammixto subdito. Alius. Vuarum passarū carnes tritas cum melle subdito. Alius. Hederæ aureum florem habēdis folia in uino cocta cū melle indito. Asclepiadæ medicamentū in puluilli forma, ad uteri nomas præcipuū. Lupinos amaros tritos, ac cribatos seruat, & usus rēpore sinit ullo liquore subdito, uel melli ammisceto. Alius pessus optimus. Hederæ aureū florē habentis fasciculū, in umbra paululum siccatur in uas fictile cōiçito, idēq; undiq; oblinito, ac torreto, & eo cinere uitto. Alius ad humida ulcera. Aristolochiæ longæ tritæ drac. vii. rubricæ sinopiciæ hepatis colorē referētis dr. vii. misce, & cum melle ad ceratī crassitudinē redige, & panniculo attrito excepta deliga, & sub prunis exure. Et ubi optime affata fuerint, iere ac utere. Aut panniculum deligatur in ollā mitte, ac probē optem, & oblitam in ignē pone, donec medicamentū ad carbonis speciem fuerit exsūtū: & deinde tritum serua. Vsu uerō expetente ad nomas subde, & breui contrahentur. Hoc usque ad inductam cicatricem idoneum est. Alius. Seminis tamaricis parē unam, nitri rubri tantundem, terito ac cribato, & simul mixtis aridis uitto; aut rosaceum ammisceto. Vbi uerō nomē fuerint cohibet, adhibeatur ea quæ paulo antē ad ulcera purganda relata sunt.

Que ad cicatricem ducit, Asclepiadæ. Cap. x ciii.

Postquam ulcera fuerint purgata, utendū est his quæ ad cicatricem perducunt, primū mitioribus, postea efficacioribus. Ceratum cicatricē inducens. Ceræ albæ quadrans, rosacei optimi dodrantē, ad prunas liquefacto, & quadantenus refrigerato. Deinde in mortarium cōiçito, ac lacte muliebri, aut asinino, aut caprino recens multo affuso, cū pistillo subigito, donec totū inalbescat. Deinde diffusio priore lacte, nouum infundito, ac rursus subigito, & erod ad drac. i. ammisceto. Quod si magis mitigatorium facere uolueris, rosacei olei septuagē, adipis asnerini, & medullæ eiusdē sing. unc. i. accipito. potes & pro rosaceo, melinū, aut subinū ammiscere. Medicamentum ex ordo ad uteri ulcera. Ordei usti, ac triti, spumæ argenti lotæ, cerussæ lotæ, sigulorū lib. i. adipis asnerini lib. iiii. adipis capræ recētis lib. iiii. olei myrti libras ii. mellis despumati besselē, terebinthinæ quadratē siue tritē. Hoc etiā ad ardores, & ulcera pudēdorū facit. Nec minus utendū est his quæ ad sedas affectiones, ex pompholyge & plūbo usto præparatur. Itēq; eo quod ex cadmia & qd ex ladano præparatur, singulis myrteo aut rosaceo oleo dilutis.

De canceris uteri, Archigenis.

Cap. x ciiii.

Cancer totū uteri tumorū aliqui ulcerati sunt, aliqui nō ulcerati, quēadmodum de mammis suprà diximus. Itaq; in nō exulceratis, tumor circa os uteri reperitur durus, ad tactū renitens, inæqualis, eminet, colore seculentus, ruber aut sublividus, uehementēs dolores inducēs circa inguinā, summū uentrem, pedinem, ac lumbos; qui ad manū contactū, & medicamentorū uarietatem exacerbantur. Si uerō ulceratus est cancer, supra dolores duritiasq; ac tumorem, ulcera corrosa & inæqualia uidentur, plerumq; sordida, eminecia, albicicia. Quæ uerō pura putatur,

feculenta, liuida, rubicūda, & cruenta apparent. Excernitur autem ab ipsis sanies tenuis, aquosa, nigra, aut fulua graueolēs. Aliquādo & sanguis defertur, & alia signa adfunt suprà de uteri inflammatione relata. Proinde affectio quidē hæc incurabilis est, uelut etiā Hippocrates pronūciat: mitigari tamen ac leniri potest, infestationibus in foenigra, & ac malug decocto, & cataplasmatibus similibus. In exacerbationibus autē ualde mitigat malua, aut althea in aqua mulsa ad flacciditatē cocta, & cum modico rosaceo trita ac imposita. Et cataplasma ē caricis, meliloto, ac ruta paratum. Et quod ex palmulis paratur in passo coctis, ouorū uitellis, ac polenta ammixtis. Aut pauperis capita trita & cribata, cū polygoni aut intubij, aut coriandri succo. Aut solani folia tenera cum lacte muliebri imposita. Aut solanū cerato rosaceo exceptū, frigida aqua paulatim cerato infillata. Aut maluæ folia cū lacte muliebri trita, & rosaceo cerato excepta. Atq; hæc omnia in dolorū uexationibus sunt adhibēda, postea uerō ceratū imponatur ex rosaceo, aut myrteo, aut melino, aut oenanthino cū palmulis in passo coctis, facit & cataplasma ex ouis, & quod ex ordo paratur, quibus etiā ad ambusta utimur: peculiariter autē conuenit id quod ex fece uasforū areorū in quibus aqua coquitur, paratur. Hæc enim sex affata teritur minutissimē, & cerato rosaceo excipitur. Et hæc qdē forissecus. Intrinsicus autē mitigat locos, ubi ulcerati fuerint, lac muliebre, aut asininū infusum, & plāraginis succus tepidus. Si uerō cruentati fuerint, polygoni succus cū modico thure. Idē faciunt etiā pessi ex croco, & lacte muliebri, succoq; papaueris, ac clypeo preparati. Omnibus autem præstat etiā ad sedis affectiones hoc. Spumæ argenti lotæ sexuncē, thuris masculi, clypei, adipis porcini recētis, butyri recētis, ceræ tyrrenicæ, sing. sexuncē, rosacei tritētē. Seruatur hoc medicamentū pyxide plūbea, & arefactū rosaceo diluitur. Ego uerō, inquit Archigenes, spumā argētī cū feridis succi hemina diluo, & ubi mellis spissitudinē habet, liquariis alijs ammisceto: utere etiā medicamētis ad sedis affectiones præscriptis. Optimū est id quod suprà ad mammarū nomas descripsimus, ex uino, rhoē coriario, pilulis cupressi, ac galla præparatū, quod muliebri aut asinino lacte dilutū adhibetur. Philosophi medicamentū ad cancos uteri. Cancros fluuiatiles tres, aut quinq; impari numero, sub prunis exurito, & cum oleo cyprino tritos per pennam illinito.

De uteri obturatione.

Cap. x cv.

Obturatione circa os, aut collū uteri fit, aut propter ulcerationē prægressam, aut ob inflammationē induratiā, per quā loci aded angustī fiunt, ut semel nō amplius admitant, uel admissum non reneant: ob callosam enim duritiā uterus cōtrahi nō potest. Aliquādo semen admissum, & intra angustissimū os cōtētū foetus causa est. Verūm hæc cōceptio prægnatiōis mortis causam inducit, quā ob nimias locorū angustias foetus prodire non possit. Infestationes itaq; ex oleo, & aqua & foeni greci decocto adhibeatur, & p cerata, ac pessos emollientes ex clypeo, terebinthina, ac nitro præparatos, laxetur. At uerō si loci ad tactū molles fuerint, spōgiā sicā funiculo appēso intra locorū angustias dilatare gratia indemus. Et si ea exciderit, alia crassiorē immouemus. Et ea de causā plures, ac diuersas spongas siccas paratas habere oportet, &

postea tale medicamentū spongīe illinimus. Sandae rachae, aluminis scissi, sing. drac. i. auripigmenti drac. i. i. omnia simul cōrita melle excipito, & spongīa indendae illinito. Quod si sublata spōgia locus non satis apertus uidebitur, infāmatioq; oborta fuerit, subiectū medicamētū spongīae illinatur. Iridis drac. i. adips anserini, terebinthināe, thuris, olei irini, ceræ, singul. drac. i. i. Iridem primū, deinde thus minus tissime terito, ac cribrato, & terebinthinā, adipem, ceram, cū oleo liquato, ac omnia simul unito. Vbi uerō infāmatio quiesuerit, & locus apertus fuerit, ce ratum ex oleo rosaceo, & adipe anserino paratū spō gīae illinatur, in quo usq; ad inductā cicatricem persi stendum est, ut locus paulatim consolidetur.

De utero non perforato.

Cap. xcv. i.

Quædā natiuitate uterū non perforatū habet, & hoc trisaria contingit. Quibusdā enim in ipsius pudendi alis siue labijs, mēbrana aut caro oburās enascitur. Alijs in ipso pudēdi sinu idem cōtingit. Alijs circa ipsum uteri osculū eadē obstruō fit. Quibus itaq; in pudendi labijs, mēbrana excreuit, eas curaturi suā pinas pro more reflexis ac diductis cruribus loca bimus, & operientem membranā specillo discicabi mus, donec figura pudēdi ad naturā dimētionem deueniat: postea linamētis cōuulsis sectionē replebi mus, ac deligabimus, & curationē suppuratoriā per cataplasmata aliquot diebus adhibebimus. Deinde linamētis cerato rosaceo ligdo imbutis utemur. At si post sectionē pudendi alas carnosas paritibus pro pings unitas esse senserimus, utriq; excoriatibimus, & per linamēta dilatabimus, eodēq; curationis mo do utemur. Mulier uerō supina puluinar intra femo ra habēdi, usq; ad cicatricē inductā permaneat. Si ue rō pudēdi qdē figura externa aperta est, in sinu ue rō caro innata locū obstruit, ut angustū foramen re linquat, muliere eodē modo collocaat, stylū in u teri cerulē maioris uterū grātā immittimus, ne p errorē altiorē sectionē faciamus: atq; ita infra signa tū per stylū locū discicabimus, per specillū latū, do nec sinus secundū naturā habere uideatur. Deinde la bia dissectæ carnis p uolsellā disticta ad quadrāgula rem figurā circumcidemus. Et eretā mulierē didu ctis cruribus statuemus, ut humor in utero collectus cōmode profluat. Quod ubi sufficēter factū fuerit, agrā ad priorem decubitus formā reducemus, & li namētū uino & oleo imbutū in sectionē indemus, habeat autē hoc filum alligatum, quo facile extrahi possit, & loco probē deligato quietē imperabimus. Sequētibz uerō diebus locus cū aqua mulsa elua tur, & pharmacū suppuratorium linamēto inuorto illinum indatur. Et ubi cicatrix inductā est, canalis ex stanno indatur, ac alligetur, donec locus fuerit cō solidatus. Quod si partes rursus inter se cōiuerint, ac rursus uteri os claudatur, spongīa siccam indito, do nec callus fuerit obductus. Si uerō mēbrana ipsum uteri os obstruxerit, mulier in eodē situ locata, diop tra immissa sinus dilatur, & membrana per uolsellam arripeta, ac extēta intorqueatur, ut tota simul colligatur, & lato specillo amputetur, & medicamēt um sicū floridū inspergatur, & linamētū torum alligato filo indatur, & eadem curatio fiat. Quod si quid de membrana relictū fuerit, florido aut p̄saro appellato medicamēto cōsumatur. Repurgatis autē lods, hoc pharmaco linamēta unctiono. Ceræ, terebin

thinæ, adips anserini, singulorū dra. i. i. Iridis, thuris singul. drac. i. i. olei irini dra. x. vi. Iridē, crocum, & thus cū passio terito, & liquabilia liqua ta ammisco. Dioptra uerō asiduē immittenda est, ac cauendū ne caro superexcrecat, quæ tali medica mento reprimatur. Squamæ aeris, æruginis, corticis thuris, singul. drac. i. i. terito, unito, ac uitio. Aut æ ruginē, & squamā cū plumbi succo subige, & adhi be. Sed nec spōgia sicce usus omittatur, donec labijs callus obducatur. Stannus itē canalis immittatur.

De hæmorrhoidibus uteri, Aspsia. Cap. xcvi. i.

Hæmorrhoides quandoq; in osculo uteri, quādoq; in collo, & aliquādo in ipso utero, & aliquando, licet raro, in pudendo cōtingunt. Atq; hæc etiā tū, me lius tamen per dioptram depræhēduntur, & eadem accidentia inducūt, quæ reliquæ in sede ortæ indu cere solēt. Et præterea sterilitatē, ac laboriorū graui tatē tēpore purgationis inducūt. Varios itaq; ac malignas dimittere oportet: reliquæ uerō non aliter curentur, q̄ quæ in sede sunt, duris quidem ac modicū sanguinē fundētibus, neq; uasis annexis, statim amputatis. His uerō quæ multū sanguinis emittūt, circa fundū circūcirca scarificatis, & uolsella eleua tis, ac funiculo contractis, & postea paulatim refe ctis, acq; hoc facto floridū medicamentū sicum ins pergatur. At uerō si citra chirurgiam malueris hæ morrhoides resiccare, ac excæcare, huiusmodi sicca apponito. Spodiū & rosas siccas terito, & inspergi ro. Aut acaciā uino austero triā. Aut terrā lemniam sigillū appellatā, cū aceto illinito. Aliud. Stibij beles me, rosarū siccarum, pollinis thuris, singul. sextārii, cytinorū unc. i. Aliud. Balaustiorū torrefactorum sexuncē, malicorū quadrātem, florū rosarū, spodij, singul. drac. i. i. Aliud ad hæmorrhoides efficacius. Succū mandragoræ, aluminis roūdī, acaciæ, singul. drach. i. i. cum uino terito, & in pastillis efformato, eosq; uino dilutos illinito. Aliud. Succū cicutæ, succū hyoscyami, aluminis scissi, rubricæ sinopice, sin gulorū drac. i. i. sandicis dra. i. cū uino terito & exci pto. Et usus tempore uino item diluto. Aliud. Diophrigis drac. vi. cerussæ, spumæ argēti, plumbi uisi & loti, succū hypocistidis, singulorū drac. i. i. Excipi pe succo cicutæ, & cū uino adhibe. Vtere etiā medi camentis ad hæmorrhoides sedis relatis, & præser tim eo quod Hippocrati inscribitur. Et portiones ex hibeto ad sanguinis refectionē descriptas. Infesio nes quoq; in decoctis adstringentibus adhibeto.

De calculo uteri.

Cap. xcvi. i.

Calculi aliquando tofacent in ipso utero generantur, quos si extrahere uolueris, alium prius per clystē rem stercoreis eductoriū euacuato. Deinde fori græ ci ac maluæ de octo, rosaceo ammixto, uterū elui to, & muliere supina disparatis crurib, locata duos longiores sinistræ manus digitos in anī foramē im mitito: dextra uerō superiorem uentrem comprimito, calculumq; extorrum cogito, ac propellito, simul per digitos in anum missos deducens, ac exo trahēs. A uerō tofacentē substantiam extra in uteri collo, aut osculo agnaam, muliere reie locata, & lo cis per dioptram dilatatis, scalpello resicare oportet, & florido medicamento sicco insperso curare.

De calculo uesicæ muliebri.

Cap. xcix.

In uesica muliebri raro oriūtur calculi, latorem enim & rectiorem urinæ meatum habent. Atque huius extractionem,

extractionem si forte innatus fuerit, ita facias. Mulier supina coxis declinibus ac cruribus reclinatis locetur, quo facto duos longiores sinistræ manus digiti eos in pudendū mittito. Dextra uero uesticæ superne cōprimito, & calculū uersus uesticæ collū expellito, & ut extra musculum uesticæ collū adstringentem prodeat cogito, & tunc paululū supra pudendi alas, quo loco calculus occurrit, sectionem facito, & per calcularium fordepem extrahito, postea uerò sectionē manū thuris repleto, & lanam purā oleo calido imbutā uentri ac lumbis imposito ac deligato, & quosidie bis aut ter, & nocte semel exoluto, & oleo calido & incarnantibus usq; ad perfectam incarnationē uulnus explemus, & per emplastrum ex aceto & oleo paratum cicatricem inducimus. Optime autē huiusmodi locos & omne causū ulcus incarnat hoc. Manne thuris sextantem, colophoniz minutissime tritigunc. I. Ex hoc arido rotam uulneris cauitate expleto.

De hernia aquosa mulierum, *Asphasie.* Cap. c.

Hernia aquosa circa pudendi alas consistit, inflationi similis, debili ac molli tumore. Et aliquando alteram tantum, quādoq; utraq; partem occupat, ad cōstitutū fluctuationis apparentia quāda exhibens; primum itaq; disculforia adhibeantur, suprà ad hernias in uiris aqnosas relata, præsertim in uirginibus. At si parū successerit, muliere recte locata sectionē rectā tumori congruā faciemus. Dissecta autē cure, subiectas tunicas paulatim excoriat, & uolsella arreptas dissedat, & membranam humore continentem dissecat. Excreto humore sectionem membranæ ad myrtet folij figuram facito, & labijs sectionis duabus aut tribus futuris adductis, suppurationē medicamenta adhibeto. Vtere & olei irrigatione, ac reliqua curatione, ad aquosas uiroꝝ hernias suprà tradita.

De hernia inguinis mulierum.

Cap. ci.

Fiunt & mulieribus hernie inguinis, circa dextrū maxime pudendi sinum, prominet his tumor durus immurmurans, ac prebens, præcipue ubi mulieres crura dilatauerint, aut supine decubuerint. Et has quoq; cōgruis deligamentis ac medicamentis curare oportet, uelut dictū est in hernia uiroꝝ intestinali ac inguinali. At si hæc parū profecerint, ad chirurgiā uenientū est. Mulier itaq; supina declinibus cruribus locetur, & repulso intestino locus circa inguen oblique secetur, & tunice cuti subiectę sensim excorietur, atq; ita laxata peritonæi membranę pars atrahatur ac extēdatur, & intestinū diligenter repellatur, & quod superfluum est de peritoneo deligetur, ac cōsolatur, & tūc quod supra futurā extat superuacuum resecetur. Deinde labia sectionis cutis duabus aut tribus futuris adducantur, & linamētā indantur, lanāq; succida uino & oleo imbuta imponentur, & deligamenta congrua fiant, postea medicamēta suppurationē & repurgadi ac incarnadi uim habentia. Irrigationes item ac cataplasmata adhibeantur, donec inflammatio quiescat. Et inde ad cicatricem inducenda progressus fiat.

De hernia uaricosa, *Asphasie.*

Cap. cii.

Hernia quoq; siue rames uaricosus in pudendi alis nasci solet, & est uenarū ampliatio, similis uaricibus in cruribus fieri solitis. proinde in huius curatione sectionem rectam in superficie pro uasis figura facias; deinde tunicas uasi adherentes sensim excoriat, & denudatum uas cæca uolsella eleuato, & duobus

uinculis, altero superne, altero inferne deligato. Dein de uenam secato, uelut in uenæ sectione ad sanguinē auferendum fieri solet, & de radio sanguine, mediū uasis inter duo uincula superuacuum amputato. Atq; hoc sanè omnibus uasis in uaricum formam transgressis commune est. Deinde linamentis sectioni inditis, spongiam aceto aut poscā imbutam adhibeto. Et deinceps ad puris generationem, ac reliquā uelut ulceris curationem progreditor.

De nymphæ sectione.

Cap. ciii.

Nympha substantia quæda est musculosa, aut pelliculosa supra alarū pudendi cōmissurā sita, quo loco urinaris est meatus. Hęc in aliquibus mulieribus ad tāā magnitudinē augetur, ut deformitate ac pudorē inducat. Quin & a uestimentorū cōactu assiduū arrigitur, & ad uenerē ac coitū proritat. Quapropter Aegyptijs uisum est, ut antequā exuberet, amputetur: tūc præcipue quā nobiles uirgines sunt eloçadæ. Amputadi uerò modū hunc tradunt. Virgini in sella locatæ retro alsideat adolescens robustus, qui brachia sua poplitibus uirginis subijciat, cruraq; eius ac totū corpus regat. Et tū chirurgus ante ipsum stans, forcipe ampliori nymphā corripit, & per sinistram manū distendat, per dextrā uerò prope forcipis dentes resecet. Mēsurā autē resectionis eandē quā in columellæ sectione seruare oportet, ut ne funditus ipsam resecemus, sed superuacua tantum pars amputetur: proinde prope dentes forcipis nymphā resecadā esse diximus, quoniam quum pelliculosa sit, plurimū extenditur, & nisi quis diligenter obseruet, facile ultra quā oportet amputationē faciet, atq; hinc carūculæ decrementum, rheoada greci uocant, cōsequitur: peracta chirurgiæ, spōgia ex uino adstringenti aut aqua frigida expressa uulnus detergeatur, & mannā thuris inspergatur, & linamentū poscā madescenti indatur. Et spongia ex poscā expressa superdeligetur. Post septimam uerò, eadēman minutissime trita per se aut cum rosarum floribus insperge. Aut siccum ex lapide phrygio paratum, & ad pudendorum fissuras descriptū. Aut cinerem ostium palmarum insperge.

De cauda.

Cap. ciiii.

In quibusdā mulieribus carnosa quædam substantia ab uteri osculo exoritur, & muliebri pudendum replet. Aliquando etiā extrā progreditur instar caudæ, unde etiā nomē habet. Mulier itaq; uelut in nymphæ amputatione dictum est, locetur, & prominens carūcula forcipe extēdatur, & tota ex basi resecetur: post chirurgiā curatio uelut in nymphæ peragatur.

De thymis, & uerrucis tum alijs, tum formicarijs uiridis, *Philumeni.*

Cap. cv.

Thymus aut in alis pudendi, aut in ipso pudendo, aut in uteri osculo, aut collo generatur. Et est aspera quædam eminentia thymi cacumini similis, in quibusdam midis, in alijs maligina, rubra, cruenta, præcipue post concubitum aut deambulationes, & sanè moro maturo alisimilatur, uisq; deprehenditur, aliquādo sine ulla arte, aliquādo diopira immissa, oblata. Huiusmodi igitur eminentias in principio curabimus, quemadmodum de reliquis thymis ac uerrucis diximus. Verum ubi diutius perseuerat, chirurgiā adhibemus. Muliere itaq; recte locata, eminentiam uolsella extenat, totam funditus resecamus, deinde uorationem cruentis uulneribus apiam facimus. Thymos autem in abditō reconditos, quum chirurgiæ

subijci non possint, medicamentis curabimus, supra ad totius corporis thymos & verrucas fornicarias relatis. Ad verrucas autē fornicarias pudendorum summē cōserthoc. Capræ iugularæ recens oculos cōpungito, & humorē inde profluentem asidū illini to, & intra sex dierum spatium fornicariæ verrucę exstirpabuntur. Sed & bubulū fercus calidum illitum, fornicarias in muliebris natura verrucas sanat.

Aliud, quod ego in uxore mea expertus sum, & ipsas radicitus tollit. Origani fescuā ad lucernā accēdito, & fornicariæ verrucę ad moueto, ut non inde incendantur, sed fumū solū suscipiat. Et hoc ter singulis diebus facto. Aliud, ad pudendi ac sedis thymos. Soles ueteramentarias, & cucurbitam siccā exurit to sigillatim, & minutissimē trita paribus portionibus permisceto, & locis uino prius elotis inspergito. Experientia hoc cognitum est. Ceterum maligno rū thymorū sectionē, aut eruptionis sanguinis periculū reprobare oportet: nō malignos autē tūto refecamus. Neq; cū hic sanguinis eruptionis timor est. Cauendum tamē est ne uerus ā scalpri acie lædatur, quod facile uitare est, si thymus distensus prope uollesā dentes amputetur, sicut in nymphæ sectione diximus. Refectione uerō factā, ad desiccandos locos pharmacū quoddā sanguinē sistēs adhibebimus. Hu meatio enim causa est ut thymi regenerentur, sicut etiā pinguiū medicamentorū usus: proinde per totā curationē, laxāda ac pinguia sunt fugienda. post chirurgiā proflus galla trita, aut alumen scissum, cū pari thuris pondere admoueanur. Deinde medicamen to florido, ex stomomate ferri aut rosarum flore, & cytinis sicis parato utemur. Nā hæc contrahunt, & quadatenus purgant, & ulcera ad cicatricē ducunt.

*De condylomatīs, Apsasiæ.*

Cap. cvi.

Condyloma est rugosa eminētia. Rugæ enim circa os uteri existentes, dum inflammantur, attolluntur & indurantur, tumoremq; ac crassitudinem quandam in locis efficiunt: præcipue uerō dū mēses prodeunt, & post partus attolluntur, & p̄ tactū facile cognoscūtur. Ad has igitur formēta adstringētia, & elidend fa cultatis pessi subdantur, quæ omnia supra ad sedis condylomata sunt relata. facit & pessus ē malicorio & butyro præparatus, & qui ex lycio indico ac cæly po paratur.

*De rimis, ac fissuris uteri.*

Cap. cvii.

Rimę circa os uteri ex uolentis partibus aut magnitu dinē capitis infantis fiunt. Sed & ex acriū humorū influxu locos rūpente ac corrodente fieri solent. Et primum quidē latent, dolore ā partu adhuc recente, postea uerō paulatim ad sensum perueniunt. Nā & ad manū contactum, & in colui dolores excitātur, quādo sanē ex affricu cruciatur, deprehēduntur aut dilataro sinu, fissuræ enim circa uteri osculū per am biniū uisuntur. In harum itaq; curatione chirurgiā, & omnia mordacia pharmaca reprobare oportet, itaia em inflammationes ac cōuulsiones inducūt: & infectio nibus simplicioribus ac pēsis uti, & medicamentis ad sedis rimas descriptis, præcipue eo quod ē pōpho lyge, sibio, & plūbo usto paratur. Quod si callosæ fuerint, medicamento ex charta usta utendū est pluri mo rosaceo diluto: callos enim exerit, & ulcera re purgat. Si uerō nimiam eius acrimoniam nō ferunt, iridem aut lyricam terebinthina exceptam inde: postea quādem autem cicatrix ulceribus inducā est, cōuenit

id quod ex cadmia constat, aut quoddam sedi desti natum: uelut est quod ex spuma argenti lora præpa ratur, paulo antē ad caneros uteri ā nobis relatum. Aut hoc quod ad rimas sedis, & muliebrum loco rum condylomata præparatur. Stibij, acaciæ, singu drach. vi. passo excide ac utere. Sape & hoc utimur. Aloēs, opij, sing. dra. xvi. Stibij dra. vi. myrrhę dra. iiii. thuris, æruginis, sing. dra. i. uino excide & ute re cum passo. Aliud cito conferens, Stibij, acaciæ, plumbi usti, & loti, sing. dra. xvi. spodij, pompholy gis lotæ dra. viii. fructus ericæ, aluminis scissi, atrame nti sutorij, thuris, myrrhæ, opij, sing. dra. viii. cū uino terito uelut collyrium, ac pastillos formato, & cum passo dilutū uitior. Aliud ad omnes pudendo rum muliebriū ac sedis affectiones. Siftit etiā hēmor rhoidas. Spumæ argēti lotæ, cerussæ lotæ, plūbi usti & loti, sing. dra. xxv. Stibij loti dra. ix. pōpholygis lotæ dra. viii. cadmiæ lotę dra. v. Hęc omnia primū seorsim, deinde simul terito, & uini ac olei myrtē sing. lib. i. paulatim adfillaato, ac probe terito, & uni ta in plumbæ pyxide seruato, & uelut optimo me dicamento uitior. Nos uerō, inquit Archigenes, ceræ tyrrenicæ lib. i. & adipis anserini tantundem adijci mus. Quidam etiā plumbaginis drac. xx. addunt.

*De tuberculis uteri militariū.*

Cap. cviii.

Aliquando in collo aut osculo uteri, aut in ipso puden do, militares quædam eminētiæ enascuntur, ad ra tūm quidem occurrentes, uerum certus ad dioptra parentes. Solentq; ex coitus affricu, tum menses, tū conceptionem impedire. In his alius primum pur gāda est. Deinde linteolo locus detergendus, & glās ex carne caricarum pinguiū ac alumine scisso sub denda. Aut pessus ex alumine & felle. Aut medica menta ad consequenda ac discutienda tubercula cō moda illinenda. Eloriones quoque ex aqua mulsa, & aliquo aromatum decocto adhibeantur.

*De scabris uteri pustulis.*

Cap. cix.

In pudendo & uteri osculo febræ pustulæ oriri solēt, furfuraces squamas reijcētes, pruritumq; inducē tes, & calidæ aquæ affusione gaudentes. In his alius alutino lacte purgeur. Vomitus ā coena fiat. In bal neo ex udatio fiat, & in calidam infessus. Et loci uis nō calido cum nitro eluantur, & post uinum aqua calida infundatur. Et licum indicū, aut amurca, aut butyrum cum sulphure, aut ceratum myrtum cum spuma argenti, aut alumen rotundum cum melle, aut malicorium cum myrrhā & melle illinatur. Squamas autem & furfures exterle, cydamini radix cum melle illita. Cæterum in cibis omnia acrida, salsa, & acida cauenda sunt.

*De alarum pudendi muliebris abscessu.*

Cap. cx.

Si in muliebris pudendi alis siue labijs abscessus ortus fuerit, & uersus sedem declinauerit, sectionem eius uitare oportet. Nam ex eorum locorum sectio ne, quum rugosi sint, facile fistula generatur. Si uerō sursum ad urinarum meatum uergit, tūto se ca re licet.

*Ad umbilicum prolapsum.*

Cap. cxii.

Ammoniacum thymiaa cum modico cumino ex ui no tritum apponito ac deligato. Aut buphthalmum cum succo mori tritum imposito. Aliud. Bitu minis drachm. xii. carnum caricarum pinguium tantundem, primum seorsim, deinde simul trita imposito.

Ad rugas uentris, rimasq; ac nigredines d partu  
exortas.

Cap. cxiii.

Adiantum & spumam nitrī albam exactissime trita  
inspergito, & uenter nō corrugabitur. Hoc & in bal  
neo, & extra balneum utendum est. Aliud. Nar  
cissī bulbos cortice detracto concidito, & in umbra  
ficcato, & de his sumito dra. viii. radicis struthij con  
tusa, farinae pīfang, farinae fabarum, maxime Aegy  
ptiarum, singulorū drac. x. radicis bryoniae, radica  
ari, radicis cucumeris slyuestris, costi, singulorū tria  
tem, terito & cribrato, ac uentri per erui farinam de  
terito inspergito, & rursus affricando detergito. Nā  
ad rugas & rimas generari non sinit, & genitas tol  
lit. Maculas etiam ac nigredines in quavis corporis  
superficie extert. In puerperis igitur uentrem oleo  
anice probe confricato, & postea chariā medicā  
mēto cōspersā adhibeto, & fascia deligato, ac post  
quartum diem exoluito. Deinde totū corpus in bal  
neo detergito, & omnes nigredines ac rugas abole  
bis. Aliud, ad uentres a partu nigrefactos. Ostreo  
rum usitorum partem i. farinae fabarum, maxime  
Aegyptiarum, partes ii. misce ac utere in balneo.  
Aliud. Nigellæ, nitrī, æquas portiones ad strigē  
etiam spissitudinem cum aqua terito. Aliud. Scillæ  
ustæ drach. viii. cornu cerui usti, aluminis fisci, sa  
lis cappadoci, myrrhæ factes, nigellæ, singulorum  
drach. ii. farinae ordeī drachm. xiiii. Vfus tempore  
melle excipito, & panniculo detrīto infartum uentri  
adhibeto, & per dies septem finito. Octaua uerō ab  
luito, ac rursus apponito, & totidem diebus finito.

Smegma faciei ac reliqui corporis. Granorum ita  
cint, bulborū narcissi decorticatorū ac resicatorū,  
sing. drach. viii. simlaginis drac. xiii. thuris drac. ii.  
ouorum albumina ii. misce ac utere. Smegma aliud  
efficiat. Floris lunci odorati, iridis, sing. drac. ii. ma  
stiches dra. i. terito, & pīfang succo excipito, ac pa  
stillos formato, quos usus tempore aqua dilutos illi  
nito, et per interuallū frigida abluito. Aliud smeg  
ma ad corporis rugas, Rusi. Caricarū pinguis, ra  
dicis bryoniae, farinae erui, testarum sepiae usitarū,  
singulorū æquales portiones. Terenda terito, & ad  
caricas in mortario confusas ammisceto. Hoc in bal  
neo utendum est. Aliud. Vitem albam farinae erui  
ammisceto ac utitor. Smegma, ad desiccandas nigre  
dines multo usu cognitur. thuris sequiunciam, ceru  
sæ lotæ, spumæ argenti lotæ, amyli, scobis marmo  
ris præconesij, mastiches, spumæ nitrī albæ, testarū  
sepiae, sing. unc. i. saponis gallici unc. x. ii. ouorum al  
bumina x. omnia saponē excipe, & utere in quacūq;  
corporis parte. Smegma admirandum. Cutis super  
ficiem extert & illustrat. Farinae fœni græci, amyli,  
tragacanthæ, singulorum trientē, terræ samia quæ  
Stella uocatur, ammoniac thymiamatis, singulorū  
quadrantem, mastiches, medullæ ceruinæ recentis,  
singulorū trientem. Tragacantham lacte macerato,  
& reliqua minutissimè trita ammisceto, ac pastillos  
formato, eosq; in umbra exlicato. Vtere etiam  
smegmatis Sermone octauo relatis, ubi habetur etiā  
ea quæ ad alarum oris fœtorem conferunt.

Præparationes unguentorum siccorum, moschatō  
rum. Item conditorum, ænanthariorum, ac

suffumigiorum uariorum.

Cap. cxiiii.

Xeromyrum, hoc est, unguentū siccum, Beredrias appel  
latum. Arnabo, amomi, spicæ nardī, singulorum

quadrantem, folij malabathri, styracis, singulorum  
quadrantem, croci, caryophyllorum, singulorum  
sequiunciam, opobalsami sexuncem, rosarum uiri  
dium unc. x. v. misce. Xeromyrum moschatum. Fo  
lij malabathri, casia, croci, styracis, arnabonis, amo  
mi, spicæ nardī, singulorum sequiunciam, caryophyl  
lorum drachm. iiii. moschi scrup. iiii. opobalsami  
unc. i. olei indicī aut similis quadrantem, rosarum  
siccarum sextantem, aut uiridum trientem. Com  
positio Arabica. Masuaphij, caryophyllorum, co  
sti, singulorum sextantem, spicæ, folij, rosarum, sing.  
scrup. x. ii. amomi, styracis, singu. unc. i. gummi sex  
tantem, arida terito ac cribrato, gummi uerō mades  
facto, & ad styracē in mortario tritum arida ammi  
sceto, & cū gummi pilulas rotundas ad ciceris modū  
di magnitudinem formato, easq; acu perforato, ac si  
lum trajecto, & arefactas de collo suspēdas præ  
beto. Xeromyron rosatum. Rosarum aridarum  
libr. i. costi, folij, caryophyllorum, hypni, cassami  
odorati, unguium aromaticorum, styracis, singulo  
rum sextantem. Aliud. Folij, rosarum siccarum,  
amomi, costi, caryophyllorum, spicæ nardī, arnabo  
croci, singulorum unc. i. hypni, styracis, opobalsa  
mi, singul. drachm. iiii. Aliud. Rosarum libras  
tres, hypni lib. i. styracis flauī & pinguis, unguium  
aromaticorum, singulorum unciam i. Xeromyrō  
leucophyllon appellaum. Cuius usus ad collum &  
axillas est. Terræ samia librā i. styracis, folij, opo  
balsami, singulorum sextantem. Styracem cum opo  
balsamo subigito, solum uerō terito ac cribrato.  
Et ad omnia simul in mortario probè permixta, suc  
ci rosarum quantum satis est adijcito ac uitior. Hy  
gromyron, hoc est, liquidum unguentum, quo mulie  
res ad aures utuntur, folij, spicæ nardī, masuaphij, ma  
stiches, caryophyllorū, singulorū unc. i. scrup. x. ii. sty  
racis pinguis, opobalsami, singulorū sextantem, croci  
scrup. vi. moschi scrup. i. olei salsa electi trientem.

Olei salsa præparatio preciosa. Cap. cxv.

Olei omphacini sextar. x. x. iridis illyricæ lib. i. amomi  
sexuncem, aspalathi, hypni, sing. lib. i. cassami aroma  
tici lib. ii. caryophyllorū, folij, arpobalsami, singulo  
rum lib. i. xylocasie quincuncem, casia trientem,  
costi, styracis pinguis, croci, sing. unc. i. myrrhæ, ar  
nabo, singulorum quadrantem, spicæ nardī trientē,  
omnia in aqua coquito. Modus autem præparandi  
habetur Sermone primo, ubi etiam aliam olei salsa  
descriptionē, & unguētī nardini præparationē habes.  
Hygromyri præparatio. Olei salsa lib. ii. opobalsa  
mi lib. i. spicæ nardī, folij, singulorum trientem,  
carpobalsami, arnabo, amomi, ambrae, ligni aloës,  
singulo sextantem, mastiches, moschi, sing. scrup. vi.  
quod si caphuræ copia fuerit, sextantem ex ea addi  
to. Hoc ad axillas utitur, & in aures cum auricula  
rio specillo indunt. Leucophylli siue xeromyri albi  
præparatio. Lapidis specularis lib. i. folij, spicæ nar  
dī, caryophyllorum, singulorum scrup. vi. succini  
scrup. x. ii. moschi siliquas vi.

Olei siue unguenti foliati, ac spicati præpara  
tio.

Cap. cxvi.

Opobalsami lib. i. styracis, amomi, singulorū quadra  
tem, casia trientē, lilia x. simul terito ac uitior, & si  
crassius fuerit, cum oleo salsa diluito. Alia foliati  
descriptio. Cera libr. i. nardini olei cyziceni libr.  
iii. picis brutæ quincuncem, ladani unc. i. styracis  
pinguis



pinguis quadrantem, costi, casiae, singulorum sextan-  
tem, cardamomi, folij, sing. unc. i. spicæ nardi semun-  
diam, croci, uini Aminæi, singul. unc. i. opobalsami  
quadrantem. Foliat præparatio ex Oribasio. Casie  
sexuncem, folij quadrantem, amomi, ladanij, singul.  
unc. i. piperis grana quadraginta, myrrhæ troglody-  
tis unc. i. ungenti nardini libr. i. Arida terito, & re-  
nuisimo cribro excutito. Deinde nardinum addi-  
to, ac rursus probè terito, & ut nigrius reddatur me-  
dicamentum, iuglandium cortices usos ac tritos am-  
misceto, & opobalsami cochlearia .iiii. infillato, ac  
utitor. Facit etiam eximie ad resolutiones Spicati  
præparatio. Amomi sextantem, myrrhæ troglodytis  
cæ, costi, sing. unc. i. folij, casie, ungenti, foliat aut sal-  
ca, singulorum quadrantem, spicæ nardi unc. i. spicæ  
celticæ tritentem, ungenti nardini sexuncem, ceræ albæ  
quantum satis est, & ut compages liquidior fiat, opo-  
balsami quadrantem addito.

*Oenanthariorum præparationes.* Cap. cxvi.

Costi sextantem, casiae, carpopalsami, spicæ nardi, sing.  
unc. i. amomi quincuncem, nardi celticæ tritentem,  
ungenti spicati & foliat, aut salca, singulorum qua-  
drantem. Ceræ albæ quantum satis est, & ut compages  
liquidior euadat, opobalsami quadrantem ammisce-  
to. Alia oenantharij descriptio. Costi sextantem,  
casiae, carpopalsami, masuaphij, myrrhæ, sing. unc. i.  
amomi quincuncem, spicæ nardi, styracis, singulo-  
rum tritentem, caryophyllorum sesquiducum, opo-  
balsami sexuncem, lilia x. i. uini adstringentis odora-  
ti sextar. x. i. salis cappadocici sextantem. Folia lilio-  
rum crocei ipsorum ac unguibz demptis probè de-  
tergito, & in sindone pura inuoluta per diem acno-  
ctem in umbra siccato, donec marcescant, deinde ad  
myrrhā in mortario cū uino subasā arida trita am-  
misceto, & pariter cum uino subigito. Et his postea  
styracē in minutissimas partes contusum addito, &  
omnia opobalsamo affuso unito. deinde lilia quoq;  
ammisceto, & omnia in uitreū uas trāsusa cōcutito,  
& uino postea in idē uas infuso rursus cōcutito, &  
uas ipsū moscho aut hypno diligētē obturato, deli-  
gato, luto oblinito, & p dies quadraginta insolato.

*Abstinbatij siue rodabstinbatij præparatio sa-  
lubris.* Cap. cxvii.

Spicæ nardi scrupul. ii. folij, amomi, singulorū scrupul.  
i. mastiches scrupulos .iiii. rosarum siccarum scrupul.  
vi. mellis sextarium i. uini sextar. .iiii. aut ut alij ha-  
bent, quinque. Quidam pro amomo costum adij-  
ciunt. Aliud. Rosarum resectis unguibz, & in  
sindone per diem ac noctem refecatarum libr. i.  
mellis optimi sextarium i. uini antiqui sextarios  
vi. Rosas in uino ad dies quindecim macerato, &  
quotidie uas ipsum ad solem exponito. Deinde ui-  
no excolato, spicæ nardi scrupul. ii. & folij aut casiae  
scrupul. i. ammisceto. Sint autem hæc prius cum uino  
trita. Postea uerò mel adijcitur, unito, ac uisitor.  
Aliud rosarum. Rosarum exemplis unguibz in  
umbra siccatarum libr. i. uini antiqui ac splendidij  
sextar. v. mellis sextar. i. Rosas in uino per diem ac  
noctem macerato. deinde ad uinum excolato mel  
adijcitur, & post triduum exhibeto. Quidam masti-  
ches scrupul. vi. addunt, & ita alium mollit.

*Conditij purgatorij præparatio.* Cap. cxviii.  
Hoc cōditio ad pituitosos hyemis tēpore uteris. Mellis  
sextariū unū, uini sextarios v. piperis grana xlvi.

styracis calamitæ scrupul. .iiii. Styracem ad prunas  
cum modico melle diluto, deinde in mortario cum  
pipere probè terito, & mel paulatim adstillato, ac  
postea uinum ammisceto. Eius uerò meminisse ope-  
ræ precium est, quòd mel nisi ualde purum fuerit,  
non permittit ut potio ex ipso præparata desideret, ac  
pura & clara fiat. Proinde desumpandum est mel, ac  
purum faciendum: si enim desumptatum fuerit, po-  
tio eadem die desideret ac pura euadet. Alia abstin-  
thar præparatio. Spicæ nardi scrupulos v. croci si-  
liquas .iiii. abstinthij drachm. i. mastiches scrupul. vii.  
mellis sextarios .iiii. uini sextar. x. i. Alia con-  
ditij præparatio. Piperis scrupulos vi. spicæ nardi  
scrupul. i. croci si libuerit, siliquam i. uini sextar. v.  
mellis sextarium unum, Mastichat ac cuminatij  
præparatio. Cumini scrup. x. i. mastiches sesqui-  
unciam, uini sextar. v. mellis sextarium unum. Ani-  
sati præparatio. Anisi scrupul. .viii. spicæ nardi  
scrupul. vii. uini sextar. v. mellis sextarium i. Citra-  
ti præparatio. Coricis citri electi, uel foliorum  
eiusdem bessem, uini sextarios .viii. mellis sextar. i.  
corticem aut folia in uino per dies septem macerato,  
deinde uino excolato mel ammisceto. Apiciat præ-  
paratio. Seminis apij scrupul. x. i. seminis ruscæ scrupul.  
vi. mellis sextar. i. uini sextar. .iiii. aut v. pro ab-  
stinthij uini loco, aquam accipito.

*Rhodomeli præparatio.* Cap. cxix.

Succi malorum cotoneorum, dempto cortice & gra-  
nis siue medulla, expresij sextar. ii. succi rosarum  
sextar. i. aquæ ad tertias decoctæ sextar. .iiii. mellis  
sesquisextarium. Succum malorum suo tempore ex-  
primito ac excolato, eiq; mel ammisceto, & ad rosa-  
rum tempus seruato. In uere autem cum aqua ad ter-  
tias decoctæ, & rosarum succo, afferuatum cum melle,  
malorum succum unito, ac uisitor.

*Muscati præparatio.* Cap. cxx.

Similaginis sextar. xvi. olei omphacini sextar. v. pipe-  
ris quincuncem, folij malabathri, caryophyllorum,  
sing. unc. i. musci dulcissimi sextar. .iiii. mellis lib. ii.  
ex his omnibus uelut placentulæ paruæ efformatur.

*Gari præparatio pro abstemijs.* Cap. cxxi.  
Aquæ sextar. xxxi. salis sextar. ii. cicerum nigrorum  
siccorum sextar. .iiii. amanitarum libr. ii. caricas  
quinquaginta, præparato, excolato, ac seruato.

*Suffumigij moschati præparatio.* Cap. cxxii.  
Rosarum uiridiū lib. vi. mellis Attici excolati lib. .iiii.  
& quadrantem, folij sexuncem, amomi tritentem, ca-  
ryophyllorum sextantem, spicæ nardi tritentem, co-  
si bessem, unguium aromaticorum unc. i. carpopal-  
sami tritentem, alari sextantem, aloës unc. i. calami  
indici sexuncem, nuces indicas tres, sandalorū scrupu-  
los xvi. ambre unc. i. styracis pinguis lib. .iiii. qui-  
dam pro styrace, ladanij pinguis, & stactes myrrhæ  
sing. lib. i. aut ut alij habent, dextrantē accipiunt, croci  
unc. i. mastiches quadrantē, moschi scrupul. .iiii. Ad ar-  
da trita ac cribrata, ladanum, styracem, stactem, myr-  
rham, & mel in mortario ammisceto, deinde ambra  
liquefactam adijcitur. Postea moschum aqua calida  
dissoluit, & partem eius addito, & parē ad pastila-  
lorū efformationē seruato, deinde manibus omnia  
probè subigito, ac cum moscho efformato. Suffu-  
migium regium. Styracis calamitæ lib. i. ligni aloës  
sexuncem, ambre unc. i. moschi scrupul. .iiii. quidā ita præ-  
parant, styracis calamitæ lib. i. ligni aloës tritentem,  
ambra,

ambrae unc. i. moschi scrupul. iiii. & addunt succi rofarum quantum satis est. Suffumigium moschatum, Theopomp. Syracis pinguis dextantem, caryophyllorum, costi, rosarum siccarum, folij, mastiches, sing. unc. i. moschi siliquas quatuor. Ego uero inquit, moschi scrupulos iiii. & balsami quantum satis est adijdo.

Aliud suffumigium moschatum. Folij, costi, rosarum siccarum, hypni, spicae nardi, singul. unc. i. croci, unguis aromaticorum, caryophyllorum, amomi, cassiae, singul. scrup. x. i. carpobalsami, bdellij, singul. scrup. x. i. syracis scrupulos x. i. moschi scrupulos iiii. Rhodomelitis, hoc est, mellis rosacei quantum satis est. Suffumigium Moschatum in ecclesia usurpatum. Costi libras iiii. & dimidiam, caryophyllorum lib. ix. folij sesquilibram, spicae nardi tantundem, cassami unc. x. iiii. syracis liquidi lib. x. vi. alpri lib. iiii. croci dextantem, moschi, ambræ, singulorum sextantem. Cæterum princeps Orientis sic præparat. Costi quadrantem, spicae nardi unc. i. folij unc. i. caryophyllorum sesquiunciam, cassami semundam, alpri sextantem, syracis liquidi electi quincuncem, croci scrup. ii. moschi, ambræ, singul. scrup. ii. Suffumigium bonum rosatum. Foliorum rosarum aridorum, costi, mastiches, singulorum sexuncem, spicae nardi, amomi, opobalsami, singulorum sesquiunciam, croci, myrrhæ, singul. unciam i. syracis dextantem. Vini odorati antiqui, & mellis, quantum satis est. Suffumigij ungentarij præparatio. Costi sesquilibram, elenij, rosarum siccatum, nigellæ, singulorum lib. i. carpobalsami, aspalathi, singulorum lib. ii. myrrhæ sesquilibram, tari, hoc est, ligni aloës, ladanij, singulorum lib. iiii. amomi lib. i. mastiches bessum, ligni caryophyllorum sexuncem, foliorum scylmatis, hypni, singulorum lib. x. i. myrrhæ stactes libras v. bdellij libras ii. unguis aromaticorum, croci, singulorum trientem. Suffumigium ungentarium insigne. Costi sesquilibram, cassami lib. i. ligni caryophyllorum, foliorum scylmatis, spicae nardi, singulorum sexuncem, coridis aspalathi, rosa-

rum siccarum, singulorum quadrantem, mastiches chitæ, bdellij, singulorum sextantem, ladanij lib. iiii. stactes nigrae lib. vi. croci scrupulos vi. ego uero inquit, pro stactæ nigra, albæ lib. ii. & syracis libras iiii. ammisceo. Suffumigium ualde amabile. Costi unc. x. i. caryophyllorum trientem, ladanij lib. i. spicae nardi, folij, singulorum sexuncem, syracis lib. iiii. alpri unc. x. vi. croci sexuncem, moschi bessum, mellis quincuncem. Suffumigium domine Romulæ. Syracis calamitæ lib. ii. costi, stactes albæ, singulorum sexuncem, caryophyllorum, tari, singulorum sextantem, spicae nardi sextantem & semunciam, croci trientem, ambræ drachm. iiii. succini unciam unam, moschi scrupul. iiii. uel quantum accipere uolueris. Suffumigium rosatum, Embularchi. Cassiæ, myrrhæ, bdellij, arnabo, calami indicij, succini, carpobalsami, ladanij pinguis, hypni, folij, singulorum quadrantem, caryophyllorum, unguis aromaticorum magnorum, mastiches, singulorum trientem, croci sextantem, spicae nardi, opobalsami, singulorum sexuncem, rosarum siccarum, syracis, singul. lib. i. rosarum uiridium lib. ii. uini odorati ueteris, & mellis Attici, singulorum quantum satis est. Suffumigium Pamphili Episcopi. Folij, caryophyllorum, hypni, ladanij pinguis, singulorum sextantem & semunciam, calami indicij, spicae nardi, unguis aromaticorum magnorum, bdellij, carpobalsami, croci, cassiæ, singulorum quadrantem, amomi, mastiches, singulorum quincuncem, costi sesquiunciam, arnabotantundem, succini unciam unam, opobalsami quadrantem, syracis pinguis lib. iiii. rosarum uiridium relectis unguibus lib. vi. uini mulsi quantum satis est. Sit autem mel electum, & uinum antiquum odoratum, ex quibus uinum mulsum parari debet.

Myrrhatio ad cadueris conseruatio-

nem.

Cap. cx xiii.

Aloës, myrrhæ, gummi, singulo. lib. i. sarcocollæ lib. ii. acaciæ sesquilibram, iuridis sexuncem, opobalsami quadrantem.

DECIMISEXTI AC VLTIMI SERMONIS AETII  
FINIS, IANO CORNARIO MEDICO  
PHYSICO INTER-  
PRETE.

PONDERA IN AETIO VSURPATA.

Libra	undae xii.
Deunx	unc. xi.
Dextans	unc. x.
Dodrans	unc. ix.
Bes	unc. viii.
Seprunx	unc. vii.
Sexunx	unc. vi.
Quincunx	unc. v.
Triens	unc. iiii.
Quadrans	unc. iii.
Sextans	unc. ii.
Vncia	drach. viii.
Semuncia uel semissis	drach. iiii.

Reliqua pondera ac mensuræ iuxta Pauli traditionem usurpata sunt.

## DE PONDERIBVS AC MEN-

## SV RIS, EX PAVLO AEGINETA,

I A N O C O R N A R I O Medico Physico

Interprete.



**P**ONDVS, grauitatis menſu iudicatur. Menſura autem, uasculi capacitate. Vasculum uerò, tum arida, tum liquidæ quantitatibus menſura exiſtit. Quare tres omnino diſmenſæ quantitatibus ſunt diſtinctæ: una quidē ponderis: altera uerò rerum aridarum, uipote quæ uelut in aggerem accumulantur: tertia autem liquidorum. Cæterum quum penē infinita pondera ac menſuræ, tum pro locorum, tum pro eorum qui eis utuntur conſuetudine, exiſtant: de his ſaltem quæ omnibus maximè familiaria ſunt, nobis ſermo erit.

De ponderum ac menſurarum notis.

**V**ERVM quum quidam non integris literis, ſed per notas hæc ipſa pondera ac menſuras ſignificent, præſtiterit fortaliſis & nos in hac parte ueteres imitari, atque primum characteres ipſos declarare. Primum igitur litera  $\chi$  ubi literam habuerit incumbentem, Chalcum, id eſt, Aerem, ſignificat: hoc modo,  $\chi$ . Si uerò, ipſi  $\chi$  incubuerit, Choa, id eſt, Congium, demonſtrat: ſic  $\chi$ . Si  $\alpha$  Chœnicem,  $\chi$ . Si  $\mu$  Chemam  $\chi$ . K uerò litera, ſi incumbens habeat, & linea recta inferiorem ipſius apicem per obliquum ſecet, Ceratium, id eſt, Siliquum, ſignificat: hoc modo  $\chi$ . Quod ſi  $\nu$  ipſi  $\chi$  incumbat, Cyathū ſignificat, ſic  $\chi$ . Si uerò  $\nu$ , Cotsylā, id eſt, Heminam,  $\chi$ . Porro linea circumflexa, quam nihil aliud circūſtat, & quæ omnino per obliquum ponitur, Obolum denotat,  $\omega$ . Si uero duæ ſunt lineæ, quas nihil circumſtat, duos obolos ſignant,  $\omega\omega$ . Qui Gramma, hoc eſt, ſcrupulū, faciunt, quod per literam  $\gamma$  quæ  $\rho$  adiectum habet denotatur, recta amplius linea ipſum  $\gamma$  ſecante, hoc modo  $\gamma\rho$ . Duæ autem lineæ iuxta alteram extremitatem conſectæ, angulumq; cōſtituentes, ad ſimilitudinem duorum apicum, qui in ipſius K literæ pīctura, ad rectam lineam adſcribuntur, Drachmam ſignificant, quæ & Holca cognominatur: hoc modo  $\lambda$ . Propriè autem Holca per  $\lambda$  literam notatur,  $\lambda$ . Itera medium eius occupante: hoc modo  $\beta$ . Quod ſi, litera ad  $\lambda$  apponatur, libra ſignificatur,  $\lambda$ . Aliqui tamē alteram ipſius  $\lambda$  lineam per obliquum alia linea ſecantes, Libram denotant: ſic  $\lambda$ . At uerò litera  $\gamma$  intra angulum ſuum  $\gamma$  literam habens, Vnciam ſignificat,  $\gamma$ . M autem iuxta medium ipſius  $\gamma$  habens, Minam denotat,  $\gamma$ . Si uerò  $\gamma$  habeat, Myſtrum,  $\gamma$ . Si  $\mu$  Medimnum,  $\gamma$ . Si  $\rho$  Modium,  $\gamma$ . Porro  $\gamma$  literam  $\rho$  complectens, &  $\nu$  incumbens habens, Trybliū ſignificat,  $\gamma\rho$ . Id autē ſupra  $\rho$  habens, Xeſten, id eſt, Sextarium, deſignat,  $\rho$ . Si uerò  $\rho$  habeat ſupraſcriptum, Oxybaphum, id eſt, Acetabulum,  $\rho$ . Aliqui tamen Xeſten per  $\rho$  denotant, recta linea diſſectum, hoc modo,  $\rho$ . H autem incumbens  $\mu$  habens, Heminam indicat,  $\mu$ . K uero cum  $\rho$  connexum incumbente ipſis litera  $\mu$ , Ceramium ſignat,  $\mu\rho$ .

## DE PONDERIBVS.

MNA Antica &amp; Aegyptia habet Vncias xvi

Mna Romana Vncias xx

Libra Vncias xii

Vncia Drachmas viii

Drachma Scrupulos iij

Scrupulus Obolos ii

Obolus Siliquas iij

Siliqua Aerōs ii

duasq; tertij partes: ita ut obolus æreos octo complectatur.

## DE MENSVRIS LIQVIDORVM.

ITALICVM Ceramium habet Choas viii

Chus ſive Congius Sextarios vi

Sextarius Cotulas ii. quæ &amp; Trybliā appellantur.

Cotula autem ſive Tryblium, Magna Myſtra iii. Acetabula uero iiii

Magnum enim myſtrum continet Acetabulum i. &amp; Drachmas vi

Acetabulum uerò Sequicyathum habet.

Cyathus Chemas paruas, aut Myſtra parua ii habet.

Quod ſi uelis liquidorum iuxta pondus ſcire dimensionem: multæ enim rerum liquidarum differentię iuxta lancis momentum exiſtunt: idipſum ex olei, uini, & mellis exemplo docebimus. Mel igitur uino grauius eſt quarta ampliusq; decima parte, quod ſerē totum tertiam eius partem facit: habet enim eadem mellis ad uinū menſura totum uini pondus, accedente in ſuper tertiam eius ponderis parte. Ad oleum autem mel dimenſum, dimidia ſua parte ponderoſius exiſtit: habet enim totum olei pondus, atq; in ſuper dimidiam eius pōderis partem. Vinum uerò nona parte oleum excedit: habet enim pondus ipſius totum, ampliusq; nonā eius ponderis partē. Quæ res ut magis euident & manifeſta fiat, omnium mēſurarum pondus ſigillatim ſubiecimus, uelut in tabella depīctum: ut ſi manifeſtè conſtet, quod per pondera quæ ſingulis menſuris ſubiecta ſunt, Oleum, Vinum

Vinum, & Mel, ex ordine demonstrantur.

Olei	Cerarium Italicum habet.	Mellis
libras LXXII	Vini libras LXXX	libras CVIII
libras IX	Chus siue Congius habet libras X	libras XIII & dimidiam
uncias XVIII	Sextarius habet uncias XX	uncias XXVII
uncias IX	Cotula siue Hemina habet uncias X	uncias XIII & dimidiam
uncias III	Magnum mystrum habet uncias III scrupulos VIII	uncias III & dimidiam
drachmas XVII	Acetabulum habet uncias II scrupulos XII	uncias III scrupulos IX
drachmas XII	Cyathus habet sesquunciam scrupulos IIII	uncias II drachmas II
drachmas VI	Paruum mystrum habet scrupulos XX	drachmas IX

Oribasius autem iuxta Adamantium, Sextarium Italicum vini quidem iuxta mensuram Vncias viginti quatuor habere ait: iuxta pondus uero Libram unam, Vncias octo. Sextarium autem mellis Librarum duarum & dimidia pondus habere tradit.

#### DE MENSVRIS ARIDORVM.

AEgyptia Artaba continet Modios III  
 Modius Aegyptius & Italicus habet Choenices VIII  
 Choenix, Sextarios II  
 Sextarius habet Semisextarios II. qui & heminae appellantur.  
 Hemina autem habet Cyathos VIII  
 Atticus Medimnus continet Hemiecta XII  
 Hemiectum autem seu Semodius, Choenices IIII. quo fit ut Medimnus habeat Modios VI. choenices XLVIII.  
 sextarios XCVI.

Cæterum pondus harum mensurarum non facile est proferre, quod immensa diversitas rerum aridarum iuxta loci inclinationem existat.

FINIS BORVM QVAE PAVLVS AEGINETA  
 de ponderibus & mensuris tradidit, interprete IANO  
 CORNARIO Medico Phisico.

# QVATVOR AETII TETRABI-

BLAN, ID EST SERMONVM XVI. INDEX,  
in quo præter cætera ad Medicinam spectantia, Simplicium nomenclaturæ ram Græcè quàm Latine dicantur, iuxta Alphabeti ordinem.

**A** Blacidi infantes tempo 203  
& quæ post  
Abfractionem uicūs ratio fit habenda ibidem  
Abortiētes bimestres aut trimestres fetus quomodo medendæ 965  
Abortum futurum signa præcedentia 964  
Abrotoni facultas, & abrotoni uis 9  
Abcessum signa iudicatoria 241  
Abcessus intestinorum ortus & remedia 598  
Abcessus palpebrarum cura 403  
Abcessum sedis medicinæ 843  
Abcessum generalis curatio 863  
Absinthium quale 16  
Absinthium quod præstantius 118  
Absinthiorum uariorum descriptio 155  
Absinthiorum oleorum præparatio 1027  
Acacia unde fiat 10  
Acaciæ facultas 10  
Acacia quæ optima 117  
Acalyphes uirtus 10  
Acanthæ Aegyptiæ proprium 11  
Acanthæ leucosus 11  
Acanthi uirtus 11  
Accipitrum quale fel 98  
Acerbitas sincera ubi 3  
Acerbis sapor qualis 123.4.5  
Acerborum & dulcium natura 5  
Aceti facultas 4.5.56.135  
Acetum ab uix immaturæ succo quo differat 5  
Aceti multi præparatio 211.290  
Acetum mulsium qualis facultatis 126.132  
Acetorum mulsorum purgatorium uariæ compositiones 156.49  
Aceti purgatorii descriptio 116  
Acharista collyria 423  
Acharistos antidotus 806  
Achores infantium quomodo curentur 202  
Achorum descriptio & curatio 343.344.345  
Achoribus quæ cicatricem inducant 345  
Achrades quali uirtute 14  
Acidus sapor qualis 23  
Acnæ, id est, faciei uari, quomodo sanandæ 449  
Aconiti energia 11.784  
Aconitum, iris syluestris 340  
Acopa quæ dicantur 170  
Acopa podagrica diuersa 742. & inde  
Acoti facultas 11  
Acri sapor qui 27  
Acrium saporum natura 7  
Acerchordon quid, & unde ei nomen inditum, eiusque curatio 837.838  
Acron Agrigentinus quomodo ærem transfmutauerit pestis tempore 269  
Acæ qualibus uiribus 11  
Acutorum morborum terminus decima quarta dies 233  
Acutorum morborum prædictiones non esse tutas 243

Adamantis efficacia 338  
Adarces cuius facultatis 85  
Adianti facultas 10  
Adeps uulpinus qualis 171  
Adipis uirtus medica 107.108  
Adipis animalium conditio 107  
Adstrictionis actio 3  
Adstringentium medicamentorum qualitas 2  
Adstringentia simplicia quæ 125  
Ager feruadus quatuor morbi tempore superat 231  
Aegris incurabilibus neque occasio ne neque auxilia commodare 255  
Aegrotates quomodo doleant, nullo forisficus accedente quod dolorem ipsis inducat 273  
Aegilopsis uirtus 10  
Aegilops quid, eiusque cura 405.406.407  
Aegrius quibus uiribus 10  
Aegyptiacæ terræ usus 76  
Aegyptium Andromachi emplastrum 923  
Aegyptium pharmacum ad omnes aurium dolores 310  
Acquinoctium uernum quando 181  
Acquinoctium autumnale quando 182  
Aeris facultas 10  
Aeris flus qualis 90  
Aeris qualitates notio & differentia & deinceps 179  
Aeris squamæ efficacia 87  
Aeris uis qualitas 90.814  
Aeruginis aeris qualitas 855  
Aeruginis rasæ usus 87  
Aeruginis uermiculatæ facultas ibidem  
Aetitis lapidis energia 84  
Aetius prestigioris opinionem ne incurreret fugit 91  
Aethyopas à uatiuitate frontem circumcidere, ne oculorum fluxione infestentur 409  
Affectiois principium & generationem posse esse ex diuersis partibus 301  
Agarici proprietates 152  
Agaricum quod præstantius 117  
Agerati lapidis efficacia 82  
Ageraton cuius facultatis 10  
Aglaidæ liquidum collyrium 416  
Agninæ carnis qualitas 102  
Agnini pulmonis uis medica 108  
Agnos seu uirax 9  
Agrostis qualibus uiribus 9  
Aizozi uires quæ 10  
Alabandicus lapis qualis 84  
Alabandici lapidis uis 338  
Albi collyrii compositio & præstantia 424  
Albuginibus puerorum quæ cura conueniat 200  
Albuginum oculorum remedia uaria 383.384.385  
Albuginum tincturæ 385  
Alciadiadum, aliàs onochilos 9  
Aleyoniorum species & uires 85  
Alenum oleum quod 398  
Alexandriæ terræ usus 77  
Algæ conditio qualis 70  
Allicæ qualitas 127

Alimentorum ratio 6  
Alimentorum quæ sint facultates 125. uisq. 136  
Alisma quali uirtute 20  
Allij propria conditio quæ 164  
Aluæ quæ præstantior 117  
Aloës qualitas 11.857  
Aloës uis medicamentaria 149  
Alodaria Oribasij 259  
Alodariorum purgantium uariæ compositiones 161.162  
Alopecia qualis affectio, undequæ generetur, & eius cura 334.335  
Alphos quid & unde dictus, eiusque cura 825. & quomodo differat à lepra 830  
Alisnes facultas 12  
Althææ qualitas 21  
Alui animalium qualitas 103  
Alui adstrictionis remedia 545.548.562  
Alui fluxione laborantis remedia 584  
Aluminis species & efficacia 89  
Alumina balnea quibus conueniant 186  
Alysson quibus uiribus 12.150  
Alyssus cur dicta syderitis heraclea 317  
Amaracinum oleum 27  
Amaranti uires 12  
Amarorum natura 7  
Amarus sapor qui 37  
Amazonum pastulus 142  
Ambigua morbi quomodo inuestiganda 234  
Ambrosiæ qualitas 12  
Ambustorum ab igne medelæ 895.799.85.100.  
Amomi facultas 13  
Amomi electio 117  
Ammiu seu Ammi 12  
Ammodites quale animal, & qualis eius morius 773  
Ammoniaci qualitas 13.857  
Ammoniacum quod melius 117  
Ampelitis terræ qualitas 79  
Ampelos leuæ quæ facultate sit prædita 12  
Ampeloprasii uirtus 12  
Amphemerina febris quæ, & cur sic dicta 261  
Amphisbæna quale animalculi, & quod à scythala chalcidica differat, eiusque noxa & cura 775  
Amuræ facultas 12  
Amyli temperamentum 61  
Amylum cur dictum ibidem  
Amyli qualitas 110  
Amygdalorum uires 12  
Amygdalorum oleum 23  
Anagallidis utriusque qualitas 13  
Anchuse specierum facultas 9  
Ancylloglossorum remedia 470.60  
Anchylo affectio duplex ibidem  
Ancylotis quid, & cura eius 397  
Andrachnes facultas 13  
Andromachi compositio ad dentes molares, quæ eadem hora dolores fedat 467  
Androsimon quæ uirtute 16  
Anemones qualitas 13  
Anethi facultas 13  
Anethinum

# AETII INDEX.

Anethinum oleum 25  
 Aneurysma quid 147-915  
 Aneurysma quod fiat & curetur 915  
 Aneurysmatis quæ sint indicia ibi.  
 Angina species & causæ, remediaque 483.484.485.485  
 Angina medicæ 87.99.101.117.144-173.416  
 Anhelosus medentia 80 108.164.173.501  
 Ani fistulas quomodo curare oporteat 843  
 Anicetum emplastrum 940  
 Animalia uenenata quibus artibus tollantur 763  
 Animalium quis usus in medicinis 91.& inde  
 Animalium morbi unde deprehendantur 92  
 Animalium per singulas suas partes qualitas describitur, pagina 91. uisq; 117  
 Animalium quæ præfaga sint & uenenum prodant 790  
 Animi deliquij remedia 537  
 Animi deliquium in balneo quomodo curandum ibidem  
 Animo inquantibus remedia 270.  
 & deinceps quæ 278  
 Animo liqui quodam propter crudorū humorū multitudinē 270  
 Animo liquentes ob fluxū bilē 272  
 Anisati præparatio 128  
 Anisi facultas 14  
 Anserinus adeps qualis 3.108  
 Anserum uis qualitas 104. item ouorum 105  
 Antiades, uide Glandularum.  
 Antidoti ex cancriis fungulibus compositio 316  
 Antidoti ex nucibus compositio ibidem  
 Antidoti podagricæ 751. & inde  
 Antidoti mithridaticæ compositio & usus 801.802  
 Antidoti pæoniæ compositio 804  
 Antidotus aromatica optima Galli 805  
 Antidotus ex duobus piperis generibus ibidem  
 Antidotus Athanasia ibidem  
 Antidotus Efidæ qualis 802  
 Antidotus Hadriani 806  
 Antidotus Acharistos ibidem  
 Antidotus theriaci contra uenena quæ simplicia recipiunt, & quod coniciatur 793. eiusq; usus 794  
 Anthomis qualis 14  
 Antoninus, collyrium 420  
 Anulus digito impactus quomodo detrahatur 901  
 Aparines uires 14  
 Apes & uespas fugantia 765  
 Aphronitri energia 86.87  
 Aphtha quid 197.200  
 Aphthorum remedia 471  
 Apiati præparatio 927  
 Apij qualitas 14.63  
 Apochyma quid 191  
 Apochymatis præparatio 947  
 Apogei uenti qui 181  
 Apollonij Meimphytæ medicamentum 119  
 Apollonij naturale ad polypos medicamentum 355  
 Apollonij liquida compositio 417  
 Apomeli quid 252  
 Apomelitis præparatio & uis 289  
 Apoplegmatisformum pituita per os detrahentium descriptio 332  
 Apoplexia quid & qualis affectio,

eiusq; cura 318.319  
 Apoplexia quo differat à paralyfi 319  
 Appetitus perdit remedia 552  
 Appetitus caninus qualis, eiusq; species & cura 553.554.555  
 Appetitus uitiosi medicina 555  
 Aqua qualitates expert 2  
 Aquosus sapor ibidem  
 Aqua nihil humidius 5  
 Aquam concoctioni maximè resiste re 131  
 Aquæ frigide noxa & remedia 789.  
 Aqua quò per fossas ducenda 183  
 Aqua quomodo emendetur 184. fine aqua alimentum concoqui non posse ibidem  
 Aquæ lixiuij usus ibidem  
 Aquam ducentia remedia 153.656  
 Aquarū albularij potus utilitas 698  
 Aquarum dulcium iuxta temperatū ram uis 184.185  
 Aquā horrentiū affectio & cura 314  
 Aquæ mulsæ usus 132.133.134  
 Aquarum potabilium differentia & notæ 182.183.184. & quibus comoda & incōmoda sit ibidem  
 Aquaticorū animalium alimentū 105  
 Aquila ortus & occasus 182  
 Aquilaram fel quale 98  
 Arabica compositio 102.16  
 Araci facultas 15  
 Aranearum telæ ad quid utiles 111  
 Arborum fructus ferè omnis prima generatione acerbi sunt gustu 5  
 Arbuti, eiusq; fructus qualitas 43  
 Arceutos qualis 15  
 Archigenes quò suum præceptorē Agathinū delyrio liberat 187  
 Arctium, quod & Bunion 18  
 Arcturi occasus, ortusq; 182.183  
 Ardor æstuosus quò curadus 214  
 Arenæ ingestiois modus 143  
 Argemum quid, & eius cura 374  
 Argenti scoria 89  
 Argenti spumæ uis 88.789  
 Argenti uini proprium 789  
 Aridorū collyriorū compositio 412  
 Aridum Danai 413  
 Arictinæ carnis qualitas 102  
 Aritholochia triplex, & qualis 14  
 Aritholochiæ clematidis feminis energia 152  
 Armeniaca mala 13  
 Armenij usus medicus 151  
 Armenij pictorū facultas 85.384  
 Armuthus lapis 386  
 Arnoglossi qualitas 15  
 Arromaticum collyrium 430.435  
 Aron quali uirtute 15  
 Artemisiæ uires 15  
 Arundo sepiaria 37  
 Aruatū morbus quid, & eius remedia 545.546  
 Arsenicum, auripigmentum 86  
 Arteriarū sectio quomodo fiat 147  
 Arteriarum sanguinis sistendi medicamentum ibidem  
 Arteriarum sectionis ratio 408  
 Arteriarum remedia 489  
 Arteriæ confectiones 491  
 Articularis morbus, uide Arthritis & Podagra  
 Articulorum incuruatorum quæ sit causa 718  
 Articulari morbo qualis perussio conueniat 723  
 Articulorum distortorum malagmata 737  
 Articulos laxos & luxatos quomodo cures 898

Arthritis quid, & quomodo differat à podagra, ac eius causæ 716. cur in quibusdam paruis, in quibusdam magnus morbus, & alijs diu, alijs paruo tempore duret 717. uide Podagra, & Articularis  
 Artis circa hominis corpus uersantibus primæ ac maximæ partes quæ 195  
 Atari facultas 15  
 Ascarides quid, quomodoq; curentur 597.598  
 Ascites hydrops quid, eiusq; causæ Ascitæ hydropsis cura 651 (550)  
 Asclepius siue Aesculapius paphilus 877  
 Atellorum millepedum usus 328. 340.349  
 Atelli marini usus 116  
 Atia petre flos flaccidas carnes con fumi 121  
 Asfininum lac quale 92.94  
 Asfinorum domesticorum & syluestrium caro qualis 102  
 Alpalathi qualitas 15  
 Alpalathus quomodo probetur 117  
 Alparagus siue alparagus 15  
 Alperæ arteriæ si qua infixa, aut illa pā fuerint, quò reuocet 489  
 Alperæ arteriæ descriptio & affectus eius remedia ibidem  
 Asphalion cur trifolium dictum 69  
 Asphaliti maris aqua qualis 7  
 Asphalts, bitumen 86  
 Asplodeli facultas 16  
 Asperfonium faciei ratio 187  
 Aspis acutias 417  
 Aspriduo palpebrarum unde oriatur, quomodo à densitate differat, & curetur 386.387  
 Asij lapidis & floris eius uis 82  
 Astaphys quali uis 16  
 Astaphys agria qualis ibidem  
 Aster siue stella famia, terræ famiæ Aster Atticus 15 (species 78)  
 Aster Asclepiadæ 426  
 Aster Magni collyrium 427  
 Aster famius, collyrium 423  
 Asthmatici qui dicatur, & unde fiat, quomodoq; curentur 501  
 Athanasia antidotus 805  
 Athanasia collyrium 426  
 Atheromatum curatio 405  
 Atramenti scriptorij constitutio 88  
 Atramenti futurij uis 90  
 Atramenti futurij qualitas 855  
 Atræ bilis generatio, unde 302  
 Atræ bilis quò cognoscatur 239  
 Atram bilem que ducant 305  
 Atræ bile laborantium cura 732  
 Atræ bile stomachum infestatum habebitis quomodo mendendi 531  
 Atrædylis qua ui 16  
 Atræphaxis qualis ibidem  
 Atriplicis uirtus ibidem  
 Attenuate partes quò sanandæ 207  
 Attenuatoria alimenta quæ, & quibus conueniant 126  
 Attenuatoriorum & crasseficientium media quæ 127  
 Atrachoria emplastra 849. & inde  
 Atrachoria simplicia quæ 124  
 Auditis difficultatis cura 347.348  
 Auellana uis 39  
 Auenæ proprietates 18  
 Augustus, collyrium 426  
 Auim quæ optima 125.127  
 Aurea faciei circumlitio 44  
 Aureum Hygient collyrium 435  
 Auricula muris, asine 12.54  
 Aures que purgent 172



Aurum dolorum origo, item diuer-  
fitas & curatio 346. 347  
Aurum infantium doloribus quo-  
modo medendum 200  
Aurum doloris in febris curatio  
Auris suppuratæ curatio ibi. 180  
Aurum elotiones quibus fiant 349  
Aurii fordes quò expurgandæ 346  
Aurium fontis causa & remedia  
ibidem  
Aurii inflammationis medelæ 348  
Auris meatus ulcerum cura 349  
Aurium futores, item superexcre-  
scentes in aurium ulcerib. carnes,  
tum uermes aurium sanantia 350  
Auribus humectis absq; ulceratione  
remedia 349  
Auribus sanguine fluctibus, aut qui-  
bus calculi aut aliud qd illapsum  
fuerit, medelæ 350. 351  
Aurium affectionib. extra meatu 351  
Auricularis compositio ad dolores  
magno, & pus album 350  
Auribus purulentis & graueolenti-  
bus, item Aurium diuturnis ulce-  
rationibus remedia ibidem  
Auripigmenti qualitas 86. 789. 855  
Austerum quale 2. 4. 5  
Australium uentorum qualitas 181

B

Balanus myrseica qualis 16  
Balauftium quid & uis 17  
Balnearum ratio 184. 185  
Balnearum ingressus qualis fit 186  
Balnearum usus in morbis oculo-  
rum 365  
Balsami facultas 17  
Barbæ nigrefaciens pharmacu 339  
Barbari emplatri usus 76  
Basiliscus & eius plaga qualis 776  
Basilicum tetrapharmacum 947  
Balsi liquida 417  
Barrachij specierum uires 17  
Batos seu Rubus ibidem  
Bdellij dinotio 118  
Bdellij energia 153. 857  
Bdellij utriusq; natura 17  
Befala, ruta lychnitris 14  
Beredriæ unguentum 1025  
Berenices thymia 809  
Beta stomacho quam incommoda 131  
Betæ uis 67  
Betonice uirtus 40  
Bilis effusio quid, eius causæ & re-  
media 144  
Bilem atram euacuantiâ 150. & inde.  
159. & inde  
Bilem flauam quæ expurgentiâ 49. &  
inde. 159. & inde  
Bilis expurgatio quomodo conside-  
randa & facienda 223  
Bilis influxu laborantes quomodo  
medendi 727  
Bichyus passillus 878  
Bituminis electio 118  
Bituminis qualitas 86. 816  
Bituminosa balnea quibus conue-  
niant 186  
Bliti qualitas 18  
Bolæ collirium 426  
Bolæ liquida 416  
Bolis Armeniæ cuius facultatis 79  
Boni succi quæ sint 129  
Borealiu uentorum qualitas 184  
Braficæ facultas. 44  
Brafica quomodo preparanda ut ut  
alium subducatur aut iustat 133. 135  
Brathy qualis 18  
Bryon qualis 18  
Bryon thalassion 19  
Brionia, ampelos leuce 12

Britannicæ qualitas 13  
Bromium emplastrum 948  
Bromus qualis 13  
Bronchocele quid, & eius medica-  
mina 912  
Bubastica ulcera in pueris 201. co-  
rumq; remedia 202  
Buprestis qualis & quomodo affi-  
ciat hominem 782  
Bubonium, aliàs After atticus 15  
Bubulæ carnes quales 102  
Bubulum fel quale 98  
Bubulum lac quale 92  
Bubuli stercoris qualitas 100  
Buccellæ purgatoriæ compositio 160  
Buccinorum testæ ad quid utiles 115  
Buglosi qualitas 18  
Bulbi proprietates 18  
Bulbus uomitorius ibidem  
Bulimus quid 276  
Bulimos unde oriatur, & eius reme-  
dia 536  
Bunij facultas 18  
Buphthalmi flores & actio 18  
Butyri qualitas 97

C

Achexia quid, eiusq; indicia, ac  
cura, & in quos morbos trahat  
649  
Cadmia energia 87. 855  
Calami aromatici præstantia quomo-  
do discernenda 118  
Calamus aromaticus 37  
Calamus phragmites ibidem  
Calaminthæ qualitas 36  
Calcis uirtus medica quæ 68. 89.  
789  
Calculi palpebrarum cura 404  
Calculi uesicæ muliebris cura 1020  
Calculis excretis quæ diætâ conue-  
niant 679  
Calculi ne nascantur, aut renascan-  
tur, diætâ præseruatiua 671  
Calculis uesicæ remedia 673  
Calculis uesicæ & renum remedia  
672. 676. 677  
Calculos uesicæ atterentia medica-  
menta 673  
Calculorū qui nec atteri nec excer-  
ni possunt medicamina 679  
Calculos renum ac uesicæ euacuan-  
tia 175  
Calculosorum rhenum causæ & re-  
media 668. 669  
Calfactientia alimenta 134  
Calfactientia moderate, item primo,  
secundo, tertio & quarto ordine,  
quæ sint 120. 121  
Calidi temperamenti notæ 216  
Calidorum temperamentorum cor-  
rectionis modus 223  
Calidi & sicci, ite calidi & humiditæ  
peramentis notæ quæ sint 217  
Caligo oculi quid, eiusq; cura 373  
Calionimi fel quale 98  
Callositas palpebrarum quid, eiusq;  
cura 387  
Calor duplex 387  
Caluariæ circuncisionis ratio 409  
Caluities unde proueniant 334  
Camelinæ carnis qualitas 102  
Camelinum lac quale 92  
Cancani radix qualis 48  
Cancari mammarum quò curadi 980  
Cancari qui facile & qui ægrè curen-  
tur ibidem  
Cancari chirurgia 981  
Cancari post amputationem & inuulsi-  
onem curatio 981  
Cancrorum citra chirurgiam sana-  
tio 982

Cancari ulcerati medicinz 982  
Câceratorum tumorū nō tamen ul-  
ceratorum remedia ibidem  
Cancrorum fluuialium usus 114  
Cancerata ulcera oculorum quæ di-  
cantur, & quibus accidunt 378  
quomodoq; curentur ibidem  
Cancrorum tumorum medicami-  
na 889  
Candidi nardinum collyr. 436  
Canes rabiosi quò curentur 316  
Caniculi ortus occasusq; 182. 183  
Canis fluuialis testiculorum usus  
115  
Canis terrestris catuli utilitas ibide  
Canis temperatura, & rabies 314  
Canis rabioforū signa quæ ibidem  
Canina couulsio, eiusq; remedium  
173. 187  
Canina couulsiois curatio 321  
Canina infania qualis 307  
Canini stercoris qualitas 99  
Canities ne eueniat 339  
Cantharidi haustus remedia 781  
Cantharidum usus 113  
Capnias lapis, qualis 84  
Capnion, fumaria qualis 37  
Capparitis facultas 37  
Capillos quæ tingant & nigrefaciant  
338. fuluos faciant 339  
Capillorum corruptio unde proue-  
niat 334  
Capillorum defluuium qualis affe-  
ctio, & quomodo curetur. 336. ui-  
de etiam de pilorum defluui-  
o  
Capræ ortus occasusq; 182  
Capræ cornu quale 101  
Capriæ carnis temperamentū 102  
Capriini sanguinis usus in mēden-  
do 91  
Capriini feni usus 108  
Capriini stercoris conditio 100  
Caprinum fel quale 98  
Caprinum lac quale 92  
Caprarum fimi præstantia 192  
Caput p. nares quæ purget 173. 332  
Caput refrigerantium medicamen-  
tum compositio 333  
Capitis dinotio 218  
Capitis dolori in febris quomo-  
do medendum 277  
Caput lædentiâ alimenta 136  
Capitis doloribus omnibus quæ me-  
deantur uaria 330. 331  
Capitis dolorū distinctiones 325  
Capitis doloris ex ardore aut calidi-  
tate oborti, aut in febris, siue  
ex ebrietate aut meri potu, cura-  
tio 325  
Capitis perfrigerati cura 326  
Capitis dolori à stomacho, aut ob  
plagam remedia ibidem  
Capiti quæ ex natura dolorem adfe-  
rant 327  
Capitis pustularum diuersarum re-  
media 333. 344  
Capitis scabritiei remedia 345  
Capitis ulcuscula parua, densa & ru-  
bunda quæ curent 345  
Capitis totius illitionum modus &  
ratio 411  
Capitum ex animalibus uis medica  
108. 109  
Carabi seu locustæ usus 114  
Carbunculi palpebrarum 377  
& quomodo curentur ibide. & 378  
Carcinades, qualia animalcula 106  
Cardamines herbæ proprietates & ex  
ea sinapismus qualis 710  
Cardamines energia 193. 194  
Cardamij uirtus 38  
Carda

Cardamomum quod optimum 118  
 Cardamomi uis 38  
 Cardiacorū dinotio & remedia 129  
 Cardui facultas 64  
 Cares quomodo serum parent 35  
 Caricus uirtus 16.66.67.129  
 Cares lignorum qualis 63  
 Carnem duram habentia quib. cōue-  
 niā, & quomodo preparāda 133  
 Carnes quadrupedum qua parte ho-  
 ni succi sint, & qua mali 130  
 Carnis in magno oculi angulo de-  
 crementum quomodo fiat 407  
 Carnis in oculi angulo excrefcentis  
 medicamentum 396  
 Carnis animalium praeſtātia quomo-  
 do exploranda 126  
 Carnium qualitas 102  
 Carnium iuxta cocturā qualitatem  
 mutari 103  
 Carnium ſalarum differentia 108  
 Carnofitas quomodo liquanda aut  
 ſubvertenda ſit 206  
 Caro animalium quomodo dijudi-  
 canda 104  
 Caroi proprietates 38  
 Caros quid, & quomodo ad lethargo  
 differat, eiusq. curatio 297  
 Carpaſi ſuccus qualis efficaciae 785  
 Carpeſij uis 45  
 Carpha, quae tubercula 50  
 Carya, nux arbor 38  
 Caſeorum qualitas 96  
 Caſeorum uſus in medicamentis 97  
 Caſia uirtus 38  
 Caſiæ dinotio 118  
 Caſij ſiccum collarium 416  
 Caſianæ quales 21  
 Caſtorium, id eſt, teſtes caſtoris 114.  
 115. quibus ſit uirib. præditi ibide  
 Caſtrato, ppter elephāſiam 812  
 Catalepiſ quid, eiusq. cura 297  
 Catapleſmatum uariorum compo-  
 ſitiones 159.190  
 Catapleſmatum uſus 183.189  
 Catarrhi remedia 494  
 Catheter, inſtrumentum quo urina  
 prolicitur 322  
 Catocha qd., & quomodo curet 297  
 Cauſus febris cur dicta 240  
 Cauſos quomodo differat ab exqui-  
 ſita tertiana 253. item quomodo  
 differat à cōtēte putrida, tū que  
 ſint eius notæ & remedia ibide  
 Caulcis qualitas 48  
 Caudæ mulieris reſectio 922  
 Cedri utriuſq. facultas 39  
 Cedrie uirtus 39  
 Cedrolei uis 39  
 Cedrides fructus cedri 39  
 Celeuocatur omnis tumor 912  
 Cenchrias quale animal, & quā m-  
 xius eius morſus 773  
 Cenchrites & eius plaga qualis, tum  
 quae eius curatio 774  
 Cenchros, milium ſiccum 39  
 Centauræ maioris uirtus 39  
 Centauræ minoris facultas 40  
 Ceparum qualitas 46  
 Cephalæa quid, & qualis affectio,  
 eiusq. uarietatis dinotio, tum cu-  
 ra 327.328.329  
 Cephalicorum emplaſtrorum com-  
 poſitio & uſus 332  
 Cephalicorum medicamentorū ſic-  
 corum ad repurgandum & incar-  
 nandum confectio 366  
 Cephalus piſcis quale animal 166  
 Cera quae præſtantior 118  
 Cereæ facultas 41.37.35  
 Cerebri animalium qualitas 103.104

Ceratorum diuerſorum compoſi-  
 tiones 950  
 Cerata podagrica 741  
 Cerati roſacei uſus 24  
 Cerati qualitas 40  
 Ceratia, Ceratonia ibidem  
 Ceraſtes & eius plaga qualis & quae  
 remedia 774  
 Cereſium feminum qualitas 116  
 Cerebri inflammationis affectio &  
 cura 317  
 Cerebri eryſipelas, & eiusq. curatio  
 318  
 Cerebri duæ facultates 319  
 Cerebri temperaturarū dinotio 219  
 Cerebri membranā glutinantiā 318  
 Cerebrum palmæ 70  
 Cereum quid, eiusq. cura 916  
 Cerniæ carnis qualitas 102  
 Cernuorū cornuū uis medica 110  
 Ceruſſæ qualitas 90.789.855  
 Ceſtri uirtus 40  
 Chalbana ſeu galbanum 70  
 Chalcanthos, qualis 90  
 Chalcuanthos 90  
 Chalcoas uſum 90  
 Chalcitis qualis 88.90.855  
 Chamaeactæ qualis 11  
 Chamaedryos qualitas 70  
 Chameleæ efficaciac 71.153  
 Chamaeleucæ temperamentū 71  
 Chamaeleonis facultas. ib. & 788  
 Chamaemeli qualitas 15  
 Chamaemelinum oleū ibid. & 24  
 Chamæpitys energia 71.153  
 Characias quid, & eius uſus 68  
 Charitagineorū piſciū qualitas 108  
 Chelidonii uirūq. facultas 72  
 Cherſydris ſerpentis malitia 776  
 Chezananzæ epithema, quale 170  
 Cholia collyria 439  
 Chioz terræ efficaciac 79  
 Chœrodolethron, quale 55  
 Chilio dynamis uirtus 60  
 Cholera quid, cauſæ eius & reme-  
 dia 144  
 Chondrilla ſpecies ſeridis 63  
 Chryſocolla 90  
 Chryſeectri energia 84  
 Cibi quando febricitantibus porri-  
 gendi optimi 216  
 Ciborum qui optimi 125.160  
 Ciborum uarietas nitida ibidem  
 Ciborum qualitates 125  
 Ciborum quid 41  
 Cicada ad quid commoda 117  
 Cicatricem quæ ſimplicia inducant  
 124  
 Cicatricibus in albadis remedia 248  
 Cicatricibus nigris. exulceribus re-  
 lidis remedia 825  
 Cicatricem uulneribus inducentia  
 1017  
 Cicerbitæ uis 65  
 Cicerulæ quales 48  
 Ciceris natura 32  
 Cicerorij uirtus 63  
 Cici, arbor 122  
 Cigis, id eſt, galla qualis 42  
 Cicinum oleum 22  
 Cidis arboris fructus qualis 47  
 Cigeutæ efficaciac 48.785  
 Cimices prohibentia 778  
 Cimoliz terræ facultas 79  
 Cineris in genere uis 68.856  
 Cefſos, hedera 42  
 Ciſthos ſive Ciſtharus 41  
 Ciſthos ſive Ladanum 42  
 Citrea malus & citreum 53  
 Citra prægnantium quid, unde di-  
 ſta, quor & quando mulieribus

accidat, tum quō medenda 999  
 Claus quid & cur ſic dictus, & eiusq.  
 remedia 838  
 Clematidis qualitas 14  
 Cleonis ſpo diacum 428  
 Cleopatrae regiæ ſmegma 444  
 Cleopatrae paſſilli ad deſtium ca-  
 pillorum 337  
 Clidion pharmacum 514  
 Cnici qualitas 42  
 Cnici feminis efficaciac 152  
 Cnici ſylueſtris natura 16  
 Cnide, quæ urtica 10  
 Cnidij coci facultas 42  
 Cnips quid perinat 79  
 Coaguli qualitas 97  
 Coaguli diuerſa efficaciac in lacte  
 789  
 Cocali facultas 48  
 Cocci cnidij, item tinctorij facultas  
 42  
 Coceymeze qualitas 42  
 Cochleæ terreſtris uſus 115  
 Cochleæ mucus quid, quomodoq.  
 colligendus, & ad quæ utilis ibi.  
 Cociaci qui dicantur 620  
 Cociacia affectio quæ proprie dica-  
 tur, qualisq. ſit, & eius remedia  
 789  
 Coitus ratio, item commoda & in-  
 commoda 141.142  
 Coitus mala 314  
 Coitus potentia indicia 222  
 Coitus impotentia quomodo ſane-  
 tur 703  
 Colicorum affectionis cauſæ uarie  
 & remedia uaria 576. uſq. 586  
 Colis reſoluti curatio 322  
 Colliqutio quid, & quomodo ei  
 medendum 263.594  
 Colla, qualis uirtutis 43  
 Collyriorum aridorum deſcriptio-  
 nes 412.413.414  
 Collyriorum liquidorum compoſi-  
 tiones 415. & inde  
 Collyrium ſiccum Caſij 416  
 Collyria ex croco & ex ſuccis diuer-  
 ſa 418  
 Collyria monohemera 419  
 Conſutorum medela 897  
 Coquere bis, aliquid, quomodo co-  
 ueniat 134  
 Collyrium monomelum ibidem  
 Collyriorum ſiſtemum deſcriptio  
 420. & inde  
 Collioriorū leniū compoſitio 423  
 Collyriorū cygni, libianorum, ſpo-  
 diacorum & tephricorum ratio  
 & compoſitio 426.427  
 Collyria ex roſis uiridibus & al-  
 bis 428  
 Collyria diſamyrna & chiaci dicta,  
 429  
 Collyria ad aſpitudines & extero-  
 ſia 431  
 Collyrium preſtum 433  
 Collyria enſtaſta, id eſt, inſtillantiā  
 appellata 435  
 Collyria ex cornu cerui 435  
 Collyria nardina & theodotia 436  
 Colocaci qualitas 436  
 Colocyntidis energia 43.151  
 Coloris conſideratio 8  
 Columbus quibus edere liceat 126  
 Columbinū ſanguinis utilitas 91  
 Columbini ſtercoris qualitas 100  
 Columellæ affectus ablatio quomo-  
 do fiat 475  
 Colymbades quæ uirtute 31  
 Colymbadum oliuarum muria ad  
 quid utilis 168

AETII INDEX.

Coriandri efficacia 43-78  
Corianum seu corion, quale 43  
Coria animalium ad quod conducit 110  
Corij fomentatio quo fiat 143  
Corion, qualis affectio 343  
Corniflorae oculi tumefacti ex qua-  
tuor constare corpufculis 375  
Cornui ex animalib. uis medica 110  
Coronæ ortus, ocafusque 182  
Coronopodi folia 43  
Corpora ex quibus caufas induren-  
tiae tur 113  
Corporum quæ fit præstantiffima  
constitutio 196  
Corpus odorem redditura 44  
Corroborantia simplicia quæ 112  
Corrodentia simplicia quæ 114  
Cortina medicamentorum 882  
Corrupti facilia aut diffidilia alimen-  
ta 133  
Corydalis ad quid utilis 115  
Costi dinotio & species 118  
Costi facultates 43  
Coryleoides qualitas 44  
Crambes utriusque facultates 44  
Crapula quid, eiusque remedia 562  
Crapulae quæ cura conueniat 215  
Crassaffartii simplicitas quæ 112  
Crassafacientium & attenuantium  
quæ sint media 117  
Crassi fuerit alimenta quæ 117  
Crasso uicū qui ui possint citra di-  
scrimen 117  
Crassi fuisset alimenta quæ sunt ibide  
Crete uici quæ expiantur 79  
Cretmon, quale 22  
Crimmon quid 45  
Crimi facultates 45  
Crithæ, ordeum 118  
Croci uici 45  
Croci exploratio 118-89  
Crocodili qualitates 118  
Crocomagmatis preparatio 118  
Crocomagmatis ad capitis dolores  
preparatio 330  
Cremillon, cepa 46  
Crotan, arboris fructus 22-41  
Cruði humores quales sunt 117  
Cruði humoris generatio quæ fit 117  
Cruiditas quid, unde, eiusque reme-  
dia 56-66 & inde 118  
Cruiditas quid, unde curanda 102-115  
Curis aut alterius cuiusdam mem-  
bris resoluitio 333  
Custam inducentia 89½ & inde 89  
Custam inirentia 89  
Custumini preparatio 120  
Cuscumini sive cuscuthæ virtutes 64  
Cyamensis sylvestris energia 112  
Cucumerum facultates 113  
Cucumbers uici 43-189  
Cucubitalinum quid usus 117  
Culicum idus curatio 117  
Cuminitati preparatio 117  
Cupholihos lapis 89  
Cupressi uirtus 89  
Curari recte morbum non posse ci-  
tra uici præsentiam 112  
Currus collyria 112  
Cutem quæ desinit 112  
Cutem de se curatio, & inde den-  
tetur cutis 112  
Cyamas faba, uici 112  
Cymali efficaciac 112  
Cyclami qualitates 113  
Cydonati preparatio 112  
Cygni pullus ad quid utilis 115  
Cygni seu cygnaria collyria quæ di-  
cantur 44 & qualia 46  
Cygus regina, colligat 42

D Amafonij facultas 26  
Daphnes facultas 26  
Dauci qualitas 68  
Dauci species et facultates 26  
Daui lyfleuris vis ibidem  
Decameron unguentum 745  
Declinatio morbi quid 237  
Declinationis tortus morbi cogni-  
tio 237  
Declinatio quorundam morborum  
non potest cognosci ibidem  
Defluuium capillorum qualis affe-  
ctio, et unde generetur, eius cu-  
ra 336  
Defluxu pilorum species et cura 364  
403 ibidem  
Deglutitionis refolutio cura 312  
Deglutiti metalli aut talis cuiuspi-  
am remedia 609  
Delicatum collyrium 248  
Deliquis animi, unde Animò inquit  
Delphini ortus et occasus 181  
Delyrij causa et medela 312  
Delyrij et facinoris differentia ibidem  
Dendromache qualis curatio 211  
Densantiore simplicia qua 174  
Densitas et aspritudo palpebrarum  
differentur 373  
Dentes duabus contrariis affectioni-  
bus esse obnoxios 447  
Dentii affectionibus remedia 447  
Dentium ex caliditate, frigiditye,  
humiditate affectorum reme-  
dia 448  
Dentium a fecitate, item caliditate  
in humiditate simul affectorum  
medicina 448  
Dentium eorum curatio 448  
Dentes quò lima atterendi 448  
Dens ut citra dolorem et absque fer-  
ro extrahatur 448  
Dentii denigratorum, linimentum et  
rarefactorum 449  
Dentitio puerorù quò modo fuan-  
da, et quando incipiat 449  
Dequamata qua dicantur, et quò  
modo confectur 449  
Deffillationis remedia 449  
Diabetes quid et eius curatio 449  
Diapenteton collyrium aut 449  
Diacoilò còpositio 449  
Diacoilò non consequenter exhi-  
bendum, et curatio 449  
Diaria febris que, et quò fiat 449  
Diatrum febrim trahitio 449  
Diaphanitas capitis specularis 487  
Dialysma collyria 487  
Dialysmi qualitas 23  
Dies indicatorij boni aut mali qui  
Dies qua regit et moriturus pœno-  
dus 487  
Dies prima morbi qua dicatur 487  
Dies principium 487  
Diebus singulis differentias affe-  
cti 487

# AETII INDEX.

Dionis' collyrium 375  
Dionyfia emplastrum 933. & 945  
Dionysii collyrium 430  
Diospolitici pharmaci compositio duplex 519  
Diphyrgis conditio 87. 355  
Diplos, qualis 20  
Diplas quid, ac eius morfus auxilia 772  
Discussoria simplicia quæ 124  
Discutientia quæ 328. 313  
Discurtiorum emplastrum compositio 942. 943  
Distentionum, uide Consultationum  
Distichia quid 397  
Diuites in plenitudinis morbis peius curari quam pauperes 188  
Diuitum peruerum iudicium ibid.  
Durities in artibus cura 749  
Dolichi quales 20  
Dolere quomodo possint ægroti, nullo forisficus accedente quod dolorem causetur 273  
Dolor quid 273  
Dolorum iuxta situm causæ & differentia 273. 274  
Dorcadia herba, alio nomine Mulsicium 354  
Doryenion quale 20. 784  
Dracenes quales & ubi, & quæ ab eis noxa 776  
Dracenis marini usus 112  
Dracenis marini plagæ medela 777  
Dracontij qualitas & usus 115. 21  
Dracontij sanguis 413  
Draconculus quid, & quomodo auferatur 904  
Dropacis usus & compositio uaria 191  
Drupa oliuæ quales 21  
Dryinus serpens & eius plaga qualis, quomodo; curesur 774. 775  
Dryos qualitas 21  
Dulce ulcus, quod aliis Melicris dicitur 202  
Dulcis sapor quid 24. 46  
Dulcium & acerbiorum natura 6  
Dulcis uocata compositio 541  
Dulcia sitim inducere 134  
Dulci usus qd in cibis & potib. 127  
Durities quibus de causis corporibus accidat 112  
Dysenteria ortus & curatio 159  
Item 603. & 607. & inde ulq. 618  
Dysstros, mensis Martius 181  
Dysurias in febris curatio 181  
Dysuria quid & eius medicamenta 684. 685  
Dysuria in febris remedia 685  
**E** Beni facultas 21  
Ebfusus qualis 21  
Ebfrietas quæ arecat 326  
Ebfrietas quæ refingunt ibid.  
Ebfrietas, epithema 311  
Ebuli facultas 112  
Echini marini usus 108  
Ectropij quæ dicantur 364  
Eczemata quæ pustula, & quæ eorum remedia 824  
Edessenum collyrium 420  
Eduliorum quæ optima 426  
Edyari uirtus 338. 239  
Egestionum notæ & seductiones  
Elezæ & elezon quali facultate sint 122  
Elaphobosci facultas 31  
Elate, palmae germen 270  
Elaterij temperamentum 270  
Elaterij facultas 152  
Electri piis medica 84  
Elenium siue Helenium 31

Eleliphacos qualis 31  
Ellebori qualitas 31  
Ellebori utriusque dinotio 118  
Elephantiacus quomodo inopinatus 113  
Elephantiasis qd, & cur sic dicta 810.  
eius remedia 811. usque 820  
Elephantinum emplastrum 930  
Elxines facultas 31  
Elymos qualis 32  
Emero callis, uel Hemero callis 33  
Eminentiarum represius simplicia quæ 124  
Eminentijs corporis tumentibus illusiones 814  
Emollientium emplastrum compositio & usus 927. & inde  
Empetri seu Epipetri uites 33  
Emplastica quæ dicantur 2  
Emplastrum ex apidibus 940  
Emplastrum uariorum preparatio & coctura, tum quæ in ipsa conijciuntur 853  
Emplastrorum diuersorum & plurimorum, uarijque usus descriptio 918. usque 952  
Emprosphotonus quid 223  
Eincanthus quid, curatioq. ipsi 396  
Encauma quid, & eius curatio 373  
Enneapharmacum 947  
Enneapharmacus pessus 1010  
Ephemer efficacia 784  
Ephesiatis emplastrum 83  
Ephialtes usus 19  
Epicauma oculi qd, ei curatio 373  
Epinyctides quid & quomodo medendæ 894  
Epithemata quæ post euacuatos corporis humores pro glutino sunt 655  
Epithematim purgatoriorum compositiones uariæ 170. 171  
Epithematum ad capitis dolorem compositio 331  
Epithymbrosi eiusque facultas 150  
Epithymi facultas 130  
Equi ortus in celo 181  
Equinae carnis qualitas 102  
Equinum lac quale 92  
Equiseti facultas 141  
Equitationis modus & usus 141  
Erasistrati panchrestos liquida compositio 416  
Erethisti qualitas 32  
Ericerum acharistum, collyrii 443  
Ericera etiam alia 443  
Ericeron quali ui 33  
Erioforandæ siue 273  
Erylos siue Herpylos 32  
Erucæ uis 32  
Erucæ pius potata qualem dolore interfert 82  
Erui efficacia 56  
Eringij qualitas 154  
Erysimi qualitas 32  
Eryspelas quæ morbus 262  
Eryspelas: corruptus & species quos, & earumque medicamina 892. 893  
Eryspelas cerebri 318  
Erythrodanti uirtus 32  
Erythrodanti compositio 801  
Efferentia, emplastrum 928. 932  
Efrictas, emplastrum 928  
Eguacare per seru quod decauat 89  
Eguacuatione q op habet, neq. tantæ equacuita ferit, quod sanari 972  
Eguacuationis quæ sit mensura 145  
Eguacuationum localium tractatio 172. & deinceps 173  
Euphorbij energia 113  
Euphorbij quod melius 113

Eutonum collyrium 432  
Exacerbatio quid 230  
Exacerbationis particularis & universalis quatuor tēporum, id est, principij, augmenti, uigoris ac declinationis signa 230. 231  
Exedentia medicamentis 832  
Exercitata omnia in exercitatis meliora 126  
Exercitatio qd, eiusque usus 138. 139  
Exercitationum species 139  
Exhalationum terræ ratio 180  
Experientia certitudo 8  
Extorioria quæ sint 123. 383  
Extremæ partes animalium quæ dicuntur, earumque facultas 102. 103  
Extrematum ulcera ac callos quomodo sanes 876  
Exulcerantia simplicia 124  
Euchron collyrium 418  
Eupatorij uis 33  
Euphorbij qualitas 33  
Euzomon quali uirtute 32

**F** Abas facultas 46  
Facies ne à sole aut uento exaratur quomodo illinenda 442. 443  
Faciei rugæ & nigredo quomodo præcauentur aut tollantur 443  
Faciem nitidam reddentia finegma 443  
Faciei lentiginēs, maculas solares & nares sanantia 446  
Faciei ficosi tumoribus quomodo medearis 450  
Fagi facultas 21  
Farinae crassioris usus 45  
Farris preparatio 604  
Farclutium quod 45  
Fatuus quid 31  
Fatuus origo & cura 31  
Fatuus quod differat à delirio 31  
Fatuus quid, eiusque cura 343. 391  
Febris quid 230  
Febris continens quæ sit, & quibus peculiaris 247. 248  
Febris cōtinētis differentia tres 248  
Febris epiala quæ & cur sic dicta 262  
Febris lypyria quæ 262  
Febris tertiana quibus familiarior 262  
Febris tertianæ rigor quod differat à quartanæ rigore 262  
Febris tertianæ exquisita dinotio & quæ ita nominetur 262  
Febris tertiana extēta, item tertiana dupla quæ dicatur 262  
Febris tertianæ exquisita & sporadica generatio & curatio, item semi tertianæ 262  
Febrim diffuso 262  
Febrim generat & causæ defunctu, & cur sic dicta & remedia 262  
Febrim cogniti & curatio 262  
Febris putrida in quibus maxime locis generetur, & quæ ob causas, & quæ Febrim putridam septem iudicationes 262  
Febris heclicæ deceptio 262  
Febris quartanæ dinotio 262  
Febris quartanæ, quæ ob hominē non plus quam semel capiat ibid.  
Febris ardens quibus morbis differat ab exquisita tertianæ & quartanæ 262  
Febris quotidiana dinotio 262  
Fellis, id est, flauæ bilis conditio 37

# AETII INDEX.

Feras quæ fugent 754  
 Fermenti qualitas 33.61  
 Fermenti usus in cataplasmate 189  
 Ferulæ efficacia 55  
 Ficus confuturo & alimentum 66  
 Ficus quid, & cur sic vocari, eorūq; medicinz 838.902  
 Ficuum usus in cataplasmatibus 190  
 Figulinæ refus usus 83  
 Filicis confutatio qualis 61  
 Fistularum aui curatio quò fiat 843  
 Fistularum in vultuibus medicamina 885, usque 888  
 Flagellatorum curatio 896  
 Flammum in ventre quæ causæ 565  
 Flammola, & flatus expertia quæ 131  
 Flava bile infestatorū uictus & medicamenta 729  
 Flavâ bile uomentibus remedia 533  
 Flori colligendi quò usus est in Drusmate 428  
 Floriditas faciei quid significet 228  
 Flos aris qualis 815  
 Fluuij quò optimi 183  
 Fluuialis aqua qualis ibidem  
 Fluxibus humorum permixtis affectionum auxilia 734  
 Fluxu tenui laborantium cura 733  
 Fluxus muliebris quid, & unde proveniat 992  
 Fluxus rubri medelæ ibidem  
 Fluxus albi cura ibidem  
 Fluxiones capitis rescicantium medicamentorum descriptio 334  
 Foecundatio mulieris dinotio 958  
 Foemina frigida temperatura unde discernatur, & quò curetur 985  
 Foemorum intertriginum cura 202  
 Foeni graeci facultas 68.91.133  
 Foeni graeci oleum 25  
 Foeniculi efficacia 51  
 Foetori oris remedia 456  
 Foetum quò corruptant 963  
 Foetus masculi aut foeminae indicia 959.  
 Foetus abruptus in utero si detineatur, quomodo eiciendus 965  
 Foetus extractio & executio quomodo scienda 968  
 Foetus exedione facta quæ curationes conveniant 970  
 Foliat olei preparatio 30.102.6  
 Fomentum usus in morbis oculorum 368  
 Fomentorum usus & ratio 182  
 Fomentorum vaporariorū species 143  
 Fossile oculorum quæ dicantur, earumq; curatio 374  
 Fontana aqua qualis 183  
 Frictio corporis quomodo fieri debeat 137  
 Frictionum species quæ 139  
 Frictionum variorum usus 214  
 Frigefactientia alimenta 134  
 Frigefaciendum moderate, primo, secundo, tertio & quarto ordine, enumeratio 121  
 Frigida quæ exhibenda ægrotis 249  
 Frigida quomodo frangatur 154  
 Frigida cœtenta quæ dicantur 262  
 Frigida lotio quibus conveniat & quando 187  
 Frigide potus intempestivus quæ incommoda ferat 249  
 Frigidi temperamenti notæ 217  
 Frigidi & humidi temperamenti, inter frigidi & sicci notæ 218  
 Frigiditas aquosa quibus in sit 122  
 Frigiditates qualiter curandæ 213  
 Frigiditas quæ morborū causa ibid.  
 Frigidum densare meatus 294  
 Frontis exoriationis usus 409

Fructuum escariorum quale sit nutrimentum 66  
 Fructuum generationis & saporis ratio 4.  
 Fucus quid & eius uis 70.89  
 Fuliginis qualitas 50  
 Fuligo cœpiti quomodo paretur, & quò eius usus 101  
 Fuliginem lacrymarum quomodo colligere liceat 50  
 Fuligo ex pice quò præparetur 59  
 Fuligo ex refina 62  
 Fuligo styracis qualis 65  
 Fumaria uel fumus terræ 37  
 Fungorum proprietates 54.788  
 Fures quomodo deprahenduntur 83  
 Furfurum usus in cataplasmatibus 190  
 Furfures capitis, qualis affectio, & unde proveniat, ac quomodo curetur 341.342

## G

Gagatis lapidis uirtus 82  
 Gagatis lapidis dinotio 119  
 Galactides, id est, tithymalli 68  
 Galactites lapis qualis 68.69  
 Galbani qualitas 70.857  
 Galbani exploratio 119  
 Galeni pharmaci ex pice Brutia compositio 315  
 Galerita ad quid utilis 115  
 Galla omphacitis qualis 41  
 Gallas dropacis species 191  
 Galli pinguedo qualis 2  
 Gallinaris eius qualis cœueniat 126  
 Gallinarum fel quale 98  
 Gallinaceum seum quale 109  
 Gallinaceum stercus quale 101  
 Gallinarum oua qualia 104  
 Ganglia quid 112  
 Ganglia oculorum quò curanda 405  
 Ganglium quid, quò differat à meliceride & atheromate, tū quomodo curetur 914  
 Gangræna quid, quò in sphacelum abeat, & quæ eius cura 883  
 Gari uis medicamentaria 108  
 Gari preparatio pro abstemijs 1028  
 Garorum purgatiuorum diuersæ compositiones 157.158  
 Genistæ efficacia 65  
 Gentianæ facultas 19  
 Geodes lapis qualis 83  
 Geranium emplastrum 931  
 Gestatio, qualis sit exercitatio, & eiusque usus & species 140  
 Gigarta qualia 19  
 Gingidij uirtus 19  
 Gingiuarum inflammatarum cruentarumq; remedia 418  
 Gingiuarum excrementis, putrefactis, tumorem, corrolari, ulcerosum, inflammatarum ac fistulosarum medelæ 418.419.460  
 Gladioli uirtus 55  
 Glans unguentaria qualis 16  
 Glandis quercinæ uirtus 21  
 Glandium optima quæ 21  
 Glandiū subditariū compositio & usus 179  
 Glandulæ carnis quales 103  
 Glandularum inguinis inflammationis cura 867  
 Glândularū situs, affectio, & cura 488  
 Glaster facultas 36  
 Glancedo quid 364  
 Glucedo dupliciter dicitur, & quò curari, aut secus possit 392  
 Glauco oculi ut nigri fiant 381  
 Glaucij uis 19  
 Glechon, quale 19  
 Gleucini olei preparatio 743

Glossos ad quid conferat 19  
 Gluten piscium quò dijudicandū 118  
 Glutinium quod præstantur 118  
 Glutini facultas 43  
 Glutitionis resolutæ cura 322  
 Glycyrrhizon quale 19  
 Glycyfides qualitas 19  
 Gnaphalii qualitas 20  
 Gobius piscis qualis 107  
 Gongylis qualis 107  
 Graciles quomodo nutriendi 207  
 Gramas in puerorum oculis quomodo cures 386  
 Graminis facultas 9  
 Grando oculi quid & quomodo sananda 404  
 Grandinis generatio 180  
 Grani cniidij facultas eiusq; electio 152  
 Grani cniidij usus 42  
 Grani tinctorij qualitas ibidem  
 Gruum caro qualis 104  
 Gryali collarium 432  
 Gummi, quæ uirtute 43  
 Gurgulionis affectionibus remedia 473  
 Gustus & odoratus conspiratio 3  
 Gutturis tumoris medicamina 912  
 Gypsi efficacia 86  
 Gypsi poti remedia 789

## H

Hædriani antidotus 806  
 Hæmatitis lapidis facultas 30  
 Hæmorroides sedis quid, unde dicantur & oriuntur, quomodo sanentur 837  
 Hæmorroides sæpe soluere morbum 240  
 Hæmorrosos & hæmorroides qualis & quam uenenata animalia, eorum morbus cura 772.773  
 Hælica, uide Alica 69  
 Halicacabæ qualitas 69  
 Halimion siue Halmyris 11  
 Harmala, ruta lythæstris 54  
 Harmation collarium 432.433  
 Hebeudo oculorum quid, & ipsius cura 389  
 Hæcatontarchium collarium 421  
 Hæctica febris quæ & qualis quotq; eius genera 243.266  
 Hederæ proprietates 42  
 Hedychoi confectio 791  
 Hedychoi menta 33  
 Heclycina, quid & quale 89  
 Helenium siue Elenium 31  
 Helidæ collarium 433  
 Helitis quid & qualis 87  
 Helonij qualitas 118  
 Hemerocallæ qualis 33  
 Hemierania, qualis affectio, & unde oritur, eiusq; dinotio ac curationes 328.329.330  
 Hemitrite, id est, hemiterianæ curationes 256  
 Hepatis temperaturam unde liceat iudicare 221.222  
 Hepatis debilitas, affectiones, & indicia & remedia 610  
 Hepatici qui dicantur, & morbiditas & quomodo curetur 612  
 Hepatis inflammatio, & quomodo cognoscatur, hepatis an aniticius eius inflammati sint 613  
 Hepatis abscessus remedia 615  
 Hepaticorum remedia 616  
 Hepatis emulcerati remedia 617  
 in cirrhum indurati 618  
 Hepatis & sima & gibba quæ patient

# AETII INDEX.

Heptapharmacum 947  
 Hepsema, graum, sapa, idem 4  
 Heraclij lapidis facultas 83  
 Herbae fabinae facultas 18  
 Herbae lanariae efficacia 65  
 Herinacei marini caro qualis 108  
 Herinacei marini usus 113  
 Herinacei item terrestres ibidem  
 Hermolaus parvus & Hermolaus magnus, collyria 422  
 Hermonis emplastrum uiride 917  
 Hernia aquosa quid & quomodo generetur, ac curetur 849.850  
 Herniae mēstruorum cura 851.852  
 Herniae inguinis ibidem  
 Hernia aquosa mulieribus ubi accidat, quis sit, & quomodo mededum ei 1011  
 Herniae inguinis muliebris medicamina ibidem  
 Herniae uricae in mulieris pudendis curatio ibidem  
 Herpes quid, & quot eius species, item quae curatio 893  
 Hierae Rufi praestantia 313  
 Hierarum uariarum iuxta suos auctores compositio 163.164.165  
 Hieracitis lapidis energia 83  
 Hippocamporum marinarum usus 113  
 Hippocrates quomodo aërem purgarit Athenis tēpore pestis 269  
 Hippofelini potentia 65  
 Hippuris qua uirtute 35  
 Hirca adeptus qualis 3  
 Hircinae carnis qualitas 102  
 Hircinae medullae qualitas 109  
 Hircini sanguinis uirtus 91.675  
 Hircinum seuum quale 109  
 Hirudinū deuatorum noxa quae 383  
 Hirundines quando apparere incipiunt 182  
 Hirundinum usus medicus 117  
 Hirsipi pueri quō curandi 103  
 Hodi sanguis ad quid conferat 91  
 Hœdium seuum quale 109  
 Hœdorum carnis qualitas 102  
 Hœdorum ortus & occasus 182  
 Holofchoeni constitutio 67  
 Hominis ætati cuique quid exercitij conueniat 103  
 Homo, ceratum 950  
 Humanum stercus quale 99  
 Humefcētia alimenta 135  
 Humefcētiarum secūdi ordinis enumeratione 122  
 Humefcētiarum ratio 138  
 Humefcētionis & irrigationis differentia ibidem  
 Humidissimos, diutissime uiuere 224  
 Humida temperatura praestantia ibidem  
 Humiditatem ex ore quae trahant 173.332  
 Humor melancholicus, frigidus & siccus 304  
 Humoris, atrabiliarij, biliōsi, crudifrigidi generatiua quae sint 128  
 Humorem euacuātia, & post euacuatos humores adhibenda malagmata & epithemata 655  
 Humores cur non excidant extra uasa in febribus continui 250  
 Humoribus euacuatis cura quae conueniat 659  
 Humorum in podagricis dinotio 718.719.720  
 Humorum in uentris amplitudine & in uentris tunicis storum differentia 220

Humorum omnium in corpore æqualiter redundantium purgatorium compositio 160  
 Humorum permixtorum curatio 735.736  
 Humorum à capite in nentrem destillantium remedia 547  
 Hyacinthi temperamentum 69  
 Hyadi ortus occasusque 182  
 Hyena tota cocta quid proficiat 111  
 Hyena fel quale 98  
 Hyenae pellis usus 111  
 Hyenae uirtus 117  
 Hyderus quid, & eius remedia 665  
 Hydna, tubera 69  
 Hydrocephala affectio quae, & unde dicta, eiusque generatio 291.292  
 Hydromeli preparatio 289  
 Hydriperis facultas 69  
 Hydrops pro diabete 665  
 Hydrops quid, eiusque differentiae, & causae 650. tum remedia 651. 652.653.654.655.656.657  
 Hydrops subtercutis cura 660  
 Hydrorofari preparatio 288  
 Hydrus qui & natrix 776  
 Hygidij nardinum collyrium 437  
 Hygieni aureum collyrium 435  
 Hyofcyami qualitas 69.786  
 Hyofcyami dinotio 119  
 Hyperici efficacia 69  
 Hypnon quale 19  
 Hypnophori solani uis 69  
 Hypocistis quali facultate 41  
 Hypophthalmium quid 441  
 Hypopia quid, & cur sic dicta 441  
 Hypopiorum curationes ibid.  
 Hypopistis quid, eiusque usus 409  
 Hylicas quid 408  
 Hylosi temperamentum 69  
 Hytera cur uterus dicatur 955  
 I  
 Iasme uel Iasmolæum 26  
 Iasmolæon 26  
 Iaspachates lapis qualis 84  
 Iaspidis uiridis usus 552  
 Iaspidis uiridis proprietates 84  
 Iaspidis subuirdis ibidem  
 Iberidis herbae descriptio, uires & sinapismus eius 193.710  
 Icterus quid 645  
 Icterus quid, unde dicatur & oriatur 645. eiusque cura 646  
 Ictericis animalium qualitas 103  
 Ictur sycotum seu ficatum 103  
 Ictinoris debilitas, affectionesque & cura 620. uide Hepatis  
 Ignis facer, erysipelas 262  
 Illicis qualitas 21  
 Illitiones ad tumentes corporis partes 814  
 Illitiones oculorum uariae 412  
 Illitiones praeseruatiae aduersus febras 763  
 Illitionum stomatarum confectio nes 477  
 Illitionum omnium stomatarum usus doctrina summaria 478  
 Imber & uentus quando simul fiant 180  
 Imbrium generatio 180  
 Impetiginis equorum utilitas 110  
 Impetiginosis corporis tumoribus remedia 451  
 Incubus quid, eiusque curatio 308  
 Indarium collyrium 437  
 Indicum regium collyrium 434  
 Indici lapidis energia 83  
 Indurantia simplicia quae 123

Infantes stercentes quomodo mendi 199  
 Infantium uox intercepta quomodo restituitur 196  
 Infantum dēctio, inflammationes oculorum, albugines, aurium inflammationes, & siriahs quomodo curentur 199.200  
 Infantes quando ablactandi, & quomodo post ablactationem pascendi ibidem  
 Infantis recens nati sanitas quomodo cognoscatur, item eius educatio qualis sit 196  
 Infantibus spinas aut festucas deoueras quomodo eximas 200  
 Infantium sternutationes & grauedines, tussis, profluvia, alui superflua aut pustulae quomodo curantur ibidem. & 202  
 Inflammata triplicem sanationem habent 202  
 Inflammatio cerebri 317  
 Inflammationis cutis eunq; remedia 862  
 Inflammationis oculorum cura 305  
 Inflammationibus incipientibus, quomodo uena sectio debeat fieri 145  
 Inflammationibus non ualde fruentibus remedia parabilia 738  
 Inflammationum podagricarum causae quae 718  
 Inflationis cura 817  
 Inflationis uentris causae & remedia 565  
 Infusio sanguinis fedis ratio 177  
 Inguini inflammato quae cura conueniat 245  
 Infantis origo & indicia 299  
 Infantis species infinitae 300. & quomodo curanda ibidem  
 Infantis lupina seu canina, qualis, eiusque indicia & remedia 307  
 Infestio sanguinis ratio 187.188  
 Infestus in solum ex oleo ratio 187  
 Infestationis modus & utilitas 143  
 Instrumenti uocalis resolutio quomodo curanda 322  
 Intemperatura ex morbo constatae differunt à naturalibus 219  
 Intemperatam aliquā diutius persequere impossibile 216  
 Intertriginis inter foemora exortae curationes 844  
 Intertriginum medela 896  
 Interualum morbi 230  
 Intestina terrae quid 198  
 Intestina tenuia quae euacuent 174  
 Intestini recti resolutio curatio 313  
 Intestinoeum ex animalibus qualitates 103  
 Intestinoeum abscessus unde proueniat, & quomodo curetur 598  
 Intestinoeum tormina, id est, dysenteriae, quomodo oriuntur, & medeantur 599.603.609. & inde uide 618  
 Intestinoeum leuor, id est, lienteria quid, & quomodo curetur 618  
 Intyborum facultas 35  
 Ion, id est, quioia, qualis 35  
 Ios xyftos qualis 87  
 Ionthis, id est, uari faciei quomodo curandi 449  
 Iordanes fluius 7  
 Irinum oleum 28  
 Irionis facultas 32  
 Irrigationum ratio 187  
 Irrigationis & humefcētionis differentia 187  
 Ictus



# AETII INDEX.

Iatis utraq; qua ui prædita 36  
 Ichthiaci qui dicantur, & quomo-  
 do ipſorū morbus oriatur acun-  
 de 707  
 Ichthiacorū auxilia 708. uſque 717  
 Ichthiac. uſionis modus 710  
 Iſidori Memphisæ collyrium 433  
 Iſj uirtus 112  
 Iſj, uiride emplaſtrum Hermonis  
 917  
 Iſophoton collyrium 429  
 Iſtheon collyrium 429  
 Iſſur quali uirtute 35  
 Iſſuria quid, & eius auxilia 686  
 Iſſea, ſaliſ quali uirtute 36  
 Iudei emplaſtrum 935  
 Iudaicus lapis qualiſ 81  
 Iudicacionis morbi modus & ſigna  
 232. & deinceps  
 Iudicacionis euetus quomodo præ-  
 noſcendus 232  
 Iudicatorij dies qui boni & qui ma-  
 li 233  
 Iulides piſces quales 107  
 Iunci acuti qualiſ 67  
 Iunci leuiſ temperamentū ibidem  
 Iunci odorati qualiſ 47  
 Iunci rotundi qualiſ flos 67  
 Iuniperi uirtus 15  
 Ixiæ efficacia 787  
 L  
 Labiorum fiſſuris remedia 416  
 Labrum ueneris quale 20  
 Lac optimū quod 128. 129  
 Lac cur ſcrobicantibus nociuū 131  
 Lac generancia ac mouentia 173  
 Lac uitiatū quomodo mānas lædat,  
 & quomodo curandum 977  
 Lac ad quid utile 92. 93  
 Lac quibus conueniat 93. quibus  
 non 94  
 Lactis utendi ratio 93  
 Lactis coctura 94. 96  
 Lactis ſerum quale 94  
 Lactis acidi qualiſ 96  
 Lactis concreti conditio ibidem  
 Lac primarium quod 96  
 Lac pyriton uel pyriephton quod  
 ibidem  
 Lactis nutritis probatio 197  
 Lactis uſus & differentia uarię 92. 93  
 Lactis coagulati mala, eorūque re-  
 media 789  
 Lactis defectū quomodo ſuccur-  
 rendum 976  
 Lacin mammis ne grumeſcat ibide  
 Laci in mammis coagulato quomo-  
 do medendum ibidem  
 Lactis purgatorij compoſitio 118  
 Lacti quæ in coctione admixtæ 96  
 Lacti nutriti deficienti, aut tenui,  
 ſeu craſſiori factō, quomodo me-  
 dendum 198  
 Lactis item alijs uitijſ ibidem  
 Lactuce facultas 34  
 Lagophthalmi qui, & eorū medi-  
 camenta 353. 367  
 Lanæ lotæ, puræ, ſuccidæ, & uſæ  
 quū uſus & quō uenda ſit 110  
 Lapathi uis 48  
 Lapis Phrygius 82  
 Lapidum uariorū nomina & faculta-  
 tes medicæ 30. 31. 32. 33. 34. 85  
 De lapidib; omnib; generalis do-  
 ctina 80  
 Lapides qui emplaſtris immittan-  
 tur 816  
 Lapidis ſpecularis uirtus 87  
 Lapidis qui nec ateri nec excerni  
 poteſt curatio 679  
 Lapidibus exciſis quæ diæta conue-

niat agrotō ibidem. & 680  
 Lapidēs ne aut naſcantur, aut rena-  
 ſcantur, diæta 671  
 Lapidēs, uide Calculoſ  
 Lappæ qualiſ 55  
 Lappanæ qualiſ 48  
 Laporum ex alto remedia 790  
 Laſer qualiſ facultatiſ 56  
 Laſitudinū uariæ ſpecies, & ua-  
 rię curationes 207. 208. 209. 210.  
 211. 212  
 Laſitudinū ſpontanearū ſpe-  
 ciestres 210  
 Lauri facultas 20  
 Laurinum oleum 23  
 Lathyri & Lathyriſ qualiſ 48. 152  
 Leæna emplaſtrum 713  
 Leniſ facultatiſ quæ ſint 423. 424  
 Leoninum ſeuum 109  
 Leonis ſtella illuſtris quando occi-  
 dat 182  
 Leontiaſis quid, & cur ſic dicta, ac cu-  
 ra ipſius 810. 811  
 Leontopetali qualiſ 49  
 Leontopodij uirtus 49  
 Lens ſtagnorum ſeu paluſtris cuius  
 qualiſatiſ 70  
 Lentēs qua facultate 69  
 Lenticulæ coctura qualiſ 134  
 Lentiginib; faciei menditia 446  
 Lentiſci temperamentum 67  
 Lentiſcinum oleum 23  
 Lepidij qualiſ 49. 193  
 Lepiſ duplex, & qualiſ 87  
 Leporiſ capitiſ uis medica 110  
 Leporinæ carniſ qualiſ 102  
 Leporini coaguli præſtantia 97  
 Lepus marinus qualiſ & quām ue-  
 nenatuſ 792  
 Lepra quo differat ab alpho, leu-  
 ce, ſcabie, & impetigine ſylueſtri  
 829. 830  
 Lepræ remedia plurima 829. 830  
 Lepræ generatio 829  
 Letharguſ unde cauſetur 295. quæ  
 habet accidentia, & quomodo  
 curandus 295. 296  
 Letharguſ & caroſ quomodo dif-  
 ferant 298  
 Leucacanthæ facultas 11  
 Leucanthemi facultas 110  
 Leuce, populuſ alba 49  
 Leuce quid, & unde, ac cur ſic dicta,  
 eiſque medelæ 827. 828  
 Leuce quomodo differat à lepra &  
 ab alpho 830  
 Leucographiſ lapiſ 77. 81  
 Leucophyllon unguentum 1026  
 Leucoij uirtuſ 49  
 Libanoti qualiſ 49  
 Libanoti fuligo qualiſ 49  
 Libanotidiſ temperamentum 50  
 Libidiniſ extinctæ prouocamenta  
 703  
 Libræ in ſuas parteſ diuiſio 1030  
 Libyaſ collyria quæ dicantur 424.  
 & qualiſ 426  
 Lichen ſeu muſcuſ petrarum 49  
 Lichen morbuſ, ſui nominis herba  
 curatur ibidem  
 Lieniſ affectionum cognitio 631  
 Lieniſ animalium qualiſ 103  
 Lieniſ intemperierum cura 632.  
 inſtationiſ 633. & inde  
 Lienoſorum uſtio & diæta, tum iux-  
 ta morbi uarietatem curationeſ  
 643. 644. 645  
 Lienteria quid, & quomodo curan-  
 da 618  
 Ligamentorum induratorum me-  
 dela 909

Lignorum cariei aut putrediniſ u-  
 ſuſ 62  
 Lignyoſ facultas 50  
 Liguſtici uſuſ 50  
 Liguſtri qualiſ 47  
 Liliij temperamentum 45  
 Liliaceum oleum 25  
 Limniſſorum uſuſ 293  
 Lingue aſperitiſ quomodo curan-  
 da ſit 278  
 Lingua principij & finiſ intera-  
 neorum eſt 279  
 Lingue inflammata, deſquamata &  
 tumentiſ remedia 471  
 Lingue reſolutæ curatio 321  
 Linifemiſiſ uis 50  
 Linozoſtiſ qualiſ 50  
 Liniſemiſiſ oleum 22  
 Lipothymia quid, eiſq; cauſæ 274  
 & quomodo differat à ſyncope  
 ibidem  
 Lippitudiniſ in febrib; curatio 280  
 Lippitudiniſ ſpecieſ & curatio 401  
 Lipypia febril quæ 262  
 Liſqueſeri quid 75  
 Liquidorum collyriorū deſcriptio-  
 neſ 415. & inde  
 Litri ſpumæ qualiſ 86. 88  
 Lixiuiſ facultas 43  
 Lobi quales 20  
 Loculuſ, uide Secunda  
 Locuſtæ uſuſ in medicina 114  
 Localium euacuationum tractatio  
 172. & inde  
 Lolij uirtuſ 10  
 Lonchitiſ ad quid conducatur 50  
 Lomina, caſtanea 21  
 Loquentium difficulter affectio du-  
 plex, item quæ remedia ipſiſ con-  
 ueniant 470  
 Loti arboriſ qualiſ 51  
 Loti herbæ facultas 51  
 Lucernarum oleum 22  
 Lucij malagma ad articuloſ diſtor-  
 toſ 737  
 Lumborum doloriſ curatio 282  
 Lumbriorum generatio, diuerſi-  
 taſ & remedia 594  
 Lumbriſ laruiſ quid, unde gene-  
 retur & curetur 597  
 Lumbriſcoſ educuntia 176. 179  
 Luna ſecundum menſem quatuor  
 differentiaſ in aëre operatur 180  
 Lupi piſciſ qualiſ 106  
 Lupiniſ qualiſ 34  
 Lupiniſ erraticuſ 34  
 Lupiniſ ſtercoriſ qualiſ 100  
 Lupinuſ morbuſ qualiſ 307  
 Luxatorum membrorū curatio 897  
 Lycij deſcriptio 50  
 Lycopſoſ, Anchufæ ſpecieſ 9  
 Lycos, paſſilluſ 614  
 Lymoniij uireſ 703  
 Lyncyriſ facultas 49  
 Lyre ortuſ, occaſuſq; 182  
 Lyſmachium quale 51  
 Lythargyri uis 88  
 M  
 Acer quid & qualiſ 51  
 Macieſ & tabeſ oculorū quid  
 & quomodo differant, curen-  
 turq; 393  
 Maculiſ ſolaris. cōmōda 406. 407  
 Madaroſiſ quid 364. 368  
 Madefieriſ quid 75  
 Mænularum moriæ uſuſ 108  
 Mænularum capituſ quæ uirtuſ  
 109. 110  
 Magnetis lapidiſ efficacia 83  
 Magoſ emplaſtrum 83. 615  
 Magnum collyrium 428  
 Malaba

# AETII INDEX.

Malabathri folium quale 51  
 Malabathri folii qd præstantius 119  
 Malabathrinum oleum 30  
 Malachæ uirtus 51  
 Malagmata humorē euacuātia 65f  
 Mali Armeniacæ qualitas 53  
 Mali Medicæ facultas ibidem  
 Mali nauis occalus 182  
 Mali punici qualitas 62  
 Mali perficæ proprietates 53  
 Malorum in genere tractatio 53  
 Maluæ efficacia 5f  
 Maluæ fyluestris energia 153  
 Malua fyluestris, ebificus 21  
 Malus habitus corporis quid, eius  
 que indicia & remedia, tum in  
 quos morbus transeat 649  
 Mammis ob lactis abundantia tur-  
 getibus quomodo auxiliādi 976  
 Mammarum inflammatarum reme-  
 dia 977  
 Mammarum inflammationum in-  
 duratarum medicinz ibidem  
 Mammarum abscessuum, fistulārū,  
 ulcerum depauperantium, ac cācro-  
 rum curæ 979-980  
 Mamarū induratarū medelæ 983  
 Mandragoræ uis 51-786  
 Manna quid, & quomodo differat  
 à thure 383  
 Manus emplastrum 948  
 Man zizanion, colocasion 42  
 Marasmus quid 267  
 Marathri facultas 51  
 Marcianon unguentum 744  
 Mare mortuum 7  
 Marrubij uires 60  
 Maculo gignēdo quid agēdū 976  
 Masticati præparatio 1018  
 Mastiche duplex & qualis 52  
 Mastiche, lenticili resina 173  
 Mastiche, resinarū præstantissima 61  
 Mastichinum oleum 26  
 Masaphij confectio 809  
 Matrix. uide Vterus  
 Maza quid 45 (ate 45)  
 Maturitas fructuum ex foliis calidi-  
 Meconis natura 52  
 Meconis ceratiti qualitas 13  
 Meconium quid 197  
 Media quæ sint in quatuor qualita-  
 tibus 110-122  
 Medica siue citrea malus qua-  
 lis 53  
 Medicamentorū quæ sint qualita-  
 tes ex uirtute simplicium 115. & ide  
 Medicamenta purgantia componē-  
 di methodus 153  
 Medicamenti ex papaueris capitu-  
 bus præparatio & usus 285  
 Medicamentorū electio, quæ tradit  
 quæ sint præstantiora 117. & inde  
 Medicamentorum qualitatū or-  
 dines quatuor 1  
 Medicamentorum diuifio, & qua-  
 litates 3  
 Medicinz præcticæ duæ partes ma-  
 ximæ quæ 195  
 Medicum, naturæ operum esse gna-  
 rum debere 227  
 Medullæ usus ex animalibus 109  
 Medullarū differētia efficaciq; 109  
 Medullarum quæ optima 119  
 Megaleum oleum 27  
 Mei radicem usus 54  
 Melampylli facultas 11  
 Melan quale 88  
 Melancholiæ generatio & uarietas,  
 indiciaque 302-303  
 Melancholiæ species quot 303. eius  
 quæ sit cura ibid. & 304-305-306

Melancholici qui dicantur 164  
 Melancholici cur plures cibos ap-  
 petant &c. 303  
 Melancholicus sanguis nū cerebrū  
 tantū, an totū corpus occupat,  
 quomodo cognoscas 304  
 Melantheria qualitas 88  
 Melantheriæ exploratio 119  
 Melanthij qualitas 52  
 Melanthij noxa 790  
 Melæ armeniacæ proprietates 53  
 Melæ perficæ qualitas 53  
 Meliceridum remedia 40f  
 Meliceris qualis affectio, & cur  
 dicta 343  
 Meliceridis puerorum cura 202  
 Meliloti uires 52  
 Melines qualitas 51  
 Melinum oleum 24  
 Melythophyllon, quale 80  
 Melitites lapis qualis 12  
 Mellis facultas 52-84  
 Mellis emollientis præparatio 157  
 Mellis rosacei cōpositio 155. & 288  
 Mellis in Heraclea Ponti nati pro-  
 prietas 785  
 Melli quō adimat extensoria uis 52  
 Memæcydon quid 43  
 Membranam cerebri fauciatā quæ  
 glutinosa 327-328  
 Membrorū resolutorum cura 323  
 Memoriz amissæ differentiz & re-  
 media 312-313  
 Mendesium oleum 217  
 Menfis cuiuslibet quatuor esse dif-  
 ferentias scēdum lunam 180  
 Menfes quibusdā mulieribus sup-  
 primi naturaliter, aut præter na-  
 turā 984  
 Menfes quæ ætate fluere incipiunt  
 & desinant ibidem  
 Menstruis purgationibus quæ mu-  
 lieres careant ibidem  
 Menstrua quibus de causis suppri-  
 mantur, & quomodo curētibid.  
 Menstruis quæ non purgantur, qui-  
 bus accidetibus oonoxiæ sint 985  
 Menfes ducentia remedia 986  
 Menfes quibus mulierib. non fluit,  
 uel ob plenitudinem, uel ma-  
 ciem, uel uiciatos humores, uel  
 ob sanguinis ad nares, aut sedē  
 delationē: uel ob nimium otium  
 aut aliquam uteri affectionem,  
 remedia 987-988  
 Mensium stillicidij medicinz 989  
 Mensū nimiz purgationi quomo-  
 do subueniendum 990  
 Menfes quæ ducant in potu sum-  
 pta 176  
 Mensium fluxu morbum sæpe fuisse  
 solutum 240  
 Menstruæ mulierum purgationis  
 ratio 957  
 Menstruæ purgationis in uirgini-  
 bus indicia 958  
 Mensura quomodo iudicetur 1031  
 Mensurarum liquidorum descri-  
 ptio 1031  
 Mensurarum notæ 1031  
 Meriendæ quantitatis differentias  
 esse tres ibidem  
 Mentæ facultas 33  
 Menti papulas manātes quomodo  
 cures 451  
 Menti scabriciei medela 446  
 Mercurij herbæ usus 57  
 Mercurialis quali uirtute 50.  
 152-153  
 Mergi uentriculum ad quid utilis 111  
 Merula piscis qualis 107

Mespili natura 53  
 Metallistisue similis rei degluti-  
 tionis remedia 609  
 Metallica quæ dicantur, & quæ eo-  
 rum uirtus 85. & inde  
 Metopium oleum 27  
 Metafyncritica quæ dicantur 690  
 Metafyncritica curatio 194  
 Metra cur uterū dicatur 861  
 Miliariis, species herpetis quid, &  
 quomodo medenda 893-894  
 Milij confusio 39  
 Milphosis quid, & unde dicta 364.  
 403  
 Miltos, id est, rubrica 78  
 Minthe, quæ menta 33  
 Miscendorum medicamentorū quæ  
 stratio 153  
 Misy quale 88-85f  
 Mola uteri quid, unde dicta, quæ  
 affectio, res eam consequantur, &  
 quomodo curentur 1006-1007  
 Molares dolentes quomodo citra  
 forcipem tollas 112  
 Mollitia simplicia quæ 123  
 Mollium piscium qualitas 107  
 Moly quale 54  
 Molybdenæ & molybdi usus 88  
 Moni collyrium 431  
 Monohamera collyria 419  
 Monomelum collyrium 420  
 Morbi prima dies quæ dicatur 229  
 Morborum principium trifarium  
 dici 229-230  
 Morbi principium, augmentum, uig-  
 sor & declinatio quæ & quomo-  
 do dinoscantur 230-231  
 Morborum causæ quomodo consi-  
 derandæ 205-205  
 Morborum perfectæ aut imperfectæ  
 solutorum signa 242  
 Morbum recte curari non posse ci-  
 tra ipsius prænotionem 228  
 Morbus urum tardius aut citius  
 iudicetur 231. item an iudicari  
 possit, quomodo & quando præ-  
 noscatur ibidem  
 Moroxus lapis cuius uirtutis 81  
 Morfus hominis medela 759  
 Morfus canis 760  
 Morfus leonum, pantherarum, aut  
 ursorum antidoti 761  
 Morfus suum, felis, crocodili, & be-  
 stiarum uenenatarū remedia 762  
 Morfus fellionis, salamandre, lacer-  
 tæ, chalcitidis, murisq; aranei me-  
 denta 766  
 Morsum aspidis & uiperæ utriusq;  
 remedia 770  
 Mortem non esse prædicandam in  
 acutis morbis 243  
 Mortis & diem & horam præno-  
 scere posse doctum medicum  
 241-242  
 Mortis signa ex atræ bilis motu  
 239  
 Morus & mora 54  
 Moschatorum unguentorum com-  
 positiones 1025  
 Morus externus & internus qui di-  
 cantur 234  
 Mucus ex qua nāsi parte excolle-  
 tur 357  
 Mugil qualis piscis 106  
 Mulieris uirtutis notæ 984  
 Mulierum quæ non purgantur acci-  
 dentia & remedia 985  
 Mulierum fecundarum dinotio  
 958  
 Muliebres purgationes sæpe solue-  
 re morbum 240  
 Mulus

# AETII INDEX.

Mulus qualis piscis	106
Muralij siue Muralis herbe uirtus	31
Murenæ morfus medela	778
Muriæ uis medicamentaria	108
Muicæ æreæ quæ dicantur	413
Mufcas necantia	778
Mufci marini facultas	19.70
Muscium, aliâs Dorecadias	314
Muscus arborum qualis	19
Muscus petrarum	49
Mustati olei præparatio	1028
Mustellarium nifus medicus	111
Musti ufus	55
Mutum, emplastrum	935
Myacanthus, qui alparagus	15
Mycetæ quales	55
Mydryafis quid	364
Mydryafis quid, eiusq; cura	392
Myle quid, & eius ufus	49
Myoccephalo quid, & cur sic dictû	380
quomodo differat à pustula	380
Myopes quæ dicantur	388
Myopiam effe incurabilem.	ibid.
Myos otis qualis	54
Myricæ ufus medicus	54
Myrmecia unde dictæ	17
Myrobalani facultas	16
Myrobalaninum oleum	23
Myrrhæ temperamentum	65.87
Myrrhæ dinotio	119
Myrrhario ad cadauerum conseruationem	1030
Myrsine siue myrtus	54
Myrteum oleum	26
Myfterium, alio nomine tetrapharmacum	754

## N

Napy quale	55
Narcifsi uirtus	55
Narcifsinum oleum	26
Nardi celticæ uirtus	55
Nardi cretici conditio	70
Nardi fpicæ facultas	55
Nardinum oleum & eius præparatio	28.29
Nardinum fecundarium	28
Nardoſtachi quale	55
Naribus ulceratis quæ cõueniât	310
Narium affectionum tractatio	352
& inde	
Narium mucî remedia	495
Narium obturationis medelæ	357
Nariû ulcera quomodo cures	356.
357 item languinem fluentem ibidem	
Narthex qualis	55
Nafus quomodo cõstructus fit	357
Nalturij facultas	38
Naufææ origo & cura	539. & inde
Naufearum cataplafmata & epithe-mata	543
Naufææ, effe communia accidentia omnium redundantium in uentre humorum	220
Natrix qualis	776
Naturalium operum per fe nullum effe nocium	141
Naxiæ cotis reſtrimenti uis	83
Necheſi regis ad carnem in naribus enatam medicamentum	355
Necheſion Aegyptius	14
Nerij efficacia	55
Nerueorum ſauciatorum cura	819
Nerueorum contuſorum cura	861
Nicarum Zoli collyrium	436
Niſtalopes qui dicantur & quomodo curandi	388
Nigellæ uis	52
Nilamnon collyrium	426
Nileſi epithema	551
Niliæ quæ præſtantia	183

Nili collyrium	428
Nitri qualitas	856
Nitriſpumæ uis	86.87
Nitroſa balnea quibus conueniant	185
Niuſi generatio	180
Noctis quatuor effe differetias	180
Nomarum oculi remedia	378
Nubecula oculi quid, eiusque cura	373
Nucis arboris qualitas	38
Nucis pineæ uis	48
Nuclei pinei quales	59
Nucum oleum	23
Nux auellana	39
Nux iuglans ſeu regia	38
Nux parua, auellana	39
Nux pontica, auellana	ibidem
Nux pinea ſeu picea	59
Nutricis electio & uiſus, tum exercitia	197.198
Nutriticia multum & item parum quæ ſint	128
Nympha quid, & eius ſectio	1022
Nymphææ qualis actio	55

## O

Obducentium meatus medicamentorum qualitas	3
Obſcuratio oculorum quid & unde, curatioque ipſius	390.391
Obolum continere ſiliquas tres	323
Obſcuratio oculorum quid	364
Obturtantia, aut obturatione liberantia	132
Ocidentalium uentorum qualitas	181
Ochroſum facultas	70
Oculorum obſcurationis in febris remedia	281
Oculorum infantium inflammatio-nibus quid conueniat	200
Oculus quæ pungent, & lachrymas prouocent	172
Oculus humectos & ſentes quomodo cures	407
Oculorum lippientium cataplaſmata	411
Oculorû illitiones & collyria	412.
413.414.415 & inde	
Oculorû ulcera cancerata, ite maligna quomodo curetur	378.379
Oculorum ulcerib. quomodo cicatricem inducas	382
Oculorum cicatrices & albugines quomodo curandæ. ibidè	& 383
Oculus glaucos quomodo nigricantes facias	385
Oculorum fluxionibus, ſuppuratio-nib. ſiſcoſis eminentijs	387
Oculi debiles qui dicantur, debilitatisq; curatio, & quomodo differant à fluentibus	388
Oculorum hebetudo & obſcuratio quid, quomodoq; curanda	379
Oculorum reſolutio, & ipſius curatio 391. item quæ curabilis & quæ non ibidem	
Oculorum macies, expreſſio & conſuſio quid, quomodoq; curentur	383.384
Oculi albis innata quomodo tollenda	394.395
Oculorum quæ ſit natura	363
Oculi ſingulæ partes quot & quibus affectionibus infeſtetur ibi.	ibidem
Oculi humores tres	ibidem
Oculorum perturbationis cura	364
Oculorû inflâmationis medela	365
Ocularium morborum curæ uariæ	364.365.366.367.368.369

Oculorum frigida intemperie curatio	369
Oculorum inflamationis, tumoris, & tumoris indurati cura	369.370
Oculorum ulcera, & ulcerationes ab igne, item ſi qua oculis illaſa fuerint, quõ curanda	376.377
Oculis infixis quomodo extrahantur	371
Oculorum ſugillatio, puncturæ & uulnera profundiora quomodo curentur	372
Oculi humor ouiformis quomodo exiccandus	373
Oculi prolapsus, item ulcerationi ſuperficiali, nubeculæ, caliginis, epicaumatis & encaumatis curatio	373.374.
Oculorum argemum, ſoſſula, concaua ulcera, tum ſuppuratio & unguis quomodo ſananda	374
Oculi puſtularum origo, dinotio, curaq;	375.376
Oculorum nomæ quomodo curandæ	378
Ocymi baſilici conſtitutio	71.
Odoramentorum uariorum con-poſitio	1025
Odoratus & guſtus conſpiratio	8
Odoratus oblaſionis medelæ	357
Odorum corpus reddentia, & odorrem corporis ſectentem tollentia	445
Oenanthiariorum uariorum conſectio	1027
Oenanthæ quid	23
Oenanthinum oleum	23
Oenoſ, uinum	55
Oeſyſi præparatio	948
Oeſyſi præparatio, & uſus	101
Oleæ qualitas	121
Olei uirtus & quid proprie	22
Olei purgatorij conpoſitio	171
Oleorum ſalca, foliati, & ſpicati præparatio	1026
Oleum alenum	398
Oleorum diuerſorum præparatio-nes & qualitates deſcribuntur pagina 12 & deinceps	
Oleum amaracinum	27
Oleum amygdalinum	23
Oleum anethinum	25
Oleum chamæmelinum	25
Oleum cicinum	22
Oleum cyprinum	27
Oleum ſceni græci	25
Oleum foliatum quomodo fiat	36
Oleum ſaſnæ dictum	26
Oleum irinum	28
Oleum malabathrinum	30
Oleum laurinum	23
Oleum lenticinum	23
Oleum liliaceum ſeu lirinon	25
Oleum lini feminis	22
Oleum maſtichinum	26
Oleum megalium	27
Oleum melinum	24
Oleum mendefium	27
Oleum metopium	27
Oleum myrobalaninum	23
Oleum myrteum	26
Oleum narcifſinum	26
Oleum nardinum	26
Olei nardini præparatio	28.29
Oleum nucum	23
Oleum oenanthinum	23
Oleum populi nigre	22
Oleum raphaninum	22
Oleum roſaceum	24
Oleum ſabinum	22
Oleum ſalca	29
Olei	

# AETII INDEX.

Olei fampuchini præparatio	472	positiones	153	Paroxyfmi quatuor effe tempora	230.231		
Oleum ſclaminum	23	Oxythemos qualis	67	Paroxyfmi particularis ac uniuersa-	lis, id eſt, principij, augmenti, u-		
Oleum ſcyonium	27	Ozænarum ortus & cura	352. 353.	goris, & declinationis ſigna	230		
Oleum ſtyracium	26		354-355.356	Parthenij proprietates	31.150		
Olei ſuffumigabilis præparatio	30	P		Parientes quomodo in enixu ſe ge-	nerare debeant	561	
Oleum ſufinum	25	Paccianum collyrium	435	Partus infantis indicia	951		
Oleum telinum	25	Pacciꝝ afclepiadeum	429	Pafiphilum, medicamentum ſic-	cum	876	
Oleum uiolatum	26	Pæderotis uires	11	Pafilli ex acacijs & ueratris compo-	ſitio	725	
Olerum nullum effe boni ſucci 130		Pæonia facultas	19	Pafilli flauum bilem purgantis com-	poſitio	160	
Oliuarum effe qualis	12.6.12.7.12.8	Pæonia antidoti compoſitio	804	Pafillorū ad hemicranias & omnes	capitis dolores compoſitio	331	
Oliuarum purgatoriarum compo-	ſitio	Pæonia radices uis	311	Pafillorum ſcilliticorum præpara-	tio	791	
	158	Palati remedia	471	Pafillorum theriacorum præpara-	tio	791	
Oliuarum falſarum uirtus	133	Paliuri facultas	57	Pafillus Cyri archiatri Edeſſe ad	ozenas	314	
Olympionici collyrium	423	Palme temperamentum	70	Pafinaca, daucus	20		
Omotribes oleum	22	Palpebrarum morborum omni-	genarum differentię & curatio-	Pafinacæ uirtus	65		
Omphacij & acetii differentia	5	nes	386	Pafinacæ caro qualis	108		
Omphacinum oleum	22	Palpebrarum futura quomodo fiat	tam furſum quàm deorfum	Pafinacæ marinæ uulneris reme-	dia	777	
Omphacomelitis præparatio	288		340	Patos quæ ſordes	62.93		
Omphacocarpos, quæ Aparine	14	Palpebræ euertio qualis & eius cu-	ratio	Paulina antidotus Ariſtarchi	517		
Onochilos, Anchufæ ſpecies	9		340	Pauonis caro qualis	104		
Onoclea, Anchufæ ſpecies	9	Palpebrarum concretio & contra-	ctio quomodo fananda	Pectus purgantia	173		
Operis huius inſtitutum	8		397	Pedicularis morbi generatio & cu-	ratio	343	
Ophiasis qualis affectio, & unde	proueniat, quomodo quæ curetur	Palpebrarum pediculis & pilis quo-	modo medendum ibidem	Pedicularum in palpebris origo &	curatio	397	
	334	Palpebræ pilorum ordo duplex &	multiplex ibidem	Pedicularum capitis & totius corpo-	ris remedia	343	
Ophitis lapidis energia	83	Palpebrarum aſpitudines unde fiat	& quomodo curentur	Pediculos omnis generis circa cor-	poris ſuperficiem deſtincta	177	
Opiſthobares collyrium	432		386	Pegani uirtus	58		
Opiſthotonos quid	323	Palpebrarum ganglia, atheroma-	ta, ſteatomata, melicerides, ua-	Pelagie patritiæ ſapo	444		
Opos qualis	56	rices & reliqua mala quomodo	cures	Pelaria collyria	431.432		
Opopanax qualis	57.857	Palpebrarum abſceſſus & calculi cu-	ra	Pelecinus qualis	33		
Opopani fructus qui	66		403.404	Pellium animalium qualis uſus	110		
Orcheſtæ unguentum	745	Palumbi ſanguis ad quid conferat	91	Pentamæron unguentum	745		
Orchis cynos qualis	56	Pampathes emplaſtrum	938	Pentaphilli facultas	57		
Orchis altera	ibidem	Pamphilii Epifcopi ſuffumigium	1030	Pentatheton emplaſtrum	949		
Orchis facultas	45	Panacea emplaſtrum	936	Pentorobos, aliàs pæonia	19		
Ordeoli tuberculi ſedes	377	Panacis radicum & ſucci explora-	tio	Peplij uſus	57		
Ordeoli oculorum cura	404	Pancratij temperamentum	57	Peplij uirtus quæ ſit	150		
Orientalium uentorum qualitas	181	Panchreſton ſuluum. collyrium	434	Peponis facultas	57		
Origani uires	56	Panchreſtos Eraſiſtrati, cur ſic appel-	lata	Perca piſcis qualis	107		
Orionis ortus	182		349.416	Perdicium quali ui-	31		
Oris ſecutori remedia	455	Pani circa quam oculi partem pro-	ueniant	Perdicium eluſus quomodo conue-	niat	126	
Oris ſiltionum, quæ ſtomaticæ di-	cuntur, deſcriptiones & uſus	Panicum quale	32	Perdicium quale fel	98		
Oris inflammationū remedia	476	Panis uſus in cataplaſmate	196	Perſuſionis uſus & ratio	188		
Orobanchæ temperamentum	56	Panum ordeaceorum qualitas	45	Peripneumonicorum affectio & re-	media	518	
Orobi facultas	ibidem	Papaueris qualitas	52	Periſtèreonis qualitas	518		
Orophe Siris, crocodilias	667	Papaueris cornuti uis	53	Periſtyphiniſmus quid, & eius ra-	tio	409	
Orthopnoici qui, & unde ſiant, ac	quomodo curentur	Papaueris fucci uis	787	Peritonæon quid	626		
Oryzæ actio	56	Papaueris Thebani proprietates	53	Permonum medicinæ	898		
Oſicia uſorum aperientia ſimpli-	cia quæ ſint	Papularum ortus & cura	895	Perſee foliorum facultas	58		
Oſium laſcituudo quæ	208	Papularum menti eruptionibus ma-	nantibus quomodo medendum	Pes cornicis quali uirtute	43		
Oſium uſorum uſus quis	110		451	Pefſtis futuræ ſigna	269		
Oſtracitis lapidis uires	83	Papulis ex ſudore aut ſeruore auxi-	lia	Pefſilentes morbi qui dicantur, &	unde generentur, cum quomodo	cauere liceat	268.269
Oſtreodermorum qualitas	107		824	Petri Archiatri collyrium	433		
Oſtreorum teſtarum uſus	116	Papulis ulcerofis crurum medica-	menta	Petroſelinum quale	53		
Oſyridis uirtus	57	Paralyſis efficaciac	53	Pucedani uires	18		
Ocium quantum obſit ſanitati	126	Paralyſeos affectio & cura	319	Phaci, id eſt, lentes	69		
Oua animalium qualia 105. item uis	medica ibidem	Paralyſis quomodo ab apoplexia	ſeu ſyderatione differat	Phacos paluſtris qualis	70		
Oui candidum quale	3		319	Phagi uirtus	21		
Quorum iuxta coſtutam quæ me-	liora & quæ deteriora	Paronychiarum medelæ	899	Phalangioſis quid, & quomodo cu-	retur	397	
	105	Parotidis affectio & cura	351.352	Pharmacæ uehementiora quæ	205		
Quilla carnis temperamentum	102	Paroxyſmus quid	230	Pharmaci ex pice Bruti Galeni co-	poſitio	Y	
Quilla pellis uſus	110						
Quilli ſtercoris qualitas	100						
Quillum fel quale	98						
Quillum lac quale	92						
Oxallidis efficaciac	310						
Oxos, acetum	56						
Orygala quale	96						
Orygalaſcini caſei utilitas	96.97						
Orylapathi uirtus	48						
Orylipes panes	246						
Oxyporium medicamentum	246						
Oxyporium polyetes	560						
Oxyporij ad inflationes præpara-	tio						
	307						
Oxyporiorum purgatoriorum co-							

positio	315	Piscium descriptio 105. usque	109	Porriginis affectio, origo, & cura-	
Pharmacæ ex tribus piperis generi-		Piscium optimi qui	127.128	tio	341.342
bis compositio	560	Piscium salforum qualitas	128	Portulacæ uirtus	13
Pharmacum qui biberit, & non pur-		Piscium pinguedinis usus	109	Potacurum alium purgantium com-	
gantur, quomodo curandi	165	Piscifacæ facultas	59	positio	157
Pharmacitidis terræ uis	79	Pituita laborantium cura	730	Potamogeton qualis	60
Phascelorum facultas	20.70.	Pituitam per os à capite ducentium		Potionum incundatum & commo-	
Phalangij qualitas	55	descriptio	333	darum in febribus compositio	286
Phasiacorum caro qualis	104. 008	Pituitam ducentia quæ sint	151	Potus intempestiue sumptus sitim	
qualia	105	& inde	160	auger	279
Phemus, pharmacum	611	Pitydis quale	59	Præcocia quid	13
Philadelphus pastillus	613	Placitis stypteria	89	Prædicere mortem in acutis mor-	
Philanthropi qualitas	14.55	Plaga capitis quomodo curanda	327	bis non decet	243
Philetærij efficacia	60	Plagæ scolopendræ, araneæ, tetra-		Pregnantes quomodo se gerere de-	
Phalinus præses quo medicamento		gnathi & phalangij medicamen-	766.767	beant	960
curatus	78	ta		Pregnantis utero quæ innascan-	
Philotimus quomodo melancholi-		Plantaginis qualitas	765	tur	956
cum se caput non habere putan-		Plantarum rimis utilia	902	Præputiolum seu ordeolum quid,	
tem curauerit	302	Platani qualitas	60	& quomodo curetur	404
Phlomos qualis	70	Platyocoria quid	364	Præsi efficacia	60
Phlogini linameti compositio	414	Pleiadum ortus occasusque	182	Præstion qua ui	60
Phoenix palma	70	Plenitudinis dinotio unde sumatur	144	Præstoides, qualis	32
Phoenix collyrium	150			Priapismus quid, & eius cura	699
Phoenix niger, collyrium	435	Pleuritis qualis affectio & cura	522	Principis orientis suffumigium	1019
Phoenixinum, epithema	311	& inde		Principium morbi quid, & trifaria	
Phoenixorum compositiones	642	Pleuritis quæ uidetur & tamen non		dici	229.230
Phosphorus collyrium	418	est, quomodo dinoscenda & cu-		Procidantium sedis remedia	842
Phrenitis quid, quotque eius dif-		randa	525	Procidens sedis perustio quando	
ferentia, & quomodo curanda	293	Plinitis stypteria	89	fiat	842
		Plumbaginis qualitas	88.854	Procyonis ortus	182
Phrygiæ lapis qualis	82	Plumbi usus	88.854	Proplapsus oculi qualis	373
Phu qualis efficacia	70	Plumbi succus quomodo fiat	726	Prophetæ doctoris antidotus	802
Phuæ pisces quales	107	Plumbum quomodo augetur	182	Propolis qualis	61
Phycos, fucus	39.90	Plunæ aqua qualis	188	Proteus collyrium	434
Phylæma pinus	62	Pluuiarum generatio	181	Pruinæ generatio	180
Phycotryche emplastrum	249	Pluuiæ cur aliquando post uentum,		Pruna Hispanica qualia	205
Phycos qualis	70	aliquando ante fiat	ibidem	Prunorum facultas	42
Pica prægnantium quid, unde di-		Podagra quid, & quo differat ab		Purritum omnis generis curando-	
cta, cur & quando mulieribus ac-		arthritide, eiusque cura	716	rum remedia	819
cidat	959	Podagra cur aliquibus magnus		Pseudobunij facultas	18
Picea quomodo medendum ibidem		morbis, aliquibus paruus exi-		Pseudodictamni qualitas	20
Picationis usus & compositio	191	stat, item alijs diu, alijs breui tem-		Psychotrophæ facultas	40
Picis efficacia 59. & quomodo ex		pore duret	717	Psidracibus pustulis quæ auxilien-	
ea fuligo præparetur	ibidem	Podagricorum accidentiū quæ sint		tur	824
Picra ex aceto, mulso, Oribasij		rationes	718	Psilothra quæ dicantur, eorumque	
808		Podagrica cerata	741	compositio	340
Pieris qualis & cur sic dicta	63	Podagrica unguenta & acopa di-		Psilothrum, ampelose leuce	12
Pili palpebrarum uarij, & eulsi ne		ueria	742. & inde	Psilothrum ex herinaceo terrestri	
renascantur, medicamenta	397.	Podagrice antidoti	751. & inde	quomodo fiat	113
398		Podagricorum qui lauandi & quo-		Psorium quomodo fiat, & eius co-	
Pilorum agglutinatoria	398	modo	756	ditio	90.91
Pilos quæ nigros, aut fuluos, aut		Podagricorum humorum dinotio	718.719	Psyllij efficacia	72.864
albos faciant	338.339	Podagricorum præseruatiua, dieta		Pygmithium cuius uirtutis	90
Pili utrisque fiant	339	& medicamina	721.722.741	Pteleæ temperamentum	61
Pilos quæ corrumpant, quæ extir-				Pterios facultas	61
pent, & quæ attenuent	340.	Polemonij uires	60	Pterygium quid, curatioque eius	
341		Polemeæ ordeacea uis	48	395.396	
Pilos corruptentia, triplicia sunt		Poli qualitas	60	Pterygium medella	892
332		Polyarchiorum compositio	583.	Ptilosis quid	364.403
Pilorum in palpebris desquij spe-		Polygoni temperamentum	60	Ptilanæ ordeacea uirtus	45
cies & curæ	403.404	Polypodij facultas	60.150	Ptolemæi psorium collyrium	435
Pilos pulchros & denstos quid faciat		Polypodites uinum	154	Pubes puerorum quomodo diutius	
in pueris	337	Polypus qualis affectio, eiusque cau-		sime maneat impubis	46
Pilularum ex fimo caprarum præ-		sa & cura	352.353.354.355	Pudendorum inflammationes, no-	
stantia	192	Pomorum fructus qui optimi	126	mæ, carbunculi, interna in urina	
Pilorum vstorum usus	110	Pompholygis constitutio	89.855	meatu ulcera, quomodo san-	
Pinguedinis animalium usus & dif-		Pompholygis exploratio	368	nes	847.848
ferentia	108.109	Ponderum descriptio	1031	Pudendorum thymi, rimæ & ulcera	
Pinguedinum qualitates & differe-		Ponderum nota	1031	quomodo curanda	
ntia	3	Pondus quomodo dijudicetur	1031	Pumicis qualitas	845.846
Pinguedo & seum quomodo dif-		Populi albæ qualitas	40	Puer febrilis ut exudet	800
ferant	109	Populi nigre facultas	10	Pueri quomodo in literis & disci-	
Pinguis sapor qui	2	Populi nigre oleum	22	plinis exerceant, & qua ata-	
Pini corticis usus	69	Poiricarum carum qualitas	206	te	203
Piperis differentia & efficacia	57	Porcini pulmonis uis medica	109	Puerorum comitialium cura	311
Piri uires & pisorum	14	Posri efficacia	60	Puerorum uictus ratio iuxta ata-	
Piri syluestria, qualia	14	Posri capitari succus quid efficiat	132	tem	203
Piscatoria emplastra	845			Pulegij uires	19.150
Pisces molles qui, eorumque usus	107.108	Posri syluestris facultas	12	Pulices necantia	778
Pisces laxantes	106			Pulmonem purgantia	173

# AETII INDEX.

Pulmonis qualitas	109
Pulmonis uis medica	109
Pulmonis animalium qualitas	103
Pulmonis uenarum rupturæ unde cognoscantur	107
Pulmo nis temperaturæ dinotio	220
Puls farinæ crassioris	45
Pulsium signa	234
Puluillorum ad ozænas compositio	313
Puluillorum inspersilium caput densantium compositio	332
Puluillorum pilos attenuantium compositio	341
Pulsis Theodosij, caput rescians	333
Pupillæ dilatatio quid, & curatio ipsius	392
Pupillæ tabes quid, & unde, eiusque chirurgia	393
Purgandi rationes	148. & inde
Purgantia medicamenta componendi methodus	153. & inde
Purgationis inhabiles	194
Purgatoria omnia stomachum infestare, præter aloë	149
Purgatio ob quinque causas nihil proficit in uentre	165
Purgationis excessus quomodo mendum	155. 170. 171
Purgationi nihil efficient quomodo succurrendum	165
Purgationis aut uenæ sectionis impatientes quomodo curandi	726
Purgationis usus in morbis oculorum	367
Purgatiua medicamenta articulis morbis conuenientia	750
Purpurorum testæ ad quid utiles	117
Pustularum ortus & cura	895
Pustularum in febris curatio	283
Pustularum capitis diuersarum descriptio & medelæ	343. 344
Pustularum diuersi generis medicamentis	823. 824
Puteana aqua qualis	183
Putrefactio quid	250
Putrida febris quæ	243
Pyrethri temperamentum	61
Pyri qualitas	61
Pyriaton lac pyriæphaton lac quod	96
Pyripton lac	127
Pyrites lapis qualis	81
Pyxanthos qualis	50
Pyxis emplastrum	935

<b>Q</b> Valitarum medicamentorum ordines quatuor	1
Quantitatis dimetiendæ tres differentias esse	1031
Quartana, uide Febris	
Quercus qualitas	21
Quid cani & balneo comune, pro uerbium unde ortum	315
Quinquæfolij qualitas	57
Quotidiana febris, uide Febris	

<b>R</b> Abies canum unde causetur	314
Rabioforum canum indicia ibidem	
Radix dulcis usus	19
Ranex uaricosus quid, ubi oriatur mulieribus, & quomodo curatur	102. uide etiam Hernia
Ranarum usus	111
Ranæ palustris attractus quid mali inferat	777
Ranunculi species quali ui	17
Ranunculi sub lingua remedia	470

Raphani qualitas	61
Raphani uis medicæ præparatio	166
Raphaninum oleum	22
Rapi facultas	20
Rarefactientia cutem simplicia	124
Rescidendi signa	242
Reduinarum medelæ	899
Regium medicamentum	109
Regium suffumigium	1028
Remissio morbi quid, eamque dici dupliciter	230
Renale emplastrum	668
Renale unguentum	672
Renibus è lapide laborantibus corporis constitutione gracili existente remedia	672
Renum inflammationis medicamenta	681
Renû duriciæ & suppurationis medicinæ	682. 683
Re nes purgantia	175
Renum calculosorum affectio, & causæ & remedia	668. 669
Renum in animalibus qualitas	103
Renum cruentam urinam excrementum debilitas & remedia	666. 667
Repellentia quæ sint	328. 352
Reprimentia eminentias simplicia quæ sint	124
Resinæ qualitas	856
Resinarum facultates	61
Resinæ quomodo urantur	62
Resinæ fuligo qualis	ibidem
Resolutio seu paralytis quomodo differat ab apoplexia	319. eiusque affectio & curatio ibidem
Respirationis signum	228
Reuulsionis modus	328
Rha cuius temperamenti	61
Rhamni temperamentum	61
Rheoponticum quale	61
Rhinarium collyrium	433
Rhinema collyrium	433
Rhoa qualis	62
Rhododaphniti præparatio	1027
Rhododaphnes proprietates	55
Rhodomeli præparatio	1028
Rheas quid Græcis	407
Rheacidis uires	52
Rheoidarij præparatio	89
Rhois facultas	62
Rhypos qualis fordes	62
Ricinus, arboris fructus	41
Ricininum oleum	41
Ridiculum medicamentum	489
Rimarum in pudendis medicinæ	833. 834. 835
Rimiss platærum quomodo medicaris	902
Robur hominis omne debilius reddit in coitus usu	141
Robur hominis quid	ibidem
Romulæ suffumigium	1030
Roris generatio	180
Rosæ qualitates	8
Rosarum facultas	62
Rosæ cerati usus	24
Rosæ mellis compositio	155
Rosaceum emplastrum	949
Rosaceum oleum	24
Rosati flauum bilem ducentis descriptio	155
Rosatum pituitam & atram bilem trahens	155
Rosatum xemomyron	1026
Rosatorum præparatio	1027. 1028
Rubeta quid, ac quotuplex, & læsionis ab ea quæ fit cura	777. 783
Rubi qualitas	17

Rubiæ tinctorum facultas	32
Rubificantia quæ sint	192
Rubricæ facultas	78. 85
Rubrica Sinopica	78
Rumicis qualitas	43
Ruptio quid, & quo à sinu differat, eiusque medelæ	827
Ruptoria emplastrum	941
Ruptura unde fiat	273
Rutæ temperamentum	58. 116
Rutæ syluestris facultas	54
Rutæ syluestris noxa	790

<b>S</b> Abinum oleum	22
Sacra herbæ proprietates	58
Sagapeni qualitas	857
Sagapenum quale & quid	63
Salamandra quale animalculum, & quæ ab ea homini mala obueniant	782
Salcas oleum	29
Salca olei compositio	1026
Salicis uirtus	36
Salis fomentatio quomodo fiat	143
Salis generum differentia	7
Salis morsus qualis	179
Salis specierum differentia & facultates	85
Salis usus	ibidem
Salis floris qualitas	ibidem
Salis spumæ efficacia	ibidem
Salis purgatorij compositio quadruplex	161
Salis qualitas	856
Sales Iamblichii	561
Sales Poleis	ibidem
Salis de decathæ compositio	562
Sales theriaci quomodo conficiantur	797
Salamætorum ex animalibus qualitates	108
Salis natura	7
Salutæ quorum animalium carnes sunt aptæ, & quæ ineptæ	108
Salus sapor qui	27
Salutæ energia	31. 53
Sambuci facultas	11
Samix terræ facultas	78
Samius after collyrium	423
Sampfuchi uirtus	63
Sampfuchini olei præparatio	212. 744
Sanalia, alio nomine Meliceris	202
Sandarachæ efficacia	89. 789. 855
Sandacoli collyrium	427
Sandycis natua uis	90
Sanguine euacuato, si rursus fluat sanguis, quomodo auxiliandus	724
Sanguinem quæ purgent	153
Sanguinem per nares educens episthema	170
Sanguinis animalium diuersitates, & quæ ex eo remedia	91
Sanguinis uiscosi generatiua alimentum quæ sint	127
Sanguinis ex naribus erumpentis prænotio & significatio	240
Sanguinis narium fluxus in febris curatio	281
Sanguinis in homine alteratio quomodo fiat, aliquando particulatim, aliquando uniuersaliter	302
Sanguinis ex aurb. eruptioni	350
Sanguinis ex naribus eruptio quomodo medearis	356
Sanguis quomodo è naribus eliciatur	357
Sanguinis ex oculorum angulis eruptio quomodo sistenda	397



# AETII INDEX.

Sanguis dracontij	413	Sedis fistulis & tuberculis quæ remedia conueniant	835	ceps, & pagina 119. ac deinde	
Sanguinis ex pectore aut pulmone reiectatio unde proueniat	506.	Sedis omnigenis malis auxiliantia ibidem.	836.837. usque 844	Sinapi quale, & quod optimum	55
quomodo curetur	508	Sedem infantium prociðetem quomodo cures	202	Sinapi uim consimilem quæ habeat	192
Sanguinis reiectationis cuiuscunque auxilia §10. §11. & inde		Sedis infusioñi ratio & differentiæ	177	Sinapismus quid, eiusque usus & præparatio	191.192
Sanguinem meicatum per circuitum, remedia	667	Sedis thymis, uerrucis formicarijs, clauis, fibrosis, hæmorrhoidibus, prociðetis, abscessibus, ulceribus proserpeticibus & depasceticibus, & fistulis quæ medicinæ sint adhibendæ	837. usque 843	Singulus unde sit & eius remedia	531
Sanguinis hircini efficacia	675	Selachia quæ Græcis dicantur	108	Sinon qualis uirtutis	64
Sanguinis ex tefica erumpentis auxilia	690.691	Selini temperamentum	63	Sinus ulcerum quomodo curandi	893.894.895
Sanguinem meicatum cura	691	Selinusæ terræ uirtus	79	Sion quo temperamento	64
Sanguinis abundantia causa agrotantium auxilia	722.723	Semen prouocantia simplicia	125	Siphon quid Græcis	346
Sanguinis testudinis maris præparatio & usus	773	Semen quæ inhibeant	ibidem	Sira, quæ pars corporis dicatur	322
Sanguinis taurini proprietas	788	Semen quæ ætate appareat, & quæ ad generationem aptum fiat	958	Siræum, hepsema, fapa, idem	4
Sanguinis erumpentis cura	879.	Seminis fluxus quid, mulieribus & uiris æque communis, ac quomodo medearis	1000	Siriæsis infantum quid, & quomodo curetur	200
& deinceps		Seminis profluuium quid, & eius remedia	700	Siros quid Græcis	ibidem
Sanguifugorum usus qualis	148	Seminis profluuium in somno quibus & quas ob causas contingat	701. eiusque cura	Siroma quid	30
Sanitate esse duplicem	195	Semperuiui facultas	10	Sisymbrij natura	64
Sapa quid	25	Seneceionis uirtus	33	Sitis duplex	5
Sapa, hepsema, siræum, idem	24	Seneceia ex morbo quæ dicatur	267	Sitis quibus corporis partibus causetur, eiusque dinotio	220
Saponis Constantini, fluxiones reificantes compositio	333	Seneceia naturalis quid	204	Sitis in febribus curatio	279
Saponis Andree comitis ad eadem compositio	ibidem	Senum uictus ratio	204	Sitim esse duplicem	ibidem
Sapores obfcuri quomodo depræhendendi	2	Senum comitialium cura	311	Siticoloforum remedia	134
Saporum alteratio	5	Sepiæ usus medicamentarius	117	Smaragdus uirtus	84
Saporum proprietas	2	Sepe quale animalculum, & quam nocuus eius ictus, tum quæ cura	774	Smegmata ad achoras, furfures, asperitates ac scabrities	345
Sapores xylon, id est, caries lignorum	63	Septica quæ Græcis dicantur	39	Smegmatum caput densantium compositio	332
Sapphiri energia	84	Serum lactis quale, & quomodo præparandum	94.95	Smegmatis ad cutem illustrandam & pilos lanuginosos compositio	341
Sarcites hydrops quid, eiusque causæ & remedia	650.651	Serum lactis quomodo uentrifundatur	133	Smilax hortenſis	20
Sarcocollâ quid & qualis	53	Serpilli proprietas	32	Smilacis natia uis quæ	785
Sardonis herbæ efficacia mirabilis	785	Sesami conditio qualis	63	Smitridis efficacia	83
Satureiæ uis	37	Sesaminum oleum	23	Smyrna, myrrha	65
Satyrasius quid, cur sic uocata, ipsiusque curatio	699.810.311	Sestelli quale	56	Smyrnijs qualitas	65
Satyrj facultas	63	Seris qualis	63	Solani efficacia	69
Scammonis uirtus, & qualitas	149	Seridis nomine quæ herbæ ueniant	127	Solani furiosi efficacia	784
Scandicis conditio	64	Seueri album collyrium	421	Soleorum coria usta ad quid profint	202
Scarcificationis quis usus	647.148	Seuum quomodo differat à pinguedine	109	Solstitium æstiuum quando	182
Scarus piteus qualis	107	Seui ex animalibus usus	109	Solstitium hybernum quando	182
Schinus, lentiscus	67	Siccantia alimenta	135	Solutionis morborum signa	242
Scilla uis	64	Siccantia citra mordacitatem, item simpliciter & secundum quatuor ordines quæ sint	121.122	Sonchi constitutio	65
Scinci ad quid conducant	117	Sicci medicamenti ad scabros oculorum angulos compositio	402	Sorbitionum ex eruo præparatio, ad ulcera depascencia	607
Scheni flos qualis	67	Sicci temperamenti notæ	217	Sordis balneorum usus	19
Schenos lea qualis	67	Siccitas corpora animalium citò ad fenestram producit	224	Sordis in ouium lanis innotuit	101
Scolimi facultas	67	Sicya quali potentia	63	Sordium qualitas	62
Scordij qualitas	64.153	Sicyos agrios qualis	67	Sori qualis facultatis	88.895
Scoriz conditio qualis	89	Sicyonium oleum	24	Soporis grauis curatio	278
Scorodon quale sit	64	Sideritis Heraclea	12	Sparti qualitas	65
Scorpij marini fel quale	98	Sideritis qualis	63	Spathiuros & eius morsus qualis, quomodoque curetur	775
Scorpionis marini plagæ medela	778	Sigilli lemnij usus	78	Sphacelus quid, quæque eius medicamina	888
Scorpionis plagæ opè ferentia	769	Sigillum Coracium	878	Sphæron emplastrum	949
Scorpium (puto ieiuni hominis occidium)	99	Signa bona & mala quæ sint	228.229	Spinæter quid	569.597
Scribentes turpia, peiores quam qui perpetrarint	91	Silique lobj	20	Sphragidis lemnis facultas	78
Scrofi scabiosi & pruriginosi, tum inflammati medelæ	847.848	Siliquæ facultas	40	Spice ortus	182
Scutularæ collyrium	422	Silphij proprietas	64	Spice nardi facultas	55
Scybelites unum quod	561	Silulorum muria quibus conferat	108	Spicati olei compositio	1026
Scylacium collyrium	430	Similaginis qualitas	127	Spinæ albæ uires	11
Scyrala Chalcidica qualis	775	Simplicium medicamentorum facultas traditur, pagina 9. & deinceps		Spinæ Aegyptiæ qualitas	11
Seantia alimenta	132			Spinæ deuoratae ac tonsillis infixæ quomodo excerni possint	489
Se-unda cur sic uocata, & hæc in utero desit quomodo ejiciantur	969			Splanchnon, qualis	19
Secundarum generatio	966			Splenis affectio num cognitio	631
Securidacæ qualitas	33			Splenis intemperierum remedia	633
Secio arteriarum, uide Arteriarum				inflationis 634. in icthrum inducati 636. & inde	
Secio uenez, uide Venæ				Spleniorum usio & dieta, tum iuxta affectionis uarietatem curationes	643.644.645
Sedis affectionum causæ	833			Spodiaca collyria unde dicantur, & qualia sint	414.427
Sedis inflammationum medelæ	833			Spodia	

Spodiaceum coll. Demofthenis 428  
 Spongiae uirtus medica 89.187  
 Spongiarū lapillorum facultas 83  
 Splenem euacuantia 175  
 Spumæ argenti qualitas 854  
 Sputi hominis uis 99  
 Sutorum signa 241  
 Squamæ aris uirtus 87.153.854  
 Squamæ ferri usus 87  
 Squaræ marinæ usus 117  
 Squama stomomatis ferri 87  
 Staete quid & qualis 65  
 Staete myrrha quæ bona 119  
 Stagnina aqua qualis 183  
 Staphis quæ & Aftaphis 16  
 Staphylis usus 65  
 Staphylomata quid, eorumq; differentia & curatio 380.381  
 Staphylinus, daucus 20  
 Staphylinus quali ui 65  
 Steatoma quid, eiusq; cura 914  
 Steatomarum remedia 405  
 Stella famina, terræ famiæ species 79  
 Stellarū ortus & significatio 181  
 Stercoris diuerforum animalium qualitas 99.100.101  
 Stercus exigentia 11.154.163.176  
 Sterilitatem feminis quæ inducant 973  
 Sterilitatis & in uiro & muliere causas & remedia 970  
 Sternutationem quæ moueat 360  
 Sternutationis usus & ratio 359  
 Sternutationes redundantes quomodo sedandæ 360  
 Stertentibus pueris quomodo auxiliandum 199  
 Stibij facultas 89  
 Stibij orandis palpebris 413.414  
 Stibium Alexandri regis 407  
 Stibia alia 407.408  
 Stillicidium urinæ quid, & eius remedium 684  
 Stœchadis temperamentū 65.330  
 Stomachus, id est, gula 322  
 Stomachi adstrictionis remedia 546  
 Stomachi imbecillitas, supinitas & subuersio quomodo curetur 538  
 Stomachi exusti remedia 534  
 Stomachi dissoluti, item inflammationis remedia 548  
 Stomachi exulcerati medicamenta 551  
 Stomacho si qui conuellantur, comitialis modo, curæ 551  
 Stomacho atra bile grauato remedia 531  
 Stomacho commodantia aut incommo-dantia 131  
 Stomachici qui dicantur 620  
 Stomatocarum iltitionum cœfessiones 477.478  
 Stomomatis ferri facultas 87  
 Strangulati quomodo reuocentur 488  
 Strangulatorum auxilia 790  
 Stranguria quid & quomodo curanda 684  
 Stratiotæ collyrium 435  
 Strobili uirtus 48  
 Strumæ quid, eorum ortus & medicamina 910.911  
 Strumarum inter se differentia 910  
 Struthij facultas 65  
 Strutho camelorum caro qualis 104  
 Strutho camelorum oua qualis alimentum 104  
 Struthui facultas 65  
 Stupefacientia medicamenta 729.

Post horum usum qualibus uigentis sit utendum ibidem  
 Stryax qui melior 119  
 Stryacis efficacia 65.153  
 Stryacium oleum 26  
 Stryteria, alumen 89  
 Subfidentia urinæ alba non semper bona 235  
 Subfidentiarum urinæ signa 137  
 Substantiam simplicem & incommixtam inuenire impossibile 75  
 Subtercus hydrops quomodo curatur. 660.661.662  
 Succij boni aut mali qui 129.130  
 Succini uirtus 84  
 Succus Cyrenaicus qualis 56  
 Succus Medicus 56  
 Succus striacus ibidem  
 Sudor, & ex eo pharmacum 98  
 Sudores excludentia 176  
 Sudores quomodo sedentur 170  
 Sudorum significationes 240  
 Suffusiones ad tulsim 501  
 Suffusum ratio 174  
 Suffocati quomodo reuocentur 488.489  
 Suffumigabilis olei præparatio 30  
 Suffumigij moschati præparatio, & aliorum 1028  
 Suffumigiorum uariorum præparatio 1025  
 Suffusio oculorum quid, & eius indicia ac species, tum cura 392  
 Sugillatio quid 372  
 Sugillationum sub oculis curationes 441  
 Sugillatorum medelæ 897  
 Suilla pinguedo qualis 109  
 Suillæ carnis præstantia 102  
 Suillum fel quale 98  
 Suillum lac quale 92  
 Suillus talus ad quid conducatur 110  
 Suis pinguedo qualis 3  
 Sulphuris conditio 87.856  
 Sulphurulentæ balneæ quibus conueniant 186  
 Supercilij resolutionis cura 321  
 Supercilij denudatis quomodo pilos inducas 337  
 Supercilij orandis remedia 441  
 Superfluitates quæ redundant, & quæ careant 128  
 Suppuratoria simplicia quæ 123  
 Suppuratorum affectio & dinotio, curaq; 515  
 Surditatis curatio 347.348  
 Sufinum oleum 25  
 Syca, qualis constitutionis 66  
 Sycofis qualis affectio, eiusq; cura 90.386  
 Sycamina qualia 54  
 Sycomora qualia 54.57  
 Syderon quid, & qualis affectio, eiusq; cura 318.319  
 Syderationis præseruatiua 313  
 Sydero quomodo differat a resolutione, eiusq; affectio & cura 319  
 Syderii ortus & significatio 181.182  
 Syluestria latius fortiora 44  
 Syluestrii animalium caro qualis 103  
 Symphytum petrarum 67  
 Synerotis collyrium 429  
 Syncope quid 300  
 Syncope & lipothymia quo differant 274  
 Synoptici sudores ibidem  
 Synochos febris quæ 247  
 Syriaci lapidis uis 81  
 Syricum, Cernissa 90  
 Syricum collyrium 427

T  
 Abes siue tabida febris quæ dicitur 267  
 Tamarix 54  
 Tauri adeps qualis 3  
 Taurinæ carnis qualitas 102  
 Taurinæ medullæ qualitas 109  
 Taurinum fel quale 98  
 Taurinæ adeps medullaq; qualis 109  
 Taxi efficacia quæ 785  
 Tecolithos qualis 81  
 Telamonium emplastrum 949  
 Tellis, id est, fornem græcum 68  
 Telinum oleum 115  
 Tellinorum usus medicus 257  
 Temperamentorum corporis humani dinotio 116. & deinceps  
 Temperamentorum omnium correctio & medela 223.224  
 Temperaturæ alterationis ratio diuersa 302  
 Tempora inurere an liceat 408  
 Temporum quatuor anni, singulorum tres esse differentias 180  
 Temporum muiculis quæ cataplasmata agglutinatoria, illutiones conueniant 410  
 Tendinum induratorum medela 909  
 Tenefmus quid, & eius cura 601.602  
 Tenuum partium simplicia quæ 122  
 Tephra, id est, cinis 68  
 Tephrica collyria unde dicta, & qualia sint 424.426  
 Tephron collyrium 427  
 Terebinthi efficacia 67  
 Terminus quid, quomodoq; mendendus 895  
 Terra quid, eiusq; qualitas 75  
 Terræ differentia quæ sint 75  
 Terra quomodo lauanda 76  
 Terræ agrorum quæ usus in medicamentis ibidem  
 Terra lemmia seu sigillata 78  
 Terra famia 78  
 Terra selinusia & chia 79  
 Terra cimolia 79  
 Terra Ampelitis siue Pharmacitis ibidem  
 Terra Cretica seu Creta 79  
 Terræ usque uis ibidem  
 Terræ exhalationum seu uaporum ratio 181  
 Terræ quæ in emplastra commiscetur 816  
 Terræ intestina ad quid cōferat 115  
 Tertiana, uide Febris  
 Testarum clibei usus 83  
 Testa interorum naturam esse excontrarij facultatibus compositam 133  
 Testæ onori ad quid cōducant 105  
 Testa interorū piscium qualitas 107  
 Testa mollitiorum conditio ibi  
 Testarum conciliorū qualitas 85  
 Testarum fidilium qualitas 856  
 Testamentū aurifabri collyriū 437  
 Testamentum, collyrium ibidem  
 Testes animalium qualis temperamenti, quiq; esu optimi 103.104  
 Testium temperamenti indicia 122  
 Testiculus canis qualis 56  
 Testiculorum castronis usus 114  
 Testiculorū canis flumacilis usus 115  
 Testudinis fel quale 98  
 Tetanica consulsio quos non inuadat 324  
 Tetanus quid 324. unde proueniat & quomodo curetur, ibidem  
 Tetragæathus quid, eiusq; idus medela 767  
 Tetra

# AETII INDEX.

Tetrapharmacum basilicum 947  
Tetrapharmacum medicamen 109  
Tetrapharmacum compositio 751  
Teulon quale 67  
Thalassorum Hermophili, collyriū 434  
Thapizæ facultas 34.857  
Theion sulphur 87  
Theodoretos antidotus triplex 807.808  
Theodotium magnum 438  
Theodotium Seueri ibidem  
Theodotium nardinum coll. 435  
Theodotium Placianum 437  
Theophilum collyrium 431  
Terebinthina resina 62  
Theriace confectio, usus & probatio 792.793.794  
Theriace exhibitionis modus quis 795  
Theriace ex uiperis Andromachi compositio 791  
Theriace Oribasij, qua Marcus Imp. est usus, compositio 805  
Theriaca eiusdem alia 806  
Thermus fatuus 34  
Thermus sylvestris 34  
Thlaspi quali uirtute 34  
Thryallis, uerbasci species 70  
Thridacis qualitas 34  
Thronus Marcellius pastillus 614  
Thuris facultas 49.857  
Thuris dijudicatio 119  
Thuris cortex qui melior ibidem  
Thyrs lapis qualis 81  
Thylacitidis facultas 52  
Thymus niger, elleborus 35  
Thymi proprietates 35.153  
Thymi pudendorum quomodo faciendi 845  
Thymi sedis quid, unde dicti, & que eorum cura 837  
Titanus, id est, calx 68.89  
Tithymalli uirtus 151  
Tithymallorum efficacia 68  
Titianus pessus 1012  
Toforum in artubus quæ sit causa podagricis 718  
Toforum in artubus cura 749  
Tomentorū subditiōis ratio 179  
Tonsillarum inflammationum remedia 479  
Tonsillarum ulcera qualia, quomodo fiant & curentur 480.481  
Tonsillis infixas spinas quomodo educas 489  
Tonforis emplastrum 654  
Torminum intestinorum ortus & cura 599. & 601.608. & inde usq; 618  
Torpedinis qualis caro 108  
Torpedinis usus 116  
Torpor, uide Lethargus.  
Troxicum unde dictum, & quæ eius uis 787  
Tragacanthæ dinotio 119  
Tragacanthæ, qualis 69  
Tragorogani facultas 56.150  
Transcuntia tarde quæ sint 132.133  
Tremorum in febr. curatio 285  
Tribuli efficacia 69  
Trichiasis quid 364  
Trichiasis quid & quomodo curanda 364  
Trifolij facultas 51.69  
Trifolium pro satyrio 63  
Trigla piscis qualis 106  
Triphyllon, trifolium 69  
Tritici facultas 61  
Triticeæ farinæ usus in cataplasmatibus 190

Trixago qualis natura 70  
Trychiny facultas 69  
Tubera qualia sint 69  
Tumores pedum grauidarum quomodo curandi 960  
Tumores faciei scicofos quomodo cures 450  
Tumoris gutturis medelæ 912  
Tumoriū pultacei ac mellei humoris curatio 912.913  
Tumoriū adiposorū medelæ 914  
Tumorum cancerorum medicamina 889  
Tumorum durorum, item crudorū & inconcoctilium medicamenta 735.736  
Tumorum laxorum medelæ 905  
Turdi pisces quales 107  
Turturis sanguinis usus 91  
Turturis marini plage auxilia 777  
Turturum eius qualis fiet 126  
Tulsis causæ & remedia 497. & inde  
Tympantes hydrops quid, eiusq; causæ & remedia 650.651  
Tyrrhenicum emplastrum 938  
V  
Vaporum ratio 7  
Vaporum terræ ratio 180  
Vaporariorum fomentorum usus et modus 143  
Vari circa quam oculi partem oriatur 377  
Varos faciei tollentia 446  
Varices quid, & quæ curentur 903  
Varices palpebrarum 405  
Vasculi mensuratio 1031  
Valorum dilatatio ubi, & quomodo fiat, & quomodo curanda 915  
Valorum oscula quæ simplicia aperiant 123  
Valorum sectionis usus 410  
Venam in anno sepe incidere, inco modum & cur 147  
Venæ sectionis usus in, oculorum morbis 366  
Venæ sectionis aut purgationis impatientes quæ curandi 726  
Venæ sectionis usus in febr. 248  
Venæ sectioni quod corpus aptum ibidem  
Venæ sectioni quæ obstant ibidem  
Venæ sectio quibus conueniat, & cur fiat, quæq; in ea sint consideranda 144.145  
Venæ quales secandæ, & quomodo 145  
Venæ sectionis quæ magnitudo, figura, & quod tempus sit 146  
Venæ sectionis iteratio quomodo fiat & quando 146.147  
Venarum pulmonis rupturæ unde cognoscantur 507  
Venarum apertio & corrosio unde proveniat 507  
Venæ eleuatas & incuruas ex membris fluxione infestatis auferendas 723  
Venenata animalia quibus artibus tollas 763. eorum moribus quomodo medearis ibidem  
Venenata animalia quæ fugiet & quæ occidant 764  
Venentorum animalium quæ letaliter corrumpant 778  
Venenosum pharmacum ne lædat præseruatua 779  
Venenum qui sumpserint quomodo cognoscendi 779  
Veneni omnis curationes communes 780

Venenatorum plagis omnibus communia remedia 764  
Venter quinque de causis purgatorio accepto, nihil excernit 165  
Ventris suppressionem, plurimorum malorum esse causam, quæque ea sint, & eorum cura 177  
Ventrem subducentia 133  
Ventrem supprimentia 134  
Ventris temperaturæ dinotio 220  
Venti cur aliquando post, aliquando ante pluiam ueniunt 181  
Venti multi & assidui boreales curantur ibidem  
Ventos locales uniuersalibus morbosiores esse 181  
Venti apogei qui ibidem  
Ventorum iuxta situs qualitas 181  
Ventorum generatio, numerus & nomina 181  
Ventus & imber quomodo simul fiant 181  
Venus, emplastrum 936  
Venem emortuam quomodo excites 703  
Veneri quæ natura ac diætæ commodiores, item quod tempus 142  
Veneris herba uires 58  
Veneriei signa 222  
Veratri qualitas 31  
Veratri nigri uirtus 150  
Veratrum quomodo & quando quibusq; dandum, & quibus non, quidq; facere possit, ac quæ probata sint nota 167  
Veratri purgandi ratio, eiusq; exhibendi differentiæ 168.169  
Veratri cremor, decoctum, ramenta &c. qualia 168  
Veratro purgadis quæ sit diætæ præscribenda ibidem  
Verbaſci species & facultas 70  
Verbenacæ usus 58  
Verberum uibices seu notæ quomodo curandæ 449  
Vermes ulcerum quid curet 36  
Verruca, & uerruca formicaria quid & unde uocata 837  
Verrucarum, tum uerrucarum formicarum remedia 838  
Vertigo unde oriatur, & quomodo curanda 298  
Vesica bilis susceptrix 97  
Vesicæ collum ubi situm 322  
Vesicæ doloris in febribus curatio 281  
Vesicæ calculorum remedia 672  
Vesicæ calculis & etiam renem simul 673.676.677.678  
Vesicæ calculos atterentia medicamenta 673  
Vesicæ inflammatio, qualis affectio & cura 689.690  
Vesicæ sanguinis fluoris auxilia 690  
Vesicæ tubercula quomodo ad maturitatem producenda 692  
Vesicæ ulcerum curatio ibidem, & inde  
Vesicæ laborantium diætæ 697  
Vesicæ fluxionis auxilia 698  
Vesicæ resolutæ curatio 322  
Vesicæ scabiosæ medicamenta 687  
Vesicæ paralyſi dissolutæ auxilia 688  
Vesicam quæ purgant 175  
Vespa & apes fugantia 765  
Vibicum à uerbere illatarum remedia  
Vigens ratio cuiq; ætati 449  
Vigiliarū in febribus remedia 277  
Vigo

# AETII INDEX.

Vigoris totius morbi cognitio 231  
 Vinaceorum facultas 19  
 Vini vis 55  
 Vinorum qualitas iuxta colorem 134.135  
 Vinum cur acefcit 5  
 Vina quomodo alant 127.128  
 Vina qualia fenibus cōueniant 158  
 Vini bilē & pituitam purgantis præparatio 154  
 Vinum quod melancholicis auxilietur quomodo componatur ibidē  
 Vini potus ufus in morbis oculorū 366  
 Vinum polypodites 154  
 Vinū multum stercus exigēs ibidē  
 Vinū multum flauū, itē quod atrā bilē, itē quod pituita expurget 155  
 Vinum fcybelites quod 561  
 Vindemiatoris ortus 182  
 Violæ qualitas 35  
 Violæ albæ energia 153  
 Violatum oleum 26  
 Viperae ufus & qualitas 112  
 Viperarum adeps qualis 109  
 Viperarū capitū ufus medicus 110  
 Viperarū efus & præparatio in elephantia 812  
 Viridis iafpidis ufus 552  
 Viscerum animalium qualitas 103  
 Visci vis & constitutio 35  
 Viscum optimū quod 118  
 Vitex fūe Agnos 9  
 Vitis albæ vires 12  
 Vitis nigrae facultas ibidem  
 Vitiliginum origo, & curatio 826.827  
 Vitulinae carnis qualitas 102  
 Vitulinum feum quale 109  
 Vitri vis medica 83  
 Vitri leuiffimē tritusus 406  
 Vlerationis quæ os facrum, item circa frotum & anum, in febrivacuratio 282.283  
 Vlcera fedis proferpentium & de pascitum medicinæ 843  
 Vlcera, & cautorum ulcerum curā dorum ratio 864.865  
 Vlcera fuppurandorum, repurgā-dorum ac incarnandorum medicamenta 865  
 Vlcera carne excrefcientum remedia 867  
 Vlceribus cicatricē inducentia 868.869.870  
 Vlcera quæ citra mordacitatem exiccent 871  
 Vlceribus medicamentorum adhibendorum ratio ibidem  
 Vlcera ligamenti ratio 872  
 Vlceribus malignis qualia emplaftra conueniant 873  
 Vlcera poft cicatricem obductam rufus ruptorum cura 874  
 Vlcera uermes ac nomas ac putredines quomodo fanes 875  
 Vlceroſæ lafitudinis caufa & cura 210  
 Vlmi qualitas 61  
 Vlophoni efficacia 787  
 Vmbilici puerorum prociētiæ caufa & cura 202  
 Vmbilici ueneris uirtus 44  
 Vnguenta odorata quibus commo-

dent, eorumq; ratio 30  
 Vnguenta recalcitatoria poſt ſtupelactiuorum medicamentorū ufum adhibenda qualia 729  
 Vnguenti purgatorij cōpoſitio 171  
 Vnguentorum ſiccorum moſchatorū ac uariorū præparatio 1025  
 Vnguentorum quæ cocturam ſuſtineant, & quæ non 856  
 Vnguis oculi quid, ipluſq; cura 395.174  
 Vnguuium abſceſſuum medelæ 899  
 Vnguuium contuſorum, ſubcruento rum, motorum, ſcabrorum ac leproſorum cura 900  
 Vnguibus reparandis quid conueniat 901  
 Vnguui ex animalib. quib. ufus 110  
 Vocalis instrumenti reſolutio quomodo curetur 322  
 Vociferatio quid, eiusq; ufus 139  
 Vocis ſuppreſſæ & alperæ, aut rauræ & cat. 492. & inde  
 Volucris animalū caro qualis 104  
 Volucrum animalium partes quomodo differant 104  
 Voluulus quid, eiusq; generatio & remedia 567  
 Vomentes ægrē quō iuandū 223  
 Vomitus ratio. & ufus inſignis, item quibus conueniat & quibus non 165.166  
 Vomitus quæ iuuent, quæq; ſedent 166.167.168. & inde  
 Vomitoria qualia debeāt eſſe 166  
 Vomitus prænotio & ſignificatio 239  
 Vomitus cataplaſmata & epithemata 543  
 Vranium collyrium 427  
 Vrentia medicamina 882  
 Vrinarum qualitas 98  
 Vrina an bibenda 98  
 Vrinæ notæ 139  
 Vrinæ prociēdiæ qualis glans præparetur 175  
 Vrinā cientiæ remedia 656.673  
 Vrinarum ſigna 234.237. & inde  
 Vrina naturalis & optima quæ tam in ſanis quā ægris 235  
 Vrinæ ſubſidentia alba non ſemper bona ibidem  
 Vrinæ ſubſidentiarum ſigna 237  
 Vrinarum oleoſarum differentie & ſignificationes ibidem  
 Vrinæ difficultas quid, & eius remedia 684  
 Vrinæ difficultatis in febris auxiliā 695  
 Vrinæ ſuppreſſio quid 686. eius medicinæ 686  
 Vrinam in ſomno emittentium auxilia 689  
 Vrinæ mucoſæ, capillis aut lanis ſimilis, medicamenta 698  
 Vrinum fel quale 98  
 Vrinum feum quale 109  
 Vritæ vires 10  
 Viſta quomodo mutant qualitatem ſuam 76  
 Viſtita ſimplicia quæ 124  
 Vteri animalium qualitas 104  
 Vteri ſitus, magnitudo & forma 955

Vtero prægnantis quæ & quo ordine inſciantur 956  
 Vteri frigidiſſi ſigna & medicinæ 972  
 Vteri calidiſſi indicia & curatio 972  
 Vteri humidiſſi ac ſiccioſi medicinæ 973.974  
 Vteri ſtranguationis remedia 995. & inde uſq; 999  
 Vteri ſuffocationis auxilia 999  
 Vteri debilitati ſanatio 1000  
 Vteri furor, reſolutio & prolapsus quomodo medantur 1001  
 Vteri reſclinationis, auerſionis & reſcurſus medicamina 1003  
 Vteri inſlatio & hydrops quomodo curentur 1004.1005  
 Vteri tumoris laxi & inflammatoris pharmaca 1007.1008  
 Vteri in tumorem indurati medicamina 1011  
 Vteri abſceſſuum uariorum medicinæ 1013.1014  
 Vteri exulceratio, ulcera carbunculofa & fordiſſa, quomodo curentur 1015.1016  
 Vteri humor profluus & nomæ quomodo medenda 1016  
 Vteri cancri obturationisq; medicinæ 1017.1018  
 Vterus non perforatus tripliciter contingit, & quomodo curetur 1019  
 Vteri hæmorrhoidum & calculorū medicinæ 1020  
 Vteri thymorum, uerrucarū, & verrucarum formicarum medicinæ 1022  
 Vteri condylomata, rugæq; ac ſiſſuræ quomodo curentur 1023  
 Vterum euacuantia 175  
 Vuæ temperamentum 65  
 Vuæ immaturæ ſuccus quo differat ab aceto 5  
 Vuæ paſſæ qualitas 16  
 Vuarum reponendarum ratio 65  
 Vulcania quid 411  
 Vulerum cruentorū remedia 857  
 Vuleribus cruentis glutinandis ac comoda emplaftra 916  
 Vulpes quem ufum in medicamentis præſtant 111  
 Vulpini pulmonis uis medica 109  
 Vulpinis adeps qualis 171  
 Vulſio quomodo fiat & curetur 897

X  
 Anthi qualitas 55  
 Xeromyron ad capitis fluxionem 333  
 Xiphion qualis 55  
 Xylocolle dinotio 118  
 Xyſter collyrium 431.432

Z  
 Arinaca, bolus Armenicus 80  
 Zarnacha idem ibidem  
 Zea quid 33  
 Ziger, ſpecies Caſiæ 118  
 Zingiberis uirtus 33  
 Zoili nardinum collyrium 436  
 Zoili Nicarium, collyrium 436  
 Zygis ſerpylli ſpecies 32  
 Zyma, id eſt, fermentum, quale 33  
 Zythi qualitas 33

## FINIS INDICIS.

*Lugduni excudebant Godefridus & Marcellus  
 Beringi fratres, M. D. X L I X.*

